

a.4.

9683

1/14

K6/3





4 \$ parts
169 parts in all
1/14

1798 —

1. *Jonstoni, historiae naturalis de arboribus et fruticibus tam nostri quam peregrini orbis*
Libri decem. Francof. a. M. 1662. c. fig. Pzb.
Fol. Van Fleischer d. J. Phil. in Leipz. Mus. 32. f. aug.
bolem. (1802.)

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES





HISTORIA NATURALIS
DE AUIBUS
LIBRI VI.
Cum aeneis figuris
IOHANNES IONSTONUS
MED: DOCTOR
Concinnavit.

FRANCOFVRTI AD MOENVM
Impensa

MATTHÆI MERIANI.
M. D. C. L.



Cum Privilegio S. Cæs. M. et Regis Christianissimi



Dresdae, 1791

Extraict du Privilege du Roy.



OVIS parla grace de Dieu Roy de France & de Nauarre. A nos amez & feaulx conseillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Bailiffs, Seneschaux, Preuots ou leurs Lieutenans, Et a tous autres nos officiers, quil appartiendra, Salut. Nos chers & bien amez les heritiers de feu Mathieu Merian de Francfort, Nous ont fait remonstrer quapres le decedz dudit defunct, ils ont trouué dans ses effects, vn Liure contenant quatre Tomes Intituléz, *Historia naturalis Iohannis Ionston*

Med. De quadrupedibus, De avibus, De piscibus & Cetis, De Insectis, serpentibus & Draconibus. Que les exposans desireroient faire Imprimer, Vendre & distribuer en nostre Royaume. Mais parce que cét oeuvre ne se peut faire sans nostre permission, & quelle est de long trauail & de grandz frais, ilz craignent dén estre soustrez par dautres, sil ne luy est surce par nous pourueu de nos lettres necessaires. A Ces causes desirant faire part a nos subjects dvn oeuvre si considerable, Nous auons de nostre grace speciale, Permis & octroyé ausdits Exposans de faire Imprimer, Vendre & debiter ledit Liure par les Libraires & Imprimeurs que bon leur Semblera, pendant le temps de cinq ans, faisant tres expresses Inhibitions & defences, a tous autres Marchands Libraires, & Imprimeurs, dImprimer vendre ny distribuer Ledit Liure sans la permission des Exposans, soubz changement de Tiltre, faulce marque ou autrement, apeine de confiscation des exemplaires, & de Trois mil liures damende applicable moitié á lHostel Dieu, & lautre aux exposans. A la charge dén mettre deux exemplaires en nostre Bibliotecque Publicque, & vn en celle de nostre tres cher & feal Chler le Sr. Molé Garde des Sceaux de France. Mandons au premier nostre Huissier ou Sergent surce requis, faire pour lentiere execution des presentes, tous exploits & actes requis & necessaires, sans demander autre congé ny permission, Car tel est nostre plaisir. Donné a Paris le xij Iour de Feburier, L'an de grace mil six cens cinquante cinq, & de nostre regne le douziesme.

*Par le Roy en son Conseil
Coupeau.*

ILLUSTRISSIMIS HEROIBUS:

DN. JACOBO HIE-
RONYMO DE ROZDRA-
ZEWO ROZDRAZEWSKI, DO-
mino in Krotoszyn, Castellano Califfienfi, Capi-
taneo Coninenfi, &c.


ET

DN. HYACINTHO DE ROZ-
DRAZEWO ROZDRAZEWSKI, DOMINO IN
Novvomiasto, in Exercitu Sereniffimi Poloniae & Sue-
ciae Regis, Equitatus gravis armaturae
Chiliarchae, &c.

DOMINIS SVIS GRATIOSISSIMIS,

Hanc Historiae Naturalis de Avibus partem, ob-
servantiae monumentum, exhibiti sibi favoris
memor, offert & dedicat

IOANNES IONSTONVS Med.D;



HISTORIÆ NATU- RALIS DE AVIBUS LIBRĪ VI.



P R Æ F A T I O:

*In qua & de Operis ratione, & de Avium naturâ
in genere, agitur.*



Quaticos gre-
ges, aëreus *Avium*
feu volucrum grex
insequitur, *Benevole*
Lector. Inditum iis
id nomen, non tam
quod pervia discur-
rant, iisdemq; delectentur, ut Isidoro
& Perotto placet: vel ab adventu,
quod inde venient, unde quis non su-
spicetur, ut Festo: quàm vel à volâdo,
quod Ebreis *חַי* dicitur, ut Martinius
in Lexico deducit, vel ab *αἰέν*, audien-
do, quod Scaligero patri visum. Græ-
cis, *ορνίθες* ab *ὄρνις* & *οἶκος*, *ορνέας*, *κινώπια*,
&c. vocantur. *Collum* omnes & *dor-*
sum & eas quæ terram spectant, quæq;
pectoris vicem gerunt, partes, cum
cæteris animantibus communes ha-
bent: peculiare præ cæteris, *alas*, *pen-*
nas, quibus caulis, plumas & *rostrum*,
quod in senecta durefcit. Neq; *la-*
bia ipsis sunt, neq; *dentes*, neque *manus*
pedesve anteriores, neq; *auricula*, neq;
nares, sed meatus horum sensuum, ad
odoratum in rostro; ad audiendum in
capite. *Oculos* similiter atque aliæ
animantes, duos sine palpebris habet.
Connivent inferiore gena graviores:

nictant ab angulo obeunte membra-
nâ omnes. Aristoteles, *σπασσάμενός τις*
ἐν τῇ καυθῇ δέξιματι θρόνον, dicit. *Femur* Arist. H. A.
simile coxæ, longum, ad medium usq; l. 3. c. 11.
subeuntem atque affixum ventrem:
quod cum avulsū est, *coxam* putes:
At ipsa coxa, quæ inter hoc & tibiam
est, alia quædam pars esse videatur.
Maxima unguibus, & *pectus*, aliis
robustius. Pro *cauda* clunis est, iis qui-
bus aut crura longa, aut pedes conti-
nuatâ planicie dati, brevis, longus a-
liis. Alas in priora curvant. Omnium Arist. l. c.
animalium *bipedes* sunt ut homo: quâ Plin. H. N.
vis retrorsum curvant crura, qua- l. 11. c. 45.
drupedum modo. Uncos habentium & 47.
longi, & quæ ad aquas versantur. Ca- Plin. H. N.
rent tamen iis Cypseli, & quoddam l. 8. c. 39.
Manucodior. genus. Omnes sunt
πυλόνυχτοι, sed & omnes quodammo-
dò *πολυδακτύλοι*. Plurimis namque digiti
discreti sunt: & *τα ὅλα τὰ τετραπόδα* qui-
dem, dearticulatos tamen atq; distin-
ctos habent digitos. Plinius eos a Plin. H. N.
lias habere dixit, palmipedes esse a l. 11. c. 47.
lias, alias inter utrumq; divisos digitis,
adjectâ latitudine. Quæ volatu sub-
limes feruntur, omnibus quaterni di-
giti, tres in anteriore parte, unus ponē
pro

Scalig. in
Hist. Ani-
mal. l. 1.
p. 48.
Arist. H.
A. l. 2. c. 15.
edit. Sca-
lig.

pro calcaneo plurimis. Pauca binas ante, totidem post habent. Quibusdam etiam calcaria sunt, Uncungues autem & calcarigeræ, nullæ. Plinius, nifallor, radios dixit. Illæ sunt volucres; hæ humiles. Data nonnullis & surrectis pennis crista, Soli gallo peculiaris, quæ nec caro est, nec à naturâ carnis aliena. Interiora si attendamus, *Lingua* fortitæ omnes sunt, sed diversam: aliæ longam, latam alia, quæ præter cætera animalia, literas sonò exprimunt: aliæ ante ex cornu acutissimo, retrò ex carne compositam, ut in historia occurret. *Lingula* quæ gurgulioni imposita est, nulli: apertione & contractione ita meatum temperant, ut prohibeant, ne quid gravioris in pulmonem demittatur. *Viscera* & inter se & ab aliis animalibus differunt. Præjacet in quibusdam ventriculo ingluvies, seu cavum amplumque corium, in quod receptus cibus per initia coquitur; à gula angustius, dein laxius, & rursus, quò ad ventriculum demittitur, arctius. *Ventriculus* plurimis carnosus & compactus: pelle interiore robusta, etiam cum à carnofo ablata est. *Ingluvie* destituta, gulam capacem latam, aut totam quâ vetriculo jungitur obtinere, ut monedula, corvi, coturnices: quæ tali carent, longam habent, & liquidius præ cæteris excernunt, ut Porphyrio. Complurimis *intestinum* tenue, & si explicetur simplex. *Appendices* explicatæ sunt, sed pauca, neque superne ut piscibus, sed in ima parte ad intestini extrema. *Fel* non eodem loco habent, quædam enim *περὶ τῆ κεφαλῆς*, quædam *περὶ τοῦ ἐντέρου*, ut columba, hirundo &c. *Testiculos* *περὶ τῆ ὀσφύς*. Antequam coeant, quibusdam sunt parvi, quibusdam obscuri & *ἀδηλοῖς*; tempore coitus majores fiunt. *Genitura* alba est. Vesicæ carent, quòd larga humoris copia ad pennarum ortum & incrementum requireretur, ut Aphrodisæo visum. Pennigeri hujus exercitus loci sunt Aer, aqua, terra. Illum sulcant, unde Aves cœli dicuntur; in hac gradiuntur; in ista quædam natant. Sunt tamen quæ in quibusdam locis non inveniuntur, de quibus ita Plinius.

Hæc quoque mira naturæ differentia: alia aliis locis negat; tanquam genera frugum fruticumve, sic & animalium non nasci translativum; invecita emori, mirum. Quid est illud unius generis salutis adversum, quæve ista naturæ invidia? aut qui terrarum dicati avibus termini? Rhodus aquilam non habet: Transpadana Italia juxta Alpes Larium lacum appellat, amœnum arbusco, agro, ad quem Ciconiæ non permeant: sicuti nec octavum circa lapidem ab eo, immensa alioqui finitimo Insubrium tractu examina graculorum monedularumve. *Picus Martius* in agro Tarentino negatur esse &c. Sed nec eadem semper omnibus regio. Faciunt enim quædam, ut in gruibus, Ciconiis & aliis dicemus. Unde Plinius. Temporum magna differentia avibus. Perennes, ut columbæ, semestres ut hirundines: trimestres ut turdi & turtures, & quæ cum factum eduxere abeunt, ut galgali, uppæ, Scilicet. Migrant quædam, alio non procul à locis in quibus morabantur secedunt, & seipsas abdunt, & quidem nullo discrimine, tam quàm *ἐνθωπύχοις*, quàm *καμψόνοχοις*. Vicitant carnibus, insectis, herbis, granis, & seminibus, piscibus & ranis. Sola Emmo prunas etiam devorat, ut in ejus descriptione dicitur. Bibunt suctu ex his quibus colla longa, intermittentes, & capite resupinato velut infundetes sibi: Porphyrio solus morsu. Non bibunt *καμψόνοχοις*, quod Herodotus, ut Aristoteles scribit, ignoravit. De Generatione notandum, duobus modis fieri coitum; sceminâ humi confidente ut in gallinis: aut stante, ut in gruibus. Quædam omni tempore coeunt, ut gallinæ, & pariant, præterquam duobus mensibus hyemis brumalibus: plerumque tamen vere & ineunte estate: quo tempore etiam pleræque pariant, & quidem semel. *Oscimes* præter exceptas, inquit Plinius, non temerè fetus faciunt ante æquinoctium vernum, aut post autumnale: ante solstitium autem dubios, post solstitium vitales. Ova ferunt omnes, vespertilione excepto, qui animal. Infœcunda sunt quæ ad uncos habent ungues. Tribuit hoc avium generi natura, ut fecundiores essent fugaces earum quàm fortes. Ovorum alia

Arist. H. A. l. 2. p. 213. edit. Scal.

Albert. M. de Animal. 2. tr. l. c. 6.

Arist. H. A. l. 2. c. 22. edit. Scalig.

Arist. H. A. l. 2. c. 16.

Arist. H. A. l. 3. c. 1.

Arist. H. A. l. 6. c. 9.

Arist. H. A. l. 6. c. 2.

Aphrodis. Probl. p. 1. q. 108.

Plin. H. N. l. 10. c. 29.

Arist. H. A. l. 8. c. 12.

Plin. H. N. l. 10. c. 28.

Arist. H. A. l. 8. c. 21. edit. Scalig.

Plin. H. N. l. 10. c. 46.

Arist. H. A. l. 8. c. 18.

Plin. H. N. l. 10. c. 52.

Plin. H. N. l. 10. c. 53.

Arist. H. A. l. 5. c. 8.

Arist. H. A. l. 6. c. 1.

Plin. H. N. l. 10. c. 31.

Plin. H. N. l. 10. c. 52.

sunt candida, ut columbis & perdici-
bus: alia pallida, ut aquaticis: alia pū-
ctis distincta, ut meleagridi: alia ru-
bri coloris, ut Phasianis. Intus omne
bicolor. Exeunt rotundissimā sui par-
te dum pariuntur, molli putamine,
sed protinus durefciente, quibuscun-
que emergunt portionibus. Tempus
a coitu, partus excubationis, & nume-
rus variant, ut apud Plinium videre
est. Aliquando fœmina tantum in-
cubat, aliquando mas. In columbar.
genere, interdum mas, noctu fœmina:
inter palumbes post meridiem in ma-
tutinum fœmina, cætero mas. A coi-
tu inhorrescunt & se excutunt, sæpe
etiam aliqua festuca lustrant: quod &
edito ovo faciunt. Sunt etiam quæ-
dam his bella amicitiaeq; unde & af-
fectus. Dissident olores & aquilæ:
corvus & chlorio, noctu invicem o-
va exquirentes. Simili modo corvus
& milvus, illo præripiente huic cibos.
Rursus cum terrestribus, mustela &
cornix: Aegithus avis minima cum
asimo. &c. De Motu ita egregie *Pli-
nius*. Omnibus animalibus reliquis
certus & uniusmodi & in suo cuique
genere incessus est: aves solæ vario
motu feruntur, & in terra & in aëre.
Ambulant aliquæ, ut cornices: saliant
aliquæ, ut passeris, merulæ: currunt,
ut perdices rusticulæ: ante se pedes
jaciunt, ut ciconiæ, grues: expandunt
alas pendentesq; raro intervallo qua-
tiunt (ut milvi) aliæ crebrius sed & pri-
mas duntaxat pennas: aliæ & tota la-
tera pandunt (ut corvi) quædam ma-
jore ex parte compressis volant (ut pi-
ci) percussioq; semel aliquæ & gemino
ictu aëre feruntur: (cardueles) vel ut
inclusum eum prementes ejaculatur,
sefe in sublime, in rectum, in pronom.
(hirundines) Impingi putes aliquas,
(perdices) aut rursus ab alto cadere has,
(alaudæ) illas salire, (coturnices) Anates
solæ, quæque sunt ejusdem generis in
sublime protinus se rollunt, atque è
vestigio cælum petunt, ut hoc etiam
ex aqua. Itaq; in foveas, quibus feras
venamur, delapsæ solæ evadunt. Vul-
tur & ferè graviores, nisi ex procurfu,
aut altiore cumulo immisæ non evo-
lant, cauda reguntur. Aliæ circum-

spectant, aliæ flectunt colla. Sine vo-
ce non volant multæ: aut e contrario
semper in volatu silēt. Subrectæ, pro-
næ, obliquæ, in latera, in ora, quædam
& resupinæ feruntur: ut si pariter cer-
nuntur plura genera, non in eadem na-
tura instare videatur. De cætero, por-
rectis ad eandem cruribus volāt, qui-
bus longi pedes: quibus breves, con-
tractis ad medium. Uncos ungues ha-
bentes altivolæ ferè sunt, exceptis no-
cturnis. De voce hoc dicere sufficiat,
loquaciores quæ minores, & circa coi-
tus maximè. Aliis in pugna vocem,
ut coturnicibus, aliis ante pugnam, ut
perdicibus: aliis cum vicere, ut galli-
naceis. Iisdem sua maribus: aliis ea-
dem, ut fœminis, ut lusciniarum ge-
neri. Quædam toto anno canunt, quædam
certis temporibus. Palum-
bibus omnibus similis & idem trino
conficitur versu, præterquam in clau-
sula gemitu. Est quæ boum mugitus
imitetur, in Arelatensi agro *taurus* ap-
pellata, alioquin parva. Est quæ equo-
rum quoque hinnitus *anthus* nomine,
herbæ pabulo adventu eorum pulsa
imitatur, ad hunc modum se ulciscēs.
Varium & vitæ inter eas spacium. Ma-
res passeris negantur anno diutius vi-
verè. Columbæ & turtures ostenis
durant. Cornicibus & cervis, nescio
quot tribuuntur lustra. *Morbis* infe-
stari nullum dubium, & habentur ap-
ud authores remedia. Conferunt *Arist.* H. A.
illis οὐ ἀνιχμοί, incommodant τὰ ἐμπύρεστα l. 5. c. 13.
em. Invaletudinis indicium in pennis.
τὰ ἐμπύρεστα ἴδ' καὶ τὴν αὐτὴν ἔχει κατὰ πρῶτον.
Quæ de Natura, ingenio, cicuratione, do-
cilitate, & affectibus occurrunt, abun-
dè in Historia explicabuntur. *Divina-
tionis* iisdem aliquid inesse, comper-
tum est. Grues ex mari in mediter-
raneo volantes, si silent, serenitatem
pollicentur, si clamant, atrocem tur-
binem. Idem sonans in crepusculo
matutino Ardea, prænunciat, quæ &
pluviam si ad mare rectè tender, præ-
dicat. Sereno canens noctua, volubili
sono crocitas corvus, crepusculo vo-
cales cornix & graculus; monedulæ
modò sursum, modò deorsum versus
volantes, &c. tempestatē innuunt &c.
Vsum homini præbent, in cibo, Medi-

dicina, venatione, re vestiaria & plumarum, oblectatione & aliis. Caro earum levior & sanior, purgatissimaque in suo genere est, ut Albertus dixit.

Differentia Avium sunt infinitæ, ex multisque fontibus petuntur. *Partes* si respicias, aliæ habent *rostrum* rectum, aliæ, superius, inferius, aut utrinque incurvum, *Pedes*, quædam longos, breves quædam. Aliæ sunt

Arist. H. A. l. i. c. 2. e- digitatæ, aliæ palmipedes, aliæ inter utrumque divisas digitis, nonnullæ apodes: *Caput* aliis cristatum, sine crista aliis, sunt & cornutæ, ut apud

Aelian. H. A. l. 17. c. 10 Aelianum videre est. *Collum*, aliæ longum, ut grues; aliæ breves obtinuerunt. De *Lingua* superius attigimus.

Ala, plerisque proportionem: sola Dodo tam exiguas habet, ut se à terra tollere non possit. Omnes plumis vestiuntur, recens natus si excipias, & Dodonem, quæ lana quasi tegitur.

Herbert. in Caudata quoque sunt ferè omnes *Caudæ* insulæ Mauritiæ avis cauda caret &c. *Ratione Magnitudinis*, sunt, parvæ, mediocres, magnæ, apum quantitate, & bobus majores, ut Aelianus

Aelian. H. A. l. 17. c. 14 fabulatur. *Ratione Locis* sunt terrestres, marinæ, lacustres, palustres, domesticæ & villaticæ, sylvestres, campestris.

Aliæ arboribus insident, vel illis se affigunt, aliæ cavernis delectantur. Quantum ad *Qualitates*, sunt albæ, nigræ, versicolores, & quidem tales pleræque. Mutant quædam colorem, vocemque tempore anni ac repente fiunt aliæ, ut oscimes & grues: non mutant aliæ. *Ratione Cibi* sunt carnivoræ, ut rapaces, insectivoræ granivoræ &c. Deglutunt & lapillos & ferrum quædam. *Ratione Generationis* omnes ferè, ut dictum, ovum ponunt, sola vespertilio, animal. Infœcundæ sunt uncungues: fœcundiores aliæ. Columbæ decies anno pariunt: hirundines, turtures, merulæ bis. Nihil de congressu, partu, incubationis, exclusionis, differentiis dicam. *Motus* diversitatem superius jam attigimus. Sed & de *vo-*

Plin. H. N. l. 10. c. 53. *cis* varietate actum. Philomela modulatur: Aquila clangit: Accipiter pipat: corvus crocit, crocit, corniculat. Perdix cacabat: Anser, grati-

tat, glacitat: Cygnus drenfat. Turtur & Columba gemunt: Palumbes plausitat: Ciconia gloterat. Gallus cucurrit: Gallina gracillat, glocit: glocitat. Pavo pupillat: Grus gruit, Vultur pulpat. Græculus frigulat: Milvius lipit, lugit. Anas tetrinit: hirundo trinfat. Passer pipit: Sturnus pisitat. Turdus trutilat: Acredula mittat. Coturnix gryllifat: Galgulus glocitat. Merula stridet vel modulatur: Upupa popissat. Meleagris caccissat: Vespertilio stridet. Pica picatur: Cuculus cuculat. Bubo bubulat: Noctua cucubat. Ulula ululat: Buteo bubit. Regulus zinzi-
lutat, Parus tinninat. Reliqua, ne nimis prolixus sim, non attingo. Ego eas in hoc Opere, in *Terrestres* & *Aquaticas* distinxi. Illas iterum in *Carnivoras*, sub quibus sunt Aquilæ, vultures, Accipitres, Falcones, Psittaci, Corvi, Cornices, Noctuæ, Vespertilio &c. *Insectivoras*, sub quibus pulveratrices, sylvestres & domesticæ, pulveratricesq; & lotrices simul, &c. & *Baccivoras*. *Aquaticæ* in *Palmipedes* & *Fissipedes* quæ etiam sua sortiuntur genera, dispescuntur, prout in syllabo libror. & Capitum præfixo apparet. Et tantum de Avium natura in genere præmittere placuit.

Quod reliquum est, scire te *Benevole Lector* velim, exhiberi hic Tibi quasi in tabella, quicquid de Avibus veteres & recentiores habent. Addidi enim omnia illa quæ à Gesnero & Aldrovando omissa sunt. Ideò & totum quintum librum Marcgravii de Avibus Brasiliensibus Appendicis loco adjeci, paucis quibusdam omissis, quæ alibi abundè explicata sunt. De Usu si quæ desiderabuntur, in Additamentis, Deo benè volente, prostant, in quibus una quæque Exotocar. suæ Classi restituetur. Quapropter, si aliqua nunc bis occurrerit, veniam dabis. Similes aliquando appareant species, quæ tamen velicone, vel quibusdam in descriptione positis differunt. Quia verò duplici Aristotelis Historiæ Animalium editione usus sum, vulgari nempè &


Sca-

Scaligeranâ; ideò illam absque addi-
ro, hanc cum nomine Commenta-
toris citare solco. Indicem tibi da-
bo, postquam totum de Animalibus
opus paratum fuerit, illumque totius
operis ad species, partes, & affectio-
nes reducti, prout Plinius Historiæ
sue libro undecimo, capite trigesimo-
septimo & aliis pluribus in locis fecit,
Compendium, sed Alphabetico or-
dine dispositum: si tituli marginales
omissi sunt, ne mirere. Primus hic
in hac Historia labor, & jam fere
per triennium apud Typographum

delituit: nec tùm mihi istos addere
animus, prout & in historia de Pesci-
bus vidisti. Fruere interim his, *Be-
nævole Lector*, cum Deo; & auctori
juventutis literariæ studiosissimo, pro-
speram valetudinem & ad plures cu-
ras vitam apprecare, ut Tu bono, o-
pus Historiæ Naturalis, de Homine
in primis, quod parat, aliaque huc spe-
ctantia, feliciter absolvere possit.

Vale. Lesnæ ex Musæo. 10.

Febr. A. C. M. DCL.



HISTORIÆ NATVRALIS DE AVIBUS

LIBER PRIMVS.

De Avibus Terrestribus Carnivoris.

TITVLVS I.

De Aquilis.

CAPUT PRIMUM.

De Aquila in genere.

Nomen.



Quia Græcis seu *ἄετος*, concitus feror, seu *ἄετος* *ἰνός* *εἶναι*, quod semper auguriū ejus veridicum esse solet, *ἀετός*; Cy priorum dialecto *ἀετ* & *ἰβω*, Macedonum *ἄετος*, *Ἀετῖον* & *Ἀετῖναι*, Pergeorum *Ἀἰβητ* vocatur.

Descriptio.

a Athen. Dipnos. l. 5.

Totam avis *molem* si spectes. *Corpus* ipsi densum, figura erecta. *Ossa* solida & nihil ferè medullæ habentia. *Magnitudo* determinari non potest. *Viginti* cubitales a in Ptolomæi pompa delati fuere. Inter Misenam & Dresdam tres in nido, pulli, totidem patulas quercus ingenti spacio complexo, inventi; quorum maximis alæ per trāsversum extensæ septem ulnas, ungues viri grandis digitos æquabant, crura leoninis majora erant. *Partes*, si in rationem veniant, anterior *Capitis* pars paulatim arctatur & in *rostrum* definit; quod durum, aduneum, ad senectutem crescit, sed tractu temporis fit inutile. *Oculi* sunt, parvi, charopi, concaui, profundi, nec nimium oblongi, nec exactè rotundi. *Dentes* nulli. *Cerebrum* adeò calidum, ut in pulverem

reductum, maniam; exhibitum, inducat. *Alæ* rectæ & extensæ; in summitate recurvæ, nervosæ, paucæq; carnis, magnitudinis tantæ ut eas *b-Homerus* merus, januis thalami compararit. *Iliade ult.* *Pennæ* in iis sunt duræ & aliarum, Anserum in primis & Columbarum permixtæ pennis easdem absumūt. Dum pulli excluduntur, inediâ albescunt, *Pes* dexter sinistro major, colore uterque difformis. *Ungues* adunci & recurvi, quos in incessu, intrò semper vertit, nisi solem aut prædā intueatur, perpetuò inspicit. & hebetatos, rostro, aut ad Lapides atterendo, acuit, quiq; cum pullos nutriunt, invertuntur. *Alvus* propter cibi humiditatē mollior. *Fel* c ærugineū, impensè acre & mordax. *Sanguis* crassus & fibrosus. *Stercus* tantæ acrimoniæ, ut nulli d in Medicina vlti esse possit.

Quantum ad *Sedes & loca* nec in insulis, parvis in primis, (cum Rhodi in culmine domus Tiberij consedisset, e portentiloco fuit) nec in locis prope Mæotidem spaludem, nec in extrema Scythia, & Sarmatia, ob aëris fortè inclementiam reperiuntur. In Caucaſo, Tauro, regno Peruano, Germania,

b-Homerus Iliade ult.

c-Galen. de Compos. Medic. f. l. 4.

d-Galen. l. 10. de simp. facult.

Locus. e-Suet. in Tiberio. f-Strab. Geogr. l. 7.

mania, Polonia, Britannia, Dania, &c. in quibus prædæ copia, eas invenias; *g Arist. H.* & quidem locis *g ὑψηλοῖς* præsertim *ἐν* *A. l. 9. c. 32.* πέτραις σκοτεινέμεναις, καὶ ὅτι δένδρων (de Pygargo & Morphno id sumendum non est) seu πέτραις ἀσφάλειαν ἔχουσιν ἐνεδρεύουσιν, id est ut tutiores ab insidiis sint; seu ἅπασαν τὸ βροχθεῖον αἰετὸς ἀπὸ τῆς γῆς, quia difficulter à terra attolluntur.

*Nutri-
mentum.*

Nutritum ipsis Carnes sunt, Columbarum, Anserum, Cygnorum, Gallinarum, Ovium, Cervorum, hinnulorum; ob sui à morbo tutelam, leporum, testudinum terrestrium, piscium, etiam & cancrorum: serpentum imprimis, seu propter odium, seu propter eam quam ex humido & frigido cibo capiunt, voluptatem. Sed nec à sui generis avibus iratæ & famelicæ abstinere. Cadavera tamen non tangunt, Percnopterus si excipias. A meridie venari quædam incipiunt, ab orto sole quædam. In prædam conspectam, & injuriæ patentem (lepus in planis, testudo post coitum supina invaditur) velocissimè & tormenti instar (hinc ὀξύλαβεῖς) se demittunt, posteriore pedis digito feriunt, & occisam in nidos deferunt. Falluntur tamen interdum, quod in Falcone Scalig. Exerc. 237. Scaliger observavit: sed & à Polypo apricante in profundum detractas, Aelianus *h* annotavit. Potus iisdem nullus, fortè quod ad eum sanguis animalium sufficiat. Visæ tamen aquam bibisse, medicinæ gratiâ; & ultimo in senio, rostro præ ficitate incurvato, vitam aliquandiu bibendo sustinere coguntur.

Sexus.

De Sexu Aquilarum dubitari non debet. Datur genus, quod propter tres testiculos, *Triorchis* appellatur. *Genera-
tio.* Coeunt verò frequenter; & foemina ter decies in die compressa, si mas revocet, denuò accurrit. Unde Aegyptiis & Venus dicitur, & soli dicatur. Commiscuntur aliquando cum accipitre, sed ovis incubare non dignantur: sed & marem cum lupa aliquando coire, scriptores Africani referunt. Ovis majoribus XXX. minoribus XX. diebus incubant, & ad exclusionis promotionem lapidem ætitem, qui æstum ovorum ab incubatione contra-


ctum, utpote frigidissimus, temperat; & peculiari qua pollet vi partum accelerat in nido deponunt. Duos plerumque *excludunt* pullos, quandoque tres. Exclusos solem adversos intueri cogunt, & invitos eidem obvertunt. Si fortè oculos visplendoris inflexerint, aut nictatione obnubant, tanquam adulterinos abdicant; si immotis eum aspexerint, genuinos agnoscunt. Volatum affectantes, in *k* altum sublato, *k' Sinesius* dimittunt, sibi relictos, aut fortè dilata- *in Dione.* plos suscipiunt, grandiusculos, longissimè tanquam rapinæ æmulos, à nido fugant, *l* ἧς ἐν τῷ τόπῳ ἔστι πρὸς αὐτὸς παν- *Arist. H.* τὸς ἀπελάνυσθαι. *A. l. 9. c. 32.*

Quantum ad *volatum*, à meridie ad *Volatus.* vespere moventur; manè, quiescunt, donec hominum conventu fora impleantur. Tam sublimes rectè viā feruntur, & deorsum tanta mole corporis labuntur, velificatas alas modico caudæ gubernaculo advertentes, ut cæteras omnes aves superent, & vel idè à Poetis Altivolantes ὑψιπέται *m m Home-
rus* dicantur Tempore incubatus, & nu- *rus* tricationis pernecitas illa imminuitur, *Oppian.
Cyneg. l. 1.
Lucr. l. 5.* sed motus tonicus perpetuo peculiaris manet.

Vocem ipsis clangere seu χλάζειν quidam, ut *n* Homerus, & Author Philo- *Fox.
n Homer.
Ilia. μ.* melæ, tribuunt, qui reboatus quidam est propter strepitum gravem, avicular. motum obrundens: nonnulli penè mutas aut vix vocales, quod de tertio genere Aristoteles affirmat, tradunt. Pullos muros esse constat, quod illis lingua humore quopiam tenellis impediatur. Sed de hoc inferius dicitur.

De *sensibus externis* non est quod *Sensus
multi dicam, tam exacti est visus, o externi.* ut sola contra rotantis jubaris lucem *o Plut. de
Homer.* ita volans, ut à nobis tanta luce difficile cernatur, latentem sub fruticelepusculum, sub fluctibus nantem pisciculum, videre comperta sit. *August. l. 2.
de morib.
Manich.*

Animam ipsi olere certissimum est, propter quam contracta ab ea corpora facillimè putrescunt. De *ingenio* ac *Ingeniū.* docilitate pauca occurrunt. Callitrichum herbam in nidum suum contra noxia animalia ingerere affirmant. Sub-



p Pausan. Subvenisse q Aristomeni in Ceadam
 4.V.G. demisso; gratiam q virgini Sestensi &
 q Plin.H. puero pro educatione, rustico r pro
 N.I.10 c.5. lato contra serpentem auxilio, retu-
 r Aelian. lisse, infantem recens natum s ab ex-
 H.A.1.17. itio servasse, apud Authores invenies.
 c.37. Indi pullos educatos ad leporum vul-
 s Aelian. pium venatum, descripto ab Aeliano
 H.A.1.12. t modo, instituebant. Tales & Cu-
 c.21. blai Tartarorum Imperator habuit.
 t Aelian. Sed & Pythagoras u aquilam ita mā-
 H.A.1.4. suefecisse, ut certis vocibus sisteret &
 c.26. u Plut.in devocaret. Superodantem, dicitur.
 Numa. Antipa-
 tia. Inimicitias gerunt x cum Cygnis,
 x Arist.H. (pugnæ apud Statium y descriptio-
 A.1.9.c.1. nem vide) Trochilo, Gruib. quæ ideo
 y Statius montem Taurum transmissuræ, lapil-
 Thebaid. lis vocem cohibent, & noctu transvo-
 l.3. lant. Ardeolis, Ciconia, Hierofalco-
 ne, vulturibus, Dracone & Serpen-
 tibus.

Vita. Vita quamvis salaci diuturna est. In
 senectute visus hebetudine, & rostri
 aduncitate tentatur; cum vero se illa
 gravari sentit in sublime fertur, inde,
 oculorū caligine solis calore dispersa,
 fervida, in aquas frigidissimas z se dat
 præcipitem, quibus tertio immersa,
 nidum petit, & inter pullos capturæ
 aptos quasi febre correpta, cum sudore
 quodam plumas exiit. Oppetit
 ergo mortem non tam senio vel ægri-
 tudine, quàm fame, in tantum supe-
 riore accrescente rostro, ut ad uncitas
 aperiri non queat.

CAPUT II.

De Aquila in Specie.

ARTICULUS I.

De Chrysaëto.

Nomen. CHrysaëtos Aquilæ genus à ful-
 vo Colore ita dictum est. Aristote-
 les χρυσῆος, Albertus Herodium, Ae-
 lianus a Aquilam stellarem, Pinda-
 rus b Jovis alitem, Hesiodus Aegiopen
 & c. vocat.

a Aelian. De externa ejus constitutione veteres
 H.A.1.2. hoc duntaxat, produnt, quod maxima
 c.39. fit omnium inter cæteras aquilas ea-
 b Pindarus demque ruffa seu fulva aut subrutila
 Lythio. (qui color interdum cum ætate muta-

tur) & oculis Charopos. Quæ Aldro-
 vando à Ferdinando Medicæo missa
 erat, pendebat libras duodecim, co-
 lor, in minutioribus totius corporis
 plumis, ex fusco castanci albis sparsim
 intercurrētibus maculis, paucis dor-
 so, pluribus ventre, radicibus albis; in
 alis & cauda fusci, eò magis quò ma-
 jores pennæ, in cruribus ad pedes usq;
 ferruginei: Longitudo ei ab extremo
 rostro ad ultimam caudam, quinque
 dodrantum, à rostro ad extremos un-
 gues: quatuor Spithamarum, & ultra.
 Latitudo expansis alis Spithamar. octo.
 Rostro quod palmam superabat adun-
 citas infra inferiorem mandibulam
 ad pollicem unum propendebat, lati-
 tudo plusquam duorum digitorum,
 medii præsertim, erat. Color, in acie
 nigrior, alibi. Corneus ad caruleum
 dilutum tendens, fusco maculatus.
 Oculos habebat Charopos, quos pal-
 pebræ in uno quoque binæ, supernæ,
 & infernæ integebant, inter nictan-
 dum tunica quadam crassa, ab infra
 sursum exporrecta, musculo conspi-
 cuo, cujus initium haud procul ab e-
 ruptione nervi optici à cerebro erat,
 quamque palpebræ superioris loco à
 naturâ datam, & ad angulū internū
 in priinis collocatam, quod cutis ca-
 pitis ob dūritiē in palpebras abire
 nequeat, creditur instructa, ab angu-
 lo majori ad minorem, obducebatur.
 Humor aqueus in iis copiosus, Cry-
 stallinus, Sessilis, utroq; latere com-
 pressus, & solidus, Lingua erat huma-
 næ similis, lata, extremo teres, versus
 radicem duobus utrinq; ceu hamatis
 utriq; appendicibus corneis armata.
 Sinistri pedis posticus unguis sex digi-
 tos in circumferentia longus erat,
 dextri quatuor, singulos digitos, qua-
 tuor semicirculares tabellæ, extre-
 mos propè ungues, integebant; maxi-
 mo interiori excepto, quem tres dū-
 taxat vestiebant. De ingluvie, Oeso-
 phago, ventriculo, consulat Aldro-
 vandum qui volet c Musculos col- c Aldrov.
 lum moventes anticos & posticos ha- Ornithol.
 bebat duodecim, seu sex paria, late- l.2.c.2.
 rales tres. In thoracis utroque latere
 tres; Abdominis quatuor paria; Alas
 moventes decem, Scapulæ quatuor;
 B 2 Ulnam

Ulnam moventes, sex; eam partem qui carpo in homine respondet totidem, crura quinque; Tibiam octo; Tibiam & digitos, plurimos.

Nutritum. *Cibus* ipsi carnes leporum, gruum, Anserum, Hinnulorum, Cervorum, quos ex declivi præcipites agit; & Taurorum, quos magno & ausu & astu aggreditur: aliquando fame premente fructus, & fruges, ut hac in parte deceptus videatur *d* Aristoteles, *A. l. 8. c. 8.* qui fruges etiam si in os ingeras respicere aasserit, comedit.

Generatio. Ova ad summum tria ponit, si juvenis est & vegeta, ut plurimum duo, quorum alterum sæpissime putre deprehendi testimonio aucupum, per octennium nidum explorantium, Albertus affirmat, quæ de ovorum vel ab alterius generis Aquila Chrysaëto, vel à Chrysaëto alteri Aquilæ suppositione scribuntur, dubia nimis sunt. Si duo excludit, alterum pullorum ejicit, seu nutritus difficultate, seu quia minus generosus apparet. Prædam nisi fame coacta sola minimè absumit. Impertitur avibus regiâ magnificentiâ portio, quæ ea spe sectantur, adulatorum aulicorum ingenia exprimentes.

ARTICULUS II.

De *Haliæto* & *Melanæto*.

Nomen & descriptio. *Haliætus*, *Haliætos* Phavorino, *Aquila marina* Latinis, Nisus, sed non recentiorum, *a* Ovidio dicitur, *a* Ovid. *l. 8.* German. *Weer Adler.*

Metamorphos. Qui à Bellonio *b* exhibetur, magnitudine est Milvi. *Caro* ei cinerea ad nigrum vergens, fibrosa. *Alarum* ad pedes duos Romanos, & digitos undecim extenditur longitudo. *Caput* album & fuscis lineis distinctum, *rostrum* aquilinum, *Oculi* in medio nigri, in ambitu aurei. *Lingua* ferè humana, appendice ad radicem utrinque instructa. *Colore* per summa Asturis, per ima albo, Guttur maculis ruffis notatum. *Pectus* purè candidum. *Venter* gutturi colore respondens. *Crura* crassa & squammosa. *Cauda* ad commoditatem volatus lata, *Pedes* fissi, hamati, cærulei. *Digiti* quatuor per superna ad di-

midiam longitudinem squammosi, ad reliquam incisi, per inferna asperi & aculeati, tam validi, ut flexos vix ulla vi distendas.

Species Aquilar. marinar. plures esse videntur, ex quibus, tum illa est *tia.* Bellonii quam testas in cruribus & ungues omnino rotundos habere scribit: tum illa Alberti M. & Anglorum, quæ pede est uno anserino & natante, altero fissio & prædæ dicato; adipem in cauda gerit, quo guttatim in aqua dimisso, pisces attoniti, prædæ fiunt opportuni.

Habitat circa *c* mare, littora & *Locus.* oras. *c* Ari. *H. A.*


Cibus ei interdum *d* columbæ in- *l. 9. c. 32.* terdum aves marinæ; quas universas *Nutritum.* nunquam invadit, singulas cum *e* mergentes observavit aggreditur, & *d* Aelian. immerfas vel strangulat in humore, *H. A. l. 3.* vel per summa corripit, sed piscibus *c. 45.* præcipuè victitat, quos in sublimi in primis *e* natantes, in altum mare se *e* Oppian. præcipitans aquis pectore discussis ra- *l. 2. Ixent.* pit, & interdum pòdere victa demer- *c. Aldr.* gitur. Quod de adipe superius dictum, quia & testimonio fide dignorum nititur, & pari, in ardea pede in aquam demisso, pisces alliciente, exemplo comprobatur, fidem videtur mereri; & virib. narcoticis, quales, seu in torpedine, seu in opio, seu in spiritu vini sentimus, adscribendum est. Vixit quidam & quidem quietus ad septimum sine cibo. De ipsius *Ortu* mira *f* Plin. *H.* Plinius, quæ quia mendo non carent, *N. l. 10. c. 3.* diligentius expendi debent.

Fel ipsius ad oculorum suffusiones *vsus.* & nubeculas cum melle mixtum pro- *g* Plin. *H.* desse scribit Plinius *g.* *N. l. 29.*


MELANÆTOS, Aquila Valeria *c. 6.* Hermolao, *λάγων* & Aristoteli, *λα-* *Nomen.* *γωνίας* Hesychio & Phavorino, aliis Hyperionis avis dicitur.

Minor est reliquis nigra, *rostro* ad- *Descri-* unco extremitate nigro cæteris cor- *ptio.* neo subcæruleo. Initium ejus supra narium foramina, membrana quædam transversim obvestit. *Vertex* ac cervix obscuro ferrugineo tinguntur, *Oculi* pupilla est nigra, iris charopa, & ex luteo rufescens. *Dorsum* ternis exiguis notulis albicantibus aspergitur. *Alæ*


Aquila
Adler. Arn.



Haliaeetus.
Adler bastard.
Meer Adler




Pygargus . . .
Weis geschwänzter Adler



Mosr Wey Entenstosse .

Anathura seu
Morphnos.






Melanctus uel Melancæctus
Aquila Valeria.
Stock arn.



Melanctus



Aquila Pygærgus. alius.





Alæ ad ultimam ferè caudam exporriguntur. *Crura* tota propemodum plumis operiuntur; quod nudatum est, id luteum, vix ad digiti unius spatium

Locus.

Cibus. *Victitat* leporibus *h* quos, sen-
h Arist. H. *sim* in terram delapsa, in plana digres-
A. l. 9. c. 32. sos opprimit. Pugnat tamen & cum
Pugna. cervis animose. Multum pulverem

volatu collectum, insidens cornibus excutit in oculos, pennis ora verberans, donec præcipitet in rupem; sed & cum Dracone, Ova hic confectatur Aquilæ aviditate malefica: at illa ob hoc rapit, ubicūq; visum. Ille multiplici nexu alas ligat, ita se implicans, ut simul decidant. Sola Aquilarum *i*
Plin. H. *in* foetus suos alit, est liberalis, sola sine
N. l. 10. c. 3. clangore & murmuratione.

ARTICULUS III.

De Pygargo & Morphno.

Nomen. **P**ygargus, Gazæ Albicilla, Hinnularia aliis Melaneto & Morphno maior est, at minor Percnoptero.

Descriptio. Qui ab Aldrovando exhibetur, majusculi Galli erat magnitudine, vertice ac collo dilutè castaneo ex cinereo. *Oculi*, pupillâ nigerrima, iride luteâ, *Rostrum* adunco, & paulo quam cæteris Aquilis, proportionem habitâ, longiore. *Dorsum* alarumq; pars superior, ferrugineis obscurè plumulis ac subnigris integuntur, uti venter ac femora. *Cauda* ab Uropygio ad finem usq; tota albicat: duæ tamen pennæ minores, majoribus incumbentes extremo nigræ sunt. *Tibiæ* totæ ferè nudæ, impensè luteæ, tabellis superintectæ. *Ungues* acerrimi.

Locus.

Colit oppida & campos, plana & lucos; sylvas & montes nonnunquam. Romæ rarè visam ex Symmachi epistolis colligitur. Adoritur cervos, ut Melanætus, cum hinnulis; à dextro latere insilit, in oculos involat, & tamdiu alis percutit, donec præcipientes agat. Aëritem in nidum infert, à quo & is nomen obtinuit. Sed in alendo foetu reliquis est difficilior.

Differētia.

Duplex illius *genus* Bellonius recenset. *Vnum*, corpore colore inter album & cinereum ambiguo, extre-

mis *alarum* nigris, supinâ parte totâ cādicans, quod Ardeam volatu refert; *caput* versus terram deprimens & perdicibus cuniculis, gallinaceis, & aliis minutis volucris, victitat, & ut plurimum Oriente & Occidente sole conspicitur. *Alterum* Milvo regali ad eò simile, ut nisi hic & minor esset, & ventre intensius albescente, (pennas circa Uropygium cum superioribus candidissimas obtinet) unus ab altero non dignosceretur. *Ungues* habet atros, crassos, & in fornicem curvatos. Insectatur alaudas per campos, & cū subbutone de præda tam acriter certat, ut uterq; alis & pedibus confectis in terram delapsus, sæpissimè aucupibus in prædam cedat.

MORPHNOS, *πλάγγος, κλάγγος, Nomen.*

Νεφρόντος, & περνός Græcis; *Nævnia*, clanga, Planga aut *† Plancus, Anata* *† Plin. H.*
ria seu Avicida Latinis, dicitur. *N. l. 10. c. 3.*

Veteres eam a magnitudine Melanæti superare, & nigro ac sub obs-
ptio. scuro colore, qui tamen nēvis quibus-
a Aristot. dam interstinguatur esse scribunt.
H. A. l. 9.
c. 32.

Homerus alas ejus tantum patere, quantum valvæ ostii cujusdam viri divitis, cecinit. Ex recentiorib. Aldrovandus nullam se vidisse cui omnia veterum competerent, fateretur. Turnerus apud Gesnerum, nomen hoc Balbusardo Anglorum, qui est Buteone major, *nævo* in capite albo colore fusco proximo; quiq; ad ripas degit, in terra inter arundineta super aquas nidificat, volatu non admodum valet, pisces & cuniculos dilaniat, adscribit. Bellonius avem falconē secuplo majorem, pedibus cæruleis, digitis oblongis, Unguibus patulis, Gallis Gerfault dictam, & terrestri venatui adhibitam, pro Morphno, sed dubius, obtrudit. Saltus convalles & lacus incolit.

Locus.

Aquaticis avibus ut fulicis & anatis plerumque, sæpè & piscibus *victitat.* *Pugna.*

Spectanda dimicatio est, inquit Plinius, *b* ave ad perfugia littorum tendente, maximè si condensa harundo
Plin. H. sit: Aquila inde ictu abigente alæ, & cum appetit, in lacus cadere, umbraniq; suam nanti sub aqua, à littore ostendente; rursus ave in diversa, & ubi minimè se credat expectari, è mer-

B 5 gente.

gente. *Nascitur* ex Ossifragis si Aristoteli credimus.

Genera-
tio.

Morpho CONGENER Aldrovandus appellat aquilam sibi missam, cujus magnitudo galli gallinacei erat. Color totius ferrugineus, rostrum dorsum recta propemodum tendens, membranula lutea capiti conjunctum. Extrema alæ versus ventrem maculis ovalibus insignita, remiges extremo apice albicantes. Crura hirsuta, & albis notis è bætico aspersa digiti supernè squammis, infernè tabellis seu annulis intectæ.

ARTICULUS IV.

De Percnoptero, & Ossifraga.

Nomen.

Percnopteros, qui & Cypaëtos, vel Hypaëtos, Ægyptias, & Oripelargus dicitur.

Descri-
ptio.

Breviter à veteribus, diversim à Neotericis describitur. Aristoteli est capite albicante, corpore, quam ceteræ dictæ majore, sed brevioribus alis, longiore cauda, vulturis referens. Aldrovandus binos ejusdem icones exhibet. Prior Chrysaeto non multo minor, habet *Corpus* coloris castanei ad nigrum vergentis, *rostrum* mediotenus rectum, extremo in unicum insignem curvatum, principio juxta frontem album, cetera nigrum. *Caput* subalbidum ad fuscum vergens. *Oculus* iride subalbida, pupilla nigrâ. *Collum* dimidia ferè parte eaq; superiore propemodum calvum, & paucissimis iisq; exilibus plumulis confutum, candicans, ad cujus finem, medio prope collo instar pilorum quorundam hirsutorum ac crisporum, plumula veluti setæ oblongæ supra ceteras, plumas extabant. In tergo veluti cucullus quidam, ad medium usque protensus in acutum finem, velut triangulum quendam desinebat. Alter ignavus, colore pennarum totius ferè corporis erat fusco ad castaneum obscurum vergente, quem in ultimo collo nonnihil albicantium ordo continuus, angulum acutum in dorsum exeuntem constituens qui veluti cuculli humeris inducti basis erat, distin-

guebat. *Capite* ad occiput usq; calvo, ita ut pennæ post verbum surrectæ, cuculli speciem exhiberet. Bellonius avem Gallis busfard dictam, buteone majorem, coloris nigri, alis brevibus ignavam Cypaetum vult esse. Gesnerus aliam ciconiæ formâ & coloribus similem. Frigoris impatientem, corporis intense calidi, carnivoram, sed pisces respuentem, quæ quatuor horas uno loco sedebat, & solem aliquando splendentem intuebatur, si non Gypaetum, ex altero saltem parente natum, credit.

Incolit lucos & plana, ut plurimum, *Locus*. montes, quandoque, in Syria & Ægypto maximè invenitur.

Cibus soli inter aquilas, a cadavera. *Nutri-* mentum. Gravis enim, & ad rapinam iners, à corvo cæterisq; id genus alitibus verberatus, fugatur, capitur. *Muribus* A. l. 9. c. 32. quoq; circa Gazaram Ægypti urbem victitat. Pullos statim parere, Aelianus auditione se recepisse scribit. Avicenna fel ejus destillatum cum oleo violaceo ad aurium dolorem & tinnitum, simum ad abortum commendat.


OSSIFRAGA & Ossifragus, Græcis φάγνις Aristoteli φάγν. *Nomen*. Harpa quoq; Sanqualis, & Immussulus dicitur.

Aristoteles b de ea. Ossifragæ magnitudo major est quàm Aquilæ (Chrysaeto nempe excepto) Color ex cinere albicans. Parum oculis valet. *Nubecula* enim eos habet oblæfos. Quæ ab Aldrovando exhibetur, quatuor dodrantes & medium erat longa, novem, alis extensis Spithamas, lata, libras undecim pendens. *Pluma* totius corporis, sub-albo, fusco, & ferrugineo colore variabât. Cutem proximè vestientes, molliculæ & candidissime erant, remiges ex toto ad castaneum tendebant. *Caput & collum* angustis & oblongis pennis rigeat. *Rostrum* ei duos digitos latum, palmum longum, subnigrum, è Corneo fuscum, ab initio membrana quadam ultra navium foramina protensa, marginibus suis lateram s. exprimente tectum, ita aduncum, ut uncus solus pollicis latum adæquaret. *Lingua* humanæ simillima, lato apice, hamatis utrinq; duris & corneis appëdicibus, membranula tenui





Ossifragus.
bain brecher.



Morphno congener.



Heteropus aquilae
species.



Pernopteros Aquila peregrinus.




Avus Scythica.



Chrysactor
Bellonij.



Mitternachtlicher
Adler.



tenui ad inferiorem mandibulam
 connexa. *Mandibula* inferior canalis
 instar excavata; palatū medio rimam
 quandam exhibebat per quam pitui-
 ta à capite destillabat. De *mento* plu-
 mulæ tenues villorum instar, ad bar-
 bæ speciem quod ossifragæ c Plin.H.
 tribuit propendent. *Crura* fuscis plu-
 mulis aliquantulum fulvescentibus
 ferè tota obtegebantur. *Ungues* niger-
 rimi, præ atrore splendebant, & semi-
 circulum ad amussim repræsentabāt.
 Substantia ipforum intus alba & of-
 fea, foris fusco cortice intacta erat.
 Duodecim *cauda* pennæ albo & nigro
 maculabantur, intus albæ, extus fusce.
 Et hæc *externarum* partium ratio est.
Interna si attendantur, Uvea, quæ ho-
 mini in pupilla perforatur, tenuissi-
 mam quandam membranulam pupil-
 læ prætensam habebat unde, ut Phi-
 losophus notavit, minus visu pollet.
 Pars, quæ iridis ambitu clauditur, ne
 prorsus visio præpediretur, subtilissi-
 ma, & pellucida erat, *Abdomen*
 pinguedine copiosâ redundabat. *Lien*
 illi rotundæ figuræ, *ventriculi* corpus
 membranofum, fundo superiori orifi-
 cio latius, ingluvie carens, quod de
 sua ossifraga Plinius, cujus vicem Oe-
 sophagus, simul atq; jugulum transit,
 paulatim ad ventriculum usq; dilata-
 tus, gerere videbatur. *Vesica* fellis nul-
 lum cum *epate* consortium hoc sub vē-
 triculo multo immersum erat adipi.
Vterus crasso corpore, pyri formâ, se-
 mine plenus. *Vropygium* medii pugni
 crassitudine, & adiposum cōspicieba-
 tur &c. Ad hujus genus Bellonii illa,
 quæ corpulentia colore & specie mil-
 vi est, duab. maculis nigris ad alarum
 latera notata, capite accipitris stella-
 ris, cruribus & pedibus vulturinis, &c.
 non pertinet: sed illa quæ in comitatu
 Tyrolensi, colore accipitrum in dor-
 so, in ventre albicante; orgyæ, distē-
 tis alis latitudine, rupicapras ex alto
 ad montes præcipitat, & frusta ossium
 etiam majuscula deglutit; referri huc
 potest: ut & illa, quam Gesnerus, plu-
 mis albis, capite nudo & flavo, Saxi
 injecta ossa confringentem, amici
 verbis describit.

Cibus ipsi Rupicapræ, Hinnuli, ca-

nes Venatici, Anguillæ, cujus frusta *Nutri-*
 in dissecto ventriculo inventa, tam a-
 menti. cuti fœtoris erant, ut spectatores in a-
 nimi ferè deliquium conjicerentur.

Probè *fætificat*, ut pullos suos & A- *Genera-*
 quilæ, quos ista nido volandi faculta- *tio.*
 tem adeptos, & edaciusculos, † eji- † *Arist. H.*
 cit, nutrit, & abreptos *λιγέως* deflet. *A. l. 9. c. 34.*
 Vultures minores ex iis progenerari,
 & ex iis magnos qui omnino non ge-
 nerent, scribit d Plinius.

Pugnat cum vipera; & sauciata, e *N. l. 10. c. 3.*
 herba soncho simili, sibi medetur. *Antipa-*

Voces alias alio in tempore jacit. *thia.*

Vsum si spectes, fel ejus cum melle *e Lucret.*
 potum *fleucen* curat: stercus aridum *l. 5.*
 tritum concoctionem promover. *Vē-*
 ter potus calculos pellit. Intestini ex- *Vox.*
 tremum ad alligatum, colicam sistit. *Vfus.*
 Os ad coxam suspensum, varices *f Plin. H.*
 fanat. *N. l. 30. c. 7*

ARTICULUS V.

De Anopæa, Aquila alba, A-
quila heteropode & Scy-
thica Ave.

ANOPÆA fit in Homero Odyssi 1.
 mentio, quæ quibusdam est *αφαις*
 invisibilis, seu *ανωφεγής* id est sursum e-
 vecta. Alij *πενόπαια* scribunt, & hi-
 rundinem intelligunt.

AQUILA ALBA seu Cygnea,
 magnitudine est Chrysaëti, candoris
 nivei, in rupibus circa Rhenum inve-
 nitur. Leporum, cuniculorum, por-
 cellorum & piscium venatu vivit, &
 volatu tarda est.

HETEROPOS Gesneri, sinistrum
 crus cæruleum, dextrum fuscum albi-
 cans habet, de cætero, pectus, collum,
 & venter fusca sunt, punctis nigrican-
 tib. maculosa. *Capitis* & cervicis pen-
 næ rigent. *Oculi* subrubent, dorsi ini-
 tium circa alarum summitates in gib-
 bua attollitur.

DE SCYTHICA ave ita a Ari- *a Arist. H.*
 stoteles. In Scythia genus avium Oti- *A. l. 9. c. 33.*
 des. Hæc duos pullos parit. Ovis non
 incubat, sed in pelle leporis aut vulpis
 impositos pullos relinquit. Observat
 in summa arbore an adsit qui pullos
 surri-

furripiat. Quod si quis ascendat, pugnat & verberatalis, ut Aquilæ. Plinius ab eodem defumfit. Olaus M. oculatus testis, utriusq; historiam confirmat, quā Albert. M. falsi insinuat.

NB. *Ad Aquilas pertinent Itzquantitli & Tlacoquantili Indorum, vide infra Mantissam N^o. 1.*

TITVLVS II.

De Vulturibus.

CAPUT PRIMUM.

De Vulturibus in genere.

Nomen.

Vulturis nomine intelligitur, quæ Græcis *ῥαψ γόπας, Οἰωνός, Αἰγυπτιός*; Latinis etiam Vulturius, à tardo forsan volatu, & per periphrasin, Avis Titi, torva, avida, magna, Palatina, a Lycophrō caucasea, dicitur. Lycophrō a eas olores rapaces, Hermogenes *ῥαψ γόπας*. Seu sepulchra animata vocat.

Descriptio.

Toto corpore Aquilam ferè imitatur, illamq; sesquialtera proportionē, si Bellonio credendum, excedit; nec tamen, quod in rapacium genere solemne, marem fœmina magnitudine superat. *Rostrium* ipsi obuncum, oculi truculenti; quatuor, apud Philē, narium spiracula, unde *πτερόπτερος*, quod fabulosum est. *Collum* implume, seu potius capitis plumę ita breves, si cum Aquilis conferantur, ut implumes videantur. *Guttur* longitudine & capacitāte, quod propendens ante vētrem ingluvies ostendit; insigne, sub quo spaciū palmi latitudinē, non tam plumis quam pilis, ruffis, vitulinis simillimis, instar lenissimi cujusdam velleris, omni scapo calami destitutis, vestitur. *Alarum* incumbens corpori pars, leni tota vellere, quod soli inter rapaces peculiare integitur. *Crura* tota ad pedes plumosa, contra gelu & frigus munimentum. *Vngues* adunci.

Locus.

Sedes in altissimorum montium jugis, ponere, b Aristoteles, c Plinius, & d Homerus sunt authores. Poetæ c *Plin. H. N. l. 10. cap. 7.* d *Homerus Iliade 2.*

Sedes in altissimorum montium jugis, ponere, b Aristoteles, c Plinius, & d Homerus sunt authores. Poetæ c *Plin. H. N. l. 10. cap. 7.* d *Homerus Iliade 2.*

pti inter Cairum & mare rubrum planis, numerosos Bellonius vidit, quod iter illud Camelorum cadaveribus plenum, pastum ipsis suppeditet. e Agricola in sylvis degere asserit. Juvenali f nidulantur etiam in arboribus. In Creta & alibi in præcipitiis montium mari imminentibus. Propterea Herodotus Briffonis Rhetoris pater ait, † esse vultures in terra altera nobis ignota, eo argumento, tum quod nemō vulturis nidum conspexerit; tum quod magno numero repente apparent sequentes exercitus.

Vicitant morticinis & quidem solis, illi, qui cum Aquilis, Offifragis, & Accipitribus nullam cognationem habent, sui generis volucres mortuas, si Herodoto Pontico credimus, ne attingentes quidem. Vivis etiam tum volucris (ruunt enim in anseres) tum quadrupedibus, illi, qui Spurii sunt. In g Creta & Helvetia agnos, hæc dōs, g Bellon. l. 2. de Avibus h Americæ provincia pecudes, infestant. c. 23. h Monard. l. de Aromat.

Datur quoddam genus quod Torgos & Hamatorrhophum dicitur.

Venantur à meridie usq; ad noctem, ab ortu solis ad illud tempus quiescunt.

De eorum *Sexu, Coitu, Partu, & Incubatu* non conveniunt Authores. Fœcubatio. minas duntaxat inter eos reperiri, i Aelian. H. Aelianus, k Orus, l Philes, Tzerzes m A. l. 2. c. 46 & alii authores sunt. His adversæ Auk l. 1. Hierogl. l. Phile de propriet. Animal. m Tzetzes Chil. 12. c. 439. De eorum *Sexu, Coitu, Partu, & Incubatu* non conveniunt Authores. Fœcubatio. minas duntaxat inter eos reperiri, i Aelian. H. Aelianus, k Orus, l Philes, Tzerzes m A. l. 2. c. 46 & alii authores sunt. His adversæ Auk l. 1. Hierogl. l. Phile de propriet. Animal. m Tzetzes Chil. 12. c. 439. Spiritus venti influens, intra quinque dies, quibus nec cibum nec potum capiunt, ipsos implet. Tertio à conceptu anno, non ova sed pullos parere, Geoponicorum scriptor, Philes, & Simocattus produnt, intra centum & viginti dies ova deponere, Orus & Tzerzes. Aristoteles n & o Plinius n Arist. H. nidificare scribunt. Niphus nidum in A. l. 6. c. 5. Italia vidit. Ille bina complurimum o Plin. H. ova ponere reliquit: hic ex Umbricio N. l. 10. c. 6. Aruspice tria. De tempore partus nihil determinant, hoc interim à Divo Hieronymo proditur, vulturem cum cœperit ova edere, quippiam ex Indico tractu adferre, nucis instar, intus habens,

Vultur Bæticus. Gejyr.




Vultur cinereus Gejyr.



Vultur

Leporarius.

Hasen Gejyr.



Vultur Alpinus vel aureus
Goldgejyr.





habens, quod moveatur, sonumque subinde reddat. His veritas subscribere videtur; attamen cum Aquilæ, ossifragæ & vultures, ut ex Aristotele, & Plinio palam est, promiscuo coitu inter se utantur: facili ex diversarum specierum avibus, tertia sterilis, ut ex equa & Asino Mula, generari potest, quæ ob similitudinem cum vulturibus, quam Aquilis majorem, inter illos potius collocetur. *Educationem*, si videas, apud *p* Orum centum & viginti diebus pullis nutriendis infumit, alimento deficiente femoribus suis rostro vellicatis sanguinem ciet, ipsisque suendum præbet. Apud Albertum verò unguibus eos vulnerat, & de superfluo sibi cibo pascit.

Aetas. Extendit *etatem* ad *q* centesimum *q* Ambros. annum.

Quantum ad facultates & actiones animales, Oriente sole in occasum, occidente in ortum prospicit, ut apud Orum extat. Non ultra maria tantum, sed per quingenta *r* etiam millia passuum cadavera odoratur: seu quod

Visus. instrumenti sit exquisiti & sicci; seu quod copiosa ab integris quandoque exercitibus exhalatio sit, seu quod eadem globata, ventis eodem deferatur.

Volatus. *Moventur* tardè propter corporis molem, & volant turmatim.

Ingeniū. *Ingenium* exinde colligas, quod Regionibus frigus evitaturi mutant. Aegypto non minus, quam Ciconiæ advenæ, quod ad idem cadaver, à quo satiati sæpius recesserunt, identidem redeant, & expeditos ad bellum exercitus præsentione quadam consequantur: ac ut aliqui addunt, bido triduo, imò septenis diebus antè ea loca circumvolent, in quibus cadavera futura sunt, quod domi cadavera

sà venenoso serpente percussa fugiāt, & hepatis morbo laborantes magnarum avium jecinora vorent. Suavolentia adeò aversantur, ut ne armenta quidem mortua, unguento *t* odorato illita, attingant; imò unguentorum odore perimantur, perit, & *u* manu Ael. H. A. li Punicigrano vultur: sed semine Siferis *x* Cretici vehementer oblectatur.

Inter eius *morbos* sunt, Hepatis obstructio, & pediculi, insectum venenosum, pediculo par, vel ei qui in inguine nascitur, per simile.

Vsum in medicina partes ejus; magnum obtinent. Medicamentum ex integro ab Aëtio *y* paratur, ad abscessus, cōdylomata, strumas. Cerebrum capiti vel naribus cum oleo cedrino illitum, dolorem ejusdem sedat. Cor pulli adalligatum adversum comitalem morbum prædicatur. Sereus jecur ad jecoris dolores commendat. Fel. Opstalmicis benè ex Sammonico admiscetur. Penna pedibus subjecta parturientes adjuvat; sed nisi tempestivè auferatur in uteri procidentiam conjicit. Si dentes ea scalpentur, acidum anhelitum reddit. Nidore penarum, si urantur, serpentes fugantur. Pellis ventriculo apposita *z* concoctionem egregiè juvat. Nervi *†* ex cruribus & summis pedibus collecti, & ad talos egri alligati, podagram curant. Externa si attendas, ex ossibus vulturis tibiae * Scythæ Anthrophagi, Malenchleni, & Arimaspi conficiebant. Ex cruribus cadelabra quidam, quod ipsa, innatà vi venenum explorare & attrahere crederent.

CAPUT II.

De vulturum Differentiis.

Vulturum duo duntaxat genera Aristoteles *†* agnoscit: at Neoterici plura esse observant.

Primum est Albicantius, & parvum, quod in montibus * Rheni, Danubii, Helvetiorum circa Clavonam, apparet, & in Scythia, & subjectis Septentrioni regionibus frequens est.

Alterum *σποδοειδέπτερον* seu magis cinereū, cujus pilos seu plumulas albas capillaceas & capillamentorum instar subtiles, adeò candidas esse Bellonius scribit, ut pellē subdititiam & elaboratam, mustelæ alpinæ albæ, seu etiam vulpis albæ esse, quispiam existimare possit.

Tertium Beticum, quod Aquilā paulò minùs habet pennas colli, dorfi, ventris, totiusq; adeò corporis, castaneo colore

colore tinctas, dorſi & laterum exiguas, & ſquammarū inſtar latiuſculas, quæ dorſum, ventriculū, ventrem, & uropigii radicē veſtiūt, ruſſas plumas verticis breuiculas ac curtas, ſi Aquililis comparetur. Colli anguſtas ac longiuſculas, quales gallis gallinaceis, & ſturnis propendent. Crura brevia, plumis undiquaq; ad ſuperiorum uſq; digitorum partem conſecta.

Quartum Nigrum, quod eſt cauda brevi, alarum & caudæ pennis ejusdem cum Bætico coloris. Albertus minus hoc, ſed viribus præſtantius ſcribit.

Quintum Leporarium, roſtro obunco, nigro, ſædis oculis, corpore firmo & magno, alis latis, cauda longa & directâ, colore in rutilo nigricante, quod ex vulture & Aquila cōpoſitum videtur, & illud quod Homero Albertus *melanocon* vocari ſcribit. Huic enim peculiare leporibus inſidiari: & ſolus inter cæteros velox & ad docendum aptus eſt.

Sextum Aureum Gefneri, quod ita deſcribit. Longus eſt à roſtro ad extremam caudam ſex dodrantes & paulò ampliùs, ad extremos ungues quinque dodrantes aut paulò minus, longitudo ſuperioris roſtri quātum illud aperitur, ſeptem ferè digiti trāsverſi. *Caudæ* longitudo circiter tres dodrantes. Tota *pars ſupina*, id eſt collum inferius, pectus, & venter & pedes quoque ruſſo colore ſunt, dilutiorē quidem caudam verſus, rubentiorē verſus caput. Digiti pedum fuſco vel corneo colore ſunt. Alarum penna longiſſima, quatuor dodrantes æquat. Subnigricant ſeu fuſco ſunt omnes alarum pennæ uno ferè colore: parvulæ tamen ſupremæ in alis nigriores ſunt, ut per medium alię ſubruffis maculis, aliæ ſubalbidæ circa imum diſtinguuntur, eo nigriores autem ſunt, quo propiores dorſo, ubi præ nigredine ſplendent. Pennæ per medium dorſum nigræ ſunt, ſplendentq; in earum medio cauliculi albi, præſertim quæ circa medium dorſum ſunt, & dimidia colli parte, reliqua enim colli pars, pennas ex albedo ruſſas habet. Caudæ pennis idem color eſt qui ala-

rum, nempe fuſcus. Hiſce addit Albertus quoddam collo craſſo, aliſque ad dorſum valdè retortis & magno pectore, quod frequenter in ripis maris degit, & quod venatur, eò deſert.

TITULUS III.

De Accipitribus.

CAPUT I.

De Accipitribus in genere.

Accipiter vultures excipiat, avis cuius tanta apud veteres veneratio, ut & a præſagiendi poſt exactam hanc vitam vi pollere, crediderint: & legem qua capitis damnatur, qui eum etiam imprudens occidiſſet, tulerint: tanta apud Ægyptios, ut ipſum *b* Soli acceptum putarent, picto *c* Oſirim proponerent. Tentyritæ *d* & Philarum *e* incolæ ſanctiſſimè colerent, interfectum ſepulchri honore afficerent, & in urbem *f* Butim aſportarēt; ſeu quod ipſius ſubſtantiam ex ſanguine & ſpiritu conſtare *g* dicerent; ſeu quòd regionem à venenatis animalibus *h* eos repurgare cernerent; ſeu quòd Accipiter priſcis temporib; librum puniceis literis ſcriptū, in quo cultus Deorum forma continebatur, Thebas ad ſacerdotes, detuliſſe *i* crederetur.

Dicitur Græcis communiter *ἰεραξ*, Macedonibus *ἰεραξ*, apud Lybias *βελγας*, Heſychio, *νεκρον*, Tyrrenis *ἰεραξ*; aliis *νεκρον*. Latinis Accipiter, ſeu à rapacitate, ſeu quòd ter ſit acceptus. Unde & ſacer ales vocatur.

Avem ipſam ſi ſpectes, corporis ipſi *Descriptio* incerta. Nonnunquam vix *Aprio* quilis cedit, in Ægypto *k* minores quàm in Græcia, in regionibus Aquiloni obverſis & rupibus, quia ſanguine & ſpiritu abundant, majores. Major mare ſcæmina, quòd in illo humidum ab immodico abſumatur calore; in hac, ſanguis cum moderato calore copioſior, multum argumento materiæ ſuppeditat. *Color* ipſis ut plurimum ex albedo fulvo & nigro diverſus, maculiſq; diſtinctus, alibi, albi & leucophæi reperiuntur, & qui in frutice ſpiſſo aut acere habitāt, ad ruſſum aut nigrum declinant: qui in fago, ad gil-

a Porphyr. lib. 4. de abſtinent.

b Porphyr. ibid.

c Plutarch. de iſide & Osiride.

d Aelian. l. 10. de Animal. c. 24.

e Strabo. l. 17. Geogr.

f Herodot. in Euterp.

g Porphyr. l. 6.

h Diodor. Sicul. l. 2.

i Euseb. l. 2. de præpar. Evangel.

k Arist. l. 9. Histor. A. C. 28.

Nomen.

vum seu pallidum. *Caro* est asperior, quam *I* cuculi copiosioribus plumis integitur, quàm graviores aves, quòd superfluâ materia ad pennas amandetur, eorumque generationi serviat. *Rostrum* habet aduncum extremo plerumque; corneum. *Oculos* splendidos, unde Soli sacri, & perpetuò mobiles, quorum color cum ætate mutatur. *Cerebrum* copiosum, linguam latam, principio obtusam, nec bifidam, nec acutam. *Pectus* acutissimum, modicâ carne munitum. *Alas* rapacium acutiores. Anhelitum fœtidum, *cor* magnum, cuspidè obtusa. *Lienem* adeò exiguum, ut sensum propè modum effugiat. Fel nonnunquam ærugineum, jecori & intestino adjunctum.

Locus. Si *loca* spectes, frequentissimi sunt, in Anglia, Suecia, Prussia, Livonia, Russia, quod istæ avibus tardioris volatus, & multæ carnis abundant: minus frequentes in Syria, Persia, Africa, Græcia, & Cretâ. *Nidulantur* in præruptis & altis rupibus, in Alpibus inprimis, sed vel inter vepreta, vel in arborib., acere inprimis, fago, quercu, abiete, pinu. Qui Massiliæ o agros incolunt, humi fœtificant, nec alibi nascuntur.

Nutri- Potu omni, Tinnunculo excepto, **mentum.** abstinent, si Aristoteli *p* & Suidæ *q* credimus: bibere *r* Plutarchus, etiam postquam hominis defuncti corpus tetigerit, si affluentis copię aqua invitetur, *s* Gyllius, prodidere; quamdiu viventium sanguis sedandæ fiti sufficit, non bibere: si exanguibus vesci cogatur, potare, credibile. *Cibus* ipsis aves, gallinacei inprimis & colubacei generis, Turdi, Fringillæ, Corvines, Corvi, Picæ, Cornices; nobilioribus cancri & caro leporina vehementer sapiunt: viliorib. etiam mures, ranæ, & talpæ; mansuetis quoque fruges & panis. Nec à cordibus, quod cum *t* Aristotele, *u* Plinius & Aelianus non credidere, teste Alberto *x* & Aldrovando abstinent, quin cerebro è cranio divulso & absumpto, reliquum corpus involant. Nulli ad reliquias prædæ suæ revertuntur, & dum sylvestres sunt; nec unquam cadaveri insidere visi: sed omnes inter-

dum tam avidi, ut stercora præ fame deglutiant. *Venatur* autem Accipiter, non tantum Turtures; Gallinas albas maximè *a* propter candoris insigne, *a* Columel. Anates, Cornices, Sturnos, Picas &c. *la l. 9. de re* sed & proprium genus, quod præter- *ruf.* quam Aquilæ & Olori, ut quibusdam placet, nulli aliarum avium cum eo commune est. Cuculus ab eodem absumitur, *b* si quando vna apparuere, *b* Aristol. sola omnium avis à suo genere inter- *H. A. l. 6.* emptæ. Leporem postquam cœpit, *c. 7.* sinistram pedem terræ infigit, dextro *Plin. H. N. l. 10. c. 9.* prædam retinet, & quàm primum post oculos ejus eruit. Venaturus solus volitat; prædâ conspectâ humilis propè terram fertur, & omni conamine instat si primo nisu frustratur, persequi desinit, & sibi indignatur.

Fœcunditate negatâ, quòd humo- **Genera-** rem *c* ad crura, ungues, pennas, & ge- **tio.** nitalia loca simul nequeat transmittere natura; *salacitatem* ipsi adscripsit *c* Arist. 3. de *gener. A-* antiquitas. Certè, & cum Aquilis *d* *anim. c. 1.* coeunt, & Asteria cum Accipitre cõgreditur. Quoddam genus, cum in *d* Arist. 2. de *gener. Ani-* venerem ruit, minimarum etiâ avium *mal. c. 5.* moribus patet: aliud, *e* more hominum amatoria levitate flagrantium, *e* Aelian. l. 2. de Anim. *c. 43.* fœminas semper sectatur; absentes clangore prosequitur. Aegyptii fœminam una die requisitam, quantumlibet secesserit, à marito vocatam, obsequi tradunt, & inde fœminas morigeras titulo Accipitris honestant. Tria ut plurimum quatuor aut quinque *f* Albert. l. 10. c. 8. quandoque ova pariunt, & vicenis diebus incubant.

Aetas hujus avis in multos se pro- **Aetas.** tendit annos. Aegyptij *a* ad septingentos pervenire, sed falsò asseruerunt. Multis etiam infestatur *a* Aelian. l. 10. de Animal. *c.* *morbis,* *b* nempe difficultate respirandi, & tum sonum elidit; aliquando oscitatur, *b* *seegnos-* & vomit: tineolis, & tum ipsi venter & collum glabescunt: cholera, in qua li- *σφρον De-* quorem viridem evomit. Spon- *metrii ed.* giâ, quâ affectus, præter consuetudinem bibit, multum seditat, nec ex manu, nec expert: cã discedit. Febri, tum pustulas filigini similes in ore habet. Tineis, tum caudam, frequenter motitat. Suppressione alvi, tum crebro anum perticæ admovet, & ex-

crementa nigra reddit. Intemperie frigida, & tum excrementa crocea aut cruenta reddit, alas autem remissas & laxas, capitis plumas horrentes habet. Pituita sicca, & tum liquorem per nares non emittit. Gravedine, & tum ipsi liquor per nares, spumâ per oculos elabatur. Tremore, & tum pinnas ut struthiocamelus habet, & volare nequit. Plura apud citatum Authorem vide. *Vox* Accipitribus alia alio tempore, & generi. Apud Græcos verbo *Πύξεν* per onomapopœiam conficto, apud Latino Pipandi exprimitur. Gallinæ si eam audierint, dum interim incubant, ova viciantur. *Visus* ramacer, *d* ut nullo negotio adversos Solis radios intueatur. Hinc dicitur Aristophani *παντόφθαλμος* omnioculus. Cum Apolline, qui est sol, magnam convenientiam habere credebatur; & ejusdem *e* imagine solem denotari Aegyptiis solitum.

*Vox.**Visus.*
d Aelian.
H.A. l. 10.
*c. 14.**e Plut. lib.*
de Iside &
*Osiride.**Homer. I.*
*liad. v.**Volatus.*
f Aristoph.
*in Avib.**g Aelian. l.*
*10. c. 24.**Ingeniū.**i Aelian. H.*
A. l. 2. c. 42.
Plin. l. 10.
*c. 8.**k Aelian. l.*
10. c. 17.
m Porphy.
l. 4. de ab-
stinent.

VOLATV sunt velocissimi, & adeo celeres, ut velideo *ῥῆσι πωροτόξοιτες, ἔξωφαι,* & *ἱεργαίς, ὡς δὲ ἡ πᾶσιν ἱεραῖς* à facili motu dicantur; soli qui velocissimus sacri sit; & summam cū igne cognationem habere credantur. Ita sanè se aliquando efferunt, ut humanum visum effugiant; nihilominus prædam inde visam, jaculo citius demissi, assequuntur. Peculiare illis & cum sola Noctua commune, in aëre sese resupinare, caudam deorsum, & alas expandere, his vice soli uti.

INGENIVM ex parte attigimus, solitariam semper, præterquam tempore coitus volare; justè magnitudinis cum vulpibus etiam, Aquilis, & vulturibus certare; in Thraciæ *i* parte supra Amphipolim cum hominibus societate quadam aucupatum fuisse; in toto avium genere docillimam esse; avem sibi forte sub noctem oblatam, totam noctem sub pedibus tenere, ex oriente sole manumittere, obviam non persequi, tandem, succo Hieracii herbæ oculos tingere, sic claritatem pristinam recuperare, addi potest. De cætero, mortuum *k* lugere, & in oculos ejus terram ingerere, nocturæ à reliquis avib. infestatæ auxiliari. Turem deprehensam *m* dimittere;

unde Aegyptii, ne quando imprudentes avem ab Accipitre dimissam gustent, toto eorum genere in cibo abstinent, à *n* Tinnunculo o crocodilo, & vite nigra sibi metuere; cum salvia, mentha, abiete & salice sympathiam habere; Authores quidam prodiderunt.

Vsum si spectes, pulli suaves sunt valde, adultorum caro dulcis & levis. Totus assus & in cibum sumptus, morbum sacrum; in rosaceo elixus, oculorum vitia, pulvis in quo se volutavit, lino rutilo ægri collo alligatus, quartanam, adeps oculis inunctus caliginem, oculi à collo suspensi tertianam; depellere sed frustra creduntur. Stercus in vino dulci tritum, *p* conceptum juvare; fumum verò *q* ex eo, spolio serpentis, opoponace, myrrha, galbano, castoreo, sulfure citrino, & felle vaccino excitatum, & per fistulam in uterum exceptum, fœtum educere, credibile est.

n Plin. l.
10. c. 37.
o Plut. in
Iside & O-
*siride.**p Hippocr.*
de morbis
mulier.
q Vellani-
van. in Bre-
via.

CAPUT II.

De Accipitribus in Specie.

ARTICULUS I.


De Asteria, Accipitre Palumbario, & Fringillario.

ASTERIAS, qui & Astur aliis, corpore est grandi & oblongiore, unde Palumbario a comparatur, punctis & notis quibusdam stellas referentibus respergitur, hinc ipsi nomen. Capitis pars anterior extensa paulatim est in rostrum. Oculi varii & pellucidi: collum longius Aquilino. Femora longiora quàm falconum, crura horum respectu brevia, & crassa. Pedes magni. Cauda ob longitudinem dependet. Est ex eorum genere, qui, quòd emissi præterito pugno revocentur, Pugillares mansuefactariis dicuntur. *Differentias* sortiuntur Astures varias. *A natura.* Alii aut rupes mari adjacentes incolunt, aut flumina & aquas dulces sectantur, qui humilem propè terram volatum exercent, & clandestino astu prædam adoriuntur. Alii diffitis à mari locis delectantur, & ex excel-

a Arist. l. 9.
Histor. c. 36

sis ar-


Buteo.
Bulant . Busalm
massiveijh.




Goyrani seu Boudree Bellonij.



Accipiter.



Hapich.



sis arboribus prædam despiciunt, & infestant. A *Sexu*, in quo fœmina colore ad Aquilam accedit, nisi quod maculis dentioribus & rufis aspergatur. A *magnitudine*, quæ Astures ita commendat, ut in Syria aves quæ prædæ aucupio serviunt, ad pondus emantur. A *loco*, sunt namque *Armeni*, qui oculos habent virides, & si cum dorso nigricantes, optimi censentur; crura candida, pedes magnos. *Persis*, corpus græde, plumis benè vestitum, oculi concavi, supercilia pendentia. *Græcis* caput grande, & raræ in collo plumæ. *Africanis* dorsum nigrum, oculi, in juventute nigri, ætatis progressu rufescunt. *Sardis* pennæ nigræ, crura breviora, femora longa, pedes pallidi. *Illyricis*, sive Sclavis, statura mediocris, pennæ rubræ, majori ex parte prunarum candentium ad instar; pedes magni, femora ab interna parte plana, volæ manus instar æqualia. *Alpinis* corpus magnum, oblongum, pedes ferè candidi, sufficiens ad leporum venationem robur. *Germanis* oculi iris & suprema capiti contigua rostri pars, crura, tibiæ & pedes, crocea. Pennæ caudæ nigris & canis iisque latis & obliquis maculis asperguntur; colli superioris & capitis rufescunt, & pūtulis, nigris interstinguuntur. Carcanni Astocellus, est fortè Tardici & Belonii SemiAstur.

ACCIPITER PALUMBARIUS, qui Græcis est *Φασσόν*, *Φασοτύπ*, & *Φαβολόν*, seu columbicida, quis sit, b l. 8. Hist. certò dici non potest. Aristoteles b 6. 3. meram nomenclaturam suppeditat, & simpliciter Accipitrem nominat. Ephesius à Nispho citatus, Falconem gentilem vulgò dictum ex eo facit. Alberto cum Asture idem esse videtur, Turnero cum Fringillario idem. Aristoteli est Chalcidis avis magnitudine, & Carnivorus: Porphyrio omnium celerrimè volat.

ACCIPITER FRINGILLARIUS Græcis veteribus *Σπιγίαις* recentioribus *Ξυντέας*, corrupto fortè ab Oxyptero vocabulo; Latinis Nisus, quod ei Alberti ni fallor primum ævo impositum est, sed non Ovidij, cui Nisus idè cum Haliæto, aliquibus Sparverius, ab Ita-

lorum Sparviero dicitur. *Mas* qui Muscetus vocatur, & fœmina minor est, quiq; ab Aldrovandro exhibetur, *rostrum* habet breve, unco acutissimo præditum coloris cornei subcærulei. *Oculi* pupillam ochræ colore pallido, lutea iris excipit, quod reliquum est intentu flavet. *Caput*, collum, pectus, venter, crura albicant, & variis maculis distinguuntur. *Dorsum* & alas maculæ multæ albæ respergunt. *Cauda* nigris & fuscis maculis transversim ornata, reliqui ferè corporis longitudinè æquat. *Pedes* & tibiæ crocei sunt coloris. *Fœmina*, vertex, collum, dorsum, alæ coloris sunt obscurè fusci. In *Syncepite*, & alarum medio, qua dorso incumbunt, alba macula conspicitur. *Pars* totius corporis *prona*, est candida, & transversis lineis luteis interfecatur. *Degit* tempore hyberno in sylvis cæduis, earumq; gracilibus. Non ante occidentem solem ad sedem suam revertitur. Plærumque adverso vento *volat*. In legibus Salicis de eo legitur, quod qui furatus fuerit, centum & viginti denarios persolvere deprehensus teneatur. *Dividuntur* ab *Ætate*, in *Nidarios*, *Ramularios* qui necdum plumarum deposuerunt exuvium & mutatos. A *loco natali* in *Illyricos*, qui ut plurimum lumbos, ac dorsum nigra obtinent, & vitam brevem agunt. *Orientales* quibus cauda duodenis pennis instruitur, *Africanos* quibus oculi nigri, pectus nigris & transversis maculis varium, alæ longæ. *Tridentinos*, qui sunt proceri, volaces, sæpe captas, alaudas in terram deorsum dejiciunt; mox sursum arripiunt. *Vincentinos*, qui aut in montibus Vincentinis nascuntur & omnes statura sunt exigua; aut in Mucrofticanis Spinaroli dicti, capite magno, reliquis minores, & ad aucupia inepti: & *Ignotos*, qui corpore mediocres, maculis ferrugineis ad rubrum inclinantibus, resperguntur.

A colore Albos namque in Septentrionalibus oris reperiri,

Olaus Magnus author est.

b l. 8. Hist. 6. 3.

l. 3. de abstinentia ab animalibus.

ARTICULUS II.

De Circo Aesalone & Tinnunculo.

Nomen. CIRCUS Hesiodo *ἱερὸν κίρκου*, Homero & Aristoteli *κίρκου* simpliciter, Festo Circanea vel Circenda, fortè, quod, cum insidiatur, circuitum in aère faciat, dicitur.

Descriptio. Si descriptionem Bellonii sequimur, haud multò milvo minor est: *Capitis* vertex & guttur inferius ex rufo albicant, plumulae quae auditus foramina tegunt nigrae sunt. *Rostrum* capiti continuum plumbeum est, extremum atrum, *collum* breve. *Crura* gracilia, lutea, falsò altero claudicare, Plinius prodidit.

Locus. Galliae est inquilina, & ibidem in Arveniae planis *nidulatur*.

Nutritum. Cuniculos, vulpes, a columbos, b Plin. li. 10. Turtures, c Mures d infestat. Bibit cum in maritimis versatur. Amaraginem, lactucam sylvestrem, vel crocum nido imponere creditur.

Vox. Vox ipsi acuta, e & clangere dicitur, idè; tum facit, f cum praedae propinquus, de ea apprehenda est sollicitus. *Volat* in gyrum, & quidem velocissimè, hinc g Homero *ελαφρότατος*, *πάχυσ*, *ἄγγελος*, Oppiano Equis Iberis velocissimis celerior.

AESALO, qui Turnero Smerillus, Isidoro Merillus, Crescentiensi Ismerillus, Alberto Mirle, inter rapaces minimus est, & tum corporis specie, tum pennarum colore, Falcones refert.

Perdices & columbas venatur; A-laudas tam avidè ut ad h clibanum usque ardentem, puteum, vel hominum vestes offendat, si pericia, & usus aecedat, quatuor merilli, cygnum etiam deiciunt. Solus omnitempere i ap-h Crescet. paret, quod tamen Buteoni Aristoteles k adscribit.

Inimicitias cum l vulpe & corvo gerit; illius catulos interficit; hujus ova confringit. Corvi vulpibus auxiliantur.

TINNUNCULUS Gazæ aliquādo Tristunculus, ut Italis Tristarellus, Plin. l. 10. ut Italis Tristarellus, & Canibellus & c. 74.

Gavinellus. Graecis *κίρκος*, *κίρκινος*; *Nomen*. *κίρκινος*, & *κίρκινος*, quod multis milij instar punctis insignis sit, dicitur.

Mas, prout ab m Aldrovando describitur, habebat, *caput* in summo vertice nonnihil cōpressum, coloris cum univèrsa cervice ad dorsi initium ferme cinerei. *Rostrum* statim deorsum molli declivitate tendens, unco insigni ac longiusculo, cujus pars capiti contigua fulvescit, media colore est cinereo, ad latera appendix erat, hemicycli formā. *Alas* & dorsum ferrugineis pennis notis atris distinctis; gulum, pectus, ventrem flavis maculis nigris perspersis vestitum. *Alas* oblongas, & quinque digitorum spacio ultra Uropygium extensas. *Caudam* maximā sui parte cineream, reliqui corporis longitudinem aequantem. *Feminae*, quae major erat, *rostrum* brevius cum rostro magis recurvo, cinereum. *Dorsi* & alarum pars superior ferruginea ad rufum accedens. *Pennae* extremae dorsi cinerei coloris, & notis trāsversim fuscis obliquis utrinque in angulum medio scapo coeuntibus maculatae. Habet Aldrovandus & Tinnunculum fœminam alteram, cujus descriptionem apud eundem vide.

Nidulatur in altis ædificiis, muris, *Locus*. turribus & cavis quercubus, mone-dularum more, non super fronde, sed in latibulis.

Fœminas Mas semper sectatur, n Genera-de absentibus dolet. Illæ supra qua-tio. terna o ova edunt, minii modo rubē- n Aelian. tia. *Pullos* tam diu alit, donec proprio l. 2. de Animal. c. 43. volatu vivere possint. o Arist. l. 3. de gener. c. 1.

Vicētat papilionibus, Locustis, vespis, muribus. Inventus aliquando in nido ejus & serpens: sed & ipse in picarum nido cum pullis inventus est. Bibat annon dubium. Aristoteles p p l. 3. de gener. c. 1. rarò & solum inter uncungues tradit. Aelianus q & Suidas nullo potu in-q l. 2. de Animal. cap. digere scribunt.

Cum columbis singularem colit 43. amicitiam, cum Accipitribus aliis, et si sui generis capitalem hostilitatem exercet. Ideo, r Plinius. Avis, quæ r l. 10. Hist. Tinnunculus vocatur, cum columbis stor. Nat. habenda est. Defendit enim illas ter- c. 37.

retq;



Accipiter Palumbarius.
Habich Rakenstößer.




Accipiter Nihus.
Rötelgeier.



Accipiter Fringillarius Nihus.
Rötelgeier Fincken
habicht Sperber.



Tinnunculus mas.
Wandwähler Sternschmab.



Tinnunculus femina.

retq; Accipitres naturali potentia in tantum, ut visum ejus vocemque fugiant. Hac de caula præcipuus columbis amor eorum, feruntque si in quatuor angulis defodiantur in ollis novis oblitis, non mutare sedem columbas. Fumus ejus albugines oculorum & extenuat.

Plin. l. 29.

Hist. Nat.

cap. ult.

ARTICULUS III.

*De Bubeone, Subbuteone, aliis
Accipitrum apud Aristote-
lem generibus, & sacro
Aegyptio.*

Nomen.

Plin. l. 10.

c. 28.

Descri-
ptio.

BUTEONES, qui & à numero a testium Triorchis, Marcello, Millo dicitur, quæ ternam descriptionem Aldrovandus exhibet.

Prima sub nomine Buteonis ex motibus Vineolanis allati ponitur. Corpus erecti duarum Spithamarum erat. Caput habebat compressum, figurâ trigonâ. Rostrum nigrum membranâ circa nares luteâ vestitum. Iridem circa pupillam in oculis nigerrimam. Collum breve & plumosum. Dorsum ad caudam coloris ferruginei. Altera ex Gesnerus sub Bushardi ut Sabaudis dicitur, matris cognomento, eaq; duplex. Magnitudine prior magnâ Gallinam referebat. Caput pennis fuscis integebatur: Collum brevissimum erat. Pennæ in tergo fusæ, extremæ non nihil rufi coloris præ se ferebant; in ventre & pectore albicantes nigrisq; plaræque maculis per medium insignes visebantur. Testes deerant. Alteri, circulus in oculis flavissimus iridem nigram ambiebat, colore non nihil à superiore variabat. Venter, latera & crura superius plumis albis vestiebantur, quas latiusculi circuli obscure rufi per transversum distinguebant. Testes bini albi & pusilli ad spinam dorsii inter utrumq; renem confederant, in quorum medio particula teste minor & flava, testiculo proportionem respondens, visebatur. Tertia est Bellonii sub nomine Guyrani seu Boudree. Huic rostrum est curtum, acie nigrum & hamatum, narium re-

gio & rictus flavescunt. Venter plumis candidis, quarum apicem macula nigra, juxta scapi medij ductum insignis, vestitur. Rectrices alarum plumæ, crenas instar ferræ exhibent nigras, ubi albere incipiunt. Caudæ color varietate Attaginis similis. Crura antica & postica annulis imbricata. Quarta est illius in quo dissecto tres testes inventi, & qui hæcenus descriptionis in omnibus ferè conformis erat.

Victus ipsi ex herbis b selarea, asperula seu alyso & Matrisylva; ex animalibus, k mures, ranæ, rubetæ, laceratæ, limaces, serpentes, scolopendræ, crucæ. Erepta illi aliquando ab d ardea & anguilla; inventa in dissecti ventriculo & talpa. Volatus est tardus, tam deses etiam, ut telo petitus vix ad tertium ictum cedere dicatur, idcò nullo negotio capitur.

Vsus ipsius tum in cibo, tum in Medicina. Sanè & in Balearibus insulis, e & apud Arvernos Galliæ populos in honore mensarum est. Carnem quippe habet, teneram, hyeme præsertim, & dulcem. Testiculi ex f aqua fontis cum melle decocti ad venerem commendantur.

SUBBUTEO seu Hypotriorchis, quod nomen Aristoteles g illis qui in Accipitrum genere latiores sunt adscribit, prout ab Aldrovando describitur, verticem habet ex cinereo & castaneo ad nigrum vergentem; ejusdemq; coloris macula, una à capite per tempora ad gulæ latera descendit; altera ab initio rictus sub oculis utrimque per gulam in longum proteditur. Palpebre sunt subluteæ. Plumæ menti & gulæ totæ albæ, & color ille continuus, ad cervicis & verticis per tempora initium, quod minori oculorum cantho ex opposito est, perducitur. Pectoris totius plumæ, nec non & ventris medio macula fusca oblongâ notatæ in oris albicant. In pedum planta, tubercula veluti calli ubiq; eminent. In nemoribus cellis & denis degit, & homines quos Perdicum vel Coturnicum venationi operam dare conspexit, ipsi insequi solemne est, ut aviculas Canum metu subvolantes arripiat. Sed hæc de istis sufficiunt: quid verò

Nutrim-
entum.

b Bellon. l.

2. de Avib.

c. 10.

kc. Arist. 9.

Hist. c. 1.

d Simonid.

apud A-

then.

Vsus.

e Plin. l. 10.

c. 49.

f Bapt Por-

tal. 3. c. 34.

Pythognō.

Descri-

ptio.

g Arist. H.

A. l. 9. c. 36.

h l. 9. *Hist.* verò h Aristoteles per Pernem, Percum, Rubetarium, & Levem, intelligat, disquiritur. *Pernos* apud Hesychium & Phavorinum genus venatorij est accipitris, ultra ignotatur. *Percus*, seu Percuus idem cum Fringillario propter alarum nigritiem, esse videtur. Aristoteles per Fringillarium, Nisum fœminam; per Percum marem vulgò Maschettum dictum, fortè intellexit. *Levis* quis sit ignoratur. Bellonius Smerillum esse existimat. *Rubetarius* vel idem est cum Levi, quia de utroq; Aristoteles. Abundè vivunt, & humivolæ sunt, vel Milvi species. Qui SACER ÆGYPTIUS Bellonio dicitur, corporis magnitudine Corvum refert, capite Milvum, colore ad Falconem sacrum accedit. In Ægypto est frequentior, quàm ulla alia Avis quæ rapto vivit. Rara in Syria conspicitur; sed & in Caramania aliquando. Serpentibus potissimum vescitur. Vnde ei olim apud incolas tanta i reverentia, ut illius vel per imprudentiam occisor, morte multaretur; ipsa mortua honorificè sepeliretur.

i Herdot.
in Euterpe.

ARTICULUS IV.

De Lanariis & Collurionibus.

DE Lanariorum ignobili genere, Buteonibus rectius annuerando hic res est, de nobili inter Falcones agemus. *Nomen* ipsi seu à laniandis avibus: seu quod plumas lanarum instar molles habeat. Aliquando Lanius Molliceps, Falco albus, degener, & Buteo albus dicitur.

Nomen.

Aldrovandus n duplicem iconem exhibet. *Prior*, accipitri palumbario magnitudine par, vertice erat lato, capite & collo crassis, omnibus uti & ventre, totâ parte pronâ, femoribus uropygio, & cauda inferna. Inter oculi canthum majorem & rostrum, maculam habebat nigram, alas oblongas; longè ultra uropygium protensas, tibias luteas, & pro reliqui corporis proportionem valdè graciles, easdem à poplite ad ungues paulò plus palmo longas, & culmo triticeo vix crassiores.

n Aldrovand. l. 5. c. II.

Vngiculos uncos, sed tenues. *Alteri* lingua erat lutea & nigra. Caput & dorsum cum leucophæo fuscum, pectus totum leucophæum, ad anum usque maculis in longum ferrugineis distinctum. Alarum remigia ex sex ordinibus ratione coloris constare videbantur. Vropigium totum candidabat. *Pedes* habebat luteos, femora plumis ad poplites usq; vestita. Tibias erectas & instar stipitum. Vngues longos & admodum recurvos.

Victum ex muribus in agris quærit; *Albert. l. 1.* sed & avium pullos, in nido, vel cum 23. de Animal. c. 15. per terram volandi impotentes, replant, rapit.


COLLVRIONES de minore sunt Lanariorum genere; illiq; vel *Majores*, vel *Minores*. Ex *majoribus*, qui *Aeliano* Merulæ venaticæ, fœmina est *Differētia*. turdi mediocri magnitudine, è lōginquo contēplanti tota cinerea. Capite ad reliqui corporis proportionem triplo majore. *Rostrum* habet parte superiore valdè inflexū: inferiore fursum modicè curvatum. *Linguam* in extremo multifidam, & in fibras acutas, & quasi capillamenta quædam desinentem. *Oculos* totos nigros. *Caudam* picæ similem; quæ explicata, corniculatæ crescentisve lunę imaginem exhibet. In Mare gula, pectus, venter, femora, cauda prona dilutius quàm in fœmina albicant. Vertex & dorsum obscurius fufcescunt, plumulæ harum partium adeò sunt tenellæ, ut pili potius glabri ac leves esse videantur. Erat & *alter* totus albus, rostro, tibiis & ungibus exceptis. Interdiu semper ferè arbori summæ aut dumeto insidēt: in Helvetia inter frutices spinosos, & confidentes caudam erigunt.

Victus ipsis Papilionibus, scarabæi, *Nutrivermes*, juli, erucæ hirsutæ, locustæ, *mentum*. grilli; quos, præda uberior si cōtingat, defectum penuria providi in aculeis & spinis arborum fugunt: inter aves Turdi, Fringillæ, Picæ sylvestres. *Offa* comminuta devorant, & famelici, tantos carnis bolos in gulam ingerūt, quantos rictus capere potest.


Nidos ex musco, lana, fundos eorundem ex erica, componūt. Senos pullos *Generatio* Bellon. l. 2. de Avib. bus, c. 23.




Subuteo. niofweiben




Laniarius.



Laniarius. Schimneev



Lanius cinereus Femina



Lanius albus
neintöbler







Timunculus Cincbris
Wanen Wäher



Cuculus
Guch gauch



Dendrofalcus

Baumfalk





Cuculus
Alter




Accipiter
Spezies

Lanius Minor



Lanius
Warkengel
neuntöbler


Lanius
alius. War-Kengel.



Lanius Collario.



Lanius *Milvus.*



Cuculus. Guggauch.
Kukkrick.




Buteo. Triorches
Buschart, Busant.




Accipiter *minor.*



Milvus. Weije.



Accipiter *maior.*



bus, pedibusq; exceptis, quia plumularum radices ad virorem nonnihil vergunt, omninò dissimiles.

Fox. *Vox.* canum à longè auditum latratum, aut Noctuæ aliam appellantis ululatum referunt, & vocem Houin, quam sæpius iterant, exprimunt. *Aelian.* Uniformis ea hyeme & autumnos; vere & æstate varias Avium modulationes imitati, eas ad se capiendas alliciunt. Capti in caveam inclusi, muti & elingues permanent. Hyberno tempore facile capiuntur. Nam avem caveæ inclusam invadunt, decipulâ decidente, intercipiuntur.

L. 5. c. 14. *Collurio-* *Collurio*num minorum quinque genera observavit Aldrovandus. Tria aliqua sui parte rubescentia: duo cinerea. Aviculæ sunt Alaudis paulò majores, duos palmos & pollicem circiter longæ. Omnes utraq; rostri quod recurvum est, modicè tamen parte, ternos pilos instar barbæ prominentis habet. Utrorumq; pulli, antequam frequentibus integantur plumis, virescere nonnihil apparent. Tanta eis (expertus Bellonius) similitudo, ut difficillimè dignosci possint. *Cibus* ipsis forices, mures, lacertæ, talpæ. Inter edendum, uni tibiæ insistentes, cibum pede altero sursum retractoprehendunt. Humilius volant, & prædæ inhiantes aliquandiu sese in aëre librando suspendunt. In carduis sæpissimè quiescunt. Octonam aliquando, senaam nonnunquam prolem excludunt. Rubore verticis qui insignes, in Italia inter delicatos cibos.

ARTICULUS V.

De Milvo & Harpa.

Nomen. *Milvus*, quod vocabulum & piscē, a *Plin.* l. 9. *M*_a & stellam *b* in Septentrionali parte significat; Græcis *ἰκνυ*, Cretenſibus *ἀρπυ*, Helychio si locus spectus non est, *ἀναπνοσιέρας*; eidem & Phavorino *συλλ*, *ἔλαν*, & *κασυνδ* - *cl* 10. c. 10 *ελον* dicitur. *Plinio* c ex Accipitrum est generib; Aristoteli inter carnivoras, sed vix rapacium nomine dignus.

Differē- Tria ipsorum sunt genera. *Vnum*, *tia.* *ἰκνυ* & *ἀσπιδος* d Aristoteli dictum, minus nigrum & robustum. *Alterum* *Anim.* c. 6. majus, colore propemodum ruffo, in-

firminus. *Milvi* *regalis* nomine gaudet, quod à binis falconib. sacris in ipsum emissis, intra nubes etiam se condens, summa cum Principum voluntate in terram dejiciatur. Cui & Milvus palustris x accenseri debet. *Tertium*, x Et Bou-

albidius & rapacius, Angliæ, & Septentrionalibus regionibus, in quibus nigredo & albedo in candorem vertitur, frequens. *Descriptio* operosâ opus non est. *Descri-* *Rictum* habet rectū, nulla marginum *ptio.* appendice à fræno seu lateribus extremis ad unci usq; initium. Intestino & hepatis fel adjunctum habere Athenæus e tradit.

Loca temperata Milvo sunt familiaria, nisi quod in Lybia, circa fontes Nili perennare f dicatur. Ideò & insula S. Dominici, vicinoque mari multi, quibus bifurcata cauda, visi sunt: & in Angliâ, nullo non anni tempore apparent, & quod spurcitiam in plateis & ad flumen Thamesin legant, lege ab omni noxa immunes sunt. Ideò hyeme adventante vel calidiores regiones Aetoliæ citius, quàm Regales petunt, ibidemque hybernant; (sanè ultimo Aprilis tot circa Pontum Euxinum g Bellonius vidit, ut, si quindecim dierum spacio tot prætervolassent, hominum superaturos fuisse numerum crederet) vel in nidis ad breve tempus plumarum suarum vellere corpus à frigore tuentur: vel in quercubus aliisque arboribus carie excisis, corpus fovent. Ideò denique æstu accedente, calidas regiones deserunt, & in Europam, tardius tamen Aetoliæ, quàm Regales revertuntur; & æstu in eadem urgente, supra nubes, quò radiorum solarium reflexio pertingere non potest, ideò nec æstus ita urget, elewantur, ibique aliquantisper hærent.

Viciant carne, *b* animalium pul- *Nutri-* *lorum* inprimis gallinaceorum & an- *mentum.* *serinorum* tam vivorum, quàm mortuorum, & fructibus. In Ægypto in *h Arist. H.* *palmas* devolasse, & dactylos comedisse visi sunt. Fruges respuere *k A-* *ristoteles* credidit. Bibunt *l* rarò, *k* *l. c.* quia sicco cibo rarissimè utuntur; & si quando, ex solis pluvialibus aquis, si

Tzerzi credimus; à quibus tamen dum pluit, abstinent. Quod ad fenestras domum in Ægypto *m* advolant, & in insula S. Dominici propè ad homines accedunt, in eorumque conspectu corpus à pulcibus expurgant, mansuetudinis est indicium: quod pueris cibum è manibus, carnes abluentibus, pisces exenterantibus, pileos deambulantibus in urbe, nidulationis inprimis tempore, eripiunt, rapacitatem arguit: quod in Eliden nihil ex funerum ferculis *n* esculentis; nihil Olympiæ ex ara carniū Jovi sacrificatarum, auferre dicuntur, vel *o* fallum est, vel timiditatis, *o* quia turba præsens, argumentum præbet. Creduntur primo anno præ audacia nihil mortuum gustare, secundo præ metu nihil vivum edere; tertio fame interire.

Generatio. Pariunt bina, magna ex *p* parte, interdum tamen terna, totidemque ex *p* Arist. H. cludunt pullos, post vicenorum dierum incubatum: sed qui Aetolius vocatur (malè Plinius Aegolium vertit) quaternos.

Vox. Vocem si spectes, lippire vel jugere dicitur.

Visus. Visus ipsi satis *q* acutus. Unde Aristophanes *r* παντοφθάλας dixit.

Volatus. Volatu & præstant, & in eo aliquid peculiare habent. Illud, tum quia intra nubila se recondunt, & indefesso labore maxima aëris *s* spacia emetiuntur: tum quia tanta velocitate se præcipitant, ut sæpè projecta in altum pulmonum bubulorum segmina, unguibus antequam in humum delaberentur, *t* arripuisse, visi sint. Hoc, tum quia ducunt per *n* aëra gyros, unde Circaneæ, κυκλεῖνσαι, & περιόδουσαι, aves dicuntur; tum, quia immotis alis diutissimè in aëre, motus tonici beneficio hærent. Scilicet, elatæ ex parte paulisper ala, unde subitaura, motum aëris in reliquum etiam corpus excipiunt, & ita sustinentur. Sufficitur lata in alarum vicem cauda, quā, prout respoulat, dilatant, constringunt, deprimunt, attollunt. Videatur, inquit

Plinius. *x* artem gubernandi navium docuisse caudæ flexibus, in cælo monstrante natura, quid opus esset in profundo.

Amicitiam colunt cum *x* Harpa & Cuculo. *Inimicitias* cum vulpe, *a* z Arist. l. 9. corvo, gallinis & columbis exercent. *Hist. cap. 1.* A solstitiis afficiuntur *b* | odagra, id eò tunc frequentius latent. *Aelian. 5.* *H. A. c. 48.* *a* Horatius in Epodo. *b* Plin. l. 10. cremati bibitur, contra Epilepsiam. *c. 1 H. N.* testiculi ex aqua fontis, contra impotentiam; fimus, contra articulorum dolores, quod & vermes, qui ex eo XL diebus in fimo macerato, nascuntur, faciunt, cōmendantur. De HARPA inter Aristotelem, Plinium, & Oppianum non convenit. Gesnerus vulturem aureum Harpam Oppiani, quod sub mento plumas barbæ instar habeat, esse credidit. *c* Aldrovandus cl. 5. c. 16. Milvum palustrem opinatur.

ARTICVLVS VI.

De Cuculo.

CUCULUS, quo nomine mons in agro Bononiensi, piscis *a* marinus, *a* Athen. l. 7. c. 27. *b* herbæ involucrum papyraceum, & alia veniunt, Græcis κούκωξ, nomen à voce sortitus est. Accipitri apponitur, quod eum tanta similitudine referat, ut Aristotelis ætate hoc ipso creditus sit prognatus, & apud *c* Gallos *c* Bellon l. 2. de Avib. Falco cuculi parens communi probio dicatur. Plinii is videtur error. Nam Aristoteles, *d* dum Cuculum ab Accipitre interimi scribit, quod nulla avis in suo genere solet facere, accipitrini generis eundem non esse docet.

Duo sunt ipsorum genera, Majus nempe & Minus, quæ sola inter se magnitudine differunt. Nec est quod curiose describantur. Neque ad uncis sunt inquit *e* Aristoteles unguibus, ut Accipitres, neque capite accipitribus similes. Sed ea utraq; parte columbos potius quam accipitres imitantur: nec alio quàm colore repræsentant Accipitres, nisi quòd isti maculis seu lineis distinguantur, cuculi velut punctis. Cave tamen, illud quod de pedibus, extra ad uncitatis defectum intelligas. Nec enim iis terni ante & retrò unus ut columbis; sed bini antici & to-

& totidem postici, ut Picis, & nocturnis a vibus, quod Antiquitati ignotū. Sed & id, quod de punctis dicitur, strictè sumendum est. Nam quos Aldrovandus describit, pronā parte totā tam cinerei sunt, quā albi, lineis seu maculis transversum ductis oblōgiusculis, fuscis, & interruptis interdum, interdum magis continuis distincti. *Crura* corporis magnitudini in ijs non congruunt. Nam & femora brevia, & tenuia sunt, & tibiæ vix pollicem latum longæ. Juvenem totum nigricantem maculis subruffis per alas respersum, Aldrovandus notavit, foramina narium in rostro multum eminebant. Oris pars interior flavi coloris erat.

Locus.

Loca, si attendamus, ubiq; ferè gentium reperitur, novum orbem, & Æthiopiā, si Alvarezius fidem meretur, si exceperis. Aestate pro natura avis, in cujus nido parit, in arborib. petris, & fluminum ripis *degit*: hyeme in terræ, lapidum, & arborum cava se abdit, in ijsq; per totam hyemem latet. Auditam ejus latentis vocem fabulatur, cum truncus fornaci calefaciendæ immitteretur.

Nutri-

mentum.

f Arist. l. 9

H. A. c. 29.

g Arist. l. 6.

H. A. c. 7.

Plin. l. 10.

H. N. c. 9.

h Author

de Natura.

i Arist. l. 3.

de Gen. c. 1.

k Idem l. 6.

hyster. An.

c. 7.

Genera-

tio.

l Hist. Ani-

mal. l. 6.

c. 1.

m Arist. l. 9

Hist. Ani-

mal. c. 29.

n Aelian. l.

3. de Ani-

mal. c. 30.

o Plin. H.

N. l. 10. c. 9

p Arist. l. 3.

de gen. c. 1.

Aelian. l. 3.

de Animal.

c. 30.

Cibus ipsi erucæ, muscæ, fruges; sed & carnes, si verum est, grandiusculum nutricis pullos, imo ipsam devorare, quod f quibusdam creditum, quam exinde carnivoras esse g negatur, quod nonnunquam Accipitri in cibum cedat. Hyeme dum latitat & implumis est, vel congestis & ibidem h repertis vivere, vel hirundinum & urforum modo vitam sustentare, credendus est.

Quantum ad *Generationem*, quia naturæ i est frigidæ, majori ex parte k singula parit ova, rarò bina. Genus quoddam in petris m idificat; (sic Arim stotelis l verba sumenda sunt) reliqua in palumbi, n alaudæ, luteolæ, sed curruæ in primis nido ovis n jam facta, ova sua deponunt: seu, quod o obmetum & ignaviam non fore tutam o Plin. H. generi suo stirpem opinentur; seu N. l. 10. c. 9 quod propter frigidam p corporis cōstitutionem, ex ovīs pullos excludere de gen. c. 1. non possint.

De *ingratitude* in nutricem, non

conveniunt Authores. Alij, negant, Ingeniū. dum, vel avis eum duntaxat in cujus q Arist. l. 6. nidum sua importat, ova q comedere, Hist. c. 7. propria subicere: vel deprehēsa post- Isidor. l. 12. quam adoleverint fraude, à nutrice r Orig. c. 7. relinqui; vel ad volatum firmos, sibi r Oppian. in l. l. i. conscios ad parentem s evolare; vel s Aelian. l. c. nutricem, seu viso cuculi, cujus ovum citius excluditur, pullo, tanquam eo contentam à suis incubandis t destit- t Niphus a- ftere; seu exclusos, specie cuculi ele- pud Aldrov. gantiores captam (arripit hic cibos avidus, & pinguescit) tanquam spurios u occidere, & in cibum cuculi pullo u Arist. l. 9. dare, scribunt. Alij affirmant dum, vel H. A. c. 29. pullos nutricis ab ijs vel conculcari, vel cibo fraudari, vel ipsa x inspectate x Plin. l. 10. absumi; & jam volandi potētes, ipsam c. 9. H. N. nutricem y corripere credunt. Ut ut y Idem l. c. sit, hoc certum est, educare curruam subditum cuculum adulterato fecit nido.

Volatus ipsis brevis, interruptus, humilis, & ut hostem effugiant, instabilis. Ideo Milvorum scapulis, quo tempore adveniunt, suscipi putantur, ne per longa aëris spacia defatigati deficiant. Solent autem incunte vere apparere; cujus adventantis primi post amphisbænam sunt nuncij. Caniculæ ortu z occurrantur, post rarissimè a z Plin. l. c. cernuntur. Hyeme deplumes in ca- a Ael. l. 3. de vernis torpent. Anim. c. 30

Vox ipsorum propria Cucu. hanc minus explanant, b cum se abdituri b Arist. l. 9. sunt. Ad ultimum alibi Julium, ad S. H. A. c. 49. Johannis, apud nos, festum, perfectam edit, si ultra, uvæ vix mature- fcent.

Inimicas tum omnes ferè aviculas, præcipuè cum ova pariunt, habent, seu Antipathia. quod illorum sint fraudis conscia: seu quod Accipitri per quam sint similes: tum cicadas ex ejus saliva c ortas, quæ c Isidor. l. eos frequenti agmine invadunt, & 12. orig. c. 4. postquam sub alas irrepere, moribus lancinant. Ideo sub ortum caniculæ, quo raucis

Sole sub ardenti resonant arbuta cicadis. cantilenam suam abruptit. De ejus- Sympa- dem cum Milvo amicitia superius di- thia. ctum est, quod de paliuro in monte Coccygio à c Plutarcho refertur, o- c Plut. de mne animal, solo cuculo excepto, fluviis.

quod infederit, tanquam visco retinente hæreere, non minus fabulosum est, ac quod de cicadis ex ipsius saliva natis dicitur.

Morbi. Inter corporis affectus referri potest, quod hyeme deplumescit, pennas mutat, & simul colore immutatur. Exuvio deposito, corpus ejus scabrescit.

Vfus. Usus ejus, & in *Medicina*, quia cine-
d^{Plin. l. 10.} res d^{H. N. c. 9.} usti ad dolorem ventriculi valenti. & in cibo, quia ejus pullo, qui jam volare potest, nulla avium suavitate carnis comparari potest, obtinuit.

TITVLVS IV.

De Falconibus.

CAPUT PRIMUM.

De Falconibus in genere.

Nomen. **F**alconis ut avem significat, vocabulum adeò generale est, ut eo omne rapacium genus Authores includerint; & Aquila, a cum Theodotione & Symmacho, omnes quarum in venatu volatico usus est, Falcones nominarint: Recentiores illis avibus à falcato unguium hamo nomen indidere, quæ Thuscis Campanis vernacula Capys dicebantur, & à nobis jam describentur; ne tamen tam strictè, ut non quædam Accipitrib. communia inter cursura sint.

Differètia. Ad tres ipsos *clases Migratores* nempe, *Campestres*, & *Riparios* Bellonius redigit; ad *nobiles*, *ignobiles*, & *Hybridæ* seu medij generis, quod promiscuo generosorum & ignavorum coitu generentur, b Albertus. Sub illis Falconem sacrum, Hierofalcum, Falconem montanum, peregrinum, gibbosum, album, rubeum, cynopodam arboravum, & lapidarium; sub *istis* Buteonæ, Lanarios, Tinnunculos, sed perperam; comprehendit. Sub his, Germanos & Tunctanos quidam enumerant, sed & hi omnes, ætate, colore, & corporis formâ variant. Hinc *Hornotinorum*, qui eodem anno nati sunt: *Nidulariorum*, qui statim à nido

domi adoleverunt, nec ita ut ramularij pennas producant. *Ramaliæ*, qui circa nidum ramulatim obvolitant; *Mutatorum*, qui vel deplumes sunt, vel plumam veterem cum nova jam commutant; nomina.

Quantum ad *descriptionem* exactâ, *Descriptio.* In capite, dorso, superiore colli, exteriore alarum & caudæ parte cinereus sit & subniger, in aliis passim partibus varius, & virgulis quandoq; interruptus: sed primo anno secundus color rufus est, remissæ rubedinis, albescit deinceps paulatim, eo magis, quò pennas mutat sæpius. *Caput* habet crassum, nec oblongum, nec strictum, superiore parte à rotunditate deficiens. *Collum* & rostrum brevia, maculas in maxillis nigras, circa oculos albas; *oculos* croceos ad rubedinem accedentes, *pectus* cum osse pectoris acuto & duro. *Pedes* patulos, croceos, & ad albedinem declinantes. *Crura* brevia. *Coxas* longas, & pennatas &c. *Morantur* in tota septentrionali plaga, & quidem optimi. Bosnia albos profert, sed & Oriëntis regiones haud malos. Degunt vel in altissimis montium verticibus vel sylvarum arboribus excelsis.

Vox ab acuto in graviores *fl.* *Vox.* Atitur.

Mira quadam *volandi* ratione, in *Volatus.* principio, medio, & fine venationis utitur. Ad prædam pergens celeri volatu in sublime ascendit, & rursus compositis ad pectus, quibus icturus est vnguibus, tanto impetu in avem obliquo volatu descendit, ut strepitum quasi concitati venti suo descensu exciter, in descensu avem percussit, adeò longum vulnus infligit, ut à capite ad caudam usq; discissa, aut toto capite truncata, nonnunquam in humum decadat.

Cum Ardea ipsi periculosum certamen. Hæc enim c^c ubi infra positam se videt, rostro suo prælongo ac acuto, quod prius abscederat, sursum elato, irruentem ita excipit, ut eo semet Falco sæpius medium pectus induat, & ambo interdum illis inter-raneis humo affligantur.

Cum multis sæpè *morbis* confl- *Morbi.* ctan-

Antipathia.

stantur, Febri: Apoplexia, Apostematibus capitis, vertigine, oculorum suffusione, asthma, vermibus, podagra, pediculis, &c. *Antipathiam* cum illis gerit, tum Alauda, quæ in hominis manus, quam falconis unguis mavult incidere: tum Drepanis avicula lacustris, quæ auditis falconis tintinnabulis, tanto operè consternatur, ut malit lapidibus ab homine obrui, quàm volatu se in aëra attollere.

CAPUT II.

De Falconibus in specie.

ARTICULUS I.

De Falcone peregrino, sacro & Gyrfalcone.

Differentia.

Falconum species superius exposuimus. *PEREGRINO* qui primum ob audaciam & generositatem locum fortitur, nomen ex eo est inditum, vel quod semper de regione in aliam migraret, vel quod nidus ejus nullibi gentium inventus, fuerit.

Quatuor ipsorum à colore generatim posuit Carcanus, duo ab eodem Belisarius. *Vnum* quod pennis æreum colorem præ se fert, & in singulis pennarum capitibus ad coronæ modum albedine sigillatim distinctæ pennæ, quasi figuram ostendunt. Si excellere debet, Caput necesse est aliquantum in fornem, vertice leniter elevato ac rotundo, curvatum, cinereo colore habeat: simul atque volandi potens evasit, in rostri parte superius plumulas quasdam, quæ veluti barbulæ speciem gerant; ostendet. Gula lineis in longum ductis nigris maculetur. Supercilia & maxillæ admixto modico rubore albicent. Dorsum livefcit. Alæ sint longæ in ultimam caudam recumbentes. Cauda longa, crassis pennis constans, in acumen paulatim desinens, femora longa: tibiæ breves, pedes colore inter flavum & plumbeum ambigente tincti, digiti graciles. Ungues magni, nigri & acuti &c. *Natales*, Sardinia, Ægypto, Cypro, Cretæ &

Rhodo debet. Si qui in Italia vel aliibi capiuntur, vi ventorum eo depulso fuisse creditum est. In Alpibus etiam nidulari, fide veteri cujusdam Falconarii, Albertus M. refert. *Alterum*, Nigrius, quod multis à priore notis variat, femora lineis transversim distincta, crura item colore croceo sed diluto maculata, gerit. Qui ex hoc genere ab Aldrovando describitur, *Aldrov. l. 7.* verticem capitis habebat planum ac *l. 1.* compressum, Rostrum membranâ luteâ intensi coloris, nares ambiente; capiti conjunctum. Caput, cervicem, dorsum, alas fusca, per singulas ferè pennas maculis atris transversim per alarum maiores resperse conspiciebantur. Gula ex albo non nihil flavescebat, parte sui infima, maculis veluti guttis nigris transversis distincta. Pectus, venter, & femora alba, lineis latiusculis nigris transversis variegata. Videtur hoc genus idem cum illo esse, quod alii Nigrum absolute, alii Carbonarium & Falconarium appellant.

Creditur primò in montanis prope Babylonem visum, post in Salamine apparuisse. Nunc in alpinis & Pyrenæis reperitur: in Germania adhuc rarum est.

Utrumque rarius in volando alas movet, sic à montano distinguitur: & à sublimi in pronum velocissimè descendit.

Adeo mites sunt, ut quandoque irasci nequeant; ad hominumque nutus magnitudine quadam animi potius, quàm inedia venantur. Cretenses capiunt etià Grues, Anates, Mergos, Tardas, Phasianos: Ardeas, in primis si cibi abstinentiâ inducantur. Si Aquilam viderint nunquam impofterum aucupantur.

SACER, qui & Britannicus, Aëlius, & Aëriphilus apud Avicennam Falco Sacchari, vel Græcorum imitatione quasi Hierax Accipiter, per excellentiam dicitur, vel à corporis magnitudine, viriumque præstantia, ita appellatur. Sanè à Bellonio a Accipitrum adiicitur numero. Tria ipsorum apud Tardivum genera; *Vnum*, quod lepores & hinnulos; *alterum*,

quod capreas parvas capit, *tertium* peregrinum exprimit, de quo superius.

Descriptio.

In descriptione Albertus & Fridericus Imperator dissidēt, si Carcanum sequimur, corporis ipsi statura plerūq; oblongiuscula. Capite vertice plano canum. Rostrum cæruleum; Nares exiguae, pectoris, dorsi, & alarum superiorum macula fusca, femora interiora alba. Crura pedesq; tota ferè coloris cærulei. Cauda maculis circularib. phaseolorum aut renum figuram exprimentibus varia. &c. Excellit, cui color rubicundus, rufus aut incanus, lingua crassa, pes amplius, digiti crassi, & colore cæruleo diluti.

Locus.

b Paulus Iovius in libro de legat. Moscovitico.

Inveniuntur apud Tartaros, & Moscovitas. *b* In Polonia, quod Maximilianus Cæsar per suos exploratores comperit, in arboribus non ita proceris nidulantur. Cum versus meridiem victus quærendi gratiâ proficiscuntur, ab aucupibus adventus gnaris, in Aegæi maris insulis intercipiuntur, & Venetias etiam è Creta afferuntur.

Nutritum.

De victu scriptores inter se non cōsentiunt. Belisarius cadaverib. etiam vesci dicit. Tardivus cibos etiam crassiores faciliè concoquere scribit. Albertus delicatè, eos cibandos, cibo semper recente, cerebellis, sanis carnibus, reliquit. *Volacissimi* sunt, nisi è nidis abducantur, & nubes etiâ transcendunt. *Capiunt* Anseres sylvestres, Grues, Ardeas, Lepores, Capreolos. His insident, & cerebrum capite perforato excutiant. In eorum conspectu ne Aquilæ quidem volare audent.

Descriptio.

c. l. 7. c. 3.

GYRFALCO seu Gyrfalcus (malè à quibusdam Horodius dicitur) qui id ab *c* Aldrovando describitur, verticem habebat complanatum colore cinereo. *Rostrum* breve cæruleum, unco modico, deorsum incurvato, subcæruleo, instructum. *Dorsum*, alæ, venter, cauda alba erant. Verum tergi, alarumq; plumæ plenè singulæ nigra macula notatæ, quæ cordis quodammodo figuram emulabantur. Alæ erant admodum longæ. Remiges propè extremum apicem notâ majori ac longiori nigra ornabantur, quæ tamen albo claudabantur margine. *Gula*,

pectus, & venter pura tingebantur albedine. *Cauda* erat breviuscula notis nigris transversim variegata. *Pedum* digiti oblongi, validi, latè expansi, tabellarum continua serie per totum intecti.

Genera ipsorum à colore petuntur. *Differētia.* Alij sunt, flavi, rubei, & cinerei. Albos etiam in Moscovia reperies. Qui in pectore albicant, magis etiam albi sunt, & primo anno dorsum partim albicat, partim subruffum, vel subrubeū est. Ubi verò mutati sunt, color ille subruffus in nigredinem permutatur.

Locum ipsis natalem Norvegiam & *Locus.* Hiberniam Belisarius ponit: at certum in Tartaria d quoq; & Moscovia e in d Paulus Vanet. l. 1.

Vescuntur in primis Columbibus, & id genus aliis: & postquam semel de aliqua ave gustarint: illâ deinceps reliquâ novam semper prædam persequuntur. *Nutritum.* Aggrediuntur & Aquilas, Accipitres, Nisi, Falcones, iis ad volantib., *Pugna.* prædam ulterius non prosequuntur, sed pavidæ persistunt. Si in quinque Grues libero aëris campo unus emitatur, nō prius persequi desinit, quam singulas in terram dejecerit.

Duo habent *peculiaria.* Unum, *Ingeniū.* quod cum simul aliquot vehuntur, certo quodam senii ordine cibum capere soleant. Alterum, quod præter ceterarum rapacium morè, nunquam sese aquâ abluant, sed sola arenâ utantur. Frigore etiam tantoperè gaudet, ut perpetuò, aut super glacie, aut lapide, marmoreve algido stare gestiant.


ARTICULUS II.

De Falcone Montano, Gentili, & Tunetano.

FALCO MONTANUS, quod sit *Descriptio.* magis reliquis indomitus per excellentiam ita dicitur. *Caput* habet vertice fastigiatum & nigrum, coronulâ quâdam cinereâ cinctum, cui in fronte non longè à rostro plumulæ quædam exiles, & capillares eminent. *Guttur* ad sternum usq; non nihil canescit, maculis conspersum majusculis,

Falco Rubens

Rother Falcke



Alies.

Falco Falken andez
art



Falco aliter



Falco Pas.
Sagitt




Falco
Orientanus



Falco

Falk.

Aesalo. - falconom Specier



Gjyrfalco. Gejrfalk.

Falco


peregrinus.



Falco
Bergfalk

Montanus.

Mirle, Smirlin.



lis, *pectus* reliquum versus inferiora, notis quibusdam, quandoq; ferrugineis, nonnunquam rubeis nigricantibus aliquando insignitur, quibusdam guttur & pectus nigris plumis vestiuntur, *Dorsum* a lumbi majori ex parte plumis fuscis, minutis, obteguntur. Aliqui eorum post medium dorsum, lineas quasdam albicantes, aut rubeascentes, quæ deorsum vergunt, habet. *Crua* & pedes plerumq; crocei, vel ex flavo paleari flavescentes, & squamis densissimis integuntur. Mutatos facilius est cognoscere: & optimus est hornotinus fuscus.

Nutritum. Non Anates solum, sed & Anates & Ardeas capit, & persequitur. Visus aliquando & Aquilam, quæ sibi prædam præripuerat, & seipsum interemisse.

Differētia. Ponit & alterum ejus *genus* Aldrovandus, quod *Leucophaum* nuncupat. *Corpus* eius totum cinerei est ad cæruleum vergentis coloris, pro diversa partium ad lucem obversione dilutioris obscuriorisvè. *Rostrum* crassum, breve, nigrum, robustum, pollicaris crassitudinis, tam validum, ut vix ulli alteri fortius. *Pectus* valdè teres ac grande. Diversum primò ab aliis Aldrovandus putabat: sed cum cū descriptione Montani apud Albertum conferret, & verò Montano, qui aliquoties plumas veteres cum novis commutavit, mediam partem dorsi cæruleam affingi, & quo frequentius senectutem exuit, eo tergum magis cærulescere, gulam cum pectore, abolitis, quæ distinguebant cum ætate maculis, albescere, observaret, alterum Montani esse *genus* conclusit.

Descriptio. GENTILIS per excellentiam propter generositatem ita dicitur. Fridericus Imperatori alii sunt Gentiles *Peregrini*, alii *simpliciter* ita dicti. Illi Falconibus sacris sunt minores, & quo plus cum Gyrfalconibus participant, eò elegantioris esse formæ existimantur. Vertex *capitis* debet esse planus, occiput latum. *Rostrum* crassum, & recurvum. *Collum* breve, propè caput subtile, propè spatulas crassius. Habere debent *pectus* foris prominens, & carnosum, cavitatem inter pectus & collum magnam & profundam. *Coxas* plumis

complurimis opertas, & sub genibus etiam dependentes. *Crua* crassa ac brevia, pedes amplos, digitos expansos & macilentos. Cum adhuc hornotini sunt. Alii sunt absolute fuscis: alii rubris, nonnulli pallidis maculis ceu guttulis perornantur. Alii rufi sunt, aut simpliciter, aut ad nigredinē vergentes. Alii fulvi, vel absolute, vel cum quadam rubedine. Maculæ à collo ad pectoris furculā parvæ sunt, inde verò progressæ ad anum usque majores evadunt. Fulvis ad rubeum vergentibus, color est ex æquo permixtus. Laudabiliores in suprema capitis parte ceu corona quadam in circuitu perornantur; prope nares durities rostri virescit. Maxillæ sub oculorum parte subrubeæ sunt. *Dorsum* fusco est colore, ad rubedinem inclināte, marginibus rubescentibus & maiusculis sine guttis tamen exornatum. *Pennæ* alarum maiores fusce cum marginibus. *Cauda* eiusdem cum dorsi pennis coloris, modò quod margines in ea in plurimis sunt pallidiores, seu quod à corde sit remotior, seu propter aliam causam. *Simpliciter dicti* trium eidem sunt generum, sicut & peregrini, de quorum datis notis quo plures obtinent, eò magis probantur. Aldrovandus eosdem cum Carcani GERMANIS facit, qui Peregrino forma, capite, rostro & pedibus sunt simillimi. Corona albicans caput ipsis propè collum cingit, femora interna plumis albis vestiuntur. Mutatis caput, collum, & humeri fusca sunt, dorsum cyanea tingitur. Mares seu Tertiarii à maribus Peregrinorum nulla possunt ratione discerni. In volando crebriore spissioreq; alarū motu utuntur. Rapiunt omne avium genus, Aquaticum præsertim, quod si è nido exemptus adhuc pullus ad hoc instituatur, Grues etiam capere audent. In eo solum Peregrino cedunt, quod non sola animi magnitudine, sed etiam cibi aviditate prædam invadere dicantur.

DE TUNETANO inter Carcanum & Bellonium non constat. Ille Bellon. l. 2. corporis esse exigui, coloris perpallidi, capite flavo, alias nigro, peregrinos pedibus præsertim ita exprimere, ut mul-

multi fallantur, scribit. *Hic* magnum esse, ad Lanarij similitudinem, plumis & pedibus accedere, diutius & constantius volare, capite crasso & tereti esse, strenuè sublimem aëra scandere, reliquit.

ARTICULUS III.

De Falcone Gibboso, Albo, & Gallorum Lanario.

Descriptio.

FALCO GIBBOSUS, quod ei ob brevitatem colli, caput ante jugum alarum dum eas supra dorsi latera componit, vix appareat, ita ut gibbum gestare videatur, ita dictus est. *Corpus* habet exiguum, planum collo ferè continuum. *Caput reliqui* corporis proportionem magnum. *Rostrum* perbreve & rotundum, oculos flammeos. *Alas* prælongas, & valdè exertas, in facie guttas. *Crura* proportionem cæterorum membrorum longiuscula & squammosa. *Pedes* in articulis digitorum, præcipuè ad interiorem plantæ pedem nodosos. *Nidulatur* in montibus inaccessis. Tam altè *volat*, ut hominis visum effugiat. In aucupio non statim inter descenderidum percütit, sed potius cum à descensu rursus ascendere incipit, tunc posteriore ungula ante pectus disposita ferit, & quandoq; tam fortiter, ut unguem sibi amputet, pectus lædat, imo seipsum aliquando occidat.

Falco alius.

Est & aliud Falconis Gibbosi genus, quod semper alas tanquam ad volandum extendit, animosius quàm robustius. **ALBO** nomen color imposuit. Albertus eum in dorso & alis subalbū esse, alibi guttas valdè albas aliis guttis sub pallidis interpositas habere; & regionem frigidam, & humidam in causa esse, scribit. Addit, Falcone Peregrino majorem, & ad similitudinem Lanarii albi, qui per campos muribus infidiatur, accedere. *Mittit* eum septentrio, & ex illo in primis Norvegia, Suecia, Estonia. Non tam est in volando velox ut Niger: diutius tamen in Avium persecutione perdurat. Non debet ad venandum emitti, antequam pœnas mutaverit. Ad eum

refert Adrovandus quendam *Sparverium*, Aldrov. l. 7. c. 10. cujus descriptionem Romæ acceperat, qui corpore toto caloris lactei, maculis flavis perspersi, rostrum habebat album magis quàm cæruleū, alas candidissimas ac sine maculis, in cauda pennas duodecim candidas & flavis maculis conspersas: quarum cōspectum, pennarum præcipua & aliarum quasi tegumentum, tota candida, eripiebat, easdem quasi in vaginam recondens. Pendebat mortua tredecim uncias, pondus in eiusmodi ave haud leve. **LANARIUS** (generosum intellige) **GALLORUM** dicitur, quod Rei accipitrariæ autorum testimonio, Galliæ peculiaris & proprius.

Rostrum & crura cum pedibus habet cærulea, plumas anteriores albo & nigro varias, maculis non transversis, sed plumas in longum distinguentibus. Plumæ dorsi, alarum & caularum, partem externam si spectes, non admodum sunt variegatæ. Extensarum interiora notis rotundis, instar exiguum nūmmulorum per superficiem disseminatis, conspiciuntur. Sic à Tardivo & Bellonio describitur X qua Galliæ est perpetuus, semperque tam hyeme, quàm ætate ibidem conspicitur.

Ingenii sunt tractabilis, & ad omne aucupii genus idonei. *Ingeniū.* Picas, Coturnices, Perdices, Cornices, Phasianos; imò Anates & Grues, si institutio accedat, capiunt, & societate maximè gaudent. Quoniam alis diutissimè in æthere supra prædam suspensi hærent, tantopere Anates fatigant, ut & canum operâ, & fustibus plurimæ occidantur.

Carcanus *Italicor.* meminit. Habet *Italicis* isti caput totum planum. Rostrū falconis, peregrini & montani rostro minus & cæruleum. Pectus flavum raris & ferrugineis maculis distinctum. Extremas alas veluti ocellis rotundis albisq; pictas. Mutatis, caput universum ad humeros usq; flavo colore ad rubeum vergente, & lineis tenuibus distincto, tingitur. Pes, qui ante cæruleus fuerat, in luteum abit. Nascuntur in montibus Vincentinis & Alpibus,

bus, quæ Germaniam ab Italia di-
dunt. Solent alarum æquilibrium, in
aëre sese diu admodum & frequenter
suspendere, sic metu incusso, ne Per-
dices, Coturnices, aut Phasiani diffu-
giant, faciunt, rarenter occisas in ter-
ram præcipitant. Visus aliquando qui
& Accipitrem exanimaret.

ARTICULUS IV.

De Falcone Lapidario. Ar- borario & Rubeo.

Aldrovand. l. 7. c. 11. **F**ALCO LAPIDARIUS rectè Letho-
falcus dicitur. Est mediæ inter Pe-
regrinum & Gibbosum magnitudi-
nis. In præruptis petris, & Alpium
rupibus nidificat. Regitur & nutritur
simili modo quo Peregrinus.

ARBORARIUS, quem Gesnerus
descripsit, *rostrum* erat caruleo, *oculis* ni-
gricantibus, *pectore* albidis & nigrican-
tib. maculis variegato; pennis alarum
nigrioribus; *dorso* nigro, cujus penna-
rum margines infimos, maculæ ex cā-
dido ruffæ distinguebant. An idem
sit cum Accipitre Fringillario dubi-
tatur. *Nidum* in arboribus exstruit.
Rarus ipsius in aucupio usus; jucū-
dum in conflictu cum monedula spectacu-
lum exhibet. Adeo quoque placidus
est, ut per sylvas & agros emissus ad
dominum redeat. In dissecti ventri-
culo plumas & Cantharides reperit
Gesnerus.

Albert. l. 10. c. 9. Crescent. l. 23. c. 12. RVBEVS à guttarum seu notula-
rum quibus distinguitur, rubro colore
dictus est. Peregrino minor est, nec
citius rubere apparet, quàm alas ex-
erat. Calor debilis in superficiem
corporis effusus, & fumosum humi-
dum, quod ad generationem penna-
rum excernitur, adurens, rubedinis
causa esse putatur. Invenitur in locis
planis & palustribus. *Phaniceos* in Mo-
scovia dari perhibent.

Volatus. Volatus est agilis, sed non diu perse-
verat. Nam penna rubea, quia mol-
lior, non diu volandi impetum su-
stinet.

Ingeniū. Facile cicurari, Albertus inquit,
difficulter regi Tardivus. Post secun-

dam aut tertiam pennarum mutatio-
nem melior; quod remittentibus per
gratem humoribus calidis, non parum
temperamentum juvetur. *Vita* est mi-
nus quàm reliqui longæ.

Ad istum *duos ex Indiis Orientalibus Alii.*
allatos Aldrovandus reducit, qui parte *Aldrov. l. 7.*
anterior tota & alis internis adeo ru-
beant, ut qui pronos inspexisset, ni-
hil præter colorem rubeum vidisset.
Majorem putat fuisse fœminam; mi-
norem, marem. Mares enim ob hoc
ipsum Tertiarii dicuntur, quod tertia
parte fœminis sint minores. Mentum
in fœmina, maculâ oblongâ cinereâ,
quæ infernè desinebat, distingueba-
tur. Pectus quoque ejusdem coloris
notulis anteriori sterni raris resper-
gebatur. In mare color rubeus, satu-
rator & evidentior erat. Mentum
nullâ maculâ insigniebatur. Pennæ
remiges interiores notis fuscis trans-
versim frequentibus; statoque inter-
vallo distinctis, albeant.

ARTICVLVS V.

De Falcone Cyanopode, & illis, qui promiscuo coitu gi- gnuntur.

FALCO CYANOPVS ad quod re-
ferri debeat genus, cum quatuor
Falconum genera pedibus caruleis
instructa inveniantur, difficile est di-
cere. Ad Lanarium tamen potius,
quàm aliam speciem pertinere vide-
tur. Est Falconi Peregrino & ma-
gnitudine æqualis, & figurâ similis: sed
in hoc differt, quod dorsum ejus, &
exterior alarum pars minus nigredi-
nis, & pectus plus albedinis habeat; a-
læ sint breviores, cauda longior ali-
quantum; pedes hyacinthini.

Vocem acutiorem, quia humidior, *Vox.*
Peregrino habet. Rarè aves Picæ, vel
cornice majores invadit. Plærumq;
se præcipitaturus, propter metum lo-
co manet, & suspenditur. Audacior
evadit, si aucupis accedat præsentia.
Qui in Helvetia reperitur, diversus
est ab isto.

Nidificat in excelsis juxta aquas, aut *Locus.*

E pro-

Aldrov. l. 7. c. 15. profundas valles, petris. Nidis exemptus mansuefit. Capit Perdices, Columbæ, Cornices, Anates, Phasianos, & Tetraones.

Aldrov. l. 7. c. 16. Falcones PROMISCVO COITV geniti, à Peregrinis plærumque proveniunt. Hi enim à parentibus statim expelluntur, & cum suæ speciei conjuges non inveniunt, ad speciem alteram quam sibi similimam invenerint, libidinis tempore convertuntur. Carcanus ex altero parente Peregrino, altero Montano procreatos, *Falcones transversos* vocat. Albertus quatuor eorum genera ponit. Cæterum, si cum Falcone pedis cærulei Peregrinus commisceatur, ferè similis Peregrino, generatur avis, si cum Lanario nigro, ignobilis Falco niger. si cum Lanario albo, similis Falconi albo, si cum Lanario rubeo, similis colore & figura Falconi rubeo. Patristant autem plærumq; , & ignobilitatem matris, institutio post unum vel alterum annum compensat.

TITULUS V.

De Psittacis.

CAPUT I.

De Psittacis in genere.

Nomen. **R** Apacibus Psittaci subnectuntur, tum quod rostrum & ungues aduncas habeant; tum quod cicures, carnem etiam ipsam devorent. Nomen sortiti sunt, seu à Psittace urbe *a Stephan. de urbibus.* juxta a Tigrim celebri, seu *ἡ πόλις τῆς ψιττακίας*. Soli virides Psittaci veteribus cogniti. Psittaci fructus, in intimo quoq; cortice & tota nuclei carne, insolenter admodum eundem imbibit.

Descriptio. *Magnitudinem* si spectes, in regione cui nomen dedere, brachium cum dimidio longitudine explent. Visus *b Scalig. Exerc. 236.* Scaligero qui clathratæ fenestræ ferè impleverat spacium. in quadam novi orbis regione Phasianos superant. in insula Banda, columbam nostratam vix excedunt. Alibi, Gallinis, Turdis, hirundinibus, imò Passeribus æquan-

tur. *Color* quoque illis varius. In nova Hispania, Æthiopia & ultima India, quosdam totos albos invenies. *Exerc. 59. c. Scalig.* Circa Tarnassaram septuplici colore *sect. 1.* superbos; in Ternate Moluccarum una, Brasilia, & Æthiopia rubros; in quibusdam Æthiopiæ sylvis nigros; in Malabar, prassinos; scutelatos, purpureos; cinereos & cæruleos alibi. Belonius magnos quosdam totos canere, mediocres ex rubro variegari, pusillos nonnullos proluxa cauda, totos virides esse ait. Circa Javam, alii sunt rubri rostro luteo; alii versicolores, candidi quidam. Et quis omnes diversitates enumeret, cum supra centenos magnitudine & colore discrepantes, curiosi observaverint. Antiquis *d solo-d Apul. l. 2. Floridor. c. Stat. l. 2. Sylv. Ovid. El. 2.* lus in intimis plumulis & extimis pin-nulis, viror, notus erat. Vnde Avis *e* viridis dicebatur. Communia ferè omnibus sunt. Caput prægrande, ingenii signum, rostrum, quod qua collo committitur, in solis infernè sub faucibus apertum est, adeò durum, ut ferreis clathris vix parcant. Statius cornu vocet: aduncum idem, ut *f eo, tan- fclin. H. N. l. 10. c. 43.* quam hamato & semicirculari forma constructo, se cum devolant, excipiat, illi innitantur, levioresq; se ita pedum infirmitati faciant. Mandibulæ superioris, quod ipsis cum solo Crocodilo, & Thæmatopode si Oppiano credimus commune, motus. Lingua quæ cucurbitæ seminis figuram repræsentat cæteris avibus *g* latior. Unde *ἀν- g Arist. l. 8. θρωπύλοψ* dicitur. Pectus rotundū. *H. A. c. 12.* Pedum species, quia ante & pone binos habet, raras illos in regno Æthiopiæ interioris propè mare arenosum, si excipias, quorum quidam sex in pede digitos habent, quidam tres. Crura breviuscula, infirma, & plærumque fusca. Ungues adunci, quibus escam elevant, & ad os extrorsum convertunt. Capitis Anatomiam apud Aldrovandum vide.

Locus. *Locus.* *Locus.* ipsorum natalem solam Indiam esse, veteres *b* credidere. Tempore Alexandri M. in Taprobana primum inventi; Neronis, in *i* Gaugada Æthiopiæ insula visi sunt; Diodori Siculi, in ultimis etiam Syriæ nascebantur. Avorum temporibus, terræ cui-

dam supra caput bonę spei, nomen ob
copiam indidere. In regno Calecut
tanta ipſorum eſt ubertas, ut Oryzam
ſępiſſimę depaſcantur; tanta in Occi-
dentali India, vt Pſittacorum regioni
inde nomen creverit. Nec Nigritę in
regno Senegę illis carent.

**Nutri-
mentum.** *Victus* ipſis feris adhuc, frumenta,
legumina, ſemen Carthami ſeu Cruci,
quo pingueſcunt, cum homo purge-
tur; fructus omnigeni, cum molli tum
duro cortice inteſti. Nux etiam my-
riſtica, ad quam in Inſula Banda ſępiſ-
ſimę advolant: Cicuribus, quicquid
porrigetur, caro, panis, ſaccharum in-
primis. Bibunt aquam, ſed vinũ multo
libentius, cujus potu non ſolum laſci-
vi, & ſolito loquaciores redduntur,
ſed & humano inebriantur more, &
intra bibendum, pedibus ſuſpęſi cau-
dam in altum, & caput deorſum ad a-
quam extendunt. *Nidos* ſi Cadamuſto
credimus ex ſurculis ad tenellos pro-
cerarum arborum ramos penſilibus,
pilę modo rotũdos, per quam exiguo
foramine, conſtruunt, ut ſerpentum
inſidijs viam pręcludant. Maximi,
gallinaceis haud minora ovaponunt,
mediocres columbaceis paria, ſęcun-
ditatis indicium, ingens illorum in
natalibus locis copia; caſtitatis, quod
bini ſemper, mas & ſcœmina agere vi-
deantur.

Volatus. *Volatus* ipſis in natali ſolo expedi-
tior. In noſtris oris propter cęli frigi-
dioris inclementiam minus eo valęr,
impotentiam, reptandi facilitas, qua
ſuſum, deorſum, & in maximam alti-
tudinem ſcandunt, ob congruam ro-
ſtri & pedum conformationem, com-
penſat. Illius unco, dum pedes pro-
moverentur, appenſos ſeſe ſuſti-
nent; dum provolāt, ne pedes ob cor-
poris deorſum labentis pondus debi-
les offendant, ſeſe obvio adminiculo
apprehenſo, eodem velut anchora &
pręſidio excipiunt.

Vox. *Vocem* articulatam nullam natura-
liter habent, quidam etiam ferę muti
ſunt; nec quicquam unica illa voce
Perroquet exceptā, quę in ipſorum
nomen abiit, ingeminant.

Amicitia *Amicitiam* ſingularem colunt, cum
Oppian. l. k lupo, cum quo ſimul paſcuntur; ho-

mine, unde in America relictis ſylvis l. 2. Cynę
interdiu propę domicilia agunt, & get.

Turture, quod Ovidius l. notavit. 1 Eleg. 2. 6.

Ingenio propę ad hominem acce- Ingeniũ.

dunt. Accipiunt namq; verba & pro-
nunciant articulatę omnia; facilius, ſi
intra alterum ætatis annum docueris,
ſegniores, ſerreo in caput verberātur
radio. non ſentiunt aliter, propter du-
ritiem, iſtus. Sic Aſcanij m Cardi- m Rhodig.
nalis cõtinuatis perpetuò verbis ſym- l. 3. Antiq.
bolum Apoſtolicum pronunciabat. c. 32.

Henrici VIII. Anglię Regis in Tha-
meſin delapſus auxilium implorabat,
viginti libras promittens; extractus,
quatuor denarios hoſpitatori ſuo dari
juſſit. Meditari eosdem Cardanus ad-
dit; Phercides maſculos, eos obſer-
vare, & deferre, qui venena propinare
moliuntur, & in domos important, re-
fert. Quosdam circa Javam intel-
ligere, & ad interrogata reſpondere,
quidam narrant. Non facilę credi-
derim. At pueros n interdum imber- n Albert.
bes amare; blandę attrectatos libidi- l. 23.

ne, o ita ut oſcula figant, tangi, quos- o Scalig.
dam pueros ita odio proſequi, ut in Ex. 23 6.

eorum capita de ſublimi loco non ali-
ter impetum faciant, atq; Falco in A-
natem, ſi inter lugentes p agant, la- p Manafſes
mentari, quod Conſtantine Manaf- in Annalib.

ſes in hiſtoria Baſilij Imperatoris teſta-
tur. Saltantes capitis geſtu, depreſſis
agitatisq; alis imitari, q dubitandum q Scalig.
non eſt. Fcœminas nunquam aut ra- l. c.
reter humanas reddere voces, r Ti- r de leg glo.

raquellus reliquit. Virides macrou- 1. p. 12.
ros, quibus collum torque rubro cin-
gitur, annulo illo primum apparente,
nil præterea diſcere quidam affirmāt.
Scaliger acceptas ẽ via publicitus vo-
ces reddidiſſe ſcribit. In inſulis verò
S. Michælis & Divite ſimplicitatis
tantę eſſe, ut ad crocitantem Pſittacũ
innumera, ex arbore in cujus ramis
auceps latet, multitudo convolet, fa-
cileq; ſe capi patiatur, apud Martyrem
ſ legimus. ſ. 1. 10. de-
cad. 3. verũ

Vſus Pſittacorum apud Occiden- Ocean.

tales Indos in cibo apud Orientales Vſus.

olĩm, Aeliano † teſte, ſacri habeban- † Aelian.

tur. Heliogabalus capita ipſorum in H. A. l. 13.

convivio exhibuit, iisdemq; leones, c. 18.

pantheras, & alia animalia t pavit. Lampr. in

Heliogab. Ob.

u Varrol.
3. de re ru-
stica. c. 9.

Oblectamenti loco apud Romanos olim fuere. Nam cum Gallinis rusticis & Merulis in publicis ornatibus ponebantur. Viros Psittacos manu gestare M. Cato conqueritur. Articulatam ipsorum vocem in tantum eosdem miratos esse, Suidas author est, ut eos Indi mercem fecerint. Unde cavcis eburneis, argenteis, vel ex alia pretiosa materia factis includebantur. Indispennæ ipsorum in magno usu. Ex his imagines varias, papilionum, flores, herbas, pileos & perizonata cōficiunt; vestes, aulæa & tapetes contexunt; enses & clypeos exornant, aliaque utensilia miro artificio conficiunt. Sed de plumario opere alibi.

De Psittacis vide quoq; infra Mantissam N. 4.

CAPUT II.

De Psittacis in specie.

ARTICULUS I.

De Psittaco maximo Cyanocroceo, Maximo Psittaco altero, Psittaco albo cristato, & Psittaco viridi alarum costis superna rubente.

Descriptio.
Aldrov. l. II. Ornith. c. 2.

Psittacus maximus Cyanocroceus in aula Ducis Mantuæ ab Aldrovando visus est. Magnitudine benè saginatum caponem exæquabat, ab extremo rostro ad caudam extremam bicubitalis. Vertex capitis erat planus & viridis, rostrum aduncum, in hemicyclum compositum, extrinsecus in perfectam dimidij annuli rotunditatem formatum, palmum longum, totum nigrum; superius longitudine duobus digitis inferius excedebat. Oculos habebat albos & nigros, quos ternæ lineæ nigræ à rostro ad colli initium ductæ, figuram literæ S. jacentis repræsentantes, in longum succingebant. Guttur veluti torques nigra am-

biebat. Pectus, venter, femora, Uropygium, cauda inferior, crocea erant. Cervix superna, dorsum, alæ, cauda pars superior, colore cæruleo vestiebantur. Qui apud Comitum S. Floræ erat, semel singulo die instante vespere bibebat, notis & familiaribus ab blandiebatur. Æstivo tempore aquis se immergebat, aut pluviam donec totus maderet exponerebat, à madore frigore correptus, ad solem se vel focum siccabat, ex podagra mortuus est.

Maximus Psittacus alter apud eundem Aldrov. l. c. de Principem fuit. Corpus ei non ita ut 6.3. superiori crassum. Capitis vertex compressus, palmo longior. Rostrum quam superiori brevius, nec longo adeo hamo incurvum, tres propemodum digitos longum, & totidem, qua capiti committitur latum; mandibulâ superiore albâ, inferiore nigra. Oculorum regio & tempora albescentia. Dorsum, alæ incipientes, gula, pectus, venter, femora, cauda tota supernè, punicea. Remigum tegetes secundo in alis ordine lutei, puniceis marginibus, cæruleo velut oculo propè apicem ornata, &c. Psittacus albus cristatus magnitudine erat columbo domestico par. Corpus universum candido plumarum Agmine vestiebatur. Capitis verticem habebat plumis gradibus, sesqui palmum altis, retrorsum non nihil incurvis, acuto apice denuò antrorsum reflexis, candidis, denis, velut crista perornatum. Rostrum cinereum, ad nigrum vergens, qua capiti committitur naribus patulis pervium, ac harum medio tuberculo, quodam tereti clivoso. Oculos iride lutea, pupilla nigra. Linguam latam, rubicundam. Caudam in altum plumis dodrantalibus, frequentibus, candidis, surrectam. Crura cum pedibus sublutea. Psittaco viridi alarum costis super- Idem c. 5. na rubente pullastri anniculi erat corpulentia, capitis vertex luteus. Rostrum superius extremo nigrum, post subcæruleum, reliqua rubicundum; inferius verò album. Oculi iride croceo aut potius rubente, cincti pupilla nigra, corpus totum viride, parte quidem prona virore flavescere ac diluto, alis verò & dorso saturiore, & qui in maxi-


Psittacus. Maior.



Psittacus. Minor.




*Psittacus
Tappengej*



Psittacus.




*Psittacus.
Poikilorinchos.*




Psittacus Viridis



Pittacus Maximus
pappengej. gresser art



Pittacus Maximus alter.



Pittacus viridis melanorinchor.



Pittacus albus cristatus.




Pittacus versicolor siue Erythrocajanos.



Pittacus Leucocephalos.



Pittacus cinereus.



maxima & extrema penna remige ad cæruleum nonnihil tendat. Costa superna alarum in tantum rubet; uti & cauda eaq; breviuscula, parte inferiore ad latera, rubrâ in longum maculâ insignitur; supernè verò flavescit.

ARTICULUS II.

De Psittaco poikilorincho, viridi melanorincho, Leucocephalo, & Erythrocyano.

Aldrov. l.
11. c. 6. 7.
89.

P*Psittacus poikilorinchos* magnitudine erat gallinæ minoris. Corpore plerôq; virescens, dorso obscurius, pectore & ventre, interlucente luteo, radicibus ubiq; cinereis, dilutius. Rostrum superius in parte superiore habebat ex viridi cæruleum; ad latera, colore ochræ, in cujus extremitate macula transversalis candida percurrebat, inferius circumcirca coloris plumbei in medio lutescentis. Vertex plumulis aureis ornabatur. Remiges parte exteriori, ventrem versus, initio virides, paulatim in colorem subcæruleum, seu amethystinum, purpureumve potius terminabantur, nigra cætera. Secundæ in ordine longissimæ totæ luteæ erant. Quæ mediis fermè alis conspiciebantur, ad principium latere exteriori, quod ventrem respicit, primum viridi, dehinc miniaceo obscuro, inde viridi, postremum apice ipso partim violaceo, partim nigro vicissim variabant. Cauda duodenis instructa pennis, quarum quæ è latere sunt, utrinq; quaternâ, quæ enascuntur, initio sui primum virides erant latere exteriori, luteæ interiori, inde rubeo, coccineove colore, tertio ordine denuò viridi, postremo luteo variegatæ. Reliquæ quatuor mediæ totæ virides, at sine sui nonnihil lutei habebant. Pedes plumbei, quaterni digiti bini ante, retro totidem, ut in Picis Martijs, interiores quidem exterioribus multò breviores. Ungues ut rapacibus adunci. Tibiæ brevissimæ, nempe inter poplites & talos, digitum

longæ sed crassiusculæ. *Psittaco viridi melanorincho* collum, dorsum cum alis virore pleno tinguntur. Costa alæ, qua corpori adnectitur, extrema, coccineo rubet, penna in extremis alis, qua ventrem spectant, est nigra. Uropygium inferius coccineum. Rostrum totum nigrum. Caput & pectus lutea. *Psittacus Leucocephalus* ita ab Aldrovando describitur, &c. Dodrantem & digitum unum longus est. Rostrum duos digitos crassum, album: & pars capitis rostro cõtinaua item alba. Oculi pupilla nigra, iris ferruginea. Vertex & frons, quæ albent, maculis nigris variegatæ sunt. Occiput, collum, dorsum, alæ, uropygium supernum obscuro ac pleno virore tinguntur. Gula & alarum costa suprema rubore cinnabarinno. Pectus ac femora virent denuò. Pars ventris inter femora & pectus interjecta fusco subrubido, aut eo colore, quem pictorum vulgus terræ umbræ vocat, insignitur. Alarum latera pennas quasdam, quæ remiges tegunt, easq; extremas cæruleas habeat, albo tamen nonnihil admixto. Venter postremus uropygio proximus lutescit. Cauda medio rubra, ad latera rubro & luteo, inde cæruleo variegata est. Pennæ penè omnes extremo apice nonnihil nigrescunt, cætera virides sunt. Tibiæ & pedes cinerei. Posset & hic idem ob multiplicem colorum varietatem *Psittacus ποικίλος*, i. e. versicolor appellari. Est enim coloribus non paucioribus quam septem distinctus, quorum tamen præcipuus est viridis. *Psittaco Erythrocyano*, caput, pectus cærulea sunt. Vertex summus macula lutea insignitur. Rostrum haud ita ut prioribus grande, nigrescit. Oculorum regio albicat. Pupilla nigra, Iris fusca. Ventris latera sub summis alis lutea sunt. Venter viridis. Femora è viridi albicant. Uropygium luteum est. Summum dorsum dilutè cæruleum est. Alarum tegetes viridi, luteo, roseo promiscuè conteguntur. Sic remiges & cauda totæ roseo perfusæ sunt. Dorsi extrema pars seu lumborum regio flavescit. Caudæ deniq; pennæ pauculæ, eaq; virides obtegunt. Crura & pedes cinereo imbuuntur, cætera roseo. Hic

fortè ille est, quem in Tarnasari urbe Indiæ pulcherrimum ac septemplici colore distinctum reperiri Ludovicus Patricius scriptum reliquit.

ARTICULUS III.

De Psittaco Cinereo, Erythro-leuco, Torquato macrouro, Minore macrouro toto viridi, Erythrochloro macrouro, Erythrochloro cristato, & aliis & Gesnero positis.

Aldrov. l. II. c. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16. **P** *Psittacus Cinereus* ex Mina adfertur, & à potissimo partium colore ita dictus est. Corpus enim totum cinereo obscuro, seu potius æqualiter subcæruleo tingitur, remiges paulò saturiore visuntur. Oculos macula candida cingit. Cauda vix ultra extremas alas protenditur, & tota cinnabarino colore tincta est.

Psittaco Erythroleuco magnitudo est caponis grandiusculi, corpus candidum, postrema tergi pars, uropygium, cauda tota, alarum remiges miniacei coloris. Rostrum unco quàm in alijs longiore.

Torquatus macrourus solus antiquis cognitus fuit. Caput & corpus omne habet viride. Rostrum miniaceum. A rostro inferiori sub mento &c. *Minor macrourus totus viridis* in Hispaniola reperitur, nec totus turdo major est. Rostrum habet superna parte rubrum, inferna è rubro nigricans. Iridem oculi rubicundam & croceam. Corpus herbaceo virore amœnum. Pedes & tibiae rubicunda.

Erythrochloro macrouro ex Japonia allato, corpus quatuor colorib., quorum potiores viridis & ruber insignitum erat. Verticem habebat planum, rostrum rubeum, exiguum, & inferius etiam aduncum. Retro & ante oculos maculam cæruleam. Caudam corpore toto longiorem.

Erythrochloro cristato alæ, cauda ac cristâ, quæ sex pennis, tribus majori-

bus, totidem minoribus constabat, sunt rubri coloris, corpus reliquum viridis.

His adde *Psittacum Erythrocyantum*, nec non *Erythroxantum* Gesneri; quorum ille, parte supina rubet, alis superius in flavo viridibus, cetero cæruleis; cauda partim rubra, partim cærulea, hic, illi per omnia simillimus, in hoc tantum discrepat, quod per medium alarum plurimum flavioris coloris habeat, nonnihil etiam in cauda.

Huc etiam Aldrovandus *Avemillam*, quæ in Hispania capta, magnitudine erat fringillæ; rostro nigro, aduncum; capite, collo viridi, vertice ut in Garrulo Bohemico cristâ insignito; alis cæruleis, extremo nigrificantibus; uropygio ferrugineo; femoribus albis; pedibus nigris; digitis quaternis, binis ante, retro totidem; refert.

TITVLVS VI.


De Corvino genere, & aliis nonnullis Avibus, quibus rostrum durum ac robustum est.

CAPUT PRIMUM.

De Corvo.

CORVUS, Græcis, seu à colore nigro, *Descriptio.* seu à capitis magnitudine *reæ. ptio.* L. Floro a Satyra avis, seu propter sâ. a In Hist. laticitatem. Virile enim membrum *Valer. Cor-* veteres Græci *ovio* appellabant; seu à vini. Satyra b palude, quæ & Pomptina, b Rhodig. viginti quatuor olim urbium capace *Antiq. lect.* loco, dicitur. Locus ipsi post *Psittacos* l. 29. c. 25. vel eam ob causam datur, quod & ad rapaciam naturam accedat, & olim apud veteres in tanto precio fuerit, ut per c illum jurarent. Magnitudine c *Aristoph.* Cornicem superat, & adeò est ater, ut in *Avibus.* præ nimia nigredine cæruleus quodammodo appareat, nec ab d aquis d *Scalig. ad* mutetur. Rostrum habet aterrimum, l. 2. de caus. nonnihil aduncum utrisq; marginibus *plant. c. 17.* incidens; Oculos lucidos; Linguam in apice latam, ad radicem rotundam, nigram.

Corvus. Rap. rab.




Corvus. Rab.




Altrap.



Cornix. Krae.



Graculus. Tul. Dole



Nebel Krae.



Pjrrho coraceus. steinrab.



Coriacias Arist.



Pjrrhacorax. alius



gram. Vñ tamen in Septentrionalib.
e regionibus, Anglia, Neapoli apud
Magn. l. 19. c. 8. Alphonsum Sicilię Regem, Lestorum
Indiæ extra Gangem regione, quin &
f 1. 5. de ge- tempore f Aristotelis, albi; seu quod
ner. c. 5. ob aspectum nivium in nivosis locis
tales nascantur, seu quod frigus id ef-
ficiat, seu quod alimento id attribuē-
dum sit. Interiora ejus si attendas, gu-
lam patentiore propè ventriculum
g Arist. H. pro ingluvie g habet. Fel renibus, &
A. l. 2. c. ult. h parte tantum altera intestino jun-
h Arist. H. gitur. Excrementa alba esse apud Ho-
N. l. 2. c. 15. ratium legimus. Cuidam verò apud
Livones & Botnios generi, quod ma-
rinum, dicitur, rostrum dentium ferè
instar serratum, sed fortè falsò, adscri-
bitur.

Locus. Quantum ad Locum in Asia non
i Plin. H. N. nasci Theophrastus i prodidit. Locis
l. 10. c. 29. k desolatis, l humidis, exultis, turri-
k Esa. c. 34. bus, celis ædificijs, morari, nec ea, dū-
l Theon. in modo cibus suppetat, deferere; in a-
Aratum. gris uberrimis gregatim ferri, & ejus
frequenti suo numero bonitatē, quam
innata sagacitate cognoscunt prode-
re, compertum. Binos m per ste-
rilem & infructuosum campum, nec
non arctiora loca volare, quod non
latis n cibi pluribus, unde in Crano-
ne Thessaliæ oppido nunquam plures
duobus reperiri, à quibusdā notatum.
In Galliæ oppido, quod Corvatum di-
citur, annos plus, quàm centum egis-
se, Albertus nescio, qua fide refert.

Nutri- Vicitat corvus frumento, pomis, o
mentum. ficibus, cerasis, quæ cum pediculis
o Athen. deglutit, & dum binis p è pastu, horis
l 13. pulpam rejicit, ossa evomere solet, nec
p Aldrov. non vermibus, hinc aratoris vestigia
Ornithol. rodit; piscibus, unde apud Anglos q
l. 12. c. 1. lege sub gravi multa cautum, ne quis
q Bellon. l. vim corvis inferat, cadaveribus, quæ
6. de Avib. si non attingit, infecta esse conjiciun-
c. 1. tur. Quin nec à vivis animalculis ab-
f Plin. H. stinet. Alaudam & passerem devo-
N. l. 10. rasse visus est, pullos verò alimonia
c. 47. destitutos, parentem ipsum invadere,
† l. 3. de A- & devorare † Aelianus author est.
nim. c. 43. In Bothnia non tantum lepores & cu-
niculos interimunt; sed agnorum et-
iam & arietum stragem edūt. Consti-
tutum è publico præmium, qui eos
occidissent. Potus est vehementer

appetens. Tradendum putavere me-
morix quidam, visum corvum per si-
tim lapides congerentem in firulam
monumenti, in qua pluvix aqua du-
rabat, sed quæ attingi non posset, ita
descendere paventem, expressisse tali
congerie, quantum potaturo suffice-
ret. Æstivo s tamen tempore sexa- s Ael. l. i.
genis diebus, dum ficus maturescunt, de Animal.
non bibit, seu quod, nisi Hyginus fal-
lit, guttur pertusum, dum ficus matu-
rescunt, habeat, seu quod eo tempore
relaxatione alvi se laborare sciat.

Generationem quod attinet. Ore Genera-
coire † vulgus prodidit, inde fellato- tio.
rum ipsis nomen, sed falso. Nam & † Plin. l. 10
vulvas habent, & ova juxta septum, c. 12.
nec cogitare t quomodo semen per t Arist. l. 3.
ventriculum, qui semper quod inje- de gen. A-
ctum est concoquit, perveniat, absur- nim. c. 6.
dum est, & visi duo Avicennæ, qui a-
liorum congredebantur more. Ro-
strorum fit inter eos ante coitum cō-
junctio, seu ut alij, cātu prius quodam
velut hymenæo u demulcentur fœ- u Oppian.
minæ; tum mares admittunt, hinc ex- l. 1. de Au-
orta fabella. Ponit bina, sepe quater- cupio.
na aut quina ova, post viginti dierum
incubatum pulli excluduntur. Ex-
clusi, forte quod x color ipsis sit albi- x Greg. M.
cantior, negliguntur à parentibus, & Moral. l.
ad septimum decem, quo atrocem in- 30. c. 8.
duunt, seu cœlesti rore, ut Cassiodo-
rus credit, seu à muscis prætervolan-
tibus aluntur. Agniti recipiuntur in
curam, donec firmiores evaserint,
mox pulsi, quæ sunt ad vivendum
necessaria inquirunt. Circa Crano-
nem tamen singula perpetuo paria z Plin. H.
degere, & genitores soboli loco cede- N. l. 7. cap.
re, Plinius z asserit. Ætatem eis lon- 48.
gævam a Hesiodus tribuit, fabulosè si a Plin. H.
γενεαν pro centum sumas annis; verifi- N. l. 8. c. 48
militer si pro uno, intra quæ & omnia
quæ terra profert perficiuntur, & ipse
homo in utero: Sic longæ vitas intra
CVIII. annos consistet. Vox eidem
minimè sonora, quamvis cātare Plau-
tus b dixit, quia crocit, raucedine b in Aulu-
& stridore aures offendens; hanc seu laris.
propter diversos c effectus, seu im- c Lucret. l.
brium & d ventorum instantem in- 4. de Natu-
cursum, ita mutat, ut Fulgentius sexa- ra rer.
ginta quatuor diversas habere di- d Virg. Ge-
org. l. 1.
xerit.

xerit. *Odoratu* cum vulture ferè certat, in *volatu* tardior & gravior est, id eò non mirum aliquando populi clamore è dissidio gravius ictum, *ὡς αἰετὶς ἐμυβῶν τὸν τοῦτον* decidit.

e Plut. in
Flamino.

Ingeniū.

Mores & ingenium admirationem merentur. Ad trigesimum & quadragesimum una viventes, conjugii jura servant, uno defuncto alter per vitæ reliquū viduus permanet. Nummos quidam g Erfordix furabatur, & sub lapide abscondebat. Alter Augustum ex h Aetiaca victoria reducem, verbis, Ave Cæsar, victor, Imperator salutavit, viginti millibus seu D. aureis solatis emptus. Quidam i sub Tiberio Principe singulis matutinis in rostra evolans, in forum versus, Tiberium, deinde Germanicum & Drusum Cæsares nominatim, mox trans-euntes P. R. salutabat. Occisi funus innumèris elatum est exequijs, interfectus, qui occiderat. Taceo illum tutoris, Cæsarem salutare edoctum, in quo opera & impensa periisset, nisi k operam & impensam periisse, eloqui potuisset. Nec non illum, † qui Cunradum coquum in fame implorabat, adeo expressè ut ab homine vocatus crederetur. Difficilimum elementum optimè exprimunt. Venatici (primum l Ludovicus Gallorum Rex instituit) perdices & corvos ferros venantur. Phasianos aliquando.

g Albert. l.
23. de Ani-
mal.
h Macrob.
l. 2.
i Satur. c. 4.
j Plin. H.
N. l. 10. c.
43.

k Macrob.
l. c.

† Scalig.
Exerc. 237.

l Scaliger.

Amici-
tia.
m Ruell. l.
1. de Nat.
stirp. c. 2.

n Arist. de
Mirabilib.

Inimi-
citia.

o Cicero l.
1. de Natur.
Deorum.
Arist. H. A.
l. 9. c. 1.
p Ael. l. 6.
de Anima-
lib. c. 46.

Præfagiū
q Plin. H.
N. l. 18.
c. 39.

Inimicitias autem gerit, cum Milvo & Percnoptero, propter cibum, cum o Cicero l. Aesalone, propter ovorum fractionem, Chamæleontè, Circò, Turturè, & alijs. Cū Erucè p semine, quo interit. Tempestatem plenam præfagiunt, si cum q singultu quodam diu multum-que vespertino præsertim r crepusculo latrant; & si de arbore pendent s alas sæpè numero motitant. Serenitatem, si contra solum hiantes manè per arborum ramos plumas & alas ex-

pandunt, si privatim primò crocitan-tes, mox turmatim congesti liberius vociferantur, aut si sub nocturnum crepusculum gregatim versantur, & dum separantur summè crociendo ad nidos advolant.

Vsus ejus in Medicina aliquis est. *Vsus.* Pullimentè Martio combusti contra Epilepsiam propinati sunt. Ova ad denigrandos pilos adhibebantur; à Villanovano ad Epilepsiam commendantur. Cor portatum vigilias inferre quidam asserunt. Pes à collo pueri tussientis suspensus eum, si Piello credimus, sanat.

CAPUT II.

De Cornice in genere.

QUæ Latinis Cornix, Græcis vul-
go *καρῶν* hæc ijsdem hodiè *καρῶν* *Descri-
ptio.*
vel *καρῶνα*. Polyrhænijs Cretæ popu-
lis, *καρῶνα*, Varino, *καρῶνα*, Horo *καρῶνα* di-
citur. Magnitudine vincit graculos.
Rostrum, crura, & totum corpus ha-
bet undiquaque nigerrima, (falsus † † Strabol.
Strabò, dum peculiare esse Hispaniæ, 3. Geogr.
ut nigræ ibi sint cornices scribit) illud
tamen, durissimum aliàs & acutissi-
mum, propè caput albicat, superiori
parte barbulas quasdam veluti setas
circa palpebras haber, inferiore ni-
gra, eaque minima veluti granula. Al-
bam, capite nigricante, ceteris alarum
apicibus in rubedinem vergentibus,
Rhodiginus a vidit.

Versantur circa urbes, domos, maris
ripas, fluminum littora & sterquilinia.
In Britannia ingens ipsarum copia,
quoniam in pabulo humido ejus soli
vermes abundant.

Vicitant frugibus, nucibus, oliva-
rum baccis, vermibus, piscibus, & car-
nibus, & verè b *καρῶνα* dicuntur. b^o Arist. H.

Generationem earum quod spectat,
Nidulantur in summis arborum frondi-
bus. c Non temerè nec impudenter
inter se miscentur, & eandè cum cor-
vis in conjugio fidem servant: hinc so-
litaria cornicis occurfus, malum in
nuptialibus auspiciis omen: eliminare
cornicem virgo jubebatur. Ova pa-
riunt post solstitium gemina, natura
ita di-

r Ael. l. 7.
de Anima-
lib. c. 7.
s Virg. Ge-
org. l.

Descri-
ptio.

† Strabol.
3. Geogr.

a Rhodig.
Antiq. le-
ction. l. II.
c. II.
Locus.

Vicētus.

b^o Arist. H.
A. l. 8. c. 3.
Genera-
tio.
c Aelian.
de Animal.
l. 3. c. 9.



Cornix cinerea.
graw Kræ.



Cornix Cærulea.
holz Kræ.


Pica Indica
mafc.




Cornix Frugilega.



Pica Indica
Famina.



Pica Caudata f. uaria
Azcl Angerft.




Pica glandarice species alia.



Pica glandaria garrulus.
heger, herren uogel.



Pica.
Hagerft aglafter.



Pica marina.
nebel Kræ.



Aphrodis. ita dispensante, ut *d* quæ diu vivunt
l.2. pauca procreent; *Incubant* foeminae
Probl.64. tam impensè, ut *e* assiduo, in incubi-
Isidor.O. tu plumas exuant. Pullos à cauda de
fig. l.12. ovo exire, seu pedibus primò prævo-
l.7. lutis, falsum; cæcos nasci *g* verisimi-
Arist. l.4. lius est. Non prius pasci quàm plumis
de Gene- vestiri incipiant, vulgò creditur. Vo-
rat. c.6. landi potentes *h* diu prosequuntur,
Arist. H. & avolantes subinde comitantur, id-
Al.6.c.8. eò iusta naturæ talione & decreto,
Isidor. l.c. quantum *i* tempus impendere in fac-
 tibus educandis, tantum & ipsæ senio
 confectæ, à pullis suis aluntur. Malè
k Porphy. à solstitio æstivo *habent*, seu quòd *k*
περὶ σπο- scabie & lepra afficiantur; seu quod
χν. carnes à lupo semefas comedant, *Ae-*
l. Plin. l.7. tates ipsi humanas ter *l* tres authores
t.48. tribuunt. Arato *ἐννεά γε καὶ καὶ τριῶν* dicitur,
 fortè quod diu vivat *πολύ γε καὶ* nā-
 que Theon exponit. Aristophani *πέντε*
γενεὰς ἀνδρῶν ζῶει, quinque generationes
 virorum vivit. *Vox* ipsius est *καὶ ζῆν* vel
καὶ ζῆν, ob assiduitatem obstreperi can-
 tus, garrula & loquax dicitur. *Quam-*
m Odyss. vis verò eas *πανγλώσσαις* Homerus *m*
 vocet, id est lingua longa & extensa,
n Plin. l. tamen tempore Plinij allata, *n* è Bæ-
10. c.43. tica, plura contexta verba exprimens,
 & alia atq; alia crebrò addiscens.
Volatus. *Volat* celeriter: *Graditur* lentè in-
 stante pluvia, celeriter dum pullos
 pascit.
Affectus. *Amicitias* colit, cum Ciconijs qui-
 bus maria transvolantibus Ducem se
o Arist. H. præbet, & cum *o* Ardeola, cum qua
Al.9.c.1. contra vulpem pugnat. *Inimica* est,
Plin. l.10. Noctuæ *p* cujus ova merdie absumit;
c.74. Mustelæ, quod ipsius nidos sæpè diripi-
p Aelian. de at; & cum Tympano ave, quam occi-
Anim. l.3. dit. *Ingenium* earum & singularem
c.9. solertiam multa ostendunt. Si nucem
Ingeniū. perfringere nequit, in altū sublatam
q Plin. H. ad saxa & regulas *q* præcipitat. Ver-
N.l.10. benacam *r* supinam nidis imponit, ut
c.12. ab iisdem blattas aliasq; bestiolas abi-
r Zoroastr. gat. Apud Marrem Ægyptiorum Re-
in Geopon. gem educata, literas, quocunq; iube-
 ret, detulit. Mortuæ *†* sepulchrum ad
† Acl. H. A. lacum Myridis propè Crocodilorum
l.6.c.7. urbem erectum est.
Vfus. Quantum ad *Vsum* cerebrum co-
s Plin. H. sum & in cibo sumptum inveteratis
N.l.20.c.6 capitis doloribus remedio esse *s* Plin-

nii testatur. Carnem in morbis
 chronicis utiliter sumi, & nidum cor-
 pori illitum vitæ dies prolongare, olim
 vanè creditum est.

CAPUT III.

De Cornice in specie.

ARTICUL. UNICUS.

De Cornice Frugivora, Ci- nerea, & Carulea.

Cornicis tres sunt species *Frugivo-* *Descri-*
ra nempe, *Cinerea* & *Carulea*. *Frugivo-*
ptio. *givoram* *σπερμολόγων* Aristoteles vocat,
 frugilegam & granivoram alij. Nigra
 est tota, rostro excepto, quod albicat.
 Magnitudine est inter Corvum &
 Cornicem media.

Vicitat ut diximus frugibus, nec *Victus.*
 tamen lumbricos respuit. Quia Ar-
 dea in earum nidis *nidulari* solet, ideò
 circa villas nobilium, qui Ardearum
 aucupio delectantur, in summis arbo-
 ribus impunè nidos faciunt. Angliæ
 sunt maximè infestæ. Ideò olim san-
 citum est, ut funditus extingueretur;
 precium occisori daretur.

Cinerea Turnero Marina dicitur.
 Minor est Spermologo. Dorsum
 totum, collum superius, alarum la-
 tera, nates & totum ventrem ci-
 nerea habet. Aestivo tempore al-
 tos montes *incolit*, in quibus sobo-
 li propagandæ incumbere, ex eo col-
 ligi potest, quòd nullibi in planis ni-
 dulari reperiatur. Sub autumnum finem
 ad plana descendit, ibique totam post
 hyemem prope oppida & pagos degit.
 Fit id ob rupium asperitates, & nives
 continuas; vel ob intolerabilem fri-
 goris sævitiam. *Victus* ipsius idem qui
 nigræ. Quadrupedum, hominum su-
 спенforum cadavera & pisces affectat;
 nec à lacticinijs abstinet. Gesnerus
 in dissecto ventre, quasdam quisqui-
 lias, & cortices granorum, nec nō sub-
 stantiam quandam albam, pinguem,
 ex iisdem fortè granis concretam &
 lapillos invenit. Nunquam in Helve-
 tia nidulari dicitur. In inferiore Ger-
 mania in cibū à plebecula admittitur.

Aldrov. l. 2.
Ornithol.
c. 5.

Ceruleam cornicibus, quamvis vix
fciri potest, an ex earum sit numero,
Gesnerus, Kentmannus & Aldrovandus
annumerarunt. *Ceruleo* passim
colore, in capite, alis, cauda, circa U-
ropygium & tota parte supina, nitet,
alibi sinceriore, alibi viridi admixto.
Dorsi & colli proni color fuscus est: ma-
jores alarum pennae nigrae. Crura fusca, &
pro corporis portione parva habet.
Reperitur trans Albim in saltu Luchoviano,
& sylvis finitimis. Versatur in
locis non frequentatis. A projectis,
praeter caetera, cadaveribus victitat,
& nidum ut upupa ex oleto construit.

CAPUT IV.

De Graculis in genere, & in specie.

a Varro l. 4
de Lingua
latina.
b l. i. Instit.
Orat.

Graculus seu quod a gregatim vo-
let, quae etymologia Quintiliano
b improbat, seu quod iacta segetum
semina plurimum gerat, seu quod ex
olivæ cubitum sese recipiens binas
baccas pedibus ore verò tertiam fe-
rat, dicitur

Victitat praeter segetes, carnibus glan-
dibus, & c. locustis. Unde à Lemni
c Plin. H. insula incolis, quod adverso volatu
N. l. 10. locustarum exitio occurrit, colitur.
c. 29.

Aelian. l. 3.
de Animal.
c. 12.

Vox.

Affectus.

d Aelian. l.

l. 9. c. 1.

e Ael. l. 9.

f Nicolaus
Leonius.

Adcoitum verno tempore excitatur.
Vox ipsius est κροῖαν καὶ κροῖεν, ut
Pollux tradit, quorum istud & Galli-
naceo quodam generi tribuitur. *Ami-*
citiam cum d. Gaviagerit, hospitali-
tatem cum Accipitre. Hoc Home-
rus sub Hectoris & Aeneae Graecis in-
fensissimorum exemplo prodidit. A-
vem congregem esse, vel vulgaris pa-
raemia, semper graculus affidet graculo
ostendit. Mas mortem potius subit,
quam conjugem derelinquat, e altero
mortuo, alter dolorem perpetua
viduitate testatur. Loquacissimi sunt,
coitus inprimis, & quo pullos enu-
trunt, tempore. In vini potu miri-
pulis lascivia. Manibus retenti, oculos
f impetere maximè solent, seu quod
effigiem suam in illis cernentes, velut
ad cognita desideria tédant, seu quod
à rebus fulgentibus & mobilibus qua-
les oculi, facillimè alliciantur. Cicu-

res voces pronuciare discunt g ad-
eo, ut è caveis emissis spontè sua eas re-
petant. Matutino, verò suboriente
sole tempore, citius eas capiunt, & me-
moriam tenacius mandant. Suetum id
& veteribus. Paxillos h enim in pa-
rietibus domi suae, quibus insisterent
faciebant. Epileptico i morbo ob-
noxij, velut extincti ex arborum, te-
ctorumq; culminibus decidunt. An-
num fastidium lauri purgant folio.

Vsus ipsorum apud plurimos in
cibis.

Quantum ad genera tria k Aristo-
teles posuit, quartum palmipes, tria & tio.
Gesnerus, Tullam nempe Becuam & k l. 9. H. A.
Taham, Nos *Coraciam*, *Pyrrhocoracem*,
& *Lupum* seu *Monedulam* ponimus.

CORACIA magnitudinem ha-
bet cornicis, illa inprimis, quae nigra
& pamphaga. *Rostrum* quatuor ferè
digitos longum, quodammodo arcua-
tum, coloris punicei, seu inter auran-
tium, rubrum & subflavum medij *Pe-*
dese ejusdem coloris, unguibus exce-
ptis, qui simul cum toto corpore sunt
nigerrimi. *Incolit* praeruptos montes,
& raro ad plana descendit. Cicur si-
mila ex lacte, carne, pane, & tritico
vescitur.

PYRRHOCORAX Cornice est
minor, *Monedula* aequalis, luteis cru-
ribus & l rostro, quod parvum Tur-
nerus, in extremitate nonnihil adun-
cum Bellonius dixit, caetera nigerri-
mus. Tam frequens est in Alpibus ut
peculiarem Alpium Plinius scribat,
sed & in Anglia, Crera, Cycladibus
morte in Jura & alibi reperitur. Apud
Rhætos hyeme duntaxat cernitur.
Agros frumento confertos depascitur.
Altum vociferat, & vocem Merula-
rum acutam, ac ad fistulæ sonum non-
nihil accedentem imitatur. Ex ejus
volatu alto frigus augeri, humili mi-
nui quidam colligunt. Pulli in cibum
pauperioribus mensis cedunt.

MONEDULA, Aristoteli λ/ω
omnibus nota avis est. Caput, pedes,
totumq; corpus & rostrum nigra sunt.
Nigredo de cinereo aliquid partici-
pat; *rostrum* circa narium foramina al-
bicantibus punctulis insignitur, pro-
pè ventriculum n gulam pro ingluvie
paten-

n Arist. H.
A. l. 9. c. 24.

g Brujer.
l. 15. c. 78.
dere ciba-
ria.

h Aristo-
phan. in
vespis.

i Dalechāp.
in Plin. l. 3.
c. 22.

Vsus.

Genera-
tio.

l. 9. H. A.
c. 24.

Monedulam

ponimus.

ha-

bet

cornicis,

illa

inprimis,

quae

nigra

&

pamphaga.

Rostrum

quatuor

ferè

digitos

longum,

quodammodo

arcua-

tum,

coloris

punicei,

seu inter

auran-

tium,

rubrum

&

subflavum

medij

Pedese

ejusdem

coloris,

unguibus

exce-

ptis,

qui simul

cum toto

corpore

sunt

nigerrimi.

Incolit

praeruptos

montes,

&

raro

ad plana

descendit.

Cicur si-

mila

ex lacte,

carne,

pane,

&

tritico

vescitur.

patientiorem habet. *Loca* plana amāt, sed & in altissimis turribus sæpè tam numerosè nidificant, ut in una cētum interdum nidi conspiciantur. Quia frumenti aliorumq; granorum, ubi satiata fuerit reliquias terra recondit, & spicas sub sequenti anno ex ijs colligit, ideò frumentum *o* ferendi rationem hominibus ostendisse creditur. Auri & argenti *p* furacitas in eam mira. Unde Monedula à moneta dicta creditur. Gaudet in capite tricare, quasi pruriret, ideo carnem ejus pruriturum inducere Albertus credit.

Est & aliud Monedule genus, quod collum habet albo torque circumdatum, fortè illud quod Hesy chius & Phavorinus *σεφάνιον* seu coronatum dixere, fortè & illud, quod in Helvetia circa Tugium albo circulo collū ambiente distinctum, cætera alteri similimum, reperiri, Gesnerus prodidit.

CAPUT V.

De Picis in genere.

Pica, quæ Atticis *κίττα*, communiter *κίττα*, Laconibus *κίττα*, Hesy chio & Phavorino *βάσιλλα*, & *νεγγών*, alijs *κίττα*, *κίττα*, & *κίττα* dicitur.

Genus. Genus ipsarum unicum duntaxat agnovisse Aristoteles videtur. Alij in *urbanas* & *sylvestres* dividunt. In nulla non regione obviæ sunt. Glandaria in Batavia rara.

Vitæ. *Vitæ* si attendas, est pamphaga. Suum alveos quandoq; cibi causa petit, & quosvis acrodryos fructus. Vifa passerem *a* devorasse, sed & una, à cancro, quem è fluvio abreptum in arborem vicinam portaverat, collo sub forcipibus compresso, misere interempta legitur. In libidinem valde sunt proclives.

Genera. Ova circiter novem parere; multos sed imperfectos imò cæcos pullos excludere *b* Aristoteles prodidit. In nidis construendis singulari utuntur artificio. Nam eum in locis spinosis figunt, terrā intus oblinunt, foris in circuitu, infra & supra spinis diligentissimè muniunt, foramen unum (duo quibusdam placent) idq; arctissimum

pro introitu relinquunt. Ova verò interdum alio transferunt. Binos frequenter exstruere, ut qui pullis insidiantur dubios reddant, prodidere nonnulli.

Volatus ipsis rarò altus, quem etiam alarum brevitate impeditæ parū protrahunt. Saliant, & caudam more Metallicæ perpétuò moverit. *κίττα* Pollux scribit; sed singulis ferè diebus imò horis, vocem mutare, & unius cujusque animantis imitari, certum. Puerili vagitum *d* expressisse quandam, alteram hœdi primū veluti à matre separati querulam vocem edidisse, mox vituli instar mugisse, ovismore balasse, tandem ad instar pastoris, cum post pascua oves ad potum deducit, sibilasse, fide digni authores prodidere. Aliquid illi apud Plutarchum *e* ne subfuerit metuo, *e* lib. de sequæ alioquin loquacissima, auditis Romæ buccinatoribus obstupuit, paucos post dies quasi expergefacta, omnem eam buccinatorum harmoniam summa cum admiratione expressit.

Infestantur ab Alucone & fulula. *Affectus.* Epileptico eas corripimorbo quidam prodidere. Variæ *g* quotannis cum rapæ feruntur, calvescere, proprium. In Augusto id fieri Gesnerus prodidit.

Vsus ipsarum & in *cibis* & in *Medicinis*. Glandariæ Bononiæ in foro venduntur, sed duræ carnis sunt; Athenæus tamen Cothyin Thracum Regem apposuisse testatur. Quidam seu vino albo ad consumptionem coctas, seu in olla tostas, & in pollinem redactas, seu destillatas, oculorum hebetudini rubori, & dolori prodesse, prodidere. Nonnulli vivam in partes dissectam, laborantibus articulis imponunt.

* *

* *

☉ (○) ☿

☿

CAPUT VI.

De Picis in Specie.

ARTICULUS I.

*De Pica varia seu Caudata,
Caudata Indica, Glandaria,
Garrulo Argentoratensi,
Pica Marina, &
Persica.*

Aristoteles unicum duntaxat genus Picarum, glandarium nempe ponit. Plinius id duplex, sumpta à pedibus differentia, facit, nec de vario reticet. Nos & has, & quæ sequentur, huc pertinere credimus.

VARIÆ seu Caudatę caput dorsum, collum, pectus, alæ femora, cauda, pedes eorumq; digiti atq; ungues aterrima, extremum alarum albicās, dorsum & cauda & maxima nigredine viridescendentia, tota ventris superficies candida.

Caudata INDICA quàm Aldrovandus exhibet, ex Japonia allata erat. *Rostrum*, tibiæ & pedes rubescebant. *Caput* totum & collum, quod torquis albus ambit, erant cærulea, *dorsum* & scapulæ ferruginea. A superiore rostri parte inter utrumq; oculum macula tres ferè digitos longa, & pollicem lata punctulis seu potius lineolis nigris transversalibus conspersa ad dorsum usque protendebatur. Alarum pennæ vestitricæ castaneæ, sed lineis nigris crassiusculis per longitudinem positis respergebantur, reliquæ virides erant. *Pectus* & venter ad anum usque candescebant. &c.

GLANDARIA, Aristoteli *μαλανά-νεγκης* seu Molliceps, recentiorib. Græcis *καρνάδα*, alijs Picata Granata dicitur. Differt à varia, tum magnitudine, tum maximè colore. Habet ad alarum latera transversales notas cæruleas, quales in nullo fermè volumine genere conspicias; tam amplum oris hiatum, ut glandes integras deglutiat. Nares plumis albis & nigris operiuntur. *Rostrum* aliquantulum re-

curvatur, *lingua* bifida est. *Color* corporis varius est. Nam cervix ex rufo & cælio mixta est. Uropygium candidat, dorsum pallescit. Cauda longiuscula est; & duodecim pennis nigris constat.

GARRULUS Argentoratensis à garritu, & loco in quo maximè degeret solet, nomen sortitus est, veteribus vel ignotus, vel saltem nō descriptus. *Caput* ipsi crassum colore ex cæruleo & viridi mixto, maculis per longitudinem albis, quæ per totum pectus ventremq; deorsum feruntur. *Rostrum* mari duos digitos longum, crassiusculum, aliquantulum recurvum. *Oculi* magni, nigri, *Dorsum* à secunda, vel tertia vertebra ad Uropygium usque castaneum. *Alarum* color varius. *Cauda* superna parte virescit, inferna partim violaceo, partim cæruleo permiscetur. *Fæmina* toto cælo à mari diversa est. *Caput*, *collum*, *pectus* *ventrem* ex castaneo ad Leucephæum vergūt. *Rostrum* est crassius. *Ala* propè scapulas cæruleæ, mox ex cæruleo virides, remiges nigræ. *Cauda* latiuscula, ex viridi & cæruleo ad fuscum inclinans.

PICA MARINA, quæ & Gaza dicitur, tota, caput, cervicem, pedes, & alarum partem si excipias, subviridis apparet. *Rostrum* habet robustum, paulò quàm in Picis longius. *Capitis verticem* coloris castanei diluti, inferiorem eius partem ad tempora luteā. *Digitos* longos, pedes insigniter aduncos, secundi ordinis alarum pennas ex castaneo dilutas.

PICA PERSICA, tota ferè subfusca est, rostrum habet breviusculum & albicans. Oculos albos. Alarum secundi ordinis pennas, cum Uropygio, & prioribus in cauta luteas, pedes subcæruleos, tabellis nigris insignes.

NB. De Picarum generibus quibusdam exoticis vide Mantissam. N. 5.

ARTICULUS II.

De Garrulo Bohemico, Gesneri, seu Ampelide Aldrovandi.

AVem, quæ Garrulus Bohemicus Gesnero dicitur, Ampelidem, à *Descriptio.* potio-

Aldro. l. 12. potiori viſtu, Aldrovandus appellat.
Ornit. c. 18 Magnitudine Merulas exæquat. *Ca-*

put habet quodammodo cōpreſſum, coloris ferruginei, more alaude criſtata apice retrò vergēte, coloris verſus roſtrum ſubcaſtanei diluti, retrò ſubcinerei ad fuſcum vergentis, terræ Vmbriæ haud diſſimilis, inſignitum. *Collum* breviusculum, anticâ & poſticâ parte nigrum, ad latera ruſſum, propè roſtrum candidum. *Pectus* caſtaneum dilutum ad roſeum vergens. *Dorſum* ſubcaſtaneum, propè Vropygium leucophæum. *Ventrem* totum ſubcinereum. Exteriores *alarum* pēnas nigras maculis ſpactatu jucundiſſimis inſignitas. Nam primæ numero ſeptem ſolidæ & quodammodo cartilagineæ albæ ſunt, appendices cīnabaris inſtar rubeſcunt, has alię maculis luteis perornatæ, literam L. figurâ exprimentes ſubſequentur, ſicq; diſpoſitæ ſunt, ut in quibusdam ſeptem, in alijs ſex, in quibusdam quinq; tantum appareant. Vltimæ maculas albas habent. Cauda maris decem, fæmellę duodecim pennis conſtat. *Interiora* ſi ſpectes, ex Anatome habeto. *Inteſtina* in diſſecta duos dodrantes longa fuiſſe, abſq; revolutionibus & anfractib., ideò celerius fæces excernebat. *Ventriculum* in medio epatis velut recōditum, exiguum, carnoſū & duro callo obductū, tunicam in eo ſubſtantię diverſæ, uveæ quoad colorem non diſſimilem, duriffimam & quaſi cartilagineam; *Iecur* in duas partes æquè diviſum, pro ſua magnitudine maximum. *Lienem* exiguum, linguæ humanæ figurâ, oblongiusculum: *Pericardium* duplicatum, & veluti pinguedini merſum: *Pulmones* qui in omni ferè avium genere ad medias uſq; coſtas protenduntur, colli & dorſi vertebris & coſtarum duntaxat ſuperiorum principijs adhærentes; *aſperam arteriam* in principio laxiorem & ovalem, mox anguſtiorē, tandem latiorē iterum: *Linguam* duram & oſſeam, & in extremo, ubi velut alas quasdam habere & ſagittam præ ſe ferre videtur, biſidam, & quaſi in duas aciculas diviſam. *Os hyoides*, quod reliquis animantibus pro implantatione linguæ datum eſt, ab oſſe occipitis ad

latera foraminis, per quod ſpinalis medulla à capite ad dorſum transmittitur, originem ſuam deducere, & ubi ad radicem linguæ conjungitur, acutiſſimum angulum efformare videbatur. Ejus medio aſperæ arteriæ caput inſertum erat. *Oculi* intus adeò magni, ut cerebri ipſius magnitudinem, ſuperare viderentur. *Cerebrum* ſphæricam referebat figuram; & ſuperiores ipſius ventriculi ad mediam regionem capitis collocabantur.

Locum ſi attendas, Bohemiæ quidem peculiaris eſt, ſed migratoria eadem. In Italiam delatæ, in Placentino & Mutinenſi agro, ubi XL. ſimul capiabantur, morabantur; in Ferrariēſi, nullæ viſebantur, fortè quod terræ motum ibi futurum præſenſiſſent. Anno 1552. inter Moguntiam & Bingam, in tanta copia apparuere, ut, qua trās-volarent, ex earum umbra, veluti nox induceretur.

Viſtus ipſis uvæ, liguſtri, juniperi, *Viſtus*, Cynorrhodæ baccæ, pinæ nucleï, uvæ paſſæ, poma, amygdala. Baccas hederæ, carnem, & frumentum non niſi fæmelicæ attingunt. *Volant* perniciſſimè & gregatim.

Vox earum erat ziziri, unde fortè zin zivellæ quibusdam dicuntur. Facile cicurantur.

Cibum ſibi invicem offerunt, mas fæminæ, fæmina mari. *Caro* ſaporis eſt in cibo gratiſſimi. Nec ergo verè eſſe Pica videtur, quamvis jam, quia de genere non conſtat, inter eas reposita ſit; quia linguam latam non habet, nec *incendiaria* Plinii, quia nec in incendiis naſcitur, nec carbones apportare viſa eſt, nec *avis Hercynia* Plinij, quia ei noctulucere non competit, utut in Voilandia ſylvis, quædam Turdi minoris magnitudine, colore partim cæruleo, partim aureo, quam croceo, talis eſſe dicatur; Nec *avis Nova* Plinij, quia columbo minor eſt. Nec denique *Merops Ariſtotelis*, qui nec apibus inſidiatur, nec vermibus veſcitur.

* *
*

ARTICULUS III.

De Pica Brasiliça & Rhinocerotæ ave.

Pica Brasiliça, alijs à rostri magnitudine Ramphastos, Hipporynchos, & Burynchos, alijs Barbara & Piperivora dicitur. Magnitudo ipsi inter Picam & Merulam media. *Caput* pro corpore majusculum & crassiusculum & atrum. *Rostrum* duos palmos longum, unum latum, ferratum, & velut è squammulis quibusdam compactū, substantiæ ad instar membranæ tenuissimæ, osseæ, splendidæ, levissimæ, cavæ, atq; aëris intus capacissimæ, unde Naribus carere crediderim. *Oculi* in medio capite, illiq; maiusculi. *Collum, dorsum*, atq; alæ nigre. *Pectus* aureo colore cum quadam rubedine propè initium micans. *Venter* & fœmora cinabarinæ colore vestita. *Cauda* nigra, & in extremitate insigniter rube-
fcens.

Vicitat pipere, quod avidissimè devoratum, inconcoctum & crudum adhuc ei cit. Incolæ, vim ea ratione piperis domitam credentes, recenti illud præferunt.

RHINOCEROS à cornu, quod in fronte gestat, ita dicitur. Occisa in ipso volatu tum esse dicitur, cum Turcas Christiani ad Naupactum superarent. Caput erat duorum propemodum dodrantum, cirrhis nigris, altis, deorsum spectantibus ornatum. Rostrum quatuor ferè dodrantes lōgum, instar arcus cuiuspiam recurvum. Inferior pars tota ex luteo albicabat; supina versus caput colore miniaceo, reliquum ex luteo, albescat. Cornu è fronte enascebatur, & supinæ rostri parti adhærebat, prope frontem palmum unum latum, in fine recurvum, colore supra & infera parte miniaceo, medià luteo, &c. Fit taliū Avium apud veteres mentio. Nam & Helychius Rhinocerotem avem in Æthiopia reperiri scribit; & *Tragopanda* Plinii, Aquila maior, capite phæniceo, cornibus in temporibus insignitur; & *Tragopa* solini in capite arietinis cornibus armatur; & Pomponius Mela

eiusmodi aves *Tragopemanes* appellat. Et Cardanus avis meminit Aquilā *Salig.* Ex maioris, ex luteo & rubro splendidæ, *ercu.* 231. ex cuius rostro fulvo cæruleoque capuli parentur.

CAPUT VII.

De Loxia.

LOXIA seu corvi rostra, Trogon *Descriptio.* Plinii Roberto Constantino esse, *prio.* videtur; ignota sine dubio Aristoteli. Magnitudine parum maximum vincit. Rostrum habet contra omnium avium morem ab utraq; parte recurvum, crassum & admodum robustum. Vnde ipsi nomen est. Colorem singulis annis hyeme in primis, mutat, ita ut nunc ad viridem, flavum, nunc ad rubrum & cinereum vergat. Rubere primum solet pectore, collo, & vêtre, deinde flavescere. In vertice, cervice, & circa oculos cæruleus apparet; in cauda & extremis alis nigricans, crura rubicunda.

Plurima Germaniæ loca incolit, in *Loctis.* Italia rarius videtur.

Vicitat seminibus cannabis, nucleis *victus.* abietum, &, ut quidam produnt, cadaveribus. Voracissima autem est.

Nidificat in abietibus, & verisimile *Generatio.* est à cauda de ovo exire, seu quod, si *tio.* reliquarū more prodiret, exitus à rostri curvitate impediretur; seu quod, cum media hyeme nascatur, subinde ab ambientis inclementiā, calor animalis suffocaretur. Hyemali tempore *cantat*, & quidem suaviter, in æstate abstinet. Cayeis inclusa Plittacorum more sursum atque deorsum reptitat. A potu pocillum rostro si potest abiicit, imaginem fortè suam in aqua conspicata.

TITVLVS VII.

De Noctuis.

CAPUT PRIMUM.

De Bubone.

Absolutā Avium diurnarum Car- *Aldrov.* anivorarum historiā, ad Noctur- *l. 8. c. 1.* nas deflectendum est. Hæ verò ob cæcios

cæsius oculos γλαυκῶπις, dicuntur, & magnitudine inter se differunt. Oculos magnos amplos & cæsius habent. Non solum in tenebricosis montium & rupium cavernis, sed & in cavis arboribus, desertis ædificijs, domorum, templorum, & turrium tectis latent.

^{a Arist. l. 9.}
^{H. A. c. 34.} Inter duo denique crepuscula, *a* (de nocte parum aut nihil vident; de die excedens sensibile sensum lædit) læcertas, scarabæos, apes, vespas, mures, hirundines, interdum lepulos, & cuniculos rapiunt. Numerantur autem inter rapaces nocturnas. *Bubo*, *Asio sive Otus*, *Scops*, *Aluco*, *Flula*, *Noctua*, *Strix*, *Caprimulgus*.

BUBO, qui Græcis βῦας, βέταλ, σκῆψ, βῆφ; Goropio Becano, cum Aristotelis Cyminde, Chalcide, Hubride, & Ptynge, idem: Aristoteli fortè Ascalaphos, omnium nocturnarum est maximus, *b* nec Aquilâ minor. Corpus ipsi breve, & propter caudæ brevitatem veluti decurtatum. Corporis tegmen plumbeum ferrugineo seu obscuro quodam æris colore est.

^{b Arist. l. 8.}
^{H. A. c. 3.}
^{Strabo}
^{Geogr. l. 17} Maculis nigris sparsum & incerto ordine respergitur. Caput habet, adeo grâde, ut ob ejus magnitudinem pulchritudo à cauda primum in lucem præprodire credatur; frontem orbiculatam seu teretem, plumis velut auribus eminentibus in regionibus prout in Oto, insignitam. Cavernas ad auditum patulas, hocce pennarum ornamento ob magnitudinem tectas. Oculos maximos, & qui igneo splendore, ingenti magnitudine, & truci obtutu, terrorem aspectantibus incutiunt. Rostrum aduncum; Collum pro sua magnitudine perbreve; Ungues Aquilinis majores; crura brevia. Cujus *c* Gesnerus iconem exhibet, magnitudine Anserem vincebat. Alas habebat ad tres dodrantes longas. Caput magnitudine & forma felinum. Pennæ supra vtramque; aurem nigricante, & tres digitos subrigebantur. Cujus Aldrovandus, *d* in multis ab illo differebat. Nam huic quidem etiâ ad extremos usque digitos crura; sed breviora, graciliora, nec ita supra genu torosa. Color ei erat per totum corpus ex cinereo ferrugineus, in pectore potissimum,

^{† Plin. l. 10.}
^{H. N. c. 16.} ubi etiam sub nigris maculis per longum ductis, promiscuè resperfus erat. Dorsum & alæ è ferrugineo magis fuscescebant. Et cum ille Gesneri in singulis totius corporis plumis magis variegatus, & tenuibus quibusdam lineolis, transversim ductis Accipitrum & Anatum instar, minutim distinctus fuerit: & universo corpore magis verò dorso & capite, maculas quasdam incerti ductus, lituris nigris, crassis, & quodammodo figuratis gesserit: hic in alarum pennis majoribus, & cauda, lineis subnigris, transversis, largiusculis, distinguebatur; quæ ita efformatæ in cauda præsertim fuere, ut singulæ latiores supernè & infernè instar simbriarum triplici ordine dispositæ, alijs subtilioribus, clauderentur.

^{c Gesner.}
^{in Ornith.} Locum si spectes deserta incolit, *Locus*. nec tantum desolata, sed dira etiam *Plin. H.* & inaccessa. Inter sepulchra etiam *N. l. 10.* diu noctuque versatur; aliquando propter mures, & juxta horrea reperitur. Ceterum aliarum avium fugit. Hinc solicana & devia *f* vocitatur. Nidulatur in altissimis rupibus, ne foetum injuriis exponat, & ut securius ad prædam evagetur. Ovum ejus *Plinij* tempore vix visum *g* est, nostris non adeo *g* *Plin. H. N. l. 29.*

Cibus ipsi *b* carnes avicularum, cuniculorum, & leporum. Tantum prædæ, dum pullos educat congerit, ut & venatoribus satis lucri adferat. Templanoctu frequentare, ut se oleo ex lampadibus ingurgitet, vix credi potest. Noctu autem victum quærit, & sublustri crepero gaudet in vespere. Vnde Nocticanica, & *i* noctis mō- *Plin. l. 10.* strum vocatur. Si diuturno tempore *c. 12. H. N.* prodeat, ab aliis avibus seu visu insolens, convellitur. Roboris est magni. Visus & feroces canes abegisse, & cum Aquila depugnasse. Si se viribus imparem sentit, in dorsum supinus procumbit, unguesque ac rostrum sic adversum erigit, ut hostium nullus accedere audeat.

Quantum ad *volatum* *k* vix movet *Volatus*. natus per inertia brachia pennas, nunquam volat *l* quo libuit, sed transversus. Hebetes ipsi interdum oculi, *l* *Plin. l. 10.* minus tūm quàm Noctua videt. Non *c. 12.*

cantu

^{d Aldrov.}
^{Ornith. l. 8.}

^{k Ovid. l. 5.}
^{Metam.}

in Plin. l. c. cantu *m* aliquo, sed gemitu vocalis est, & bubulare, quod Græcis est βύζων, dicitur.

Vfus. *Vfus* ejus est, tum in *Ancupio*. Nam & aviculæ dum eam interdū circumvolant, & percutiunt, facillimè retibus capiuntur; & Galli *n* ejusdem opera, Milvos venantur: tum in *cibo*. A quibusdam enim editur: tum in *Medicina*. Cerebrum vulnera cum adipe anferino glutinat; cum aphronitro scabiem sedat. Sanguis asthmaticis est utilis. Cor ejus, si impositū *o* māmæ mulieris dormientis sinistræ fuerit, ut omnia secreta pronunciet; si axillæ, ut canes obmutescant; efficere, sed falsò tradunt. Creditur *p* Agrippæ Romæ captivo, primo regnum cum libertate, post mortem portendisse; Chingis Canum ab hostibus victum, quasi servasse, ideò à Tartarish honorari, serenitatem deniq; si totam noctem cecinerit, portendere.

CAPUT II.

De Asione seu Oto.

Descriptio.

A Sio seu Otus fortè ab auribus qui, Alexandro Myndio apud Athenæum Lagotia, quod aures leporinas habeat; aliis apud Aristotelem *Nyctikorax*; quia Buboni per omnia, magnitudinem si excipias (magnitudine columbæ esse scripsit † Athenæus, quod de maximis intelligendum,) est similis, ternos quoq; digitos habet anticos, posticum unum (malè noctuè similem Plin. *a* dicit malè & Gaza τὸν οὐδὲν per *a* sionem apud Aristotelem vertit; & *cap. 13.* Oppianus, *b* cum * Athenæo Otum cum Otide confundit) Bubonem sequitur. Aldrovandus *c* binos describit. Priori *caput* erat auribus velut cornibus plumeis insignitum, cinereo, bætico diluto & nigro ad supercilia utque & nares prope modum colore variū. *Facies* tota anterior, è cinereo candicabat, minutissimis plumulis velut pilis tota obsita. *Corpus* totum è cinereo seu leucophæo ad ferrugineum dilutum vergebat, maculis, ubique fuscis conspersum, tam majusculis, quàm punctorum instar minutissimis. Per *ventrem* notæ fusæ in

longum rectà ducebantur, & in actum desinebant &c.


Alterum semipalmum in longitudine minus, Fulvum Aldrovandus appellat. Toto propemodum anteriori corpore maculas fuscas, in longū protensas, & singulis plumis albicantibus decus fatas, ut crucis aut lilii Francisci referrent, figuram, habebat. *Crura* & pedes ad ungues usq; hirsuti, uti totum corpus, flavescebant. *Cauda* infra alarum longitudinem, uno ferè digito erat. Describit & Bellonius *d* tertium, d. l. 8. c. 3, auribus parulis, cruribus ad ungues pilosis, facie Aluconi simili, ventre maculis nigris variegato. *Cauda* alarum longitudinem æquante, ululà multò majorem, qui vel superiori est similis vel Aristoteli incognitus & Arvernus in Gallia montibus peculiaris species, dicendus. Cranii Anatomen vide in Aldrovando. Auris & oculi hisce verbis idem exequitur. Avi huic supra aures cutis in longum producit complicata, rugosa, sponte concidens, & meatum eo loco occludens, instar membranarū, quæ tamen in amplissimum, si voles, ambitum deduxeris. Sunt enim laxæ, implumes intus, candidæ, foris verò minutissimis & pulchellis plumulis confite, & quæ orbem venustum in marginum ambitu constituunt. Non alteri rei magis appositæ, hæc cutaneas valvas, quam branchiis piscium compararim. His apertis, auditus foramen amplum ac patulum in medio apparet, multis anfractibus instar humani tortuosum. Oculus inventus fuit substantia quadam cartilaginea, velut capsula circumclusus, non tamen undique. Nam infra in parte oculi posteriori haudquaquam membrana hæc substernebatur, sed circumquaque ad latera, à qua circulus supra totum oculum exporrigebatur, ante quidem hæc membrana angusta erat, intra verò & qua magis ad posteriora vergebat, dilatata. Oculus ipse ante orbicularis erat retro sessilis, & compressus, longè quàm vel in medio latior. Refecta cornea uveam ab illa intus plurimò nigrore tinctam & veluti atramento perfusā, quippe quæ etiam humores subjectos digitis

Tab XVIII

Bubo. Berglu Huru.
Jiwu




Bubo.



Bubo. Nacht Eule.



Bubo. Kauz. dieh.



Aio.
Sulhamis Species



Vlula. Eule.



Aio seu Otus.
Oureil




Aio alius seu Scops.





Vhula .



Vvel . Huhu . eule



Noctua .



Aluco .
mashiu .



Vhula alia



Noctua

Kauslein .

Noctua
Steinkauz .

Saxatils

Strix





digitis contrectata tingeret, observavi. Huic in orbem alia tenuissima pellicula instar annuli circūponebatur, crocea, seu aurea per totam substantiam, ita uveę connata, ut nullo modo integra ab ea secerni posset. Huiusmodi sanè nullam, quod equidem sciam, in alijs animantibus reperiri puto. Duę igitur hæ membranę coloribus diversis tinctę, & per corneam transparentes, horrendum illum nocturnarum avium oblutum faciunt, concurrentibus simul è nigro & croceo ex adverso radijs & velut flammę è silice excussę micantibus. Humor crystallinus minimè durus aut solidus erat, qualem in Aquilis & alijs observavimus, sed tener & molliculus, utpote qui facillimè vel suā sponte dissolutus reflecta cornea simul cū aqueo humore efflueret.

Locus. *Locum* si attendas, montes plerumq; inhabitat, locaq; edita. In montibus Arvernı́ copiosi inveniuntur, & in Italia in monte Plumbicio passim sunt obvii. In Cilicię campis de die inter Ambrosię plantas abditum Bellonius invenit, cū tamen eo loci, ne ad quartum quidem milliare, arborem ullam nascentem videre liceat. Nidulatur in arborum cavernis, & foraminibus e Aristoteli & f Plinio migratorius est. Nam cū Lingulaca, matrice, & Cynchramo, Coturnicibus hinc profici-scentibus ducem esse scribunt.]

c Arist. H. A. l. 8. c. 12.
f Plin. l. 10
H. N. c. 23.

Volatus & Vox. Levi faciliq; volatu fertur. Vocem edit ei similem, quā homo frigore affectus reclamare solet hu, hu. Repetit eam solis occasu instantē, aliquanto intervallo interposito, sonoram, tanquam si fistulā tenui ederetur. Cum a quopiam laceffitur, sibilum aut crepitum emittit, qualem felis solet. In pugna eadem ratione se defendit ac g l. 8. H. A. c. 12.
Bubo, καὶ βάλει καὶ μιμητὴς g Aristoteli, seu quod instar mimorum ac parasitorum cellum contorquendo nunc in hanc, nunc in illam partem ridiculos & mimicos gestus edat, seu quod imitatione gaudet: Quicquid faciētem aucupem cernit, idem quoq; agit. Stant h illi è regione, & viscoso quodam Pharmaco oculos inungunt, illud post in pelvibus relinquunt & ab-

h Athen. i. 9. Dipnosoph.

eunt. Accedit Otus & oculos sibi conglutinat, sicq; capitur. Aristoteles eum in altero aucupe intentum, ab altero circumveniri reliquit. Magi recenti Afionis felle glaucomata curari dicunt.

i Arist. H. A. l. 8. c. 12.
Athen. l. c.

NB. Est & genus exoticum Oti, de quo vide in Mantissa.
Num. 2.

CAPUT III.

De Scope.

SCops, à Alexandro Myndio absque σ apud Latinos nondum invenit nomen, quamvis Bellonius † Ululam ex ipso faciat. Græcis vel à voce, inepta, b vel quod εν σιγή ὥπα habet ενέγγον, seu nocturnum maxime cernat, vel quod varietate gesticulationum, quibus naturaliter utuntur homines, σιωπῶντας, id est, qui alios deludere solent, referat, sic dicitur. Habet ferè cum omnibus nocturnis aliquid commune. Cum Bubonibus & Otis, quod auritus sit. Cum Ululis & Alucone, quod pedes utrinq; in æquum digitorum numerum dispersitos habeat. Cum Noctuis, quod pedum compositione, figurā, colore deniq; & magnitudine, his quā alijs propior sit. Ab Athenæo & Aeliano ita depingitur, ut minor Noctua esse, in colore plumbeo albicantia puncta habere, & ab utrisq; temporibus duas pinnas subungere, dicatur.

a Athen. l. 9. Dipnos.
† Bellon. l. 2 de Avib. c. 35.
b Eustat. in Odyss. 5.

Duplex apud c veteres ipsorum generis. Alij sunt vocales, qui omnib. temporibus patent, idē δεισιπῶνες dicitur, glauci sunt ac esui propter vitium carnis inepti. Alij muti qui autumnō interdum apparent, nec plus uno vel altero die commorantur, Scopos absolute dicuntur, & ab Aescopib. crassitie differunt, turturi & palumbo similes. Tot & apud Neotericos differentię. Una Italię frequens, quam isti Chiuuino vocant. Altera huic apud Germanos similis, paulò albidior, caudā & auriculis longioribus. Illa prout ab Aldrovando describitur, noctuā est minor palumbo par, omnium ferè nocturnarum minima, illam si

Genera. c Athen. l. 9. Dipnos. ex Callimacho.

excipias, quæ Alaudam non superat, & rara est. *Caput* ei teres plumulis coloris ubiq; plumbei vestitum. Aurium plumulæ unâ tantum pinnulâ constabant, quæ in mortuo vix appareat. Totius corporis superficie tenus color cinereus est, hinc inde nonnihil admixto, plumbeo, maculis albicantibus distinctus. Majores alarum & caudæ pennas, maculæ albæ, transversim ornant; minores reliquas omnes etiam linea in longum nigra secat. Circa collum & alarum initium ruffo decorare promiscuè respergitur. *Pedes* habet exiguos fuscis, ad plumbi colorem obscurum accedentes, squamosos, depiles, in digitos binos anticos, & totidem posticos dispartitos, unguibus fuscis instructos.

Genera-
tio.

d *Arist. l. 9.*
H. A. c. 28.
e *Plin. l. 10*
H. N. c. 49.

De *Generatione* ipsius nihil exploratum esse scribit d *Aristoteles*, nisi quod Favonijs flatibus appareant. *Plinius* e amplius nasci negat, fortè quod ipforum satyricos motus, cum insidēt, plerisq; memoratos concipere mente non possit.

Vox.

f *Athen.*
l. 9. *Dipn.*

De *Voce* superius dictum est. Quod ei ex f *Athenæo* potius quàm *Aeliano* à *Gyllio* applicatur, πάντα πᾶ τῶν ζώων ἔν γλωττῇ καὶ διαφραγμένῃ εἶναι τὴν φωνήν, quasi omnes oris expressione & articulata voce longè superet; ad aves, quarum lingua latiuscula pertinet. Ridiculos sæpè exercent gestus. Cum enim colla retrò agilia habeant, caput modo adducendo, modo protendendo, vertice nutando, humeros, jactando, & saltitâdo, histriones imitantur. Vnde *Scops* saltationis apud antiquos genus, quod & *Scopiam* g nominabant; ἔχον πᾶ τῇ τετραγίᾳ περιφορὰν κατὰ τὴν ὀρθομίμησιν. Habebant quandam colli circumvolutionem ad avium imitationem. Perire mali Punici grano, *Gyllius* in *Aeliano* h addit.

g *Pollux l.*
4. c. 14.
Meurs. in
Orchestra.
h *Aelian.*
l. 6. H. A.
c. 46.

C A P V T IV.

De Alucone & Ulula.

ALVCONIS, qui Græcis ἑλεός, non ἑλειός, nec ἑλαιός, nomen, vel ab Italogorum Alochone Gaza formavit; vel à Germanorum, ut *Lazius* vult, locken, quod allicere significat, defum-

ptum est. Duo a ipforum sunt genera^a Bellon. l. 2. de Avib. c. 32.

Vnum majus, alterum minus. *Majus* Caponis est b magnitudine, hoc peculiare habet, ut palpebram à summo oculo ad imum adducens, cō-niveat. *Auriculis* caret; sed eorum loco coronam quandam è plumis constructam, quæ faciem totam, pinnulis supra oculos superciliarum altorū modo, elevatis, & utrinque per tempora nec non sub mentum descendendo in orbem cōeuntibus, flammei muliebris formâ, habet. *Rostrum* ipsi album. *Oculi* in cavitatem profundam, à plumulis undique surrectis constitutam, magni, & toti atri immerguntur. *Dorsum* coloris est plumbei, notulis albidis variegatam. *Crura* plumis candidis conteguntur, *pedes* duntaxat pilis. *Incolit* tam loca campestria, quam saxa prærupta, rimas turrium, & cavernas quercuum. Muribus & aviculis & inter has c picis victitat. Quod fortè a nimalculum cœpit, deglutit, integrū. Tam ampla enim ei gula, ut bolos ovo majores integros transmittat: neque quicquam cibi sumit antequam ossa, pilos, & plumas rejecerit. Transversim, Ardearum more inter volandum fertur.

a ¹ Bellon. l. 2. de Avib. c. 32.

b ² Aldrov. l. 8. c. 5.

c ³ Arist. H. A. l. 8. c. 3.

c ⁴ Arist. l. 8. H. A. c. 3.

Minus simili cum majore maculorum diversitate variegatur, domesticam columbam magnitudine non excedit. Vertex capitis, collum, dorsum, alæ ad pennas remiges usq; plumis vestiuntur ab initio propè radicem cinereis obscuris; reliqua ferrugineis dilutis. Anterior capitis pars, plumulis candidis informam flammei cinctâ videtur, quas circulus luteus undiquaq; ambiens claudit. *Oculi* nigerimi versus interiorem canthum plumis luteis obsidentur.

Tibiae & pedes villis horrentes nonnihil rubent, binis ante & totidem retrò digitis instructi. *Unguibus* armatur longis, validis, acutissimis, & aterrimis.

Vocem noctu edit adeò terribilem, *Vox.* ut pueris & fœminis terrorem incutiat. Rarior multò cōspectu est, quàm major. *Ulula flammeata* Gelnéri eadem cum Alucone.

VLVLA, Græcis αἰγώλιον, ὀλολυγὴ, & ὀλο-

CAPUT V.

De Noctua in specie sic dicta.

NOCTUA Latinis quod noctu canat & volet, Græcis γλαῦξ, κοκκοβαδων, α-
κρίην, & πτωό dicitur. Duplicis ipsarum
generis mentionem faciunt Authores, a Hesychius
Majoris nempe & Minoris. Utrique collum
breve, gulæ pars inferior paulo latior.
b Arist. H.
A. l. 2. c. ult.
c Idem l. 2.
c. 15.
d Albert.
l. 23.
e l. 23. de A-
vib. c. 32.
f Aldrov.
Ornithol.
l. 8. c. 7.
Noctua seu appendices infra b ubi in-
testinum definit paucæ, lien tam par-
vus, & αἷμα λαμβάνειν ὀλίγως τὴν αἰσθησιν, ut sen-
sum multorum effugiat. Cauda d bre-
vis, & si e Bellonium audimus, pedes
pilosi, Capitis vertex ex plumularum
ibidem positu veluti introrsum exca-
vatus. Quæ ab f Aldrovando descri-
bitur, erat columbæ magnitudine,
capite majusculo supernè depresso. O-
culis magnis & glaucis. Rostrum longius-
culo, dilutè fiavo, corpore toto plumis
partim bætico partim albo distinctus.
Cruribus plumosis, & ad pedes usque
hirsutis, coloris è cinereo bætici. Pe-
dum digitis subfuscis, cinereis, implu-
mibus. Quam Germani saxatilem no-
minant, tota parte prona fusci, modi-
co ruffo permixti, & albicantibus ma-
culis distincti est coloris. Crura & di-
gitos pedum habet hirsuta, plumis al-
bidis. In extincta rostrum superius rube-
bat, cum prius in viva rubere non videret-
tur. Inter oculos & rostrum pennu-
læ quædam, seu pili aut barbulae ri-
gent.

Locum si attendas, in Creta nasci Locus.
negat g Plinius, illatam mori tradit, g Plin. H.
nec in Alpibus Helvetiæ regionib. in-
veniri scribit. E Gallia Cisalpinâ, Lō-
gobardia, & Germania ad Rhenum
eò advchuntur. In Attica h plurimæ. h Apostol.
Unde Noctuas Athenas. Saxatiles Cret. 6. Pro-
montana & saxosa incolunt. Ideò ad verb. 41.
frigus arcendum plumas cruribus &
digitis natura induit.

Cibus ipsis vespa, apes, lacerte, i mu-
res, quarum k cicuratae, in domibus i Arist. H.
etiam venationem exercent, semel A. l. 8. c. 13.
saturata trium dierum in ediam per-
ferunt, nec novem abstinentiæ læ-
duntur. de Agricult.

d Gesner. d de-
scribitur, magnitudinē erat Gallinæ,
vel supra, colore ruffa, vel nigro re-
spersa. Rostrum breve & aduncum al-
bicabat. Oculos habebat magnos ni-
gros, pupillam obscurè ruffam, pinnu-
las inter oculos & rostrum multas, dē-
sas, cineriferè coloris, margines pal-
pebrarum rubicundi, membrana nictā-
ti supernè abducebantur. Collum erat
multum retrò agile. Crura albicantia
punctis conspersa lividis, hirsuta ad
pedes usq;. Pedum digiti bini antè,
toridem retrò. Quam e Aldrovandus
describit, & inter ululas, quod vocem
non flebilem ejulando, sed Gallina-
ceorum hāud absimilem rostro fren-
dēdo, ediderit, reponere metuit. Ca-
put, dorsum, alas, caudam colore ci-
nereo, maculis albicantibus ac nigris
distinctam habebat, sub ventre albi-
cabat, & nigris maculis variegabatur.
Capite erat valdè magno, tereti, e-
normiter crasso, admodum plumoso.
Oculis ex toto nigricantibus, & plu-
mulis albis undiquaq; in orbē cinctis,
in quorum ambitu, ad palpebrarum
oras lippientium, instar rubescens cir-
culus conspiciebatur, superiori tātum
palpebra inter nictandum oculus cō-
tegebatur. Rostrum erat subvire-
scens, &c.
f Arist. l. 9. Colis & campestria & saxa, δῖα λ-
H. A. l. 17. f est, seu geminicti. Fruges in humilio-
g Arist. H. ribus colligit. In excelsis rapinas agit,
A. l. 8. c. 3. & carnes in cibum parat. Picas g ve-
h Idem. H. natur: sed & h colorem (subest men-
A. l. 9. c. 1. dum, nec nota cuiquam avis) forte
i Idem l. 9. collurionem, rapit. Est νουκινόμ. & i κρη-
c. 17. ήμερας ὀλιγάκις φαίνεται, Noctu vagatur;
Genera- de die rarò apparet.
tio. Parit quaternos, si benè Plinius k
k Plin. H. N. Parit quaternos, si benè Plinius k
l. 10. c. 16. Aristotelem † intellexit. Nam ne
† Arist. H. de Aetolio Milvo res sit verendum
A. l. 6. c. 6. est. Vox ejus est ululare, seu mœsta &
m Apul. l. flebili voce plangere, idq; m vesperti-
2. Floridor. no tempore.
n Plin. l. 29. Fel ejus prædicatur ad albugines,
H. N. c. 6. suffusiones, & caligines, n Adeps ad
Vfus. claritatem.

Genera-
tio.

Quantum ad *Generationem*, quod de Bubone, id & de hac l Plinius dicit, solam inter unguines, & carni- voras non cecos parere pullos, Eustathius & Varinus falso tradunt, nec verius, cum formicas à suis pullis abigere cupiunt, vespertilionis cor in nido tanquam amuletum habere, Oppianus reliquit. Si enim ipsa lepus est, cur aliunde pulpamenta quærat. Nec de die ominò *cacuire* verum; nec propter inositam vim igneam *tenebras penetrare*, ac luna silente videre, quod Eu-

stathius, & Varinus scribunt. Die, m exorto quasi splendore visus ejus he-

betatur, & quasi quibusdam errat in tenebris. Sicca nimis & tenuis humoris substantia facili negotio dissipatur. Noctu, quia aëre qui visionis medium est, non illuminato, objectæ colorum species non exprimuntur, si propius

accesseris, haud loco sese movebit. Moderata lux quia Noctux conveniens, ideò *ὁρῶντες οὐκ ἔστιν ἡμεῖς καὶ περὶ ὀφθῶν*, per vesp̄eram & circa matutinum crepusculum venatur. Sonum edit duplicem, unum *tau, tau*; alterum vo-

cant cucabare. p Aristophani *κικαβαῦ*. Pollux q eam *νιζεύ* scribit. Nigidius r Polux q eam *νιζεύ* scribit. Nigidius r novem habere voces prodit. Apule- jus s ferum & intortum ejus cantum vocat.

Est etiam *saltatrix*, & corpus & cer- vicem frequenter in orbem contor- quēdo, nunc torvo & fixo obtutu hominem aspicit, nunc capite huc illuc acto scurras & histriones imitatur.

Luce t vagantem aviculæ reliquæ sturnatim admirantium specie primò circumvolitant, mox impetunt. Ab his u circumdata, resupina pedibus repugnat, collectaq; in arcum, rostro & unguibus tota tegitur.

Inimicitias gerere dicitur cum x cornice, seu quod sibi ova meridie absumat, seu propter aliam causam. Lucretius z sanè cornices metu Noctuarum in Athenarum mœnibus unquam volasse negat: cum orchilo, a ejus ova itidem exedente; cum Pico Garrulo, & ovib. Contactu frondium platani torporem contrahere, sic à coniis à nido submoveri, fabulatur Aelianus. Auxiliatur b ei contra a-

viculas collegio quodam naturæ pas- ser, bellumq; partitur.

Vsus captæ tum in *aucupis*, prout in Oto dictum est: quod genus aucupii hodiè, à pipatu avium circumvolantium noctuam Pipatam vocant. Unde Pipare quod decipere; tum in *cibis*, apud tenuioris fortunæ homines; tum in *Medicinâ*. Nam cibus aquâ in qua Noctua lavit perfusus, Gallinarum pituitam pellit. Sanguis inter psilothra numeratur, jecur parotidas sanat. Anginis cerebro succurritur. Ebriosis ova per triduum in vino data, tedium ejus adducunt.

Præfagia si respicias, si nemore de- ferto frequentior in urbibus apparuerit, sterilitatem; si vespertino crepusculo de suis lustris citius pro consuetudine egressa, plurimum cucubaverit, pluvias; si c pluviam durante, cessaverit, serenitatem, polliceri creditur.

NB. De Noctua genere exotico vide *Mantissam*. N. 2.

C A P. VI.

De Strige & Caprimulgo.

STRIX quænam sit avium, non cō- stare arbitratur a Plinius. Ovidius eam brevi compendio descripsit, dum scribit

--- Strigum

Grande caput, stantes oculi, rostra apta ruina,

Canices pennis, unguibus hamus ineft.

Ubera eas infantium labris immulgere, sanguinem in cunis noctu exugere, imò & dilaniato unguibus corpore mortem afferre, credidit supersticiosa Antiquitas. Isidorus c verò propriis b Ovid. 6. pullis lacteum humorem instillare, eosq; ultra modum amare prodidit. Vox ipsarum propriè stridor est Latinis. Omen semper triste habebatur.

Aldrovandus d huc nocturnā quædam avem refert, quæ habebat caput magnum, rotundum, anteriore parte plumulis exiguis, in orbem velut flammæum positis exornatum. Oculos grandes cum iride dilutè flava ac pallente, pupil-

Nycticorax.



Nachtrab.




Tab: XX.

Caprimulgus.
nachtrab. Pfaff.
alias. geiznelker

Caprimulgus, alias.

Vespertilio.




Vespertilio.

Speckmause. Fledermaus.



lunge Fledermause.




Vespertilio. lactans

Fledermaus. mit den Jungen.



Vespertilio.

Fledermause.





pupillas maximas, & vehementer atras. *Rostrum* corneum, fuscum. Pen-
nas universi corporis ferrugineas, ma-
culis fuscis in remigibus transverlim
distinctas. *Caudam* palmo ferè alis lon-
giorem. *Crura* ad digitorum ungues
usq; instar pedis leporini pilosa. *Digi-*
tos pedum binos ante, totidem retrò.
Magnitudine erat Afionis. Dicebatur
caprarum ubera exugere.

Descri-
ptio. CAPRIMVLGVS est specie à re-
liquis multum differat; nocturnis ta-
men, ratione visus accensetur. Græcis
Ἀγροθήτης παρὰ τὸ ἐξ αἰγῶς πεθιλακίνας, quòd
capras fugat, dicitur. Magnitudine est
e *Arist.* H. e paulò major quàm Merula, minor
A. l. 9. c. 30. quàm cuculus, seu ut Plinius, f gran-
f l. 10. H. dioris Merulæ aspectu. Cujus iconem
N. c. 40. Aldrovandus exhibet, erat cuculo ita
similis, ut nisi inusitata pedum, cru-
rumq; exilitas & brevitās cum diversa
constructione obstitisset, is idem esse
crederetur. *Caput* habebat vertice
longo & compresso. *Oculos* grandes,
iridem & pupillā nigerrimas. *Rostrum*
vix passerino maius, modicum adun-
cum, plumulis tanquam pilis quibus-
dam supernè ad nares & infernè sub
mento, ornatum, &c. Quam Gesne-
rus exhibet, rostrum habebat adun-
cum, & tibia plumis obvestitas.

Locus. Dedit in g montibus circa mare in-
g *Arist.* l. c. primis in Creta, propter viciniam sta-
bulorum quibus capræ includuntur.
Intrant h namque isti fures nocturni
pastorum stabula, caprarumque ube-
ribus advolant, propter suctum lactis,
quâ iniuriâ uber emoritur; capræ, quas
ita mulserè, cœcitate percutiuntur.
Adèd terribilem clamorem habent,
ut etiam audientibus pavorem incu-
tiant. Duo aut tria cum i plurima o-
vapariunt. De visu ita Aristoteles:
ἔστι ἢ κ' ὀξύπνοῦ τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ τῆς νυκτὸς
βλέπει. Parum acutè interdum videt,
fed noctu perspicax est.

TITVLVS VIII.

De Carnivoris medie na-
tura.

CAPUT PRIMUM.

De Vespertilione.

V Espertilio, LXX. νυκτερίς, Hesy- *Descri-*
chio & Phavorino φάλκη, Philo νυ- *ptio.*
κτάλωφ & φιλέσπερος, Victorino Avis so-
rex, Vallæ semimus, Platoni in æni-
gmate, Avis non avis dicitur. Τὸς ἡ-
νοῖς καὶ πεζοῖς ἐπαμφοτερίζον καὶ διὰ τὰς ἀμ-
φοτέρων τε καὶ εἰς τῶν μετὰ, benè scri-
psit a Philosophus, malè b Macro- a l. 4. de
bius, quatuor pedibus ingredi, & inter *partib.* A-
quadrupes referendum, ut inferius *nim.* c. 13.
parebit. Color nonnullis fulvus, aliis *b l. 7. Sa-*
niger, subalbus, cinereus. *Magnitudo* *turnal.*
diversa. Maiores † in urbe Assyriæ † *c. 16.*
Borsippa, quàm alibi, in novo orbe co- *† Strabo.*
lumbas adæquant, in Brasilia * mon- *l. 15.*
dulas, circa Vrabam * turtures, in O- ** Livius*
rientali India, si Pompilio Azalio cre- *Hist.* c. 10.
dendum tanti, ut illas transeuntes, a ** Gomara*
larum verberè prosteruant, multos *Hist.* c. 61.
etiam occidunt. *Caput* quibusdam mu-
rinum est, caninum aliis. *Rostrum* à
cæteris avibus diversum. *Nares* vituli
instar. *Dentes* XXXIV, in mandi-
bula inferiore octodecim, sedecim in
superiore Bellonius observavit, vi-
ginti quatuor in singulis mandibulis
duodecim, eosque serratos, teretes, &
longiusculos c Aldrovandus utrinq; *c l. 9. Or-*
in superiore mandibula senos, in infe- *nithol.* c. 1.
riorè septenos quorum anteriores cæ-
teris longiores; omnes valdè albi, Clu-
sius. *Maxillas* intus & foris pilis ob-
lōgus, niger, obvestit. *Auriculas* inter-
dum binas, quaternas interdum ha-
bet: similitudo eis Afinarum, & su-
periores quadruplo sunt inferioribus
maiores. *Mamillæ* soli volucrum datæ
sunt, lacte sola nutrit ubera d admo- *d Plin.* l. 10
vens. *Alas*, quæ † pellitæ, exangues *H. N.* c. 61.
quidam dixerè. Ab armis incipiunt, *† Strabo*
& per latera per axillas continuò du- *l. 15.*
ctu ad crura usq; feruntur, eaq; circum-
ambunt. Quatuor hæ flexus, plicas
seu articulationes habent, quibus alas
inter volandum dilatant, & contra-
hunt, mediis superiorum, (cubitos Al-
bertus nominat) quiq; in plures alios
deorsum flexus divaricantur, *digituli*
singuli, unguiculis hæmatis instructi,
quibus parietibus se affigunt, anne-
ctuntur. In supremis alis rudimenta,
quædam *brachiorum* nervosa apparent,
quæ in uncum desinunt. *Pedes* illi bi-
ni, in quinos digitos dissecti & ungui-
culis

culis acutis instructi, singuli in medio, ac si palmam efformarent, ampli. Innituntur inferiori alarum membranae, atque ex ventre ad caudam, si quæ est, latera, exporriguntur. *Cauda* quippe alijs nulla, ut rectè e Aristoteles, Africanis murium instar oblonga, *f* & quatuor digitos extra membranas alarum prominens. Aldrovandino medijs atque infimis alarum membranis sub ventre involvebatur, & ad extremam earundem exporrigebatur apicem. *Penis* maris at magnus; exertusque, qualis simiarum est, genitalis foeminae meatus pone podicem apparere solet. Quid sibi Plinius, verbis, *Coxendix huic avi una traditur*, velut, cum duo crura habeat, intelligi vix potest.

Locus.

Locum si species, loca obscura, cavernas, & meatus subterraneos amat. Idè & in labyrintho Cretæ inter Gnossium & Cortinam, Borissippam, g urbem adde, plurimi, & in Appennini propè Puteolos, speluncis multa milia, & in monasterio quodam Misniæ tanta, ut excremètorum acervis multi carionerari possint. Delictantur

no partum non edit; quia verò magnâ
corundem interdum copia ingruit;
haud malè ^{???} quidam è putri etiam
materia oriri, opinati sunt.

Volant manē & vesp̄ri potissimū m̄s;
fœminę sæpè geminos implexæ infan-
tes; volatu ob timorem indirecto seu
tortuoso, atq; haud longè à terra sem-
per. Volitatione fessi, hamis digitulo-
rum, quorum in medijs alis rudimēta
habent, *n* parietibus saxi, arborib.,
aut cavernarum fornicib. sese appen-
dunt, & *o* continuata serie, ac veluti
catena quadam inter se coherent.
Melius de nocte *vident*, *p* quia spiritus
ip̄orum visorius tenuissimus & dilu-
cidissimus, per noctem modicè in cras-
fescens, idoneus ad conspectum red-
ditur, de die extenuatus, expanditur
& evanescit, ideò face vel gladio vo-
lantibus objecto, decidunt.


Voce exilgannitum potius & latura *Vox.*
rum canum imitantur, quàm murum
sibillum. Latinis stridere, Græcis *q* *q* *Hon*
τρίζεν, τετρίζπειν, & τετρίζεναι *†* dicuntur. *Odiſſ.*

Singularis ipſis cum columbis *amici-
tia*, detinentur iſtæ, ſi caput veſperti-
lionis in peris ſummo columbarij fa-
ſtigio ſuſpendatur. *Inimicitias* verò
gerunt cum Ciconia, ſ quia à ſolo il-
lius contactu hujus ova ſterileſcunt, ni
platani folijs in nidum poſitis ſibi ca-
verit: Cum *platano*, qui præ foribus ſu-
ſpenſus ne involent, prohibet; cum
hedera, cujus ſuffitu & odore perimū-
tur; cum formicis, ad quarum nidos ſi
alas ſuſpenderis, nulla ipſarum egre-
ditur, cum locuſtis, ⁊ quæ locum ubi
veſpertilio ſuſpenſus non transvo-
lant.

*V*ſus veſpertilionum eſt tum in *cibis*; *Vſus.*
nam à *u* Borſippenis condiebantur, u *Strabō.*
ab incolis inſularum & Catigan & S. *Li. 6.*
*J*ohannis eduntur, ferventi aquæ im- x *Scalig.*
merſi & excoriati eduntur, † in Ori- *Exerc. 236.*
te gallinas ſapore vincunt: tum in *Me-*
dicamentis, tori præparati, benè ſcirrho, † *Nirem-*
& podagræ adhibentur. Sanguinem berg. *Natū-*
trichiaſi conducere, Archigenes z, & *ræ Excot.*
Serenus credunt, Galenus & Julius *l. 10. cap.*
Alexandrinus negant. Cor & lingua *93. 94.*
hydrophobiâ inducit. Caput dextro *ſy Galen. in*
alligatū brachio vigilantis ſomnum *Euporiſtis.*
impedit. Magicæ revera, vanitatis eſt *z Galen. l.*
quod *4. de Com-*
poſ. medic.
ſ. l. c. 8.


Tab. XXI

Struthocamelus
Straus.



Gallus Monstrosus, caudatus

Pavo Sine cauda
chincensis



quod tradunt, si ter circumlatus domui vespertilio vivus per fenestram inverſo capite infigatur, amuletum eſſe, præſertimque ovilibus circumlaturum toties, & pedibus ſuſpenſum in ſuperliminari.

CAPUT II.

De Struthocamelo.

Deſcri- ptio. **S**truthocamelus *στρουθοκάμηλος* Philoſtrato & Ariſtoteli, *στρουθοκάμηλος* Heſychio, *στρουθοκάμηλος* Oppiano, *στρουθοκάμηλος* recentioribus Græcis dicitur, melius Chænocamelum, quia *χῆνα* five anſerem potius, quàm *στρουθὸν* five paſſerem, niſi cum Scaligero, gallinam reddere malis, dixiſſent. Plautuſeū Paſſerem marinum appellavit, Phavorinus Lybicam avem, Diodorus Siculus Cervinam dixit. Ariſtophanis *λυβικὴν ὄρνειον*; Horatij Afra avis, gallinæ potius ſunt, quas prægrandes Atrica terra tulit. Maximus eſt omnium avium.

a Diodor. Biblioth. l. 3. c. 12. Diodorus a Camelo parem eſſe. **b Plin. H. N. l. 10. c. 1.** Plinius b equitis equo inſidentis magnitudinem excedere; & verum eſt, ſi collum quantum poteſt erigat. *Roſtrum* habet exiguum ſed acutum. *Caput* in quo ferè nullum cerebrum, parvum, exiguis pilis, in fœmina pallidè luſcentibus, in mare flavſcentibus, collo ad rubrum colorem vergente. *Palpebras* vtrinq; ſolus omnium alitum ut homo, pilos in ſuperiore palpebra. *Collum* longiſſimum. *Dorſum*, cujus pennæ in mare nigerrimæ, in fœmina fuſcæ, lanæ quandam ſubſtantiam ſua mollicie efficiunt, tam latum, ut puerum lactentem inſidentem† terre poſſit. *Alarum* pennæ ejusdem ſunt coloris, ſed in ſuperiori parte candidiſſimæ. Gordianus miniatos habuit. In interioribus alarum cubitis ſpicula ſecundùm c quosdam, quibus ferit, habet; oſſeos in extremis alis, ſecundum alios, mucrones, quibus ceu calcarib. ad curſum velociorem ſe incitat. Aldrovandus obſervare eos non potuit. *Cauda* pennæ in mare ſubalbidæ, in fœmina ſubfuſcæ ſunt. *Coxæ* prægrandes, quod in anguſtum ſenſum iuxta femur finiatur; *femur* humanum potius imitantur. *Pedes* Camelorum

cruribus ſimiles † *θαμνῆσιν ἀντιγράμνουν φο- λιδεσι*, frequentibus firmati ſquammis *l. c.* ad geminos, uſq; duos poplites integuntur. Pedes more boum biſidi, in binas *ungulas* dividuntur. Cur biſulcum potius quàm ſolipedem aut digitatum natura fecerit, ignorare me fateor.

Reperiuntur, in d Africa, Lybia, e *Locus* Aethiopia, f Arabia, & g Syria. A- d Theophr. mant deſerta & ferè aquoſa, & tanta *l. 4. Hiſtor. plant. c. 4.* eorum aliquando conſpicitur copia, *c Plin. l. 10. c. 1. H. N.* ut velut equitum quandam aciem *f Xenoph. l. 1. Exp.* minus efformet.

Quantum ad *Viſtum*, Cæropophagum eſſe ex Strabone h colligi poteſt. *Strabo l. 18. g Diod. Si-* ferrum, lapides, oſſa, & quicquid ob- *cul. l. 3. c. 13* tingerit, ſine delectu devorare certum *Viſtus.* fere eſt: ſed an eadem concoquet, du- *h l. 6. Geo-* bitatur, ſi ſit, quod i Langius credi- *gr. Strabo.* dit, ſpecificæ potius proprietati, quam *l. Epist. 12.* intenſiſſimo calore tribuendū id erit.

Nam leo k ſtruthocamelo calidior, *k Aphrodis.* ferrum concoquere non poteſt. Inter- *in proœm. probl.* rogatus, qui circumducebat, à Brëtio, *† Voſſius in* † deglutire quidem ferri particulas, *emend. ad l. 3. de Idol.* ſed iterum, vel integras, vel ſummum perpuſillo imminutas, reſpondit.

In Venerem proclivis eſt, & Came- *Genera-* ti Baſtriani inſtar, averſus coit. Com- *tio.* plura ponit ova, octuaginta m nempe, *l Plin. l. 10. c. 52.* & quidem menſe Julio; illaq; lapidea *Ariſt. l. 9. H. A. c. 15.* quaſi cruſta munita, & XV. plus mi- *m Aelian. de Animal. l. 14. c. 13.* nus libras pendentia. In arena cõdita, & neglecta, ſolis calore foventur: ſolo viſu exijs pullos excludi quidam credidere, quod intueri ea avem viderēt, nec propter gravitatem iis incubare poſſe ſciant. Non *excluduntur* ſimul. Pars intra ova formatur, pars in lucem prodit, pars fovetur.

De eius voce nil memoratu dignum *Voce* occurrir. Nō elevatur à terra propter corporis molem; feſtinantiſſime tamē interduſ incedit, ingruente in alas vento, & tanquam vela eas extendente. Naturaliter eum *calvere* Plinius n dixit; equum odiſſe alii tradūt, *n Plin. H. N. l. 11. c. 37.* Collum frutice occultat, ſeu quod *o Plin. H. N. l. 10. c. 1.* di *ἀφροσύνην καὶ νυθγόμητα ψυχῆς*, o latere ſe ita exiſtimet; ſeu quod eam corporis partem; quam ſe inferioreſ habere novit, contra perſequentium iniurias muniat.

Vſum


Vfus.

p Plin. l.c.

Vsum si spectes, ova p propter amplitudinem pro quibusdam habentur vasis. Garamantes patoria & capitum regmenta ex ijs conficiunt. Pennæ conos bellicos & galeas adornât, quas apud Turcas solis Janitzaris gerere concessum. Lapis in ventriculo repperitus, & collo suspensus, concoquendi vim promover. Sebum efficacioris ad omnia quam adeps anserinus usus: ideò cum auctio regia per Catonem Uticensem fieret, LXXX. festertijs vñijt; & apud Æginetā emplastrum diacinnabarios ingreditur. Carnes

Arabibus, Æthiopibus, Numidis & alijs in usu, hinc Struthophagorum nomen. Heliogabalus † sexcentorum † Lamprid. in Heliogabalo. capita una cœna, ad edenda eorum cerebella apposuit. Firmus Seleucius, qui Hippopotami adipe delibutos inter Crocodilos impunè natabat, totum uno die comedisse dicitur. Sceletum apud q Pareum vide. q l. 24. c. 22.

NB. Est & alia Struthocamelorum species. Vide Mantissam. Num. 3.



HISTORIÆ NATVRALIS

DE

AVIBUS:

LIBER II.

De Avibus Phytivoris.

TITULUS I.

De Avibus Granivoris,
Non Canoris.

CAPUT PRIMUM.

De Pulveratricibus Sylvestribus.

ARTICULUS I.

De Pavone.



Aboluta Avium Carnivorarum historia ad Phytivoras pergendum est, inter quas pulveratrices tam sylvestres, quàm domesticæ primò occurrunt. Inter illas primus Pavus, propter exquisitum pennarum a ver, & gemmantes b colores, quos adverso maximè sole, quia sic fulgentius radiant, expandit; Junonium in-

cessum, ingenium, de quo in sequentibus singulare, & magnum apud veteres æstimiū occurrit. Athenis c statuto precio singulis novilunijs per annos XXX. spectabatur, multi Lacedæmone & ex Thessalia spectatū confluabant. Alexā. † visis ijs apud Indos, c gravissimas in eū qui occideret pœnas constituit. Tiberius d ob subtractum e viridario unum, capite multavit. In Lybia si quis tantummodò lædisset, non

a Lucian.

de domo.

b Plin. H.

N. l. 10.

c. 20.

Varro l. 3.

de rerust.

c. 6.

Oppid. l. 1.

Lucret. l. 2.

de Natura

rerum.

Aelian. de

Animal. l.

5. c. 21.


† Acl. l. c.

d Sueton.

in Tiber.

non

Pauo Pfau




P.

Pavo foemina cum bordeo spurio



P. Pfau



Pavo albus cum Tritico multiplici.

Weser. Pfau.



Pavo japonensis mas. Cum locustis.



Pavo Japonensis femina. cum hordeo distico.





non impunè ferebat, si Eustathio credimus. Quod si *precium* spectes, mille drachmis marem & fœminam venditos fuisse *e* Antiphon scripsit: & tempore Varronis *f* ova earum denarijs vœniebant quinis, ipsi faciliè quinquagenis, grex centenarius faciliè quadraginta millia sestertia reddebat, vt quidam Albatius aiebat, si in singulos ternos exegisset pullos, perfici sexagena potuisset. Dicitur & *g* Medica, *h* Persica, *i* Junonis, & *k* picta avis. *Diversitas* illorum à colorum inprimis, & loci diversitate sumitur. Nostrates satis sunt noti. In Terra Firma quidem ventre & pectore nigris, cætera flavi; alij pectore & ventre flavi, cætera nigri conspiciuntur. In Curiana regione sunt sylvestres, *l* qui per nemora vagantur, & adeò viles sunt, ut unica sunt, vt unica duntaxat vendantur acu, alibi in palustribus inveniuntur. Quod si & *Sexum* attendamus, fœminam mare multò minor est, neq; in cauda oculos illos gerit, Japonensem si excipias, quæ quatuor in Uropygio obtinet.

Placet maris & fœminæ *descriptio* nem exhibere. Mas igitur capite, collo, & pectoris initio intensè cærulei, seu sapphirini coloris est. *Caput* pro corporis proportionem habet exiguum, & quodammodo serpentinum, maculis duabus oblongis candidis, quarum una oculos superequitat, altera brevior at longè crassior subjacet, ornatum. *Apicem* in vertice è nudis quodammodo scapis tenerimis, viridescentibus, in summitate ejusdem coloris liliorum flores ferentibus conspicuum. *Rostrum* candicat & insigniter hiat. *Collum* est longiusculum tenue & exile. *Dorsum* ex albo cinereum, maculis atris transversalibus conspersum. *Cauda* in duas quasi dividitur. Non longioribus quæ ex dorso prope podicem oriuntur pennis, in rotam extensis, minores quædam eaq; fuscae non rigent, sed ut in reliquis avibus extensæ conspiciuntur, datas vt longiores sustinerent crederes. Oculi *3* *Alleg* quatuor circulis, aureo, castaneo, viridi & sapphirina constant, & varios ad solem obversa colores ja-

ciunt. In *fœmina* pauca colorum conspiciuntur varietas. Alæ totæ, dorsum, venter, coxæ, ac pedes coloris sunt fusci ad cinereum verentis. Capitis vertex & apex ejusdem coloris, in vertice tamen aliquot maculæ exiguae, veluti puncta virefcentia interse-runtur. &c.

Quantum ad *Locum* in Asia fuisse *Locus*. investitios *m* Theophrastus author *m* Plin. H. est, transmarinos *n* Varro. Babyloniam *N. l. 10.* o multos pulchriore quam alibi varietate aluit. Media gulosis *p* celebratos. Ex Asia in Græciam *†* primum, Samum inprimis unde Samii tanquam præstantiores *q* commendantur, post in Italiam & alias oras delati sunt. Athenis in præcio fuisse superius dictum. Roma tempore *r* Athenienses plures fuerant quàm Coturnices. In Suetia, quoq; Ostrogothia, & apud Normannos in agro Lexoviensi aluntur. Amant edita loca, pascuntur tamen cum Gallinis, & Gallinarium sub vespere simul repetunt.

Summa ipsis *Cocum* cupiditas. Masculus *s* quinque fœminas desiderat, & ni ad sit alia, incubantem invadit, ac ova frangit. Agnoscitur irruisse libido, & quoties circa se amictum caudæ gemmantis incurvat, & singularum pennarum capit occulta, locis suis exierit, cum stridore procurrens. Accenditur eadem, si leviter tostam fabam tepidamq; jejunis quinto quoq; die exhibeas. *Cœunt* ab Idibus Februarij *u* ad Martium, vere præsertim, locis ferè apricis, cum Favonij spirare cœperunt. *Partus* à trimatu obvenit, cum varij colores funduntur, brevi à coitu agitur tempore. Ter is anno à fœminis, quæ non incubant editur: at quæ fovent ova totum tempus fœcunditatis aut excludendis, aut etiam educandis pullis consumunt, ita ut verè semel in anno parere Aristoteles octona in primiparis numerat, duodecim aut paulò pauciora in alijs; nec ista continuatis, sed binis ternisve interpositis diebus ponuntur. Alij primo anno unum & alterum, sequenti quaterna quinqve, cæteris duodena

H edete

e in Orat.
contra E-
rasist.
fl. 3. dere
rust. c. 6.

g Suidas.
h Aristoph.
in Avibus.
i Statius *l.*
2. Sylv.
k Athen.
Dipnos. l. 9
c. 19.
Genera.
l Martyr.
dec. 1. de
reb. Oceani
l. 8.

Descri-
ptio.

Locus.
m Plin. H.
N. l. 10.
c. 29.
n Varro de
rust. l. 3.
c. 6.
o Diod. Si-
cul. l. 2. c. 53
Rhodig.
Antiq. lect.
l. 1. c. 10.
p Clemens
Alexand. in
Padagogo.
† Ael. l. 5.
de Animal.
c. 21.
q Gellius *l.*
7. Noct.
Attic. c. 16.
r Athen.
Dipn. l. 14.
Genera-
tio.
s Columel-
la l. 8. de re
rustica c. 11
t Pallad. *l.*
1. de reru-
stic. 28.
u Columel-
l. c.
x Aelian. *l.*
5. c. 32.
e Columella
l. 5. c. 32.
y A. y H. A. *l. 8.*
c. 11.

edere volunt; ne hic numerus trans-
scenditur. Quæter *z* pariunt, earum
z Columel.
1. l. c.

a Aelian. l.
5. c. 32.
b Athenæus
Dipn. f.

c Columel.
1. l. c.

d Aelian de
Animal l.
5. c. 32.

e Arist. H.
A. l. 6. c. 9.
f Aelian. de
animal. l.
11. c. 33.

For.
Vocem si attēdas, Philomelæ author
eas pupillare dixit, Varro à voce sua
dictos tradit.

Ingeniū. Si *Ingenium*, incessum suum ita cō-
ponit, ne maculetur, pullus adhuc, si
malescit (fide Alberti refero) mori-
tur. Laudatus *i* gemmantes expandit
colores, adverso maximè sole, quia sic
fulgentius radiant, simul umbrę quos-
dam percussus cæteris, qui in opaco
clarius micant, condarta quærit cau-
da, omnesque in acervum contrahit
pennarum, quos spectari gaudet, ocu-
los. Si tacitus *k* spectes; recondit suas
opes. Refrigerationis indigus, passis
pennis, & in anteriorem reflexis, cor-
pus suum operit: ingruente à tergo
vento, alas pandit, & suaves auras ex-
cipit. Lini radicem *l* naturale fascini
amuletum, sub altera alarum retror-
sum gestat. Qui eos venenum dete-
gere, de fossis eruere referunt, fidem
suam exsolvant.

i Plin. H.
N. l. 10. c.
20.

k Ovid. l. 2.
de arte a-
mandi.

l Aelian. l.
11. H. A. c. 11

Morbi. Duplici inprimis morbo afficiuntur,
Doloribus nempe dentientium in-
fantum similibus cum crista produci
incipit, & pennarum defluvio; de qua
m Plinius. Idem cauda annuis vicibus

m Plin. H.
N. l. 10.
c. 20.

amissa cum folijs arborum, donec re-
nascatur iterum cum flore, pudibun-
dus ac mœrens; quærit latebram.

De *Viprasagiendi* hoc dixisse suffi-
ciat, cum plus solito clamitant, noctu
inprimis pluviam *n* imminere. Vocis *n* Mizald.
enim illius obstreperæ congeminatione, in Ephem.
vegetum & acutum intus cum calore text. l. c.
vocalem Spiritum, per arteriam va- 43^a
poroso aëre imbutum, erumpere re-
stat. Quod verò extra tempus can-
tillantem, Paracelsus mortem alicu-
jus ea in domo præfigire tradit, fabu-
la est.

Vsum & in Medicina & in cibis ali- *Vsus:*
quem præstat. Nam jus pavonis pin-
gue pleuritidem sanat, linguarum u-
sus ab epilepsia præservat. Ova usta &
in aceto trita impetigines emendant,
fumus è pennis exceptus rubescentes
oculos, *o* propter signaturam curat. *o* Porti-
Finus podagræ fervorem mitigat. Ca- Phytogn. l.
ro propter siccitatem & frigiditatem, 3. c. 29.
dura & concocta difficilis audit. Et-
iam mortui post annum nec olet, *p* August. de
ne putrescit, visa *q* post quadrien- Civit. Dei
nium cariem fœniculi odore, sapo- l. 21. c. 2.
ris amari & falsi contraxisse. Primus *q* Aldrov.
eos *r* Aufidius Lurco circa novissi- Ornithol.
mum bellum piraticum faginare in- l. 13. c. 1.
stituit, & ex eo quæstu, reditus seu fe- r Plin. H.
stertium seu minorum sexaginta mil- N. l. 10.
lia habuit. Hortensius *s* Orator, pri- c. 20.
mus editiali cœna cibi causa occidit, s Aelian. l.
& ideo in jus vocatus est. Cerebella 5. de Ani-
Vitellius in *t* famosa illa patina, quæ mal. c. 21.
Minervæ clýpeus, cum aliis prodigio- tsueron. in
sis cibis apposuit. Quævel de *u* vir- Vitellio.
gine à Pavone in Leucadia adamata, u Athen.
vel de Pavone *x* Indico. Joviconse- l. 13.
crato, quem sacrilegi suffurari non po- x Aelian. l.
tuerunt, dicuntur; inter historica re- II. de Ani-
cenferi debent. mal. c. 33


ARTICULUS II.

De Pavone albo, Pavonibus
Iaponensibus & Gallo-
pavone.

PAVONES ALBI Septentrioni pecu-
liares esse credebantur: & in cali-
dioribus regionib. eosdem nasci, suc-
cessu

Gallopauc. Mas. Cum. Orjza.
Welscher han


Tab. XXIV.




Gallina. India. Cum.
Ovis Eius



Phasianus




Gallina Africana



Phasianen

Phasianus



a Cap. de
b In fabri-
ca Mundi
to. 3. cit. Al-
drov.
Aldrov. Or-
nith. l. 13.
r. 2.

Descri-
ptio.

cessu temporis compertum est. Vidit Aloysius a Cadamustus in Maderis; Johannes b Laurentius Ananias in parva insula, plures, Scaliger in Gallia binos; Gaudentius Merula Mediolani plures; Aldrovandus unum Bononiæ natum. Cum ex Norvegiâ Coloniam adveherentur, numero per feminium aucto, cum penitus in frigidiora loca commearent, & matres in ipso vere ovis incubantes nivosa loca perpetuò ob oculos haberent, vulgatiores facti sunt. Tales & in calidioribus regionibus nascuntur, si caveas in quib. incubant & excludunt ova, ex parte albis velaminibus obtendas.

PAVONUM JAPONENSIIUM maris & famellæ descriptionem Marchioni Facchinero, qui eâ à Julio IX. Pontifice accepit, Aldrovandus debet. Mas nullam cum nostrate præterquam in cauda & pedibus similitudinem gerebat. Rostrum erat, ut in nostrate cineritium, sed longius & subtilius. Vertex capitis, qui planus erat, & collum superius virefcebant, & maculis cæruleis ceu punctis, quæ pariter in medio exiguas lineas albas deorsum descendentes habebant, respergebantur. Apex in capite quatuor fermè digitos longus partim viridis, partim cæruleus, figura filiginis spicæ non omninò dissimilis. Oculorum pupilla nigra, iris lutea, hanc ruber circulus ambiebat. Pectus & dorsum velut ex squamis, sed colore variantibus constabant. Pectoris enim squamæ, si ita vocare licet, ex cæruleo, viridi & aureo: dorsi ex cæruleo & viridi tantum tingebantur. Alarum principium ejusdem cum dorso erat coloris, sed squamæ illæ virides haud ita apparebant, cæruleæ verò majores erant & lucidiores. Pennarum secundi ordinis primæ ejusdem erant cum superioribus colores; reliquæ in medio virides, ubi lineis nigris transversalibus notantur: post subluteæ similiter nigris lineis notatæ; in extremitatibus deniq; nigrae. Venter, coxæ, & deniq; pedes colore leucophæo & maculis nigris insigniuntur, quarum quæ in ventre sunt, lineas albas habent. Cauda pennis, quam in nostrate rariorib.,

colore magis fusco ad castaneum vergente, calamo candidissimo. Oculi caudæ multo quam in nostrate majores, primum aurei, dein cærulei; postremo virides, ut in nostrate. Femina mari quidem minor est, sed capite toto, collo, dorso, pectore & alis simillima. Illud vero in hac admirandū est, supra uropygium, nempe ad dorsi finem, quid veluti caudam habere, eaque oculatam, ut in mari: sed oculi, licet quam in illo sint minores, sunt tamen pro pennarum portione magni. Habebat itidem caudam viridem peninis in ambitu cæruleis, & calamis albis. Postremò in eo etiam à mare, differebat, quod ventrem haberet prorsus nigrum. GALLOPAVO, alijs Gallus Indicus, Peregrinus, & Caltcutensis dicitur, & idem esse cum Meleagride, cujus synonyma sunt, c Gal- c Varro l. 3.
lina Africana, Numidica, Afra avis, de re rust.
Numidica guttata, & alba Lybica, vi- c. 2.
detur; si vera est illa descriptio, quam Plin. H. N.
ex Clyto Milesio Athenæus d adfert. l. 10. c. 26.
Verba ejus sunt. Circa templum virgi- d Athen. l.
nis, Minerva nempe in Levo (sic legendu- 14. Dipnos.
m e non Olero. Insula est maris I- c Casaub.
carij Sporadum una) Meleagrides aves l. 14. c. 20.
sunt. Locus ubi aluntur est ἰσθμὸς non pa- Dalechâp.
ludosus, (ut quidam vertunt, Melea- ad l. eund.
grides enim Aristoteles ab avibus pa- Ael. l. 5. c.
ludicolis distinguit, & Hesychius na- 27. de Ani-
malib.
tominus ἰσθμὸς vocat) sed arboribus con-
stitus. Animal illud non ita prolem a-
mat; & juniores pullos adeò negligit, ut sa-
cerdotibus illos curare necessum sit. Avis
magnitudo ut gallina generosa est, capite
ampliore, quam pro modo reliqui corporis,
glabro, ac super ipso cristâ carnosâ, dura, ro-
tunda, quæ clavi modo super caput extube-
rat, colore ligneo. (Sic lege, ξόψα e non e Casau-
σάψα. Lignei coloris facit & f Theo- bon & Da-
phrastus mentionem, fortè est substa- lechâmp.
vus.) Ad malas jacet instar barbae longa ad l. c.
cra, incipiens ex ore, rubentior quam in f Histor.
gallinis: at eam quæ rostro Gallinarum insi- Plant. l. 7.
det, & quam barbam nonnulli vocant mi- c. 3.
nimè habet, tanquam ea parte sit mutila:
rostrum acutius & grandius quam gallinæ.
Cervix nigra, crassior & brevior quam
Gallina. Corpus totum varium. Nigre-
scit enim totum, crebris maculis albis nota-
tum ac compunctum, lenticula majoribus,

quæ rhomborum figurâ parvis nigrisq; circulis ambiuntur, & pennarum illam varietatem efficiunt, quia niger color aspergitur candido, & vicissim candidus nigro. Alarum pennæ linearum ductibus candidis ferratisq; distinguuntur, in spiras protractis, intervallo pari diremptis. Nullum calcar in cruribus, quæ gallinaceis similia sunt. Matribus adco femina similes, ut vix Meleagridum sexus discernatur. Similitudinem in colore & mole corporis intellige. Eo enim veluti clavo ligneo carent. Quem Aldrovandus ex Gyllo describit ex novo orbe allatus erat, eadem quâ Pavo proceritate. Collum ei simul cum capite à plumis omnino nudum, tantum purpurascens pelle obducebatur, & tam erat crassum, ut pellem quæ antea laxa & vacuâ, cum vocem emittebat, spectabatur, sic inflaret, ut ad brachii crassitudinem accederet. Cum quis ad Gallinam accederet, totis inhorrescebat plumis, & gradu superbo exterrere accedentes conabatur.

Locus. Quantum ad Locum Bœotij soli indigenæ Meleagrides esse videntur. Aetoliæ peculiare, Menodotus g sanius facit, & inde in alias partes translata credit. Diodorus h ultimam Syriæ partem, Strabo i Arabiam ipsis tribuit. Certum, nostras calidioribus locis delectari, una cum Gallinis pah Diodor. l. sci, & longius à domo per agros divagari. Quod autem Scylax Carianensis k lacu Cephissio; in Africa, Mnaseas l lacui ibidē Cratum amnem de se promenti, eas vendicat, vel error est, vel Gallinis, quibusdam Africanis, quæ paludes amant, rutilam m galcam & cristam in capite gerunt, quæ m Colum. que novissime n peregrinarum avium in mensas propter ingratum virus (quod nostris Meleagridibus non competit) receptæ sunt, nomen Meleagridum propter similitudinem indidere.

Generatio. Coeunt o aliquando cum Pavonibus, & excluduntur pulcherrimi pulli, nitidissimis pennis fulgentes. Incubant verno tempore diebus tricenis. **Vox.** Ad Vocem earum extendit Pollux verbum *κωκκίζω*. Crocitacioni Gallinaceæ Pavoninæque non dissimilem edit, cum fragore per collum longe

lateq; vagantem, & instar liquoris in dolium infusi obstrepentem. De usu ipsorum in cibis non est quod dicamus. Olim Iliidi Tithoneæ p à pauperioribus immolabatur. p Pausan. in Bœotici

ARTICULUS III.

De Phasiano, Vrogallo seu Tetræone, majore & minore.

PHASIANUS, Galeno Gallus Sylvestris, Statio Phafidis ales, Scythica volucris Juvenali, Itis quibusdam dicitur. Magnitudo non omnibus eadem. In regionib. Ergimul & Cerguth quæ Magno Chamo subsunt, maximos reperiri Paulus Venetus scribit, cū tantę prolixitatis caudâ, ut decem & octo palmos excedant. Is quem Aldrovandus describit libras tres duodecim unciarum pendebat. *Rostrum* coloris erat cornei, pollicis transversî longitudinē, in extremo recurvum, superius inferiorem longius. Membrana carnosa, qua capiti conjungitur tuberosa, sub qua nares occultantur, instructum. *Caput* in vertice colore cinereo ferè micabat; ad latera supra coccineam maculâ, & propè rostrum viridi, & admodum vel in sole, vel in umbra varia. Ab utraq; capitis parte è regione aurium pennæ, quas Plinius cornicula vocat, elevabantur, sub his caruncula seu musculus qui cornicula illa movent, apparebant. *Aures* erant admodum latę, profundę, & rotundę. *Colli* pennæ infra propè pectus, & pectoris etiam propè collum tribus coloribus variabant, fusco nempe propè radices, dein aureo & viridi; sed viridis nisi complicatis simul pennis non conspicitur, si unicam à corpore ablatam examines, niger jam apparet, sed & aureus si pennas invertas splendorem amittit. *Tergoris* pennæ erant totæ ferrugineæ ad rufum vergentes, & velut in exigua flamenta delinebāt. *Cauda*, quæ organi pneumatici figurâ obtinet, duos dodrantes, cum duob. palmis explebat. &c. Fœmina mare per omnia deformior est, Coturnicis ferè colore.

Locus

Vrogallus maior.
Aurhan.



Vrogallus seu Tetrao.
alius.



Vrogallus minor.



Grygallus maior.
Spillhan Gurgelhan.



Gallina Corylorum.
Hafelhün. Rab hun.



Locas: *Locus* ipſis Phasiſ amnis, unde nobis *Athen.* men fortiuntur Athenæus *b* ex Media accerſiri ſolitas quaſi meliores, *Dipnoſl.* traditiſin Indiæ hortis cum Pavonibus enutritas *c* Aelianus. In Curiana *d* regione tam numeroſi capiuntur, ut ſinguli duabus aciculis venditi fuerint.

l.8. Decad. In Scandinavia aliquando abſque *Ocean. c. l.* cibo ſub nive latent. Fridericus Saxoniæ Dux ducentos emiſſos capi vertuit. *Victus.* *Victitant* granis, ſeminib. & bacis. Avena in primis delectantur.

Genera- *Coeunt* e menſe Martio & Aprili. *tio.* Unus mas duabus ſœmellis ſufficit. *e Pallad. de* Viginti ferè ovis, illiſq; rubris parienti ordo concluditur. Semel in anno *re ruſt.* foetificanti, & trigefimo die maturos *c. 29.* pullos emittunt. Optime Gallinis incubanda committuntur, vt una matrix quindecim ova operiat. Quomodo verò ex Phasiano mare & Gallinis Gallinaceis ſimul coeuntibus Phasiani procreari poſſint, docet apud *f* Aldrovandum. Longolius. Intereunt pediculis, niſi ſe pulverent. Pennas dum nimis pingueſcunt, ſi quibusdam credendum, amittunt. Capite interram immiſſo, totos ſe latere exiſtimant; & dum propriam imaginem admirantur prius ſe capi ſinuunt, quam auſugere poſſint.

f *l. 13. Ornith. c. 5.* Quantum ad *uſum medicum* non pingues *g* bene purulentis in cibis exhibentur. Vinum in quo unus extinctus eſt bibitum, torſiones, ſi Marcello Empirico credimus, tollit. Adæps, tetanicis, marriſis ſuffocationi,

ſuſ. *Quantum ad uſum medicum* non pingues *g* bene purulentis in cibis exhibentur. Vinum in quo unus extinctus eſt bibitum, torſiones, ſi Marcello Empirico credimus, tollit. Adæps, tetanicis, marriſis ſuffocationi,

h Galen. de & renum *h* affectibus prodeſt. In cibis *ren. affect.* vehementer laudantur, nec vel Perdicibus vel gallinis domeſticis, ſi pulli edantur, cedunt. Olim inter iſummas delicias numerabantur, à quibus Ptolomæus abſtinebat: at quibus Helioabalus *k* Leones & alia bruta paſcebat.

Deſcriptio. **UROGALLUS** maior, qui veterum Tetrao Ariſtotelis Terrix, vt Geſnero; Agricola; Jovio & Aldrovando placet, à quibusdam cum Otide ſeu Starda, vel Tarda; à nonnullis cū Ortygometra confunditur; ex Gallinaceorum eſt genere. Quem Aldrovandus deſcribit, habet collum dodranta-

le, palmis nigricantibus, cinereo diluto colore ſparſim notatis. Caput nigrū, roſtrum breve, gibberum, latum. *Supercilia* & pelliculam circa oculos rubra. *Pectus* & ventrem coloris nigri. *Alarum* pennas longiſſimas palmorum quinque nigricantes, aut potius fuſcas, minores ſub alis albiſſimas. *Poplites* & femora plumis albis, crura ad digitos uſque fuſcis veſtita. Ex albis in cauda maculis ætas conjicitur, quo maiores ſunt, eò pauciores illas habere feruntur. Reperiuntur qui libras quatuordecim Germanicas: imò & viginti tres Italicas pendunt.

De coitu ipſorum mira tradit Ence- *Genera-* *lius.* Ore coire, Gallum ſperma exo- *tio.* re tempore coitus evomere; Gallinas poſtquam id deglutiverunt, concipere; mox comprimi. Reliquias rore vel pluvia ſuperveniente, putrefactâ materiâ, in ſerpentes mutari, non ſuperveniente; in gemmam tranſlucidam & candidiſſimam abire, ſit penes authorem fides.

Saporis ſunt gratiſſimi. Caligula *ſuſ.* ſibi eos immolari voluit. *Suetoni.*

UROGALLUM minorem Stumpſius, Phasianum mœtanum appellat. A Geſnero conſpectus multo maiora ſupercilia & pellicula rubente, quandoq; cærulea, quam Urogallus habebat, Roſtrum longitudine tranſverſi digiti, plumas in vertice nigras. Collū plumis Indicis &c. In Septentrione, ſi Olao fides, ſub nive duobus aut tribus menſibus latitant. Capiuntur laqueo; ita ut collo adſtriſto ſuffocentur.

ARTICULUS IV.

De Grigallis & Attagine.

GRigallus vel *major*, vel *minor* eſt. Illam ſub nomine Tetracis Ne-meſianus Poëta deſcribit, dum ait *Et Tetracem Romæ, quem nunc vocitare Taracem* *Cæperunt; Avium eſt multo ſtultiſſima.*

Aldrovandus duplicem tradit deſcriptionem. *Prima* eſt illius qui à Medico

Cracoviensis missus fuit. Erat magnitudine anserina, rostro nigro adunco, gibbofo. *Capite* plano, à rostro ad narium foramina usque cinereo, nigris maculis consperso. Reliquum, collum item pectus, venter, & coxæ coloris erant rufi, modò nigris, modò albis maculis aspersi. *Cauda* ruffa, sed magis quam reliquo corpore ad castaneum accedens, maculis nigris maximis conspergebatur. *Digitis* nudis, cinereis, quatuor erat instructa. *Oculorum* cilia coccineus color ambiebat. Tota avis si rostrum more rapacium & ungues aduncos habuisset, & parvo fuisset corpore, vel Lithofalcus, vel Accipiter Fringillarius videri potuisset. *Altera* ex Gesnero desumpta est, cujus Grigallus erat toto corpore Perdix ferè, præsertim rusticæ instar colorato, & punctis maculisq; nigricantibus distincto, ima colli pars prona intercedentibus lineis ex cæruleo virentibus rubebat, in ventre plurimum albedinis conspiciebatur. Propter mirificam colorum varietatem, Attagenem Alpinum vocare posses. *Minor a* perdice est major, sed eidem persimilis. Creditur à betulæ colore Germanis Birkhunden dictus. Supremum à betula corticem si detrahas qui albo subest, in nigroque rufescit, præcipuum huius alitis colorem imitatur. Densa & opaca loca ut bombardarum minas fugiat petit, ideò sæpe in betuleto latet, & inde in fata & fœnilia callidissime excurrit.

Descriptio.

c H.A. l. 9. c. 49. d in avib. & vespis. e Bellon. l. 5. de Avib. c. 6.

ATTAGEN, Perdix b Asclepica quibusdam inter pulveratrices ab Aristotele ponitur; quod inter palustres ab Aristophane d & ejus scholiaste; vel error est, vel ideò factum, quòd interdum ex montibus ad loca vicina e descendat ibidemque moratur; vel illa, nisi Turnerus fallit, intelligenda est, quæ ad ripas fluminis moratur. Gallinagini ita similis est, ut nisi paulò major esset, & pectoris color magis ad cinereum vergeret, altera ab altera difficulter distingui posset; rostrum habet longum, sed capta triticum non secus ac columbi comedit. Quantum ad veterum descriptionem, Alexander Myndius, perdice

paulò majorem, totum circa dorsum *κατὰ φεγγον*, id est versicoloribus maculis pictum, figulinæ testæ colore, sed magis rufum; corpore gravi, alis brevibus facit. Quantum ad Recentiorum, Gesnerus Attagenem Corylorû Gallinam esse putat. Bellonius f suum f Bellon. l. Anaticæ pestri, quem coturnicibus citato. benè macularis comparat, similem es. g *1ul. Alex. l. 13. salubr. c. 5.* scribit. Julius Alexandrinus g *ge. l. 13. salubr. c. 5.* nus quoddam longiore collo & crutibus, plumis non iisdem macularum notis distinctis, ex Hispania allatum se vidisse refert. Florentiæ b observatus rostrum nigro sed in extremo rubescente, oculi pupillâ nigrâ, iride cinerea, maculis per ventrem albis, dorso ferrugineo, nigris maculis insignito, pedibus ferrugineis. Aldrovandus avem ex Sicilia montibus allatam pro Attagene ponit, quæ magnitudine & toto habitu ad Phasianum accedit. Rostrum habet breve, nigrum, & in acuto recurvum. Colorem totius varium. Caput in primis aspectus pulcherrimi, cristam in medio vertice erectam, subluteam, nigris & albis maculis variegatam. Pupillam oculorum nigram, iridem luteam, supercilia expellicula coccineo colore rubente. Sub rostro & gulæ principio ceu barba ex tenuissimis plumis dependet. Collum est longiusculum, & ad corporis habitum assimilatum, tenue, & exile, cinereum, maculis albis & nigris conspersum. Pedum digiti anteriores longi, posterior brevis, singuli adunco hamo armati.

Loci si ratio habeatur, nulli sunt in Campania, quod ibi aconitum, quo purgantur, non proveniat. In Creta non nisi in Cydoniatar. regione. In Cypro etiam domi aluntur. In Rhodo & Jonia laudatissimi habentur, sed & in Hispania Pyrenæis, Arvernensibus Gallia & Alpibus reperiuntur.

Vicissitantes granis l & frugibus. Loquantur nomen suum qua possunt voce, & decantant. Vocales capti, obmutescunt, si Plinio m & Aeliano credimus: in suas sedes dimissi, καὶ τὸ φθῆ γυαλὴν τὴν πείρησιν recipiunt. Ex Lydia n in Aegyptum aliquando deportati, & in Iylvâ dimissi, coturnicis primo vocem


Locus.

Ambr. Leo Probl. 343. k Plin. H. N. l. 8.

Vicissitantes.

Arthen. l. 9. Dipnos. m Plin. H. N. l. 10. c. 48. n Ael. H. A. l. 15. c. 27.

Otis. Cum. Cuere. Arictino.



*Attagen.
haselthun.*



Tab XXVI

*Otis. Trada
Trabgans*



Charadrios.

Avis Stellata. Stella. Stern Vogt



Oedienemus Triel.




Allagen seu Perdix
Rebhuhn.




Galgulus.

Pica Caudata.
Elster Ael.




Caryocatactes.
Nussbicker.

Ortjigometra. Wachteln
König.



Coturnix. Wachtel.




Rusticula minor.
Graschnepf.



Moskuv.



Capella. Kyjuts.



Merops. Seeschwalb.



Vpupa Kothan.



Widhopf

Caro in *Cibo* est laudatissima; seu sanguinis optimi generationem seu excrementi paucitatem; seu concoctionem alimenti attendas. Candida est, tenera, & fibris prorsus carens. Conceditur purulentis à Tralliano; Nephriticis à Galeno. Cerebrum genituram augere Avicenna reliquit.

descri-
tio.

*Genera-
tio.* Pullōs educatos extra locum edu-
cationis ipsorū abducunt: illiverò bi-
ni, mas & fœmina aliorsū se conferunt.

Quantum ad *Formam* fides est *Descri-*
Athenæo, *b* tribus insistentis digitis, *ptio*.
 magnitudine Gallinacei majoris, ca- *b* *Dipnōs*.
 pite oblongo, oculis amplis, rostro a- *l. 9.*
 cutō, linguā ossicā, gracili collo. Bello-
 nio *c* & Gesnero, crassior est & vali- *c* *l. 2. de A-*
 dior, gravis, tredecim cum dimidio *vib. c. 13.*
 libras interdum pendit. *Caput* habet
 inconcinnum, cinerei cum collo, &
 ad ventriculum usq; procedentis co-
 loris. *Rostrum* robustum valdè, *linguam*
 ferratam, utrinq; acutam, & in extre-
 ma duram. *Meatus* auditorius adeo
 patulus, ut extremitas digiti immitti
 possit. Si introspicias duo apparent
 sub plumis anfractus, unus rostrum
 versus, alter rectā ad cerebrum ver-
 gens. *Pectus* crassum ac rotundum;
 cum ventre & cruribus quatenus plu-
 mis vestiuntur ad media usque femora
 albicans. *Dorsum* castaneis ac subni-
 gris maculis respersum. *Alarum* pen-
 nas majores candidas, circa finem ni-
 gras. Pennarum radices rubras. *Can-*
dam pennis ruffis, cum tenijs quibus-
 dam & maculis nigris superiore inte-
 rioreque parte albis ornatam. *Tibias*
 polles

pollicem crassas, medium pedem longas, squammosas. Pedes admodum crassos, sub quibus talus magnus instat muscoli conspicitur. Digitos pedis utriusq; contra reliquarum avium morem ternos tantum. *Interiores par-*

d Gesner. *tes* si spectes, *d ventriculum* habet magnum, in quo interdum calculi albi inveniuntur, in extrema gula ante stomachum partem capaciorem ex multis rotundis carunculis compactum. *Intestinis* diductis & extensis id quod à fundo ventriculi ad alvum recta procedit, dodrantum est septem cum dimidio: appendices verò duæ ab alvo retrocedunt; quarum altera tenuior est tres dodrantes longa; altera amplior, duos cum dimidio, tres verò isti meatus juxta alvum in unam capacitatem conveniunt.

Locus. Quantum ad *Locum* in Italia non visuntur, *e* nisi fortè turbine advectæ. Hispaniæ peculiare esse credit *f* Plinius, sed falsò. Nam & in Græcia circa *†* Cephissum Bæotiæ nascuntur, & in Britannia *g* magno sunt numero, & in Belgium sub autumnum gregatim advolant, ibidemq; in agris procul ab urbibus distitis morantur, nihil de Polonia dicam. Falsum itaque cum cornicibus quod *h* à Plinio traditur, quæ ab eo tempore Italiam deserunt, avolare. Arboribus nunquam insidēt, nec aquas nisi eas, quas post pluvias in camporum foveis relinquuntur, sitis sedandæ causa, frequentant.

Vitus. *Vescitur* frugibus sed & herbis, ut auri rricula muris; & *i* rapis ventrem implet.

Generatio. *Nidificat* in terra, tricenis *k* diebus incubatum absolvit, & parit cum maturatione seges est.

Volatus. *Volatu* est propter corporis pondus admodum brevi & tardo, & capitur manu, si quis *l* celerius instet.

Amititiam cum Equo *m* colit, huic appropinquare & finem *n* deicere gaudet, *†* ita capitur. *Inimicitiam* *m* Ael. l. 2. verò cū vulpe & cane exercet. A vulpe *de Animal.* inversa in terram *o* abjecta, caudamq; *c. 28.* ut collum avis extendente, capitur. *n* Plut. *de Solertia Animal.* *περίσσειν ὡς πρὸς ὄρνιν ὁμόφυλον.* Humilitatis ob ponderosam *p* corporis molem sibi conscia, simul ac canes latrantes

audiveris. *εἰς τὰς θάμνας καὶ τὰ ἔλα* confugit. *o Ael. l. 6. de Animal. c. 24.*

Vsum & in *Cibis* & in *Medicina* præbent. In *Cibis* caro Xenophonti apud *q* Athenæum suavis, à Demetrio Constantinopolitano. *r* Accipitrib. *Vsus.* tanquam suavissima præscribitur. Julio Alexandrino *s* quamvis nigra & durior, valenter tamen alit; si vel exquisitam in ventriculo concoctionem adeptæ fuerit, vel captæ & jugulatæ durities dometur.

In *Medicina.* Nam adeps *t* apud Phryges & Lycaones mammis puerperio vexatis applicabatur. Fimi usum Avicenna contra impetigines prædicat. Ova eodem teste capillos nigro colore tingunt. Piscatores repræsentatis ex ipsarum pennis muscis, piscibus insidiantur. *t Plinius in H. N.*

ARTICULUS VII.

De Anate Campestri & Ave Stella dicta.

ANas Campestris propter confimilem digitorum numerum Otidi succedit. Bellonio Anas Campestris, Canne Petiere Gallorum: & Tetrax, & Galliæ peculiaris esse creditur; à rusticis Gallis Oliva dicitur. Ex ejusdem descriptione, est Phasiani corpulētia, *Capite*, si crassitiem demas, Coturnicem; *rostro* quod nigrum pullum galinaceum refert. *Dorsum* tribus aut quatuor coloribus, nempe flavo tendente ad rubrum, subcinereo, & rubro intermixto variegatur. Quatuor pennæ alarum in superiori parte in extremitatibus suis nigrescunt. *Pectus* alba torquis juxta ingluviem circumdat. Radices omnium plumarum rubræ sunt & sanguineæ. Tres duntaxat in pedibus *digiti*. Omnia intus in avibus granivoris communia.

Vescitur granis absq; discrimine *o. Vitus.* omnibus, nec non formicis, scarabæis & muscis. Quamvis color colli & capitis semper idem non sit, & in hoc maris à femina differentia consistat; dorsum tamen & alæ nunquam colorem mutant.

STELLA tribus quoq; digitis inscendit.

cedit. Totum corpus, si ventrem & caudam & alas majores excipias ex albo, luteo, & nigro ita variegata est, ut qui color superet difficile sit judicare. *Rostrum* est longiusculum, in extremitate parum recurvum, nigricās. Venter & coxæ candicant. *Cauda* maculis nigris plurimis, quarum binæ transversales insigni sunt magnitudine, consperguntur.

ARTICULUS VIII.

De *Oedicnemo Bellonii*, & ejus congenere *Aldrovandi*.

Descriptio.

Bellon. l. 5. de Avib. c. 5.

Avis, quam Bellonius *Oedicnemo* à tibiærum infra genu propter os quod valde crassum est, quæ nota vel sola agnosci potest, singularem crassitiem, vocat; magnitudinem habet *Elori*, *rostrum* longiusculum, in extremo nigrum & flavum qua capiti jungitur. *Alis* intus albis, extra nigris *Otidem*, *dorso* *Attagenem* refert. Coloris enim est fumosi, maculis nigris per longitudinem ductis variegati. *Digitos* habet in pedibus ternos, *tibias* ut supra. Tardè parit; & ineptæ ad volandum, sub finem mensis Octobris repertæ sunt. Huic respondet illa quam sub *CHARADRII* Aristotelici nomine *Gesnerus* descripsit. Gallinæ parvæ aut columbæ ei magnitudo. *Rostrum* longiusculum, antè nigricās, postè flavescens, extremis partibus inferiore & superiore leviter decussatis. *Pennæ* in collo, capite, & pectore maculosæ, posteriore colli parte ad fuscum tendente; in dorso & alis fuscae, maculis quibusdam ruffis insignitæ. *Crura* oblonga, coloris sublutei. *Digitus* terni, brevib. interiore parte membranæ juncti. *Ungues* brevissimi & mutili. *Degit* in pratis palustribus; & aliquando in lacu Tugurineni glacie adstricto manibus se capi permisit.

Gesnerus in Ornith.

Victus.

Victitat muribus quos de nocte venatur.

Vox.

Vocem tanquàm fistulæ edit. Domi inclusa subinde ambulat, aliquando

in orbem ad multum *Tempus*, circa columellam aut aliud quidpiam; aliquando recto tramite; & si quid impedimento fuerit, transilit potius, quàm à via recta deflectat. Oculos etiam si digitos admoveas, non claudit.

Addit *Aldrovandus* aliam *Oedicnemo* congenetem. Crassitie corporis & ped. in constitutione *Otidem* refert. *Rostrum* habet superius & inferius æquè longum, rutilum, rictu amplissimo, naribus valdè, ut in *Anfere* patulis. Caput, cervicem, dorsum, caudam, & alas, ex flavo & castaneo elegantissimè diluta & maculata. Venter totum, & femora, intus candida. Gula & pectus albicantia, intercurrentibus maximè in pectore, maculis. Tibias si digitos pedum compares longissimos.

ARTICULUS IX.

De *Perdicibus* ingenere.

Perdix, Græcis πέρδιξ & περδίκην, Cretensis πέρδιξ, Pergeis σαρδαπέ. *He-sychio* καυκάβα dicitur. Quo nomine nostra ætate hæc avis indicetur, non satis est compertum. *Perdicem* rufum, veterum minorem vulgare *Perdicem* esse placet *Turnero*; sed *rostrum* a illius *cinnabarinum* non ad-mittit. Quidam apud *b* Longolium *Otidem* cum *Perdicibus* confundit. *Bellonius* c ex eo quod *Aristotelis* *Perdicem* cum alijs avibus modò magnitudo par sit, coire scribit, *Coturno* Græcorum, qui cum *Gallinis* rem habuisse visus est, id nominis imponit. *Aldrovandus* cui *Coturnus* & *Coturnix*, magnitudinem quæ pro diversitate terrarum variat, (sunt in *Allobrogibus* d *Perdices* mediocri pulso non d *Scalig.* minores,) si excipias, eadem; *Coturnicem*, *Perdicem* rufam esse sentit, & l. 3. *Perdices* minores ab *Athenæo* e ap- e *Athen.* pellatas, easdem cum *Avib.* novis *Pli-Dipn. l. 9.* nij esse, & *Starnas* tanquam externas vocari contendit; *Rusticulam* autem *Plinij*, quam *Dalechampius* & *Suef-sanus* *Perdicem* minorem esse credit, *Gallinagini* quam *Ascolopa* seu *Scolopacem* *Aristoteles* vocat, ex descriptionum collatione accenser.

Genera. *Genera* ipsarum sunt plurima. Strabo *Geograph. bo f* Indicos vulture & Anseris majores tradit. De Græca seu majore ruffa *l. 17.* aliquid diximus. Aelianus *g* Syroperdicem vocat avem, perdice minorem & nigram, rostro ruffo, mansuescere nesciam, quæq; circa Antiochiam Pifidæ lapidem exest, & conficit. Idem

h Athen. *h* Perdices Cyrrhæos vocat, qui neq; *H. A. l. 4.* ad certamina valent, neq; pulchrè cātare sciunt, & *i* allio vescuntur. In *6. 13.* Chio insula sunt rubræ, Gallinæ *i* magnitudine. In Ægypto cineræ, alibi *9. Dipnos.* albæ. Apud Troglodytas Gallinacei *k Nicol. de* magnitudine, *l* rostro & cruribus seu *Nicolas l.* fuscis seu luteis. In regno Barnagassi, *2. Itin. O-* quædam Caponum magnitudine, *rient. c. 8* pedibus & rostro luteis, minores Gallinis *l Scal. Ex.* alias pedibus & rostro purpureis, non- *236. 13.* nullas rostro & pedibus cinereis. In Hispaniola diversicolores, suavissimi saporis. In continente, si Oviedo credendum, Hispanicarum Gallinarum magnitudine, duplici pulpa, alia alteri substrata. exq; tantæ molis, ut unam ne insignis quidem helluo absumere queat. Colore sunt in pectore, alis & collo cinereo. Ova ponunt ovorum nostratium Gallinarum magnitudine, colore lapidem cæruleum æmulante.

Quantum ad *internam constitutio-* nem bina habere in Paphlagonia corda, *m Plin. H.* falsò fortè, prodidit *N. l. 10. c. 33* Theophrastus, hybernis mensibus nullos habere *Ael. de A-* testes eadem *n* fide alij. Ingluviem ven- *nim. l. 16.* triculo in ipsis præjacere, *o* appendi- *6. 15.* ces non supernè ut piscibus, sed infer- *n Arist. H.* nè ad extrema intestini haberi, cum *A. l. 3. c. 1.* *o* Arist. H. cocunt turgidos valdè testes obtine- *A. l. 2. c. ult.* re; verissimè Aristoteles prodidit.

p l. 3. H. A. *c. 1.* Loca si quæras, In Hibernia & Lemniorum insulis nullæ sunt, si Botero & Liberali credimus, nec minores in Creta, ruffæ in Belgio raræ. A duabus in Anapheu insulam immisiss, tanta vis procreata, ut incolæ de loco deferendo cogitarent. Apud Tarnassaros, Æthiopas, Samios, Cretenfes & c. eximia ipsarum fœcunditas. In insula Caprea adeò pinguescūt, ut adipem eximant incolæ, & in futura convivia fervent. Qui in Bœotia, fines in Atticam non transvolant, si *q Athen. l.* *9. Dipnos.*

& si fortè aliquo migraverint, voce ab indigenis dignoscuntur.

Vescuntur limacibus *r* unde ibi nulli *Victus.* ubi Perdices, in Sciatho *s* insula coch- *r Arist. H.* leis, allio, quod de Cirrhæis *t* Aelia- *A. l. 9. c. 37.* nus prodidit; Sabulo, *u* granis & alijs. *s Athen. l.* Pamphagam esse suspiceris. *9. c. 4.*

Libidinis sunt profusissimæ, unde *sa-* lacitatis veneræ Symbolum. Sane *l. 4. c. 13.* Mares non tantum visis fœminis, *u* sed *u Scalig. in* & voce illarum auditâ, semen emit- *Aristot. de* tunt, ex animi fortè impressione. Nam *plantis.* & si speculum contra eos posuerimus *Gene-* ad imaginem suam accurrentes idem *ratio.* faciunt. Idem, si Alexandro Myndio *u Ath. Di-* credendum, hiantes coeunt, & toto *pnos. l. 9.* coitus tempore linguâ exertâ volant. *x Aelian. l.* nata jam ova, *x* ne circa pullitiei edu- *2. de Anim.* cationem occupatis fœminis, earum *c. 5.*

societate frustentur, frangunt, in aucupantes *y* interdum Veneris impa- *y Arist. l. 9.* tientia ruunt; & capitibus ipsorum in- *H. A. c. 8.* fident, si fœminarum copia nō detur, *Plin. l. 10.* vociferantur & pugnant inter se. Vi- *H. N. c. 33.* ctum ajunt Venerem pati, & quidē *z Aelian. de* tamdiu donec & ipse alterius victor e- *Animal. l.* vaferit, quin in proprios pullos idem *10. c. 47.* scelus committunt, eosdemque simul fermè ac exclusi sunt, subagitant, nec Gallinaceo parcutunt generi, ex quorum cum Perdicibus congressu, tertium quid progigni *a* Aristoteles reliquit. Nec remissior *Fœmella* salacitas. *b* Si contra mares steterint, aura *a l. 2. de Ge-* ab his flante prægnantes fiunt. Hian- *ner. c. 2.* tes per tempus exertâ linguâ æstuant, *b Plin. H.* concipiuntque supervolantium affla- *N. l. 10. c. 33.* tu, sæpè voce tantum auditâ masculi.

Adeoq; vincit etiam libido fœtus cha- *Athen. Di-* ritate, ut illa furtim & in occulto *pnos. l. 9.* incubans, cum sensit fœminam aucupis accedentem ad marem, recanat, revocetq; & ultrò se præbeat libidini; quod tamen Plutarchus inficiatur. *Nidum* cæterarum avium more non exstruunt, sed partui vicinæ aream seu receptaculum è festucis substernunt, idemq; spinâ & frutice; *c* tum ut con- *c Plin. l. c.* tra feras abundè vallentur, tum ne o- *Aelian. l. 3.* va à rore decidente vel imbribus & sic *c. 16. & l.* infœcunda evadant, afficiantur, mu- *10. c. 35.* niunt, nec in quo loco peperere incubant. Septem verò diebus nidum contextunt, septem in pariendo confu-

munt.

munt, septenos pullos enutriūt, si Aelianus *d* credimus: Ova bis quotannis
anim. c. 15. ponere Albertus dicit; decem, sæpius
 quindecim & sedecim, illaq; seu alba,
e Arist. H. seu ovis columbæ similia, *e* alij addi-
N. l. 9. c. 8. dere. An utraq; Perdix *incubet*, ab
Aelian. l. aucupibus inquirendum est. *Exclusio-*
10. de Ari- *nem* quod spectat, pullos moræ impa-
mal. c. 35. tientes, occupatis spatijs sponte crū-
 pere, pertulsiq; ovis, vbi primū caput
 exeruerint, pedesq; protulerint, reli-
 quo corpore adhuc adhærescente, vi-
 procurrere, sibiq; cibum ductu ma-
 trum inquirere, *f* ajunt. Sanè more
f Aelian. l. Gallinarum, plumis obvestiti, in agros
4. de Anim. ubi messis stetit, deducuntur, quod
v. 12. l. 10. *Variæ histo.* mater suo volatu ijs cibum submini-
6. 3. strare nequeat. *Vitam* ad *g* quindecim
g Athen. vel sedecim annos extendunt, quod
Dipnos. l. 9. ad vigesimum quintum pervenire, a-
Plin. H. N. pud *h* Aristotelem legimus, mendum
l. 10. c. 33. est. Olfactus ipsis exquisitus.
h Arist. H. *Volatus* ob corporis gravitatem &
A. l. 9. c. 7. *Volatus*, brevis & humilis; *k* velox tamen &
k Ovid. l. 8. impetuosus, hyberno tempore grega-
Metamor. tim, verno, cum proli student, binæ
 tantum volant. In Bæotia sui cum vo-
 lant nō esse juris, sed in ipso aëre, quas
 transire non audent metas habere, in-
 de ultra notatos jam terminos nusquā
 exire, nec in Atticum solum trāsmear-
 re, Solinus *l* fabulatur. *Vocem* non
l Polyhist. eandem habent. Bæoticas exili voce
c. 12. uti ajunt. Athenis *m* circa Coryda-
m Athen. lum pagum oppidū versis caccabant,
l. 9. ultra verò *πικρὸν*. Helychi⁹ *κατακταται*
n Ael. l. 4. scribit; Aelianus *n* quasdam vocis
de Animal. contentione & cantu valere ait. Ex
c. 13. ipfarum cātu certissimum jam appro-
 pinquantis diei signum, sed falsō asse-
 rit *o* Bellonius.

o l. 5. de A- De *Pugnacitate* earum quædā pro-
vib. c. 14. duntur. Alexander Severus *p* Perdi-
Pugna. cum & Carulorum certamine sese ob-
p Lamprid. lectabat. Cypri easdem *q* ad ejusmo-
in Severo. di certamina enutriunt. Apud Ge-
q Lusignia- fnerum *e* Sedunis allata, fœlem morde-
nus in hist. bat. Pugnāt & inter se cum grega-
Cypri. tim per nemora pascentibus, fœmina
 ceu futuri certaminis spectatrix sese
 offert, & nisi victori copiam sui faci-
 ciens.

victus. *Victus* *r* nunquam in conspectum
x Aelian. l. prodit. *Pulli* cum primū ad eoitum

educuntur, sua cute armati, quam vel
 ad arbores affricando, vel luto obli-
 nendo asperam reddunt, pugnant. a-
 cuitur pugnacitas, si trichomanes &
 polytrichum in cibo offerantur, si *s* Li-
 berali credimus.

Sed & singulari pollere Perdicēs
ingenio certum est. Si ad nidū cœperit
 accedere auceps, præcurrit ad pedes
 fœta, prægravem aut prælumbem sese
 simulans, subitoq; in procursu aut bre-
 vi aliquo volatu cadit, fractâ aut alâ
 aut pedibus, præcurrit iterum jam jam
 prehensurum effugiens, Spemq; fru-
 strans, donec in diversum abducatur
 nidis. Eadē pavore libera, & maternâ
 vocans curâ, in sulco resupina, glebâ
 se terræ pedibus apprehensâ, operit.

Discunt & pulli astum, *u* & quam
 primū hominem adesse sibillo signi-
 ficavit mater, supini se collocant, &
 corpus quisquiliis tegunt. Nec depo-
 nit has venator fraudes. Antè retia
 propositus, cantum ad pugnam lacef-
 sentem orditur. Sylvestribus ingru-
 tibus pedem refert, ipsi in laqueos in-
 cidunt. Nolo sermoni humano enun-
 ciando aptos dicere, quod aliqui ex
 scriptoribus innuere, & latiuscula ea-
 rundem lingua suadere videtur: Non
 caret tamen fide, interdum ita cicu-
 rari posse, ut, cum Gallinarum dome-
 sticarum cohorte promiscuè habitet,
 quod apud Aloysium *y* Mundellam
 factum; domi educatæ, ad montes in-
 terdiu victum inquirendi ergo sub cu-
 stodibus dimittantur, sibilo revocatæ
 sub vesperam redeant, quod Nicolaus
 à Nicolais *z* in Chio insula commu-
 niter fieri prodit; & ab homine de loco
 in locum ad quatuor millia, ita ut ille
 terra iter faciat, istę per aërem volent,
 quiescente quiescant, ducantur, quod
 in Pontō visum, Odoricus de Foro Ju-
 lii tradit. Ova deperdita per alterius
 a matris damna, ut adoptione alienæ
 sobolis suæ orbitatis incommoda re-
 parent, resarcire; Natos in campos e-
 ductos, ut fuerint materna voce com-
 moti, ovorum genitricem petere; ubi
 sentire *b* medicamentum lætale pa-
 rari, vociferari. Cirrhæas *c* seipsas,
 ut ab aucupibus spernantur emaciare:
 porro ad vocem sonoram *d* conciliā-

4. de Ani-
mal. c. 1.

s in cong.
mirab.
narrat.

Ingeniū
Plin. H.

N. l. 10.
c. 33.

Arist. H. A.
l. 9. c. 8.

Aelian. l. 3.
de Animal.
c. 16.

u Plin. de
solertia A-
nimal.

x Statius.
l. 2. Syl.

Athen. Di-
gnos. l. 3.

y Aldr. l. 13.
Ornit. c. 16

z l. 2. Na-
vig. Orien-
tal. c. 8.

a Castrod.
var. l. 2.

b Aetius
l. 13.

c Aelian. l.
4. de Ani-
mal. c. 13.

d Arist. l. 2.
Probl. 39.

c *Ælian. l. 1.* dam uti; vulnere ori animum, *e* man-
5. de Anim. sum imponere; laurifoliis *f* annum
c. 46. fastidium purgare; arundinis lectâ, &
f *Plin. in* seu comesta, seu in nidum imposita
H. N. comâ, oculorum fascinationem *g* a-
g *Ælian. l. 1.* vertere, adductorum Authorum fide
1. de Anim. refertur.
c. 35.

h *Idem l. 1.* *Vfus* Cirrhæarum in cibo nullus *b*
4. c. 13. aliis enim vescuntur, nostrates lau-
Vfus. dem apud omnes, Martialem si exci-
 pias, meruerunt, sunt qui pullos veteri-
 bus alas reliquis partibus preferunt.
 Fuere & exta & ova in usu. Helioga-
 balus & Palatinis ingentes dapes iis
 refertas exhibuit. Sed nec *Medicina*
 illis destituitur. Caro Elephantiacis,
k *Cardan.* lue venerea *k* affectis, fluxu alvi *†*
in Cōment. laborantibus prodest. Medulla & ce-
in Aphorif. rebrum cum vino, ictericis; ventricu-
† Hippocr. lus *l* ex vino nigro iliacis; jecur ari-
l. 3. de dicta dum comitiali morbo laborantib. san-
l. Plin. H. N. guis *m* suffusioni oculorum. fel *n* in
30. c. 6. heberudine visus, & albuginibus cum
m *Idem l. 1.* mellé commistum; pennæ combustæ
16. c. 18. ad uteri strangulatum; ova ad *o* lactis
n *Galen. l. 1.* copiam, facere creduntur.
10. de sim-
plicib.

Dioscorid.
l. 2. c. 72.
o *Plin. l. 1.*
30. c. 14.

ARTICULUS X.

De Perdicibus in specie.

PUNCTUM I.

De Perdice Græca Bellonii;
 Perdice ruffa. Cinerea &
 Damascena.

PERDIX GRÆCA crassa quoq;
1 *Bellon. l. 1.* & *Corurnus* ex descriptione *a* Bel-
5. c. 13. lonii dicitur. Nostratibus duplo cras-
 sior est; *rostro* pedibusq; rubris, maculis
 ad anteriorem ventriculi partem
 eisdem quibus rostra resperfa, medio-
 cris Gallinæ magnitudine. Frequens
 est in rupibus Colmenibus, insulis
 Cycladibus & Crææ maritimis. *Vox*
 nostrarum voce major, coitus in pri-
 mis & partus tempore. *Nidificant* sub
 dio mense Majo. Ova edunt sub ali-
 quo magno lapide octodecim, quan-
 doque sedecim, ovis Gallinæ similia,
 minora, alba, maculis subrubris exi-
 guis resperfa, usui peridonea, sed quo-
 rum vitellus non congelatur.

PERDIX RUFFA sive major, co-
 lumbam exprimit, rostrum habet Cocci
 colore, pedes minus rubent. Color
 cinereus per dorsum, pectus & caput
 decurrit. Oculorum palpebræ in mar-
 ginibus rubent; ab iis linea nigra re-
 trò per collum tendit, inde reflexa per
 pectoris partem supremam sæpè cir-
 culum facit: quod intra eam est al-
 bicat.

PERDIX CINEREA, seu minor,
 Græcis ignota, ex descriptione Ge-
 sneri, coloris est varii, nec descriptu
 facilis. Rostrum subfuscum. Caput è
 ruffo fuscum; synciput, partes circa oc-
 culos, proram capitis simpliciter ruf-
 fa: collum & pectus cinerea, exiguis
 maculis nigris quasi per versus, crispis
 & undantes, interstincta: Dorsum,
 caudam & alas varios colores præ se
 ferenda, crura ex fusco albicantia. Gre-
 gatim volat, vere verò bimatum.

Perdix quæ sub *DAMASCENÆ*
 nomine Aldrovando transmissa est,
 brevitate & crassitie corporis ad *Per-*
dices accedit, minor tamen est, rostrum
 habet prolixius; pedes quodammodo
 luteos. Nectamen *†* *Æliani Syro-†* *Ælian.*
perdix est, etsi magnitudo respōdeat, *H. A. l. 16.*
 Nec enim est nigra, neq; rostrum ha-
 bet ruffum, imò illa mansuescit, cum
 hæc semper in feritate perseveret.

PUNCTUM II.


De Perdice alba, seu de
 Lagopode.

PERDIX ALBA, *Lagopus* à pedibus le-
 porinis & villosis; *a* *Aristoteli*, qui *a* *H. A. l. 3.*
 nullum animal præter unum leporem *c. 12.*
 pedes villosos habere scribit, incogni-
 ta; *Hesychio* & *Phavorino* *λαγώπης.* *b* *b* *l. 2. ser-*
Horatio *Lagois*, nisi forte piscem Ro-
monæ Sa-
tyra. 2.
 prætes volunt, intelligat; aliis *c* *Per-*
c *Aldrov. l. 13.*
Ornith.
c. 21.
Genera.
d *Plin. H. N. l. 10.*
48.
Scalig. Ex-
ercit. 59.
c *Aldr. l. 6.*
 rubent: collum maculis quibusdam
 nigri-

Perdix cinerea.
grau Rebhun




Perdix rufa.



Lagopus. Schneehuhn
Steinhuhn




Perdix Damascena.



Coturnix mar.



Lagopus alpestra



Hortulanus mar.
Brachamsel



Ortygornis
wachtel König



Hortulanus Conger



Hortulanus famina



nigricantibus perspergitur, & radices pennarum nigrescunt.

Alterum nomine eodem à coturnicibus magnitudine tantum differens croceo tinctu; quod Aldrovandus Perdicem Bellonij Damascenam, seu Syroperdicem esse credit. Dorsi & colli colore Gallinaginem æmulator. Alæ quæ corpori junguntur, albas, fuscas & fulvas pennas habent; decem remiges cineræ sunt; pars interior & venter alben, & torquem in pectore rubro, fulvo, flavoque coloribus constantem habent.

f Gesner. in Ornith. Describit & *f Gesnerus* aliud, quod per ætatem fulvescere, & ne per hyemem quidem albescere dicitur.

Locus. *Reperiuntur* Lagopodes in *g* Alpibus, & Pyrenæis *h* montibus inque summis jugis imminentibus ei valli cui nomen Arbusti, quæ fauces aperiunt iter. Ita verò frigore, nive, & glacie delectantur, ut ubi locis inferioribus liquantur nives, altiora & soli averfa prosequantur loca, in quibus nix perennat.

Vox. Vocem edebat, quam Gesnerus describit, cervinæ non dissimilem.

Ingeniū. *Naturam* si spectes, non extra *i* terram, in qua nascuntur, ijs vesci facile; quando nec vivæ mansuescunt, & corpus occisarum statim marcescat. Latent quidem homine conspecto; eoque dissimulato sese motu prodere cavet; tanta iis fallendi similitudine nivis fiducia; sed tantæ etiam simplicitatis sunt, ut à venatoribus *k* dispositam lapidum seriem transire non audeant, sed secundum illam, quasi secus murum insuperabilem decurrentes in decipulas incidunt.

Vsus. *Vsus* earum & in cibis est. Præcipuo sapore esse Plinius dicit. Saluberrimas teste *l* Scaligero Norici credunt gustu; subamaras Gesnerus reliquit.

NB. *Perdices Indicas* vide in *Mantissa*. Num. 8.

ARTICULUS XI.

De Coturnice Latinorum.

Genera. *Coturnix* Græcis antiquis *ὀρνις*, modernis *ὀρνις* & *ὀρνις*, Villa-

vano. Quisquila, Gasio Quaquila dicitur. Unum duntaxat ipsarum observatum *genus*. Vifa tamen & Alba, si à Aristoteli credimus, & in campis *a Arist. l. de colorib.* *b* Russicis & Podolicis virentibus pedibus, quarum usus spasmus inducat, inveniuntur. Notæ quas suis veteres tribuunt, & in nostris reperiuntur. Parvæ *c* sunt; pedes *d* fissos, & pinnas *e* duras habet. Theophrasto fortè Perdices nanæ dicuntur. *Mas* & *Fæmina* distinguuntur, quod *Fæmina* totus color quodammodo testaceus superius ad cervicem, dorsum; caudam & alas, ad metum & pectus subluteus; ad ventrem ferè albus. A rostro ejus supra oculos & aures linea insignis longitudinis alba, circulares aliquot maculas habens excurrit. Cauda proportionem major est. In Mare rostrum magis nigricat. Supra illud capilli quidam extant. Collum lineolis albis intercurrentibus rufescit. Pedes minus lutescunt; digiti verò eorum ita constituti sunt, ut mediis primò & tertio longè major sit, posterior quem pro calce habet, longè exiguus. In *internis partibus* singulare quid obtinent. *Ossa* ipsi dura & solida. *f* *Ingluvies* & gula propè ventriculum ampla & lata. *Cor g* *τρυβλον*, seu muricis modò in tres cuspidem divisum. *Iecur* & fellis conceptaculum intestinis agglutinata. *Fellis* ad intestina labentis canalem vix aspectabilem. *Testes* jecori subditos.

Quantum ad Locum Averrhoës in Andalusia, teste *h* Galeoto Martio *h l. de promiscua doctrina.* reperiri negat, in mediterraneis Galliarum tractibus sunt raræ. In Delo, *i* unde nomē Ortygiæ sortita est; ad sinum *k* Arabicum, in superiore Aethyopia, Terra sancta, Madera, Capreis magna ipsarum copia, ad Tænaron, quæ nunc *l* Cerempolis tanta, ut hodiè Porto de *l* *Procop. l. 13. de bello Vandalico.*

Qualeis nominetur. In agum Neopolitanum tanto numero ex Africa propelluntur, ut glomeratim sæpè in ædes maritimas incidunt, & sine ulla difficultate capiuntur. Migratorias esse aves, omnes, Albertū si excipias, concedunt. Adveniendi habent tempora ætate depulsa. Cum maria trahant, impetus differunt, & metu spicii longioris vires suas nutriunt tarditate.

tate. Ubi terram perferunt, co-
cunt catervatim, deinde globatæ ve-
hementius properant, quæ festinatio
m Polyhist. c. 18. (sunt verba *m* Solini *n* & Plinij) ple-
n H. N. l. 10 c. 23. rumq; exitium portat navigantibus.
Accidit enim plerumq; noctibus, ut
vela incidant, & præponderatis fini-
bus alveos invertat. Austro nunquam
exeunt, nam metuent vim flatus tu-
midioris. Plurimum se Aquilonibus
credunt, ut corpora pinguiuscula atq;
cò tarda facilius provehat, sicciòr &
vehementior spiritus. Ortygometra
dicitur quæ gregem ducit. Eandem
terræ proximantem speculatus Acci-
piter rapit, ac propterea opera est u-
niversis, ut sollicitent ducē generis ex-
terni, per quem frustrentur prima di-
scrimina. Quod de tempore dixit er-
ratum est, nisi de terris tepidioribus
estate apud eos depulsa intelligantur:
quod de continuo volatu cum malis
& velis infedisse observavit *o* Bello-
nius, in Delum sæpissimè delatas alij;
in Ponticis insulis requiescendi causa
paucos dies morari *p* Varro; falsum,
quod de navigantium exitio vix cre-
dibile, ne tantam simul abire multi-
tudinem verisimile, cum nonnullo
corporis pondere & vento apto desti-
tutæ, in locis apricis & tepidioribus
remaneant. Austro nunquam exire
f Bellon. l. 5. de Avib. c. 17. falsum. Cum & *r* Bellonius à Septen-
trione in meridiem tendentes, cum è
Rhodo Alexandriam Ægypti navi-
garet, observavit; & Aristoteles Au-
stro tanquam humido & gravi mole-
stè volare prodiderit. Sec nec de Du-
cibus inter authores convenit. Aristote-
les *s* hæc loca adeuntes, sine Ducibus
pergere; abeuntes. Lingulacam,
Otum, Ortygometræ, & Cynchra-
mum Duces habere; ab hac noctu et-
iam revocari, scribit. Plinius id *t* ad
ventum transfert, & de Ducibus ita.
Glottidem seu Lingulacam initio blā-
blandita peregrinatione avidè profe-
ctam, pœnitentia in volatu cum labo-
re scilicet subit. Reverti incomitatam
piger, & sequi, nec unquam plus uno
die pergit. In proximo hospitio defe-
rit. Verum invenitur alia anno inter-
cedente relicta: simili modo in singu-
los dies. Cynchramus perseveran-

tior festinat etiam pervenire ad expe-
titas terras.

Victitant granis milij, tritici, & alia-
rum frugum. In Capreis insulis Acinis
herbarum; apud *n* Holandos Bryo-
nia, secundum Portam malo Punico.
femine cannabis, lolio, & tritico sagi-
nantur, sed & Hellebori semen *x* per-
inde ipsi cibis, ac sturno cicuta, quæ
hominib. venena esse creduntur; (id-
eò Plinius *y* veneni semen dixit) seu
recuperandæ sanitatis causa, cum
pilepsia tentantur, quod Aquæ placent,
seu peculiari quadam naturæ suæ præ-
rogativa, concoctio enim non vi dun-
taxat caloris, sed tota ventriculi sub-
stantia perficitur; seu, quòd, cum per-
tenuis habeant ad corda penetrantes
meatus, antea devoratam cicutā con-
coquant, quam inde lethale gelu, ad
præcordia pervenerit, ut Divus Basi-
lius genset. Aquam simul ac bibere,
turbant, seu quòd tali delectetur, seu
quod singularem cum Camelis & E-
lephantis, quibus idem solenne, ami-
citiam gerant.

Salacitas ipsis quæ *z* Perdicibus, Genera-
sæpius coitum repetunt, & humi ni-
dulantur. Sunt qui quotannis quater
prolem edere velint; bis in his quas pe-
tunt, bis in his ad quas revertuntur
regionibus. Utur sit, quo loco parit
non incubant, ne quis locum longio-
ris temporis morâ percipiat. Sed cim-
ova cornicis similia, si, Bartholomæo
Anglico credendum, excludunt; ex
his pulli fœminæ, rursus ad decem me-
se Augusto pariunt. Unde non mirum
tantam Coturnicum copiam, & mense
Majo incubanti insidiantem, sp̄ cen-
tum & amplius perdere.

Volatus sunt modici, Austro præfer-
tim flante, cujus humiditas corporis
gravitatem auget, sed defectum cursu
compensavit natura, hinc Comestori
Currelij dicuntur.

Vocem mari Aristoteles ademit, exi-
lem Albertus credit fœminæ crassam.
Mensis Aprilis initio canere incipiunt;
num subito cum ad nos venerint, du-
bium. Vox nemini nota non est, & id-
eò apud Athenæum Pratinæ placuit,
ut *αδύφωνον* dixerit. Sapientes olim
prognomone utebatur, quod verum
cantu

Victus.

u Junius in Novædalib.

x Lucret. l.

4. de natu-

ra rerum.

Arist. l. l. de

plantis.

Galen. ad

Pison.

Aphrodis.

in præmio

Problem.

Ambr. l. 3.

Hex. c. 9.

y Plin. l. 10.

H. N. c. 23.

c. 72.

Solin. Po-

lyhist. c. 18.

tio.

z Arist. H.

A. l. 9. c. 8.

Athen. l. 9.

Volatus.

Vox.

tantu suo horoscopi emersum signare crediderint; cum in eo certum numerum seruet.

Pugnacitas quæ avibus † duræ pen-
næ communis, in istis adianthi usu *b*
accenditur, & occasionem, ut *c* Ari-
stophanes Garcini Poëtæ filios, *εργα*
διονομεύς dixerit, & pugnax *εργα* *ψυχ*
εργ dicatur, dedit, satis olim Athenis
& alibi nota fuit, ubi ad cerramen tan-
quam ad gladiatores ludos effusissimè
conveniebatur, & Solon pugnantis
spectandis tempus impendere jube-
bat. Nec ignota Neapolitanis hodiè,
aliquoties victrix, duodecim sæpè au-
reis venditur. Augustus quoq; tanti
fecit, ut Erotem Ægypti Præfectum,
quod victricem per contumeliam e-
disset, morte infami multaverit, & A-

reopagitæ *d* puerum, quod Coturni-
cibus quas comprehendere posset, o-
culos erueret, damnaverint. *Antipa-*
thia ipsius cum *e* Pelicano, sed & cum
Luna & Sole exorientibus, si Oro cre-
dimus. His visis terram fodiant, pu-
pillasq; identidem conscribillant.

Epilepsia eas laborare, experientia
comprobavit, sed solas præter homi-
nem quod *f* Plinius prodit, falsum,
cum *g* Hippocrates, capras & oves,
Scaliger *h* canes, Rhodiginus *i* fe-
les & arietem, Absyrus Equos, Bro-
dæus Accipitres & Graculos, eodem
morbo vexari scribant. Quæ de
Ingenio ipsarum Oppianus *k* & *l* Pli-
nius, nempe adverso statu pondu-
sculis lapidum appensis aut gutture
arenâ repleto stabilitas volare, & cum
mare transvolant, singulas ternos ore
lapillos ferre, singulos per intervalla
dimittere, sic utrum mare tranarint
observare, produnt; *περτωδὴν καὶ πύκτως*
πύκτως esse videntur. Bellonius in naves
lapsas aperuit, & milium duntaxat re-
perit, lapidum non obliturus, si ali-
quos invenisset.

Vfus Coturnicum olim *in cibis* apud
quosdam nullus, *m* quod veratro ve-
scantur, & comitiali morbo laborent.
Galenus *n* quosdam, qui edissent, in
Doride, Bœotia, & Thessalia muscu-
lorum distictionibus correptos obser-
varit. Nos nihil tale sentimus, ut nec
ex capris vel avib. quicquam, ex mo-

dico esu assarum inprimis optimum
pollicetur sanguineq; Aldrovandus,
ex immodico, pinguiorum inprimis,
putredinalem febrem minatur. *Vsum*
in Medicinali requiras, *o* cerebrum ex
unguento myrteo tritum, & stanneo
vase repositum, Epileptico paroxy-
simo medetur, si faciem eo illeveris.
Adeps cum pauco helleboro mēbro
pudendi inunctus, venerem auget,
cum melle, myrrha, & chalcanto albo
oculorum vitia corrigit. Cum Zingi-
bere tritus, Equorum oculos incolu-
mes servat. Caro inveterata porco-
rum & piscium escæ immiscetur.

NB. *Coturnicis genus exoticum vi-*
de in Mantissa. N. 7.

ARTICULUS XII.

De Ortygometra.

DE Ortygometra quam Plinius & *a* Plin. *10*
Gaza Matricem, Villanovanus
Ethigometram, Scaliger *b* Coturni- *b* *in Com-*
comatrem, & verius vocat; vi *c*, quid *ment ad l.*
certi dicendum sit, habemus. De for- *8. Arist. de*
ma nihil ferè ab Antiquis traditū est, *H. A. c. 15.*
Aristotelem *c* si excipias, qui palustri- *c* *l. 8. H. A.*
bus avibus facie similem esse reliquit. *c. 12.*
Sed nec ex Recentioribus quicquam
certi colliges. *d* Scaliger non ablimi- *d* *loco ci-*
lem gallinaginis, magnitudine parem, *tato.*
colore tamen dilutiore, facie totâ co-
turnicis, esse, & ab aucupibus matrem
Qualearum, ab aliis Rascle dici, scri-
puit. Bellonius duplicem *e* ponit. *V-* *e* *l. 4. de*
nam quam Rascle quoq; nuncupat. *Al-* *Avib. c. 19.*
teram quam in genistis degere affir-
mat, magnitudine Ortygometræ ni-
græ, quam falsò Rallum nominat, co-
lore præcipuè ruffo, in alarum costis
subrubente, in femoribus castaneo,
maculis albis interstincto; capite per-
dici cinereæ simili. Aldrovandus, qui
aquaticarum hanc ferè speciem esse
putat, ut crura habeant oblonga, di-
gitum qui pro calce est per brevè, cor-
pus gracile, plumas plærunque varias,
ventrem albicantem, caudam bre-
vem, rostrum longiusculum modicè
flexum, avem, quam à Cardinali Pa-
leotto acceperat, quæq; rostrum co-
turnice majus, caput, collū, dorsum,
& ma-

& majorem alarum partem testacei coloris, alas qua ventrem contingebant rufescentes; crura pedesq; pro corporis portione longos, colore inter croceum & viridem medio, obtinebat, pro *Ortygometra* posuit.

ARTICULUS XIII.

De Cynchrano.

Cynchramus Hefychio Cynchra-
 mas, a Aristoteli Cychramus, a
 A. l. 8. c. 12. lijs Cenchramus quoq; dicitur. Quā-
 nam sit avis inter graviores non con-
 venit, etsi ferè certū est, nec linariam
 miliariam esse, ut Ruellio placet, & in
 frequentibus parebit, nec ex cenchriti-
 sis avibus milio quidem pinguescen-
 tibus sed aquaticis, & ex Anserum ge-
 nere: nec Cenchrin, à varietate pun-
 ctorum milij instar dictum, ex Acci-
 pitrum familia. Gesnerus *b* Helvetiis
Brachvogel dictam, ferè esse putat,
 quæ cruribus est proceris, rostro ob-
 longo, eodemq; modicè inflexo, quæ
 autumnò avolat, & tempore verno
 cum coturnicibus redit, & palustribus
 delectatur. Bellonio *c* est Gallorum
 le Prujer aut Preyer, quæ alaudâ cr-
 istatâ est major. *Rostrum* habet breve,
 crassum, tuberculo conspicuum, ad
 instar ossis durum, inferius cum supe-
 riore junctum, foveam in medio
 efformans, *ventrem* pallidum & nigris
 quibusdam maculis distinctum. *Crura*
 pedesq; inter rubrum & castaneum
 media, posticum *digitum* longum, *Ver-*
satur in pratis, hordeo, & milio *delecta-*
tur, nidos in agris avena & milio con-
 fitis exstruit, & sex pullos excludit,

Vox. *Vox ipsi Tirtertirteriz.*

Volatus. Cum *volat* crura contra aliarum avium morem pendere finit.

d Aldrov. Ornith. l. 13. c. 24. Aldrovandus d Hortulanum omni-
nò esse credit, avem alaude magnitu-
dine, at paulò minorem, cui *rostrum*,
crura tota, pedumq; *digiti* rubescunt.
Caput, *collum* & *pectus* in mare inter-
currentibus punctis croceis, flavi, in
fœmina partim flavi, partim viridis
sunt coloris, alarum pennæ inter co-
stales in utroque sexu, flavo & nigro
colore tinguntur, mas sub oculis ad
latera maculam habet rotundam, in-

tensè luteam, quæ in foemina non est.

Reperitur in agro Bononiensi & Florentino, ex milij esu vehementer pinguescit, & magno numero depilata, & scatulis asservata, Romam, transmittitur, ibidemq; caro pretio venditur, sunt verò & alia Hortulanorum genera, Flavus nēpè colore propemodum paleari, alarum costis & remigū pennarum extremitatibus albis. Albus cygno ipso ferè candidior, & Hortulano congener. Caput ipsi ex cinereo ad flavum vergit, collum cinereum nigris maculis punctatim distinguitur. Venter, crura, pedesq; crocea sunt. Cauda tota fusca ad latera latescens.

Albicilla cujus cauda alba, cætera
vulgaribus Hortulanis similia, color
duntaxat in omnibus pallidior.

CAPUT II.

De Avibus pulveratricibus domesticis.

ARTICVLVS I.

De Gallo Gallinaceo:

Gallus Gallinaceus, Gr. ὄρνις ἀλεκτρυ-
ων, ἀλεκτωρ, βρητὸς, κίτρις, θεοκοβοῦς ὀρ-
νις, κέρυθιν, κόπτις, κροκίας, κοπίνας μη-
δικὸς, δολῶφιν, ὀρθοβοῦς, ὀρθαίλιχ, πέρσπος
ὄρνις, σέρκ, τέλκ, ὠιδ ὄρνις, Latinis
cohortalis avis, lucis, criitati oris, &c.
dicitur. Gallinam ἀλεκτρυῶναν, ἀλεκτόρι-
δα, κίκκαν, ὀρθαλίδα, Cortisavem, Myla-
gridam, appellavere. Νέοσσι, νίκεσθες, ἴπ-
ποι, νεοπίδες ὀρθαλαχοί, pullorum sunt
nomina.

Differentiæ ipsarum sunt variæ, quæ *Genera*.
à *locis*, *voce*, *integumento*, *partu* & *incubatione* sumuntur. *Hadrianarum* Gallinarum *Aristoteles* *a* mentionem facit, quæ pennæ *versicoloris*, quotidie pariunt, sed pullos interimunt; quas *b Athenienses* alere studebant, quæq; *b Athen.* vel. sunt eadem cum *nanis*, & *pumi-* *Dipnoi*. *l. 7.*
lionibus seu *c Plinij*, quibus certa *cœ-* *c l. 10. c. 53.*
cunditas rara, & *incubatio* ovis *noxia*, & *56.*
seu *Columellæ*, *d* quæ etſi vetuſtæ *dColumellæ*
propter *infœcunditatem* improban- *la de reru-*
tur, pluribus tamen *locis* *fœcundæ* re- *ſtica l.*
periuntur, & ova plurima edunt, vel
cū *Longolij* *Parturientibus*. seu *Leyhen-*
nen,

hen, quas versicolores, & rostro longiusculo facit. Pumilas enim, quæ pal-
sim extant; & claudicando potius,
quàm incedendo per terram reptant,
nemo istis accensuerit. Sunt & Tana-
grææ, Lydæ, Rhodiæ, Chalcidice, Me-
dicæ, & Alexandrinæ. Ex Tanagris
Galli imprimis probabatur; alij *μαχίνοι*
seu pugnaces dicti; alij Cossiphi & Me-
rula dicti, qui Lydas & magnitudine
æquabant; Corvis colore similes; pa-
leariam & cristam instar anemonæ,
nec non candida & exigua in rostro
supremo & caudæ extremitate signa
habebant. Cum omnes à prælijs f
commendentur, & amplitudine pa-
res sint, & facile ejusdem generis esse
suspiceris, fortè & cum Longobardi-
cis, qui pedibus usq; sublatis incedunt,
plumis ex auro fulvis teguntur, eos-
dem. Patavinæ Hermolaus, & Lon-
golius dixerunt; sed quia cauda destitu-
tur, quod veteres in suis non reticui-
sent, vix est credibile. Sunt & in regno
Senegæ, Gallinæ Pharaonis dictæ: in
regno Tarnassari nostris triplo ma-
iores. In Jamaica insula h Pavonib; nec
magnitudine, nec sapore cedunt.
Reperitur & propè Thessalonicum
genus quoddam Gallinæcorū per-
petuò mutum nunquam familiari his
alitibus cantu vocale. Nonnullæ quo-
que sunt *Lanigeræ*: ut in quadam Ori-
entis urbe, & nivei coloris, in regno Man-
gipilis more felis nigris vestiuntur. De
reliquis suis locis agemus.

Forma. Quantum ad *Formam*, Gallum gal-
linæcum Alucone scilicet majore *mi*
norem prodidit k Aristoteles. Soli fi-
dipedium altitium colores diversi sunt;
& nitorem hunc si attendas; majori
speciositate quàm † Cræsus vestiun-
tur. l Spectatissimum insigne ipsis;
corporeum ferratum, nec carnem id
esse, nec cartilaginem, nec callum ju-
re dixerimus, verū peculiare. Cristam
Latini *φρυνος*: ὄφον; *κρυβασιάν* vel *κρυβασίαν*,
κορυφὴν, & *λοιφίον* Græci, dixerunt. Semper
est exerta & rubens dum integra sani-
tate fruitur, & mirum de ea: Herber-
steinus. m Cum cuidam in Mosco-
via frigore jam ferè enecto, abscissa
fuisset, sibi restitutum, erecto statim
collo cantasse. Plicabilem Gallinæ

obtinuere, & per medium caput de-
orsum dependentem. *Oculos* omnes
habent splendidos, salacitatis indicium.
Paleæ (Aristoteles *καλαρίον* ob pur-
pureum floridumq; colorem vocat) ex
rutilo albicantes, sub mento & collo,
velut incanæ barbæ dependeant. Ro-
strum robustum, in superiori parte ad-
uncum, coloris plarumq; cornei visi-
tur. Caro quæ rostrum undiq; cingit,
nonnullis mentum, Columellæ gena
est. *Iubæ* (sic longiores cæteris plumas
Columella dixit) collum & cervicem
undiq; ambiunt. Vel pectus vel pars
ventris posterior *Navis*, à qua pullum
aperiri jubet n Apicius, vocatur. *Cau-* n. l. 6. c. ult.
da, quàm ὄρεον Helychius vocat, ma-
ribus major, quàm fœminæ, binæ lon-
gissimæ incurvi arcus imaginem pro-
pter tenebritudinem præseferentes, in
fœminis sunt; quæ capis saginandis sub
cauda evelluntur; pinguefactorias
Germani dicunt. *Calcaribus* quæ *πλά-*
κτες, & *κέντρα*, armantur inares; inque iis
in magnam quandoq; molem excre-
scunt, sed & gallinæ cum mares vice-
rint, cucuriunt, crista etiam caudaque
erigitur, ita ut difficile sit, an sint fœ-
minæ, cognoscere, nonnunquam cal-
caria parva, errore ne naturæ an opere
ignoro, ijs enascuntur. Plinius o Gal- o Plin. H.
linas probat imparib; digitis, aliquan- N. l. 10.
do & super quatuor transverso unio, c. 56.
Columella quinq; ita tamen ne cru-
ribus emineant trāsversa calcaria, sed
hæc ad Oeconomiam spectant. *Inter-*
narum partium ista est ratio. p *Ossa* ha- p Gælen. l.
bent consistentiam laxam, cavam & i. l. de usu
levem. *Ingluvies*, quæ *πρόλοφος* & *φωρα* partium.
ventriculo q præposita est. Appendi- q Aristor.
ces habet intra, quæ desinunt intesti- H. A. l. 3. c.
na, ut verè ultra ventriculum esse r ult.
Plinius scripserit. Pellicula intra ven- r Plin. H.
triculum stercorei destinata, Echinus, N. l. ii. c. 37
ab aspredine dicitur; Dioscorides *κοι-*
λίαν vocavit. *Tesses* gallinæcis sunt sub
jecore, fœminæ supra caudam. Ute-
rus ex descriptione M. Antonij Ulmi
duplex habet foramen. Infernum per
quod ovum ad externa respiciens jam
perfectum egreditur; supernum & in-
ternum per quod sub septo transverso
inchoatum, ad formam perfectam su-
scipiendam ingreditur. Totus in parte

sinistra ad spinam situs est, dextram abdominis & centrum, intestina obtinēt. Exitum ipsi in superna ad spinam desinente parte dedit natura, quia animalia supergressu coeuntia, instrumenta in proximo habere oportebat, in inferiore podicis ad ventrē positus, quia infra illius est officium. Uterque tam proximē cute, quod præputium dixeris, & musculo, sphaericæ figuræ, ut extensioni magis accomodi essent, obteguntur, ut arctissimè connivētia, sensim ipsū aliquando fallere possent. Uteri substantia membranæ & crassa est, figura concava, trium digitorum longitudine, qua ad exitum pertinet latior. Porrigitur ab infimo abdomine, juxta ipsorum intestinorum exitū, ad locum conceptionis ovorum sub septo transverso, estque cum extenditur longitudine dodrantali, cujus longitudinis ratione, membranam obtinuit à spina dorsi proportionalem omnino ac persimilem intestinorum mesenterio, quam & venæ frequentes percurrunt, cum ad nutritionem ipsius uteris tum ad ovi intrinsecus contenti, dum pertransit à loco sub septo transverso, ad ipsius uteri exitum, alitionem. Membrana autem (verba sunt Vlmi) spinæ colligans, eadem prorsus existit ipsi mesenterio intestinorum, quin imò eadem est & substantiā, & origine: quapropter consensum habet uterus cum ipsis intestinis. Figura uteri inæqualis, alibi angusta, oblonga, alibi lata, brevis, juxta hanc varietatem, varia quoque fortitudo nomina debet. Nam uteri latitudo infimo abdomini proxima, & in qua ovum jam absolutum continetur, estque ipsemet uterus, reliquum verò corpus angustum, oblongum, rotundum, quod ad septū transversum extenditur, vel *uteri stomachus*, vel *uterus productus* extensusve, vel *uteri gula*, nuncupari posset. Est autem membranæ & tenuis, admodum diversa à reliquo utero protenso, & à substantia ipsius uteri, qui ad exitum jacet. Nam finis hic membranæ subtilis & pellucidus existit, ac exanguis. *Intestinum* quoque *uteri*, ratione figuræ & quantitatis, cum longitudine rotunditatem cavernosam habeat, me-

ritò diceretur. Cui accedit membranæ occasio hanc uteri extensionem, vel productionem spinæ colligantis, quod *Mesenterium uterinum* appellamus. Intermedia pars uteri, quæ est illius portio ab utero propriè dicto, finem interjacens, crassam obtinet substantiam, albam, lacti similem, & in semetipsam confidentē, cujus mesereō multiplices venas habet. Hujus substantia cocta ovi albuminis gustu saporem exhibet.

De *Victu* non est quod multa dicamus. Præcepta faginandi ad Oeconomiā pertinent. Vis & ficubus impensè, sed infelicitè vescuntur. Steriles enim evadunt, & pituitosi, si vel semen s cannabis apposueris, numero ovorum partu gaudebūt, si vel hordeum semicoctum, vel *Nasturtium* semen cum fursure & vino subactum, exhibueris; majora deponent, ad faginandum tum triticum cum aqua coctum, potui interdicto, tum Cytisus vehementer laudantur.

Quantum ad *Generationem*, & quæ *Generatiō* ei adhærent. *Sexus* in hac ave manifestis signis distinxit, & mas erectā cristā, iubā, à cervice per collum dependente, cauda majore, & insigni ad præliandum calcari superbit. *Salacitatis* verò sunt inexhaustæ. Nam etsi peculiare ipsis coeundi tempus, vernum esse, unde majores fortè tum testes, Aristoteles innuere videatur, & ad unum ovum fecundandum multoties cum eadē gallina gallus coeat, quin & quidam effœminati à primo ortu nascuntur, ut nec cucuriant, neque fecundas ineant, & Theophrastus a gressus cortalibus ad venerem procliviores dicat: certum tamen simul, singulis diebus quinquagesies & amplius uxores suas Gallum inire, si eas mori contingat, mœrore animi interdum contabescere, si illæ desint, ne à masculino quidem genere sibi temperare, unde lege a vivicomburio damnabatur, aliās non sui generis volucres, Phasianos nempe & Perdices aggredi, & semen b ad Gallinarum & conspectum & vocem emittere. Quin nunquam c qui in æde Herculis placebantur ad Gallinas, quæ in Hebes inter-

Victus.

Mathioli
in Dioscor.
lib. 3. c. 148.Oppian.
in Ixentinas
c. 49.Arist. l. 9.
c. 49.
y apud Athen. l. 9.Æl. l. 4.
Plut. in l. nū brutarum
ratione utantur.
b Athen. l. 9. Dipnos.
c Ælian. l. 7. c. 46.

interfluente utramq; ædem rivo perenni, transvolabant, nisi cum libidinis vexabantur stimulis. Non æquè tamen salaces omnes, lacertosi, rubenti, erectaq; cristâ; rostro, brevî, pleno, acuto, oculis ravis aut nigris, paleâ rubrâ, collo vario, fœminibus pilosis, ungibus longis, cauda magna, frequentibus pinnis, profusissimi in Venerem esse creduntur. *Coitus* tempus mari, statim ac à cubili surgit, fœminæ, progresso jam die, superveniente illo, cōsidet ista humi. à coitu *d* inhorrescit, sæpè festuca aliquâ se lustrat, & vapore per libidinem excitato membra extendentes, sese excutit. *De partu* & ovine hoc caput nimia mole legentes perturbet, in sequentibus separatim dicemus. *Animales actiones* quod spectat, quia Gallinæ unico oculo sursum elevato, rapaces aves observant, *Visu*, quia aridissimum quodq; modò id ore recipere queant, illicò dijudicant, *e* gustu pollere videntur.

Vox Gallinæ mutabilis. Circa partum *κωνναζες* seu singultit, dum incubat, glocit seu glocitat. Cum iniri debet, mancā & exilem vocē format, in genere gracillare & pipare dicitur. Cantus, pro malo omine accipitur, & inter obstetricum numeratur observata, Galli propè Theſſalonicā nullā habent, apud nos graviolem, sed verè *ἀπὸ δὸν*, quinec choro, nec fidibus concordat, *ἀδεν* & cucurrire solent. Vigiles hos nocturnos excitandis in opera mortalibus, *f* rumpendoq; somno natura genuit. Norunt sydera, & ternas distinguunt horas interdum cantu, cum sole eunt cubitum, quartaq; castrensi vigilia ad curas, laborēq; revocāt, nec solis ortum incautis obrepere, diemq; venientem nunciant cantu, ipsum verò cantum plausu lauterum, hinc *ῥιπέροφων*, & lucis prænūcius dicitur, & veteres gnomonibus horarijs destituti, noctis deliquium & diei accessum eo metiri solebant. Matutinum cantum, quidam alimentidulcedinerio, (avidè animal calidissimum nutritur:) alij salacitati (initurus cucurrire incipit) nonnulli auræ mutationibus, quæ ex solis contingunt motibus, multum cum & satur, & à coitu ca-

nat, occultæ cum sole amicitia vendicant. Qui profunda nocte validius, manè remissius cantare putant, cantum vento ferri, ventum noctum magis quam sub crepusculū spirare, sic galilum longius audire, opinantur. Muti evadunt, si vel circulum è sarmentis *e* g *Plin. II. N. l. 29. c. 4.* callo addideris, vel caput & frontem oleo inunxeris, si Plinio & Alberto credendum.

Singularem ijs inesse *Fastum* tum inde colligi potest, quod imperitant *b* h *Plin. H. N. l. 6. c. 21.* suo generi, & regnum in quacunque domo sunt exercēt: tum quòd nullam *i* ineundi sui absq; atrocissimo certamine copiam faciant, tum quòd ædes † ingressuri, sese, nescilicet cristā uspiam offendatur, inclinant. † *Ælian. de Animal. l. 4. c. 29.*

Pugnacitas nulli est ignota. Ejus spectaculum, quo Miltiades Græcos in Persas felicissimo successu animavit, Socrates Iphicrati Duci animos adjecit, Themistocles exercitum contra Persas ducens instituit, Pergameni quotannis celebrare. Eo Tarnassari Indiæ populi, Ambivariti, *k* apud *k* *Becan. in Gortodadio in curia quotannis committuntur, nictis l. 7.* Galli, Angli, hoc tempore delectantur. Accendi, & *l* alio, unde *ἰονοπόδισ* *l* *Rhodie, μείροι, politricho, m* trichomane & a *Ant. Lect. diantho, forrè quod cristam n* Galli *l. 16. c. 13. m* *Plin. II. N. l. 22. c. 1. n* Porta in *phirognō,* quodammodo æmuletur, dicuntur, apud veteres stimulis ferris æneisque, quos plectra vocant armabantur, ut se facilius tutarentur in pugna. Nec hæccaret singulari artificio. Videre est ibi *v* intenta projectius capita, inflatas comas, vehementes ictus, cautissimas evitationes, & in omni motu animalium rationis expertium nihil non decorum. Si ex certamine *p* vi *p* *Plin. H. N. l. 10. c. 20.* ctorem reportavit, tum oculos e *N. l. 10. c. 20.* minentia, tum cervice crecta simul & cantus contentione insolenter effertur, & triumphantis similis est, verè *Ἀγεωγὶς* *ῥιπέροφων* Martis pullus.

Victus idcirco non canit; quod ex illa mala pugna spiritus, fracti vocem suppressunt. Cujus offensionis verecundia confusus, in primam quamque latebrā sese occultat. Ad *Sympathiam* & *Antipathiam*, quæ sequuntur, pertinent. Quod de Gallinis circa præ-*Affectus.*

d *Aristot. H. A. l. 5. c. 2.*

e *Scalig. Exer. 266*

Vox.

f *Plin. H. N. l. 10. c. 21.*

o *August. l. 1. de ordine Politian. Rusticis.*

o *August. l. 1. de ordine Politian. Rusticis.*

q Colmella
de R.R.

sepia q decidit, immistam pabulone-
cem bobus affert, Porphyriionem tan-
to amore Gallum prosequutum, ut
hoc occiso, ille inedia perire voluerit,

r Ælian.

H. A. l. 5.

c. 28.

Ælianus r oculus testis est. Apes
deficiente cibo gallinarum carnibus,
& uvis passis refocillantur. Leo Gal-
lum, & maximè album, ut Ambrosio

s Ambros.

Hex. l. 6.

Ælian. H.

A. l. 8. c. 28.

s placet, metuit, quem ex cantu à lon-
ge, ex crista propius agnoscit, seu ob
occultam quandam causam, nam à
leonibus & Pantheris homines non
attingi, qui jure Galli peruncti fue-
rint, maximè si ei allium admisceatur,

t Plin. Hist.

Nat. l. 29.

c. 4.

† Lucret. l.

4. de Natu-

rarer.

Plinius verè an falso prodit: seu
quod sint

--- Gallorum in corpore quadam

Semina quæ cum sint oculis immissa

Leonum

Pupillas interfodiunt, &c.

u Ælian.

de Animal.

l. 3. c. 31.

Basiliscum, cum cucurrientem audit
adeò tremere dicunt, ut emoriatur. Sic in
Cyrenensium arenis ab itinerā-
tibus abigitur. Vulpes una nocte qua-
draginta interdum & amplius aufert.
Voce mustellæ Gallinæ serò exani-
mantur. Superventum verò eorum, qui
serpentis vel canis rabidi morsu læsi
fuere, incubitus virantur. Eo tamen
die quo peperere, à serpentibus non læ-
duntur, & caro earum tum à serpenti-
bus morsu remedio est. Florem vitis
si comederint maturescentiū uvarum
esum abstinent. Ex Sambuco magis ca-
noram buccinam fieri pastor credit, si
ibi cædatur, ubi Gallorum cantum
frutex ille non exaudiat, seu quod in
locis sylvestribus, in quibus Gallorum
cantus non auditur, sicciora & soli-
diora ligna nascentur, ex talibus tibia
magis sonora tornetur, seu & ob aliam
causam. Nam ob streperam Galli vo-
cem, stridore suo fungosam sambuci
materiem convellere, vix verisimile
fuerit. Denique taxi baccis quidem

z Dioscor.

l. 4. c. 75.

impunè z vescuntur, sed sparti femi-
ne, & hominis qui helleborum bibit
excremento, ut Avicenna testatur,
intereunt, si cum incubant a tonue-
rit, ova pereunt, & semiformes pulli
interimuntur. Auro liquescenti si
Gallarum membra misceantur, cõ-
sumunt id in se, ita hoc venenum auri

a Arist. in

H. A.

Plinius in

H. N.

Columella.

de R.R.

est, falso scripsit b Plinius, & ab expe-
rientia c confutatur.

Morbi Gallis peculiare; Phtiriasis
& Pituita. Hac inter messis & d vin-

demix tempus, & cum ficus ac uva
immatura ad satietatem e permixta

est, laborant. Aqua in qua origanum

maduit, præservantur, restituntur sa-

nitati, si vel urina rostrum ablueris,

membrana qua tum lingua obducitur

leviter unguibus avulsa; vel scillam in

aqua maceratam cum farina exhibue-

ris. Aphthirias maximè dum incubant

infestantur, si arena littorali vel sapo-

nariorum elixivio relicto cinere cura

mulierum sese pulverent, liberantur.

Solent & cum abortu confictari, qui

ovi candido assato, cum uvis passis to-

stis æquo pondere tritis & ante alium

cibum exhibitis, præcavetur. Pulli fa-

cile Podagra tentantur, si sterus pe-

dibus eorum adhæreat: quanquam an

Galli quibus calor multus, cibi absti-

nentia non minor, f ea laborent, du-

bitetur. Capi sanè quibus pusillus

calor & edacitas multa familiaris est.

Quæ de Ingenio dici poterant supe-

rius sunt attacta, singulari familiam a-

more prosequi, & simul ac aliquid esce

naustus est, Gallinas & pullos ad ve-

scendum invitare, easdem cõtra Mil-

vos defendere, parientibus g fœminis

condolere, & mœrorem exili testari

voce, Luna exoriente h letari, & quod

summa admiratione dignum est, cum

sese sanguinis copia aggravari sentit,

unguib. sanguinem ex cristis prolice-

re, sic plethora levare, helixine se herba

purgare, adjecisse sufficiat.

Nec omittendum, Gallos si tempo-

re pluvix canant serenitatem, si noctu

citius, quam solent, aëris mutationem

& ventum, si paulo post solis occasum

vel à vespertinò crepusculo, insolètes

in raticionum cucurritum non sine a-

larum motu prorumpant, k tempe-

statem prædicere. Scilicet, Auster vò-

calia instrumenta replet, ea sarcina

dum se per motum exonerare volunt,

ad cantum insolito modo stimulantur.

Sed & Gallinæ, si vel manè exire recu-

sant, vel pediculos querant, & paludes

more Anatæ verberent, vel pe-

ctora rostro purgent, vel in arena ultra

foli-

b Plin. l.
29. c. 5.

H. N.

c Scaliger.

Exer. 88.

Morbi.

d Plin. H.

N. l. 20. c. 6.

e Columel.

la de re

rust.

f Scaliger.

Exer. 277.

g. 2.

Ingeniū.

g Porphy.

l. 3. p. 2.

h Ælian.

de Animal.

l. 4. c. 29.

i Plin. H. N.

l. 8. c. 27.

Præfagiū.

k Ælian.

de Animal.

l. 7. c. 7.

Aldro. Or-

nith. l. 14.

c. 1.

folitum sese concutiant, vel in principio pluviae locum opertum quærant, imminentes imbres maximos præfagire, creditum est. Tempestivè serendum esse moneat, si pennas, cum depulmantur, ut ante hyemem solent, à capite amittere cœperint; serotinè, si à posterioribus.

Vsus. *Vsus* harum avium in cibis frequens & ab omnibus laudatur, signatarum imprimis. Ideò hoc primum à antiquis cœnarum interdictis exceptum invenio jam lege C. Fannij, annis undecim ante tertium bellum Punicū, ne quid volucrum poneretur, præter unā Gallinam, quæ non esset attilis, quod deinde caput translatum, per omnes leges ambulavit. Inventumq; diverticulum est in fraudem earum, Gallinæ ceos quoque pascendi lacte madidis cibis, multò ita gratiores approbatur. Nec tamen in hoc mangonio quicquā

m Capito- lin. in vita ejus. totum placet. Pertinax *m Imperator* lumbos amicis mittebat, & dorso laganis *n* sunt similes. Messalinus Cottagena cristas cum palmis pedum & Anseribus torrere, atq; patinis conderere petiit. Cerebrum asinum cum pauco sale & pipere editur. Jecinora inter omnia edulia Cardanus celebrat. Vē-

o Galen. l. 3. de aliment. triculum si concoquatur, *o* uberrimè nutrit. Intestina quæ & Gigleria vocabantur, cum alijs quibusdam rebus incocta edebantur. Testes apud Bononienses Calend. Augusti comedere solemne est. Uropygium inter militares cibos à Gallis computatur.

p Galen. l. 3. de aliment. Erant *p* Galeni tempore, qui & sanguinem Gallinarum edebant. Apud *q Alpin. l. 3. de Medic.* Ægyptios *q* nigræ arte certâ saginatæ in familiarisunt usu. Jus fœminæ in balneis potant, sic pingues evadunt. *Aegypt. t. 16.* Apparatum pullorum Conchialatorum, Parthicorum, Oxyzoniorum, laseratorum, cum cucurbitis elixatorum, Varrianorum, Frontonianorum, traetogalatorum, farfilium, leucozoniorum, & his similium, in Apicio vide, ex quo multa Aldrovandus desumpsit.

r Hippocr. l. de morbo sacro. Olim tamen qui morbo *r* sacro laborabant, Galli carnibus abstinebant. *s Caesar. l. 5. de bello Gallico.* Britannis *s* olim nefas Gallinam gustare, hodiè in Socotora insula eandem contingere, religio est.

De *Vsu in Medicina* quis unquam dubitaverit. Inde olim superstitiosè Æsculapio immolabantur, nec quisquam ferè est morbus cui depellendo non adhibeantur. Reperti qui exorbili ovo ter quaterve excreverunt, si Brasavelo fides. Febrientibus albumen ovorum in aqua concussum exhibuit *r Hippocr.* & Hippocrates. Testes in hætica *n* commendantur. Cerebrum *Gal. l. 3. de morbis.* Galinarum in tremore & narium fluxu. Melancholicis Gallina nigra per medium dissecta benè supra caput imponitur. Sunt qui Gallinæ pennam in aceto intinctam ad somni profunditatem conferre tradunt. Jus Galli veteris Asthmaticis prodest. Stercus album Galli ad occultas anginas commendatur, & certò vomitum educit, nec malè in colica exhibetur, & cum oleo & nitro mixtum clavos pedum sanat. Membrana ventriculo subdita cornu similis trita, stomachicis feliciter exhibetur. Jecur assatum Ilæo resistit. Marcellus deniq; Empiricus prodidit, ossiculum extremum ex ala Gallinacæ cochleari terebratum, nodisq; septem litio ligatum, atque ita brachio vel cruri ejus partis, quæ inguina habet suspensum, ijs mirabile remedium exhibere. Pro Co. o, hone notandum est, quod Cælius Aurelianus reliquit, quendam à Gallo pugnante leviter læsum, in rabiem incidisse.

AD ARTICULUM Primum.

APPENDIX I.

De Gallinarum ovīs.

Dupliciter Gallinam ova concipere, *Per se* nempe & *ex congressu*, constans ferè veterum & recentiorum est sententia. Priori concipiuntur modo, quando mare absente, desiderio ipsius projiciunt intra sese a semen gal- *a Aristot. l. 1. de generat. animal. c. 10.* linæ; sic, tanquam maris initum passæ *H. A. l. 10.* essent, prægnantes fiunt. Excitat ingentem in partibus genitalibus pruritum, seminantis materiæ abundantia; quam mutua inter se libidinis imaginatio auget, sed & si tempore certo

c Arist. H. suavitē attrēctentur, c idem motis
A. l. 6. c. 2. attrēctatione humoribus faciunt, ut
haud falsō; etiam pulvere concipere
Plinius dixerit. Accedit ventorum
Austrinor. Autumno & vere auxiliū.
His flantibus, aves multiparæ loca am-
per quæ concipiunt, obvertunt, ijs ad
libidinem concitantur. Continuus
caudæ ut motus, semen quod copio-
sum, nec menstruorum discessio ulla,
ad matricem attrahit. Hinc à vento

d Varro R.
R. l. 2. c. 1. concipi d aliquando creditum. Hæc
e Arist. l. 6. ova *ὑπερμυα* seu subventanea & zephy-
H. A. c. 2. ria dicta sunt, ut e cynosura & urina
Scalig. in l. illa, quæ ætate ab humore contento
10. Aristot. inutuli generantur. Neq; tamen omni-
Histor. ani- nō inania credas. Omnes enim partes
mal. c. 6. habent, minora *πολύμυα*, liquidiora, mi-
nus suavia, & infœcunda per se, à su-
perveniente Gallo fœcundantur. Nec
obest velex luteo in album mutatio,
ut Aristoteles credidit, vel utriusque
à membrana ambitus. Ex albumine
enim pullus generatur; ova piscium
jam exclusa, post à mare injecto semi-
ne fœcundantur, & ovum in matrice
subventaneum, præter testam & pel-
lem completum, à semine Galli fœ-
cundari, Albertus M. testatur. Quan-
to tempore maturescant, incertum:
tardius propter caloris in semine pe-
nuriæ, verisimile. Reliquias eorum
quæ è semine generata sunt esse, fal-
sum. Nam in gallinarum & Anserum
genere, à novellis sine coitu edita,
compertum est.

f Arist. l. 6. De Ovis quæ ex congressu sic habet. f
H. A. c. 2. Postquam fœmina de superiore loco
Aldrov. Or- quæ præcincturæ seu septo transverso
nich. l. 14. subest genituram excepit, formantur
c. 1. ex ea à facultate formatrice ibidem
ova, quæ spinæ pedunculis adhærent,
exiguum tum primò quiddam ut can-
didum videtur, & venulis distinctum,
rubrum dein & sanguineum, luteum,
& flavum totum tandem. Mox de
spina in intestini uterini principium
decidua & ad primos uteri loculos
transmissa continuatō congressu eo
citius quo iste frequentior augescunt,
& albugo à croceo secernitur. Tum
in secundos loculos detrusa, iustā mo-
lem acquirunt, & luteum, albumine
involvitur. Deveniunt tandem in ter-

tiam cellulam, in qua testæ naturā dū-
ritiem largitur, eam tamen, ut mollia
adhuc exeant, nec nutritio, quæ per
eamdem fit, impediatur. Sic vitello &
albugini constantia, (gallatura seu
sperma Galli, si Alberto & Aldrovand-
o credimus, per totum albumen, us-
que ad vitellum pertingit, huic ver-
sus partem ovi acutiorem infigitur.
Decimo à coitu die perfecta, trib. tu-
nicis, quarum una vitellum ambit, al-
tera tanquam pia mater albumen cō-
plectitur, tertia inter quam & illam
humor crudus nascitur, & dum for-
matur fœtus excernitur, testæ adhæ-
rens, duræ meningis locum implet;
intus instructa, mollia, ne dolorē pa-
riant, latiore parte, ut mollius depo-
nantur, & quia acutior adhæret, ideo
postrema exit, egrediuntur, ac refri-
gerata, evaporato humore qui exi-
guus, relictaq; portione terrea, iustam
duritiem, sed acuta parte, qua pullus
exit, & ubi grandinem generationi in-
utilem, qui non cernitur nisi fracto
putamine, & injecta parte lutei infra,
Aristoteles ponit, exactiorem, servata
suâ figura, acquirunt. Poni cōnectâ
brum incipiunt. Circa Calendas Ja-
nuarii etiam locis tepidioribus ac fœ-
cundissimis. Optima fœtura ante æ-
quinoctium vernum editur, post sol-
stitium nata, magnitudinem non im-
plent, tantoque minus, quanto serius
provenere. Parituras se singultu *g g Columel-*
produnt; eodem, peperisse testantur, *la de R. R.*
facilior, si festucam ore apprehensam
dorso imposuerint, si b Oppiano cre- h in Ixen-
dendum, libentius, si jam prius ovum *tis.*
in nido conspexerint sine dolore, vel
exinde quod testa membrana mollis
fuerit, egresso demum induretur, col-
ligas.

Numerus pro ætatis ratione variat,
quæ multa pariunt, bis in die ponunt,
sed hyperinæ evadunt, & citò cōmo-
riuntur. Sunt qui quasdam noctu te-
nere, & nisi ad magnam diei partem,
dura, eniti credunt, tenera edituras,
dura, si aliquot horis antelucanis lu-
men viderint, ut sub ortū solis ponere
cogantur, & salis supponatur paululū.
Monstruosa interdum circa ea accidere
certum. Vidit Aldrovandus cujus
puta-

putamen punctis & lineis sanguineis conspersum. Uterum læsum vix dixerim. Sanguinem quo uteri interdum turgent venæ transfudasse verisimile est. Vidit & Albertus totum sphaericum, duabus testis inclusum, absq; ullo vitello, cum albumine aquoso tenui, & altero intra interiorem testam. Dantur & sine testa tam hypenemia quā vera: fortè quòd illa aquosa sint, & exiguo, si humidus Gallinis cibus apponatur, calore dotentur: his propter icthum, vel ex multitudine compressionem tale quid accadat, si Nicædri opinioni standum est. Nec inter rara trilecitha, id est triplicis vitelli habentur; illaq; plerumque in medio testæ cavitatē habere Elluchasis prodidit. Vidit & Gesnerus aliquando cujus putamen, ab altera parte extrema, in angustum velut collum instar cucurbitæ se colligebat. Unum sphaericum ad columbarum vix accedens: alterum anserino haud minus, plicis rugisq; insigne in Aldrovandi Musæo reservabatur. Cæterum *ponatve & Gallus ova* inter doctos quarritur. Nonnulli decrepitum & ad coitum ineptum, septimo, nono, aut ad summum decimoquarto ætatis anno, pro virium vel imbecillitate vel robore ponere ajunt. Ortum id putrefacto intus semini debet; vel ex humorum colluvio conflatur. Editur sub caniculæ exortum, quod tunc maximè ab ambientis calore expultrix languida in alite decrepita juvetur. Visum in Imperati Musæo oblongum, ab Aldrovando rotundum, colore modò luteo, buxæo, flavescente, lurido, sed & quoddam ruptum, vitello omninò carere dixisses. Quin & Lemnius Zirizææ duos annos Gallos non tantum ovis incubasse, sed & ægrè fustibus ab illo opere abigi potuisse, reliquit. ConfRACTA tandem ova, & strangulata à civibus Gallus, quod, ne Basiliscus excluderetur, metuerent. Et hæc est quorundam opinio. Ovo simile aliquid ex conglobata intus putri cōcreatione, in ultimo senio, cum non amplius coit, concipere, verisimilius est: At ovum cum testa non magis excludere potest, quàm vir fœtum, cum pa-

rere non didicerit. Basiliscum ex eo produci inprimis si rubeta incubaverit, nugæ, testâ carere, & adeò duræ pellis esse, ut fortissimis ictibus resistat, fabulosum.

APPENDIX II.

De Generatione Pullorum.

Absolutâ Ovorum historia, de generatione pullorum aliquid nobis dicendum est. Horum verò principium veteres Græci, & inter eos Alcmaeon Crotoniates, & Hippocrates Cous in vitellum; nutrimentum in albumen conjecere. Recentiorib. contrarium sentire placuit. Ex albo liquore ovi corporatur animal. vitellus alimentò destinatus est, *ἡ τῶν αἰσθητικῶν ὁργάνων ἐν τῷ ὄντι ἡ αὐξήσις*, inde membris subinde constituendis incrementum administratur. Et cerè pullo jam constituto sæpe vitelli pars extat, & cum albumen *πυκνόμενον*, ignitum, quod incubatione fit & fotu, *στέρεον* solidum fiat; luteum *ἐν τοῖς πύλαις πηγύεται*, *θερμαίνον ἐγγράνεται*, gelu duratur & coit, calore humescit. Excluduntur incubatu, vel *αὐτόματα* in terra. Nam in Ægypto & defodiuntur in fimo terra obruto, & turmatim fornacibus Cairinis exclusi prodeunt. Syracusis, potatorem quendam ovis sub storea humo stratis tamdiu potare nunquam opera intermissa solitum fuisse dum excluderentur, proditum est. Liviam ovum in sinu exclusisse, apud Plinium legitur; & vas in quo absq; Gallinæ opera excluderentur, à Porta descripsit. Oblonga & acuta excludunt fœminam, obtusa rotundaq; ab ea parte quæ acutior esse solet marem. Incerto id argumento ab Aristotele proditum, contrarium apud Columellam legimus. Diester septem exclusioni adscripsit Philosophus, minuuntur, si tepidus aer accesserit, *ἡ πέψις θερμότης τοῦ* Concoctio calor quidam est, sed & de, ravantur aliquando nimio, & urina evadunt, *ὥσπερ οἱ ὄνοι ἐν τοῖς ἀλγίστοις ὀξύνοισι, ἀντηρεπόμενης τῆς ἰδύος*, quemadmodum vina fæce subversa in calore acescunt. Formationem,

nem, & quomodo alimentum pullus factus assumat, diligentissime exposuit Aristoteles; hunc Aldrovandus secutus, sequentia nobis reliquit, quæ ipsius verbis proponemus. *Secundo* inquit ab incubatu die, luteum observavi deferri ad cacumen, aliquo pacto alteratum, & in medio quasi subalbium: cujus rei in primis Aristoteles non meminit. In aliqua verò parte albuminis, quæ pariter erat alterata, semen Galli apparebat, quod tres illas videbatur obtinere qualitates, quales jam ante diximus. *Tertia* die ablato putamine in parte ovi obtusa, vidi albumen, & reliquam substantiæ ovi partem in superiori putamine separatam. Recesserat autem albumen aliquantulum à putamine, quemadmodum fieri videmus in ovis omnibus, quæ minus recentia sunt. Hinc Plinius ova schista appellat tota lutea, quæ triduo incubatu tolluntur. Vocat autem *schista*, teste Hermolao, quia dividantur, & discedebat vitellus à candido. Videbam item manifestè admodum membranas illas tres quas ovis inesse ex Alberto dixi, & ex Aristotele etiam colligitur: neque verum est, quod secunda earum sit recentè genita. Si enim illud ita esset, minime in ovis nondum incubatis conspiceretur. Inest autem & his, ut etiam vidi, sed albior in incubatis calor causa. Eadem die vitellus videbatur versus ovi partem acutam: atque hoc est, quod dicebat Philosophus. Effertur per id tempus luteus humor ad cacumen, ubi est ovi principium, nam ibi est major calor, & vis spermatis. Apparebat etiam in albumine exiguum velut punctum falsiens, estque illud quod Philosophus eor statuit. Ex eo vero evidentè admodum videbam nasci venæ trunculum, & ab hoc duos alios ramulos proficisci, qui meatus illi fuerint sanguiferi, quos ad utramque tunicam ambientem vitellum, & albumen protèdi ille dixerat. Sum autem omnino ejus sententiæ, ut ejusmodi vias credam esse venosas, ac pulsatiles, sanguinemque in ijs contineri puriorem, principalium membrorum generationi, jecoris nempe, & pulmonis, si-

miliumque idoneum: adeo ut rectè dixerit Philosophus, tertia die signa apparere, an ova fecunda sint futura: licet ejusmodi observatio in majorum avium, utpote Cynorum, Anserum, ac id genus aliarum ovis locum minime habeat. In ejusmodi enim, ut idem Philosophus testis est, paulo tardius ea signa apparent. *Quarta* die bina videbantur puncta, & quodlibet eorum sese movebat: quæ haud dubio cor, & jecur fuerint, quæ viscera in ovis triduo incubatis idem dixit. Apparebāt item duo alia puncta nigricantia, nempe oculi: & jam luteum manifestè ad acutam ovi partem, ubi major calor est, & spermatis vis sese receperat. Trahitur autem à spermate illud pro carnis generatione, ut in omnibus animalibus fit, quæ sibi simile generant. *Quinta* die non amplius punctum illud, quod cor esse diximus, extra videbatur moveri, sed obregi, ac cooperiri, & duo illi meatus venosi evidentiores conspiciebantur, alter vero major altero: nec verum est, quod Albertus scripsit, apparere in tunica illa, quæ albumen includit: nisi forte id de tertia tunica, seu secundaria dixerit, cui evidentè venæ insunt, nam alioqui in illa nullius venæ vestigium inerat. Harum venarum insita vi reliqua albuminis portio quasi in palearum colorem immutatur. Videbantur etiam famuli ad locum tendere, in quo caput formatur, eo scilicet puriorem materiā, à qua caput, ac in eo cerebrum fiat, una cum virtute formatrice deferentur: Erat autem capitis fabrica valde rudis adhuc ac informis: oculi vero conspectiores, atque erui quasi magnitudine. *Sequenti dein die* ablato superiori partis obtusæ putamine, ejectisq; duabus prioribus tunicis, tertia evidentè cernebatur venulis referta: de hac locutū fuisse Philosophum arbitror cum inquit: Membrana etiam fibris distincta sanguineis: atque hæc meo judicio secundina dici potest. Dein inter hanc, & quartam membranam, quæ fœtum involvebat, humor erat aquosus: quem autumno serosam albuminis partem esse, quæ post natū fœtū superest, tanquam ad generatio-

hem inepta. Eam vero membranam innuere videtur Aristoteles à meatibus illis venarum ortum ducere, quatenus scilicet vi fibrarum à venoso illo meatu ortarum in palearum, vel sanguineum colorem immutatur. Cernebatur deinde totus foetus moveri, & oculi jam majores erant, quam in præterita die: at partes inferiores, thorax nempe, venter, & pedes, erant valde imperfecte, nec discerni adhuc poterant, & rostrum erat mucosum: ut rectè dixerit Aristoteles: pars inferior corporis nullo membro à superiori distinguì inter initia cernitur. Caput denique tota inferiori corporis parte majus erat. *Septima die* aperta quarta tunica foetum conspeximus parvum adhuc, ac indistinctum cum oculis tamen magnis, triplicique in illis humore, crystallino nempe, vitreo & aqueo. Aperto capite jam cerebrum aperte cernebatur, minus verò reliquæ partes. Undè dicebat Philosophus. Paulo post (intelligit meo iudicio diem quintam vsq; ad nonam inclusivè) & corpus jam pulli discernitur, exiguum admodum primum, & candidum, conspicuum capite, & maxime oculis inflatis, quibus ita permanet diu, uti nos conspeximus: & sero, inquit, decrescunt oculi, & se ad ratam proportionem contrahunt; quod quidem verissimum est: siquidem in quarta decima, aut quinta decima die aliquantum resident diminuti propter caloris digestionem. *Octava rursus die* oculi majores adhuc videbantur, utpote cicercis fere magnitudine: Totum corpus tunc sese velociter movebat, & jam crura, & alæ distinctè cerni incipiebant. Rostrum tamen interim mucosum adhuc erat. Sed fortè quispiam quærat, cur prius superiores, quam inferiores partes in ejusmodi formatione appareant: cui responsum velim, virtutem, seu facultatem formatricem in superioribus magis quam in inferioribus vigere, quod spiritales sint, & per consequens plus caloris obtineant. Cæterum isthæc omnia, quæ hac die videbam, *sequenti* manifestiora apparebant. *Decima die* non amplius caput toto corpore majus erat, magnum ta-


men, ut in infantibus etiam videmus: magnitudinis autem causa est humidissima cerebri constitutio. Quod vero Aristoteles dicit oculos fabis majores esse, id profecto minime verum est, si de vulgaribus nostris fabis locutus fuerit, cum alioqui ervi, vel ciceris albi, magnitudinem non excederent: atq; hinc etiam nō absurde quispiam colligat fabas antiquorum fuisse rotundas, quales araci sunt, quem id eo fabam veterum quidam existimant. Neque etiam verum est: quod tradit, tunc scilicet oculos pupillis adhuc cære. Etenim hæc non tantum hac die apparebant, sed duabus etiam præcedentibus, una cum omnibus partibus ac humoribus. Quod vero ait, detracta cute nihil solidi videri, sed humorem tantum candidum, rigidum, & refulgentem ad lucem, nec quicquam aliud, id de crystallino humore mihi dixisse videtur, qui tamen haud solus apparebat, sed vitreus quoq; & albugineus, unde non parum hallucinatus videri potest Philosophus, uti etiam Albertus, qui eo tempore nil duri, & glâdulosi in iis reperiri existimat, cum crystallinus humor solidus sit, ac quâ maxime conspicuus. *Eadem item die* vidi omnia viscera, nempe cor, jecur, pulmonem. Cor autem, & jecur erant albicantis coloris: & cordis motus non solum apparebat, antequam foetum aperirem, sed jam secto etiam thorace moveri videbatur. Erat autem pullus involutus quartæ illi membranæ plurimis venis refertæ, ne in humore iaceret. Cernebam etiam vasa umbilicalia prope anum ad umbilicum deferri, ibique inseri, ut cibum per illum petat foetus. Vidi denique, quod Aristoteles non advertit, in dorso prope uropygium pënarum principia nigricantia menti humani cuti non absumilia, cui pili abradi sunt. *Die subsequenti* hæc omnia erant manifestiora, & in superioris rostellæ extremitate erat quid albidum: cartilagineum, & subduriusculum, quod rursus die decima tertia magis erat conspicuum. Erat autem rotundum milij grano haud absumile. Sagacissima rerum parens natura id ibi fabricasse videtur, ut im-

L pediat,

pediat, ne rostellum suum vel venulas, vel membranulas, vel alias quascunque tenerimas particulas pertundat. Ajunt mulierculæ, pullos iam natos cibum capere non posse nisi prius id auferatur. *Decimaquarta* die pullus iam totus plumefcebat. *Decimaquinta* in digitis ungues albicantes apparebant. *Die vero decimasexta* ovum aperire placuit in opposita parte, ubi nativa tunica, sed unica tantummodo apparebat, eaque alba. Alteram enim quam in altera parte semper videram, hic observare minimè datum est. Itaque dubitabam an ea tantum pro albuminis tutela nata sit, cum scilicet ovum non sit recens, vel ad pulli defensionem in ovo incubato. Nam indies illa magis magisque decidere videtur, & foetum sequi, qui sui gravitate deorsum decedit. Aristoteles etiam unicam tantum esse eiusmodi tunicam his verbis innuere videtur. Sunt, inquit, quandoque locata ova hoc ordine, prima postremaque ad testam ovi membrana posita est, non testæ ipsius nativa, sed altera illi subiecta: liquor in ea candidus est, quasi diceret, omnes partes in ovo locatæ sunt hoc ordine: nempe prima, postremaque ad testam ovi membrana posita est. Intelligit meo iudicio per primam, & postremam membranam, eas membranas recēs in incubato ovo genitas, eas videlicet, quas aliquoties appellavi tertiam secundam, & quartam, quam involventem foetum dixi. Nam cum dicit testæ nativam non esse, ostendit nec primam, nec secundam esse, quæ ab altera ovi parte reperitur. Videtur igitur excludere hanc nativam sive primam, vel secundam, & intelligere tertiam, quam secundam sæpe vocavi. Cum verò dicit, sed altera illi subiecta, intelligit eandem, secundam nempe testæ subiectam, quod vel ex hoc maximè liquet, quod candidum in ea liquorem inesse dicat. Is enim, ut supra ostendi, inter tertiam & quartam continetur. Hinc manifeste errore Sueffanus convincitur, qui ex Ephesio per primam interpretatur eam, quæ testæ adhæret, per postremam vero, quæ albumini. Quæ omnia à nobis observata quotidie in

sequentibus diebus evidentiora, utpote in perfectissimo pullo apparebāt. *Die vero vigesima* pullus putamine à parente Gallina ablato hora vigesima secunda sua sponte exivit. Post exclusionem reperiri in putamine tunicas duas albas nativas una cum duobus aliis in incubatu genitis secundina nempe, & quæ foetum ipsum involverat, in qua excrementum adhuc inerat subalbidum. Evidenter adhuc apparebāt in pullo tria illa *vasa umbilicalia*, duæ scilicet arteriæ, & vena una, & orificium umbilici valde erat contractum. *Vena* vero jecori per alium rarum, qui recta ad illud tendebat, inferi videbatur. Mirum autem erat, quod extra id nihil lutei appareret, cum tamen in cavitate abdominis, ubi intestina sunt, prope anum pullus per umbilicum totum fere id absorberat, simul cum quinta tunica, quæ id involverat. Tanta autem ibi lutei inerat copia, ut vix duplo plus sit in ovo nondum incubato. Aristoteles etiam scripsit, decima ab ortu die, si alvus abscindatur, aliquid adhuc lutei in ea conspici. Sed consideratione in primis dignum est, quomodo ejusmodi membrana, quam una cum vitello à pullo absumi diximus, post eiiciatur. Videtur autem dicendum, quod per eandem viam, umbilicum videlicet, regredi debeat, vel per anum, quod potius credo. Tunicæ huic duo vasa implantantur, quorum unum arteriam esse, & à corde proficisci, pulsus indicat: alterum vena est, deferiturque ad intestina, lutei videlicet vehiculum: Hepar erat coloris admodum lutei, forte quod ex luteo pervenas attracto nutriatur. *Hactenus Aldrovandus.* Auxit naturæ dotes ingenium. Fœminas habebis si lunam plenam nata, eadem supposueris. Eo colore nascuntur, quo tincta ova fuerint, pulcherrimi excluduntur, si cum Palumbi mare Gallina creverit, & ne de mortuos laboremus, à Johanne Baptista Porta absque causa provisum est. Solent in partu numeroso quod conceptus cohereant sæpe monstra nasci; nec vel geminas vel quadrupedes pullos, nulla sectis membranæ vitellis, vidisse, rarum est.


Gallus Indicus
Welfcher han.



Gallus cornutus.



Gallina Patauna.



Gallus Patavinus.



Pumilio Kriechhuhn.




Gallina
Henne.



Gallus. Han.



Gallus.



Gallus Turcicus.



Gallina Turcica.



Gallus Persicus.



Gallina Persica.



Gallus Indicus.



Gallina Indica.



Gallus Indicus mirabilis.



Gallina Guinea.




Gallina lanigera.



Gallus palustris murhan.



*Capo.
Kappain.*



Gallina aquatica.

Fulica. Wasserhuhn.

Chloropus Gallinula.

*Ispida.
Eijsvogel.*

Gallina hypoleucos.

Erythropus.

*Scolopax sine Gallinago.
Schnepf.*

Erythra.

Gallinula terrestris.



*Rusticula syluatica.
Walschnepf.*

*Scolopax seu Gallinago minor.
Harschnepf.*

Gallina Ochra.

Gallina Sorica.

Gallina Rhodopes.



ARTICULUS II.

De Gallis Gallinaceis & Gallinis in specie.

PUNCTUM I.

De Gallinis Patavinis, Pumilio, & aliis quibusdam monstrosis.

HAtenus de Gallis & Gallinaceis; in specie occurrunt nobis Gallinæ, Pumilio, Patavinæ, Gallinæ Turcicæ, Persicæ, Galli Scotici sylvestres, Palustres, Galli & Gallinæ Indicæ, Gvineenses, Capi. Gallina PUMILIO seu Nana, quam Aldrovandus describit, erat ferè tota nigra. Majores alarum pennæ in extremitatibus candicabant. Maculis in collo mediam lunam æmulantibus ornabantur. Oculos macula sublutescentis coloris rotunda ambiebat. Caput erat cirratum, Palææ & crista intensius rubeabant. Ungues impensè candicabant.

Ex PATAVINIS Gallina tota ex nigro virescebat. Cristam gerebat exiguâ coloris vix rubri. Pellicula quam propè aurium foramina obtinent, albebat. Mas quinque duntaxat coloribus ornabatur, nigro, albo, viridi, rubeo & luteo. Corpore erat ater, caput cirrhatum, cirrhi radices erant albæ, rostro & pedibus luteis. Visa aliquando Gallina tota candida, cristata, visa & alia in lapideam substantiam inter parietes cõversa, caudiculis suis absque pennis histricis instar horrida. Dantur & pedibus pennatis seu hirsutis quarum descriptionem apud Aldrovandum vide. Cristam Gallus habebat duplicem non admodum magnam. Visi aliquando & monstrosi. Tacebo gallinam quæ tres pedes, tertium propè anum enascentem habebat, pullum, qui totidem instructus, tertium velut ex Uropygio enatum ostentabat. Nihil vel de eo dicam, cui pesè podice natus, quinque digitis instructus, visebatur, vel cui seu qua-

tuor, priores imperfecti & pallidi, perfecti & lutei posteriores, seu quinque erant, vel de cõpullo cui quatuor alæ erant: nō tantum contrarium alarum pennæ situm; sed & cervicis plumulas caput versùs cirri instar erectas. Tagliaferus Medicus observavit in quodam. At qui in aula Hetruricæ Ducis visebatur Gallus, habebat caput & palæas ex plumis militum, conos quibus galeas exornant æmulantibus duos in fronte pennarum calamos velut duo cornua surrectos; totidem ab utraque rostri propè nares parte, qui in extremitate plumas tenuissimas setarum instar edebant, unum in cervice, qui à principio ferè ejusmodi setis ornabatur. Pennæ veluti squammas toto corpore æmulabantur. Propè Uropygium qua cauda exit tuberculum rotundum & subalbidū visebatur. Cauda carnosâ, pilis nuda; in extremitate floccum album habens propendebat. Tibiæ velut ocreis induebantur.

PUNCTUM II.

De Gallinis Turcicis, Persicis, Gallo Scotico Sylvestri & Pallustribus.

TURCICUS Gallus, quem Aldrovandus describit corpore erat candicante. Alis & alvo nigris. Cauda partim viridi partim nigra. Tibiis & pedibus subcæruleis. Toto corpore, modò argenteis, modò aureis lineis variegato. Gallina tota erat alba, maculis ubiq; nigris conspersa, pedibus subcæruleis. Visa & alia cum pedibus cæruleis ex albo & nigro maculata. Post carneâ cristam, aliam ex pennis albis Alaudæ instar habebat, ut in icone expressum est.

PERSICUS cristâ veluti caudam obtinebat, pedes cinereos, ipse totus niger erat. Gallinæ totæ coloris ferè rugini visuntur.

Gallus SCOTICUS sylvestris Phasianus carne ac magnitudine est similis, sed nigrâ plumâ, rubentibus admodum palbebris. Mas collo, pectore, re, alis, coxisque punctis rubicundis

asperfus est; fœminam leucopham, maculæ nigræ variant, supercilia & barbulæ in utroq; sexu maculis nigris asperguntur. Similis est huic ille quem Turnerus Morhenā vocat. Mas enim totus splendentis est nigredinis, eam caudæ partem, quæ podicem tegit, quæq; alba est si exceperis. Caput ruber sed corneus cirrhus regit, & circa genas duo veluti lobi rubri & carnei. Fœmina tota maculis distincta est, & à Perdice nisi major esset, & rufæ, magis ægrè dignoscitur. Degunt in desertis, & erica confitis locis. Granis, & summis erucæ germinibus, vescuntur.

Gallo PALVSTRI corpus est subrufum aut sufflavum, punctis nigricantibus undiq; distinguitur. An idem sit cum illo qui frumento abstinet, & enascentibus minutisque Cytisi folijs vescitur, ut Boethius prodidit, dubito.

PUNCTVM III.

De Gallinaceis & Gallinis Indiis.

GALLUM INDICVM duplicem nobis Aldrovandus exhibet. *Primus* est auritus, tridactylos, nulli volucrum generi pulchritudine inferior. *Rostrum* illi in superiore parte aduncum, totum rubrum. *Caput, pectus, & venter* integer colore roseo diluto, qui in pectore maculis subroseis dilutioribus, exiguis, in ventre longè majoribus, quas alba linea transcurrit, insigniuntur. *Cristas* habebat duas, carneam unam, quæ propè rostrum est, inter quam & rostrum superius, macula oblonga cærulea est: alteram pennæ luteis propè primam cristam parvis, mox majoribus, quæ sursum primò ascendunt, mox descendunt deorsum, constantem. *Oculi* eundem ferè qui in homine est præ se ferebant situm, oblongum scilicet, in cuius medio illi positi. *Aures* habebat erectas asininis non absimiles. *Alas* admodum diversicoloris. *Caudam* duplicem. Priorem exiguam, quinque pennis ruberrimis constantem. Aliam novem longissimis, diversum colorem

obtinentibus. De collo superiori & Vropygio pennæ cæuleæ albis calamis ornata dependet. *Alterum* simpliciter Indicum idem nominat. Coloris toto corpore erat aterrimi. *Rostrum* superiore aduncum, utroque caput versus luteo, cætera atro. Vbi foramina narium alijs, ibi rotundum quid & luteum cerasi magnitudine conspiciebatur. *Crista* loco cirros gerebat. *Cauda* & calcaribus carebat. *Tibiæ pedesque* tabellis albicantibus præditi erant. *Gallinas INDICAS*, tres idem exhibet. *Primam* colore corporis fuso. Capite cirrhato, rostro in medio tuberoso, albicante, nigris maculis insignito. *Coxis* ex ferrugineo lutescentibus. *Cauda* nulla. Vropygio, simiæ instar, nudo. *Alteram* corpore à rostro ad caudæ extremitatem exiguo, ad cæruleum vergente, rostro recurvo & rubicundo. *Cauda* longa, ut in Pica extensa, candida, & lincis nigris conspersa; quæq; in fronte tuberculum magnum, figuræ fici, coloris ferè cæulei gerebat. *Tertiam* colore fusco, in collo & alijs ad cinereum vergente, rostro rubicundo, sed non aduncum, tuberculum simile in fronte gerentem. *Numidica* dicebatur.

PUNCTVM IV.

De Gallinis Gvineis.

GALLINÆ Gvineæ à regione ita dicta, Perdices Terræ novæ quoque dicuntur. Corpulentia vix nostrates. Gallinas superant, iisdemque quoad mores & vocem ferè similes sunt. Peculiare ipsis acervum quendam pilorum supra caput obtinere, sed qui in anteriori parte reflectuntur, à prima vertebra aut ossè colli procedendo per posteriorem capitis partem. Gallum Mauritanum ita Gesnerus ex Cajo descripsit. Pulcherrima inquit avis est, magnitudine corporis figuræ, rostro & pede Phasianæ similis, vertice corneo in apicem corneum à posteriori parte præcipitem, in anteriori leniter acclivem elevato, armatus. Eum natura videtur inferiori capitis partibus veluti laciniis se promittentibus committere atque deligare: inter

ocu-

oculum & aurem utrinque una omnibus ejusdem cum vertice coloris: ita ut insideat capiti eo modo quo Ducalis pileus Duci Veneto, si quod jam adversum est aversum fieret. Rugosus is est inferius per circuitum; quâ se attollit in directum in summo collo ad occipitium, nascuntur erecti quidam atque nigri pili in contrarium versi. *Oculi* toti nigri, æquæ & in orbem palpebræ & cilia. Si maculam in summa & posteriori parte supercilij utriusque demas. Imum *caput* per longitudinem utrinque caro quædam callosa colore sanguineo occupat, quæ ne propendat veluti palea, ut replicaretur, natura voluit, & averso ductu in duos processus acutos à capite liberos finiret. Ex hac carne attollunt se utrinque carunculae, quibus nares in ambitu vestiuntur, & caput in anteriori parte à cetero rostro pallido separatur. Harum ad rostrum margines inferiores, replicatur leviter sub utraque nare. Quod inter verticem & carnem est à dextra & sinistra parte, squamosa duplici incisura notata: in posteriori nulla sed læves, & veluti punctis quibusdam sui coloris resperse. Color illi in faucibus exquisitè est purpureus: in cetero corpore per summa contuenti, qualis cõfurgit, si album & nigrum pollinem, utcumque tenuiter tritum, colori fusco rarius aspergas, nec tamen cõmiscens. Tali coloris maculae ovales aut rotundæ per totum corpus inesse visuntur, per summa majores per ima minores comprehensæ intervallis linearum, ut apparet in plumarum compositione naturali, qua se mutuo interfecant obliquo hinc inde ductu per summa tantum corporis, non item per ima. Id non ex toto corpore solum deprehendes, sed ex singulis avulsis pennis. Superiores enim obliquis lineis se interfecantibus, aut si mavis, orbiculis quibusdam ex albo & nigro, ut dixi polline confectis, & per extremitatem cõjunctis; ut in favis aut retibus, maculas ovales aut rotundas, in spaciis fuscis comprehendunt, inferiores non item. Utraque tamen simili lege posita sunt. Nam in alijs plumis ordine ita junctæ sunt, ut ferè triangulos acutos

faciant; in alijs ut ovalem figuram representent, &c. *Vox* illis divisus sibilus non sonior, nec voce Coturnicis major. similem Gallinis communibus scribit Bellonius. Fecundæ sunt, & in nutriendis pullis sedulae.

ARTICULUS III.

De Capō.

CAporū tot sunt genera quot Gallorum, & sola castratione ab his differunt. Capitū tamen juba major est quàm Gallis, caudæ pennæ longiores sunt, & calcaria in majorem mollem excrescunt. *Vox* etiam magis demissa & ratica. Scaliger unum insigni magnitudine, perpetuum convivam habuit, qui cum ater fuisset totus, anno quarto evasit candidus, quanquam erant, alij quibus nulla pluma nigra fuerat. Duobus olim *castrabantur* mo-

Arist. H. A.

l. 9. c. 50.

Varro de

R. R. l. 1. c. 2.

Plin. H. N.

l. 10. c. 21.

Columella.

R. R. l. 8.

cap. 2.

dis, lumbis nempe adustis candente ferro, aut calcaribus ad infima crura usque. Hodie vulnere tanto quantum digito superius lumbos sublepto, ubi testes adherent immittendo sufficit, infecto, testiculi per posteriora evelluntur. Mori interdum continet, si erratum fuerit: & Gallum à castratione ita intumuisse Aldrovandus observavit, ut pellis digitis pulsata, tympani bellici instar sonum ederet. Brevis quidam *pinguescere* scribunt, si cerevisiam aquæ loco apposeris.

Vsus in cibo multus est. Optimum enim sunt nutrimentum & perfectum generant sanguinem, ut omnium avium laudes quantum ad obsonia pertinent, una caro Gallinacea, cujus patina stomachum juvat, pectus lenit, vocem sonoram facit, corpus obefat, Platina comprehendat. Maximè circa sex, septem, vel octo mensium aetatem probantur. In *Medicina* jus caponum ad virium restaurationem commendatur. Quidam ossa crurum medicamentis ad alba mulierum menstrua, immiscet. Alij Fistulae indolenti pelliculam ventriculi interiorem, in sole torrefactam, & in pulverem redactam inspergunt. Græci asserunt, fabæ femina caporum sanguine macerata, ab adversantibus herbis immunia fore;

& si pridie quàm feruntur aquæ simpliciter infusa fuerint, citius nascituræ; si nitrata difficilissimam coctionem non habituras.

CAPUT III.

De Avibus, quæ se pulverant simul & lavant.

ARTICVLVS I.

De Columbis.

^aVarro l. 3.
de rer. rust.

AVes, quas Latini Columbas, seu quod in culminibus villarum degere soleant; seu quod bibentes rostrum aquæ diutius immergant, ut Hermolao videtur. (κολυμβᾶν Vrinare est) seu quod lumbos frequenter colant, ut Alberto M. placet, dicunt, Græcis περιτέρας, & περιτέροι, πέλειαι aliquando περιτῶνες, περιτῆρες, & εὐριπῆι apud Homerum, Hefychium, Phavorinum & alios dicuntur. Descriptionem non est, quod apponamus. Proprium omnibus utraq; connivere palpebrâ. Aristoteles ^k pedibus & unguibus cucillum repræsentare dixit. *Internas* si spectes *partes* l. Ingluviem parvam & ferè rotundam ultra ventriculum, id est geminos sinus habet; unum in quo merguntur recentia, ut guttur: alterum, in quem ex eo dimittunt concoctione maturata. *Ventriculus* ipsis *m* ferventior. *Lien* tam exiguus, ut visum fugiat. *Defelle* inter eruditos non constat. Sunt qui habere negant, *n* Galeno ridiculi, sunt qui affirmant, seu in Vropygio vel dorso, quod verisimile non est: seu non eo loco, quo cetera animantia, sed & inter eas alijs ventri aliis intestino jungitur. Cysti carere dum affirmat Galenus, ne decipiat metu.

Locus.

^oEuseb.

^{præpar.} Euseb.
ang. l. 8.

c. 5.

^pAthen.

l. 14.

^qin cornu

copie.

^rPolyhist.

c. 9.

Quantum *ad Locum*, ubiq; ferè conspiciuntur. Ingens olim earum in Assyria circa Afcalonem quia sacra, *o* & lege ediveritæ; in *p* Cyprio, Papho, Cythera, Sicilia, Chido, quia Veneri dicatæ, copia. Tanta apud Pæonias & Illyrios, ut incolas militari contra eas ordine exire, Textor *q* nescio cujus fide, prodiderit. Nil de portu, & navali, Thisbæorū, Insula Columbaria *r*

Solini, quæ in Tyrreno mari sita est; Lucais insulis, in quibus columbis quædoque onerantur naves, regno Pegu, Fessa, & aliis dicam. Anant verè propter innatum pavorem eminentia loca: naturaliter tamèn specus & latebras quærunt, quæ de nidulatione in arboribus *s* dicuntur, Palumbis potius *s* Horat. l. i. competunt. *Sexum* difficulter, nisi in *1. oda. 2.* teriora scrutentur, discernas. Vox tamen exigua fœmellam, gravior marem prodit.

Coitum mutuo se exosculantur, & *Genera-* senior quidem primum congressum *rio.* ab osculo exorditur, sequentem sine osculo celebrat, *t* at junior quoties libet coire, osculatur, observatum *t* Arist. H. A. l. c. 2. *men* sine osculo marem *u* admitti, si *u* Aldrov. fœmellæ ereptus post triduum eidem *Ornithol.* restituatur. Si mares defunt, ruunt in *l. 11. c. 1.* mutuos amplexus fœminæ, ita singulis diebus ad octiduum & ultra hypemium ponitur. *Ovum* quinto à coitu die perficitur: per oblivionem factum, quod *†* Plinius intra decem maturè *†* Plin. H. scire scripsit, & fœmina sæpè ipsâ quâ *N. l. 10. c.* peperit, postridie *x* aliquando, ma- *x* Athē. l. 9. rem repetit, ut fortè ad partum alterius ovis alacrior accedat. Vexata, vel spontè paulò morosior, ovum per tristitiam retinet. Bina ferè *z* ponuntur, *z* Plin. l. 10. ita natura moderante, ut aliis crebrior *c. 52. H. N.* sit fœtus, aliis numerosior. Sed & quia volaces, *a* consumitur volatu matè- *a* Arist. de riâ, & in alas pennasque abit. Ex prio- *Anim. Ge-* ri marem, fœminam ex posteriore edi- *ner. l. 3. c. 1.* veteribus *b* creditum, visæ tamen bi- *b* Arist. 6. nas fœminas aliquando, binos aliquâ- *H. A. c. 4.* do mares uno exclusisse patru. Benè *Plin. H. N.* autem Plinius crebriorem iisdem fœ- *l. 10. c. 48.* tum innuit, & falsò διζωνον appellavit *Elia. l. 1.* Varinus. Singulis namque seu *c* tri- *var. Histor.* cenis, seu quadragenis *d* diebus con- *c* Arist. H. cipiunt, pariunt, incubant, & pullos *A. l. 6. c. 4.* enutriunt. Continuatur toto anno *d* Varro l. 3. fœcunditas, si locum *e* apricum; unde *dere rust.* Ægyptiæ *f* duodecies pariunt; & *c. 7.* cibum, quem facile acquisitum exi- *e* Idem l. 5. mio corporis & ventriculi calore nul- *c. 13.* lo negotio conficiunt; (hæc fœcundi- *f* Plin. l. 10. tatis causa Aristoteli) habuerint, si ho- *c. 53.* rum aliquid deest, à brumâ *g* ad æqui- *g* Varro. l. noctium hybernum otiantur. Sic duo- *3. dere ru-* *stic. c. 7.* *h* Plin. l. 10. *h* & qua- *H. N. c. 58,* tuor-

tuordecim, haberi possunt paria. Æstate enim binis interdum mensibus terna edunt, sæpè inter pullos ova inveniuntur, & alij prævolant, alij erumpunt, hi rursus simul i accreverunt, & robur habent, cum matribus pariunt, & quanquam k Aristoteles intra annum eos coire, semestres incipere Venerem agnoscere scribat: Plinio tamè quinque mestres foetificare scribenti, Albertus & experientia subscribunt. Non est ergò mirum quod M. Varronis temporibus, quinq; millia columbarum quandoque in uno peristerop-trophio colebantur, cum vel decem paria paucis annis in talem numerum excrecere queant. *Incubatio maris &*

i Farrol. l. 3.
de verust.
c. 7.
k H. A. l. 6.
c. 4.

l Athē. l. 9.
c. 16.

m Plin. H. N. l. 10.
c. 58.
n Arist. H. A. l. 6. c. 4.

o 4. de Ge-
nerib. c. 6.

p Oppian.
l. 1. de ve-
nat.

Aetas.
q Plin. H. N. l. 10.
r Arist. H. A. l. 9. c. 7.
s Athen. l. 9. Dipnos.

Vox.

Volatus.

sceminæ l perficitur opera, hæc noctu, ille interdiu incubat, de tempore inter scriptores non constat. Plinius, æstate octavo decimò die excludere putat, m vicesimo aliàs. Apud n Aristotelem, quod ovum prius editum fuerit, intra vicesimum diem & absolvitur, & excutitur à pullo. Pertundunt ovum pridè quam excludatur pullus. Alberto denique completur septem in utero diebus, fovetur per quatuordecim, postea fisso ovo, pullus exit. Experientia ab Aristotele militat, qui o etià cæcos & imperfectos, quod, quia pauciparæ sunt, copiam alimenti cum prole parere soleant, pari affirmat. Possunt ab ortu p versicolores haberi; si miscentibus jam oscula maritis, *Stragula flammeolis oculis rubrosque tapetes*
Et vestes ostro perfusas objicit auceps.

Vitam columbarum octonis annis Plinius q definivit; quos etiam alle- tricibus, excœcatis Aristoteles r tri- buit. Albertus domesticis viginti an- nos adscribit. Athenæus s ad triginta producit, fuit, quæ viginti duos annos vixit, & semper, excepto ultimo gene- ravit.

Vocem per γγγλίζω, γγγλίζω, πνυγλίζω, & πνυλίζω, quod Latini gemere, murmurare, & meditari dicunt, expressere Græci.

Volatum quod attinet, nullæ domesticarum neque longius domo, neque diutius abvolant, sed & altè per aëra

volitasse, in Paphlagonia Bellonius t t l. 6. de A- observavit, ut conspectum effugeret, vib. c. 23. seu ijs cum aëre tanta intercedit fa- miliaritas, ut securius in eodem degant: seu alia causa. Celeritatem mul- ti testantur n authores, hujus opera u Virgil. l. 1. uno eodemque † die victoria Tauro- s. Aeneid. sthenis ex Olympia Æginum parenti † Ælian. ipsius nunciata est. Sueta interfecta fi- variat. l. 9. des, ut Hircius & Brutus in x Muti- x Plin. l. 10. nensi obsidione, Leydenses in suas Ro- c. 37. mani in Circum vel Theatrum eun- tes, quæ vellent domum nunciaturi; * Ægyptij, Cyprij, & Cretenfes nau- * Bellon. l. tæ ad terram appropinquantes; Benê- 6. de Avib. ses † Cattiæ urbis incolæ eis usi tan- c. 21. quam tabellionibus fuerint; effecit. † Boter. in Frustra vallum & vigil obsidio per cæ- Relationib. lum eunte nuncio. Duplicatur cele- ritas, dum se à rapacibus insectari sen- tiunt. Sed & strepitum in volatu y y Virg. Ae- quandoq; edunt, quæ ostentatione, ut neid l. 5. vindæ præbentur Accipitri implica- tis strepitu penniis, & qui non nisi ipsis z Plin. H. alarum numeris eliditur. Speculatus N. l. 10. occultus fronde latro, & gaudentem c. 36. in ipsa gloria rapit.

Ad *Ingenium & Mores* Columbarum Ingeniū. a pertinet, quod cum bibunt, collum a Athen. non resupinant, sed quia breve & am- Dipnos. l. 9. plum, multarumque aquarum capax Plin. H. N. habent, largè jumentorum more bi- l. 10. c. 34. bunt, quod Arist. H. A. l. 9. c. 7.

— ubi mollia frangunt

Nubila, jam longum cælog, domoq;
gregata,

Si junxit pennas, diversoq; hospita
tractu

Venit avis, cuncta primum miran-
tur & horrent,

Mox propiusq; volant, socium jamq;
in aere ipso

Paulatim fecere suum, plausuque se-
cundo

Circumeunt hilares, & ad alta cubi-
lia ducunt.

quod corpus primò humectant, dein pulvere b sese conspergunt, sic à pu- b Arist. H. licib. & omni sorde mundantur, quod A. l. 9. c. 49 manè scæminas vagantes in nidum cō- pellunt, & incubare cogunt. Sæpè ex hac causa castigatio pigrius intrante scæmina ad pullos, c quod conjugii c Plin. H. fidem non violant, communemque N. l. 10. fer- c. 34.

fervant domum. Nisi cœlebs aut vi-
dua nidum non reliquit; & imperiosos
mares subinde etiam iniquos ferunt:
quippe suspicio est adulterij quamvis
natura non sit. Tunc plenum querela
guttur, sæviq; rostri cibus, mox in sa-
tisfactione exosculatio, & circa vene-
ris preces pædum orbibus adulatio.
Appetunt tamen maribus defunctis,
cujuscunq; coloris, non nigræ tatum,
quod proditum quibusdam, novas nu-
ptias; & si *d* domini jussu conjugia
permutent, pristino domicilio reddi-
tæ, prioribus spretis, novissimis adhæ-
rescunt, quin & nonnullas ex marita-
tis cum alijs coire Aristoteles dixit: &
ut nigræ apud Ægyptios mulier per-
petuo vidua, quod pulla semper ince-
deret significabatur: sic ingrati apud
eosdem columba, quod masculus val-
lidior factus, patrem rostro incessit, &
à matre abigere conatur. Huc etiam
pertinet, quod *e* mas adultos pullos,
cum ex nido tempus prodeunti est,
subigit, quod eis pavore perculsis (sunt
autem *f* timidissimæ) medæ nati-
um partes *g* tremunt, quod, dum etiam
sub mensis cum Gallinis conversan-
tur, hominum consuetudine se dele-
ctari ostendunt, quod deniq; Aquilam
sublimipetam ab humipeta discernere
i Ælian. H. A. 3. c. 45. norunt, & si hic invadit, in sublime
Arist. H. A. feruntur, si ille, deorsum versus ruunt.
l. 9. c. 36. Nectacendum, recens natis pullis vel
k terram salsuginosam, quam in locis
Arist. H. A. lotio conspergi fueris quærunt; vel sa-
l. 9. c. 24. lis ipsius *l* grana, seu ut livorem abi-
Ælian. H. A. gant, *m* ne fascinantium noceant im-
l. 3. c. 45. l Gomæsius preces; seu, ut ad recipiendos ci-
l. 1. de Sale. bos præparentur; seu, quod verisimil-
m Athen. limum, ut eis tam fecunditatē quam
Dipnos. l. 9. cibi appetentiam ingerant; inspuere,
corporis mundicie impensius studen-
tes, nidos à fimo repurgare. *n* Helxi-
n ne, herbâ ad evacuationem uti, lauri-
H. A. l. 1. nos ramulos tenues primum pro amu-
6. 35. leto colligere, deinde ad pullorum
custodiam nidis imponere. Colores
suos varietatemque dispositam nosse.
Memoriâ, ideo temporis, quando fœ-
minæ in cucubitu succedendum est,
† Rhodig. nunquam mas obliviscitur, † pollere.
l. 20. c. 10. Ita denique cicurari, ut & literas fe-
rant, & cibum ex auribus, quib. præ-

stigijs nebulo ille Saracenus Muhamē-
des usus est, capiant.

De Pugna satis est dixisse, in nidorum
vicinia mares pro uxoribus has pro il-
lis pugnare. Antequam coiverint;
mares adhuc cœlibes, suas alijs sub-
trahere conantur. Vidit & Avicenna
duas pro fœmina pugnantes; hæc vi-
ctori adhæsit; quem, pugna repetitâ,
deferuit victum.

Amicitia eis intercedit cum homi-
ne. Alliciuntur in columbaria & ma-
nent, si vel humano sanguine cum pis-
is integris in vase figulino circumacto
illinantur, & pisa deglutiant; vel cra-
nium hominis senis in iis *q* suspenda-
tur; vel lorum quo homo *r* strangula-
tus est, deponatur; vel lac mulieris pu-
ellam à bimatu lactantis, occultetur.
Cum capite capræ, quod excruciatū,
cum multo sale, & cumino Romano
coctum, ac ibidem depositum, eos re-
tinet. Cum Tinnunculo & vesperti-
lionibus ut suis locis expositum est,
deniq; cum vite agresti, peristerione,
saliva, carlina, semine viticis, & alijs.
Detinentur vel peregrinas adducunt,
si aliquid horum vel in columbario
sparseris, vel suspenderis in nido.

Inimicitias autem exercent, cum *inimi-*
circo, ad cujus vocem perhorrescunt, circa
quod vociferans invadat; *s* Milvo, *t* s. Honr. l. E.
Aquilis, marinis inprimis; Bubone, qui
ova exforbet. Noctua, corvino gene-
re, vulpibus, catis, Mustellis, *u* helle-
boro, albo, & dentibus humanis, *x*
quibus virus quoddam inest, quod &
fœtus implumes necat, tacito de a-
liis.

Affectus ipsorum sunt, Pulices & pe-
diculi, quibus nisi mudentur, maci-
lentæ evadunt; varioli circa oculos,
qui mense Augusto inprimis infestant;
& vitiligo ac lepra ob quam à Persis
pulas apud Herodotum *z* legimus.

De Vsu columbarum in Medicina mul-
ta prodita sunt. Ventriculo quia sunt
ferventiore, lapillos comestos confici-
unt; Margaritas eis exhibitæ poliri
a Cardanus prodidit. Pestiferis haud
corripit morbis, qui carne assidue in ci-
bo uti fuerit, ex Ægyptiorum accepi-
mus arcanis. Odor etiam sylvestrium
in aërem resolutus, ab Epilepsia & Pa-
raly-

d Aldrov.
Ornithol.
l. 15. c. 1.

e Arist. H.
A. l. 9. c. 7.

f Ezechiel.
c. 7.
g Tzeket
Chilia. l. 2.
433.

i Ælian. H. A. l. 3. c. 45.
Arist. H. A. l. 9. c. 36.
k Arist. H. A. l. 9. c. 24.
Ælian. H. A. l. 3. c. 45.
l Gomæsius l. 1. de Sale.
m Athen. Dipnos. l. 9.

n Ælian.
H. A. l. 1.
6. 35.

† Rhodig.
l. 20. c. 10.

Pugna.

Amicitia.

p Gesnerus

de colubis.

q Albertus

de Avib.

r Palladius

l. 3. c. 44.

inimi-

circa.

s Milvo,

t s. Honr. l. E.

u helle-

boro, albo,

x

quibus virus

quoddam inest,

quod &

fœtus implumes

necat,

tacito de a-

liis.

xj Plin. H.

N. l. ii. c. 37.

Morbi.

y Crescent.

l. 9. c. 90.

z Herodot.

l. 1.

Vsus.

a de varie-

tate Rer.

Columba Indica rostr.




Columbus.



Columba sylvestri.



Turtur Indicus.



Columba Cypria




Turtur.

Alchata siue Fracotona.



Columba domest.




Columba hirsutis pedibus maior.

Columba Cypria.




Columba Linia.



Oncas Seu Vmago.




Turtur.



Columba domestica Varijs coloris.



Columba Cypria.



ralysi, si Villanovano & Abenzoari credimus, præservat. Cerebella cæcitatem inducendi proprietatem habere, metuo ne falsò, dicuntur, medicamentis venerem promoventib. rectè præscribi, certum. Sanguis *b* cruorem membranis cerebri emanantem cohibet, & oculis *c* suffusus eximie prodest. Lusciosis benè illinitur. In masculis efficaciori Hierocles eundem medicamento adstranguriam Equi admiscet. Adeps ad dysuriam cõmendatur. Pennæ primum enatæ & cum urtica ustæ podagræ dolores leniunt, ut Marcellus author est. Ovis rectè condyloma fovetur; sed desiderare ante æger in aqua debet, in qua verbenà decocta est. Fimus tanti est fervoris, ut ignem sæpè concipiat, & in

nimio usu gignere, Simeon Sethi; Cynanchen inducere Rhafis, meminere. Quod verò *q* Varronis tempore, singulorum pullorū paria ducentis nummis, & si eximia essent, singulis millib. festertiorum vendebantur, quòd *r r de Re Ru-* Columellæ diebus sunt inventi, qui *stic.* quaternis millibus nummūm binā paria mercabantur; quod deniq; *s Plin. H.N. l. 10. c. 37.* ante bellum civile Pompejanum denarijs quadringentis singula paria venditasse scribit, luxuriæ potius & delicijs quam usui adscribendum est.

ARTICULUS II.

De Columbīs Domesticis.

GENERA columbarum tria Varro *b Genera.* posuit. *Vnum* agreste, seu saxatile, quod in turribus & culminibus vil- *b l. 3. de ru-* læ habetur, quod falsò Perottus *rust. c. 7.* esse credidit, quidam malè cum illo saxatili, quod in agro Bononiensi capitur, prorsus ferum, saxatilibus Varronis majus, coloris lividi, rostro rubicundo, conferunt, quodq; *c Ga-* leno *roµas & βόσκας*, dicitur. Alterum cle- *c l. 10. de Compof. simpl. Me-* mentius, quod cibo domestico contentum, intra limina januæ solet pasci. *dicament.* *Kατομίδον* seu Domesticum Galeno. Tercium ex his stirpib. Miscellum fructus causa. Aristoteli sex sunt species, nempe, *Columba*, *Oenas*, *Gazæ* vinago, *Phabs*, *Phassa*, *Pelejas*, & *Turtur*. Aldrovando verò ex magnitudinis ordine, *Phassa* primum, *Phabs* secundum, *Oenas* tertium, *Columba* quartum, *Livia* seu *Pelias* sextum, *Turtur* postremum locum occupat. Palumbum Pyralidem, Columbam, & Turturem, nihil inter se similitudinis habere falsò à Callimacho *f* dictum, in sequentibus *f Æliad. l. 1. varia. hist. c. 15.* exponetur. In Sylvestres & Domesticas commodissimè distinguuntur. Et Domesticæ quidem, si Differentias attendas coloris, magnitudinis partium, & coitus, ratione variant. Fuere in insula Capitis viridis & Madera sylvestres adeò mites, ut domesticarum more se capi manibus paterentur. In Therapne maximas nasci ait Perottus, Spoleti per exiguas. Tantum duo-

M decim

b Dioscorides. c Galen. de Simp. Medic. c. 3.

d Galen. l. 9. de Tempore.

e Gesnerus de Columbis.

p Libro de interm. affectib.

q de Re Rustic. l.

g Athen.
Dipnos. l.
9. c. 16.

h Aelian. l.
4. de Ani-
mal. c. 2.
i Scaliger.
exerc. 231.
c. 7.

d Plin. l. 10
H. N. c. 17.

decim passuum millia efficiunt discrimen. Habentur in Norvegia totæ albæ, quas & alibi vulgarissimas conspicias. In g Græcia eo primum tempore visæ sunt, quo Persicus exercitus circa Athon montem interit. In Eryce h Siciliæ ingens numerus unum rubrum tanquam Ducem sequitur. In Persia i deniq; Columbi si qui sunt, oblongo & anserino illi sunt collo. Genera tam indigenarum quam Exoticarum plurima apud nos sunt, quæ an veteribus cognita fuerint, jure dubitari potest, etiam si Romanos Columbarum amore infaniisse d Plinius prodiderit. Sunt Gutturosa vulgaribus domesticis duplo ferè majores, pedibus hirsutis, quæ inter volandum, & dum murmurant, fauces in ingentem tumorem inducunt, Plinij Campanas dixeris. Aliæ Cypriæ, seu ut Gesnerus nominat, Rusticæ, Anglicæ, Monachicæ, seu Ferrariensis, ex quib. quædam Cucullatæ, cristam gerunt, & pedes vel pennis ornatos vel nudos habent: quædam crista carentes, rostro sunt admodum exiguo, & pedibus nudis. Aliæ Turcicæ & Persicæ colore toto pullo seu betico, præter oculos, qui miniaciei, pedes qui pallidè rubent, & rostrum, quod lutescit. Aliæ Indicæ rostro Anatidis, nihil præter pedes, & magnitudinem cum columbis commune gerentes, quarum illa quam Aldrovandus Vienna acceperat, rostro albicabat, circa nares rubescebat, postremò serpentum instar subcæruleis & nigris maculis, quæ per totum fermè verticem producebatur, variegatum erat. Sub oculis macula longa alba totum caput tanquam torquis ambiebat. Aliæ, quæ, quod in honorem scæmellæ, vel sue vel aliarum post longa murmura à terra sese elevent, & ultra illas volando alas quatiant, Belgis Overslagers dicuntur. Aliæ Gyrratrices, quæ, dum in orbem supra scæmellas maximè obvolitant, tam fortiter alas quatiant, ut duorum asserum simul collisorum sonitum superent. Unde remiges earum pennæ semper ferinæ fractæ conspiciuntur. Aliæ Galeatæ, quarum caput, cauda, remiges, semper alius coloris sunt, quàm reliquum corpus. Ta-

ceo hic monstruosas, quarum una in Germania propè pagum Rikenhoven capta, præter quatuor pedes, duplicem alvum habebat; altera duplici quoque alvo Bononiæ nata est; tertia bicorpor quodammodo erat, ex uno nimirum corpore, alterum par pedum remittens, cum reliqui duo alteri corpori perfectè ineffent.

ARTICULUS III.

De Columbibus Sylvestribus.

PUNCTUM I.

De Palumbis.

Sylvestres columbæ quæ sint, præterito ex Aristotele articulo recensuimus. Primus ex illis Palumbus, qui vel Major, vel Minor. Hic Phabe Philosopho dictus, à nemine hætenus descriptus est. An ille sit, qui in Marchia Anconitana Palumbo vocatur, incertum.

Maiorem Græci φάσαν, Attici φάσαν, Nomen. moderni φάνα, Niphus Torquatum, Servius, Titum vel Titium; sed per hos fortè vultures intellexit Persius ut Aldrovandus opinatur; Villanovanus Cadonem vocant. An Generis diversitatem admittat, nondum liquet. Hispani a in quadam novi orbis insula a Martyr. grandiores nostris. Gustu & sapore Decad. O. meliores Perdibus quia aromaticum ceani l. 10. spirabant, odorem, & quarum dissecta, ingluviens floribus plena deprehensa, invenere.

Corporis crassitie ad Gallinas prope- Descri- modum accedunt, magnitudine haud ptio. multo minores. Color est cinereus, caput ex rubro & cæruleo mixtum, alæ in lateribus maculis albis insigniuntur, torquis coloris est à capitis, dorsique colore diversi. Ingluviem b ventri- b Arist. H. culo præpositam habent. Ideo bene A. l. 2. c. ult. Plinius, Aves quædam sinum unum habent, quo merguntur recentia, ut guttur alterum, in quem ex eo demittunt, coctione maturata, ut Palumbes. Testes, cum Venerem exercent, insigni magnitudine augentur; hybernis mē- sibus, ne ullos quidem habere arbitrantur nonnulli.

Locus. Locum si species, nullibi noti non sunt. Apud Delphinates, & Vesates Aquitanos, magnus eorum provetus. Rarò humi insidere visè, arboribus vel editoribus locis delectantur. *d* Aristoteles dum campestres vocat, per loca campestria; illa quæ arboribus confita sunt, intelligere videtur. Migrare prodidit Plinius, *e* nec abnuvit experientia. Nechybernare quidem apud nos sese pati, falsò apud *f* Aristotelem dicitur. Nam si repidiora defuerint loca, in angustis montium jugis sese recondunt. Ideò verno tempore deplumes conspiciuntur. Phattas semper conspici, quòd apud Aristotelem extat, error est. De Phabris id intelligendum Athenæus innuit.

Nutritum. *Cibus* eis inprimis Fabæ. Unde Fabarianum apud Petrarienses nomen, in Gallia glandibus sapius, cum ilicis cocciferæ tum suberis; ilicum viridiū, nec non fragorum repletum invetum in Gallia stomachum, Bellonius affirmat. Hinc Glandiferarum appellatio. Alicæ vehementer saginantur.

Generatio. *Coeunt* & foeticant *g* trimestres, unde tanta ipsarum copia. In Venerem accensæ, mutuò sese ante initium *h* exofculantur. Ante veris ingressum, intenso adhuc frigore nidificare, & plumas sibi, ut pulli calidius recumbat evellere, ex inspectione, an authoritate. Alciat. *p*didit. *Nido* locus arbores, juniperi inprimis, si *i* Theocrito credimus. Bis quotannis parere ex Plinio *k* habemus; semel ex *l* Aristotele. Terna plurimum pariant *m* ova. Sed *l* H. A. l. 6, quamvis tot peperint, nunquam plus *c* 4. duobus educunt. Tertium quod irritum est, Urinum vocatur. Palumbes incubat fœmina post meridia, in matutinum cætero mas. Incubatus

n citius quam à columbis perficitur. *A. l. 6. c. 4.* Decem & quatuor diebus uterum ferunt. Totidem iterum fœtus, sed *o* de Generat. cæcus & imperfectus involucris evadit, atq; perficitur. *Vivere p* palumbes ad XXX. annum, aliquos ad XL. habemus auctores, uno tantum in cōmodo unguum eodem & argumento, senectæ, qui citra perniciem recidunt. *Marem* prius mori *q* credunt, cum

in avib. cæteris fœminæ prius abeant. Salacitas fortè in causa. Nam & in passerum qui salacissimi genere idem contingit.

Quantum ad *Vocem* gemere Philomela auctore, minuire Spartiano dicitur. Cantus omnibus similis, inquit *r* Plinius, atq; idem trino conficitur *r* H. N. l. 10. versus præterquam in clausula gemitu. *c* 35. Hyeme mutis, vere vocalibus. Audiunt tamē, si ex asperissima hyeme placidum & serenum tempus successerit, si auri to testi Nipho credimus. Genere ordinariè vere *s* incipiēte, & nisi cōfesto solstitio incipiunt. Sic hujus tempus indubitatis notis signavit natura. Er vox rusticis præsentis veris signum habetur.

De corporis affectibus nil occurrit, Morbi unguum in senectute incrementum, de quo supra, si exceperis.

Sed nec de *Ingenio* & *Moribus* multum. *t* Amisso corporali consortio solitaria incedunt, nec carnalem ultra copulam requirunt. Adulterio corruptæ, *u* corruptorē, si assequi possunt, *u* Porphy. interimunt. Ingenij sunt simplicis, *l. de Abstinentia.* ideò in eorum nidis deponit ova cuculus; & Plautus hominem ignavum, Palumbem vocat. Vulnere denique accepto *x* origanum imponunt, & ad *x* *Ælian.* sanitatem redeunt. *H. A. l. 5.*

Invenere & in *cibis* & in *Medicina* *c. 46.* *Vsum.* In Carani nuptiis appositas *Athenæus;* *y* in Nasidieni convivio sine *y* *Dipn. l. 4.* clune ceu lautiores Horatius meminit. Carnes in fluxu mensium pituitoso Hippocrates: *z* in tympanite *Tral-* *z* *l. 2. de morb. quæ* *lian;* in Elephantiasi Aretæus, in comelio affectu Aëtius; in pestilentia Alexā- *her.* der Benedictus, in dysenteria & colica Plinius præscribere. M. Cato Censorius ægroris exhiberi voluit. Paulus tertium inter aves locum eidem assignavit. Venerem propter glandium esum extinguere, creditum quibusdam. Oculi, quia confossi renascuntur, ad vulnera oculorum & cicatrices *a* *a* *Porta l. 1.* commendantur. Jumentorum vermifatio finitur, *b* ter circumlato verendis Palumbo, palumbus emissus moritur, jumentumque liberatur confestim. Sanguis vulnera purgat. Fimus urinam provocat, & calculo in *M 2* faba

fabasumptus resistit. Lapilli in ventriculis inventi, contriti, potioni contra eosdem insperguntur.

PUNCTUM II.

De Oenade seu Vinagine, Alchata seu Filacotoa Arabum & Columba Livia.

Oenas Tzetzi *Ο'ονιδ*, non tam *Σκρὸ τῶν* *ivῶν* à fibris carnis, quæ dura, & nisi terg^o detraxeris esui inepta est; quam, vel à colore uvarum nigrarum maturarum, quas *διωσπὸν* Græci vocant; vel à vindemiæ tempore, quo & conspicitur & capitur; unde Lycophroni *οὐρότεπος φασ*, dicitur. Gaza vinaginem, Josephus Scaliger Vinitorculum, alij vinfiram, Julius Scaliger Rupicolam, vocavit. Major est columba: *Rostrum* habet, si Oenas est quam Aldrovandus exhibet, cinnaberinum; longum, in extremo acutum. *Caput* totum ventrem & alarum pennis cinerea. Remiges notabilis magnitudinis & nigricantes. Cervicem, intercurrentibus plumis nigris viridem. *Caudam* versus Vropygium cineream cætero nigram. *Pedes* rubros.

ALCHATÆ quam cum Filacotona eandem Aldrovandus facit, alæ sunt oblongæ, pennæ & plumæ coloris cornuicæ, cutis extrema dura, in Syria pedes nigri & breves. Ad eam proxime accedit illa, quæ nomine Angeli Monspeffulani venit, quamq; Perdici per similem, rostro & pedibus nigris, plumis ex fusco colore in nigrum vergentibus, & luteis in rufum, esse Rondeletius ad Gesnerum scribit.

COLUMBA LIVIA Alberto Cavernalis, Græcis *πέλειας*, ex descriptione Gesneri, est columba domesticæ minor. *Rostrum* ipsi albicat, & circa nates parvum purpurei habet. *Collum* primum ad latera habet pro diverso ad lucem posita variè splendens, in se partim subviride partim purpureum. Supinum ex cinereo tale. Plumas ubiq; cinereas, alarum pennis quatuor longio-

res cinereas, medias, partim cinereas, partim ad extrema nigricantes, ultimas dorsum versus subruffas. Pedes rubros.

Vescitur glandibus & granis. *Nidificat* in arborum cavis & templorum muris. Migrat, & in cibo, palumbo tantum tenerior, præfertur. In India, pro-dente Aeliano, virides pennas habet, Psittaco simillima: Cruribus & rostro Græcam refert Perdicem.

PUNCTUM III.

De Turture

Turtur in Columbaceo genere ultimo loco ponitur. Tria aut quatuor earum in Hispaniola observata genera. Visæ in locis frigidioribus, & nivosis candidæ & in Aquitania duas ejusmodi se vidisse testatur a Scaliger. Turcarum verò Imperator, parari & peculiaris generis Hærico Galliarum Regi transmisit. Ex Alexandria diversi à nostratibus adferuntur coloris. Observatum & nostro ævo quoddam genus, cujus foemella candicat naturaliter; mas coloris est cinerei ad subruffum vergentis, habetque torquem nigrum.

In *Descriptione* non est quod immoremur. Falsò Orus Apollo soli inter omnes volucres dentes & mammas tribuit. falsò b Ovidius nigrum dixit. *Collum* torquis ambit longè aterrimus, viridibus maculis conspersus, ante vix conspicuus. *Alæ* sunt versicolores. *Dorso* & pectori vicinæ elegantissimo colore rufescunt, nigris, quarum extrema viridia, intercurrentibus. Hinc virides cum ruffis marginibus sequuntur. Remiges sunt atræ; si albi aliquid occurrit, in extremitate illud est. Foemina c nisi interiorum aspectu difficulter cognoscitur. Ex *Indicis* foemina, pedibus exceptis, qui rubri, & rostro quod nigricans, tota est candida. Mari caput, collum, pectus alæ ad remiges, dorsum ad Vropygium dilute rufescit, nec ulla macula respergitur. Iris in oculis miniaceo colore resplendet. Torquis tenuis & nigra circum quoque collum ambit. Venter propè anum

Differētia.


a Scalig. Exerc. 19.

Descriptio.


b Ovid. in Epistal.

c Arist. H. A. l. 9. c. 7.


Turtur




Fringilla



Chalandra




Montifringilla




Alauda non cristata



Fucdula



Fucdula Canabia



anum lutescit. Pedes rubei tabellis albicantibus ornantur.

Locus. Nullibi ferè non videntur, rarius alibi vel frequentius. In Æthiopia tanto numero per aëra volare traduntur, ut nebulas effundant, & solis radios impedian. Apud Tartaros quia in cibis prohibita, abundant. Sed & Peru numerosè eas alit. Morantur ferè semper vel in montium jugis vel ultimi aut aliarum arborum cacuminibus Hyeme vel latent, vel tepidiora loca petunt. Unde Trimestres, quod totidem mensibus nobiscum agant. Plinio. Cum ad Italiam veniunt, in Pontijs insulis, primà volaturâ quiescendi causa paucos dies morantur. Redeunt ad nos adventantis veris nuncia, cum jam prolem fecerunt.

Nutritum. Vescuntur e frugibus, glandibus & olivis. Milio vehementer delectantur. Arist. H. f. Ætate sua sponte dummodo sit factas cibi, hyeme offa panis vino madefacta pinguescunt, & si novella sunt ætate, in tantum, ut pinguedine suffocati intereant, tanquam nimio infartu elisis faucibus.

Generatio. De Generatione eadem ferè quæ in Palumbis occurrunt. Bis anno pariunt, & trimestres fœtificans. Mas & fœmina vicissim incubant. Nidus inter densos arborum ramos ex duris & nodosis lignis construitur. Indicè quotiescunque ova rumperentur, nova pariebant; fortè non facturæ, si illa exclusissent. Proprium omnibus crepitus ventris; & cum vocem edunt, novissima pars alvi vehementer citatur.

Actas. Octonis annis vivere, reliquit Aristoteles; quindecim iisdem cubare Bartholomæus Anglicus.

Vox. Gemere Latinis dicuntur; Græcis τρυγῆν, quibusdam séven. Tum volatuum pedibus plurimum valent.

Amicitia. Amicitiam colunt cum Psittaco, & Merula, Pavonibus.

Inimicitia. Inimicitiam k cum corvo, & chloreo exercent. Helleboro, quo columbæ intereunt, propter peculiare temperamentum impune vescuntur; malopunico trito perimuntur.

Ingeniū. Ad Ingenium pertinet, quod si mori alterutrum contingat, l a secundis nuptijs abstinere, soli volare, nec ra-

mis frondentibus insidere, nec limpida aquam bibere, nido suo contra lupi incursum, m squilla folia, quæ isti fugere consueverunt, superjacere, & gladiolum seu tanquam fascinationis amuletum comedere, seu nido imponere; qua fide non addo; prodatur.

Vsum quod spectat Aegyptij ijs, n Vsum. quod Accipitris sacri sibi alitis unguis aliquando evaderent; abstinebant. Martialis, n cuius ævo capita Tur- n Porphy. turibus amputabantur, clunes laudat. l. 4. de Abstinent. l. 7. Epigr. Vulgus pingiores commendat. In Medicina idem quod Palumbes præstant; Fimus albugines extenuat. Facilitatur partus, si tribus juniperi septem lauribaccis, cum cinnamoni drachma, & corticis cassiæ drachma una & semis farta affata & pinguedine Gallinæ ad ignem inuncta; vesperti bis in hebdomada sumatur. Non tangi venereis, qui in corio lupi cor Turturis delatum gustavit; falsò a Mizaldo proditum est.

ARTICVLVS IV.

De Passeribus in genere.

Passer, Græcis περδοι, δρυγες, δρυγῆρες, Nomen. δρυγες, Macedonibus δρυγες; Eleis, a a Athen. δρυγῆται, alijs ἐλλόποδες & ἑλωι, ut apud He- dipnos. l. 3. sychium extat, dicuntur. Eidem σμυγδρυγ passerulus est.

Aristoteles vix alios præter domesticos novit: idè omnia quæ de illis

scripsit, hisce conveniunt. Athenæo ex Alexandro Myndio, alij sunt sylvestres, quorum fœminæ corpore sunt debiliores, rostri colore magis testaceo, facie id est anteriore parte, nec nigra, nec valdè alba; Hollandorum fortè lignipetæ; alij Domestici, qui περδοι πύργων b Galeno, ἀπὸ πύργων modernis Græ- b l. 3. de A- cis. Alberto sunt quidam in vertice ment.

rubri, in cavis arboribus nidulantes. Videntur & albi, & semper, si c Pfeu- c infecret. do Aristoteli credimus, tempestatem fecret. nunciant conspecti. Sunt in insula S. Thomæ virides, d canoti. Meminit d Scalig. Avicenna e cuiusdam, qui quindecim diebus continuis in principio veris suavissimè cantillet, post colorem

immutet, mutescat, & sese abscondat. Est in India *Passer Nocturnus*, qui noctu volat, interdiu quiescit. Hirundinibus est alis & volatu similis, ex cinereo niger, nisi quod in medijs alis albam habeat fasciam. Noctuam odio ingente

f H. A. L. 9. prosequitur. Fortè Aristotelis f *Colaris*, quem ab ulula capi affirmat, vel A-

c. 1.

ctuarij *Passer sylvestris* magnus, in summis fruticum furculis desidens, colore & magnitudine *Alaudæ*, voce garrula, hyeme latens, quiq; à Noctua capitur. Sunt ibidem & *Turdo* minores, velocissimi volatu, qui aquas sequuntur, & natant. Sunt & alij de quibus inferius dicitur.

Descri-
ptio.

Descriptionem non est, quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsis gula, nec ingluvies, sed ventriculus longior. g Adimum intestinum paucæ appendices visuntur. Fel alis ventri, alijs intestinis jungitur. Nulli bi non inveniuntur. In Media h tanta aliquando eorū copia, ut incolæ, quia semina terris concredita absumberant, aliò commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia, sæpè una die in uno cerevisiariorum granario aliquot cēturiæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare, Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere, fœminas permanere, ex eo quod color in ipsis mutetur, collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit; quod, mares vere, calore tam interno quam externo accrescente, quādo iterum calor accrescit, conjuges suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

Nutri-
mentum.

Vicitant grans jactis in terram seminibus milio, muscis, formicis, grillis, scarabæis, vespis, apibus delectatur & hordeo, cujus corticem celeriter à grano separant. Sed nec grana sambucirejiciunt. Et hyosciami semina absque ullo detrimento, seu propter venarum exilitatem seu causam de Coturnice redditam, devorant.

Genera-
tio.

i Exercit.
269.


Generationem quod attinet, salacissimi esse comperiuntur. Vidit unum Scaliger in cavum quoddam plus decies ad fœcellam quam iniret, ex adverso muro, pusillis interpositis mo-

mentis advolasse. Vidit. k Aldrovandus alterū, qui longè minori quam horæ spacio, vigesies fœminam inivit, pluries initurus, nisi ista locum mutasset. *Nidulantur* vel sub tegulis tectorum, vel in foraminibus parietum, & ut pulli mollius cubent in fœno & plumis. Occupant & hirundinum aliquando nidos. Unde apud Ægyptum oblimum, quem invehit Nilus, cum hirundinibus artem parietum è luto construendorum invenisse, creduntur. Pariunt cæcos & imperfectos l pul- l Arist. 4. de los: bis terve quotannis, octo ad sum- Gener. c. 4. mum, quatuor ad minimum, ut plurimum septem.

Aetas passerum diversimodè definitur. Mares negantur anno diutius vivere, argumento, quia nulla veris initio appareat nigrigudo in rostro, quæ ab æstate incipit. Fœminis longiusculum spacium, ait, Plinius. m Al- m Plin. H. bertus id à tempore coitus computat. N. l. 10. Scaliger n nullum excedere bimātū, c. 38. verisimile esse credit. Ex illis, inquit, n in Arist. parum captatur, minimum capitur; de plantis. fœcundissimi sunt, frequentia nō magna. Aldrovandus eam ad quadriennium extendit, quod columbæ etiam salacissime, decimum sextum imò plures attingant. Cognoscitur ætas ex rostro, cinereum hoc, & circa fauces croceum juvenibus, nigrum ac durum provectis. Vox eorum apud Græcos est *εργίζεν*, quod stridere vertitur. Apud Homerum *ερίζεν*, apud authorem Philomelo pipere. Rhadivus cantillare dixit. Cum gradiuntur, saliant.

Ingenium si attendas, ita sunt timidi Ingeniū. o ut sæpè à somno excitentur, ad do- o Ael. H. A. morum fastigia concurrunt, ut à su- l. 7. c. 19. spectis casibus reddantur alieni, qui multis periculis probantur obnoxij. Visus p qui ab Accipitre impetus in p Idem Var. Xenocratis sinum confugit. Tapro- Hist. l. 13. banenses q in alto mari emissos, ter- c. 31. ram peturi, sequuntur. Evadunt in- q Acofta. l. terdum ita domestici, ut ad puerorum i. Hist. ind. manus vocati advolent. Ad Noctuam confugere, dum aucupis artes effugere conantur, quod Orus Apollo prodidit, falsum. Quid ijs cum nocturnis avibus?


Gerunt & *Inimicitias* cum Vulture, Inimi- r Mu- citia.



Passer.




Passer.



Passer montanus.



Passer stultus.



Canarius.
Canariinogel.



Passer solitarius.
memlus
steinamsel.



Passer sylvestris.
ringelspatz.



Passer domesticus.



Passer falvus.



Passer maculatus.



Passer montanus.
alius.



Passer albus.



P. Albiella.



Passeris species.



Pajerculus Brachyirras.

r Barthol. *r* Mustela & alijs. Calamodyles, qui
Angl. l. 12. ex Passerum genere esse videtur, folio
c. 33. cedri perit. Pestem à milio atq; pa-
s Æl. H. A. nico, Sturnorum, Passerumve agmi-
l. 6. c. 46. na, scio abigi herba, cujus nomen est
 ignotum, in quatuor angulis segetis
 defossa: mirum dictu, ut omnino nulla
 avis intret, inquit Plinius: Eodem re-
u Plin. H. ferente *u* multi ad remedia ejusdem
N. l. 18. segetis rubetam noctu arvo circum-
c. 17. ferri jubent, priusquam sarriatur, de-
 fodiq; in medio inclusam vase fictili:
 ita nec Passerem, nec vermem nocere;
 sed eruendam priusquam metatur,
 alàs amarum fieri.

Vfus. *Vfus* Passerum in *cibis* rarus. Gale-
 nus tamen eos alibi cum columbis,
 Perdiciibus, & Phasianis inter cibos
 attenuantes numerat. Alibi autumnò
 maximè laudabilem carnem habere
 testatur; & Suidas in delicijs habitas
 prodit. At Platina *x* ob nimiam ca-
x Platina liditatem malè alere, difficulter con-
l. 5. coqui, & libidinem excitare ponit.
 Invenere & in *Remedijs* locum. Caro

z Plin. H. venerem *z* excitat; & ritè Epilepti-
N. l. 30. c. 15 cis, Tympaniticis, renum *a* calculo,
a Galen. l. vel articulorum vitio laborantib. præ-
l. 6. de sani- scribitur. Idem de cerebellis & ovis
tate tuen- prodidere scriptores. Adeps Nicolai
da. c. 2. ad top hos Emplastro inferitur. Fimus,
b Porta l. faciem purgat; quæ facultas ex mari-
5. Phyto- bus agnoscitur, *b* quòd guttatim al-
gnom. c. 16 bis, & nigris punctulis distinguantur.
 Idem cum vino potus virgam erigit.
 Cum sputo hominis illitus, varices ex-
 tirpat, cum adipe porcino inunctus
 alopeciam sanat. Stomachum exsolu-
c Archigen. tum & nauseabundum *c* inspersus cor-
apud Ga- rigit. Cum oleo calefacto proximæ *d*
len. l. 8. sec. auriculæ infusus, dolorem dentium
locac. 4. pellit. Cinis denique pullorum utili-
d Plin. H. ter ad eundem infricatur.
N. l. 30. c. 3.

De Passeribus in Specie.

PUNCTUM I.

De Passere Albo, Flavò, Ma-
 culato, Albicilla, &
 Montano.

Passer *Albus* totus est candidus, ro-
 strum, pedesq; quæ partes flavæ

sunt, si excipias. Oculorum etiam ni-
 gram pupillam lutea iris ambit.

Flavus ad Aldrovandum delatus,
 totus erat flavus, præter oculos, qui
 nigri. supra per dorsum, caput, alas, &
 caudam ad castaneum vergebat colo-
 rem. Quali etiam femora, tibiæ, & pe-
 des tegebantur.

Maculatus qui dicitur, albo, nigro,
 & subflavo constabat colore. Caput
 totum, ac collum alba, intercurrenti-
 bus maculis subluteis. Rostrum erat
 flavescent in superiori parte, in infe-
 riore omnino flavum. Alæ tribus præ-
 dictis coloribus ornabantur. Oculo-
 rum iris candida. Cauda tota penè
 flava erat.

Albicilla rostrum & cauda ex cine-
 reo candicat. Caput & omnes infe-
 riores partes ex alba lutescunt. Dor-
 sum maculæ coloris ferruginei ample,
 lineolis admodum candidis, exiguis
 decoratæ, percurrunt. Pennæ alarum
 castaneæ sunt, circumcirca luteæ, ti-
 biæ pedesque fuscæ.

Montanus est omnium Passerum no- *Aldrovand.*
 stratum pulcherrimus. Vertex capitis *Ornit. l. 15.*
 est coloris ferè puniceï, vel potius ca- *c. 15.*
 stanci. Mentum, ut vulgaribus atrum;
 inter quod & verticem color albus est,
 qui descendens totum ventrem occu-
 pat. Ad oculorum latera maculæ sunt
 binæ, una altera major, utraq; nigra.
 Dorsum atq; alæ partim flavæ, partim
 nigræ. Alæ, qua ventrem contin-
 gunt, modo ferrugineæ, modo atræ,
 modo albæ. Cauda tota ex luteo fu-
 scescit. In fœmina sunt omnia palli-
 diora, & mentum eam maculam non
 habet.

PUNCTUM II.

De Passere Sylvestri, Torqua-
 to, Pusillo in juglandibus degen-
 te, stulto Bononiensium,
 & Illyrico.

Passer *Sylvestris* verticem capitis ha- *Aldrovand.*
 bet ferrugineum ad cinnabarinum *Ornit. l. 15. c. 16.*
 vergentem. Oculorum ambitum al-
 bum, iridem flavam. A mento ad po-
 dicem cinereus est, sed plumarum ex-
 tremi-

tremitates ad subrufum inclinant. Mentum & collum inferius lineæ admodum continuæ, transversales. Nigriusculæ percurrunt; cum aliâs in omnibus Passeribus maribus totum atrum statuendum sit. Dorsum, cauda, & pedes ex ferrugineo fuscescunt, nisi quod pennæ in extremitatibus suis omnino sint luteæ. Alæ eundem colorem exhibent, sed pennæ primæ costas obtegentes, in notabilem desinunt candorem.

Idem lib. c. 18. *Torquatum* Bellonius ab albo torque oculos sub supercilio ambiente vocat. Macula ei lutea est. Dorsum & alæ cinerea. Habitat in sylvis, in cavis arborum nidulatur, vocem edit magnam, & aliter se & pullos, quam is, qui in urbe degit, alit.

Passer in juglandibus degens omnium est minimus. Rostrum admodum brevi, nigro, crasso; pedibus, cruribus, capitibus, alis, Passeri murali similis.

Idem c. 20. *Passer stultus Bononiensium*, est avicula habitu Passeribus similis, sed colore diversissima. Totus namque; flavescit, maculis ubique; ferrugineis, aut potius ruffis, oblongis, sed per dorsum multo longioribus & crassioribus, ubique; deorsum descendit. conspersus. Rostrum ipsi est rufum, crassum, curvum. Oculi majusculi, quorum pupillam lutea iris ambit. Cauda & alæ ad nigrum vergunt; extremitates tamen pennarum minorum in alis candidæ sunt, pedes toti ex luteo rufescunt.

Idem c. 21. *Illyricus* nostratibus major est, colore ferè similis. Pronus enim planè candicat. Supinus pallidè rufescit, nullo intercurrente alio colore. Oculi & rostrum, quod cādicat, pro corporis proportionem sunt magni. Cauda bifurcata, pedes lutei, lineis transversalibus coloris penè carnei ornati.

His adde *Passerculum Brachyurum nostratem*, cui cauda admodum brevis. Totum corpus flavescit. Pectus & venter magis albicant, Rostrum intensius luteum est.

Idem c. 17. Sed & avicula *Passeribus congener* huc referatur, cui rostrum, ut in domesticis, candicat, totum corpus maculis subruffis, oblongis, deorsum descenditibus tingitur. Venter ac femo-

ra albescunt. Tibiæ, pedesque subflavi sunt.

PUNCTUM III.

De Passeribus Indicis.

PAsseres Indici sunt varij, sed præcipua ipsorum genera sunt quatuor. *Aldr. Or. mth. l. 15.*
Vnus est macrourus, & hic duplex. Alius ro- *c. 22.*

stro miniaceo magnitudine domesticis, caudam si excipias par, rostro brevi, crasso, & prædicti coloris. Capite plano propè cervicem elevato, intercurrente sub viridi ad cæruleum vergente colore, subnigrum. Guttur, collo inferiore, pectore & ventre candicantibus. Alis sub viridi ad cæruleum vergente, albo, nigro, & lutescente colore tinctis. Cauda duplici minore nēpe, alba, quæ majoris fulcrum; & majore quatuor pennis longitudine dodrantale angustissimis constante aterima. Tibiis & pedibus ex nigro & albo maculatis, unguibus nigris & acutissimo hamo armatis.

Alius rostro cæruleo, cui caput ut in il- *Idem c. 23.*
lo planum, sed in cervice magis elevatum totum nigrum. Oculi nigri, circulo albo circumdante, & inde lutescente. Collum & pectus coloris coccinei; venter & coxæ candicant. Alæ, tergus, & caudæ nigricant. Caudæ longiores pennas, quæ sunt binæ longissimæ quinque; nimirum palmorum, & latissimæ, tertia primum etiam lata, sed in exilia admodum filamenta desinens, minores alæ sustinent.

Alter est Brachyurus superioribus om- *Idem c. 26.*
nino dissimilis, minor nempe, & præter pedes & rostrum, quæ carnei coloris, totus niger. Cauda brevior. Oculis nigris, albo circulo cinctis.

Tertius est sine Propygio, & hic vel E-
rythromelanus, in quo totum corpus pronè & supinè, item alarum principia coccineo colore splendēt. Reliquum alarum atrum est. Rostrum pro corporis proportionem exiguum, & domesticorum rostro minus, colore quæ capiti jungitur albo, cætera nigro, acutum & exile. Uropygium nullum. Inde ex ejus pennis opera plumaria *Idem c. 27.*
conficiunt: vel *Cyaneris erythromelanus* su-

perio-

Passer Indici.
Indiansche Sperlinge.



Emberiza indica Indica.

Passer Indico.


Passer Indico
alvus

Emberiza alba

Emberiza pratensis femina.

Emberiza pratensis mas

Emberiza. Embritz wilbling
Gorlgorst.



Carduelis. Distelfinck.

Emberiza pratensis.
Wismertz.

Prunella.

Linaria Rubra.

Stockhenfing. Linaria.

Henfing
Flackffinck.

Fringilla. Finck.

Fringilla montana.

Acanthopneuste
Gaza Spinus et li
gurius. Orca.
Ziesel.

Citrinella.
Citrinle.

Carduelis mas.

Chloris.
Grünfinck.

Serinus. Girliz.
Fedemlein.


Fringilla. alba.

Ligurinus alius

Carduelis cilijs albis.

Fringilla
sublutea.

Canaria.
Zucker Vogel. Canari Vogel.



Idem c. 28. *Quartus Porphyromelanus*, cui, caput, dorsum, Uropygium coloris sunt purpurei saturati. Rostrum collurionis æmulum, superius nigrum, qua capiti adhæret album. Remiges alarum nigrae. Cauda quinque digitos longa, decem pennis nigerrimis constans.

*De Embriza Alba &
Pratensi.*

De Pratenſi ſic idem, Emberizā pratenſem voco quā aucupes noſtri Wiſe Emberitz à pratis in quibus verſari ſolet appellant. Hæc, ut pictūra indicat, colore eſt teſtaceo, ſeu figlino, cruribus, pectore, ventre, alis & caudā mediā. Vtrinque enim in ea nigræ ſunt pennæ. *Dorſum* quoque nigricat, & in alis ſuperius maculæ nigræ ſunt ſubrotundæ: inferius verò marginis *pennarum* ſecundum longitudinem nigricant. *Rorſtrum* fuſcum, *vertex* niger, infra quem utrinque macula albicans retorſum tendit: tum ruruſ aliarū duarū nigrarū & albicantes per intervalla ſequuntur. Hanc avem circalacum Verbanum Cepa vocant.

*De Avibus Granivoris
Canoris.*

*De Carduele, Spino & Pas-
sere Canario.*

Avis est parva, cui *dorsum* cinereum & fuscum, *Alæ* croceo colore, nigroq; mixtim & alternatim variatæ, albisq; notatæ maculis; *vertex* nigricans; *rostrum* acutum subrubens apice fusco. *Oculi* ambitus exterior niger, hunc mi-

niatus, miniatus, miniatur cæsius circumdat. Nec tamen hæc colorum pictura in omnibus apparet. *Fæmina* alas habet cinereas, guttur album. Visâ nondum adulta ubique unicolor, ex cinereo ad rufum tendens. Visâ & aliâ, quarum quædam in anteriori capitis parte & in mento aliquid rubri obtinent, dorso, pectore, ventre, & reliquis capitis partibus albescunt: quædam totæ prorsus albæ sunt, capitis partem rubram si demas, & aliquot lutescentes in alis pennas.

Sexus facile cognoscitur, si coloris, *Sexus*.
ut supra attigi, vocis & plumarum ha-
beat ratio. Vox fœminis exilior, nec
diuturnus cantus. Plumæ costas ob-
vestientes cineræ aut fuscæ, maribus
aterrimæ.

Victitat feminibus lapparum, papa *Nutri-*
veris, rutæ, dipfaci. Cannabino adeo *mentum.*
pinguescit, ut cantandi alacritatem *Porta l. I.*
amittat. Quæcunq; verò edit, ro- *de Villa.*
stro decorticat, ut pura medulla ve-
scatur.

Nidum in truncis arborum & spinis *Genera-*
construit, ter in anno, Majo nempe *tio.*
Junio & Augusto. Aliquando & in hy-
pocaustis pullitiam educit. Septē sepe

ova, octo interdum, quinque aliquando ponit. Præstant cæteris, qui mense Augusto excluduntur. In dumetis nascuntur, atriores sunt, & prunis aut malis aurantijs potius quàm alijs arboribus insident.

Vox. *Canunt* omni tempore, sed maximè, cum alias è suo genere adventare cognoscunt.

Volatus. *Volant* gregatim, & ad duo millia quandoque.

Aetas. *Aetatem* ad XX. annos producunt. Visa Moguntia viginti tres egressa, cui singulis annis rostrum ac unguis præcidebantur, ut cibum potumque capere posset. Depositis geminis pennis canæ, quo locabatur vel prona vel supina jacebat. Plus voce quam patinâ hominem delectat. Haud mali tamen sunt alimenti, si pingues, & non nidificant, Afla siliacis & colicis prodesse Kiramides auctor est.

Descriptio. SPINVS seu Ligurinus avicula est, pectore luteo, rostro mediocri, tenui & acuto. Duas habet maculas nigras. Alteram in fronte, alteram sub mento. Mari capitis macula multo nigrior; idem toto corpore magis quam fœmina lutescit.

Locus. In frigidioribus regionibus vel nunquam vel rarò apparet, nec in Italia quotannis cernitur.

Victus. Iisdem quibus Carduelis vescitur, nasci in primis & comizæ semine.

Generatio. *Nidulatur* in montium sylvis. Ova secundum nonnullos duodecim, secundum alios quatuor aut quinque ponit. Amantissimè cantat; & non tantum Carduelis, sed & aliarum avium aliquando vocem imitatur.

Vox. *Aldro. Or-nith. l. 18. c. 4.* *Volatus.* *Volant* gregatim, & toto agmine facillimè autumnò capiuntur. Sanguis ejus cum sali sanguine non coit. Asino verò, quod spinas tempore verno depascens, nidum dejiciat, infensus est.

Descriptio. PASSER CANARIVS ab insulis Canarijs, unde adfertur, ita dictus, avis est vulgaris Pari magnitudine; rostro albo parvo & in acutum tendente; alarum & caudæ pennis totis viridi colore. Mari pectus, venter, & pars superior capitis, quæ rostro adjacet magis lutea sunt, quàm fœminæ.

Victus. *Pascitur* Phalaridis semine, sacca-

ro, & auricula muris, quæ ad cantum excitatur.

Concentu est valdè amœno & a- *Vox.* cuto, quem spiritu diu non interrupto nunc in longum, nunc in altum varia vocis inflexione extendit.

Præferendi quibus cauda longior, corporis magnitudo minor.

CAPUT II.

De Fringilla, Montifringilla, & Linaria.

FRINGILLA, seu quod frigus præ- *Descri-* nunciet, seu quod plures in frigore *ptio.* convolent, ita dicta, Spiza est Aristoteli, modernis Græcis Fringillaro. In ea capitis & colli pars prona ad subcæruleum vergit; quod hinc ad Vropygium subvirescit. Pectus & venter inter rubrum & spadiceum ambigunt. *Fœmina* minus vegetis ornatur coloribus; pectus & venter ex ruffo albescunt. Vifa toto corpore candida. Vifa & ex albedo flavescent.


Locus. *Locus.* *gaudent* hyeme moderatè *Arist. H. A. l. 9. c. 7.* frigidis, æstate tepidis. Nam in Helvetiæ fœminæ per hyemem recedunt, & valido frigore ita offenduntur, ut volare nequeant, & manibus capiuntur.

In infimis arborum, & summis fruticum ramis *Genera-* *nidulantur.* Nidus intus ex *tio.* lana & araneorum telis, extus ex musco constructur. Quinq; aut sex ponere ova aucupes referunt.

Non uno eodemque modo *canunt.* *Vox.* Quædam concisè quasi quæruant, quædam in longum trahunt, Maribus vox alta est & plena. Fœminis exilis & submissior. Fringutur vel frigere auctores dicunt, si suavius ut canat volueris, locustam mandendam appone.

Difficulus ob astutiam capiuntur, *Ingeniū.* facilius vel zephyro flante, vel sudo. Nam & demissius tum volant, & melius alleetricum voces audiunt. Quædam nunquam mansuescunt, & inedia consumptæ commoriuntur. Omnes primis captivitatis mensibus præcæstitia obmutescunt; nec nisi blanditijs exhilarantur. Manè si canant, *Theophr. design. rēpest.* tempestatem præfagiunt.

MON-



Coccothraustes



Coccothraustes Indica



Linnæus flammula




Linnæus



Alauda Cristata
Alcedo

Alauda

Alcedo



Carduelis *discolor*



Linnæus




Spinus

Linnæus




Chloris *scutellata*

Gilla *viridis*
grisea



Hortulanus
Brachyotus
trochiloides



Turdus
Kramera *Vo-*
gel

Montifringilla mas.

Montifringillæ Congener.

Linaria marina.

Linaria rubra.

Linaria alia

Alauda.

Alauda Cristata.

Güntel.

Lerche.

Alauda pratorum.

Alauda Cristata.

Alauda Cristata Senex.

*Alaudæ Congener
Cum loto Æthiopica.*

*Salandra.
alauda maxim
Culander*

Chloris sylvestris

Citrinella.

*Lutea seu Cirulus.
fæmina.*

Lutea mas.

Descri-
ptio.

MONTIFRINGILLA magnitudine fringillam excedit. Color in capite, dorso & cauda nigrior quam Fringillæ. Supina pars albicat. Pectus cum gutture nonnihil ruboris habet. Alæ duabus transversis lineis ex ruffo flavescentibus distinguuntur, media linea interjecta. In fœmina, vertex, cervix & dorsum plus habent ferruginei: alarum linea superior adeo est angusta & brevis, ut ferè deliteat. Non adeo suave canunt, & caveis inclusæ aliarum alitum Passerum inprimis voces imitantur.

Descri-
ptio.

LINARIA Passeris est magnitudine, specie admodum similis, colore testaceo seu ferrugineo ad cinerè vergente, coq; in mare intensiore. Idem in pectore maculis respergitur ruffis, fœmina fuscis & majoribus. Alarum rectrices pennæ nigricant, sed ad latera & in extremitatibus suis candicant.

Nutri-
mentum.

Cibus ipsi Phalaridis, lini, cannabis, raparum, & caulium semen, panicum, avena fracta &c.

Morbus.

Laborat interdum *morbo*, quem subtilem dicunt, in quo mœsta silet, pennæ obrigent, venter solito tumidior venis rubris conspergitur, pectus ex carne apparet.

Vox.

Ex oriente caniculâ obmutescit, ac plumas vellicando circa medium excutit; sic certum canicularis syderis exortum indicat. Celebris est apud Italos ejus astutia. Unde proverbium *egli è un Fanello*.

Gefner. in
Ornithol.

Huc pertinet *Linaria Rubra* Gefnero à coccineo verticis colore dicta, sive illa Aster Oppiani, sive aliud quid. Advolant aliquando turmatim, & ferè pestilentiam brevi futuram circa Norimbergam indicare putantur.

Aldrov. l.
18. c. 9.

Nec non *Linaria marina* Aldrovandi, quæ rostro lutea, vertice miniacea, pectore & ventre candicans. Collo & dorso ex luteo fusca est. Alteri quam exhibet per tergus & superiora prorsus leucophææ, percurrentibus strijs deorsum vergentibus, color miniaceus magis splendet, alæ sunt longè pallidiores; Gula & pectus leviter lutescunt; retro oculos macula fusca, rotunda data est.

Quæ circa Argentinam *Cyntel* nominatur, per caput dorsum & caudam fusca est, pectore ruffo, fuscis distincto maculis, cruribus rubicundis, ventre inferiore albicante; seminibus papaveris & alijs vescitur; & gregatim volat.

CAPUT III.

De Alauda in genere, &
in specie.

ALAVDA, seu Cassita & Galerita, *Nomen*. Quæ tamè cristatis vocabula propriè conveniunt, Græcis veteribus *κόρις, κορυδαῖος, κόρυδα, κόρις*, ut apud Hesychium lego; modernis *Cuzula*, *τενελις*, & in Creta, teste Bellonio, *Chamæchilados* nuncupatur. Cirim *Scaliger* non esse, tum cirri seu innulæ oblongæ pulcherrimæ, tum pedes rubri, qui in alauda non sunt, Scaligero agente, evincunt. *Formam* non describam, obvia omnibus est avicula. In posteriore digito pedis longissimum habet unguem.

In Andalusia non reperiri, Averroës tradit; nunquam arboribus insidere Aristoteles. Visæ tamen in illis *Arist. H. A.* cristatæ, si rugosum nec levem habuerit corticem. In angustis montium

hyeme alicubi conduntur: in Italia & Gallia omni eas videbis tempore.

Vescuntur granis, sed & vermes deglutiunt, atque laborumque ex genere locustarum nova diligenter perquirunt; ideo à Lemniis coluntur.

Nidum ex siccarum herbarum radicibus humiter in anno, nempe citius

citer Calend. Maij, Junij, & paulo post Idus Julias construunt, eundemque auræ obversum ita in segetibus & gramine recondunt, ut prætereuntium & Accipitrum minimè obvius sit oculis. Ova quinque pariunt, quæ à bufonibus foveri falsum; quia auræ exponuntur. Superincidentes solis radij parentum defectum supplere videtur. Pulli exclusi implumes adhuc deducuntur ad pastum, ut prædantium eripiantur injuriis.

Quantum ad *Cantum* mira alacritate pennis exertis in aëre vocis motu

dulatione, lætæ serenitati temporis, quasi applaudit. Nam nubilò pluviòve cœlo, vix aut unquam canit, ut neque humi, sed inter ascendendum. Ascendit autem paulatim, subitò verò & instar lapidis descendens cantillat. Matutino verò potissimum audiuntur, meridiano silent.

Inimicitia.

Arist. l. 9.
H. A. c. 1.

Ant. d. My.
Zald. cit.
Aldrov.
Ælian H.
A. l. 6. c. 46

Inimicitias exercent cum Pella ex ardearum genere, cujus ova diripiunt, ut Aristoteles vult; cum Acanthyllide, ut Philes & Aelianus; cum corvis, quod ab ijs devorentur; cum Accipitribus Alaudariis, à quibus adeò expavescent, utin hominum sinus confugiant; cum Arcturo sydere, quia in ipsius cum sole exortu, obmutescere incipiunt, ægrotant, & plumas vellendo excipiunt. Denique cum sinapis semine, quod nulli non innoxium, alaudas conficit.

Morbi.

Laborant morbo comitiali, & alterius oculi cœcitate, idq; nono accideranno Albertus experienciâ propriâ nixus testatur.

Vfus.

De usu in cibis taceo. Juniores & pinguiusculas nemo non appetit.

Species.

Species Alaudarum sunt, CRISTATA & NON CRISTATA. Illa est vel *Major* vel *Minor*; quarum hæc Aristoteli incognita, Schvvenkfeldio *Arborea*, *Fera*, ἀνώγει, apicem pro corporis magnitudine longiusculum, & pedes rubros habet. Cum frigus intensum est, & nix agros tegit in sterquilinijs & propè horrea versatur, per æquinoctium avolat, si Longolio credendum; nidum in fossis senticosis sternit; nullam particularem cantunculam habet; sed ineptè aliarum quibus cum vicitat vocem refert: Congenere est ipsi *Alauda Sylvatica*, quam Germani *Waldlerch* vocant, parte in primis prona albicantior.

Major rostrum habet cavum; cristâ, cujus radices inter utrumque oculum situantur, aliquantulum nigricatem. Dorsum cinereum albo maculatum. Ventrem albicatem, pectus cinereum albis maculis conspersum. Caudæ plumas nigras. *Linguam* exiguum ferè furcatam, quia ramis rarò insidet; ungues longiusculos. *Habitat* in agris, circa flumina, & lacus; hyemis tempo-

Bellon. l. 5.
de Avibus
c. 22.

re ad vias. Non volat aliarum more, sed vento cogente, nunc ima nunc summa petit.

Non cristata suavius canit.

Laudatur ad colicos dolores, † seu cocta seu assa. Quidam cor alligari femori jubent: alij recens tepensque devorant. Consularis Asprenatum domus est, inquit Plinius, in qua alter è fratribus colo liberatus est ave hac in cibo sumpta, & corde ejus armillâ aureâ incluso; alter sacrificio quodam crudis laterculis incluso corde, ad formam camini, atq; ut sacrum peractum erat, obstructo facello. Thraces vivente adhuc Alauda cor exemtum sinistro femori pellendæ colicæ ergò circumdebant, ut Alexander Trallianus scribit. Porta causam in loquacitatem conjicit. Nimia enim garrulitate, flatus, ex quo morbus sæpè exoritur, eximitur.

Non CRISTATA, Hermolao, Si-pontino, & Grapaldo Terraneola, Nipho falsò Aristotelis Tetrix, colore similis est cristatæ, sed magnitudine minor. *Caput* habet nigrius fulvo colore intermixtum. *Dorsum* spadiceum, cinereum, & subnigrum. *Pectus* pluribus maculis distinctum. *Ventrem* subalbidum. Posticos digitos & ungues ejusdem magnitudinis cujus & posteriores. *Digit* in planis locis, erica & junipero conficitis. Hyeme gregatim volant, æstate binæ. Alta petunt volatu, diutius in aère hærent, & majora spacia conficiunt. Amœnitate vocis inter omnes excellunt. Galli ex uno temperamento in alterum faciliè transire, & pro ventorum diversitate, diversimodè etiam immutari, tradunt. Flante Austro macrescunt, Aquilone pinguescunt. Captura hyeme largissima, nisi nives diutinæ sedcant, & maxima sit frigoris inclementia.

Ad hanc *Calandra*, *Alauda pratorum*, & *Alauda congener* spectat.

Calandra Græcis χαλάνδερα & χαλάνδρος fortè ὑποψαλῶς ἀδεν, seu suavitatem cantus; alijs, sed falsò *Acredula*, *Charadrios*, *Gurgulio*, ad Sturni magnitudinem accedit. Alaudæ de cætero in omnibus similis. Collum qua jubæ Capiti connectuntur gracile habet, & ro-

Vfus.
† Galen. de
simpl. Me-
dic facult.
l. 11.
Dioscorides
l. 2. c. 48.

Arist. H. A.
l. 9. c. 25.
Bellon. H.
Avium. l. 5.
c. 23.

& rostrum crassius. Viſitat duriuſcu-
lis granis. Vocis modulatione audien-
tes mirificè oblectat, ac omnes avium
voces expreſſimè imitatur. Capta,
vix unam diei horam ſine cantu præ-
terit.

Alauda Pratorum Alaudis eſt minor.
Roſtrum habet tenue, & longiuſcu-
lum. Plumas cutem contegentes o-
mninò nigras. Caudæ, in extremo al-
bicantes. Humidormit. In pratis ni-
dificat. Difficulter educatur, ſed edu-
cata ſuaviſſimè canit. Cum Accipi-
treſ ſupervenientem adſpicit, in ar-
borum ramis latitat.

Alauda congener illa Aldrovando
dicitur, quæ Bononię Petrone, Genuę
Petronella & Chiapparone dicitur.
Cristatæ majoris magnitudinē æquat,
vel ſuperat. Eidemque colore ferè ſi-
milis eſt. Pectoris & totius ventris co-
lor magis ad ſubſlavum vergit. Un-
gues in tantam longitudinem non ex-
creſcunt. Tibiæ & pedes albicantiora
ſunt. Humi ſepè quieſcit vel curſirat;
in arboribus verò & fruticibus ſumma
ſemper cacumina petit, quibus diu
immobilis inſidens, ſuaviſſimas canti-
lenas modulatur.

C A P. IV.

*De Chloride, Citrinella & Seri-
no Gefneri, & Luteis ea-
rumq; congeneribus.*

CHLORIS Germanis *Grünſin* /
ſeu Fringilla viridis, magnitudine
eſt alaudæ, aliquando tota viridis, ali-
quando valdè lutea. *Mas* à ſcæmina in
hoc differt, quod hæc ſpadiceo par-
tim, partim cinereo ubique coloratur,
minusq; multo lutei coloris, imò mo-
dicum admodum habet. Pedes ei &
crura mollicula, carnea ferè ſubſtãtia
& colore. Gula, venter, pectus, uro-
pygium, & alarum ſuprema ora, pul-
cherrimo ochræ colore ſaveſcit.

Viſtus. Ariſtoteles vermiculis *viſitare* ſcri-
bit. Verum paſcitur quoq; ſeminibus,
Carduorum majorum, Lapparum, ra-
porum, & phalaridis. Adeò aliquoties
cicuratur, ut una manu detecta, cibum

altera porrectum, capere non recuſet. *Ariſt. H. A.*
Nidum ex hymphito ſtirpitis evulſo *l. 9. c. 13.*
facit. Sed ſtragulum ex lana & villo *Genera-*
ſubjicit. Quatuor aut quinque ova *tio.*
parit. *Ælian. H.*

Congener eſt huic illa, quam Aldro-
vandus *Chloridem Indicam* vocat, quæ-
que prono, ventre nimirum & pectore
eſt candidiſſima, roſtro ſubviridi ad
fulcum vergente, capite toto dorſo &
Uropygio viridibus; pennis, alarum
remigibus & tota cauda cæruleis, ſcæ-
pis albis, pedibus nigris.

CITRINELLAM Gefneri, quam
Galli *Tarin* vocant, *Thracipedem* A-
riſtotelis Bellonius eſſe opinatur. Co-
lor capitis dorſi caudæ intenſior eſt
quàm in Ligurino, ideo ob ſaveſtorem
magis fulca videtur. *Mas* plus ſavi
coloris in toto corpore & præſertim in
pectore & circa nates habet, quam ſcæ-
mina. *Veſcitur* iisdem ſeminibus, qui-
bus aliæ canoræ. Rarò plures quàm
ſeptem, aut octo uno incubitu exclu-
dit, & in cantu omnibus huius generis
excellit.

SERINVS Gefneri Ligurinum
magnitudine & colore refert; pectore
& ventre ex viridi ſaveſcens; parte ſu-
periore, partim ejusdem coloris par-
tim fulca. *Congener eſt* illa, quam Ger-
mani *Hirngrylle* vocant, magnitudine
Ligurini, ſed magis lutea. Capitur in
Helvetiæ montibus. Auceps cum ſe-
xum utrumq; domi aleret, ita ut aliqua
volandi libertas eſſet, pullos etiam ex
eis habuit. Sed cum aliquândo pro ma-
re Gryllo marem Ligurinum adhibuiſ-
ſet, ova quidem nata ſunt, ſed ex qui-
bus foris nihil provenit. Suaviſſimè
cantillat.

LVT E A R V M duo ſunt generas
Vnum, quod Ciam ſimpliciter Itali
vocant; *Alterum*, quod à colore palea-
ri, Ciam Pagliariã, ſeu Pagliaricciam,
Angli Gelgorſtam dicunt. Capiuntur
faciliſſimè omni aucupij genere. *Veſcun-
tur* granis hórdei tritici pane; hyeme
alimentum in equinis ſtercorib. quæ-
runt. Capta per duos vel tres meſes
merum Cici ingeminât; ſervitutis ob-
litæ ad ſuos modulos revertuntur. In
caveis ſæpè cum morbo comitali con-
ſiſtantur. Mediâ hyeme magno nu-

Bellon. H.
Avium. l. 5.
c. 24.

Ælian. H.
A. l. 4. c. 47
Aldrovand.
Ornith. l.
18. c. 18.

Gefner. in
Ornithol.

Deſcri-
ptio.

Viſtus.
Ariſt. H. A.
l. 8. c. 3.

mero in Italia apparent, & in pratis ingentes earum catervæ conspiciuntur. Quæ de harum *congenere* addit Aldrovandus vide si libet capite vigesimo primo, libri decimi octavi.

TITULUS III.

De Avibus Baccivoris.

CAPUT I.

De Turdis in genere.

A Vis Latinis, seu per Onomatopœiam, seu à colore, Turdus dicta, à Græcis veterib. *τὴν λυγρὰν, αἰχλασίναν*; à modernis *a* Schynopoullos, ac si lentiscinas aves diceret, vocatur. *Genera* ipsorum tria prodidit Aristoteles. *Viscivorum* seu *ἰσοβόρον* picæ magnitudine. *Τειχαῖδα* à stridore dictum, quâtitate Merulæ; & *Ilias*, omnibus minus, minusque maculis distinctum, *c* quod gregatim volat, & nidos è luto hirundinum more construit, & apud Gallos † non extare putatur. Recentiores plura enumeratis annumerant. Nam & *Turdela* Hermolao est genus Turdi alterum, quod in Veneta provincia Drexanos vulgò vocant, major Turdo, penna subfusca, variâ; & Turnero illa, quæ Saxonice *Brachvogel* / (commune hoc ferè illis nomen, quæ in novalibus & quiescentibus agris immorantur) colore fusco, terreo, obscuro, ut humi sedens agnosci vix possit, ex Turdorum est genere. Idem Germanorum *Trostel* / Turdum pilarem esse putabat. Scaliger † secundi apud Aristotelem † *l. Com-* generis, *duas species* facit; quarum una *metar. citato.* *Trida* à Vasconibus, altera *Turdus* dicitur, figurâ & facie adeò dissimiles, ut nonnunquam in agnoscendo fallâtur. Saxonum Ziepdruschel colore liliaco similis, quæq; circa rubos versatur, & fructibus eorum victitat, minimum Turdigenus, & *βανίς* Aristotelis quibusdâ, Germanorum verè *Klein Zimmer* / Merulâ minor, rostro acuto, brevib. pedibus, ejusdem nonnullis Cyanus. Helvetij habent Turdum sylvestrem. Carinthiorum avis dicta *Leimtrostel* / pedibus albis, Turdis minori-

bus annumeratur. De *Albis*, qui in Septentrione, non est quod aliquid dicam.

Forma si spectetur, cinereus color *Forma*. eis ferè peculiaris est, huic quàm illi remissior vel intensior. Omnes per collum inferius, pectus & ventrem maculis ætate consperguntur, *d* quas d *Arist. H.* per hyemem deponunt. Unde *Pli. A. l. 9. c. 49* nius, *e Turdis color ætate circa collum* *c H. N. l. varius, hyeme concolor.* Visus tamen visus *10. c. 29.* scivorus, nescio quo anni tempore captus, qui ita plumbei coloris evaserat, ut quodammodo ad amethystinum accederet. Visus & Turdus vulgò dictus, tribus diversis coloribus diversis nimirum temporibus captus. *Rostrum* omnib. est longiusculum, crassiusculum, rectum. *Lingua* lata, & ad imitandum humanum sermonem parata. *Pedes* figurâ similes, & colore non in omnibus eodem. *Intestinum* appendices nō habet, nec gula versus stomachum dilatatur, nec superius ingluviem habet. Nulli non sunt obvi. *Daphnios*, seu à Laureto illo Alexandrino, ubi baccis vesci poterant; seu à *Daphne* delitioso quodam Syriæ suburbano ita dictos, Clemens Alexandrinus celebrat. Advenas esse, & quotannis in Italiam circiter æquinoctium autumnale transmare verno revolare, Author est *f* Varro. Unde trimestres *f de Re Rust.* Plinius dixit; per hyemem latere scri- *l. 3.* psit *g* Aristoteles: nec tamen omnes, *g H. A. l. 8.* vel ex eo evidens, quod in *h* Helvetia *c. 3.* circa Tigurum per hyemem abundet, *h Gesn. in Ornithol.* hyeme in Italia loca maritima juniperis & myrtis confita, frequentent. Ab *i* Ambrosio inter eas quæ sub hyemis *i l. 5. He-* initium ad nos accedunt, numeretur; *xam. c. 14.* Bononiæ deniq; Martio *k* etiam men- *k Aldrov. Ornithol.* se copiosè habeantur.

Quantum ad *Vitum* delectantur *l. 16. c. 1.* baccis myrti, juniperi, sambuci, hederæ; nec nō olivis, ut est apud Calphurnium Poëtam. Vnde Olivariorum nomen; fagiglandibus, insectis, lumbricis & culicibus. Ex semine ab ipsis excreto provenire viscum Theophrastus *l. 1 Theophr. de Caus. Plant. l. 2.* & Plinius *m* prodidit, tã falsò quam *c. 23.* Satyria & Orchides ex eorum genitu- *m H. N. l. 16. c. 94.* ra nasci, falsum est. Quot enim in arboribus Turdus sterces excernit, & tamen

a Bellon. Obser. l. 1. c. 10.

c Athen. Dipsos. l. 2. † Scalig. in H. A. Arist. l. 9. c. 26.

Genera. † l. Com- metar. citato.

Turdus viscivorus.
Frostel.



Turdus simpliciter.
Krameluoegel.



Turdus leucocephalos.




Merula.
Stein Amel.



Merula mas.



Merula femina.



Merula alba et nigra.



Passer solitarius mas.
merulus



Passer solitarius
femina.




Merula torquata mas.



Merula torquata
femina.



Merula Congener.



tamen viscum non generatur? Quot in regionibus Turdi non sunt, ubi viscum nascitur? Concoquitur in Turdi

n Scalig. in ventriculo granum, *n* cum labrusca-
Exerc. 168. rum longè duriora & majora conco-
quantur gigarta: & exhibitis uni visci
baccis, nulla in excrementis reperta
est species. De faginatione videantur
Oeconomica.

Genera- In cacuminibus arborum *nidifican-*
tio. tes, penè contextim in succeflu, gene-
rant. Ova, decem à conceptu diebus
pariunt & fovent. Increbuit alicubi
mos, ut vasa ibidem collocentur.

Vox. Vox eorum trutillare, ut Philomela
o Scalig. author inquit. Sermoni affluet, *o* tan-
Exerc. 237. quam è modulis sermocinantur. Ha-
buit Agrippina, qui omnium sermo-

p Plin. H. nes *p* imitabatur. Et mirum est adeò
N. l. 10. furdos dici, ut vitium in proverbium
c. 42. cesserit. Invenere & in

Vfus. Medicina *Vsum.* Myrtorum baccis
farti & affi ventris profluvio laboran-
q Plin. H. tibus *q* exhibentur. Tempore pestis
N. l. 30. c. 7 in cibo, macerati, laudantur.

Bellon. l. 6. Quid de usu in cibis dicam? Duriores
de Avib. quidem concoctu, Perdicibus, Atta-
c. 31. genis, Phasianis & Gallinis, Galenus
facit: sed quia idem Phasianos Gallinis
concoctione & nutriendi vi pares, e-

dendi suavitate superiores *r* alibi scri-
r l. 7. Me- bit; alibi *b* laudatis cibarijs, quæ neq;
thod. tenuem neq; crassum succum gignunt
h l. de cibis annumerat, vel locus prior mendosus
boni & ma- est, vel sibi ipsi contradicens, fallitur.
li succi.

t Alex. ab Græci *t* sanè ova cum Turdis, lepori-
Alex. l. 5. nis carnibus, ac mellitis placentis se-
Genial. cundè mensæ frequentius inferebant.
dier. c. 26.

u Athen. in Iisdem Turdorum turmæ in propo-
Dipnos. l. 2 matibus seu primis *u* cœnæ ferculis
in usu. Eorundem pectora in patinam
Apicianam conjiciebantur. Et quan-
tus circa eos Romanorum luxus, sive
copiam, sive pretia spectes. Tanta

x Plin. H. Turdorum *x* aliquando fuere avia-
N. l. 17. c. 9 ria, ut ex ijs stercorearentur agri. Lu-
y Varro. de cull^o *y* alios videbat Turdos in mazo-
R. R. l. 3. mo positos coctos, alios volitare circa
fenestras captos. Ex uno Ornithone
quinq; millia scio vânisse Turdorum
denarijs ternis (id est computâte. Bu-
dæo denis solidis Turonicis & semisse)
ut H. S. sexaginta millia ea pars villæ
reddiderit eo anno, inquit *z* Varro.

z l. 3. de Re
R. c. 2.

At nunc ætatis nostræ luxuries quoti-
diana fecit hæc pretia, &c. Nostra æ-
tate quoquo modo capti eduntur.
Quibusdam jecur ovis integrum cum
medulla panis contunditur, & per lin-
teum transmittitur. Hinc aromatibus
ad saporem coloremq; commendan-
dum insperfis fervefcit. Turdi in ju-
re carniū elixi, & modicè frixi im-
ponuntur.

CAPUT II.

De Turdis in specie.

ARTICVLVS I.

De Turdo Viscivoro &
Trichade.

Turdus Viscivorus, Aristoteli *ἰσο-*
βύζος, Athenæo *ἰσοφάγος* dicitur. *a a Gesner.*
Major est cæteris Turdis, & paulò in- *in Ornith.*
fra columbam. Capite, alis, & ventre
fuscus; plumis tamen juxta caudam
aliquid flavi admixtum apparet. Cu-
tem intra rostrum pallidis & subru-
ber colores mixti tingunt. Collum
parte pronâ, venterq; totus nigris pun-
ctis in albicantibus plumis, & alicubi
flavis variant. Pedes digitique, poste-
riore præsertim tibiæ nervo, fla-
vescunt. *b Aldrovandus* semel unum *b l. 16. Or-*
adeò, in cauda maximè, & alarum re- *nith. c. 2.*
migibus albescentem observavit, ut
penè albesceret; capite verò, tergore,
& supernis alis omninò cinereus esset.
Nullo non tempore apud nos visun-
tur. *Cibus* ipsis abietis viscum & resina;
æstate in primis; hyeme fructiferarum
arborum semina. Sed & baccis arbo-
rum, Juniperi præsertim & Ligustri,
inhiant. Dum singuli singulas viscife-
ras arbores occupant, & propè eas mo-
rantes, alios persequuntur, facilius ca-
pi, prodidere nonnulli. Observata in
ijs, à rusticis & prælagia. Diu nempe
duraturæ hyemis, si circa hujus finem
in cacumine arboris cantillent. Futu-
ræ ætatis, si in ejus medio confideant.

TRICHAS, qui Pilaris perperam *Gesner. in*
dicitur, & à fridore nomen sortitus *Ornithol.*
est, torus ferè magnitudine & figura
est Merulæ. Rostrum habet substa-
vum

vum in extremo nigricans. Os & linguam flavo colore tincta. Collum primum cinereum maculis nigris aspersum. Dorsum charopum, & per medias pennulas nigricans. Pars circa Uropygium cinereis plumis obtegitur. Caudam nigræ pennæ constituit. Collum supinum & pectus varia sunt. Pennæ alarum partim nigricant, partim ruffo colore tinguntur, &c. Nunquam aut rarò in æstate in Anglia *visitur*, hyeme tanta illorum multitudo, ut nullius avis major. Vescitur baccis juniperi, Aquifoliæ, & forbi minimæ. Apud Helvetios postremò advenit. *c Arist. H. A. l. 9. c. 20* Acutè *c* sonat, & quamvis colorem mutet: vocem tamen non variat. Volat gregatim, & inter volandum obstreperus est.

ARTICULUS II.

De Turdo Illade, & simpliciter dicto.

Turdus Illas, Tyllas Alexandro, Myndio dicitur. Fuscus est per totum dorsum. Pectus est varij coloris, medius venter albicat; utrinque rubet. Eodem colore pars sub alis tingitur. Interiora oris penitus flavescent. *Nidificant* in Bohemia vel Hungaria. Gregatim plerumque in dumeris *degunt*. Initio hyemis per quatuordecim ferè dies ante Pilares in Helvetiam advolant, circa Pascha recedunt. Racemis *visitant*, vineisq; multum damni inferunt. Idcò tempore vindemiarum capiuntur. Gesnerus in dissecti ventriculo mense Novembri baccas spiræ albæ quam Oxyacantham dicimus, reperit.

Quem Aldrovandus *Turdum simpliciter dictum* vocat, is Bellonio *Turdus primus Aristotelis*, & *Turdus visivorus minor* dicitur. Crura in eo ex descriptione Gesneri albicant. Pectus, ventrem, & latera puncta nigra insigniunt; illud sub flavo & ruffo colore in unum commixtis insignitur. Idem sub alis color merus. Tota ferè pars prona fuscescit. Alæ fusco ruffum miscuerunt, & maculas subflavas habent. Venter candidus est. Crura albicant. Pro-

prium illis esse apparet, ut circum oculos maculentur. Sexum solo cantu discerni posse dicunt.

NB. Genus *Turdorum exoticum*
Vide in Manissa. N. 9.

CAPUT III.

De Merulis.


Merula, Græcis *κόρυς*, *κόρυς*, & *κόρυς*, quibusdam à nigro colore *Nigretta*; Latinis quod solivaga sit & sola pascatur, *Merula* dicitur. Duo ipsarum *Genera* Aristoteles *a* ponit, *Vulgare* seu nigrum, & *candidum*, quod tantum circa Cyllenam Arcadiæ nasci *Genera. a H. A. l. 9. c. 19.* scribit: nos & in Norvegia, & in novo orbe inveniri scimus. Varro *b* inter res inusitatas reponit. Addit & *tertium* fusco colore, & minoris magnitudinis, quod Passerem solitarium vel Merulam montanam quidam esse judicant. Vidit Aldrovandus totam ex flavo ad castaneum vergentem, mutato fortè priore colore. Magnitudinem ei Turdi Trichadis Aristoteles tribuit citante Athenæo, colorem nigrum, rostrum puniceum verè an falsò nescio. Albertus rostrum & pedes crocea. Sed ut plumarum colorem pro temporis diversitate mutant: ita & rostrum idem non servat. Nam id anniculis, teste Plinio, in ebur transfiguratur, at maribus duntaxat. Scaliger pullos nigrum habere, anniculos *† In Aristotelis H. A. l. 9. c. 5.* buxeum affirmat. *Sexus* optimè discernitur. Fœmina namque fusca est, rostro inferius tantum lutescente, supra planè fuscido. Gula pectusq; totum ex albicante & fuscescente coloribus maculantur. Nominat Aldrovandus *c* quædam *Leucophalum*, cujus caput præter tres maculas oblongas nigras, quæ retrò oculos conspiciebantur, prorsus candidum erat, rostrum & oculorum iris lutea, pedes fuscescebant. Cauda & venter aterrimi coloris. Alæ albo maculabantur. Apponit & *candidam* totam, rostro duntaxat rutilo, & pedibus lutescentibus. Alæ ex albo & nigro sunt maculatæ, mas minus quàm fœmina, caudâ nigrâ, rostro & pedibus intensè in mare rutilis, pallidè in fœmina flavescentibus. *c Ornith. l. 16. c. 6.*

Quan-

Merula Rosea mas seu *Sturnus*
marinus.



Merula
amstel.



Merula Brasiliica.




Merula apis Indica.



Sturnus iulgaris.




Caryocatactes musbicker



Sturnus.
Staer.



Sturnus Capite albo.



Sturnus pullus.



Sturnus Cinereus.



Locus.

Quantum ad *Locum*, versantur in locis densis confitis arboribus, spinetis, angustis montium angulis, & lapidum fissuris. Mutant ut Turdi *d* locum, & hyeme in vicinam demigrant aprica. Parasitus tamen apud Arthænam, si algor sub dio perpetiendus sit, se Merulam esse proficitur.

Victus.

Vescuntur iisdem quibus Turdi. Sed & pomis sorborum, ornifambucique acinis. Caveis inclusæ etiam carnib. Plantæ ex quibus præcipuè cibum decerpunt, sunt Oxycedrus Dalechampii, Ilex Aquifolia ejusdem, Myrtacanta, phillyrea angustifolia, myrtus laurea maxima, myrtus exotica Plinij, & area Theophrasti effigie alni.

Generatio.

Nidos figurâ hæmiphæricâ oblongiusculâ, admodum scutellæ cavos, ex furculis ramulisq; exilibus, & fibrosis radiculis luto inter se contextis, substrata molliore materia construunt. Bis anno, omnium avium primæ, ante exactam hyemem, in Helvetia mense Martio vel Aprili *pariunt*. Numerum pullorum nemo exponit. Nido Aldrovando allato, quinq; inerant, Persarum Magos ex salvia sub ficu putrefacta, dum sol & Luna secundam solis faciem occupant, avem Merulæ similem procreasse, cujus adustæ cinere lampadi insperso domus serpentibus repleta videbatur, author est e Lan-
gius.

Epist. Merulæ.

Vox.

De earum *Voce* fringulicire quidam usurpat. Veteres ejus non exprimunt proprium, sed inter canoras ponunt. Quandam aded in novem vocû modis exprimendis excelluisse, ut nullus hominum perfectè eam imitari potuerit, Albertus author est. Incipiunt autem vere canere, continuant per æstatem. Hyeme cohibendo vocem, strepunt & tumultuosè vocalantur. Plinius hyeme balbutire, circa solstitium mutas esse g ait.

f Arist. H. A. l. 9. c. 49

g Plin. H. N. l. 10.

Amicitia

Amicitiam eum ea Rubecula colit. Sequitur enim eam, & noctu, vel juxta ipsam, vel in proxima arbore conquiescit. Ipsas Nocturæ ita insensas quidam volunt, ut quotiescunq; clamantem audiverint, tanquam injuriam vindicaturæ, advolent, Ma-

li Punici grano perire Aelianus *h* au-
thor est.

Ingenium respicit, quod i humanum *Ingeniū*. sermonem, quamvis linguam strictâ, i *Philosof.* rostrum rectum, & angustum habeât, 7. *in vita* imitatur: & quod Laurifolio annuum *Apollon.* fastidium purgant.

De *Vsu incubis*, hæc pauca dixisse *Vsus*. sufficiat. In pectore ipsarum *k* adusto *k* Horat. *l.* haud parvam collocasse voluptatem 2. *sermon.* Romanos. Inter popinæ verò profes-
sores *l* clunesne tergoribus sint præ- *l* *Plin. H. N.* ferendæ, disceptatum. Tardè tamen *l. 10. c. 50.* concoquantur, parumque alunt, si *m* *Platina* Platinæ credimus; inter laudatas cē- *l. 5. de tuē-* feri debent, si Salernitanis. Nonnulli *da sanit.* à Noctua captas præferunt. Alij pin-
gues & retibus vel laqueis captas e-
ligunt.

Quantum ad *Medicinam*, benè illis qui laxa sunt alvo præscribuntur. Plinius in assatas cum myrti bacci dysentericis mederi scribit, Porta *n* Melan- *n l. 3. Phy-* choliæ. Fimus ex aceto mistus, si ori- *rogn. c. 11.* zam avis comederit, extirpat lentigines. Caput ad brachium sinistrum, cum leporis pedibus portatum, audaces facere, mendacium est.

CAPVT IV.

De Merulis in specie.

ARTICVLVS I.

De Passere solitario & ejus congenere.

Passer Solitarius, quod cum nullo sui generis unquam, nisi tempore generationis versetur vulgò dictus, quæ tertiam Aristotelis Merulam esse Gesnerus, Niphus, & Aldrovandus asserunt, Merulus Solitarius circa Tridētum, Merulus stercoreosus, quod in latrinis habitare credatur Romanis, si Alberto credendum; Merula saxatilis Placentiæ dicitur. Avis est Merula *Gesner. in* paulò minor, tota nigra, rostro longiusculo, parumpè arcuato, capite pro corporis proportionem parvò, superius plano, nigtoque ad latera, nempe circum oculos, aures, & in collo inferiore caruleo. Fœmina tota fusca est, & pectore maculis lutescentibus variegatur,

a Arist. l. 9.
c. 19.

gatur, mari planè dissimilis. In faxis & testis (non testis, a νεφεύων, namque textus habet) diverforium habere Aristoteles dixit. In parietibus alijs Passeribus cōjungi, & cum eis ad pastum volare Albertus. In dumosis rupibus circa Larium lacum nidulari, neque cum alijs avibus degere, Gesnerus affirmat. Canorus est, & Mediolani ac Genevæ magnò propter cantum precio venditur. Quem Bellonius descripsit, & Charadrium esse primo aspectu putabat, Turdi Iliaci est crassitie, Luscinia morib. præditus. *Rostrum* habet rotundum, acutum, subalbum, in extremo nigrum. *Pennas* sub pectore & duabus costis colore dactylorum, maculis interstincto. *Dorsum* cinereum, fulvo maculatum. *Pedes* Turdosimiles, *Caudam* ut in Luscinia ruffam, quam mox ut è nido eximitur, immutat. *Mas* quia pulchrior, coloris elegantia à fœmina distinguitur.

Forma.

Generatio.

In rupibus solitarijs nidificat, & raro in planò aut per valles cernitur. Certo anni tempore sub regulis seu imbribus *degit*. Canit noctu æquè ac interdum ad lumen candelæ maximè: Franciscus Gallorum Rex tanti ejus cantum fecit, ut nullam præter hanc audire dignaretur.

PASSERI SOLITARIO *congener* est illa avis, quam quidam Petrocos scyphum, Germani *Steinvögel* & *Blauvogel* vocant, Bellonius *b* Cyaneum Aristotelis, sed falsò (Ex Picorum enim genere est, rostro etiam ad saxa durissimo; & quis Merulam totam cæruleam vidit) dixit. Magnitudine est Sturni, pectore, cervice, & lumbis Cyanea: dorso & alis nonnihil nigricans. Rostrum ei sesquidigiti longitudine subter nares fuscum, imo aculeatum, superiore parte adunca, inferiorem ut plurimum contegente.

b l. 1. Ob-
serv. c. 11.
& l. 6. de
Avib. c. 6.

Seiler. ad
Gesnerum.

Locus.

Degit in altissimis, præruptis, & nivosis scopulis, in Creta, Citharea, Corcyra, Zacyntho, Eubæa, & circa fluvium Athein.

Generatio.

Nidificat in deviis solitudinibus, pullosq; quos ternos aut quaternos excludit, ut à rupicapris etiam ruti sint, in cavernas deorsum condit.

Vox.

Vox ipsi articulata, amœna & varia.

Mediâ & intempestâ nocte expegefacta, ad astantis provocationem clarescenti spiritu canit. Ante tempus autumnii cum colore etiam vocem mutat, ac alis expansis novos, secum continuo murmurans, excogitat cantus, nec veteris obliviscitur.

Color sub hyemem niger è cæruleo evadit. Circa veris initium, in pristinum commutatur. Adulta vel è nido semel egressa & volatui adsueta, nullis astutiis capitur. Moris denique ei, oculos hominum aliorum alitum more adpetere. Tamq; diligenter res observare, ut pluraque, vocis aliquo articulo indicet.

ARTICULUS II.

De Merula Montana, Germanorum Torquata, Bicolore, & Saxatili.

MERULA Germanorum MONTANA, avis est paulò infra Turdum majorem. *Caput*, dorsum & alæ, ruffo quodam modicè admisto nigricant. *Pectus* est, ex plumis partim subfulvis, partim nigricantibus obscure maculosum. *Os* interius & lingua lutei seu melini coloris. Ventris color ex nigro & cinereo mistis; crura ex glauco nigricante, & ruffo, constant. Cauda est atra.

TORQUATA, quæ & Montana, Saxatilis, & Equina, quod in sylvis vermiculos in fimo equino quærat, avis est barbatula, magnitudine ferè & colore Turdi. Parte pronâ inter colum habet albas duorum digitorum latitudine plumas, reliquâ maculosas, nigris in medio pennis, ambitu albis, superiore fuscas; alarum pennis, margine extrinseco albicantibus. *Fœmina*, quam Aldrovandus descripsit, erat corpore toto subnigro; rostro circa nares, & in apice nigro, ad latera flavescente, pennis remigibus alarum nec non ventris, extimis oris, nonnihil albicantibus, cæterâ candicantibus. In ultimo gutture seu pectoris principio macula albissima pollicè lata ad humeros pertingente, vel torque candido, ornabatur.

Meru-

0 2

b Ornith. fatigat, agnovisse videtur. *b* Aldrovandus tres exhibet, *Vnum* totum, album, rostro quod ex luteo rubescit, & pedibus, qui leviter carnei exceptis. *Alteri* caput, collum, & rostrum erant alba; Maculae supra oculos binæ nigrae: venter candidus, alarum principia maculis subcæruleis varia. Remiges alarum & cauda ut in Sturno vulgari. Pedes lutei. *Tertii* totum corpus ex cinereo lutescebat. Pectus pūctulis conspergebatur. Rostrum & pedes nigri coloris erant.

Locus & Victus. Locum si attendas, nullibi non inveniuntur. Avenis; pratis aquosis, ubi armenta pascuntur, & agris gaudent. Turribus in primis & tectis hyeme latent. Si *viētum* pamphagi sunt. Nam præter baccas & uvas, quibus impensè delectantur, & pinguescunt; milium quoq; panicum, cicutam, stercora, & lumbricos, imo suspenso cadavera, idè ab eorum esu Belgæ abstinent, depascuntur.

Generatio. *Nidulantur* iisdem ferè locis, eodemq; penè modo, ut Passeres. Ter anno *parere* dicuntur; & uno tempore septem vel octo ova ponunt. Græcis dicuntur *κρυλίζειν*; auctori Philomelæ pifitare. Summo mane maximè sunt obstreperi, nocte silent. Viti qui omnium avium voces imitabantur. Et

c Brujer l. 15. de recit. bar. c. 42. d Plin. H. N. l. 10. c. 24. Volatus. *c* in Galliæ urbibus habentur, qui sermonem explanatè, longiori etiā contextu, exprimunt. Habebant & *d* Cæsares juvenes ejusdem peritiæ unum. Proprium ipsis catervatim *volare*; & quodam pilæ orbe circumagi, omnibus in medium agmen tendentibus. Vespere potissimum aggregantur, & tanta multitudine atq; impetu quandoq; volant, ut nubem facere, & tempestatis modo sonare videantur. Dicuntur sibi ipsis medicinam facere. Atterebat *f* pedi luxato ova formicarum, comminuta, & sub alis calefacta, unus. Sic integer intra paucos dies evasit. *Metuunt* Accipitrem, eundemq; supernè vel à latere accedentem, alis eventant, subtus volantem stercorebus opprimunt. Semine alii intereunt; & à canibus metuuntur.

f Gesner. in Ornith. Galenus *g* eos inter *cibos* attenuantes & boni succi refert; quod vel de ju-

Vsus. *gl. 6 de sanit. tuenda.*

venculis, vel de illis, qui in montibus degunt, sumendum est. Vindemiæ *h* *h Alex. l. 13. salub. c. 8.* tempore pabuli melioris copiâ non improbantur. Suaviores evadere, si mox captis capita amputentur, *i* *Car- i. l. 3. de fadanus* auctor est. Stercus oryza *nit. c. 21.* pistorum ad faciem exornandam *k k Aegineta l. 28. c. 8.* facit.

NB. *Sturni genus Indicum vide in Mantissa. Num. 6.*

C A P. VI.

De Coccythraustis.

Duplicem Coccythraustem *Al- Descri- drovandus* exhibet, *vulgarem* *Ge- ptio.* *fneri, & Indicum cristatam.* Illa ita dicta, quod rostro suo coccos & interiora ceraforum grana confringere soleat. Circa Verbanum Lacum Fringilla Montana, Bellonio, à rostri magnitudine Grosbec dicitur. Putabat hanc esse Aristotelis Pardalum quiddam. *Arist. H. A. l. 9. c. 23. Bellon. de Avib. l. 7. c. 30.* Falsò, ex collatione utriusq; patebit. Pardalus enim colore toto cinereus est, magnitudine par Sturno. Coccythraustes autem est, si Bellonij descriptionem sequemur, sturno paulò minor, rostro duro, & magnitudine proportionis insignis. Capite superiore mali aurantij colore, cum macula sub gutture nigra, collo cinereo, dorso fulvò, alarum extremitatibus ex viridi lutescentibus sicuti torques Palumbis, caudæ extremitate albâ subtus fulvâ. Ventre, pectore & gutture ejusdem coloris. Gesnerus ei tribuit, Alaudæ aut Loxiæ magnitudinem. *Rostrum* durum, validum, breve, latum, quod inferius à pennis nigris ambitur. Colorem capitis, in fœmina, charopum, vel ex flavo rufum; in pectore & ventre ex cinereo rubicundum. Pennas alarum superius nigricantes, in medio albentes, in imò coloris ferè cærulei seu Indici. Collum primum, & utrinque ad latera plumis cineris vestitum. Dorsum ex fusco nigricans.


Æstate in sylvis capitur, & tum in *Locus.* Italia in montib. agit. Sub Octobrem ad plana descendit. In Germania æstate rarius, hyeme frequentius cernitur. *Nidi-*

Victus. Nidificat in arborum cavis. *Victitat* nucleis ceraforū, quæ rostro confringit; nec non olivis, & alijs baccis. Non servat accrescēte ætate colorem. Caveꝑ inclusa, non solum rarò cantillat, sed ne institutionem quidem admittit.

INDICA incolis capitis viridis apud quos repentur, dicitur Fruso, Lusitanis Cardinalitius, quod galorum purpureum gestare videatur. Habet cirros in capite figurâ trigonâ coccineos, quo colore pariter, collum, pectus & venter refulgent. Alarū extremitates dilutè purpurascentes. Caudam pro corporis proportionē, lon-

giusculam, digitum auricularem latam, aliquantulum surrectam. Tibias breves & albicantes, ungues robustos & nonnihil recurvos. *Victitat* panico, amygdalis, & alfine herba, & cibum è manibus accipit. *Voces* avium. Iuscinia maximè imitatur. Sæpè se aquæ immergit, unde temperiei calidissimæ esse putatur. Visa icone sua in speculo, mirabilibus modis sibilos edendo, cristam deponendo, Caudam more Pavonum erigendo, alas motitando, gesticulatur, & speculum impetit.

* * *



HISTORIÆ NATVRALIS

DE

AVIBUS:

LIBER III.

De Avibus Insectivoris.

TITULUS I.

De Insectivoris non Canoris,

CAPUT PRIMUM.

De Picis Martiis.

Descriptio.



Picus Martius q̄ Marti facer sit dictus, δρυόκολαψ Hefychio, δειδροκόλαπης, ξυλοκόπῃ, & δρυκόπῃ Aristoteli, δρυότομος Aristophani, κολάφῃ

Miletio, recentioribus Græcis κερκισ-
a l.9. H.A. νισῆς vocatur. Genera ipsorum tria a
c.9. Aristoteles recenset; nos de pluribus inferius dicemus. An verò vel illa quæ occidentalibus Indis Alcatran testè Cardano dicitur, rostri & corporis magnitudine celebris, cinerea croceave pluma distincta, rostro duorum

palmorum, in acutum tendente, vel Picutus dicta, cui rostrum toto corpore majus, ubi capiti jungitur tribus digitis latū, aduncum, quo & arbores terebrat, & à parvis simiis se defendit, quæq; linguam loco pennæ habere dicitur, ad Picos pertineat, penes eruditos sit judicium. *Formam* ipsorum si attendamus, habent omnes *rostrum* rectum, durum, rotundum, & ad pertundendas arbores percommodum. *Linguam* ijs Aristoteles tribuit πλατεῖον καὶ μεγάλαν. Aldrovandus lon-

O 3 gam

gam quidem in omnibus & ad occiput usq; extendi, & super totum capitis verticem ceu in glomum convolvi, adeo ut cum exoritur, tanquam è multis involucris in longum admodum extendatur, observavit; latam minimè; quin est acutissima, & in extremitate quodammodo cartilaginea. Anatonem vide apud Aldrovandum. *Crura* quoque omnibus sunt breviuscula, at admodum robusta. Digiti pedum ante bini, totidem retrò, ijque valde conjuncti, ut arborem quam scandunt firmiter apprehendant. Cauda rigida, & duriuscula, cujus penne in extremitatibus ferme nude, quibus haud aliter quam pedibus inter rependum innituntur.

Locus.

Locum si spectes, in quibusvis reperiuntur regionibus, raro in Belgio, in Tarentino agro negari scribit *b* Plinius; sed *c* Aldrovandus omnia genera in Italia ali, maximum si excipias, affirmat.

b Plin. H. N. l. 10. c. 29.
c Ornith. l. 12. c. 30.
Victus.

Victitant vermibus, culicibus nempe formicis, quas exporrecta lingua velut in veru insigunt, & latitantibus sub lignorum corticibus, & medulla cossis. Ideò arbores tundunt, quarum *d* percussi corticis sono pabulum subesse intelligunt, & tam vehementer eas interdum excavant, ut ipsas ster-

e Arist. l. 9. H. A. c. 9.

Generatio.

Nidificant in cavis arborum, olearum inprimis. Tanto artificio nidum exstruunt, & excavant, ut admoto circino rotundius reddi foramen à perfectissimo Geometra non posset; & ligna quibus inter se consertis cōstat, facilius manibus separantur, quam ferro dissecentur. *Pullos* septem vel octo educant, quos exire ex ovo à cauda Hylas, referente Plinio, tradidit. Quoniam pondere capitum perversa ova posteriorem partem corporum fovendam matri applicāt. Nunquam humi consistunt, vel in faxis confident, ne aciem unguium obtundant. Scandunt verò per arbores omnibus annis κατὰ πρὸς ὁ ἀσπαραβῶται tanquā stelliones, seu ut Plinius vertit, feles, non modo sursum per arborem reptando,

sed deorsum etiam & sub ipsis ramis, pedibus & ventre sursum, tergo re deorsum terram versus converso; quod Aristoteli est ὀπίσθεν καὶ ὑπὸ τῶν ποσέων.

Humano ipsos *sermoni* assuescere *Vox.* Scaliger *d* author est: sed minus aptè, *d* Exerci- & rariora & pauciora quam Picam *tat. 237.* reddere, addit. Albertus *e* perfectè *c* l. 23. de aliquando loqui scribit. Validius quam soleret stridens pluviam præfagire credebatur. Hinc ei pluviae avis apud veteres nomen.

Vsus ipsoꝝ & in cibo; ideo tota fe- *Vsus.* re hyeme & autumnno Bononiae in foro venduntur, & in *Medicina.* Nam cum sale torrefactum quidam ad internas ani eminentias applicant. Asatum vel elixum incantatione ligatos solvere; oculos, gestantibus visum acuere; rostrum è collo suspensum, dentium, uvulae & tonsillarum dolorem curare; Kirandis sunt deliramenta. Idem ferentes ab apibus etiam si mella earum eximant, non feriri, Plinij. Clavum & cuneum arbori, in qua nidificant infixum, diu non hærere. *ff* Plin. H. Foramen verò nidi lapide vel ligno *N. l. 10.* obstructum, herbâ appositâ, seu illa *c. 18.* linaria major, seu aethiopis, eundem *Elia. H. A.* aperire, pari fide affirmatur. *l. 1. c. 45.*

C A P. II.

De Picis in specie.

ARTICULUS I.

De Pico Maximo, Majore, Varii minore Viridi nostrate, Picoluteo Cyanopide, Viridi majore, & Murario.


PICUS MAXIMUS, est omnium longè maximus, cornicis interdum magnitudine, infra gallinam aliquid, & excepto capitis vertice *totus niger.* Plumæ tamen in vertice coccineo vel flammeo colore egregiè micant, & velut cirrhum efficiunt. *Rostrum* habet longum, robustum, digitum parvum, longum, cujus superior pars, quæ juxta caput lata eminet, & duas trias, ut fo-

Picus maximus niger.

Grosser Schwarzer Specht.



Picus Varius minor.



Picus maior Bänder Specht.



Picus viridis. Grünspecht.



Picus murarius. Mauspecht.




Picus viridis maior.




Grosser Grünspecht.

Picus nidum suspindit.
Widwal Bijnolt, Goldmerle



Picus canereus.




Blauspecht,
Mauspecht.

Picus Luteus
Gyanopus.



Picus Chlorio Indicus.



Picus varius. Elsterspecht.
Grasspecht.





ut folium Cyperi, obtinet. *Linguam* oblongam duram & in extremitate asperam. *Digitos* binos ante & totidem retrò. Ungues recurvos.

PICUM MAJOREM *πικρὸν* Aristoteles vocat. Magnitudine merulam vincit, scribente Aristotele: Is quem Aldrovandus depingit, *rostrum* habet canaliculatum, *linguam* longissimam, musculosam, extremo apice duro nervo aculeatam. *Caudam* robustam, & ob superiores reliquas cooperientes plenas duro calamo donatas & inflexu difficillimas, renitentem. In tota ave triplex color conspicitur. *Plumæ* medio vertice rubicundæ, & saturato cocci colore conspicuæ sunt, quæ in fœmella mari alioquin per omnia simili desiderantur. In oculorum ambitu, ventre toto, & alis internis insigni macula albicat. In alis & cauda nigri aliquid conspicitur.

PICVS VARIVS MINOR majori per omnia simillimus est, & prorsus videretur idem. Nisi rubræ illæ maculæ in vertice & Uropygio deessent. *Dorsum* ejus versus lumbos magis quam superioris varium. Et ex albo nigroq; promiscuè maculatum, lineis interim obscuris transversalibus quæ alarum notis respondere videntur, confersum est.

PICVS VIRIDIS *κολιδες* est Aristotelis, inter Picos quidem eidem non recensitis, inter Picos tamen vel ob solam pedum & Caudæ dispositionem (duobus digitis ante & totidem retrò insignitur, & caudam rigidam habet) numerandus. Turturem magnitudine æquat. *Rostrum* habet nigrum, durum, robustum, acutum duos digitos longum. *Caput* crassiusculum in superiori parte ex maculis partim miniaceis, partim nigricantibus variegatum. *Oculos* alia quædam macula nigra ambit, sub qua rubræ illæ maculæ superioribus correspondentes pallidiores sunt. *Dorsum* & *ale* virides cum luteo tamen intermixto. *Mentum*, pectus, venter, crura pallidè virescunt, adeo ut ex albo & viridi permisceri videantur. Aestate eum silere ajunt. Ideo cum mense Aprili quidam clamentem audivisset, hyemem adhuc

metuendam prædixit. Altissimas arbores volatu trajicit.

Ossa ipsius tosta in pollinem redacta, & in vino epota validum sunt contra calculum remedium.

PICVS LVTEVS CYANOPVS ex Persia adfertur. Magnitudine à superiore nihil differt; caput tamen & collum crassius, & rostrum prolixius obtinet. Pennæ à medio vertice ad extremum *caudæ* usq; aliquid ferruginei habent, *rostrum* vero omnino ferrugineum. *Pedes* subcærulei, *ungues* nigri, cætera lutea; nisi quod *alarum pennæ* omnes in extremo quodammodo ferrugineæ sint.

PICO VIRIDI MAJORI seu Aldrovand. Maximo, *Rostrum*, quod in omni Picorum genere rectum est, incurvum, 12. c. 35.

pedes ad similitudinem aliorum; varias maculas in alis, tribuit Bellonius. Bellon. l. 6. de Avib. c. 15.

PICVS MVRARIVS muris turrium maximè adhæret, & vermiculos in eorum rimis inquit. Passere domestico paulò major est; sturni ferè crassitie. *Rostrum* habet oblongum, tenue, nigrum. *Caput*, collum, dorsum cinerea. Pectus albicans. Alas partim cineras, partim rubeas. *Caudam* brevem. *Digitos* pedum longos, tres ante, unum pro calce. Alas *in volatu* semper motitat, nec uno loco insidere novit. In foraminibus parietum *nidulatur*. Suavem *vocem* edit.

ARTICULUS II.

De Pico Cinereo seu Sitra, Piconidum suspendente, Chlorione Indico & Picis congeneribus.

PICUS CINEREVS Aristoteli *σίπων* seu *σίτη*; aliis *χλοπιδες* quasi materiem contundens, nomine omnibus communi; quibusdam *σῆσπιγος* & *κινάιδος*, quod Uropygium motitet; modernis Græcis *καγκρινίς* dicitur. Annumeratur Picis, quia eorum more super arbores repit. *Caput* ei parvum; *Oculi* exigui; *Rostrum* longiusculum, nigrum, rotundum *Collum*, dorsum, alas,

alæ, nec non & cauda superius è plumbeo ad cinereum vergunt: sub collo verò & ventre è castaneo ad rufum. Cervix ad latera lutescit. Quâ parte inter rostri principium & retrò oculos macula oblonga nigerrima insignitur. *Vivit* maceriem contundens. In foraminibus arborum, quas terra & limo artificiosissimè claudit, angusto aditu sibi relicto, *nidulatur*, & prolem numerosam progignit. Frangit Aquilæ ova. Res malefica ei tribuitur, quasi rerum cognitione calleat.

PICVS NIDVM SVSPENDENS cū Oriolo, Alberti, Aristotelis Chloreo, & Plinij Chlorione, Galbula seu Galgulo, Ictero, & Bononienfium Regalbula idem esse ab Aldrovando creditur. Modernis Græcis *συμφάγε* dicitur. Chlorem & Chlorionem Aristoteles & Plinius appellavere, ut luteum & viridem in ea reperiri colorem innuerent. Junior virescit; adultior aut saltem annua facta alis tantummodo exceptis tota evadit lutea. Magnitudine est par Turturi; colore pro ratione ætatis variat. In juniore rostrum est subfuscum. Adulta inter rostrum & oculos maculam habet nigram. Junior minimè. Illa alas habet nigerrimas, quarum penne & remiges maximè in extremitatibus suis albefcunt; junior superiores pallidas, inferiores nigricantes.

Locus. Locum si attendas Germaniæ esse peregrinam Gesnerus reliquit. Migratoria verò est. Plinius & Aelianus hyeme eam videri negant; æstivo tempore in conspectum venire, exortu arcturi syderis discedere, & pullis editis Italiam relinquere, adjiciunt. In Helvetia mense Majo apparere incipit, in quibusdam Galliæ locis Martio. Dependens pedibus somnum capit, quia se tutiorem sperat, si Plinio credimus.

Vitus. Vermibus more picorum *vescitur*, sed & ficibus. Vnde ipsi *συμφάγε* nomen.

Generatio. Proprium ipsi *nidum* in arboribus suspendere. Constat ille ex rufco & lanugine quandoq; ex sæno & culmis nonnunquam; ex cannabe & festucis interdum. Forma ipsi corbis

vel calathi ficarij è juncis intextis vincula de quibus pendet sunt, culmi, junci, fila è lino, serico, setæ equinæ & cætera. Iconem in Aldrovando vide.

Cum *cantillatorio* vel loriot sonat, *Fox*. imminente pluvia fistulæ instar canit.

Vsus ipsius in cibo est & *Medicina*. *Vsus*. Pinguescit mirum in modum. Emoritur si ab icterico conspiciatur æger, ipsa evadit. Ad Germanos accedens, non amplius nascituras pruinas promittit.

CHLORIO INDICVS maxima sui parte, quin toto corpore luteo est; si coronam verticis & caudæ alarumq; maculas cæruleas, & rostrum pedesq; quæ insigniter rubent excipias.

PICIS CONGENEREM Aldrovandus Marchioni Fachineto debet. Erat, quantum ex pictura conjicere licebat, Coccothraustis magnitudine, rostro luteo, acuto, Picorum haud abfimili; vertice, cervice & toto dorso viridi, Vropygio albo, pennis alarum vestitricibus viridibus; remigum superiorib. albis, inferioribus, & cauda cæruleis. Prona pars à rostri initio ad anum usq; coloris cinnaberis erat.

NB. *Picarum genera exotica vide in Mantissa. N. 5.*

CAPUT III.

De lynge seu Torquilla, lynge congenerè, & Certhia.

PROPTER rostri & linguæ constitutionem, Picis Jynx subjungitur, quam Galenus & Suidas *κιναιδρον* Tzetzes *σεισπηλον* & Cinclida, Athimontis incolæ teste Bellonio Alcionem, Theocriti interpretes *σεισγλαν*, alij Turbinem, Gaza Torquillam vocat. Vincit magnitudine fringillam, Rostrum habet firmum ex plumbeo & nigro permixtum. *Lingua* aculeum tam acutum & validum, ut humanam cutim haud aliter ac acicula penetret. Ea infra arteriæ summum subit, & supra cranium reflexa, propè nares inferitur. Est autem gemina ubi ab occipitio reflecti incipit, & in syncipite rursus

rursus utræq; partes conveniunt. *Dig-
gitos* pedum utrinq; duos habet. *Digi-
torum* utrobique longior alter, cum al-
tero brevior conjungitur. Conspi-
citur in quavis regione circa arbores.

Victus.

Vesitatur formicis, easq; exertâ lin-
guâ velocissimè aculeo transfixas ve-
nari & devorare solet; nec unquam
rostro attingit. Dicitur *ῥιζεν*, id est
stridere. Sed *Ælianus* obliquam ti-
biam voce sua æmulari ait.

*Genera-
tio.*

Nidulatur in arborum foraminibus,
villis & domibus. Octo vel novem *ova*
uno partu excludit. *Ægerrimè* cicu-
ratur. Si manū teneatur, caput in u-
tramq; partem circumagit. Apud *Ge-
snerum* enutrita, accessum hominis
ægrè ferebat, collum in sublime eri-
gebat, rostrum sine morsu modo ex-
tendebat, modo retrahebat. Plumæ
capitis rigebant. Caudam erigebat &
dilatabat. Vfus ipsius est in cibis.

*Aldrov. l.
12. Ornith.
c. 43.*

JYNGI CONGENER, quem *Al-
drovandus* describit, magnitudine e-
rat par *Jyngis*; colore capitis, dorsi,
alarum, & totius caudæ ferrugineo;
maculis luteis transversalibus distin-
cto, pectore & ventre albicantibus, &
lineis luteis per longitudinem exor-
natis. Tibijs luteis; digitis picorum
more oblongis.

CERTHIA, *Aristoteli* *ῥεθίων*, vel
ut *Robertus Constantinus* opinatur
ab astu *ῥεθίων* dicta, avicula est exigua,
Regulo paulò minor. Rostrum habet
arcuatum, in superiori parte longius
& crassius. Guttur & pectus candi-
cans; dorsum & alas fulvescentia, ni-
gris maculis ubiq; distincta. Caudam
brevem, rigidam, & in extremitate a-
cutam. Ungues valdè aduncos. *Victi-
tat* insectis minoribus. In cavis arbo-
rum *nidificat*, & viginti quandoq; *ova*
ponit. Vocem ipsi claram tribuit *Ari-
stoteles*. Perpetuò ferè nunc in hanc
nunc in illam partem volitat. Toto
anno eandem patriam incolit. Arbo-
rum ramis fringillaginis instar sese
annectit, & Picorum more arbores

*Arist. H. A.
l. 9. c. 17.*

perreptat. Sagax ipsi in vitæ offi-
cijs ingenium *Aristoteles*
adscript.

* *
*

C A P. IV.

De *Merope*.

*M*eropis nomen *Albertus Pico* vi-
ridi, *Niphus Grallo* suo, alij *Paro*
majori, sed malè imposuere. Conve-
nit illi aviculæ, cujus vox multiplicem
partitionem capit, idè à *μερισμῶ ὁπὸς*
a dicta est; quæque *Cretensibus* *b* *με-* *a* *Prob. in*
λίσσος φωνή, seu *Apiaster*, *Rasi Alkenius*, *l. 4. Georg.*
vel *Alkerius*; *Alberto Muscipula*, alijs *b* *Bellon. l.*
Riparia, *Parra*, & *Gangrena* teste *Ki-* *de Avibus*
ranidis interprete dicitur. Magnitu- *c. 27.*
dine sturnum superat, *Merulis* par est.
Aristoteles *c* hoc tantum de illa ha- *c. H. A. l. 9.*
bet. Pennas ejus inferiores pallidas *c. 13.*
esse, superiores cæruleas, ut *Halcyo-*
nis, postremas pinnulas rubras. *Pli-*
nius d *Aristotelem* secutus, pallido *Descri-*
intus colore pennarum, supernè *ptio.*
Cy- *d* *H. N. l.*
aneo, priori subrutilo esse dixit. *Aldro-*
vandus & maris & fœminæ descriptio-
nem tradit, *Mari* rostrum est longum,
durū, ad instar falcis *messoriæ* arcua-
tum, & quasi triangulum *Iris* ita rube-
scit, ut aliam omnem rubedinem su-
peret. *Fœminæ* color ubicunq; minus
intensius. Tergus quodammodo vi-
rescens. Linguam habet sublongam
& gracilem: oris rictum tam amplum,
referente *Alberto*, ut multas muscas
in os ejus humoris insidentes capiat.
Vesiculam fellis amplam humore vi-
ridi smaragdi instar refertam.

In *Creta* insula tam vulgaris est, ut *Locus.*
nusquam non in ea conspiciatur: re-
peritur & in *Italia*. *Græcis* per con-
tinentem, incognitam scribit *Bello-*
nus.

Victitat e apibus; ideo *f* *Virgilius* *Victus.*
Meropis nidum propè *alvearia* prohi- *e* *Arist. H.*
bet, & cicadis. Sed nec *lampas*, cau- *A. l. 9. c. 40*
calidis, & raparum feminibus, vel tri- *f* *Georg. l. 1.*
tico abstinet. *Nidificat* in *g* cavernis, *g* *Arist. H.*
interdum *h* ad sex pedum altitudi- *A. l. 8. c. 1.*
nem, interdum ad quatuor cubitos, *h* *Plin. H.*
defossis. Et sex *i* aut septem pullos *N. l. 10.*
parit. *c. 33.*

Volat gregatim, circa montes qui
thymum ferunt frequenter; & cum
reliquæ aves quasi sursum ad oculos
versus volitent, ille retrorsum cau-
dam versum eum exercet.

P

Vocem

Vox.

Vocem instar hominis quodammo-
do edit, qui ore in rotundum clauso
sonet grulgruru, urubul, & longè au-
ditur. *Ingenium & Mores* si spectes,
migratoria est. Pullos ne faciliè capiā-
tur de loco ad locum transfert, & au-
thor est Aristoteles esse qui confir-
ment, Meropes parentibus senescen-
tibus vicem reddere; imò eisdē quam
primum facultas datur, liberorum o-
perā ali.

Vfus.

Vfus ejus in *Medicina* aliquis. Fel-
si cum gallis & oleo omphacino mi-
sceatur, firmam capillis nigredinem
inducit. Frixa in oleo manus ab apum
punctionibus immunes reddit, si cre-
dere fas est. Est & alius *Merops* quem
Germani *Hirundinem* marinam vo-
cant. Est superiore paulò longior, &
crassior. Rostrum habet nigrum, lon-
gum, acutum, & proprius ad falcem
messoriam, quā in illa accedens.
A rostro maculam nigram, quæ per o-
culos retrò ad colli initium usque de-
fertur. Alarum pennæ, variis colo-
ribus insigniuntur. Primæ cæruleæ
sunt. Secundæ ex cæruleo & flavo mi-
xtæ, Tertiæ omninò flavæ, remiges
nigræ & in extremitatibus rubræ.

CAPUT V.

De Regulo.

Regulus, Græcis *Trochilus*, *Orchi-*
lus, *Tyrannus*, *ορχίλιος, βασιλισκος,*
ρόβιλος, τρέκλος, κόρπιλος, βασιλιπών, &
Tettigon, in Creta in primis, alijs *Rex*
Senator, *Parra*, *Bitricus*, & *Acalan-*
this dicitur, quæ omnia nomina *Pas-*
seri Troglodyti communiter tribuū-
tur. Aristoteles a ipsi corpus non am-
plius tribuit quā *Locustæ*, & cristam
ē pluma elatiuscula rutilam. Quem
Aldrovandus describit, à capite ad
extremitatem caudæ mensuratus, vix
palmum exsuperabat. *Cristam* in fron-
te erectam colore ferè aureo gerebat,
quæ in mortuis non conspicitur. Ca-
put, collum, dorsum, & mediæ alæ ex
viridi lutescebant. Remiges nigrica-
bant, & ad latera flavescebant. Propè
earum exortum notabilis viscebatur
macula. Guttur & pectus ex albo fla-
vescebant, venter candicabat. Fæ-

mella pallidioribus capitis sunt con-
spicue. Minores etiam ipsis cristâ pen-
nulæ, quarum caput lineâ crassâ satis
velut corōna eleganter ambit. In alis
duas habent albas maculas, parvam
unam, longam alteram, cum mas hâc
solam habeat.

Hyeme degunt in urbibus & fora-
minibus, reliquo tempore in sylvis,
inter fruteta & juniperos. *Locus.*

Vescuntur b vermiculis, quorum *Victus.*
nomine muscæ, formicæ, coffi, & simi- b *Arist. H.*
lia insecta intelliguntur. Muscis adeò A. l. 8. c. 3.
ingurgitari quidam dicunt, ut aliquā-
do de vita periclitentur.

Bis anno pariunt & ova septem aut *Genera-*
sex pisorum ponunt magnitudine. tio.
Volant solitaria; & aliqui post migra-
tices recedunt.


Vox ipsorum zinzulare, ut Autho- *Vox.*
ri *Philomelæ* placet. Magni & sicci in
hyeme frigoris tempore, præcipuè
cantant. Parvitem corporis ingenij
solertia in ipsis natura pensavit. Ausu
enim magno contra c *Aquilam* pu- c *Aristot.*
gnare conantur. Cum se proximè H. A. l. 9.
quasi manu capiēdas obtulerint, cas- c. II.
so hominis conatu profugiant. Multi
uno specu in hyeme conduntur, ut
parvus in tam minimis corporib. cal-
lor, societate augeatur. Cum in veru-
culo igni apponuntur, tamen nemo
vertat, tamen per se convertuntur:
scilicet, ubi ea pars, quæ igni obversa
fuit, assata est; altera, quæ non est assa-
ta, quia gravior, descendit. Motu in-
solito & cantu quamvis suavi gestien-
tes, quia ariduli vaporosum aërē plau-
sibiliter excipiunt, & adventantem
humiditatem, quâ refocillantur im-
plorant, pluvias affuturas denotant.
Eadem ingruunt, Arato teste, si cava *Aratus in*
terrâ subierint. Vnde floricomis hy- *Pheno-*
menæis infestos dixit *Avienus*, quia
isti sereno cœlo gaudent.

Datur & alius *REGVLVS NON*
CRISTATVS, qui quandoq; in agro
Bononiensi capitur. Similis hic, cri-
stam si excipias, superiori *Regulo*. Ro-
strum ei gracile, oblongiusculum, sa-
turrimo atro colore resplendens, in-
terna capacitate, & utraq; mandibu-
la, unâ cum linguis rubicundis. Ver-
tex, collum, Dorsum colore betico ad
flavum

Iynx seu Troguilla.
Windhals Krimz.




Iynx Congener.



Passerculus Troglodytes.
Zünslüpfle.



Regulus. ZünKönig.




Certhia.
Barchengel.



Merops Congener.

Passer Troglodytes Armeniaais.



Asijlus.

Merops.
Imbenfras.




Hyrundo riparia.
Wasserschwalb Spyr.



Hyrundo agrestis.
Spyr schwalb.



Passer Troglodytes Bellonij.



Vrupa.




Widhopf.



Hyrundo.
Haus schwalb.

Apus. Geijr schwalb. Kirchenschwalb.



flavum nonnihil vergente. Oculi nigrescentes, quos plumæ cinereæ ambiunt. Alæ & cauda exteriori superna superficie ex fusco ad spadiceum vergunt. Pectus, alæ internæ ac supermæ, caudæq; inferioris initiū sunt flava. Postici digiti unguiculus omnium est maximus; digitus à medio anticorum magnitudine secundus, duo ceteri antiqui minores & æquales inter se sunt. Mascula alba, quam cristatus habet, in hoc non conspicitur.

CAPUT VI.

De Passere Troglodyte, & Asilo ave.

Passer Troglodytes, quem Aetius *σιλπιπιδά* vocat, etsi multò minor Regulo, quod hic pluribus pennis vestitur, appareat: duplo tamén plus carnis possidet. *Rostrum* habet longiusculum, acutum, supernè fuscum, infernè albidum; *lingulam* admodum exilem, bifidam, continens. Ventrem, collum, ac dorsum ex fusco ad spadiceum inclinante vestitum. Pectus cinereum; Caudam semper subrectam & albo colore interpunctam. *Viscitat* vermiculis. *Nidum* sapius in sylvis, aliquando in posticis edibus, & stabulis stramine tectis; juxta parietes domuum, & sèpes, ex musco foris, ex plumis intus construit. Ovi is erecti, & in altero suo fine consistentis formam habet; in medio latere ostiolum. Per hoc ingreditur, & regreditur. Bis anno parit, & ova novem, uno tempore deponit. *Volat* solus, nonnunquam gregatim, semper breviter; & quoties aliam sui generis offendit, eam aggreditur. Mira ipsi *Cantus* inprimis si cicuratur, (cicuratur difficulter) suavitas; quem Majo præsertim, sæpè hyeme exercet. In festo trium Regum, cum omnibus, quos eo anno educavit pullis cantillare Galli fabulantur. Cinis in pulverem exusti, & ex vino bibiti, calculosis opitulatur. Cerebellum in Diasatyron recipitur.

Bellonius
l. 7. de Avib. c. 4.

Quem Bellonius pro *Passere Troglodyte* quemq; Galli Favette ronse à co-

lore fulvo vocant, ponit; Ruticillæ admodum est similis, paulò verò minor, corpore oblongiusculo, rostro gracili & oblongiusculo. *Mas* magis quàm fœmina rubet. Vix plus carnis obtinet, quàm digiti extremum. Unus tantum in eo color, qualis in Luscinia cauda. Hyeme non videtur. Nidulatur, sæpè inter dumos hortorum, & in ramis cicutæ; aliquando retrò parietes in urbibus & pagis. *Nidum* ingeniosè intus ex fœtis equinis cõstruit. Quinq; plærumq; ova edit, eaque cinerei coloris, nigro maculati.

ASILUS seu *σίση* inter aviculas vermivoras ab Aristotele numeratur; quanquam hoc nomen & insecto volatili, quod Equos infestat, tribuatur. Si ea est, quam Bellonius ob parvitatem Philosopho ita vocari scribit, & depingit; habet cristam capitis flavā, rostrum nigrescens, sed in his extremitatibus aliquando luteum, longiusculum, & debile: Caudā, tergus, alarum plicas & extremitates, lutea: crura, pedes, & ungues nigra. *Degit* in umbrosis nemorum locis. *Viscitat* bestiolis vivis & grana aversatur. *Semper canit*.

CAPUT VII.

De Hirundinibus in genere.

Hirundo, seu à voce sua, ut Varro credit; seu ab hærendo, quod tectis ædium, vel trabibus, ubi nidificat, adhæreat, dicta, à Græcis *χελιδών*, *χελιδώ*, *κοπίλην*, *κεκρότης*, *κοπίλη*, *ἀφίλως*, *ἀδωνίς*, *κρίης*, & *ολοιυάνια* vocatur. Vagam volucrem Ovidius, Daulidem avem Plutarchus, Bistonis alitem Seneca, Pandione natam alij dixerunt. *De Generibus* Hirundinum non conveniunt authores. Aristoteles, a *Domesticas*, *Apodes*, & *Falcatas* agnoscit. Plinius, b *Domesticas*, *Rusticas*, *Apodes*, & *Riparias*. Gesnerus, c *Domesticas*, *Sylvestres* & *Riparias*. Scaliger, d *vulgares nigras*. *Subfulvas*, simili formâ in ripis nidificantes. Quater illis gradiore, toto corpore atrâs, fœdissima facie, crurib, brevissimis, crassissimis,

P 2 hirtisi

a Plin. in
H.A.
b H.N.I.
10. c. 33.
c in Ornith.
d Ex. 228.

hirtis; & *Buteonis* magnitudine, sed facie nullo modo ab his dissimili. Dantur & albæ, seu quod præ nimio frigore albescant; seu quod canescant ante tempus, f ut alia quædam animalia, seu quod artificio tales evadât. Si quis albas, inquit Aldrovandus, g desideret, ova earum dum cubant, olivâ illinat.

Descriptio.

Descriptione longa opus nō est. Formæ est grææ, nigredinis decentissimæ, modicæ carnis, plumarum multarum. Albedo totum cingit ventres; hinc *πικίλη* Aristophani. Color cæruleus, ad latera per caput alasq; refulet, unde Cyanea Simonidi. Rubedo sub gutture potissimum & pectore emicat. Unde Ovidius.

— *Neg; adhuc de pectore cadis*
Excessere nota, signataq; sanguine plumæ est.

h Plin. H. N. l. 12. c. 37. *Oculi* eruti *h* renascuntur, seu quod pullorum acu puncti visum recipiant, quod Aelianus i de alba in Samo nascente ab Aristotele proditum ait; seu quod laceratis eorum oculis, alij subnascentur, ut nonnulli prodidere. *Cauda* est bifurcata, & longa. *Pedes* breves nigri & debiles. *Interna* si spectentur, *k* fel alijs ventri, A. l. 2. cap. alijs intestino adhæret. *Ventriculus* iplis longior. In dissectis pullorum qui primo partu exclusi sunt, ventriculis lunâ crescente, lapilli, chelidonij dicti, magicis narrati artibus reperiuntur. De colore non constat. Nigrum & album Trallianus, l candidum & l. l. c. 15. rubenticolore *m* Plinius, varium & m Plin. H. N. l. 11. c. 17. parvum *n* Dioscorides, prodidere. Aldrovandus, unum intus albicantem, n Dioscor. l. 2. c. 49. extra melinum, alterum subrubentem habuit.

Locus. In nulla non regione inveniuntur. o Plin. H. A. l. 10. c. 24. A Thebarum o duntaxat, quod urbs illa sæpius capta sit, & Bizæ in Thracia, propter Therei scelera, abhorrent. In Ægypto perennant, nostræ hyeme menſe Septembre seu Octobrevel conduntur, vel in vicina tepidiora p loca abeunt. Inventæ multæ in apicis montium recessibus nudæ atque deplumes. In quadam Germaniæ superioris sylva, incisa quercus putrida, plena Hirundinibus inventa

est. In Septentrionalibus locis inter cannas descenduræ, sese colligant, & sæpiſſimè in modum conglomeratæ massæ, à piscatoribus extrahuntur, & in æstuaria deportatæ, caloris accessu resolutæ, volare incipiunt, sed exiguo tempore durant. Redeunt sub veris initium: ideò à Rhodijs sub hyemis finem invitantur. Et Calpurnius illis visis oves ab hybernis stabulis educi jubet. Easdem redire indicio observatum. Migraturæ † cum rubro filo † Vosſius de pædi alligato dimissæ sunt, idem retuleret reduces. c. 82.

Victitant insectis, ut cicadis, ideò *Victus*. eas in edibus haberi vetabat q Pythagoras, apibus, unde nidus earum al- q Plut. l. 8. Sap. q. 7. veis propinquos tolli, Aristoteles r H. A. l. 9. jubet; muscis, culicibus, papilionibus, c. 40. & aliis. Carne vesci, credidit s Aristoteles, an granis dubitatur. s H. A. l. 8. c. 3.

De artificiosa *Nidorum* structura, Generatio in sequentibus dicemus. Quantum ad coitum t cum cæteræ aves in eo à t H. Aelian. maribus conscendantur, Hirundines, H. A. l. 2. c. 3. contrario quàm aliæ modo miscètur, aversæ nempe. Bis anno, u quinq; semel ova, magnitudine olivæ, ferrugineis maculis conspersa pariunt, nec plura utero gerunt. Primi partus, injuria frigoris (prima namq; parit) corumpuntur; posteriore pullos, sed cæcos proferunt. *Fœtus* educatio summâ peragitur à mare & fœmina æquitare.

Alterant cibum, z & à primo natu, x Plin. H. finitur in ultimo. a Nil amplius, qui A. l. 10. accepto cibo locum mutavit, accipit, c. 33. donec in pristinum redierit. Heliodus citante Æliano, dimidium tantummodo somnum perficere ait. z Ælian. H. A. l. 3. c. 25. a Oppian. in Cynege. *Vox*.

Vox ipsarum per fritinnire, thrinsare vel drinzare, zinzilulare, minurizare, à latinis; per φριτίννειν, πινθίνειν, & πινθίνειν à Græcis, exprimitur. Canunt stantes; aliquando in volatu clamant breve & abruptum quiddam. Manè & tempore coitus magis strepunt.

Rarissimè propter pedum debilitatem & brevitatem *incedunt*. Volucrum, b verò solis, flexuosi volatus, b Plin. H. velox celeritas, quibus ex causis neq; N. l. 10. rapinæ cæterarum avium obnoxia c. 33. sunt.

Ingenium & in eo qui quidem quod *Ingeniū*. cicu-

cicurari nequeant pullis Chelidonia applicata, visum restituant, blattas ovis infestas apio fugent, & postquam pullos à serpente laniatos † animadverterint, circa ejus maxillas se tamediu, donec conficiantur, volvant; testantur; sed in Nidorum structura maxime. c Hos luto construunt, stramento roborant. Si quando inopia est luti, madefactis multâ aquâ peninis, pulverem spargunt. Ipsum verò nidum mollibus plumis floccisq; consternunt, tepefaciendis ovis, simul ne durus sit infantibus pullis.

Presagiū Putantur pluvias *presagire*, cum circa lacus ita proximè volitât, ut etiam ventre contingant; vel hac & illac volantes parietibus subinde hærent; vel usque adeò humiles feruntur, ut pedibus humum verrere videantur; seu quòd tum muscas & alia animalia veniuntur; seu quod commotam sursum auram perhorrescentes deorsum pavitent.

Affectus. Quantum ad *Sympathiam* vel *Antipathiam*, vix aliquos videntur, vel amicos vel hostes habere. Cum passeribus tamen, qui initio veris earum pre-occupare nidos conantur, pugnant, & observatum Coloniae, Hirundinem cum Passerem ejicere non posset, stridore suo multas convocasse. Hæ cum impetu advolâtes, luto, quod ore singulæ gerebant, nidi foramen obstruere, Passer inclusus suffocatus est.

Usus. *Usus* ipsarum pullorum inprimis sylvestrium in *Medicina* maximus. Cor cum melle devorât, quartanas pel. lit. Lapilli, croceo linteo involuti, li. noq; ad collum suspensi, easdem tollunt. Caput matutino pascenti præcisum, & lunâ plenâ linéo panno adalligatum, capitis medetur doloribus. Idem lapilli si manu singuli teneantur, faciunt, si Marcello credimus. Aqua hirundinum destillata Epilepticos sublevat. Lapilli ad brachia alligati, si Sexto credimus, eosdem sonât. Nec malè fimus cum aceto & castoreo à quibusdam iisdem exhibetur. Stercus cum felle taurino inunctum capillos denigrat. Fel & sanguis mirè taliginibus profunt. Idem, si tepidò applicetur, oculum ictu læsum resti-

tuit. Celebris nidorum in angina usus, sed & crematarum cinis eandem discutit.

C A P. VIII.

De Hirundinibus in specie.

ARTICULUS I.

De Hirundine Agrestis, & Riparia.

Hirundo *agrestis*, quam Plinius *Ru-* Plin. H. N. *sticam* vocat, in capite, collo & I. 10. c. 33. dorso, hirundinis domesticæ est colore. Sub rostro, gutture, & toto ventre ad caudam usque candicat. Pedes habet pennis obsitos. Sed & maculam propè caudam albam tantæ magnitudinis, ut dū volat, nihil in ea nigredinis, caudæ extremitates, caput, alas, & dorsum si excipias, appareat. His notis à domesticâ distinguitur. Caudam quidem etiam bifurcatâ habet; sed longissimis illis, quæ in domestica visuntur, destituitur. Raræ sunt in domibus. Diversos figurâ, sed eadem materia confingunt nidos. Totos supinos, faucib. porrectis in angustum, utero capaci; mirum qua peritia, & occultandis habiles pullis, & substernendis molles. In Ægypti Heracleotico ostio molem continuatione nidorum evaganti Nilo inexpugnabilem opponunt; stadij ferè unius spacio; quod humano opere perfici non posset. In eadem juxta oppidum Coptom insula est sacra Isidi, quam ne laceret amnis idem, muniunt opere, incipientibus diebus vernis palca & stramento, rostrum ejus firmantes; continuatis per triduum noctib., tanto labore, ut multas in opere emori constet. Ea militia illis cum anno redit semper.

RIPARIA Marcello Empitico Ripariola, Gazæ Falcula, Græcis Drepanis dicitur. Fœmina pronè præterpectus candicat, supinè fusca est; mâs verò magis nigricat, collo toto, præterquam sub rostro, ubi macula est, lutescens. Hoc tantum cum Hirundinibus omnibus commune habet,

quod pedibus sit curtis, multum volat, & insecta in volatu capiat. *Nidos* non faciunt. Ripas excavant, atq; ita internidificant. Aldrovandus illatis tantum plumis & stramentis nidulari audivit. Aestate tantum apparent, mense Augusto cum Sol est in Leone, & cum imber incessit. Eo tempore pariunt, cumque pulli convaluerint, moriuntur. Plinius, migrare multis diebus antequam futurum est, ut amnis auctus attingat ejus nidum, author est. Huc refer Hirundinem MARINAM aucupibus Italis dictam, quæ corpore est major, pedibus longioribus, ventre toto ad pectus usque candicante, capite, alis, & dorso fulcescentibus, Rostrum robusto, nigro; Rictu maximo eoque; coccineo. Caudâ bifurcata, pedibus aterrimis. A rostro per oculos ad pectus ferè usque notabilis linea atra defertur, & velut torquem propè pectus constituit.

NB. De Hirundine exotica vide Mantissam. Num. II.

ARTICULUS II.

De Apode.

APos, alijs κύπελος, nonnullis *Hirundo marina* vocatur. Est toto corpore plumis egregiè munita, unius coloris, qualis in murium pilis, conspicitur. Caput habet supra admodum latum; collum brevissimum, rictum adeò amplum, ut integros scarabeos deglutiat, rostrum exiguum, nigrum, alas longas, caudam bifurcatam, crura brevifcula, ad digitos usque pennis obsita, ad rependum potius quam insistendum facta. Digitos utrinque binos, ut in Picis Martii, unguibus acutis armatos, quibus quod rapuit adeò constringit, ut id perfodiat.

Viscitat insectis per aëra volantibus, eaque nisi volans capit & edit. *Oculorū* verò acie ita valet, ut per mille passus muscam observet, & subito insequatur. *Volant* plurimum, & gregatim, arcus tenus figura, sæpè alas non movendo. Hæ sunt quæ toto mari cernuntur, nec unquam tam longo naves tamque continuo cursu recedunt

Plin. H. N. l. 10. c. 39.

à terra, ut non circumvolitent eas Apodes. Cætera genera resident, & insistent: his quies nisi in nido nulla, aut pendent aut jacent. Nidificant in foraminibus turrium. Visæ & in speculis & abruptis fluminum littoribus. Foetus earum Bononiæ magno vaneunt.

CAPUT IX.

De Vrupa.

UPupam avem, quæ Græcis communiter *ὑπὺ*, Orus Cucupham, alij *σὴτην*, *ἀλεκτρούνα*, *γέλασον*, *κυκύφαν*, *Phylinopteron*, *Agriopetion*, & *ἀγριοκόκκον* appellant. Magnitudine a paululum *Coturnicem* excedit. Color in ea cinereus albus & nigricans, quem mutat autumnoinprimis. Unde apud Aeschylum *δύο μορφῆς φάνειν* dicitur. *Rostrum* ei nigrum, rotundiusculum, falcatum, parumper à lateribus depressum. *Capiti* plicatilem *b* cristam, *b* Plin. H. *τελοφίαν* Græci dicunt, ex viginti sex plumis constantem, dedit natura, quæ per medium caput à rostro residet, & per capitis longitudinem pro avis arbitrio, surrigitur & contrahitur. Hinc *μακροσκήρον*, & *κορυδαίον* poëtis cognominatur. Fit id beneficio *c* musculi, qui inter verticem capitis & rostri initium in quodam cavo locatus, totus cōtinuus, à verticis extremo, & frontis carnosiore initio nascitur, & utrinque supra nares, infima parte carnosior, & rubicundus, extrema & suprema, cui cristæ plumulæ profundè implantantur, membranofus magis, ac cutaneus, desinit. *Lingua* ipsi parva, trigona, initio lata, extremo, instar æqualium laterum trianguli acuta, in profundo latitat. *Aspera arteria* initio divaricationum, quibus in pulmones utrosque finitur, duo velut oscula, extrinsecus laryngis vicem supplentia exhibet, quibus pellicula tenuissima prætenditur. Annuli semicirculares in utrumque latus terminati, nequaquam internâ parte coeunt, sed tota interior facies hiæ, subtilissimâ membrana obtenta tātummodò cooperta, quæ aëre & spiritu copioso, vocis efformandæ ac edendæ gratia,

b Plin. H. N. l. 10. c. 24.

c Aldrov. Ornithol. l. 17. c. 11.

via, concepto, in amplum distendi potest.

Locus. Montes & sylvas incolere Aristoteles d testatur. In sepulchris, & humano stercore commorari Isidorus. Rarius arboribus insidere, sæpius in terra, maxime ubi immundities est, experientia. Plurimo anni tempore, in montium angustis, & arborum cavis locis latitat. Ideo verno tempore de plumis solet conspici.

Victus. Vescitur myrti baccis, vermibus, formicis, muscis. Uvis sæpè tam immodicè, ut ebria evadat. De Nido non convenit inter Authores, nec sibi constat Aristoteles. Gesnerus sub stipitibus arborum. Olaus M. e in paludum

Genera. tuberibus nidificari tradit. Hic f modo nidum lutu vice stercore humano, seu ut intolerabili odore foeditate homines ab eodem fuget; seu ne venchata ad eundem animalia accedant, circumlinire; modò, stipites arboru subire, & sine ullo instrumento in cavis parere, scribit. Terna ova Perdicu

Volatus. similia, g sed minora, duriora, asperius. Hic f modo nidum lutu vice stercore humano, seu ut intolerabili odore foeditate homines ab eodem fuget; seu ne venchata ad eundem animalia accedant, circumlinire; modò, stipites arboru subire, & sine ullo instrumento in cavis parere, scribit. Terna ova Perdicu

Vox. Lentè admodum volat.

Vox ipsi per æstatem alia, alia per hyemem, si Alberto credendum; si Polluci h πωμίχα semper, si poetis, πῆ πῆ semper clamat. Si gemit, pluviam indicat. Si clamat, vulpem in vepretis hædere innuit. Si ante vitium tempus canit, insignem vini copiam prænunciat.

Ingeniū. Ingenio non destitui certum, si ex uvarum esu ebria adiantum herbam ori inferere; & circumambulando sibi mederi, gramen adversus βασιλικαν edere; clausum nidum, herba quadam, prodente i Æliano aperire, verum est. Senescentes, inter pullos jam adultos plumas deponunt, & visum amittunt. Ab iisdem, donec vires recuperent, pascuntur. Visus admota herba, restituitur.

Vsus. Invenit & in Medicina usum. Cor in lateris doloribus laudatur. Mira in somniis videbis, si sanguine tempora illeveris. Lingua oblioso suspensa prodest. Pennarum suffitus vermes expellit. Corium capiti impositum

dolorem sedat. Ala dextra cum dente hominis ad caput dormientis suspensa, non expergisci, donec auferatur, fabulam esse credo.

C A P. X.

De Paris in genere, & in specie.

PARUS, Aegithalus, Parix, & Parula dicitur. Tria ejus Genera agnoscit Aristoteles; plura adjiciunt alij. Omnibus juxta oculos maculae albae sunt. Unguibus etiam omnes reptare, & facile, ubi volant, adhærere possunt, ita ut nucem è filo illis suspensam adhærerescentes comedant.

Semper ferè in arboribus degunt; Locis rarò terram petunt. Ad Belgas & Anglos quotannis sub initium Octobris accedunt.

Vescuntur muribus eute tantum de. Victus. tracta. Objectis, vermibus, apibus, & Vox. nucibus, canabino semine, quod dum rostro perforant, sonum fabri malleum in aërem adigentis excitant, Sebum eis exhibetur, ut lentore fauces demulceantur, & suavius canant.

Nidificant in cavis arborum quidam, Genera nonnullæ nidos de arborum ramis tior. miro artificio suspendunt. Ova plurima edere scripsit Aristoteles. Grega Arist. H.A. tim & impetuosè volat. Tinnire per l. 9. c. 15. noctem author Philomela scribit. Veniunt apud Helvetios in cibum, & regium morbum, patientis aspectu in se, si nonnullis credimus, recipiunt.

Species Parorum sunt, Major, Palustris, Sylvaticus, Ater, Cæruleus, Candatus, & Cristatus.

PARVS major Aristoteli αἰγίθαλος & Αἰθρὸν, l. αἰγίθις, Turnero & Longolio Parus 17. Ornith. Carbonarius, Gazæ Fringillago vocatur. Coloribus quinque viridi, luteo, albo, nigro, & cæruleo elegantissime variat. Caput integrit vitta, præintenso nigrore instar corvi resplendens. Tempora & oculorum ambitus albè. Lingua extrema in duas partes fissa est, quarum utraq; denuò in exigua quasi capillamenta subdividitur. Cauda est bifida, partim cinerea, partim nigra, cujus extremæ utrinque pennæ duæ, exte-

exteriori parte candent. Propter cantus suavitatem alitur, eumque per totum continuat. Pulverizatus colicos & nephriticis cruciatus tollit.

PARVS INDICVS tribus potissimum coloribus, oculos si excipias, cæruleo, albo, & nigro constabat. Guttur, pectus, & totus venter candebat. Vertex capitis & collum coloris erant cærulei diluti Pedes nigerimi.

PARVS PALUSTRIS in agro Bononienſi Paronzino, Bellonio, quartum Parigenus, Turnero Schæniclos Aristotelis dicitur. Capite est prorsus nigro, ut à Gesnero describitur; pectore & ventre albicat. Dorso & cauda frigescit, crura sunt rosea.

SYLVATICVS macula per medium verticem rubente est conspicuus, partibus utrinque; nigris, crurculis fuscis, alis nigricantibus, reliquo corpore viridis, ventre dilutius.

ATER qui & *Carbonarius*, albam maculam infra oculos habet, aliam in occipitio, caput nigrum, ventrem luteum, crura fusca.

CAERULEVS ab Aristotele tertio loco, & absque nomine peculiari positus, quod solus cæruleo capite sit insignis, ita dicitur.

CAVDATVS Aristoteli ὀφθαλμός, Bellonio Monticola, alijs, sed male ἀνώνυμος vocatur. Niger est, parte pronā, albus supina, in medijs alis rubet, circaimum ventrem dilutius. Vertex ei albus, rostrum fuscum, cauda bifurcata, & tantæ longitudinis, ut retrò per tergus super caput posita, hoc longitudine sua vincat. In fœmina omnia sunt pallidiora, & color tergoris in mare castaneus, in hac fermè fusce-

Arist. H. A. scit. Incolit montes & sylvas, & rarò, l. 7. c. 23. nisi frigido tempore invenitur. Vellon. l. 7. scitur vermibus, araneis, & similibus animalculis. Sed & arborum germina principio veris amputat. Nidum struit inter frutices, duos ferè palmos cum dimidio longum, ex musco & araneorum filis compositum, aditu semper angusto.

Species quæ *Mourier* Gallis audit, rotundum aditu gemino ad arboris alicujus truncum suspendit, &

multa ova parit. Visus ex lanugine illa, quæ in salice vetusta & populo, extra ex lino aut cannabe extructus.

Quæ Aldrovandus à Presbytero quodam Colonienſi descriptum exhibet, avicula est Wyntepfker, quasi vini promum Colonienſes dicunt.

Volant Pari caudati invicem, & modò hæc, modò illam petunt arborem. vox ipsis non ita incondita; altum verò veris inprimis tempore clamant. *CRISTATO* magnitudo est Paro majore minor, montano par. Caput cum paucis punctis albis nigrum, cristæ retrò extensa, corpus pronum fuscum, pectus album, crura cinerea. Degit circa abietes & Juniperos.


CAPUT XI.

De Motacillis, & Muscicapis.

*M*otacilla, Hesychio ὀφθαλμός & αἰσθητός, à motitatione caudæ dicta, à quibusdam cauda tremula vocatur. Commune omnibus muscis vesci; & circa aquas & pecora, ideò versari: combustarum pulverem contra lapidem vesicæ vehementer laudari Faventinus & Massa reliquere. Species ipsarum sunt *Alba* & *Flava*, ad quas *Spipole*, *Spardæ*, & aliæ *Muscicapæ* referri possunt.

ALBA, quæ & communis Gazæ Albicula, Bellonio Aristotelis Cnipologus, sed fortè malè, avicula est oblonga, vertice, collo superiore & pectore nigris, dorso cinereo, rostro lō, iusculo, tenui, nigro, gula candida, ventre toto candido. Fœmella vertice est cinereo, gula lutescente, cætera mari similis. Versatur circa aquas: sæpè & aratrum vermium causa sequitur.

FLAVA duplex est. *Alteri* caput proportionè parvum, fuscū: rostrum longiusculum, nigricans. Cranium molliſſimum, alæ breves, venter cum paucissimo luteo albicans, qui color initio caudæ inferius intensior est. Pennæ in alis nigricantes, in medio per transversum albidæ, extremæ totè nigre, cauda bifurcata, reliquo corpore longior. Ab Accipitre persequen-



quentes si evaserit, egregiè cantare dicitur. Alteri rostrum gracile, atrum, in extremoparum recurvum, flavedo à gula ad podicem usque præcedente intensior. Caput & dorsum ferruginei fermè coloris, mentum albicante macula velut barba canâ vestitum.

SPIPOLARUM, ut aucupes Bononienses appellant, tres describit Aldrovandus species. Una habebat caput leucophæum, albam sub mento maculam, pectus rubicundum. Dorsum cinereum, ventrem ex rubicundo & albo varium. Altera pectus maculis fuscis deorsum descendantibus interstinatum, ventrem albescentem, maculam retrò ad oculos majusculam ad ferrugineum accedentem. Tertia cui & Boarinæ nomen, tota erat ex albo lutescens, rostro & pedibus fuscescentibus.

STOPAROLAS idem exhibet binas; unam pectore & ventre ferè candido; Capite, quod maculis nigris in vertice, conspergitur, collo, tergo, cauda subfuscis: alteram rostro oblongo, recto, supra tamen parumper declivi, superius nigro, inferius corneo: collo, pectore, & ventre pallidis, oculis exiguis.

MUSCICAPARUM, quæ fortè l. 18. Ornithol. c. 28. Oppiano, quòd circa boves volitent βυδύται, plures exponuntur ab eodem species, ex quibus illa quam Pigliamosche aucupibus Italis vocari scribit, in collo maculam albam velut torquem habet, in medio alarum aliam: Altera, Magnanima quasi munus fabri obiès dicitur, fortè quod rostro sonore tundat, dum Muscas capit. Tertia quæ Gesnero Glarea, cruribus roseis, & ante hyemem avolat. Quarta quam Germani Todtenvogel vocant, fortè quod imminente pestilentia sint frequentiores, solitaria est, & per arbores irrequieta volitat. Quinta Gallis Mouchetolle dicta, quæ passerii adeò similis est, ut non nisi moribus dum vivit, & rostro cum mortua est ab eo distinguatur. In sylvis & dumetis latitat, & crura habet rosacea. Quidam Linarijs eas comparant. Gesnerus eandem cum sua Prunella esse conjicit.

CAPUT XII.

De Rubetra, Rubecula, Pyrrhula, & Phani-
curo.

Quæ Aristoteli Græcè *Ραρτε*, illam *Arifl. l. 8.* Gaza Latinè RUBETRAM, Sca- *H. A. c. 3.* liger Rubicolam transtulit. Non con- *Scalig. ad l. 8. H. A.* venit de ea inter Authores. Niphus Italorum Baradâ esse opinatur. Germani quidam Turdorum minimum genus quod rubi fructu visitat: Longolius Linariam seu Miliariam; Turnerus Anglorum Moretteram, aut Stonchatteram; Bellonius Gallorum Traquerum, quod continuò alas motitet. Si hunc sequimur, fringillâ paulò minor est. Capite supremo nigricat, unde Melanocephalos Cretenfibus dicitur. Collum & dorsum habet cinerea. Mas à fœmina discrepat, quoniam ventre candicat, dorso, capite, & collo albicat, gerit & albam per alas lineam. In Græcia, Creta & Gallia continuò, migratoria enim non est, visitur, & semper dumetorum cacuminibus infidet. Undè fortè ei apud Græcos nomen, nec ad pagos vel vicosprius accedit. Solitudine gaudet, & gregatim duntaxat, dum soboli intenta est, volare conspicitur. Nidum tantâ struit industria, ut difficulter quo intret vel exeat invenias.

RVBECVLA, quæ Græcis *ἐρίλαος*, *Hesych. & ἐρίβυς*, *ἐρίβυλ*, *ἐρίβας*, & *δάνδαλ*, Gaza etiam Sylvia, pectore est aurantio ad ferrugineum accedente, lingua bifida, cauda duodecim pennis instructa, quam sæpè motitat, postquam submisserit absque tremore statim erigit, & sic ejus pulli à Phænicuri, seu Rutcillæ fœmina, & pullis, quibus ita similes sunt, ut vix ab oculatissimo dignosci possint, quæ simul atque caudam moverint non cessant, donec ter aut quater simul moverint, dignoscuntur. Aestate cum prole ad desertissima quæque loca secedit, cum Rutcilla cõparet. In fine Autumni perfectam in pectora rubedinem nacta, ad oppida & pagos confugit, quo tempore

Ruti-

Ruticilla delitescit. Nunquam ferè in eodem saltu nisi una reperitur; unde Phavorino ὄρεσθαι μόνον καὶ μόνον τοῦτον. & natum inde illud, una arbor non

Porphyr. l. 3 de abst. ab animal. capit duos Erithacos. Voce homines imitari, prodidit Porphyrius. Si cava terræ subierit, pluviam prædicit. Merulam amore tanto prosequitur, ut noctu ferè in proxima arbore propè eam quiescat. Dicitur & morbo comitiali esse obnoxia.

Aldrov. Ornith. l. 17. c. 31. 32. Scalig. ad l. 8. Arist. H. A. PYRRHVLA seu Rubicilla, Scalligero Byrriola passeris est magnitudinis; gula, pectore & ventre, miniaceis seu purpureis (fœminæ pectus totum castanæo cinereo colore diluitur) rostro brevi ac lato, bituminis instar splendente, trigono ferme. Linguâ pro corporis magnitudine latiore & crassiore; cuius pars extrema quæ palatum tangit, & sapes dijudicat carnea est & nuda, reliquæ corneâ pellucula obteguntur. Degit æstate in montibus & sylvis; sub hyemem ad plana descendit, & facillimè capitur. Colorem per totum annum servat. Vescitur vermiculis; sed in primis semine cannabino, & primis illis arborum mali præsertim & pyri gemmis, quæ ante folia & flores erumpunt. Sed & nucibus ac acinis rubentibus sambuci aquatici, & solani perpetui, delectatur. Nidulatur in sepibus & quatuor ova excludit. Voce fistulam imitatur etiam fœmina, & omnes cantus avium canendo & sibilando exprimit: fortè & humanum sermonem.

Arist. l. 9. H. A. c. 49. PHOENICVRI seu Ruticillæ, quâ Aristoteles & Plinius cum Erithaco confundunt, plura fortassis sunt genera. Turnerus enim caput scribit ei esse nigrum, Gesnerus macula alba insigni. Aldrovandus quatuor diversas observavit, binas ipsdem ex Gesnero adjecit. Tota æstate nobiscum degit, hyeme avolat, aut se abscondit. Vescitur muscis, nucleis juglandium concissis, ovis formicarum & araneis. Nidulatur in arborum, murorum, & posticarum ædium, ubi hominum minor frequentia, cavis. Bina aut terna ova parit. Cuculi pullum, quialiquando in ejus reperit fuit nido, alit. In sublimi aliquo ædificio, primo, in primis dilu-

culo, idque veris tempore, canit. Hyeme & pullis exclusis fileat. Inter incubandum prætereunte aliquo clamat.


CAPVT XIII.

De Antho, Cannevarola Bononiensium, Oenante, & Lusciniola.

ANTHI avis, quem Florum Gæza vertit, facit mentionem Aristoteles, eidemque fringillæ magnitudinem, pedes fistos, pulchrum colorem, domicilium circa aquas & pecudes; victum ex herbis & vermiculis facit. *Plin. H. N. l. 10. c. 42. & 74.* oculorum imbecillitatem, hinnitum equorum, quem herbæ pabulo, adventu ipsorum pulsa imitatur, adhuncmodum se ulciscens, odium cum Spino & Aegitho tantum, ut sanguinem eorum credant non coire, multisque ob id veneficijs infament, tribuit. Quænam illa hodiè sit avis, non convenit inter scriptores. Bellonius illam quæ Gallis Bruant dicitur, esse credit, illamque fringilla esse majorem, mares ferè lutescere, cauda flavescere, cruribus & pedibus nonnihil rubescere, circa altas & proceras arbores procul à pratis dissitas versari, plerumque canabino semine vesci, ad minimum quinque pullos excludere, dum volat strepitum edere, scribit. Aldrovandus, qui modo descriptam *Aldrov. l. 17. c. 33.* avem Chloridem esse putat, spopolam esse judicat, cum & pulchra sit, & omnia ferè ea, quæ Antho Aristoteles adscribit, admittat. Circa amnes, inquit, & prata uliginosa degit, & si ab equis ibi pascentibus pellatur, aufugit quodam cum garritu, quo, hinnitum equi quodammodo imitari videtur. Gesnerus denique illam Aviculam quam circa Argentoratum Gaulamini vocant, Aristotelis Anthum esse conjicit.

CANNEVAROLA Bononiensium, quod in viridi crescenteque canabe & niduletur, & degat sic dicta, Germanorum Grasmuscho, & Anglorum Titlingæ, si Aldrovando credimus, per omnia similis est. Lusciniâ

tam





Parus ater. Kohnmeiß.

Parus palustris. Kohnmeiß. Aechmeiß.




Parus sibilatrix. Waldmeiß.




Parus cristatus.

Motacilla alba. Weißer Wasserstelz.



Parus caudatus sine Moniole.




Kohnmeiß.

Spipolia.

Motacilla flava. Gelber Wasserstelz.





Motacilla mar.



Stiparola.

Borin Genua.





Spipola alba.



Stiparola.

Boarina.




Rubemla lyrbola
Phalacrocorax
Rothschwenzke




Muscipeta.



Rubetra Bellonij.



Rubetra seu Bator.



Pyrrolulus.
Rotschwenzlein.



Rubecula seu
Phoenicurus. rotzägel
rotschwenzlein.



Cannecularia.
Haufrötelein.



Anthus.



Luscinola.




Nachtgall.


Hypolais seu Carinca.




Phoenicurus. alter.



Luscinia.
Nachtigal.



Oenanthe.
Bürstner



Atricapilla s. fuscata.
Grasmück. Schwarz
Kopff



alia
Fuscata seu Atricapilla



ram exactè corporis figurâ exprimit, ut nisi paulò esset minor, ne tam rufesceret, prorsus eadem videretur. Tota parte pronâ, gula nempe, pectore, & ventre ex albo flavescit, supinè capite, collo, dorso, & alis ex luteo fuscescit. Rostrum habet lutescens longiusculum. Caput planum. Caudam breviusculam infra lutescentem, supra ad ferrugineum vergentem.

gustissimis plumulis compositam. In pedibus posticus digitus admodum longus, paris longitudinis unguem annexum habet, ita ut ambo pollicem expleant, isque primum rectus ferè totus, extremo tantum, admodum exiguo unco modicè inflexo, armatur.

TITVLVS II.

De Insectivoris Canoris.

CAPUT I.

De Luscinia.

INter Insectivoras Canoras primum *Nomen.* *Luscinie*, alterum *Hypolaidi*, tertium *Atricapille* locum tradimus. Causa in voce patebit. Illa Græcis Ἀνδών & Ἀνδῶ: Latinis, seu quod in lucis canat, seu quod ante lucem, seu quod lugens *Luscinia*; sed & *Acredula*, volucris *Attica*, *Ales Daulia*, *Pandionia* &c. dicitur.

Formam non est quod describam, cum ubique sint obvia. *Descriptio.* *Lingua* summo acumine caret, nec tenuitatem illam primam habet, quam cæteræ aves, atque hoc illi cum *Atricapilla* commune intercedit. *Mari* fœmina corporis habitu similis, aliquando tamen ad cinereum vergens, quod & junioribus competit. Illa quam *Schwenkfeldius* majorem vocat, tota ferè cinerea est, & parum rubedinis obtinet. *Sexum* malè ex corpore coloris, mole, oculo dextro, qui mari major dicitur, collegeris: *Mares* adulti vere capti, quod tum in venerem ruentibus genitalia turgeant sese produnt; extra id tempus, quæ frequentes, & modulatos edit cantus, qui continuo spiritu in longum trahuntur; quæ unico sæpè insistit pedi, & diu immobilis permanet, mas est. *Cursitat* per caveam fœmina, & cantum brevem concisum ac intermissum promit.

Locus ipsis diversus. In sylvis quædam vitam agunt, quæ majores sunt fortè, quia se in his tutiores à serpentibus credunt, in sepibus quædam, nonnullæ montana loca amant, palustria nonnullæ; plana alia. *Hybernia* ijs caret

Arist. M. A. **OENANTHE** *Aristoteli & Plinio* memorata, *Gazæ* vitiflora seu vitifera, vel à colore simili uvis germinantibus; vel quòd vini tempore appareat, vel quod uvis delectetur, ita dicitur. Abdit se sub caniculæ exortum, eadem occidente conspicitur. Vitat interdum frigus interdum æstû. Quænam sit avicula ambigitur. *Bellonius* illam esse credit, quæ *Gallis*, *Cul blâc*, *Ital*is *Culo* bianco dicitur. *Avis* est *Sittæ* magnitudine; rostro, alis, cruribus, & caudæ extremitate nigris; dorso cinereo; linguâ oblonga ac plana, pedib. parvis: cruribus oblongiusculis. Quia quicquid sub ventre, infra, & supra *Vropygium*, & anteriorem partem caudæ album est, *Cul* blanc vulgo vocatur. *Versatur* in parvis dumetis, neque in volatu perseverat. *Nidulatur* in foraminibus veteris macerix, quandoque etiam in lapidicinis, quin & in terra, ubi bos aut aliquod jumentum vestigium impressit. *Vescitur* erucis & vermibus terræ. Plures *Couli* blanci descriptiones apud *Aldrovandum* vide.

Quam *Bellonius* **LVSCINIO-LAM** appellat, avis non est obvia. Pectore, capite, dorso, & collo pectoris est cinerei. Pennæ alarum, & caudæ fusæ; rostrum acutum, subnigrum, gracile, in extremo & intus aureum, celeriter per terram cursitat. Numerosè quando æstus ingravescit, & potandi gratia in palustria sese conferunt, capiuntur. Huc refer illam, quam aucupes *Itali* *Giarolam* vocant, magnitudine alaudæ. Rostrum habet fragile, intus rubicundum. *Rictum* admodum amplum. Verticem, collum, dorsum, & alas coloris varij. *Linguam* bifidam, *Caudam* ad eò brevem, ut vix ulla appareat, illamque bifidam, variam, an-

Arist. M. A.
l. 9. c. 49.
Plin. H. N.
l. 10. c. 29.

Aldro. Ornith. l. 17.
c. 38.

caret si Botero credendum; Baravia si alij; imò mori illata dicuntur. Athenis tanta ipsarum copia, ut Philomelam Atticam Poëta finxerint. Sunt & propè Arduennam sylvam plurimæ. Æstate adulta non diu apparent, & sub autumno usque ad dies vernos conduntur. Maximi vaneunt, quæ in caveis hyemem pertulere. *Cibus* eis vermiculi, sed in primis formicæ, & illarum ova. In caveis duris ovis & micapanis vescuntur.

Partus. *Nidum* vere mense Majo, vel etiam prima æstate, quandoque humi sub sepibus, & arborum truncis, aliquando in ipsis fruticibus viridibus, & densis, ex folijs arborum, paleis, & musco oblongiusculum construunt. Cum plurimum senu ova pariunt; & dum incubant, à cætu, si Aristotelem sequimur, cessant; si Albertum & alios, Luscinia pervigil custos, cum ova quodam sinu corporis & gremio fover, in somnem longè noctis laborem (solam ex omnibus somnum negligere, καὶ διὰ πλεονεξίας

Æliæ. var. γερπύων *Heliodus* apud *Aelianum* auctor est) cantilenæ suavitatem solatur; quo possit non minus dulcibus modulis quam fotu corporis; ova animare.

Vox. Cantum & vocem earum, quam *Sidon.* Εὐσομένη *Pollux* vocat, *Sidonius* sibilare dicit, *Plinij* verbis explico. *Luscinij*s inquit ille diebus ac noctibus cōtinuis xv. garrulus sine intermissu cantus. Denfante se frondium germinē, non in novissimum digna miratu ave. Primum tanta vox tanto in corpusculo, tam pertinax spiritus. Deinde in una perfecta Musicæ scientia modulatus editur sonus: & nunc continuo spiritu trahitur in longum, nunc variatur inflexo, nunc distinguitur conciso, copulatur intorto; promittitur revocato, infuscatur ex inopinato. Interdum & secum ipse murmurat: plenus, gravis, acutus, creber, extētus, ubi visum est vibrans, summus, medius, imus, breviterque omnia tam parvulis in faucibus, qui tot exquisitis tibiærum tormentis ars hominum excogitavit: ut non sit dubium hanc suavitatem præmonstratam efficaci auspicio, cum in ore *Stesichori* cecinit infantis. Va-

riant tamen. Nam in palustribus, relaxante instrumenta vocis humiditate nimia, tam sonoræ non sunt. In *Hispaniola* & *Insula S. Johannis*, *Martyr. in* *tyre* teste, nunquam à cantu cessant. *Histor. Oc-* In *Scotia* non tam suaviter ac in *Italia* *cid. Ind.* canunt; & circa *Orphei* † sepul- † *Pausan.* *chrum*, vocaliores à *Thracibus* cre- *in Boeotic.* debantur.

Amicitiam & cum *Phænicuris* *Affectus.* colunt, cum quibus etiam coire creduntur, & cum aviculis mollioris rostri, ad quas caveis inclusas advolitant. *Inimicitiam*, cum collusione qui visco implicatas capit; *Accipitre* qui eisdem infidiatur; & *vipera*, à cujus suppositæ oculorum fulgore in certissima perniciem trahuntur, descendentes enim paulatim ex arbore in prædam ipsi cedunt, ut *Merula* scribit; *Mirabil.* quod tamen *Cardanus* negare videtur, exercent. Inter affectus corporis præcipua pinguedo. Sæpè adipis mole obrutæ extinguuntur. Si aliquo alio liberos corripi contingat, formicarum ovis sibi ipsis medentur.

Ingenium singularis in herum cicuratarum fides; sæpè emissæ, (tale *Al-* *Apud Ne-* *con* *Donacis* se dono dedisse canit) *mesian. Ec-* *loga. 2.*

Scitur sursum remeare domum tectum.
que subire
Viminis, & caveam totis præponere
sylvæ;

imò multæ venditæ vel dono datæ alijs prioris domini desiderio contabescentes commoriuntur; & obstinatus libertatis amor; (si adultæ caveæ includantur, cantus & cibi abstinentia, pro servitute venatorem teste *Aeliano*, silentio ulciscuntur) testantur: Cantus maximè, & Docilitas. Simplex ille, si in solitudinibus degunt; varius & multo apparatu compositus, si in auditores inciderint. Non *φιλο- μένος* duntaxat, sed & *φιλοδόξος* cum *Charmide* *Atheniensi* agnoscas τὸ κρείστος ἐλπίδι τὸ μέλ. Nec minor posteritatis cura. Meditantur aliæ juniores: versusque quos incitentur accipiunt. Audit discipula intentione magna & reddit, vicibusque reticent. Intelligitur emendatæ correctio, & in docete quædam reprehensio. *Docilitas* mira. *Cæsares* juvenes habuere *Luscinias* *Græco* atq;

Plin. H. N. l. 10. c. 42. atque Latino sermone dociles; præterea meditantes in diem & assidue nova loquentes, longiore etiam contentu. Visum jam sæpè iussas canere cœpisse, & cum Symphonia alternasse: sicut homines repertos, qui sonum earum, addita in transversas harundines aquâ foramen inspirantes, linguæve parva aliqua opposita mora, indiscreta redderent similitudine.

Gesner. in Ornithol. Fuere tres Ratisbonæ, Anno M. D. XLVI, quæ, intra noctis silentiū, quicquid interdiu ab hospitib. colloquuntibus inaudierant, Germanico sermone, ita promere solebant, ut ab audientibus optimè intelligerentur.

Vfus. De ipsarum in *cibouso* non est quod multum dicam. Plumis nudata vox est prætereaque nihil, ut Lacon ille apud Plutarchum dixit. Appositam fuisse in centenaria illa Æsopi Tragigici, cui quendam civem Romanum donatione unica x. aureorum dedisse legimus, Patina, vel exinde colligas, quod centum aviculis, quæ cantu aliquo excelleret, constaret. Arrij etiam filios magno cœmptas effuisse Horatius testis est. *Medicinam* si spectes. Cancrorum oculi cum Lusciniæ carnibus in cervina pelle alligati vigiliam præstant fugato somno. Fel cum melle illitum visum perfectè acuit, ut vult Kiranides.

C A P. II.

De Hypolaide & Atricapilla.

Arist. H. A. l. 8. c. 3. **H**YPOLAIDEM seu Currucam Aristoteli debemus, qui quidem Cuculum in ejus nido parere scripsit; sed cum corporis formam non addiderit, par ferè de ea ac Antho inter scriptores concertatio. Niphus cantu & magnitudine Philomelam imitari, & quod in oculi Equi mortui cōcavitate nidificet, Hyppolaïda vocari scribit. Bellonius Lusciniæ in cantu similem, Gallis Fanette brune, facit. Turnerus, Tielingam seu Lingettam Anglorum, quæ Lusciniæ minor est, colore subviridi. Culices & vermiculos in ramis arborum sectatur; raro

humiconstitit; hyeme non cernitur, cuculi pullum pro suo educat, & sequitur, esse; & Germanis Passerem gramineum *Grasmusche* seu *Grasmuß* esse vocari reliquit. Gesnerus dictionem Germanicam *Grasmusche* per metatesin à Latinorum: curruca factam esse conjicit, & quatuor ejus genera facit. *Majores* vel colore sunt fusco præcæteris canoræ. Circa lacum Verbanum Piccasigas, id est, Ficedulas, vocant, vel pectore albo, capite cinereo. Ex Lino nidum struunt. Atricapillis, maribus caput prima ætate rubet, deinde nigrescit, fœminis semper rubet. *Minores* ventrem albū, oculos albicantes habent, inter sepes ferè degunt, & hyeme discedunt. Eliota Anglus Passerem sepium esse putat, quem Turnerus Passerem Troglodytem interpretatur, Germanis *Saumschlipffe*. Aldrovandus nullam observavit, cui propriè illud nomen convenire existimaret. Shwenkfeldius, *ὑπολαΐδα*, Græcis, Andothiam Alberto dici opinatur, & supina parte totam cineream, pronâ albidam, partim dilutè cinereo colore resperatam, vertice punctulis nigris maculato, describit. Secundum eundem, *nidum* inter gramina rotundum suspendit. *Ova* Majo plerumque quinque, aliquando septem, subviridia, punctis minutissimis variâ, parit; eaque si digitis tangantur, non amplius fovet, sed relinquit.

ATRICAPILLA *μελαγκόρυφος* & *μελανοκέφαλος* Græcis, falsò Gallinago ab Alberto M., ab aliis Guger Germanorum, qui capite quidem atro est, sed pectore rubet; à nonnullis avis Phœnicuro adeò similis, ut nisi cauda differrent, quæ illi rubea, huic cinerea est, vix digni possent, esse putatur. Quam verè Aristoteli & Plinio cum *Arist. H. A. l. 9. c. 49.* Sycalide, seu Ficedula, vel ut Scaliger placet Ficula & Ficilla eadem sit, *Plin. l. 10. H. N. c. 29.* & ineunte quidem autumno Ficedula, ab autumno protinus Atricapilla *Scalig. ad H. A. Arist. l. 9.* evadat, putetur; cum Schwëkfeldius Atricapillam verè & Autumno deprehenderit, judicandum relinquo. Aliquot earum exhibet Aldrovandus *Schwenkfeld. in A. icones.* Una capite, dorso, cauda, & *viar. Silef.*

remigibus alarum pennis tota nigra erat. *Alterius* vertex colorem castaneum gerebat. *Tertia* notabili macula supra rostrum in fronte notabatur.

Quarta tota ex albo & nigro variabat. Schwenkfeldius Passere paulò minorem, vertice nigerrimo, collo dilutè cæruleo, ventre albicante, podice subflavo, pedibus glaucis, unguiculis fuscis, esse scribit, & summæ linguæ acumine carere addit. In Anglia non habentur, si Turnero credimus. *Nidificant* in caveis arborū, & plura quam viginti ova ponunt, sed numero semper impari. Non tantum vermiculis,


sed & sorbi Alpinae bacculis, *vescuntur*; imò & uvis inhiant. Unde Ampelides vocantur. *Pullos* tanta sedulitate alunt, ut in nido etiam pinguiissimi existant. Optimæ sunt in cibo autumnino, propter alimentum tum in *Attic. l. 15. c. 8.* ijs abundans. Phavorini tempore negabant ullam avem præter ficedulam totam comedi oportere. Dioscorides frequenter in cibo sumptas, visum acutere testatur.

* *

*

✿ (○) ✿

✿



HISTORIÆ NATURALIS

DE

AVIBUS:

LIBER IV.

De Avibus Aquaticis. Palmipedibus.

TITULUS I.

De Palmipedibus Piscivoris.

CAPUT I.

De Onocrotalo seu Pelicano, & Ave
Diomedea.

Aldrovand.
Ornithol.
l. 19. c. 2.

Nocrotalus, qui nō nullis falsò Avis Diomedea, Catharacta Jubæ, Butaurus seu Ardea stellaris, Porphyrio dicitur; quæque diversum à Pellicano Aristotelis Gesnerus facit. Alberto Osina, Kiranidi Ramphius, Verrio Flacco Truo, Isidoro Canopus Ægyptius, Aldrovandus Pelecanus Aristotelis, & Opiani Pelicinus vocatur; & nomen hoc quod collum mergens & spirans quasi

rudirum asini edat, sortitus est. Duo ipsius Genera Albertus facit, *sylvestre* nempe & *Aquaticum*; ex quibus hoc duntaxat doctissimi agnoscunt. Videntur tamen & in provincia Manzi in India Orientali esse toti albi, cum osse supra caput, colore sanguineo, nisi nos Odoricus de Foro Julij fallit; imò & avis, quam Ælianus Indis Celim appellari scribit, quæ est magnitudine triplo major Otide, ore permagno, ingluvi maxima, longis cruribus, summis alis pallidis, cæteris pen-

Æliā. H. A.
l. 16. c. 4.

pennis cinericijs, Onocrotalus Indicus dici potest.

Descri-
ptia.

Quantum ad *Magnitudinem* visus Rhodi paulò minor cygno, multò anferere; visus, cujus longitudo ab initio rostri ad pedes ultimos extensæ, hominis proceritatem æquabat ab Aldrovando emptus hominem justæ staturæ non adæquabat tantum, sed vincebat etiam: ideò quorundam pòdus ad XXIV. libras duodecim unciarum accedit. *Corpus* habet album. *Rostrum* coloris fuscì, rubrum interdum, ut in Machliniensì Onocrotalo visebatur, validissimum ac planè osseum; cujus superior mandibula, ut Aldrovandus in Ferrariâ allato observavit, tres digitos lata, duas Spithamas longa. Inferior palmi longitudine superiorem excedit, cum ab interiori parte capitis ortum ducat; superior in curvū quendam hamum crocei ferè coloris definit; & intus plantaginis angustæ foliæ pentapleuri figuram exactè exprimit, extuberantib. per ejus longitudinem quinque lineis asperis, & ob longa tubercula referentibus. Sub hac insignè quoddam capacissimum mēbranosum, rugosum, & omni fibrarum genere præditum, coloris ferè crocei percurrentibus ubiq; maculis nigris, & facile dilatatu, dependet ceu uter quidam, receptaculum. Ingentis staturæ hominem ocreatum pedem usq; ad genu immittere in fauces & educere potuisse vidit Perottus; parvulum Æthiopem in eodem inventum scribit Sanctus. Crura ipsi Anserina, præ tati corporis proportionē breviuscula. Capitis plumæ albæ, mollesq; in radicibus suis nigræ, in occipitio longiores. *Interiora*, si spectes, in eo, quem Aldrovandus describit, quam fœminam esse ova ciceris magnitudine ad septem conspecta ostendere; *lien* erat rotundus, nucis avellanæ magnitudine, aliquanto crassior. *Ventriculus* ex membranarum crassioribus constabat, digitos decem longus, duos latus, materiâ chylosâ luteâ cum quibusdā quicquilijs & capillis, refertus (Gésnerus succum quandam viridem vermiculis scatentem in suo invenit.) *Vesicula felle* in concavo jecoris hærebat, & ab

ca meatus velut canalis ad intestinum duodenum porrigebatur. *Intestina* sex ulnas longa appendices duorum digitorum longitudinis habebant. *Gula* erat longa, crassiuscula, carnosa, quæ subinde latior evadens, ubi ad ventriculum pervenisset, comprimebatur. *Cor* maximum, ossa levia, alba, pellucida & sine medulla. *Vlnæ* alarum membrana quadam tegebantur insigni, ex qua tendones viginti quatuor oriebantur, tam tenuiter in eas inserti, ut nullo pacto separari possent.

Versatur in aquis piscosis & diffusio- *Locus.*
ribus. Visus in Ægypto à Septentrione versus meridiem tendere. Observatæ & circa Gazanum Ægypti civitatem greges, quæ versus mare volitabant. Mittitur & à Gallia Septentrionali; & Marcellus Onocrotalum Ravennatem cognominat. Reperitur etiam in Hetruriæ maritimis, circa Herodis portum, & Orbitelli stagnū. Circa Lusannam in lacu Lemano semel tantum anno apparere creditur. Gesnerus in lacu ad Tugium caprum commemorat.

Vititat in primis piscibus, eosque *Vitus.*
dum venatur, non toto corpore mer- *Gesner. in*
gitur, sed collum subinde demittit. *Ornithol.*
Cicuri si libralem (quinque librarum piscis haud magna ipsi esca est) exhibueris, ita invertit, ut rostro præmissò deglutiat. Devorat & cum testis con- *Bellonius*
chas, easq; calore interno intra inglu- *de Avibus.*
viem apertas, revomit, & hiantibus jam testis carnem ab ocreis seligit. Solum scilicet visceris habet ductum; qui ab introitu oris ad naturæ secreta pertingit. Visus dimidiam endrome- *Petr. Mar-*
dem, qua miles unus tegebatur, in se tyr. in De-
projectam absorpsisse integram, quæ *cad.*
ex gutture interfecta sine jactura e-
ducta est.

Nidum ex ramulis ad ripam fluminis alicujus vel stagni ponit; ibiq; tot *Gene-*
ova Anserinis similia, quot cygnus so- *ratio.*
let, edit, fœtusque enutrit.

Volant nonnunquam soli, nonnun- *Volatus.*
quam gregatim: & cum volant sonum alarum cient.

Vox ipsi ruditus Afini similis: sonum *Vox.*
cum edit rostrum in aquam vel terræ lutum infigit, si Alberto credendum.

Dicun-

Dicuntur (Bartholomæus Anglicus ex Ifidoro author est) erecto ad cœlum rostro, Accipitrum metu, sed fortè falsò, dormire; & in Lycia ad flumen Xanthum, quotannis cum corvis, cornicibus, & alijs carnivoris prælium committere. Si vicerint, abundantiam frugum sibi promittunt incolæ; si vincantur, ovium, boum, & aliarum quadrupedum fœcundum proventum.

Præfagiū

Vsus.

Ingluvie ea parte qua capiti adhæsit colligata, ad quam ejiciendam, Ægyptij piscatores utuntur: qui humiditate corrumpi nequit, multo tempore utilis est.

AVIS DIOMEDEA ab insulis Diomedis sic dicta, de qua multa veteres fabulati sunt, Servio, Stephano Grammatico & Ifidoro Ardeæ genus est: quibus Salmasius accedit. A Plinio & Solino cum Fulicis comparatur.

Aldro. Ornith. l. 19. c. 3.

Aldrovandus Artennam hodiè nuncupari, & in insula Sanctæ Mariæ de Tremiti duntaxat inveniri, credit. Cui Dalechampius adstipulatur. Hoc an verum sit ex comparatione colligi poterit. *Magnitudine* ista est Gallinæ fatis corpulentæ. Color ei fuscus seu cinereus obscurus. Tota ferè pronè candicat. *Rostrum* est luteum prædurum & aduncum. *Oculi* ignei. *Degit* in cavis ut lucem solis declinet; noctu circa scopulos non longè super aquam *volitat*. Piscibus *viçtitat*, quos noctu tantum venatur. In cavernis scopulorum & terra *nidulatur*, & vocem vagitui infantium similem promit. De Diomedis verò ita Plinius. Nec Diomedas præteribo aves: Juba Catuructas vocat, eis esse dentes oculosque igneo colore, cætero candidis tradens. Duo semper ijs duces: alterum ducere agmen, alterum cogerere. Scrobes excavare rostro, inde cratè consternere, & operire terra, quæ ante fuerit egesta. In his fœtificare. Fores binas omnium scrobibus. Orientem spectare quibus exeant in pascua. Occasum quibus redeant. Alvim exoneraturas subvolare semper, & contrario flatu. Uno hoc in loco totius orbis visuntur, in insula, quam diximus nobilem Diomedis tumulo

Plin. H. N. l. 10. c. 44. Solin. Polyhist. c. 2.

atque delubro, contra Apuliæ oram, fulicarum similes. Advenas barbaros clangore infestant, Græcis tantum adulantur. Miro discrimine, veluti generi Diomedis hoc tribuentes. Ædemque eam quotidie pleno gutture madentibus pennis perlucet atque purificant. Unde origo fabulæ, Diomedis socios in earum effigies mutatos,

CAPUT II.

De Laris in genere & in specie de Laro albo.

Larus, quem Augustinus Fulicam, *Aldro. Ornith. l. 19.* & alij apud Græcos *λέπρον*, quidam etiam Gaviam vocant; ab Aldrovando describitur, quod sit avis à rostri *Descriptio.* ad alarum ferè finem duas spithamas longa, capite maximo & crasso, ex albo & cinereo variegato; *pectore* ejusdem ferè coloris, illoque amplo, *rostro* crasso lutescente, in extremo nigricante & insigniter acuto; in cujus superiore parte narium sunt foramina oblonga, rictu amplissimo. *Oculi* iridem auri instar splendidam niger ambit circulus, hunc albus, album cinereus. *Alæ* ex albo cinereo, & ad castaneorum colorem simul commistis tendente constant, & caudam palmi longitudine excedunt. *Cauda* cinerea tota. *Pedes* lutei; posterior digitus satis conspicuus, ungue etiam armatus. *Corpore* est levissimo, & multis ac densis plumis induitur.

Frequentes in locis maritimis stagnis & fluminibus cum ingens aliqua tempestas coorta est *conspiciuntur*. *Æliæ. H. A. l. 3. c. 20. Locus.*

Præter pisces lumbricis etiam, cochleis, quas sursum raptas, ad saxa demissas confringunt, Locustis & Phalangijs à quibus Tarentinos agros purgant, *vescuntur*. Delphinos etiam in littora dejectos devorant. Olivis denique in Liguria perniciem adferunt. *Victus.*

Nidulantur in faxis maritimis, à quibus potabilis aqua manat, & bina ternave ova æstate pariunt. *Volant* præcipites & faciles leves quippe. Hinc Laro apud Homerum Mercurius confertur. Sed & pennæ per se aliarum avium

Generatio.

Arist. H. A. l. 5. c. 9.

Onocrotalus sine Pelicanus.

Kropfgans.


Tab. 46, *Onocrotalus sinina.*



Pelecanus sine Platea.

Diomedea auz.

Larus maior.



Larus cinereus.

Loffelgans.



Larus albus.

Met. Metw.

Larus Piscator. Fischerlin.

Larus minor Sterna.

*Stein
Spürer
Schwürring.*





Larus Fidiyer.

Larus niger. Brandvogel.

Hirundo marna.

Die Schwalb.





avium leviores putantur. Has enim pelamydum piscatores, teste Aeliano, ad hamum lineæ alligant, ut propter earum levitatem ab occurrente aqua sensim ac leviter agitetur.

Affectus. *Amicitiam* cum homine utilitatis gratia, quia piscibus vescuntur, & Monedula, ut Aelianus prodit, colunt. *Ælian. H. Al. 6, c. 6.* Malo punico interimuntur. Imminētibus ventis sublimes in aëre volitant, & vento sese obvertunt. Copiæ piscium capiendæ augurium, si ad piscatores retibus piscantes advolarint, facere creduntur.

Vfus. Cerebrum Lari siccatum & concisum infantibus Epilepticis odoradum quidam commendant. Pennæ proprietate quadam occultâ, simul atque mare intumescit, in pulvinaribus etiam eriguntur, & decumbentem sublevant.

Inter species Larorum, est primus Larus ALBUS fortè Gaviæ peralba Apuleij, quæ superfluctus marinos natat, demergit se propè ad Oceani fundum & gremium. Duo ipsius sunt genera prodente Bellonio, *Majus* & *Minor*. Ille minor est cinereo, pulchritudine corporis ad columbam accedit, quanquam male hanc vincere videatur. Nivis instar candidus est. *Rostrum* habet teres, acutum, rubicundum, cujus coloris & cauda est. Recta cruribus insistit, posteriora corporis magis elevata gestans, ita ut inferiora in arcum quasi curvari videantur. *Minor* summitatem capitis nigram habet; statim atque frigora ingruere incipiunt, in mediterraneis locis supra flumina volitans apparet, & cæteris in volando diutius perseverat. Captus intra biduum ferè cicuratur; facileque nutritur, intestinis nempe, carne & piscibus. Ad eò clamosus est, ut aërem clamore suo percellat. Videtur esse Turneri & Gesneri Cephphus, qui ex illius descriptione, est avis marina, magnitudine Monedulæ, sed alis acutioribus, & longioribus, colore tota albo, excepto nigro quem in capite gerit cirro: rostro etiam & pedibus puniceis. Diutino clangore defatigata tandem keph profert. Schvvenkfeld. Lari albi facit mentionem, cum capite rubeo.

CAPUT III.

De Laris Cinereis, Piscatore, Nigro, Sterna & Fidi-pedibus.

LARORUM CINEREORUM tria ponit in primis Aldrovandus genera.

Primum columbam magnitudinè parum superat, colore undique est albo, in dorso tantum & alis cinereo. *Caput* supremum, in acula nigra utrinque ad extremum oculi angulum insigni omninò candicat. *Rostrum* habet longiusculum, & aliquantulum velut armatum, introrsum ad instar thecæ ejus, in qua novacula reconditur cavum, colore corneo. Os interiorius totum, & linguam cujus extremitas bifida, rubentia. Ora extrema Palpebrarum rubra instar circuli oculos exornat. *Crura* interdum rubent, interdum fuscescunt. *Digiti* membranis rubris sepiuntur. Posterior *pedis* digitus aciculæ caput non excedit. Credunt quidam pennas capitis à Martio mense per trimestre quo tempore solboli dāt operam nigrescere. Reliquis novem mensibus candidas esse. *Interiora* si spectentur, *Gula* amplissima, ventriculo longiusculo, crassiusculo, cujus interior tunica crassa rubra est, præponitur. *Hepar* maximum flavicans bilobium, *ventriculum* infra amplexatur, supra cor mucrone recipit. *Lien* est longiusculus sanguinei coloris; *Fel* viride. *Vesicula* in hepate continetur, & intestino ramulo jungitur. Ad intestinum rectum appendiculæ binæ graciles, & tenues antrorsum reflexæ spectantur. *Vescitur* piscibus, insectis palustribus, muscis & conchulis. *Nidulatur* in densis piscinarum & lacuum arundinetis; Maio & Junio mensibus ova quinque columbinis paulo majora parit.

Alteri quod vix spithamam excedit, dorsum & alæ sunt coloris leucophæi ad cæruleum quodammodo vergētis. *Rostrum* pro proportionem corporis exilius, arcuatum, nigrum, pedes,

In Aviaro Silesiæ,

R

des,

des, tibiæ membranaque digitos intersepiens coloris crocei.

Tertium est capite nigro, rostro recto, & in fine acuto, coloris miniacei; oculis & pedibus ejusdem coloris; costis alarum & remigibus albis, dorso & in reliqua parte cinereis.

Larus PISCATOR, circa Argentinam privatim *Fischerlin* dictus, circa Oppenheimium Fel, minor est, Laro cinereo, vertice nigro, rostro & cruribus è fusco pallidis, totus albicans. *Volatus* est celerrimi, & dum pisces captat, etiam in aquam se mergit.

Larus NIGER, à colore sic dicitur. Quamvis enim sit alis cinereis ultra caudam extensis, cruribus levi rubore notatis; oculis ex fusco purpurascens, rostro tamen capite, collo, pectore, & ventre nigrescit. *Schwenkfeldius* ipsi crura & pedes latiusculos rubentes, nigricantibus transversim antè maculis adscribit: & nidum in arundinibus piscinarum suspendere, ac mense Maji parere, addit.

Quam *Turnerus* STERNAM appellat, marinis Laris ita similem esse, ut sola magnitudine & colore ab illis differre videatur, minorem duntaxat & paulò nigriorem adjicit. Tempore quo parturit improbè clamosa est. Apud *Frisios* dicitur esse vertice nigro, rostro & cruribus rubidis.

Larorum FIDIPEDUM duo sunt genera. *Vnum* alis longis, utpote quæ trium ferè digitorum lōgitudine caudam exuperant. Cui oculi, caput, collum, rostrum sunt nigerrima: Pedum digiti insignibus mucronibus armantur. *Alterum* brevibus, cui magnitudo *Merulæ*, caput nigrum, Alarum costæ albescentes, Pennæ sub cauda candicantes, pedes rubescentes, digiti, membranulæ quodam rudimento interjecto, quatuor.

CAPUT IV.

De Catharracta & Ceppho.

CAtarracta, Aristotelis & Oppiani, Cexo quod cum impetu ad prædam capiendam decidat, ex hujus descriptione avis est instar Lari minoris,

sed robustior, colore candido, & Accipitri Palumbario similis; ex Aristotele, Accipitre minor, gula ampla, & lata. Aldrovandus avem rostro acuto, crasso, supra non modicè aduncum, pronè per alas, dorsum, betico, albo, & luteo mixtis variegatam, supinè totam albam maculis beticis distinctā, tibijs, pedibus, & membrana eos intersepiens cinereis, ponit. In mari viçtitat; sed & scopulis, littoribus, & petris, quas chærades vocant, supra aquam eminentibus insidet. Pisces captat exiguos. Ubi verò natantes conspexerit (perspicacissima enim est, & vel ad fundum usq; maris) altius subvolat, & contractis omnibus pennis, quovis telo celerius delapsa, ad cubiti spaciū immergitur, & piscem extrahit; nec diutius manet, quàm jugeri spaciū transferis. Mirus incubandi mos ovis, si Oppiano credimus. Fucum aut algam ijs super petram insternunt, sic ventis exposita relinquunt. Mas illa unde marem procreandum conjicit, fœmina unde fœminam in sublime per aliquot dies sublata, in pelagus mittit; motu concalescentis ovis, pulli excluduntur. Pullis luce aspecta, nulla in nidis mora, parentes volatu sequi conantur: à parentibus suscepti, in mare demittuntur, mox extrahuntur. Acie oculorum in fenio obtusa, dum ad prædam se ferri arbitrantur, præcipitijs illusi intereunt.

CEPPHUS Aristotelis, Fulica est quibusdam, Aldrovando, avis, habēs rostrum colore corneo, ad mandibularum latera ruffo, in extremo quod aduncum est, nigro, oculos exiguos ruffos. Caput, collum, pectus, ventrem, coxas, ex albis & fuscis, intercurrente etiam colore betico & luteo, maculis variegata. Crura & tibijs viridescentes. Pedes & membranam digitos secantem fusca. An sit Cepphus veterum, ignoratur. Nam de hoc, si foramen corporis spectas, id duntaxat habemus, Laro esse similem, cum quo descripta parum habet similitudinis, plumis abundare, sed carnis esse exiguæ, ideò facilè vento impelli. De cetero, apud mare viçtitant, cujus & spu-

Sthyvæckfeld. in Aviario Silesia.

Arist. H. A. l. 9. c. 12.


Aldrovand. Ornith. l. 19. c. 12.

Oppian.

Catharacta.



Cephus.



Phalacrocorax.



Anser Bassanus.
Schotisch Gans.



Corvus

Syluaticus.

Waldrapp.



Corvus aquaticus.
Scharb.




Graculus palmipes.



Mergus Rheni. *Rhein Endte.*



Mergus Longirostrus.




Mergus glacialis.
Eijs Endte.



Meerganser Seesluder.



Albulus aquaticus.



Mergus Bellonij.



& spumam vorant. Thunnos, propter pisciculos, quos dentibus suis discerpunt, sequitur. Ad tonitrua adeo perhorrescit, ut sonitu exaudito ex aëre in mare decadat. Spuma inspersa alliciuntur, capiuntur allesti. Cum relicto mari gregatim in terram adverso vento revolant, imminentis ventii indicium præbent. Carnem habent probi odoris, partem posteriorem, quæ sola limum olet, si excipias.

CAPUT V.

De Anserè Bassano, Phalacrocorace, Corvo Sylvatico, Nycticorace Gesneri, & Graculopalmipede.

ANSER BASSANUS seu Scoticus, incolis Solendguse dictus, avis est domestico Anserè longior, sed minus lata, Anserem tamen & forma & voce per omnia referens. Nulli bi quam circa Castellum Bas, virib. humanis inexpugnabile reperitur, ad quod incipiente vere appellant. Tres vel quatuor primo tanquam speculatores advolant; has aliquot post dieb. reliqua multitudo insequitur, quod e gregiorum virorum relationi debemus. *Nidulantur* in castri prædicti rupibus; & construendis nidis tantam lignorum copiam comportant, ut auferentibus, qui illic habitant, abundè in annum ex ea parte prospectum sit. *Ova* in rupibus deposita, superposito pede altero, unde forte nomen à solea acceperè, excludunt. Pullos delicatissimis piscibus nutricant. Quod si avolantes novum viderè, illo abjecto, iterum se magno impetu immergunt. Tanta autem piscium ab ipsis evomitur copia, ut & præfidiarijs arcis in cibum cedant. Habent intestinū quoddam parvum, oleo singularis virtutis refertum. Ischiadem & arthritim sanare creditur. Pulli capti & asini halicis nidorem emittunt. Caro est durior, & vinum exigens, quod aliquoties experti sumus cum Anno MDCXXIII. in Scotia ageremus.

Ex adipe Unguentum fit, quod cum

Comageno Plinij de bonitate certat.

PHALACROCORAX, quem cum corvo Aquatico Plinij eundem esse vel exinde conjici potest, quod calveat, quænam avis sit inter Historicos Naturales non convenit. Gesnerus an sit illa, quæ in Burgundia Crottescherot seu Corvus Piscator, cui unus pes est ad natandum palmipes, alter ad rapinam unciis unguibus armatur; sic cum piscè in aqua arripuit, nec faciliè propter pondus volare potest, piscem altero pede retinens, altero ad ripam navigat; dubitat. Alij Corvum aquaticum Plinij, Phalacrocoracem, Corvum Sylvaticū, & Graculum palmipedem, easdem esse opinantur. Bellonius quidem simillimam avem cum ea, cujus hic pro Phalacrocorace ex Aldrovando iconem dedimus, exhibet: sed corvum aquaticum, Cornicem marinam easdem Aristoteli aves esse, & Phalacrocoracem, innuit. Gallis dicitur Cormorant, quo nomine Angli avem insigniunt, quæ anguillas integras edit, per intestina elapsas rursus devorat, & vel novies aliquando unam absorbet, priusquam retinuerit. Aldrovandus Phalacrocoracem scribit esse capi *magnitudine*, rostro longo acuto & rubescente. *Capite* ferè plumis nudo & cute tecto, quæ carnem substantia & colore emulatur. Ex collo velut jubæ dependent, quales in capis cernuntur. In pedibus plumas quasdam aureas gestat. Solus inter palmipedes Fibro excepto in arboribus sedet, in ijsq; nidulatur, æquè in aqua marina atq; dulci degit. Magnum stagnis damnum quod pisces devoret, adfert, interdum Anguillam mediocris magnitudinis ex aqua abrepta in aërem defert, & antequam devoret, diu cum illa colluctatur.

CORVUM SYLVATICUM hisce adjicio, non quod sit vel palmipes, vel aquatilis, sed quod ab alijs cum Phalacrocorace confundatur. Magnitudo ipsi est Gallinæ; color toto corpore niger; si eminus videas; sin propius ad solem præsertim, cum viridi permixtus videtur. *Rostrum* rubicundum, oblongum, & angustis terræ vel arborum foraminibus inferi

aptum. A capite crista retrò tendit, haud scitur an in omnibus aut semper. Pedes habet, ut Gallinæ longiores; crura oblonga obscure rubentia. Digitos filios. Vescitur piscibus, ranis, locustis, gryllis. In rupibus, turribus desertis & pylis, unde Claustripp Germanis, nidulatur. Bina aut teina ova parit. Altissimè volat, & primus ferè omnium, circa initium Junij ni fallor, migrat. Pulli diebus aliquot antequam volare possunt, nidis exempti ita facillè cicurantur, ut in agros evolent, & subinde revertantur. In Istria circa promontorium Polæ homine per funem demisso eximuntur, & inter mēfarum delicias habentur. Aucupes in singulis nidis, singulos relinquere solent, ut anno sequente libentius redeant.

Huc pertinet & NYCTICORAX Gesneri quamvis palmipes non sit, qui juxta aquas & inter arundines versari dicitur. Vescitur pisciculis. Nidulatur in altis arboribus, ita vel quater-na ova parit. Inter arundineta absone voce vomiturientis instar clamat.

Sed nec GRACVLI PALMIPE-DIS Aristotelis, seu Corvi Aquatici minoris, hic obliviscendum, quem alij Phalacrocoracem, alij Corvum Sylvaticum vel Mergum majorem nigrum esse judicant. Colore in toto corpore est subnigro, collum si excipias, ubi non nihil rufi admisceri videtur. Rostrum aduncum acutum, propè frontem subalbicans, cætero subnigrum. Crura, pedes, & membranæ, fuscae sunt.

C A P. VI.

De Mergis in genere.

Mergum, quem Græci Poëtæ Dypten, Poingam & Bungam dicunt, Αἰθυσά veterum esse, velex eo colligitur, quod omnes eādem avem esse tradiderint, & plæraq; de Æthyia à Græcis tradita, Plinius de Mergo interpretatus sit. Bellonius tamen Æthyiam veterum quandam MERGINI speciem, quæ Cretensibus Vultamaria & Calicatzu dicitur, esse judicat.

Bellonius
observ. l. I.
c. II.

Magnitudine est Querquedula, albo ventre, capite & dorso nigro, itemque alis & cauda. Pluma ei instar lanuginis, validè cuti inhærens. Rostrum marginibus acutis cavum & planè ferè, lanuginosis plumis bona sui parte obducitur, nigrum superiore, album inferiore parte, vertice lato. Frons tuberositate quadam verrucatur, cui floccus plumarum niger innascitur. Digito pedum posteriore sola inter palmipedes caret. Vt sit, certè & Salmasius hic consentientem habemus; hoc solo dissentit, quod Mergum & Fulicem easdem esse contendat. Formam si spectes, de ea quidem Ovidius

Descriptio.

Salmasius in

Solin. c. 2.

Ovid. Me-

tam. l. 12.

Fecit amor maciem, longa internodia
crurum

Longa manet cervix. Caput est à tergo longè:

sed quis ille sit, unusquisque conjicere tentet. Nostri contra omne genus avium pedes habent in cauda, ita ut in terra stantes instar hominis corpus erectum proferant, ut author de natura rerum scribit. Ab Anatibus dentibus & cruribus discrevit Gesnerus. Magis enim duri ac rigidi, utrinque tantum in marginibus, rostri, ceteris, quibus rostrum latum non est, sed in acutum definit, nulli. Crura vel non æquè absoluta habent, vel breviora, vel non eodem situ, vel posterius, quam obrem incommodè ingrediuntur.

Versantur plærunque in mari, † flu-
minibus, stagnis & paludibus: amant
tamen & aprica * loca, ut siccescant.
Diutissimè in aquis, dū se immergunt,
morantur, & summa ac ab Homero
allata natandi pollent peritia. Alam
namque alteram sæpius ad ventum e-
rigunt, & ejusdem tanquam veli ad-
miniculo navigant, quod Pighius pro-
didit. Soli inter amphibias inter vo-
landum piscantur.

Congros, Angvillas, & alios lubri-
cos pisces deglutiunt, ingestos, inter-
dum etiam vivos, mox albo, quod eis
à ventre mox recto intestino cibi trās-
eant, egerunt; quod Oppianus & Plinius observavere. Schwenkfeldius in
omnium quas secuit ventriculis, plu-
mas avicularum copiosissimas, quasi
cum

Locus.

† Arist. H.

A. l. I. c. 1.

* l. 8. c. 3.

† Virgilius

Æneid. l. 5.

Homer. O-

dyss. l. 5.

Pighius in

Hercule

Prodic.

Victus.

Oppian. in

Ixentis.

cum pisciculis, & avena compactas invenit.

Partus. *Nidifcant* à bruma ineunte vere. *† Arist. H.* Sæpè in maritimis *†* saxis, in arboribus * interdum. Vtrumque se juxta ** Plin. H. N. l. 10. c. 37.* ostium Thinæ fluvij, & in Nortfolcia observasse Anglus quidam scribit. *Ova* ut plurimum bina ternave ponūt. Pullos ab ovis exclusos si matrem perdididerint, adeo validos esse ajunt, ut ipsi cibum sibi comparent.

Nullam eas *vocem* emitte, arbitrati sunt quidam. Lucretius de ijs:

— *Mergig^{is} marini*
Fluctibus in salso victum, vitamque
petentes
Longè alias alto jaciunt in tempore
voces.

Ingeniū. Cicurari posse, tum ille qui Venetijs ab hero è cymba emissus, non sine *Scalig. Exercit. 233.* spectatorum & voluptate & admiratione sub aquis sibi cibum capiebat, satur redibat ad herum ostendit; tum illi in Oriente, qui ab hero, postquam eis guttur filo, ne pisces captos devorarent, ligasset, dimissi, & pisces capiebant, & in cistis huic negotio destinatas injiciebant. Piscatione heri peractâ, soluto gutture, sibi piscabantur, passi ad herum redibant, testantur. Alij tempestatem præfagire, cum maria fugiunt, & clamorem ad littora ferunt, dicunt; seu quod dimisso in profundum capite aurarum signa sub fluctibus colligant: seu quod vapores ab aquis ad imbriferam nubem erigendam sursum attolli sagaciter subdorentur; seu quod pisces pleræque per eum coeli statum, è mediis aquis ad littora enatare soleant. Alij cum in mare frequentius sese immergūt, seu propter aliam aliquam causam, seu quod tràquillo mari metu belluarum progredi non audeant; in altum sub tempestatem regressis, audacter progrediuntur. Plinius pennas rostro purgantes ventum indicare alicubi

Aelian. H. A. l. 7. c. 7. innuit. Aelianus gestu alarum exultantes, idem facere tradit. Huic & Aratus accedit, dum eas *ἐν χερσὶν τενδασε* *ἀπὸ πηγύγας*, in sicco alis plaudere ac ludere, scribit.

Fus illorum in cibo nullus: quantum ad *Medicinam*, Magi contra quar-

tanæ devorari jubent cor Mergimarini sine ferro exemptum, inveteratumq; conteri, & in aqua calida bibi. Ventriculum in cibo sumptum stomacho mederi falsissimum comperit Galenus. Fel cum cedria inunctum *Galen. de simpl. l. 11.* evulsos palpebrarum pilos renasci nō patitur. Jecur sale asservatum ex hydromelite duobus cochlearibus potum, secundinas pellere scripsit Dioscorides.

CAPUT VII.

De Variis Mergorum generibus.

Mergorū varia sunt genera. Mergus RHENANVS, quibusdam *Gesner. in Ornithol.* Monialis alba appellat⁹, qui omnium Mergorum Anatiformis maximè est, corpore undique albo atro colore distincto, prona colli & pectoris parte cum ventre candida, sed passim cinereis punctis aut maculis distincta. Frequens est apud Sueffiones & Bellovacos, MAJOR, qui rostrum denticulatum angustius, è fusco ad ceruleum dilutum vergens, extremitate deorsum incurvata; pectus, collum, & ventrem tota alba: in dorso supremo egregias quasdam plumas alternatim albas nigrasq;, inde etiam ad latera versus pectus tæniæ similiter discoloris utrinq; procedentes habet; & gobiis in primis atq; troctis vescitur.

GLACIALIS, quod per summa frigora in aquis capiatur ita dictus, cui magnitudo Querquedula, collum digitos octonos longum. Dorsum undique nigrum, alæ nigræ sed albo distinctæ, crura breviter fusca, membranis inter digitos nigris; quiq; per hyemam apud Helvetios, nō minus quam Anas fera laudatur.

LONGIROSTRVS, cui rostrum nonnihil rotundum, digiti longitudine; caput cristatum, collum subrubrum, corpus præter alas totum nigrum. Pedes crocei, membranæ luteæ.

RAVCEDVLVS, cui corpus & alæ cinereæ, gula & venter alba, pedes nigri.

R VBER cui pars superior capitis & collirubescit. NIGER cui rostrum nigrum, collum spadice colore, corpus ut in Fuligula; alæ cum transversa linea alba nigræ.

ALBVS, cui rostrum rufum, caput cum collo nigrum, viridibus aliquot punctis respersum. Crura rubicunda.

CIRRHATVS qui habet caput rufum vel testacei coloris cirrho retrorsum eminente. Dentes ferratos, duos, retrorsum flexos; Crura & digitos pedum, interjectis membranis ex rufo fuscis, rubentes. Rostrum tres digitos longum, infernè rubicundum, supernè nigricans. Duobus foraminibus odoratus causa pervium. Bellonius Fibrum seu Castorè vocat. Asperam arteriam ab aliis aquatilibus diversam habet. Nec enim est rotunda, sed compressa & inæqualis, modo crassior, modo angustior, & in medio duobus velut nodis extuberans. Cum ad ventriculi regionem pervenit, in cavitatem quandam ex membranis & osse grandiusculo inæquali constructam dilatatur. Semper in aquis manet, & in iis se diutissimè omnium cōtinet. Vrinando ad quadraginta aut quinquaginta pedes procedit. Caput inter natandum sublimè attollit; & inter arundines nidulatur.

MERGANSER denique ut Gesnerus vocat, cui caput cum tertia colli parte ex viridinigricat. Collum reliquum cum aliquo pallore album est. Inferior colli pars nigrescit. Plumæ vētris & supinæ caudæ gilvæ sunt. Crura & pedes cum membranis inter digitos minii colorem habent. *Ventrliculus* est corneus id est firmissimus. *Pondere* interdum ad libras duodecim accedit.

Huc pertinet *Mergus* ille, quem Bellonius Gallicè HERLE vocat, anatem magis quam anserem referens, rostro longo, terete, & mucrone reflexo, colore subrubro.

Item GVLO Germanis *Seesluder* magnitudine Anseris, colore gilvo, gregaria, mensis lautioribus contenta.

Necnon SCHELADRACHVS Anate major, varius rostro lato, adun-

co, dentibus acutissimis pleno, ex gilvo subrusto.

MORFEX, deniq; tota nigra, rostro ferrato & valido, quæ sub aqua mergitur, & anguillas capit. Easdem. que si se gravari senserit, evomit. Gregatim in arboribus juxta aquas nidificat. Volatura caudam diu in aqua trahit. Saturata ad solem ut siccentur, expandit. Fimus siccat arborum ramos in quos inciderit.

NB. *De mergis exoticis vide Mantissam.* Num. II.

C A P. VIII.

De Colymbis in genere & in specie.

A Vis quæ Græcis Colymbus, Colymbis, & Colymbas; Latinis Vrinatrix dicitur. Vnum tantum illius genus Aristoteles commemorat; alij plura; Turnerus tria vidit. *Primum* totum nigrum, si cirrum quem in capite gerit, exceperis; Mergo, quo tamen triplo minus est, quo ad corporis effigiem non dissimile. Angli Doukeram vocant. *Alterum* Turdo non majus, Anati colore & corporis effigie simile. Anglis media Vrinatrix dicitur. *Tertium* adeò nuper ab ovo exclusum refert Anserculum, ut nisi Rostrum hujus paulo tenuius esset, ægrè alterum ab altero discerneres. Non enim pennas, sed lanuginem quādam earum loco obtinet.

Gesnerus, Colymbos facit *Maximos*, *Majores* & *Minores*. *Maximus* qui in Aconio lacu rarè capitur, ab inepto per aquæ superficiem motu Fluder dictus, Anser major est. Rostro oblongo, angusto, acuto. Neq; volare potest rectè, neq; ingredi commodè, nisi simul pedibus alisque nitatur. Tam profundè urinari dicitur, ut orgiarum viginti spacio, quandoq; reti aut mucrone ferre sub aqua capiatur. *Major* duorum est generum. *Primus* Anser paulo minor, collo est oblongo, dorso nigro, collo inferiore & ventre albo, plumis ferè niveis. Digitos pedum habet ternos, adhærentib. membran

branis latos, sed aliquosque divisos. Ungues latiusculos præsertim mediū, teretes & in mucronem attenuatos. Crura juxta anum ferè retrosum porrecta, natationi potius quàm ingressui apta, femora in ventre condita, inæqualem interdum tibiæ situm. *Alzer* cristatus seu cornutus est, plumis circa verticem, & collum supremum eminentibus, superius nigris, ad latera ruffis. Aliquot ejus sunt descriptiones. *Minor* Germanis *Succhelin*, ut major *Succhel*, magnitudine est columbæ, digitis latis, adhærentibus membranis fuscis, non continuis tamen sed trifariam dissectis. Inferiore rostri parte tota sanguine colore rubente. In femore multa ossicula tenuia, circa articulum agglutinata, dimidia ossis femoris magnitudine, ab una tantum parte habet.

Bellonius etiam *Majorem* sub nomine *Vriæ* veterum describit, Anatis magnitudine, rostro longo, rubicundo, ac ferrato. Cristam habere videtur. Nam cum nigro sit vertice, plumæ oblongæ ab occipite pendent, quas cum ex candescit, aut exhilaratur, attollit aut demittit. Voce est horrida, sed ad sui tutelam utili. Idem nec *Minoris* obliviscitur, qui adeò aquæ familiaris est, ut ei per terram gradi possit, propter femora in ventre ita recondita, ut nullo modo appareant, & crura, quæ extrorsum protenduntur, ut omninò è lumbis censeripossit, natura negasse videatur. Caudam habet nullam, nullumque *Vropygium*. Alas pro corporis proportionem exiguas. Plumas lanuginosas. Digitos ab invicem separatos, latos tamè. Rostrium rotundum exiguum, rubicundum. Crura parte posteriore ferræ instar crenatæ. Jecur tenellum; intestina à reliquarum avium intestinis diversa, gracilia & tenuia si in pauca aqua deprehendatur, vix se in aërem attolle-re potest. Propè terram in cespite aliquo palustri nidificat. Addit & *Aldrovandus* suas descriptiones, quas hic adferre non est necesse. Addidisse sufficiat, *Colymbos* Athenæo inter omnes Aquaticas aves minimos esse, atro & sordido colore tingi, & acuto

rostro instrui; *Oppiano* *Colymbos* ^{*Oppian.*} semper natare, & ne somni quidem ^{*ixentic.l.*} vel cibi gratia in continentem exire, ^{*2.cet. Aldrovando.*} nisi partus tempore; eosdem adversis ventis natare; ne illorum vi aliquando inviti in terram extrudantur. Circa medium Augustum propter pennarum mutationem volare non possunt. Etiam celerrimè merguntur, ut bombardæ etiam ictum effugiant. Referri ad colymbos potest, avis Anglis *Coot* dicta, forma & colore *Fulicæ* similis, paulò minor, in cujus rostro parvum tuberculum rubeum eminet, quæ subinde ad fundum usque urinatur. Non piscibus tantum, sed algæ, lineo, gramine, parvisque cochleis victitat. Et vulgo fertur, non posse diutius volare, quam pedis cavo arreptam aquam retineat.

Huc pertinet *VRIA* *Anate* multo ^{*Athenæus*} minor, rostro longiore ac tenui, colore ^{*l.9. Dipn.*} sordido testaceo. Gesnerus colore tantum, & magnitudine à *Colymbis* differre putat.

CAP. IX.

De Brentho, Phalaride, Avo-
setta Italarum &
Trochilo.

BRENTHVS quænam sit avis dubitatur. Niphus monticolam esse credit, generis unci. Plinius pro eo *Anatem* vertit, quod & *Gaza* securus est. Albertus Merguli pisces venantis speciem interpretatur. Et fortè est, quia piscibus vivere *Aristoteles* reliquit. ^{*Arist. H.A. l.9.c.1.*}

Nec magis notum, quænam sit *PHALARIS*; Bellonius pro ea *Mergum* varium majorem substituit. Gesnerus *Folægam* *Italarum* eam esse credit. Apud Athenæum habet rostrum angustum; corpus aspectu magis teres ^{*Athen. Di- pnos. l.9.*} quam *Anas*, colorem in alvo & dorso cinereum.

AVOSETTA *Italarum*, quam *Lucarni* circa lacum *Verbanum* *Spinza-* go d'acqua vocant, *Recurvirostram* verè dixeris, avis est magnitudine columbæ aut paulò gracilior, rostro nigro,

gro, sursum tendente, in extremo acuto, quinque digitorum ferè longitudine. Corpore supino toto albo; capite & cervice superius ex fusco nigricante, pedibus coloris cyanei diluti, digitis membranis junctis. Cruribus longis, acideo posteriore digito, qui pro calce est, minuto.

Vox ejus est Crex. Crex.

Aelian. H. A. l. 3. c. 11. & l. 8. c. 25. Arist. H. A. l. 9. c. 6. TROCHILVS juxta ripas fluviorum oberrat, & tanta sæpius celeritate discurret, ut cursus volatu ejus velocior sit, Obvia quæque depascitur, hirudines etiam quæ faucibus Crocodili inhaerent, Cladorynchos seu potius *κλαδωρυγχος* inprimis, legit. Mira de illis Oppianus, nimirum, mares à fœminis, fœminas à maribus pasci. Ineunte vere priores fœminas, sollicitare cantu vel stridore potius peculiari, masculos ad coitum. Fœtu procreato separari, & ad sua pascua redire. Tunc mares omnem fœturæ & Veneris curam relinquere, fœminis laborem solum incumbere, eumque eas inter se partiri. Alias ova in nidis fovere, alias foventibus cibum congerere. Pullos adultos ad littus ubi mares versari solent perducere. Ibi fœmelas cum suo sexu remanere, masculos ultrò separari. Gesnerus esse putat generis Gallinularum Aquaticarum; Aldrovandus Corriram seu Tabellariam vulgò dictam. Avis hæc est varia, rostro recto, luteo, in fine nigro. Rictu magno. Oculis nigris albo circulo circumdatis, quem rursus alius spadiceus ambit. Cruribus longis, coxis brevibus, digitis membrana junctis. Si Corrira Trochilus non est, Celeris est.

TITVLVS II.

De Avibus Palmipedibus Herbivoris.

CAPUT I.

De Cygno.

CYgnus, qui & *Olor* quasi *ὄλος ὀρεῖος*, totus candidus, Græcis modernis Cyprinus, veteribus *κύπριος* & *κύπρινος* seu

κύπριος & *κύπρινος* τὴν ἰσὺν, quod cibi causa cœnū scrutetur, & turbet, seu quasi *κλέος* quod sit clamorosus; seu quod teres collum habeat, dicitur. Totus est candidus. Horatius purpureum, & pulchrum & splendentem, poetica licentiā nominasse creditur *Rostrum* habet parvum turbinatum, in extremitate obtusum, ferratum & falcis instar dentatum, colore ruffo; in cujus summa parte qua capiti committitur, tuberculum rotundum, nigerrimum, & rostrum in se inflectens visitur. *Collum* longissimum, viginti octo vertebrae constans, unde *δολιχόδερος* Homero & Euripide, *δολιχὰν χίλιν* Euripidi dicitur. Et *Lineæ* velut piscatoriae usum in aqua porrectum præbet. *Pedes* nigris notis partim cæruleis partim rubicundis & albis distinctos. *Membranas* digitis interjectas squamulis minimis rotundis inæquales. *Digito* verò veluti annuli quidam in latum interfecant; eorum medius omnium & crassissimus & maximus est, longus digitos decem, internus novem, externus septem. Vno pede pro remo, altero pro corporis sui gubernaculo utitur. *Linguam* mediam, quod superius ponendum erat, sulcus denticulis palatum medium secantibus respondens dividit, & ipse propè radicem scaber. *Interna* si spectes, *Intestina* omnia quatuor dodrantes, & palmum longa, multoque adipe, qui vicem emeriti obit interjecta, in illo quem Aldrovandus secari curavit, erant; & cum simplici tantum in se media spira revolutione inflectantur, ne aliquid non planè distributi alimenti præterlaberetur, natura, cœca duo dodrantis spacio inter anum & ipsorum initium interjecto, recto intestino appendit. *Arteria aspera* admirandæ planè est structuræ. Nam Oesophagum subiectum comitata, ad jugulum descendens cum pervenit, non recta, ut in cæteris animantibus, ad pulmones tendit, sed supra claviculas elevata, in costam ossis pectoris seu sterni, quæ ex duobus lateralibus ossibus, & tertio superno his pro operculo incumbente fabricata, vaginæ seu thecæ figuram & usum præbet. Ad huius finem postquam pervenit arteria, in-

Descriptio.

Homer. l. 1. Iphig.

Colymbus Maior
groß Suchel.



Colymbus Maior. Tab 48
Bellor.



Trochilus
Coruza




Colymbus Minor




Mergus Bellon




Anasetta Fialor.




Cygnus.




Cygnus.



Capricaica.



Bernicla



Brenta



Anser ferus
Wilde gans



ria, infernè in se instar serpentis reflectitur, & S. literam exprimit; mox quæ sub priore jam dicta portione ipsi superposita, hanc capsulam denuò egressitur, & claviculis mediis conscendit, harum jugo tanquam fulcro innititur; atque ita sustentata, denuò in morem tubæ revolvitur, thoracisque cavum subiens, antequam ad pulmones fertur, prius quasi laryngem alteram efformat, transversim secta, osticuloque quantum i. sa lata est longo, & quod tenui membrana obtenditur, hiulem fistulam, seu syringem organorum musicorum, quæ inferiore sui parte simili fissum patulæ sunt, figuram repræsentat. Sub hac larynge arteria in duas canales divaricatur; quorum singuli in medio ampliori capacitate protuberantes, recta in pulmones exiguos costis retro totos affixos abeuntes, distribuuntur. Talem structuram & cantus, de quo postea, & respiratio reposcebat. Ne enim, dum aliquando horæ dimidiæ spacio toto capite & collo pronis, vado alimoniam haustus immergitur, periculum suffocationis incurrat; ex ea arteriæ, quæ pectoris dictæ vaginæ reclusa est, portione, spiritus quantum satis suppetatur.

Locus.

Locum si attendas, est avis amphibia. Maximè tamen aquis delectatur. *Ælian. H. A. l. 10. c. 36.* *Ovid. Metam. l. 2. c. 5.* *Seneca in Agamem. Theocrit. Etyl. 19. Stat. l. 14. Theb. Polyd. l. 1. H. Anglor. Æliæ. H. A. l. 17. c. 24. l. 15. de re cib. c. 61.* *Ælianus* greges eorum in Afro mari apparere prodidit. In fluvijs Caystro, Istro, Tanai, Strymone, Mæandro, Eridano, Mintio, Tamesi & quidem magna copia degere, apud Ovidium, Senecam Tragædum, Theocritum, Lucianum, Statium Papinium. Mantuanum, Polydorum Virgilium, & alios invenies. Innumeris in agro Engolismensi, Francisci primi opera, in fonte Tenario educatos Brujerinus testis est: sed stagna vehementer appetunt; seu quod quietiora nec natantum impediunt, quod Æliano visum, seu quod in illis major herbarum suppetat copia.

Victus.

Cibus ipsi herbæ at segetum grana, ova piscium. Rostro cribrat cœnum, & algam inprimis quærit. In Scotia lacu Spina, herbæ cujusdam semine, quæ ab iisdem nomen sortita est, dele-

ctatur. Eâ autem naturâ est, ut agris injecta nunquam putrescat.

Tempore *libidinis* blandientes in-
ter se mas & fœmina, alternatim capira cum suis collis inflectunt, velut amplexandi gratia; colla mares applicant fœminis, deinde mas fœminam conscendit. Vbi *coierint*, mas conscius læsam à se fœminam fugit, illa impatiens fugientem insequitur. At non diutina hæc est eis discordia, noxa cessante reconciliantur; & fœmina maris persecutione relicta, post coitum frequenti caudæ motu, rostrum in aquis mergens, se purificat. Semel tantum anno initio veris *pariunt*. Quia plures & speciosos fœtus producant *καλλιπαίδες* & *πλούσιαι* dicuntur. Aristoteles *εὐτέκνης* dicit. Pariunt *οὐα* tertio anno, illa quæ magna, oblonga, testâ durâ obtectâ.

Probè natant, velociter sylvestres, tardè ob corporis pondus domesticæ
volant. Aristoteles longius in pelagus
effert scripsit. Et Hesiodus
nuncupat.

Cantum quod attinet, scinduntur

in sententias Authores, cum eo Socrates apud Platonem, Aristoteles, Cicero, & Philosophis, ex Poëtis Callimachus, Aeschylus, Theocritus, Antipater, Euripides, Lucretius, Virgilius, Seneca, Ovidius, Martialius, sentiunt. Diluculo ante solis ortum tanquam in aëre vacuo per id tempus audiendi clarius, in maris lit-
toribus, nisi tempestas dissuadeat ca-
nere; nec cantus in senecta morti vilcinus (remissioris tum) oblivisci. Favonium vel canendum observare, fati-
certos, ne à quoquam interpellentur
secedere, apud Oppianum legitur.
Fabulosum id, apud Lucianum, Plin-
ium, Alexandrum Myndium & Scalliger invenies. Ælianus vacillat, &
modò his ad stipulari, modò in illos
propendere videtur. An funeris sui
cantator sit, quod & Brasavolus ob-
servasse dicitur, nescio De Elephantos-
fanè id proditum. Cantare, nullum
ferè dubium. Audivit in lacu Mantua-
no cantantes Pendasius. Propè Lon-
dinum in Tamesi festivis cantib. sub-

S

eun-

Aeliā. H.A. cunctes classes excipiunt. Canorum
L.20. c.30. quiddam lamentantium in morem
L.11. c.1. quovis tempore obstrepere, observa-
Idem var. vit Aldrovandus. In hoc deniq; du-
L.1. plex ille flexus, qui ossis pectoris pri-
 mum capfulæ inferitur, deinde altera
 revolutione in furculam inclinata re-
 cumbens, in pulmones decedit, factus
 videtur, ut vox in ipso revolutæ arte-
 riæ angulo, repercusso, majori cum
 clangore erumperet, ac veluti moru-
 læ exiguæ in eo anfractu quiete re-
 creata, vires acquireret eundo.

Plin. H.N. *Ingenium* in volatu potissimum o-
L.10. c.23. stendunt. Liburnicarum more rostra-
 to impetu feruntur, facilius ita findē-
 tes aëra, quam si recta fronte inceder-
 ent. A tergo sensim dilatante se cu-
 neo, porrigitur agmen, largeq; impel-
 lenti præbatur auræ. Colla imponunt
 præcedentibus, fessos duces ad terga
 recipiunt.

Actas. Quod de *etate* apud Aelianum le-
† Arist. L.9. gitur ducentessimum nempe attinge-
H.A. c.1. re annum incredibile videtur.

Aeliā. H.A. *Inimicitias* interdum tantas inter se
L.14. c.13. alunt, ut alter alterū † devoret, vel, ut
† Statius. Aelianus, perimat. Nec pullis, velo-
Homerus vis parciatur. Ab Aquila † sibi metuāt.
Iliad. o. Attracti, non iniquo Marte repugnāt:
 sed nec cum fulgure, serpentib. & dra-
 conibus ipsis convenit. Cicutā inter-
 iisse non mirum, cum & porci illius es-
 su perierisse visi sint.

Præfagiū *Pluvias* expectabis, si rorem aquæ
 inspergunt, si profundos eidē immer-
 gunt humeros, serenitatem. Apud
 Helvetios ingens frigus metuitur, si
 hyeme in quodam lacu apparuerint.

Vfus. *Vfus* in *cibis* laudatus apud veteres.
 Alexandrides inter aves lautas nu-
 merat, & Dipnosophistis apponuntur;
 nec minore quam Anseres habitos,
 precio ex Plutarcho potest colligi.

Plut. l. de *esui carnis.* Recentiores nigram, & duram, fortè
 quia annosi adferuntur, carnem accu-
 lant. Moscovitarum tamen Duces,
Herberst. quoties carne vescuntur, assos hospi-
in Mosco. tibus apponunt. In *Medicina*, faciem
legat. purgat, & erugat adeps. Ova ad ignem
Scen. ham- sacrum celebrantur. Pellis ventricu-
mon. lo apposita, concoctionem vi pe-
 culiari juvare creditur.

* *
 *

CAPVT II.

De Anserē.

ARTICULUS I.

De Anserē domestico.

Ansēr, Plinio alicubi Ganza, Græc. *Plin. H.N.*
10. c. 22. cis veteribus *χλω, χίνα* modernis, avis est vulgo tam nota, ut descriptio-
 ne non indigeat. Inferum & domesti-
 cum distinguitur, quorum ille minor
 Aristoteli, varius esse à Columella
 manifesto errore proditur, cum apud
 nos varij candidos numero exsuperēt.
 In regno Senegæ colore & pennis
 multijugis variantur. In Hispania no-
 va capite rubeo, olores candicie su-
 perant.

Vifus cum duobus capitibus, toti- *Descri-*
 demque linguis, collo unico, quatuor *ptio.*
 pedibus, quorum unum par alarum
 locum occupabat, alterum circa po-
 dicem. Alæ duæ circa collum pande-
 bantur. Proditus ab Alberto & alter,
 dupli collo, quaternis pedibus, &
 totidem alis, dorso uno, adeo ut duæ
 aves, altera alterā ferens, viderentur.
 Frequentissima scilicet in illis ob hu-
 morem & stoliditatem monstra sunt.
Interiora si spectes, testes sub diaphrag- *Arist. H. A.*
 mate lumbis annectuntur, hisce
 duo ex vena cava rami insident. Duo
 vasa ex infima utriusq; parte emer-
 sa, & deorsum per lumborum regionem
 rectò delata, prope os sacrum, coeunt,
 & canalem teretem, qui in plures or-
 bes circumvolvitur, & cujus pars su-
 perior, tota carnea, inferior intus car-
 tilaginèa conspicitur, efformant. Pe-
 nis loco extremam portionem datam,
 quæ in coitu arrigatur, haud malè
 conjeceris.

Locus ipsis ferè ubique, eam Arabiæ *Locus.*
 partem quæ Austrum versus assurgit,
 si excipias. In Blesia agro aquarum
 ferè experte greges copiosi spectantur,
 magnumque ex his plumæ pretium.
 De *victu* non est quòd dicam. Tenel-
 la arborum germina absūmit, virida-
 riorum herbas penitus depascitur, &
 vitium pampinos rodit. Trifolio, fœ-
 nugræco, lactuca, & aliis delectatur.

Quan-

Partus. Quantum ad *Generationem* in a-
 † *Varro* de qua † coeunt, ne humi insistentes;
Re R. l. 8. à coitu * aquis sese ingurgitant. Sin-
 6.3. gulis maribus tres olim † destina-
 * *Arist. H.* bantur foeminae, sex hodiè. Tempus
A. l. 6. c. 2. admittendi aptissimum à bruma, pa-
 † *Columel-* riunt & * juvenes absque coitu, sed
la dere R. hypenemia. Coitus expertae si absque
l. 8. c. 13. eo posuerint, plura quidem, sed steri-
 † *Arist. H.* lia, minora, & minus jucundi, quam
A. l. 5. c. 33. foecunda saporis erunt. De numero &
l. 6. c. 2. H. *partus* & ovorum inter scriptores non
lib. 2. c. 1. cōvenit. Ter parere scribit *Columel-*
Plin. l. H. la si foetus non excludunt. Bis *Plinius*,
N. l. 10. si primum foetum gallinae excludant.
 6.59. Ova plurima sedecim, paucissima se-
 ptem, huic pariunt. Si quis furripiat,
 pariunt, dum rumpantur. Illi singulis
 foetibus pariunt, primò quina, sequenti
 quaterna, novissimo terna. *Quintilius*
 ad duodecim, & ultra procedere ait.
Carolus Stephanus, si non incubent
 duodecim, & singulis foetationibus
 plura. Recentiorum quidam ad cen-
 tum & ducenta ascendunt. Tempus
 pariendi aliis à Calend. Martijs ad
 solstitium: si bruma coiverint, *Plinio*
 post solstitium X L. propè diebus pa-
 riunt. Si appropinquant partus, digi-
 to tanguntur ova, quæ sunt prima par-
 te locorum genitalium. Incubatus à
 foemina duntaxat absolvitur, nec re-
 cedit, donec pullos excusserit. Com-
 modissimè à Calendis Martijs ad sol-
 stitium exercetur secundum *Palladiū*,
 à principio Novembris ad Decēbrem
 exactum secundum recentiores. Pulli
 intra triginta dierum spacium exclu-
 duntur, † intra viginti quinq; si dies
 † *Arist. H.* tepidiores sunt. *
A. l. 6. c. 6. *Vocem* si attendas, *παπυζειν* & *πλατυγι-*
 * *Plin. H.* *ζειν* Græcis; *Aratus* *πλαγγηδόν* adverbio
N. l. 10. de eadem usus est. Gratitare, gignere,
 6.59. strepere, clangere, Latinis dicuntur.
Vox. *Volatus.* Rarò *volatum* domesticæ exercent,
 sed pedibus valent. Mirum in hoc ali-
Plin. H. N. te, inquit *Plinius*, à Morinis usque Ro-
l. 10. c. 22. mam pedibus venire. Fessi proterun-
 tur ad primos, ita ceteri stipatione na-
 turali eos propellunt.
Affectus De *Affectibus corporis* pauca occur-
 runt. Solus ex pedestribus à cane ra-
 bido morsus, rabie non corripitur, si
 Nipho credendum. Laborat pituita

& phitriasi; illam pimpinellâ quæ in
 pratis nascitur avertit. Huic frequen-
 ti ablutione & sideritidis usu occurrit.
 Pullis eorum urtica contacta morti- *Plin. H. N.*
 fera; nec minus aviditas, nunc satie- *l. 10. c. 59.*
 tate nimia, nunc suamet vi; quando
 apprehensa radice, morsu sepè conan-
 tes evellere, ante colla sua abrumpūt.
 Discordia cum Aquila, ne morte qui-
 dem interruptitur, pennæ commixtæ
 certent, & Anserinæ ab Aquilinis ab-
 sumuntur.

Aetas sexaginta annos attingit, si *Aetas*.
 Alberto credendum. Non dedisset *Aethi. l. A.*
 fidem *Cardanus*, nisi carduelem tre- *l. 5. c. 29.*
 decim annis in cavea educatam sci-
 visset, & sylvestris anseris tam duram
 carnem, ut ne triduum quidem cocta
 emolliri posset.

Quod folia lauri ne in extrema qui- *Ingeniū.*
 dem fame attingunt; rhododaphnes *Mizald. de*
 ne coacti quidem edunt; quod huma- *Anim. l. 5.*
 num longè præsentiant odorem, & *6.29.*
 auditu cum apro certant; quod se ab
 Anseris dejectum Falconem vidisse
Scaliger scribit; vigil, cura Capitolio
 testata defenso, per id tempus canum
 silentio proditis rebus, & fama amor-
 ris, † *Argis* dilecta forma pueri no- † *Plin. H.*
 mine *Oleni* & *Glaucæ* *Ptolomæo* *N. l. 10.*
 Regi cithara canentis, quam eodem *6.22.*
 tempore & aries adamasse creditur,
ingenio debetur. Potest & sapientiæ
 videri intellectus iis esse. Ita comes
 perpetuò adhæsisse *Lacydi* Philoso-
 pho dicitur, nusquam ab eo non in pu-
 blico, non in balneis, non noctu non
 interdiu digressus. Quod semper vo-
 ciferatur, improbum dixit *Virgilius*.
 Si dum ad pastum festinant, jugi cla-
 more obstrepunt, tempestas immine-
 re dicenda est. *Theophr. de*
signis Tem-

Reperere olim in *cibis* æstimium: *Vsus.*
 Regum *Ægypti* mensis solus cum vi-
 tulo apponebatur. *Alexander Severus*
 festis tantum diebus ad cōvivium
 recipiebat. Ab *Annibale* Numidicis
 Gallinis præferiebantur. Quod si je-
 cur respicias, Romani eos ejusdem
 bonitate novere inquit *Plinius*. Far-
 tilib. in magnam amplitudinem cre-
 scit: exemptum quoque lacte mulso au-
 getur. Nec sine causa in quæstione
 est, quis primus tantum bonum inve-
 nerit,

nerit, Scipio Metellus vir Consularis, an M. Sestius eadem ætate Eques Romanus. Hodie in Gallia non minoris fit Anser altis, quam Romæ olim Lupus scarus, aut Mulus. Est & Judæis ubiq; terrarū in delicijs. Nec damnosum interdum, hyeme & juniores in cibum cedant. Aliorum excrementitia & concoctu difficilis caro est. Tenescunt tamen, si collo per triduum suspendantur, gravi lapide pedibus alligato. Septentrionales sale conditis, & vento siccatis, tum coctis, post æstivale solstitium vescuntur. Messalinus Cotta, quod constat, Messalæ Oratoris F. palmas pedum ex his torrere, atque patinis cum gallinaceorum cristis condire reperit.

Plin. H.A.
l. 10. c. 27.

Schwyëck-
fel. in The-
ritroph. Si-
les.

Quantum ad *Medicinam*, Plumæ ex ventre tritæ & insperæ, sanguinem sistunt. Lingua peculiariter ad vesicæ vitia & involuntariam mictionem facit. Sanguis utilissimè inter Antitoda miscetur. Fel contusis oculis prodest, si hyssopo postea & melle inungatur. De Adipis usu vide multa in Aldrovādo. Puerperæ in Bohemia butyro in cibis præparant, si aqua aurem intraverit, præcipuum est remedium. Cum iridis nostratis pulvere permixtus, & umbilico in testa nucis juglandis inditus, alvum infantibus solvit. Aliud reperit Syriæ pars quæ Comagena vocatur; adipem eorum in vase æreo cum cinnamomo nive multa obrutum ac rigore gelido maceratum, ad usum præclari medicaminis, quod ab gente dicitur Comagenum. Dioscorides Commagenes non meminit. De plumarum olim usu ita Plinius. Candidorum alterum vestigal in plumâ Velluntur quibusdam locis bis anno. Rursus plumigeri vestiuntur, molliorque quæ corpori quam proxima, & è Germania laudatissima. Pretium plumæ eorum in libras denarij quini. Et inde crimina plerumque auxiliorum præfæctis, à vigili statione adhæc aucupia dimissis cohortibus totis. Eoq; deliciæ processere, ut sine hoc instrumento durare, jam ne virotum quidem cervices possint.

ARTICULUS II.

De Anseris Fero in genere, de Vulpanseris, & Bornicla aene.

Anseris sylvestris plures sunt diffæretniæ. Plin. *Chenolopes*, & quibus lautiores epulas Britannia non novit, *Chenerotes* ponit. Apud Albertum cinereos, qui propter corporis levitatem altius volant. *Grandinosos*, seu ob candorem niveos. Qui præter extremas quinque remiges penas albi sunt. Æstate nusquam conspiciuntur; hyeme ingruente sublimi volatu gregatim migrant: *Arborum* qui ex arboribus nasci creduntur, quibus color capitis ut Pavoni, absque crista tamen, invenies. Schwenckfeldius eos in arborum cavis, cornicum & ciconiarum nidis, quæ tredecim vel quatuordecim, illaq; flaventia parere scribit. Apud Oppianum *Linurgi* & *Cenchrite* reperiuntur. Gesnerus Anseris *stellati*, quem Itali Ciccum vel Ocam Sternam vocant, cui magnitudo inter Anatem & Anserem, pondus leve, pectus maculis aspersum, dorsum & alæ cinerea, meminit. Scaliger in Oceano *Brasilæ marinos*, à colore atro, qui nunquam evolent, esse prodit. De *Bassano* seu Scotico superius egimus. Descriptionem non morabimur. *Caput* fere Anatinum magis quam Anserinum. Utraque *mandibula* intus oras ferratas loco dentium obtinet. *Palatum* quibusdam denticulis acutis instar limæ est scabrum & asperrimum. *Membrana* quæ digitos connectunt in extremo ferræ instar denticulatæ videntur.

Locus ipsis maximè circa paludes. In Æthiopia adeo frequentibus agminibus grassantur, ut tum morsu, tum stercorebus omnia demoliantur. In Septentrione cubationis tempore, quo à meridionalibus plagis redeunt, copiosissimè visuntur, circa Aprilis initium. In Bataviam, Hannoniam, Arcticiam migrationis tempore copiosissimi conflunt. Novam Hispaniam mense Decembri prætervolant. In

India

Indiapulcherrimi conspiciuntur. Totum ipsius corpus, præter pectus & ventrem, nigrum. Oculos circulus coralli æmulus ambit. Ex minore oculorum Cantha linea ejusdem substantiæ & coloris extuberat, versusque collum deducitur. Inde sex septemve ramuli exigui utrinque ad medium colli usque; descendentes, devaricantur.

Partus.

Coire post hyemale solstitium incipiunt, initio veris ova ad summum sedecim ponunt. Steriles evadunt, si mites redditæ fuerint.

Volatus.

Migratoriæ sunt aves. Migraturæ vociferantur altè volando, forè ne qua earum remaneat. Meridiem petunt cum Septentrio propellit; istum cum Auster, nec cessant, nisi esurie coacti. Ordo ut Gruum cum silentio literatus; nec clangunt nisi rupto ordine. Vide quæ de domesticis ex Plinio diximus. Oppianus nec Ducibus, nec somni tempore custodibus destituit scribit. Taurum montem superaturi Aquilarum metu lapillos rostris ad coercendam linguam ferunt. Gili-
cibus id quidem rærum attribuit Plutarchus: sed feris adscribi apud Aelianum & Marcellinum legimus. Tardius adveniunt quàm Grues. Vidit aliquando Gesnerus sexto Octobris permultas avolantium turbas, quæ ab Oriente in Galliam & Occidentem versus per turmas triangulas volabant.

Vsus.

Quantum ad usum, caro propter excitationem minus est excrementitia. Cruda adhuc suaviter olet. Lingux affæ benè à calculosis in cibo sumuntur.

ARTICVLVS IV.

De Vulpanser, Capricalca, & Bernicla aue.

AD Feros Anseres referri debet *Vulpanser, Capricalca, & Branta.*

VULPANSER seu Chenalopex quibusdā, est avis pectore rufescens, aquatica, in cuniculorum foveis, interdum & rupium cavernis nidificās, quam Angli Bergandram vocant. Ge-

snarus an Anser Stellatus sit Chenalopex considerandum reliquit. Aldrovandus nihil certi proferre potest. Inter palmipedes quæ circa aquas versantur, ab Aristotele numeratur. Ova Arist. H. A. hypenemia quandoque parit. In pul- l. 8. c. 3. lis tuendis eandem quam per dioxeram collocat. Et ab Aquilæ, felis & Aelian. H. A. l. 5. 30. l. ceterorum hostium injuriis sese defendit. In Cupedijs olim apud Britannos fuisse ex Plinio superius diximus. l. 9. c. 16. l. 11. c. 38.

De **CAPRICALCA** occurrit.

Corvo paulò majorem esse ac in delicijs haberi. Tæniis transversis fuscis per collum pectus & ventrem distinguui, caudam nullam habere. **BRANTA** seu Bernicla & Bernichia, Scotis Clakguse, Gallis Crauant, & Oye Nonnete, Isidoro Barliata, Alberto Barbates, Hollandis Rotgansen dicitur. Bellonius Chenalopecem veterum esse putat. Minor est fero Anser, Monacharum ornatui, quæ colorem album atto superimponunt, similis. Alis & dorso coloris plumbei, cauda brevi & nigra. Anserum ferarum more volat, strepit, paludes frequentat, & segetem depopulatur. De ortu magna est inter doctos controversia. Quidam coire volunt: alij ex putridis navium ruderibus; nonnulli ex pomis cujusdam arboris in insula Pomonia nascentibus corruptis; alij ex fructu folijs conglomeratis simili, qui cum opportuno tempore decidit in subjectam aquam; reviviscit; convertiturque in vivam; oriiri existimant. Isidorus, Alexander ab Alexandro, Olaus Magnus, Hector Boethius, Scaliger, Mejerius, Gesnerus, & alij, communifamæ ad stipulantur. Batavi ex propria inspectione in Grônladia Barniclas, quæ ovis incubarent, pullosque educarent sese invenisse affirmant.

(o) 25

CAP. III.

De Anate.

ARTICVLVS I.

De Anate in genere.

Descri-
ptio.

ANas, Græcis antiquis *ἄνα* vel *ἄνι*-
να, recentiorib. *χλωα*, vel *παμίτζα*,
vel Pappos, avis est apud nos notissi-
ma. Dorsum ipsi & rostrum lata, pe-
des cartilaginosis membranis interse-
pientibus, ampli; crura brevia crassa,
& retroversus disposita, ut in natatio-
ne valentius instantes; aquas propel-
lere possent. Gulam habent amplam;
linguam plaræq; interius asperiuscu-
lis utrinque eminentijs dentatam &
quasi plumatam: Musculos circa cor-
poris superficiem separatos, interio-
res albos: quod si exteriores liveant,
quod vi frigoris fieri videtur, bonam
securitatem æstatem rustici apud Hel-
vetios conjiciunt.

Locus.

Aquis tum ut earum frigiditate cō-
genitam intemperiem, quæ calida est,
contemperent; tum ut pabulū quoq;
naturæ suæ & palato conveniens, illic
quæritent, gaudent, inq; ijs maximam
temporis partem versantur.

Victus.

In *cibo* herbarum aquaticarum ra-
dicibus & seminibus, vermibus, & a-
nimalium aquaticorum ovis, lenticu-
lâ in primis palustri, quam Crescen-
tensis Anatinam, alij Pavarinam vo-
cant, delectantur. Sunt qui pisciculis
& limo vesci, nec à venenatis absti-
nere, quod Scaligero placet, vo-
lunt.

Scalig. in
Theophr. de
caus. plan-
tar. l. 2.

Partus.

Quantum ad *Generationem* tantæ
sunt, Authori de natura rerum, salaci-
tatis, ut plures mares solam fœminam
certatim coeundo, occidant. Mense
Martio & in sequente concumbunt.
Pariunt juxta aquas & rigua; pulli ex-
clusi statim reconditâ quadam naturâ
aquam prosequuntur; & mox ut o-
vum exeunt, tanta agilitate vigent,
ut etiam si matrem mori vel alienari
contigerit, sine nutrice vivant. Super
omnia autem est earum ovis subditis
Gallinæ atque exclusis admiratio; pri-

mò non planè agnoscantis fœtum, *Plin. H. N.*
mox incertos incubitus sollicitè con- *L. 10. c. 55.*
vocantis; postremò lamenta circa pi-
scinæ stagna, mergentibus se pullis na-
tura duce.

Vocem Anatum author philomelæ *Vox.*
per tetrinire exprimit. Scaliger quir-
tatricem appellat. Fœminæ crassior
est, maris acutior.

Lentè ob crurum brevitatem ince- *Incessus.*
dunt, ad natandum potius apti.


Ingenium ipsis cum Anseribus ferè *Ingeniū.*
commune, Aquilarum quomodo de-
clinare soleant iustus Aelianus descri- *Aelian. H.*
bit. Merguntur dum involant, & sub *A. l. 5. c. 33.*
aquis natando, ex alio loco extra a-
quam eminent. Cum sese aquis mer-
gunt, plumas; cum pennas rostro pur-
gant, diuq; & multum alas excutunt,
ventos spondere Theophrastus, *Æ-* *Theophr. de*
lianus, & Plinius tradunt. Ventris & *signis ven-*
intestinalium in bubus dolorem, visu *tor.*
natantium Anatum levare, easdem *Aelian. H. A.*
majore profectu mulos & equinum. *L. 7. c. 7.*
genus conspectu suo sanare, Colu- *Plin. H. N.*
mellæ & Vegetio placet. *L. 18. c. 25.*

Vsus in cibis notus est. Cato Cen-
sorus ægrotis etiam teste Plutarcho
prescribi iussit; duram, concoctu diffi- *Vsus.*
cilem, nec laudati succi esse, apud *Plutar. in*
Hippocratem, Galenum, & alios le- *Catone.*
gere est. Alij Anserinæ præferunt.
Alexàder Benedictus in peste damna-
vit. Fracastorius lue venerea laboran-
tibus prohibuit. Pectus & cervicem
laudat Martialis, cætera danda co-
quo.

Usus in *Medicina* superius etiam *Gell. Noct.*
attigimus. Mithridates Ponti Rex so- *Atticar. l.*
litus earum sanguinem miscere medi- *17. c. 16.*
camentis quæ digerendis venenis va-
lent; ipse talium medelarum usu ab
intestinalis epularum insidiis cavebat.
Idem, sanguinem à cerebro defluen-
tem infusus † sistit. Adeps per Cly- *Plin. H. N.*
sterem injectus dolorem sedat coli. *L. 10. c. 6.*
cum, & emplastro ad pleuritidem a-
pud Myrepsum immiscetur. Fimum,
Villanovanus utiliter moribus vene-
natis imponi scribit. Chineses adeò
numerosa agmina alunt, ut sæpe xxm.
excedant, his in evellendis noxiis o-
ryzæ herbis utuntur. Quæ Campo-
fulgosus, de Anate cū tredecim pullis,
men-




Anas domestica.
Zäme Endte.



Anas. Endte.




Anas Indica.



Anas Libyca.




Anas Cairina.



Anas.



Anas marina.
Meer Endte.



Anas fera.
Spiegel Endte.



Querquedula.
Klein Endtlein.



Glaucion.




Boscas maior.



Anas fusca fera.



Anas Platyrinchos.



Harle.




Anas Pljrinchos.



Anas muscaria.
Ein Leiner.



Anas fera.
Seevogel.



Penelepe.

menſe Decembri , feſto Nicolai , in Gallia propè urbem Redonenſem , templum tempore Miſſe ingrediente , & aram circumeunte , ac unum pul- lum ibidem relinquēte (nescitur quo is ſe recipiat ,) ſcribit , an fidem me- reantur , penes Lectorem iudicium eſto.

ARTICULUS II.

*De Anate Domestica, Indi-
ca, Lybica, & Cai-
rina.*

ANAS DOMESTICA Græcis *νήτα ἀναγός*, Arato *μαροίδης*, inter- dum alba, aliquando cinerea , sæpè compositi ex utriſque coloris inveni- tur. Inter marem & fœminam hoc eſt discriminis, quòd ille plumas in U-ropygio verſus caput ſurrectas ha- beat. Quod tam acutam & magnam vocem edit, & tam diu caput ſub aqua tenet, aſperæ arteriæ debetur, qua bi- fariam in pulmones devaricatur, veſi- cam quandam duram & concavam, quæ ubi major apparet , dextrorſum vergit, habet. Famis aliquando & pe- ſtis præſagæ domesticæ, manſuetudi- nis oblitæ, Sylvas cum Gallinis, An- ſeribus , & Pavonibus petiſſe di- cuntur.

ANATIS INDICÆ tres descri- ptiones habentur. *Prime* caput quod auctum plumis, in ſummitate criſtam plumeam candidam per totam colli longitudinem, quam cum excande- ſcit, erigit, gerit, ſanguinis inſtar rube- ſcit. Totum *collum*, calloſa & inci- ſuris diſtincta caro eſt. *Roſtrum* totum cæruleum. Collum, qua corpori jun- gitur, circulo plumeo nigro, rara plu- ma alba, maculoſa, per ima anguſtio- re, per ſumma latiore, niteſcit: Extre- mæ alæ atque cæuda cum ſplendore ut in Cantharidibus vileſcunt. Fœ- mina nō ita variegatur, mari alioquin ſimilis. *Alterius* caput albicabat. Ro- ſtrum, crura, cauda, & alarum longiſ- ſimæ pennæ attri coloris erant. Col- lum ſupremum anguſta linea nigra ambiēbat. In *Tertia* nihil ſingulare

apparet, tuberculum rubrum rotun- dum ſi exceperis, quod poſteriori ro- ſtri parti & cruſib. inſidet. Id ipſi cum Anate maritima Rondeletij; cuius ro- ſtrum & crura roſæ ſylveſtris colore rubent, caput non ſine viridibus ma- culis, nigricat; commune eſt.

NB. *De anatibus Indicis vide etiam*

Mantiſſam. Num. 10.

LYBICA ut à Bellonio deſcribitur, media eſt inter Anatem & Anſerem magnitudine. *Roſtrum* habet breve, latum, & in extremo aduncum. In ca- pite inter duo naſi foramina *tubercu- lum* ceraſi inſtar rubidum. Tempora ſine plumis, cute corium rubrum præ ſe ferente. Genitale ſanguinis inſtar rubrum, tam magnum, ut digiti unius craſſitiem, quatuor vel quinque longi- tudinem æquet. Vocem inter ruptam tanquam malè affectos pulmones ha- beret. Quam Aldrovandus deſcribit, roſtrum denticulatum habebat, totò corpore nigreſcens, peſtore duntaxat paulò albicante , Scaliger Indicam vocat; & nullam emittere vocem; o- va, quæ unicoloria, fuſca, rotunda pe- nē ſunt, ſi ad ſolem deſpicias, eandem in ſummo nigredinem, quæ in earum roſtris eſt, habere, adjicit. Si duas no- ſtrates ſingulis maribus deſtinaveris, magnum numerum ovorum pariunt. Sed pulli geniti nullam ſobolem pro- creabunt, ſi Auguſtino Gallò credi- mus.

Anatem CAIRINAM & marem & fœminam deſcripſit Aldrovandus. Mas qui fœmellæ major, habet roſtrū qua capiti conjungitur valdè craſſum & tuberoſum, in hamum tandem acu- rum & curvum deſinens, nigricans fe- rē, ſed propè ſinem rubidum; caput a- trum & cirratum; guttur ſub roſtro punctulis ſub candidis interſtinctum, Corpus totum ferē atrum. Crura bre- via ſed robuſta. Fœminæ roſtrum erat minus tuberoſum, qua capite conne- ctitur, linea partim alba, partim rubra ſatis lata diſtinctum. Macula illa, quæ in maris roſtro rubra, cinerei co-
loris erat, cui nonnihil ru-
bri admixtum, &c.

* *
*

ARTI-

ARTICULUS III.

De Anatibus feris in genere, &
in specie de *Querquedula*.Martyr. de
ut. Oceani
l. i.

A Natum Ferarum multæ sunt differentia. Nam ut de illis taceam, de quibus acturi sumus, sunt in Insula S. Johannis in America albissima, capite rubeo. In Ancyra alæ quæ voce cornuum sonitum imitantur, libertatis ita amantes, ut per totum etiam triennium in corte nutritæ, si occasio detur, erumpant. Cæterum latrostris omnibus corneus quasi in extremitate *unguis* est, quo cibos apprehendunt; *dentium* loco stræ circa rostrum asperiusculæ, *membrana* pedum in extremo ferratæ.

Locus.

Olaus Magnus
H. Sept. l. 19.
c. 6.

Videbis ipsas passim; in septentrionalibus tanta copia, ut ferè cunctas aquas operire videantur: in ijs tamen inprimis, quibus subterraneæ venæ calidam exhalationem subministrât, quas apertas circulari & obliquo natatu servare conantur; si vehementia frigoris vincantur, vastum mare pro statione petunt. Migratorias esse, & ad Xanthum fluvium adversus corvos pugnare, quidam credunt. Hyemis tempore aut in ripis fluviorum aut piscinarum aggeribus, aut paludum frutetis latere, aut sylvarum propinqua, hortorumque præsidia petere, verisimilius esse existimo. Sanè omni alicubi tempore conspiciuntur. Quæ in Tugurino lacu versantur, sæpè ad vicinum fluvium Silum transvolant. Quia minus ibidem à lupis & vulpibus læduntur.

Præfagiū

Si frequentes & conglobatas ferri animadverteris, quanquam cælo fereno, imminenti expectabis pluviam; si alas in continente cōcutiunt, ventum instare existimes.

Præcipuæ ex illis sunt **QUERQUEDULÆ**, quæ *Boscades* & *Phascales* dicuntur, quæque in Minores & Majores dividuntur. **MINORES** quæ *Querquedula* propriè dicuntur, *Anatibus* sunt minores, rostro, pedibus, & cætera similes. Gula ipsis alba atris

notata punctis; venter candidus, alæ in cæsis viridantes; pedes cum membranis nigris cinerei. Vivas ventre depumato in colica malum ad se trahe-
re Abdomini appositas, experientia docuit. Species plures apud Aldrovandum invenies, ex quibus *Laponica* priores quæ ad scapulam sunt pennæ, rosei obsoleti coloris, sed maculis semilunaribus nigris notatæ erant. Sequentes partim albæ partim virides conspiciebantur; omnium longissimæ cæruleo vegetissimo decorabantur colore.

Ad has *ANAS circia*, *Kernell* circa Argentoratum dicta, *Querquedula cristata*, referuntur. *Circia* mergulo paulò major est, corpore fusco, rostro latiusculo. Calculis & seminibus herbarum aquaticarum victitat. *Kernell*, habet Rostrum Indici coloris, caput rufum, punctis albis respersum, verticem nigrum, gulam albam, alas cinereas transversis duabus lineis albis distinctas. Pectus rufum, crura fusca. *Cristata* quam Bellonius *Colymbim* vocat, corpus est rotundum viriditate gemans; occiput Onocrotali instar cristatum, oculi ære polito splendidiore; sub quibus juxta rictum lata utrinque visitur macula. Crura breviora, pedes lati, pectus cum capite & collo nigrum, venter plumbeus.

BOSCADES MAJORES sunt aspectu cinereæ: Mas in collo radiantibus quasi Pavonis pennas colore ex viridi & cæruleo composito habet, torquem circa collum album, & in alis versus ventræ colore splendente sunt, vel *Minores*, quibus caput viride, rostrum subflavum, venter ex albo cinereus & variè maculosus, crura rubentia, Aristophani fortè *πεγιάχορμέναι* dictæ: vel *Majores*, quæ coloribus cum illis magna ex parte conveniunt, & Sterrenten quod rostro fundum fodientes viduum perscrutantur, dicuntur. Amant glandes & avenam. Congeneres ipsis *Anates* à victu *Gramineæ* seu Junceæ, Schmitentem dictæ, rostro & pedibus nigris, corporis colore dilutiore. Quæ Bellonius *Anatem Torquatam* esse credit, & *πεγιάχορμέναι* Aristophanis, mediæ est inter Anserem & Anatem magnitu-

Schvveckfeld in A-
venario Si-
les.Bellon. in
Hist. Avi.

gnitudinis, moribus Anserinis, sed vocem magis obscura, quæ ex ovis à rusticis inventis & Gallinæ subjectis prodijt, dicit; illam Gesnerus Picam marinam esse, pedibus palmatis rubescētibus, & ad posteriora magis positis quàm cæteris palmipedibus; rostro, tenuiore magis latitudine se demittente, quàm longiore processu se extendente, quatuor incisuris rubris à summa, duabus ab ima parte sulcata, in colore pallentis ochræ, esse asserit.

ARTICULUS IV.

De aliis Anatum ferarum speciebus.

PRæter Boscades, sunt & inter Anatum ferarum genera, *Glaucius*, *Anas fusca*, *Muscaria*, *Platyrynchos*, *Fistularis*, *Caudacuta*, *Nigra*, *Herle Tadorne*, *Puffinus* & *Penelope avis*, de iis quorum Aldrovandus lib. xix. cap. 45. mentionem facit, taceo.

Pro GLAUCIO, quem Athenæus ab oculorum colore ita dici, & Anate minorem esse scribit, Morillanem nobis Gallicum Bellonius obtrudit. Cuius *rostrum* in margine ferræ instar incisum est. *Collum* circulus quidam coloris albicantis cingit. *Caput* totum ad mediam colli regionē ferrugineo saturato ornatur. *Linguam* habet adeo carnosam, ut propè radicē gemina videatur. Nullū fel, jecur in duos distinctum lobos, quorum unus ventriculo incumbit, intestinis alter. *Vititat* feminibus herbarum, quæ in ripis nascuntur, astacis tenellis, limacibus, millepedibus aquaticis & alijs. Congenerē ipsam, quæ Gallis un Tiers, dicit, medio inter Morillonem & Anatem marem colore.

FUSCA à colore dicitur. A media magnitudine, quidam MEDIAM dixere. Gesnerus eandem cum Rothalsa, unde Erythrocephali quoque nomen meruit, & veterū Penelope, quod similiter φοινικόλεγχος, & ποικιλόδειρος sit, hoc est collo puniceo & vario, facit. Triplicem ejus descriptionem apud Aldrovandum invenies. Fæminæ ca-

put non rubet, sed maculæ aliquas flavas habet.

MUSCARIARUM (dicuntur ita quod muscas capiant) tria sunt genera. *Unum* quod laminam rostri superiorem habet planè croceam, dentes utrinque ferratos, membranaccos flexiles, eminentes. Colorem plumarum per totum corpus varium. Helvetijs Muggrate. *Alterum* corpore magno, coloris elegantissimi in lacu Podamico circa Constantiam visitur. Murente & Mossente à palustri cœno vocatur. *Tertium* Miscenis Pillente dicitur, rostro longo, molli & cinereo. Musci fuscis suspenso gradu ingrediens insidiatur, & vocem noctu lamentati similem edit.

PLATYRYNCHI seu Lati rostris in plura genera disperguntur. Sunt qui rostrum clypeorum instar convexum & longum nigricans habent. Et quia inter volandum alis suis ita perstrepunt, ut sonus crepitaculorum representetur, *Scheuten* dicuntur. Quibusdam qui *Taschenmaut* Helvetis, inferiorem rostri laminam superiorem ita ut tota intra eam includatur, subire, dentes ab utraq; rostri parte molles, flexiles, rectos, & omnium longissimos esse, adjicit Gesnerus, sunt quibus idem duplo ferè quàm in cæteris satius habetur: idque in mare nigrum, in fœmella modò flavescēs modò maculis varium visitur. Dantur & platyrynchi *pedibus rubris*: & alii *rostris nigro & plano*, quorum descriptiones apud Aldrovandum habentur. Pertinet ad eos, *Clangula* cujus mas secundum oculos, qui pulchri sunt, utrinque maculam albam, caput magnum, & in nigro viridans habet; fœmina & virore & macula destituitur. *Fuligula* à fuligineo totius corporis colore ita dicta, cujus rostrum breviusculum latumq; linea alba, alas propè finem transversim secat. *Cirrhata*, Volente à corpulentia, gallinæ magnitudine, cujus mas apicem in vertice gerit nigris pennarum cirrhis conditum, prope quem pennæ utrinque ex nigro virent.

FISTULARIS, à sono acutiore quem fistulæ modo emittit denominata,

Bellon. apud Aldrov. Ornith. l. 19. c. 38.

Gesner. in Ornithol.

nata, rostrum habet colore isatidis, circa unguē ductus quasi fila nigros, collum nigro rubroq; varium, tergum partim plumbeum, partim rubris nigrisq; pennis temperatum. In Fœmellis nihil tale cernitur.

CAVDA CVTAE rostrum supernè nigrum, à lateribus isatidis dilutè imitatur colorem. In fœmella cum maculis nigris cinereum, in alis penne infimæ transversim albæ; mediæ in nigro gemmantes, viridi, & damasceno, extremæ nonnullæ flavicantes, quæ fœmellæ denegata sunt.

NIGRA à corporis colore ita dicitur. Linea alba per ejus alarum longitudinem excurrit. Rostrum nigro luteo & rubro distinguitur. Pedes rubescunt.

HERLE, ut Galli vocant, rostrum habet rotundum & in extremo recurvum, rubrum, utrinq; striatum, colorem mali aurantij, Linguam ferratam, alas candidas, pedes rubeos. Gesnerus eum inter Mergos relegat.

LA TARDONE corpus totum esset candidum, nisi alæ superius nigrescerent, ubi & linea rubra utrinq; conspicitur. Rostrum habet breve, in superna parte rubicundum, à lateribus utrinq; versus narium foramina macula nigra notatum, extremitate in aliam unguis instar desinens. Crura paulò altiora. Torquem, qui pectus ambit rubrum, cum tota ventriculi regio candicer.

PUFFINUS avis est marina, colore fusca; pennis caret, sed plumis tantum ceu lanugine quadam vestitur. Itaq; subvolare non potest. Si quando ocyus locus mutare instituit, alarum, pedumq; extremitate nixus, aquas celeriter quasi prorepens præterlegit. Alga & cochleis victitat. Sale conditur & tempore quadragesimæ editur in Anglia.

PENELOPEN avem Anati similem, magnitudine columbæ, scholiastes Aristophanis facit. *Jon* φωνόλεγνον, id est, phœnicei coloris collum habentem ponit. Gesnerus illam esse putat, quam Germani *Kottthals*/ Bellonius Canne à la teste rousse vocat. Capite est rubro, gutture & pectore

nigro, reliquo corporis colore plumbeo; rostro, cruribus & pedibus fuscis. Marém descripsit Aldrovandus exactè, quem vide.

CAPUT IV.

*De Fulica, Cotta, & Rallo
Italorum.*

FULICA, quam quidam Phænen, quæ ossifraga est esse credunt; quidam ex veteribus, ut Cicero, Erodion, nonnulli Cephphum Aristotelis; alij nec forè malè *αἰθυσια*, cum à fuligine ita dicatur, putant, quæque Kiranidi Phalaris, Alberto Mergus niger, & pullus aquaticus dicitur, avis est magnitudine Gallinæ; colore per totum corpus nigro, in collo & capite nigrissimo, collo oblongo, syncipite glabrò figura ovali, alba pellicula, figura cristæ gallinacæ respondente, intesto, specie calvitij. Digitis pedum membranæ nigræ latæ, sed divulsæ adhærent, & utrinque aut ab altera saltem parte secantur. Internodia membranarum semicirculos ferè constituunt. Recta pedibus incedit, velociterque currit. Lingua quàm Gallinæ mollior, ungues grandiusculi ac nigri. Alæ ad reliqui corporis convexum incurvatæ. Ventriculo *lien* adhæret, una ex parte gracilis & tenuis, altera verò in extremo crassior, atque soleæ equi instar inflexus, dimidiæ juglandis latitudine. Lobo *hepatis* dextro folliculus fellis auricularis digitij magnitudine annectitur. *Pulmones* costis adhærent. *Intestinum* rectum appendicibus utrinq; singulis palmi longitudine, extremo sursum reflexo, instructum invenies, si illud in superna parte aspexeris. Ova intus formata & lumbis annexa jam inde ab hyemè etiam obtinent. Nullum *sexus* discriminè, ut in cæteris avibus agnoscitur. Sunt tamen aliæ alijs interdum in ventre colore magis spadiceo.

Locus palustribus & stagnantibus. *de Locus & lectatur*, Maro marinas appellavit, *Victus*. Herbis & quovis seminum genere vescitur.

Nidus

De la Cérda super Virgil. Georgic. l. i. Descriptio.

Bellonius apud Aldrov. l. 19. c. 13.

Partus.

Arat. in
Phenom.
Virgil. Ge-
org. l. 1.
Cicero in
Progn.


Nidulatur humi, & ova magnitudine ovorum Gallinaceorum æstate ponit. Cum per serenitatem relictis paludibus in sicco ludunt, vapores ab aquis ad imbriferam nubem erigendam, sursum attolli sagaciter odorantur, & ventos præfagiunt, ut apud Virgilium legimus. Procellas voce testari, Cicero auctor est. Obscurus quidam, dum alas quatunt aquam; dum se submergunt, simulq; alas quatunt, ventum prædicare tradidit.

Genus illud quod *Marcol* Frisiis audit, cadaveribus pascitur. Ova inter arundines parit; quib. ab incolis, uno relicto ablatis, & nido perforato, reversa alia & alia, fraudes nescia ponit, donec effæta exhauriatur.

Quam Parisienses *Diabolum marinum* vocant, colore est tã exquisitè nigro, ut penicillo inductus esse videatur, albam capitis maculam latiorè quàm Fulica habet, crura ad se attrahit.

COTTA Anglorum avis est. Fulica paulò minor, forma & colore similis. Rostrum tuberculo quodã rubeo insignitur, crura rubent, nulla syncipitis conspicitur macula. Urinando ad maris usq; fundum, alga, limo, gramine, parvisq; cochleis nutritur. piscibus abstinet. Negant eam diutius posse volare, quàm pedis cavo hausta, priusquam volet, aqua, retineatur.

RALLUS Italicorum in eo à Fulica differt, quod rostrum habeat nigrum, plus albi in alis & circa oculos coloris, crura subviridia, calvitium nullum, membranas inter digitos non ita dissectas. Mæstris rure non procul Venetiis distante magnis capitur expensis. A famulis, qui venaticorum canum vice cothurnis induti per aquas errant, fustibus exturbantur. Hinc præda Falconum insidiis fiunt.



HISTORIÆ NATVRALIS DE

AVIBUS:

LIBER V

De Avibus Aquaticis, Fissipedibus.

TITULUS I.

De Aquaticis Fissipedibus Carnivoris.

CAPUT I.

De Ciconia.

Descri-
ptio.



Ciconia Græcis *πελαγος*, & *πελαγος*, quibusdam *νηυψ*, & *νηυψα*, avis est apud nos notissima, pennis albis & nigris, cruribus albis, rostro Gruino subrubro & crasso. Tempore

Plinij affirmabatur linguam non habere, habere, illaq; sub rubram & brevissimam notum est. Degebant quoq; olim in Italia, nunc nullas esse opinatur Aldrovandus.

In Fiderate agro, necnidum fecisse apud Pliniū legimus; qui pariter eas-

T 2 dem

Plin. H.N. l. 10. c. 23.
Aldro. Ornith. l. 20. c. 1.
Locus

dem amœnum arbuſto locū in Transpadana Italia non permeare, ſicuti nec octavum citra lapidem ab eo, refert. Sed & in Britannia ignotas eſſe audivimus, creditumque vulgo non niſi in liberis regnis verſari. Migratoriam eſſe avem certum eſt, ſed quonam è loco venirent, aut quo ſe referrent, in compertum antiquis erat. Ex longinquo venire non dubium, eodem quo Grues modo, illas hyemis, has æſtatis advenas. Extractus ex quodam propè Metum in Lotharingia lacu junctarum globus; quæ thermis excalefactæ revixerunt, ſi Campotulgoſo credimus. Sed & ex Lario lacu educas (ſimul roſtra in ano inſerta habebant) & rite eodem reſtitutas modo, Gaudentius Merula author eſt. Bellonius in Ægyptum in Æthiopiam avolare ſcribit. Septembrique & Octobri menſe totam Ægypti planiciem occupare, oculatus teſtis affirmat. (Cum circa Abydum inquit eſſem, viciniſimo quarto die Auguſti, ingentem ciconiarum vim conſpexi, quæ ad tria vel quatuor millia accedere videbantur. Volabāt illæ à Ruſſia & Tartaria, & Hellespontum agmine decuſſato tranſverſum trajiciebant. Et cum ſupra Tenedum inſulam eſſent. Longo per anfractus tractu ſe convertabant, donec in circulum omnes collegerentur. Inde priuſquam longius à faucibus Propontidis pergerent, in minores aliquot turmas ſupra viginti ſe diſtribuebant, & ſe invicem verſus meridiem ſequebantur) Abituræ congregantur in loco certo, comitatæque ſic, ut nulla ſui generis relinquatur, niſi captiva aut ſerva, ceu lege, prædicta die recedunt. Nemo vidit agmen diſcedentiū, cum diſceſſurum appareat: nec venire, ſed veniſſe. (De incolis ubi moraturæ ſunt, intellige) utrumque nocturnis ſit temporibus. Et quamvis ultra citra ve provolent, nunquam tamen adveniſſe uſquam niſi noctu exiſtimantur. Pythomes comen vocant in Aſia patentibus campis, ubi congregatæ inter ſe commurmurant: eam quæ noviffimo advenit lacerant, atque ita abeunt. Notatum poſt Idus Auguſti non temerè viſas ibi.

Capotulgoſo.
Memorab.
L. 1.

Plin. H. N.
L. 10. c. 23.

Vefcuntur ranis, anguib. & piſcibus, *Victus.* bis in ejus ventriculo diſſectō aviculæ oſſa reperit Schwenkfeldius. Bufonem non niſi ſumma fame guſtant. Hinc nocere ijs, omnibus quidem locis neſas ducunt, ſed in Theſſalia vel maximè, ubi ſerpentium immanis copia eſt, quos dum eſcandi gratia inſectantur, regionibus Theſſalibus plurimum mali derrahunt. Capitale itaque occidiſſe, eademque legibus præna quæ in homicidam. *Solin. in Polyhiſt.* *Plin. H. N. L. 10. c. 22.*


Nidulari in agro Varro innuit. In ſummis urbium tectis, ipſis etiam fumariis, certum eſt, nec dubium aridarum aliquando arborum ſummitates ſectari. Primo adventu veteres nidos repetunt, ſalvos à ſordibus repurgant, tempeſtate læſos inſtaurant & conſtabiliunt. In ijs duntaxat Veneri indulgent. *Ova*, triginta non amplius diebus, ſcæminam quatuor Anſerinorum tum magnitudine tum colore ſimiles ponere, eaque quamprimum variatis utrumque plumis fovere Encomiaſtes author eſt. Incubatus ſpatio menſis tempeſtate benignâ abſolvitur, & tam impenſè nidos ſovent, ut incubitus aſſiduitate plumas exuant. Tam flagranti amore ſcetus proſequuntur, ut in incendio Delfenſi, cum ſubtrahere non poſſent, cum iſdem alis conſectis interire, quàm deferere maluerint. *Partus.* *Solin. c. 41.*

Vox earum eſt apud quosdam *glot-terare*. Quia ſonus ille ex duabus roſtrartibus ad inſtar crotali vel crepitaculi, quod ex duplici ærea lamina, vel duobus officiſulis ſe invicem collidentibus inter ſe collisus ſit, Crotaliſtria à P. Syro vocatur. *Vox.*

Nunquam Auſtro flante volant, *Volatus.* dum feruntur, pedibus curſum moderantur, porrectisque in caudam quæ brevior illis contigit pedibus, per æra contendunt. *Dormientes* uni tantum pedi innituntur, & caput humero alteri imponunt.

Cum Cornicibus, Aquilis, Mergis *Affectus* & Vesperilionibus inimicitias gerere & Ingeproditum à quibusdam. Præſagam *nium.* eſſe avem docuere exempla. Preſſa *Aeliæ. H. A.* obſidione ab Attila Aquileja, urbem *Paul. Diacon.* cum pullis deſeruit. Inde augurium ab oppugnante ſumptum eſt, & urbs in po-

Ciconia



Ibis Bellon



Ciconia nigra



*Ardea mi-
nor*



Phaenicopteros




*Ardea
cinerea
alia*



*Ardea
Reiger*



*Ardea cinerea
minor*



*Ardea cinerea
maior*



in potestatem redacta. Cum tempestas imminet, utroque pede innixa, pennas tristior infundit, rostrum in pectus condit, & vultum eo unde tempestas ingruit, obvertit. Ex earum cum carnivoris in Lycia conflictu de proventu judicatur annuo. Si penes has victoria, pecora feliciter succedunt. Si illæ palmam abstulere, frugum fertilitas præfagitur. Quod vulnera origano sanant, & Platoni folijs vespertilionis à nidis arcent; quod rostro cum alvus non dedit, excrementa ejiciunt; quod denique lapidem lychniten, serpentum averruncam nido imponunt, ut apud Philostratum legimus; ingenio debetur. Lapis in mulieris Tarentinæ sinum conjectus, quod ex Aeliano & Oppiano habemus; & recens Zingiberis radix Vesaliensi hospitallata, in gratitudinis exempla ibunt. Ciconiam fœminam adulterij, postquam hospes prohibuisset aquam, compertam, à maritis alijs disceptam; Alcinoën in Cranone Thesaliæ fœminam, quæ thorum Domini absentis polluerat, excæcatam, tanquam castitatis testimonia legimus. Ciconiarum legum apud Aristophanem nomen, inde originem traxit, quod in senectute parentes & alunt, & humeris gestant.

Aeliã. H. A. l. 6. c. 47.

Philostr. t. in vit. Apollon.

Ael. H. A. l. 8. c. 22.

Gesner. in Ornithol.

Aeliã. H. A. l. 8. c. 20.

Vfus.

Edebantur ante Plinij ævum; id Sæpronius Rufus, quem Horatius tangit, instituisse creditur. Nemo jam attingisse velit, seu quod venenatis vescatur, seu quod flavam duram, & mali succi carnem habeat.

Vsum in Medicina si attendas, Asiam si semel anno edatur ab arthritidie præservare nugatur Kiranides. Nec capras, nec oves peste infici quidam scribunt, si ex ventriculo aqua intrito singulis cochleare unum infuderis. Fimum ex aqua haustum nonnullorum fide comitialibus prodesse prodidit Dioscorides, refutavit Galenus, cum adipe suillo in Emplastri formam mixtam inveteratam podagram tollere, apud Ætium & Myrepsum invenies.

Dioscorid. Parab. l. 1. Galen. simp. l. 10. c. 17.

Aetius l. 12 c. 44.

tur in montanis & sylvosis Helvetiæ locis. Forma & magnitudine à Ciconiis propriè dictis non differt, quæ parte alæ junguntur corpori, oblonga cavitas retrorsum extensa cernitur. Intestina sunt involuta. In femore dissecto nervi quatuordecim magnitudine differentes, quorum duo latissimi in genu partem cartilagineam se inferebant utrinque. Vescitur scarabeis & locustis. Nidulatur in abietibus. In cibo ferinum & piscosum præ se fert odorem. Infestatur pediculis.

Gesner. in Ornithol.

CAPUT II.

De Ibide & Phænicoptero.

IBIS in multis cum ciconia convenit, verè *παραγυῖδες ὄρνεις*. In duplici autem sunt apud Ægyptios differentia. Candidæ, quæ ad Pelusium tantum non sunt, cum in tota habeantur Ægypto; & Nigræ, quas Pelusium duntaxat alit, tota Ægyptus abhorret. Capite ista est corvi aquatici, rostro mucronato, incurvo, fornicato, rubente, & qua capiti jungitur, pollicis crassitiem superante. Abdito in pennas quæ sub pectore capite & collo, cordis signaturam exprimit. Simul ac nata est, duas æquæ drachmas ponderat, ut Plutarchus prodidit. Majus pro corporis proportionem cor habere, Gaudentius Merula auctor est. Intestinum. Nonaginta sex cubitorum, ex aliena fide apud Aelianum legimus. Comprimitur id defectione lunæ, donec aucto rursus splendore fulgeat.

Descriptio.

Plin. H. N. l. 10. c. 30. Arist. H. A. l. 9. c. 27.

Merula. l. 3. Memo. rab. c. 50. Aelian. H. A. l. 10. c. 29.

Ægypto est peculiaris, mortem sibi fame exportata consciscit. Nul- lum non Alexandria trivium iis plenum est. Dicuntur tamen & circa Licham in extrema Aphrica, ubi lacus quidam dulcis est conspici. Quam se in Alpibus vidisse referente Plinio. M. Egnatius Calvinus prodidit, Nigram fuisse suspicamur.

Vitus. Cicero. l. 1. de Nat. Duorum.

Vescuntur serpentibus, bruchis, & locustis. Illos volucres ex vastitate Lybiæ vento Aphrico investas interficiunt atque consumunt. Nec hoc intra Ægypti fines tantum. Sagacitate

Ælian. l. 10. c. 29. Ammian. Marcellin.

*Mela in
descript.
orbis.*

*Ioseph. l. 2.
Antiq. c. 10
Arist. l. 3. de
Gener. c. 6.*

enim excitatæ, venturis in proci-
ctum eunt universæ, & priusquam ter-
minos proprios externum malum vâ-
stet, in aëre occurrant catervis pesti-
lentibus. Ibi agmen devorant univer-
sum. Moses in Æthiopas per loca ser-
pentibus infesta iturus, papyraceis in-
clusas secum tulit.

Partus.

Quantum ad *Generationem*, Ægy-
ptij ore coire & parere nugabantur.
Nidificant in palmis metu felium.
Ex ovo Basiliscus nasci putatur, trans-
lato ex venenatis cibus in illud semini-
o. Vita ipsis longissima adeo ut Her-
mopolis sacerdotes immortalem ja-
ctaverint. Pennâ, Crocodilus, scri-
bente Aeliano, & Ovo immobilis red-
ditur; sed omne serpentum genus ad
ejus cōtactum rigere, Philes tradidit.
More lautarum mulierum tardo &
molli *gradu* ingreditur; cubile petitu-
ra se purgat. Rostri ad uncitatem per eâ
partem se prodiit (falsugine autem uti-
tur) qua reddi ciborum onera maxi-
mè salubre est.

*Plin. H. N.
l. 8. c. 27.*

PHÆNICOPTERUM qui à co-
lore ita dicitur, Lingulacæ seu Glot-
tidæ Aristotelis esse credit Bellonius,
si Scaligeri descriptionem sequimur.
Rostrum neque rectum planè, sed ne-
que aduncum habet. Scythici arcus
potius partem imitatur. Cinereum
colorem nobilitant alarum puniceæ
pennæ; à quibus & nomen. Earum
quoque non nihil ad caudam, quam
hujus generis longi cruris levibus bre-
vissimam habet, ac veluti præcisam.
Subrostri initium ad colli commissu-
ram sinus turgidus est qualis in Ar-
deola. Crura pedesq; alis habet con-
colores, sed adeo breves, ut cum in
homine Galenus agnoverit longissi-
mos, huic omnium quæ nota sunt no-
bis animalium, brevissimos attribue-
re potuerit. Magnitudo ei Ardeæ, Flâ-
mant nomen in Provincia. Habet
& alterius iconem Aldrovandus, qui
ex cinereo phæniceo & albo mistis co-
loribus spectabatur. Superior mandibula,
in medio notabili extuberantia
in signis, inferiore longior erat, & in ac-
utissimam aciem definebat.

Locus.

De loco nihil ferè certi. Nil avem
Heliod. l. 6. disertissimè facit Heliodorus, ex Flan-

dria hyeme ad Narbonensis Galliæ
provinciam volare scribit Gesnerus;
in mediis stagnis marinis degere; pi-
scibus & cochleis vesci, reliquit Ron-
deletius.

Apitium linguam Phœnicopteri *vsus*.
præcipui esse saporis pronunciasse,
Plinius auctor est. Heliogabalum ve-
rò palatinis suis ingentes dapes extis
& cerebellis illorum refertas exhi-
buisse, tradidit Lampridius.

*Lamprid.
in Heliogab.*

C A P. III.

De Ardeis in genere.

Quam Latini Ardeam seu ab ar-
dendo, quod simus ejus exurat,
seu quasi arduam propter arduos vo-
latus vocant, illam Græci *ἐρωδιον*, seu
quod *ἐξ ἰσπῶς*, id est sanguinem in coi-
tu exudet; seu quasi *ἐρωτιδιον* avem A-
mori & Veneri propriam, dixere.

Genera ipsarum tria Aristoteles & Genera.
Plinius faciunt, *Leucum*, *Pellum*, & *A-* *Arist. H. A.*
steriam; Scaliger album, nigrum & sub- *l. 9. c. 18.*
fulvum, quod Pigrum Vasconia vo- *l. 10. c. 60.*
cat. Aldrovandus innumera observa- *Scalig. Ex-*
vit. Corpus ipsis leve, exile, macilen- *ercit. 233.*
tum. Collum longum. Rostrum lon-
gum, crassiusculum, robustum, intus
cavum, in extremo acutum. Digni-
pedum terni longi, membranis modi-
cè juncti. Quartus retrò pro calce si-
militer longus est.

Degunt numerosæ circa paludes & *Locus*,
stagna in Bononiensi, Ferrariensi, Mâ-
tuano, & Ravennate agro; reperiun-
tur & in Anglia, quod ibi capitale sit
eas occidere. In Gallia Ardearia
instituta habentur. Pulli volandi cō-
potes ultro citroque commeant, de-
inde domicilia repetunt. In Insulis
novi orbis quæ Ardearum dicuntur,
tantam ovorum Hispani invenerunt
copiam, ut multos ijs currus oneraret.
Ab Agricola inter eas aves numeran-
tur, quæ calidiora loca quærent. Con-
fecta hyeme ad solita revertuntur.

Vescuntur piscibus & ostreis. Illos *victus*.
dum capiunt, solis radios ita excipiunt,
ut visa ipsorum umbra refugiant. Hos
cum testis devorant, quas à colore in-
terno apertas, revomunt. Anguillas
quoq;

quoque integras deglutiunt. Ad pedem tanquam ad illicium concurrere pisces creduntur. Si oleo ex ipsis per descensum destillato inungantur manus, pisces ita advolabunt, ut sponte capi possint. Piscatores Hirschbergenses illicium ex farina hordei, carnis cācrorum ex chelis & caudis, plantæ lini expresso oleo parte una, vitellis ovorum tribus, pinguedine Ardeæ & olei laurini ana unc. 111, cum perolei & Camphoræ ana drachmis duabus conficiunt. Mirificè pisces illiciuntur.

Partus.

In coitu angī, mares etiam cū vociferatu sanguinem ex oculis profunderē, nec minus ægrè parere gravidas, Aristoteles, sed falsò prodidit. Vidit sæpè coeūntes Albertus, cruribus super dorsum fœminæ flexis, ita ut pedes maris ad caput fœminæ sint, & genua versus excrementi sedem super dorsum. Motu alarum se sustinent & semen infundunt. *Nidificant* in sylvis, locis paludosis, alnis & salicibus confitis ac ferè inaccessis gregatim. Sic & ab aucupibus, & à rapacibus immunes se putant. Cancros ceu fascinationis amuletum nidis suis imponunt, si Aeliano credimus. Carvo adversus infestinantia nidos suos animantia se munire, prodidere nonnulli.

Volatus.

Volant extensis retrò pedibus. Ideo illis Uropygium inutile; collo contracto; tam altè, ut supra nubes transcendunt, maximè cum jam futuræ imminēt pluvix.

Affectus

Inimicitias cum Alauda, ovorum suorum hoste, vulpibus, cochleis & Rapacibus exercent. Sæpè cochleæ è nativis egressæ testis, in magna securitate pascuntur; Ardeæ in vacuas involant. A Falcone depressa, rostro subalis condito ac sursum elato, irruentem excipit. Sæpè ambæ elisis interaneis humi affliguntur enectæ. Accipitrem excrementis suis, quæ penas ejus & pedes faciunt, & exurunt, repellunt. Fertur Falcones, quod Crescentius prodidit, si sanguinem Ardeæ gustaverint, omne desiderium capiendi Grues amittere; si carnem absq; sanguine, videri non teneri.

Crescent.

de Agricul.

l. 10. c. 15.

De *Presagiis* hoc sufficiat. Ventum vel pluvias innuere, vel cum caput pettori imponit; vel cum notas paludes deferit, & supra nubes attollitur; vel cum terra relicta multo cum clāgore † adfestinat; vel cum obstrepero clangore à mari ad terram avolat; vel cum in mediis arenis tristis residet.

Mensis in Gallia expetuntur. Sed cum caro illarum pisculentum quidam redoleat, & fibrosa sit, salubris esse non potest. Quæ de rostri seu in pelle asinina frōti alligati ad somnum conciliandum seu cum cancri felle in eadem ad vigilantis collum suspensi, ad vigilias inducendas Plinius vel Kiranides prodire, inter fabulosa reputo.

CAPUT IV.

De Ardeis in specie.

ARTICVLVS I.

De Ardea Cinerea.

ARDEÆ cinereæ tria sunt genera, *Major*, nempè, *Minor*, & *Con-*
gener.

ARDEA CINEREA MAJOR quæ Aristoteli Pella, seu pulla & fusca, cui superius dicta omnia ferè congruunt, Rostrum habet longum, propè frontem crassum, quod ita tenue pedetentim evadit, ut tandem velut in acum aliquam magnam desinat. Capiti cinereus, cirrhus ex tenerioribus pennis infidet, qui à syncipite incipiens sursum supra oculos per verticem erigitur. Digitus posticus longiusculus est, & ferè anticis longitudine æqualis.

Nidulantur in excelsis arborib. non procul à fluminibus, tam apud Anglos quàm Gallos. Quia piscibus pullos nutriunt, & multi, cum ori inferuntur, in terram decidunt, idem cum pluvia à multis decidisse putantur. Franciscus I. Rex Gallorum tam cicures redidit, ut à pastu redeuntes ad Ardearia sese reciperent.

MINOR prout à Bellonio describitur, rostrum habet nigrum, concavum,

vum, Lineam in fronte ab uno oculo ad alterum candidam. In capite & dorso pennas coloratas. Alas cinereas inter pennas verticis nigras exoriuntur candidę, exiles, aspectu jucundissimę. Nidificat in rupibus.

CONGENER, Ardea, rostrum habet pollicis crassitudine, digiti minimi juxta nares latitudine, intus canaliculatum, infernè corneum & roseum. Plumas capitis, colli, dorsi, & superiorum alarum ex cinereo fuscescentes, extremas omnes macula rufâ notatas. Ventrem ferè ex cinereo album. Crura subviridia, & pedes in digitos fillos, quos tamen divaricationis initio breviuscula membra cōjungit. Ad hanc refer, quam Gesnerus describit, cui rostrum est subflavi coloris, marginibus acutis, & parte anteriore leviter dentium loco exasperatis, ferratisve. Caput & collum candida. Crista capitis è plumis nigris retrorsum tendit. Dorsum & alas cinereas. Unguem medij digiti ab altera parte denticulatum.

ARTICULUS II.

De Ardea Alba.

Descriptio.

Plin. H. N. l. 10. c. 40.
Cic. l. 2. de Nat. Deor.

ARdea alba, Græcis λευκορῆς, Ciceroni Platelea, Plinio Platea, Alberto Cochlearia dicitur. Corpus habet instar cygni candidum. Rostrum nigrum pauculis notis ferrugineis superiori parte respersum, substantiæ coriaceæ duræ, cochlear referens. In quibusdam ad carneum colorem proximè accedit. Fœminæ superius maculis rubeis conspergitur. In maris verò rostri medio, linea quædam qualis etiam in circumferentia conspicitur, à fronte ad rostri apicem usque conspicua est; propè oculos macula cærulea, quæ in fœmina lutea est, visitur. Quædam maculis in collo & dorso pulcherrimis, colore coccineo consperguntur. Interiora si spectes in diffecta apud Aldrovandum fœmella, Lien erat exiguus, nigricās, rotundus, dextra parte, propè folliculum bilis non procul à ventriculo. Intestina sinuosa, uniformia, novem spithamas

longa. Cornullo pericardio vestitum. Ventriculus lævis, intus & simplex. In gluviei loco pars ventriculi superiori orificio imminens, ampla capacitas. Aspera arteria cygneæ valdè similis, licet contrario modo sita. Nam quemadmodum in Cygno ad sternum ascendens post descendit; ita hæc ad pulmones recta percurrens, suos flexus agit invicem oppolitos. Ossa tibiæ aperta, medulla rubrâ erant plena. Reperitur in Gallia, Anglia, Bohemia, nō tantum marinis locis, sed & palustribus. In Holandia non longè à Lugduno infinitos earum nidos vidimus.

Vescuntur piscibus, ranis & serpenti-
bus, ut quidam produnt. Nec vel herbas aquaticas virides, & ramenta radicum geniculata arundinum, vel intestina Gallinarum aspernantur. Facile cœunt, in arboribus nidulantur, & pariunt, ad quatuor fœtus alunt, qui à ferini saporis cultoribus commendantur. Gesnerus sibi gustanti Anseri non dissimilem visam ait; & apud Anglos in deliciis habetur.

Huc plurimæ aliæ Ardeæ referuntur.

I. GARLETTA Italarum, ut Gesnerus vocat, avis cum Ardea per omnia, colore excepto, congruens. Quam Gesnerus Ferrariæ vidit, rostrum habebat longum acutum; in cristâ capitis dorsum versus pennæ oblongæ ad duos cum dimidio dodrantes, circiter sex nascebantur, quæ aliquando magno vendebantur precio. Pedes nigricabāt: inferius tamen subito in medio cruris, niger color desinebat, & viridis è glauculo suberat ad extremos usque ungues. Minimus pedis digitus binis articulis constabat; proximus ab eo ternis, medius quaternis, ultimus quinis. Cum hac eandem illam Aldrovandus facit, quæ habebat rostrum supra nigrum, infra cæruleum, oblongum; caudam brevem, rariores aliquot in dorso illasque oblongas pennas, quibus pileos & galeas procures exornant, tres in capite pinas, breviores & coloris albi, quæ cristam efficiebant.

II. EGRETTA Gallorum, quæ & Hamatopus, Phœnicopus, & Cirris Vir-

Victus.

Arist. H. A. l. 9. c. 18.

Gesner. in Ornithol.


Aldro. Ornith. l. 2. c. 14.



Ardea stellaris maior.



Ardea stellaris altera.



Ardea nigra.

Schwarzer Reiher.




Falcinellus. Sichler.

Ardea alba.
Weisser Reiher.

Falcinellus Auis falcata.

Auis pugnax.

Auis pugnax.



Arquata seu Numerus.



Virgilij, ut Scaligeri pater & filius adstruunt, dicitur. Omnibus ferè Ardeis minor est, tota ferè ex croceo, ad colorem castaneæ vergens, pronè intensius, supinè & super alis remissius. *Collo* brevi; *rostro* robusto, longo, acuto, bicolore; qua caput tangit viridi, vel ex viridi ad cæruleum inclinante; *cruribus* & pedibus, rubri saturati coloris; *cauda* tam exigua, ut ea pro fus carere videatur.

III. SQVAIOTTA Itolorum. *Cauda* brevi, *pedibus* viridibus, *rostro* luteo in extremo nigricante. Apex *capitis* triginta plumis constat, quarum mediæ albæ sunt, extremæ nigræ, in tergore pinnæ elegantes coloris rubicundi in suis radicibus albæ.

Congener ipsi est & ista *rostro* maximè arcuato, colore prorsus leucophæo. Avis est aspectu non inuenta. Pronè ad collum & pectus, quod nigris maculis, ut in Ardea deorsum descendentibus conspersum cernitur, albicat. Cetera tota est leucophæi coloris, pronè remissioris, supinè intensioris. *Femora* in ea, contra ac in reliquis pennis vestiuntur.

Ex Ardeis quoq; albis sunt, tum ea, quæ *Garzetta bianca* dicitur, *rostro* longo gracili, acutissimo, digitis postico omnium minimo, anteriorum medio longissimo, inter oculos & rostrum maculata; tum ea quæ vertice est croceo, pedibus pro proportionē corporis longissimis, fuscis, albicantibus annulis circumdatis. Vngue medi digiti cæteris longiore, serrato.

ARTICULUS III.

De Ardea Asteria sive stellari.

ARDEA stellaris triplex genus est, *Minus*, *Majus* & *cristatum*. MINUS οὐκὸς Aristoteli, Taurus, Plinio, Botaurus, Butorius & Buttora alijs, dicitur, & quibusdam Ornocrotalus esse putatur. *Collo* est longo & mirè plumoso. *Capite* nigro, corpore reliquo fusco & pallido maculis nigris densissimè asperso. *Pedes* habet lon-

gissimos & inter extremos ungues medi digiti pedis unius & calcis ejusdem, spithamæ longitudo intercedit; *ungues* longissimos; & ille qui calcis vicem in avibus gerit longitudine sesquiunciam superat. Medius digitus utriusque pedis qui cæteris longior dentatus & ferratus est. *Cauda* illi brevissima; *stomachus*, quo ingluviæ loco utitur, capacissimus, canino similis. *Arteria aspera* in eo tota continua est, larynx nulla, nec quod huic analogia quadam respondeat. Damnum hoc compensare voluisse Natura videtur, *canalium duorum* hinc inde in pulmones utrosque abeuntium structura. Ita enim fabricati sunt, ut annuli cartilaginei minimè totum absolvant circulum, sed exteriori duntaxat parte medium; interiori, ubi alijs avibus hi circuli fissura tantummodo in longum dissecantur, membrana quædam tenuissima, alteram canalis devaricati exactè medietatem absolvens, plana & æquabilis obtenditur; quin & hemicycli latus exterius componentes rari admodum, interjectis subtilissimis membranis sive tunicis, ad faciliorem & majorem distentionem facti sunt, quo nempe largissimus, & hoc facili tumescere meatu conceptus aër, *rostro* in aquam inserto aliquandiu retentus, tandem per apertum & extractum, qua data porta, maximo impetu erumperet. Prolobo caret, at ejus loco amplissimum œsophagum habet.

Vicitat ranis & piscibus, inprimis *Victus*. anguillis.

Nidum ex arundinibus intertextum *Partus*. cum *ovis* duodecim in lacu quodam se vidisse, ipsamque avem colore ita ad arundinem accedere, ut inter arundines sedens vix deprehendatur, reliquit Gesnerus. At eundem ex surculis in celsarum arborum ramis struere, & ita aut quatuor ova excludere, reliquit Bellonius.

De *Voce* diximus, cui similes illi *fo-Vox.* ni dicuntur, quos *βραυίς* Aristoteles *Aristot. in* appellavit. Dicitur in *Ægypto* man- *Problem.* fuescere, & adeò præclare humanam *f. x.* vocem intelligere, ut si quis eam fer-
vum appellaverit, vel pigru(n)gantur
V olim

Descri-
ptio.

olim è seruo in avem transiisse) indigneretur. Non facilè hominem refugit; eo proximo, aut arundinibus se abdit, aut aquæ immergitur.

Volatus. Non citius *evolat*, quàm prius salierit. Vbi pisces frequentes novit, adeò quieta cõsistit, ut planè videatur mortua: & ne colli longitudine se prodat, breve id incurvando facit. Capta stat immobilis, & venatorem apprehensurum incautum vulnerat.

MAJOR ex Pella & Stellari prognata esse creditur. Illam enim capite, pectoris maculis, alarum colore, ipsa denique magnitudine refert. Reliquarum partium colore Stellarem minorem, maculas si excipias, quæ in ea non sunt: imò pedibus adeò eadem exprimit, ut simul positas vix peritissimus etiam auceps discernat. Apicem quoque in vertice habet, ex quo duæ longiusculæ pennæ exorientes, totum caput velut galeam, colore nigro exornant. Geisnerus *Elaphin* Oppiani esse conjicit, quæ pennas in dorso varias & maculosas hinnulorum instar habet, & linguam longissimam, quâ in aquam protensâ, sensim ad fauces, pisces ad conspectum adnatantes solet attrahere. Hanc Aldrovandus & CRISTATAM seu Cirrhatam esse opinatur.

Congener est hisce, quam idem *Ardeam Nigram* vocat, colore per totum, collo excepto, quod albo torque circumdatur, & *rostro* quod luteum est, nigricante, *collo* longo, longis *cruribus*, digitis pedum longissimis, unguibus acutis, & *cauda* brevi.

CAPUT V.

De quibusdam Avibus ad Ardeas relatis.

AD Ardeas refero Falcinellum siue Falcatam, & Pugnaces, quas Belgæ Kemperkens vocant. FALCINELLVS avis est magnitudine, & tota corporis specie Ardeam referens, eleganti colore, viridi ferè, alicubi puniceo admixto, capite & collo fusco. Superior pars *colli* antèrius albicat, maculis nigris intercurrentibus. *Ro-*

strum ei oblongum tenue & antèrius falcatum. *Crura* oblonga, pedes fissi. Nulla magis ad ibidem accedit. PVGNACES quotannis immenso numero, ex Septentrione in Belgium, verno tempore sub Majum advolant, plures mares quam fœminæ. Hinc inter mares tanta contentio, ut sese mutuo occidant, donec cum fœminis numero pares evaserint. Exclusis educatisque fœtibus, una cum his unde venerant, revolant.

Octo ipsorum genera, seu formas potius descripsit, & depingi curavit Aldrovandus.

Prima Perdici instar toto corpore maculis respergitur. Caput Galeritæ velut apice insignè est. Rostrum exile, in extremo nonnihil recurvum. Lingua longa, acuta, subatra. Caput, cervix, dorsum, alæ, venter, & femora ex luteo ad castaneæ ferè colorem tendunt, & maculis, quæ in capite adeò exiguæ sunt, ut exigua punctula potius videantur, resperguntur. *Altera* cristam quoque in vertice gerit. Ventre nigricat, candicat pectore. Mentum macula nigricans ceu barba quædam exornat, in fronte albicat; in occipite, & in reliquis partibus ex albo ad fuscum vergit.

Tertia tota ferè est ruffa, nigris maculis lunam æmulantibus undiq; excepta cervice inspersa, apice caret. Femora & infernum Vropygium colore sunt bætico. Alarum pennæ majores nigræ, in fine, & ad latera ferè crocæ.

Quarta colore ferè cum ista convenit, nisi quod venter sit fuscus, podex albicans; alas subalbicantes maculæ multæ, magnæ, transversales, tortuosæ transcurrunt. Caput nigrum magnæ pennæ velut galeam eleganter exornant, quas proculdubio dimicatura erigit.


Quinta ejusdem ferè est coloris, sed pennas eas, quas erigit dimicatura majores, candidas, & in extremitatibus suis nigras habet.

Sexta pennæ illæ sunt candidæ, color plurimum diversus. Toro enim corpore fusca est exceptis femoribus. & cauda, quæ sunt colore bætico. Ante albas

Auis pugnax.




Auis pugnax.



Auis pugnax.




Auis pugnax.




Toramus.

meerlun.



Hæmantopus

fæmina.



Ardea.

Reiger.



Porphyrio.



Hæmantopus mas.



Alcedo Vocalis.



albas illas in collo surrectas, alias habet in vertice quæ minores sunt, & nigrae. Caput ex cinereo flavescit.

Septima pennis omnibus variat, viridibus, albis, rubris, amethysticis, luteis, & quod observatu dignum est, nulla earum alterius colore permiscetur.

Octavam auritam Natura fecit. Rostrum est gracile & oblongo, à capite per collum pennæ undiquaque pendent, magnitudine æquales, sed in quibus varios cernere est colores, qui velut varios torques formant, modo ferrugineos, modo rubros, modo albos. Collum habet longum, valdè gracile, tenue, ad latera candicans, cætera lutescens, lineolis longis undiquaque conspersum. Caput ad latera maculam miniaceam magnam habet, in qua oculi siti sunt. Aures asininis non dissimiles, crura duplo quàm præcedentibus breviora. Digitum posticum admodum brevem.

CAP. VI.

De Porphyrione, & Horione.

Dipnol. 9. Descriptio. **P**orphyrion, à colore ita dicta, quam Callimachus apud Athenæum à Porphyride diversam facit, quæque in agro Patavino Telamon vocatur, avis est secundum Athenæum Galli magnitudine, colore cæruleo, rostrum ad caput vehementius obstricto, phœniceo, longis cruribus, filis pedibus, in quibus quinque digitos habet, & maximum illum, qui medius est. Oppianus ei cristam in capite qualem sagittarij Persæ gestant, tribuit. Isidorus pedem unum latum ad natandum, alterum fissum ad ambulandum addit. Apud Aldrovandum duplex ejus exhibetur Jcon. Prior habet rostrum crassum, acutum, purpureum, à fronte ad verticem ferè usque macula ejusdem coloris extenditur. Pars capitis quæ hujusmodi maculæ subjacet, & collum primum virescunt. Ex remigibus alarum pennis, quædam in extremo albicant, quædam sunt fusca. Reliquum totum corpus, cæruleo vegeto

colore insignitur. Cauda ferè caret. Digitis tantum quatuor ex purpureo subalbescens insitit. Alter rostro, cruribus, pedibus, & oculis descripto est similis, nisi quod unguis habet fuscus, & macula in fronte purpurea ornatur; & quod in illius capite & collo viride erat, in hac cæruleum apparet. Cæruleæ pariter sunt alæ. Reliquum caput, cervix, dorsum, pectus, vertex, & femora nigricabant. Laudatissimi sunt in Comagene. Nobiliorem verò Baleares insulam mittunt. Fert eas & ultima Syria, ut Diodorus prodidit. Athenæus avem Lybicam, Dijs ejus regionis sacram indigitat.

Vescitur piscibus, & in occulto quidem, ne à quo quam videatur. Non prius autem cibum capit, quam se lavaverit; nec prius se vel in pulverem vel in lavationem dat, quam in ambulationem veniens certa spacia confecerit. Sola hæc mesu bibit, ex proprio genere omnem cibum aqua subinde tingens, deinde pede ad rostrum veluti manu afferens. Polemon apud Athenæum de cibo quem apprehendit, paucas buccellas decerpere, scribit, si τρυγέας οὕτω ita sumendum est. Alvi excrementum, ut & reliquæ aves longi augustique colli, humidius, quam cæteræ solent, rejicere, Aristoteles auctor est.

Ad volatum dirigendum loco Uropygij, quod parum latum habet, pedes protendit; & quia spectaculo saltationis adeò delectatur, ut & ipsa ad saltandum membra componat, haud difficulter eo modo capitur, si Oppiano credimus.

Incredibilia ferè de ejus castitate Authores. Nunquam in conspectu hominum conjugii misceri, & ne virum quidem uxori concumbentem videri posse, retulit Oppianus. Tantum sensum obtinere stupri, ut si id deprehenderit, vitam seu laqueo seu inedia finiat, apud Ælianum, Athenæum, & Tzetzem legimus. Quædam cum Gallo tantam societatem contraxerat, ut cum iste occideretur, cōviatore privata, inedia sibi mortem conscisceret.

Nunquam cibi gratia apposita esse

videtur. Magnificis ædibus, ut Aelianus habet, pro ludicra est delectatione.

Ælii. H. A. Cognata est ipsi HORION, avis *l. 17. c. 22.* amatorio affectu flagrans, magnitudine Herodij, cruribus rubris, oculis ceruleis, sic à Musica instructa, ut nature munere suavissimè canat.

CAPUT VII.

*De Helorio, Limosa Venetorum,
Barge Gallorum, & Hæmatopode Bellonii.*

Athen. l. 9. **H**ELORIUS Creci, de quo postea, similis esse traditur. Clearchus eum apud Athenæum cum Trochilo & Carulo inter *παραυδῆσαι*, seu aves, quæ cælo sereno in littore pasci solent, meminit.

LIMOSA Venetorum, quæ ad lacum Verbanū Giraldel, circa Neapolim Leverina, Germanis, *ein Meerzün* dicitur, Arquatæ majori, de qua in sequentibus, per dorsum est similis, maculis varia, tota parte prona, capite & collo præfertim.

BARGE Gallorum, quam Ægoccephalum Bellonius facit, minor est Helorio, colore verò non absimilis, rostro brevior, recto. *Liene* omninò caret. *Fel* jecori simul & ventri adhærere conspectum est, quod de Ægoccephalo Aristoteles scripsit. *Victum* *Arist. H. A.* *l. 2. c. 15.* in saluginosis paludibus frequenter, rarius in remotis à mari, ubiq; noctu, quæritat. *Vocem* hircorum & caprarum edit. Hominis accessum non fert. Et apud Gallos in delicijs habetur.

Bellon. in obs. l. 1. c. 11. **H**ÆMATOPUS Bellonij, rara est in Gallicis littoribus avis. *Corpore* Ardeolæ, *alis* Lari, *capite*, collo, & cauda extrema nigris. Interiore alarum parte & ventre albis. *Gula* magna admodum ampla & robusta. Binos habet *digitos* simul cohærentes; interior verò ab alijs sejunctus est. *Calcar* in pedis calce, ut reliquæ aquaticæ aves, non habet. *Pedes* sunt molles & delicatuli. *Digiti* breves, ungulæ ut in Tardis fornicatæ.

CAP. VIII.

De Alcyone.

HAlcyon & Alcedo *παρά το ἐν ἁλί κύνει* sic dicta, Avis Possideonis nonnullis, Ceycis quibusdam, modernis Græcis *φασιδυνίς*, mas, *κύνες*, *κυνόλας*, & *κείρις* dicitur. Paucissimis, inter mediterraneos imprimis, nota est. Omnium rarissimum est, inquit Aristoteles, vidisse Alcyonem, & ferè circa Vergiliarum occasum, brumamq; apparet, & ubi primum per portum non plus quàm navem circumvolant, statim abit, & nusquam præterea visitur. Duo hujus Avis genera, *Mutum*, & *Vocale*, ex Aristotele quidam faciunt, sed falsò, *χελιδόνες* enim apud eum sunt intelligendæ. Turnerus & illam inter Alcyones reposuit, quæ Sturno paulò minor, corpus totum nigrum habet, ventrem album, caudam breviusculam, rostrum alcedone paulò brevius; quæque ante volatum, Alcedonis more nutat, in volatu gemit. *Alcatraces* quoque, quæ in Peruvia marinis lupis, carabis, piscibusq; insidiantur; & quia cadaveribus delectantur, adeò sunt lethales, ut ad earum usum necessitate redacti, non secus quàm aconito toxicove victi intereant, inter earundem referuntur genera.

Formam si attendas, non multò amplior est Passere, colore cæruleo & luteo, & subpurpureo mixto insignis. *Forma.* *Arist. H. A.* *l. 9. c. 14.* Tale corpus totum & alæ. Tum *collis* apud Scaliger. *lig. c. 21.* *Rostrum* subluteum, longum, tenue. Mari adeò delectatur, ut pectus aquis aspergat, cauda in terra sicca imposita: non spernit tamen & aquas dulces.

Victitat piscibus, quos ex alto se in *Victus.* mare recta immittens capit.

Quantum ad Generationem fenes in *Partus.* coitu extingui creduntur. Aliæ, ut apud Plinium legimus, foetificant bru- *Plin. H. N.* *l. 10. c. 32.* ma, pariunt ova quinque, qui dies Alcyonides vocantur, placido mari per *Lycophron. in Cassandra.* eos & navigabili, Siculo maximè (hinc Siculi maris cives Scaliger vocavit) In reliquis partibus est quidem *Plin. l. c.* *Arist. H. A.* *l. 5. c. 8.* mitius pelagus, Siculum utique tractabile. Faciunt autem septem ante bru-

Frijnga.

Frijnga alia.

Gallinula serica
Samethunlein.

Iunco Bellonij.

Merula aquatica.
Wasscrarnfel.

Rasticola. Schnepf.

Cinchli.

Cinclus.


Cinclus Gallinago
minima Bellonij.

Vanellus seu Capella
Kyuitz.

Pluvialis cinerea.

Pluvialis maior.

Charadrios.




Grus Krauch
Plu-mas



Grus Balearica



Grus Japonensis




Grus Crispa



Grus Balearica
fe-mina



Anas fete Species



brumam diebus; totidemque postea sternitur mare Halcyonum fœturæ, unde nomen hi dies traxere. Nec tamen de tempore omnes assentiuntur. Columella enim in octavum Calēdas Martij, quibus in Atlantico mari summa notatur tranquillitas eos conjicit. Sed & in numero dierum dissentitur. Quinque statuit Simonides & Aristoteles; septem Samius Demagoras, novem Philochorus, quatuordecim alij. De maris tum temporis tranquillitate, & ventorum quiete molliore cœlo, apud Theocritum, Ovidium, Plautum, Plutarchum, Ælium, & alios passim invenies. *Nidi* locum Ambrosius arenam; alij littus, quidam undas ipsas, hinc Statio, domus fluctivaga; Silio Italico nidus natans dicitur, ponunt. Saxo cuidam proximè aquam, ita ut aquæ *ἰσχυρῶς* videatur, agglutinari, credibilis est. Rostro autem suo nec alio nidum fingit Halcedo, imò navis instar fabricat, opus everti mergique fluctibus nescium. Componit devincitque conferens invicem acus pisciculi spinas, ac rectis alijs ceu stamini transversas alias veluti subtegmen implicat; mox confertum recurvat, & in orbem reducit; sic cooprat denique, ut opus navigij specie turbinatum, ac qualo propemodum piscatorio simile evadat. Perfectum littori, quo fluctus extremi pertingūt, applicat. Hic unda molliter feriens, nondum firma satis hiantiaque, procellarum verberare deprehensa, sarcire docet. Solidè verò & jam cohærentia constringit, figitq; adeò, ut nec saxo, nec ferro dissolvi diffringive facile queant. Magna comprimis admiratione ostiolum dignum est, sic modificatum figuratumq; ut hanc unam subeuntem recipiat, cœcum cæteris & abditum, & aliud prorsus nihil admittens, ne undarum quidem quicquam.

Mores. Plutar. l. c. Mores ejus exinde metiare, quod maritum adeò diligit, ut non uno aliquo statò tempore, sed per totum annum consuetudine ejus utatur; senem & ad sectandum tardum, gestat & nutrit, nunquam relinquēs solum. Cum ad tepidum solem pennas in littore

expendunt, pluviam denotare dicuntur. Virgilius hoc inter cætera serenitatis signa numerat. Virgil. Georg. l. 5.

C A P U T IX.

De Ispida, & Rousserolle Gallorum.

Ispida, quam nonnulli Alcyonem veterum vel simpliciter vel fluviale esse putant, Genuæ Martinus piscator, à nonnullis alijs Italis Avis Paradysi, sed & Piscator Regis dicitur. *Rostrum* ei est nigrum, rectum, in summo acutum, tres digitos longum. *Caput* pronum cum cervice viridis coloris transversis lineis ex albo cæruleis distinctum. Virent & alæ, sed interior pars plumarum ad purpureum ferè violaceo dilutum colorem tēdit, asperguntur lucidis aliquot punctis. Per medium dorsum à principio usq; ad finem caudæ, plumæ sunt cærulei coloris diluti, & ad album inclinantis adeò splendidæ, ut oculos etiam visu immorantes offendant. *Pedes* breves, rubicundi, in quibus duo longiores digiti ad mediam usque partem connexi, postea funduntur. *Lingua* perbrevis est latiuscula ac subrubens. *Oesophagus* valdè oblongus. *Ventriculus* in imo corpore juxta anum. *Adeps* ruffa.

Est & aliud Ispidæ genus, quod ex India adfertur. Regulum magnitudine vix superans. Rostro oblongo, tenui, nigro, reliquo corpore ad caudam cæruleo viridi & nigro. Cauda pro corporis proportionem longiuscula tota ferè nigra. Pedum constitutione cum superiore eadem. Solitaria est, & in agro Bononienfi, Helvetia, & alibi media hyeme circa ripas glacie concretas reperitur.

In arena vel scopulo aliquo juxta *Locus & Partus.* aquam *nidificat*. Nidum forma rotundum, eminente in angulum foramine exiguo, ex floribus arundinum, mollem construere ajunt. Pullos interdum novem in nido uno reperiri.

Pellis ejus cum pennis asservata *Usus.* peculiari vi adversus *tineas* pollere creditur. Non tangi fulgure domum,

in qua ejus nidus suspensus fuerit, nungantur quidam. Moschi instar cum pullis suis suaviter olere, Tragus prodidit. Suspenfam pennas quotannis tanquam in vivo corpore matare, falsum comperit Aldrovandus.

ROUSSEROLLE seu Roucherolle Gallorum, Alcyone vocalis est Bellonio. Rostrum habet ferratum Picæ Græcæ seu Collurioni simile. Plumæ capitis longiores cristæ quondam speciem præseferunt. *Nidum* si quis inversum aspiciat adarcen primo intuitu referre videtur. Sena ut plurimum *ova* parit, & quinque sexve excludit pullos. *Cantu* adeò valet, ut omnibus canorus à Bellonio præferatur, tamque in eo indefessa, ut dies & noctes absumat; tam seriatim, ut vacillet, totoque corpore tremat. Inter reliquas voces has inprimis proferre videtur Toro tret, fuis, huy, tret. Aristophanes ejus cantum expressisse creditur.

TITVLVS II.

De Aquaticis fissipedibus Insectivoris.

CAPUT I.

De Arquata, Crece & Totano.

A *Arquatam* ab arcuato rostro sic dictam, Numenium veterum, qui fortè à Neomenia quod rostri figura arcum lunæ recens à novilunio crescentis in cornua repræsentet, ita dicitur, esse Gesnerus credit; Bellonius Elorium Aristotelis conjicit. *Rostrum* habet circiter octo digitos longum, post tres digitos flecti deorsum incipiens, nigrum. *Pennas* coloris fusci varias & maculosas, ex quibus maxime fulgent instar serici villosi, quæ inter alas & dorsum sunt, in medio nigra, in circuitu per interstitia subrufa. *Digit*i sunt fissi, sed aliquatenus membrana conjuncti; quæ etiam utrinque juxta digitos descendit, & inferiorem digitorum partem dilatat.

Lingua pro tanta rostri longitudine brevissima est, & sagittæ effigiem repræsentat. *Fæmina* est aliquanto minor, & maculæ illæ, quibus totum ferè corpus respergitur, in hac magis fuscescunt. Omnium vermium genere *vescitur*, eosque in plantis quibusque quærit. Turmatim *volant*, *ova pariunt* quanta Gallinæ, quaterna, pallida, mense Aprili. Carnem habent siccam, solidam, leporinæ similem. In Gallia in delicijs habentur.

CREX, quæ & *νεκρος*, quænam sit avis, vix à recentioribus observatum est. Athenæus Helorio similem esse dicit; Aristoteles verò crura alba habere, & posteriorem digitum qui pro calce est minutum asserit. Herodotus ei Ibidis nigræ magnitudinem; Scholiastes Aristophanis rostrum acutum & ferratum assignat. Bellonius avem circa Nilum visam, cruribus longis, *rostro* longo & nigro, nigris quoque tibijs & toto capite: *collo* tergo & pectore candidis, quæ è terra *victum* petit, & in muscas debacchatur; & cum *volat* magnum edit strepitum, Crecem veterum esse opinatur. Pugnat cum Galgulo, & Merula, & Vireone, eorumque pullis nocet. *βεδονίης*, esse Arist. l. 9. c. 1. Philes annotavit.

TOTANUS avis est aquatica, capite nigricante, præsertim anterior; posterius enim & magis anteriori parte rufum est. Vertex cinereus, ut & reliqua pars prona. Alarum ima pars alba, extima nigra est, reliquæ plumæ in ambitu variæ (sunt) & albicantes. *Cauda* palmi longitudine transversis lineis albis, nigrisque depicta, ut etiam limosæ. *Penna* super caudam ad medium dorsum usque albicant. Pars omnis supina alba est: in collo tamen, & superiore alarum ambitu nigricantes maculæ visuntur. Totius avis longitudo ab extremo (rostro) ad pedis extremum extensæ, dodrantem cum duobus palmis æquat. Rostrum longitudo circiter tres digitos, colli totidem. Fides est, verum duo majores digiti pedis aliquotusq; membrana junguntur ut & limosæ. Pedes duos palmos longi ex pallido rubent, unguiculis muniti nigris. Corpus avis
cafe-

ea fere crassitie est, qua Mergulus no-
ster rostri acuti.

C A P U T II.

*De Calidri Bellonij, Nigra,
& Himantopode
Plinij.*

C*alidris* Bellonij avicula est colum-
bæ magnitudine, *cruribus* proce-
ris adeo, ut equo insidere videatur,
unde Chevalier, id est; equitem no-
minarunt. Plumis optimè instructa
est, ideoque longe minus carnis obti-
net, quam appareat. *Rostrum* & crura
rubra, longa, manifesto sane argumē-
to aquaticam esse volucrem. Superior
rostri pars nigricat, venter albus est:
caput, collum, & pennæ sub alis, & u-
ropygio cinereæ: quare Aristoteli Ca-
lidrim dici arbitramur, cuius meminit
his verbis: Quin etiam *Calidris*, cui ci-
nereus color distinctus variè. Radi-
ces plumarum sicut in Bistarda, & la
Cane petiere (Tetracem interpreta-
tur) rubent, sic in hac nigrae sunt. In
temporibus utrinque maculae sunt bi-
nae, nigrae, quæ ceu umbram præbent
supercilijs, quæ & ipsa alba macula in-
signia sunt. Priores digitos membra-
na conjungit, ut in pica marina, (Pie-
de mer) Digitus posticus admodum
exiguus. Alæ, ut in pluvialium corpo-
ri junguntur, magnitudine corpori
respondent. Tam parva itaque ales
proceris cruribus insitens, alacriter,
hilariterque incedit, prata, stagnaque
& ripas frequentat, & plerumque a-
quam ingreditur ad femora usque. Ca-
ro nihil ferinum redolet, sed delica-
tum quid, & aromaticum. In sui gene-
ris avibus, in delicijs habetur.

NIGRAM à rubra differre cer-
tum est. Nigrae enim ab ipso ortu cru-
ra & rostrum atra sunt, excepta supe-
riori rostri parte, quæ subrubra est.
Color item huic nigrior: quin ampu-
tatis capite, cruribus, atque alis, reli-
quis corporis partibus Palumbis co-
lorem inter cinereum, & nigrum vi-
debitur referre. Sin sermo sit de Ca-
lidribus, quæ jam pennas mutarunt,

distinguendusque color ab ijs, quæ
prioribus etiamnum vestiuntur, asse-
remus nos Pluvialem aliquando ob-
servasse in autumno nigram, adeo ut
post mutationem plumarum eum non
agnosceremus: nihilominus tamen huic,
quam alteri pedes nigri sunt. Fœtus
earum mense Aprili prostant, maculis
undique Ortygometræ instar (d' un Ras-
le) conspersi, cum alioqui hyme tan-
tum appareant. Ad hanc reducit Aldro-
vandus *Gambettam* Italici dictam: Quæ
est capite, collo & pectore cinereis &
maculis fuscis plurimis, undiqueque
respersa. Alarum pennæ rectrices
nigricant, corporis cinereæ sunt, in
dorso & alis ad rufum vergentes, ven-
ter candidus est. Rostrum nigrum: o-
culorum iridem ex luteo subviridem
niger circulus ambit. Pedes ex luteo
rutili, quo colore potissimum à nigra
Calidri Bellonij discrepat. HIMAN-
TOPUS à flexitate crurum ita dicta,
quam alij Hæmotopoda, à rubedine
pedum vocant, à Gesnero ita descri-
bitur. *Rostrum* digitos fere quatuor
longum est, *caput* parvum, *collum* digi-
torum quinque, reliquum corpus,
quod leve, & gracile est, instar avium
palustrium fere, quas Gallinulas a-
quaticas vocamus, digitorum sex, cau-
da quatuor, crura quindecim. Color
rostri nigricat, in capite, & collo pro-
no fuscus: dorso, & alis niger, pauco
subviridi admixto, si diligentius in-
tuearis, cauda cinerea. Partes prone
omnes, & latera quoque albi coloris
sunt. *Crura* sanguinea digitis duntaxat
ternis, sicut in Bistarda, Oenade Ron-
deletij, Morinello Gaii, Struthioca-
melo, Pluviali, & Cane Petiere Bel-
lonij, ejusdemque Pica marina: quo-
rum medius longiusculus, brevissimus
interior: jungitur autem medius cum
exteriore brevissima membranula,
tanquam palmipedum. Poplitum ca-
vitas insignis est, articulo tam flexili,
ut in scelecto etiam tibia ad femur to-
ta reflectatur. Videtur sane non cur-
su tantum valere, sed etiam volatu
hæc avis: quoniam oblongæ ejus alæ
sunt, ita ut longissimæ earum pennæ
caudam, seu uropygium, duobus, aut
amplius digitis excedant. Oppianus
hoc

hoc novum in eis, quod maxilla inferiore fixa, superior solum in ipsis moveatur notavit; sed in descripto, nihil ab aliarum avium natura variat.

CAP. III.

De Gallinulis Aquaticis in genere & in specie, de quibusdam.

Gallinulæ aquaticæ hoc commune habent, quod eis sit corpus gracile & adductum. *Caput* parvum, pennæ variæ. *Rostrum* longum, modicè inflexum, nigricans. *Ventrem* & supinam eam capitis partem, quæ inter rostrum & collum est candida. *Crura* oblonga, *digitum*, qui pro calce est admodum brevem; quædam etiam eo carent. *Plumas* ad media tantum crura descendentes. Vermiculis potius quàm piscibus vescuntur; quamvis & ex his minimos comedant. Circa initia autumnii in Helvetiam adveniunt; hyemis exitu denuò avolant. *Ancupium* earum manè ante solis exortum fit; aut vespere, quo incipiente tam sublimi volatu evehuntur, ut non amplius appareant. Ob carnem suavem & teneram, in delicijs mensarum habentur. *Species* ipsarum sunt *Chloropus*, *Erythropus*, *Ralla* Anglorum, *Rhodopus*, *Phaeopus*, *Ochropus*, *Melampus*, *Poliopterus*, *Erythra*, *Ochra*, *Hypoleucus*, *Gallinula serica*, & *Scolopax*.

CHLOROPUS est triplex *Major* quarum altera *Fulicam* & magnitudine & corporis figura refert, tota rostro longiusculo, sursum parumper elevata; altera *Italica*, *Porzana* dicta, collo & capite nigricantibus, Dorso cum superiore alarum parte castaneo; inferiore ventre toto albido, femoribus plumis cinereis usque ad genua coopertis. *Tertia* *Gesneri*, quam *Glottidem* *Aristotelis* esse credit, colore est fusco, cruribus viridibus. Vocem instar fistulæ argutam edit. Germanis *Glott* dicitur. Prælongam exerit linguam unde ei nomen. Hanc initio blandita peregrinatione (cum *Coturnicibus*) avidè profectam, pœnitentia

in volatu cum labore scilicet subit. Reverti in concitatum piget, & sequi; nec unquam plus uno die pergit, in proximo hospitio deserit.

ERYTHROPUS vel est *Major*, vel *Minor*, de utraque nihil singulare occurrit. **RALLAM** Anglorum aquaticam intellige, cujus rostrum & crura sunt rubra; plumæ undique magis cineræ, quamque malè volare, sed egregiè pugnacem esse, *Bellonius* prodidit. *Montana* & sylvestris in *Ericeto* degere solet. *Ortygemetram* esse credit *Bellonius*; *Perdicem* rusticam *Gesnerus*.

RHODOPUS nihil habet singulare. Sed ne de alijs præter descriptionem, quam apud *Aldrovandum* & *Gesnerum* invenies, quicquam. In *Ochropode* *major* septem distincti colores apparent, nec digitus posterior pedis visitur. Medio lingua in oblongum mucronem definit. *Minori* collum est quàm cæteris altius.

ERYTHRA, quam Germani *Mattferca* vocant, vocem & clamorem edit, quo sonus fullonum lanas ferientium repræsentatur.

OCHRA à totius ferè corporis colore subviridi, sed sordido & obscuro sic dicta est.

De **HYPOLEUCO**, quam Germani *Syfterlin* appellant, nihil habeo quod dicam.

SERICA idèò dicitur, quòd color ater in ea holoserici instar splendeat.

CAPUT IV.

De Scolopace seu Perdice rustica, Rusticula sylvatica, & Scolopace seu Gallinagine minori.

SCOLOPAX avis, à rostri figura, quod instar pali longum & rectum habet ita dicta (palum Græcè σκόλοπα dicunt) Volaterrano *Aristotelis* *Alectoris*, sed falsò; vulgò Græcorum ξυλός, *Herodiano* *Sylvestris* *Perdix*, *Martiali* *Perdix rustica*, nonnullis *Rusticula* *major*, *Alberto* quod suavis &

pinguis sit Ficedula, plerisque populis Beccassa, Germanis *Schnepf* & *Nietschnepf* dicitur. Similes ipsi quasdam in Frisia aves facit Gesnerus. Ea, quæ Vulp nominatur vul, o, rostro & pennis colore illi confertur, sed magnitudine vincit. Item Grutte dicta rostro. Magnitudine est Gallinæ, colore Attagenis, ut Aristoteles prodidit. *Rostri*, quod longum, antèrius asperiusculum, pars superior ultra inferiorem extenditur. *Lingua* habet gracilem, oblongam, nervosam. *Crura* ferè rosei coloris. *Felle* carere vulgo creditur, quod apud Bellonium legitur.

Arist. H.A.
l.9. c.26.

Locus.

Nullibi non *invenitur*, in Gallia, Suecia, Helvetia. Non ubique tamen iisdem in locis, nec semper æstate in altis Pyrenæi, Helvetiæ, Sabaudia & Arvernæ montium jugis degit. Hyeme cibi gratia ad campos & sylvas cæduas descendit. Circa Brixiam principio Autumni, in Helvetia mense Octobri capitur. A Germaniâ inferiorem æstatem recedit, in fine Autumni redit. Aquas in primis tepidas, loca pulverulenta & humida, sepes, & hortos amat. *Cibus* ipsi vermes. Spiritu in cava immisso, unde sonus etiam procul audiat, eos extrahere, proditum à nonnullis. Visti, qui ex farina fagotritici cum aridis ficibus pascebantur. *Volatus* debilitatem, cursus velocitatem naturæ cōpensant. Cum proximam sibi aucupes existimant, longè recessisse inveniunt. *Oculis* est obtusioribus, quamvis grandes habeat; *odoratu* potius cibum quærere creditur. Homine delectari ab Aristotele relictum.

Arist. H.A.
l.9. c.26.

Gesner. in
Ornithol.

Habetur inter ciborum delicias, sed postponitur Perdici. Aliqui depumatum exenteratumq; in furno torrent & cremant, remedio calculosis futurum.

RUSTICULA SYLVATICA,
Rusticula palustri majore, major est. Gallinam enim ferè æquat. Colore saturiore, rostro minus longo, ventre albicante, cæuribus cinereis. Tendi- culis seu laqueis capitur.

SCOLOPAX seu Gallinago minor, & Scolopax minor, Molliceps Aristotelis quibusdam, dorsum habet

eiusdem ferè cum Alauda coloris. *Rostrium* canaliculatum, maculosum, in extremo nigrum, quatuor digitos æquat longitudine. *Alæ* extensæ maculam albam in extremitatibus ostendunt. Quæ ab Aldrovando exhibetur, *rostrum* habebat palmi longitudine canaliculatum, latiusculum, nigrum, tuberculis quibusdam asperum, in extremo acutum, cuius superior pars inferiorem aliquantulum longitudine excedebat. *Lingua* longitudine rostro ferè par erat caniculata, in extremo cuspidè acus instar acuminata.

Frequentem in locis mediterraneis Gallia videt, nec Batavi eadem carent. In Germaniam circa æquinoctium vernum venit, si Longolio credimus. Nec à marginibus stagnorum & lacuum *recedere* idem affirmat. *Migratoriam* inde colligas. In disiecte ventriculo initio Decembris, scabæos, & vermes albicantes, tenues, oblongos, quales fatinarios appellat, invenit Gesnerus. Neq; in caveis, neque in aviario vivere dignatur. *Vocem* auditam (hæc talis est, ut si quis cultrum per ferram ducat) pluviae prognosticon quidam faciunt.

C A P U T V.

De Gallinula terrestri, & alia Chloropode.

HVc & Gallinulam terrestrem & aliam *Chloropodem* Fulicæ similem Bellonij refero: illa circa Verbanum lacum Polle; à Germanis aucupibus *Hoggeschar* quod turmatim juxta sepes decurrant, dicitur. Gesnerus Rallum terrenum, seu Trochilum terrestrem dicit. *Corpore* est brevi, crasso. *Digitis* pro sua magnitudine longissimis. Postremus ad anteriores circiter dimidiam longitudinem obtinet. *Vocem* ejus dicunt asperam ger, ger, ger serpentum instar. Capta sciuri vocem, si fides referentibus imitatur; Angli cœu lautissimam inter segetes capiunt.

De GALLINULA CHLOROPODE alia, ita Bellonius. Necessario

X

planè

planè Gallinulam aquaticam (la Poulette d' eau) à Fulica , & Fulica majori (dela Porle, & Macroule) separavimus: quoniam aquæ non innatat, nec palmipes est. Pullettæ autem aquaticæ, sive Gallinulæ nomen à similitudine cum jam dicta impositum est, etsi multo minor sit, major tamen Ralla, adeo ut de utraque hac particeps esse videatur. Aucupes, quibus ostendimus, cum Fulicæ similem esse cernerent, magnitudine tantum differre aiebant, hancque ad perfectam necdum ætatem pervenisse. Unde nos diligentius peculiare aliquas notas discriminantes investigavimus. In quibus ea præcipuè fere est, quòd hæc Gallinula pedibus sit viridibus, & non absimilibus Botauri, neque etiam ita planis, nec denique lata membrana conjunctis, ut in Fulica. Cauda etiam Gallinulæ longior est. Macula frontis item minor. Colore Rallo similis quidem, sed ad Fulicæ colorem tendit: quare ex primo aspectu Rallum esse putabam, sed cum diligentius inspicerem, animadverti, palpebras oculorum candidas esse, quod Rallo non convenit, sed neque Fulicæ. *Cauda* binæ pennæ albæ sunt, utrinque nempe una. Sub pectore non nihil ad cyaneum, sive cæruleum vergit. *Dorsum* colore est castaneæ intenso. Alii item aliis nigriores sunt, & alarum plicas albas habent, & aliam insuper albam lineam in minori ala, quam primæ plumæ ejus per calami longitudinem constituunt. Idem cibus reperitur in ejus ventriculo, qui in Rallo, & Fulica. *Osterni* & ischion, sive os coxendicis ab aliis avibus habet diversâ, etiam à Fulica. Caro Gallinulæ coctû facilis, ac tenera est, ossa fractu facilia, ingluvies ampla, jecur quoque fragile, cæterum intestina, & reliquæ partes internæ, ut in Fulica. Asa ejusdem cum Fulica saporis est. Nidificat, & pullos alit, & educat, ut Rallus.

Huc pertinet illa quam CORRI-RAM vocant, avis ostro pro corporis proportionem crasso, pectore, & alis supernis albicantibus, cætera nigra.

Nec PORZANA MINOR, quæ Mediolani Girardina à Gallinularum

aquaticarum censu eximenda est. Rostrum habet breve, quæ caput tangit flavum, & in extremitate nigrum, pedes atros, ventrem album, pectus, dorsum, alas, colore fumido, albis maculis consperso, alarum pennas majores nigras, &c.

CAPUT VI.

De Trynga.

DE Trynga, Juncone, & Cinclo hoc duntaxat Aristoteles prodidit, quòd caudam motitent, lacus & flumina petant. *Trynga* Turdo æquiparetur, Cinclus & Junco minores sint. Hinc factum, ut diversæ Aves pro iis ab Authoribus obtrudantur, haud paucæ tanquam congeneres referantur ad easdem. Turnerus eam totam pullam, ea parte, quæ podicem regit, quæque candida est, exceptâ, facit. Breves volatus facere, in stagnis quæ nobilium ædes obducunt, & in piscinis apud Anglos plærunque degere, si quando periclitatur, ad arundinera densiora confugere, adiciit. Germani quidam Tryngam nigram totam, sed pedem, candido vertice ad rostrum usque demisso, pedibus altis, & nigris, caudam continuè motitantem, & loca aquosa incolentem ponunt, ad eandem Gesnerus avem quæ Claronæ *Wasser Trostla* id est, Turdus aquaticus nominatur, rostro brevi, cruribus altis, sed pedem, refert. Aldrovandus aliquot ad Tryngam reducit, quas alij ad Cinclum retulere.

Prima ei ex illis quas *Giarolos* & *Giaroncellos* in Italia vocant, Turdo magnitudine par. Rostro duos digitos longo, nigro, in extremo non nihil recurvo. Lingua acuta parvis ferè longitudinis. Capite superno, collo, dorso, & alis fuscis ad colorem castaneæ non nihil vergentibus, oculorum ambitu, mento, pectore, ventre, & Vropygio albicantibus. Digitis tribus anterioribus ad medium ferè palmum exporrectis, posteriore brevissimo. Inter anticorum extimum & medium membranula est divaricationis initio, quæ inter alios desideratur.

Alte-

Alterâ Pinarolo dicta, huic ferè per omnia similis, nisi quod rostrum habeat nigrius, aliquando brevius, cujus superna pars infernam longitudine nonnihil excedit.

Tertiam Bellonius ad Gallinaginem minorem refert, Gesnerus Samethünle esse putat, uterque Cinculum Aristotelis esse opinatur. Corpulentia est ferè eadem cum Scolopace minore simpliciter dicto: plumarum tamen colore differūt, & rostro, quod utrinque quidem tenue, longum & acutum est; præcedentis tamen in extremo maculatum est, & crassiusculum. Maculis albis in capite & universo collo maculatur. Pectus verò, totusque venter, femora & plumæ sub cauda nivem candore æquant. Ripas potissimum & loca, quæ bono aliquo odore recreant, & moschum redolent, frequentat.

Quartum inter cinclos reposuit Turnerus. Alauda est major, colore in tergo nigro, ventre albo, tibiis longis. Vere circa fluminum ripas *clamosa* est. Breves & crebros facit volatus. Anglis Hirundo Aquatica dicitur.

Quinta ex Motacillis credita, *Wiwendegen* / & *Wiwegichen* Germanis in Misnia vocatur. Palmipes quidem non est, sed rostrum longum, molle, cinereum: crura alta habet. Duo ipsius sunt genera, *Majus* & *Minus*. Hoc magnitudine Merulæ, tergo cinereo, ventre albo.

Locus. Flumina colit, & in ripis vagatur. In arenis nidificat & incubat, interdum inter saxa ova ponit. Supra octo pullos uno tempore non excludit.

Victus. Muscis, vermibus, & pisciculis vescitur. Domi, pane & malorum vescitur putaminibus. Singulari in muscis capiendis arte pollet. Lento enim suspensoque gradu accedens, rostro elevato primum designat, tum captam prædam deglutit. Mansuefacta conclave ab araneis purgat.

Vox. *Vocem* noctu lacrymantis instar edit.

Quarta congenerem Merulam aquaticam Gesnerus facit, quam Germani *Bachamsel* / Lucarni & circa Verbanum lacum Folot vel Folum d'

acqua nominant: nec non cornicem aquaticam, Sturno paulò minorem, quam in Alcyone describit.

CAPUT VII.

De Juncone & Cinclo.

Junco *χοινίον* & *χοινικόν*, quod in Juncis libenter degat, quæ Græci *χοινίς* nominant, ita dicitur. Aristoteles Tryngam minorem, Alaudæ amicam facit. Addit, fluviis & lacus petere, ac caudam motitare, Bellonius pro ea quandam ostendit, quæ Gallis Aloüette de mer, seu Alauda marina dicitur. Est quidem hæc ejusdem cum Alauda magnitudinis, *rostrum* oblongiusculo; *cruribus* nigris gracilibus & oblongiusculis, *linguâ* nigra universum rostrum longitudine æquante; linea alba sub alis insignitur, & dum volat ejusdem ferè est cum Galerita coloris: sed quia maritima est, nescio an pro Juncone sumi vel possit, vel debeat. Aldrovandus aviculam, quæ Passere d' acqua vocatur pro Juncone ponit. Passeris est magnitudine, rostrum nigro candiculato, satis duro & in extremo adunco. Lingua candiculatâ, & qua desinit bifida & duriuscula. Cauda tres digitos longa denis pennis constante. *Mas* a fœmina hoc solum differt, quod in hac colores sint magis obsoleti; in illo magis vegeti.

Congenerem facit eam, cui eadem species, rostri pedumque conformatio, & colore tantum variat. Collum pronum, & pectus albicant, sed venter totus ex cinereo ad fuscum vergit. Cætera fusca est. Turnerus dum Parum sylvestrem pro Juncone obtrudit, vehementer fallitur.

CINCLUS Græcis *κινκλός*, Suidæ nisi loca sint corrupta, *κινκλός* & *κινκλός*, *βεγκλίον* Hesychio & Varino, quod armenta sequatur, tertia est ex illis avibus, quæ caudam motitant, & circa stagna & flumina versantur. Caudam motitare præter Aristotelem, Aristophanes in Tympanistis prodidit. Volaterranus palmipedem esse scripsit, sed falsò. Suidas gracilem & nullo ferè corpore scribit. Gesnerus cum

rostro recto nigro & longiusculo, ventre albo, pectore cinereo, cauda brevi ita ut eadem alarum longitudo sit, alis, dorsoque fuscis, cruribus ex ruffo ferè luteis facit. Bellonius secundam Gallinaginis minoris speciem Cinclum Aristotelis esse putat. Idem Gallinaginum minimum genus, Cinclum minorem appellat. *Tertia* inquit Gallinaginis minoris species primo generi magis quam secundo similis est. Rostrum enim sicut Scolopax major, crassiusculum habet, & in extremo maculatum. Dorsum Sturno simile. Aliquibus Deux pour un appellatur. Duæ enim hujus generis, precio unius majoris vaneunt. Aldrovandus de ea quam exhibet, an apud mare etiam degat dubitat. Magnitudine inquit Motacillam aliquanto superat. Color totius ferè corporis inter fuscum & cinereum ambigit, sed alarum pennæ majores subnigricant. Venter & femora albicant. Rostrum nigrum tenue, & longiusculum. Crura nigra, breviora & exilia.

Congeneres ipsi duas alias facit, quarum quoque Icones exhibet. *Prior* sub Cincli minoris nomine describitur. *Alter*a iisdem quidem est coloribus, sed caudam albam & lineis nigris transversim secantibus ornatam habet. Rostrum quoque quâ capiti jungitur crassiusculum, & sensim deinde magis magisque attenuatum. Quia posteriore sui parte debilis est, suapte & perse *nidum* non construit, sed in alienis parit. Apud homines vivere non dedignatur. Captam maximè mitescere tradit Philosophus. Videtur in Coryis Thracum Regis convivio apud Athenæum apposita, *νίγνλος* quidem ibi extat, seu *νίγνλος* legendum esse censetur.

C A P. VIII.

De Vannello & Cercione.
Ave Indica.

VANNELLUS seu quod alis instar vanni aut ventilabri commotis strepitum excitet, seu aliâ ob causam ita dictus, Fulica quibusdam,

Stymphalis veterum aliis, sed falsè; quibusdam à voce, *ἄξ*, sive Capella, Bellonio Parrus, Parus, vel Parcus de quo apud Plinium, dicitur. Alcyoni congenerem. Gelenius facit, Pluviali Gesnerus. Candidos reperiri audit idem, nisi Lari fuerint. Sine crista, iique aliquando colore fusco, & maculis variis observati alibi. An Tremulus avis in provincia Salernitana dicta, quæ minor est Gallinâ, coloris fusci, altè clamans, & velocissimè volans, quæque propè mare teste Villanova versatur, & cum super terra incedit, cauda tremit, unde ipsi nomen, sit ejusdem generis, disquirendum cum Gesnero relinquo. Exatissimè à Bellonio describitur. Magnitudine inquit Plaridem vix excedit. Densis admodum *plumis* contegitur, quæ in radicibus suis quæ corpus attigunt, omninò nigricant. Color enim alius est in parte exteriori. Avis inversa, supinaque collocata, & alis ejus extensis magna plumarum pars in ventre, & in femoribus nivei sunt candoris. *Ale* in superiori quoque parte niveæ, in inferiori nigricant. &c. *Hepar* habet magnum, in duas partes utrinque divisum. *Fel* in ea reperire Bellonius non potuit. *Intestinum* appendices habet.

Circa lacus & amnes versatur: aquas tamen non ingreditur, sed in planis & erica confitis, ut plurimum degit.

Vermibus, muscis, cicadis, bruchis, *Vicius*. scarabæis & alijs *vescitur*. Albos lapillos deglutire, certum est. *Æstate* sola *volat*, hyeme gregatim, & tam frequentissimo numero, ut prata etiam amplissima vix totum agmen capiant. Alis est obtusioribus, & inter volandum magnum strepitum edit.

Vocem videntur Germani & Galli *Vox*. per nomen ipsi inditum expressisse. Illi *Rivis* hi Dixhuiet vocant.

Dum *pullos* fovet, ad hominē à quo *Partus*. nidum inquiri suspicatur proximè accedit, & velut deditioem simulat, donec à nido abduxerit, sæpè multæ unum hominem ita persequuntur, ut eo facilius à nidis abducant.

Habetur in ciborum in Gallia de *Vfus*. licijs, & eodem quo lepus precio venditur.

Aldro. Ornith. l. 20. c. 56.

Bellon. de Avib. l. 4. c. 17. Plin. H. N. l. 11. c. 37.

ditur. Adeò pinguescit, ut saginata videatur. Gesnerus boni saporis & probi, sed levis & tenuis alimenti esse comperit.

De CERCIONE quam Capellæ seu Vannello præmittere debuit, caudam enim motitat ita Ælianus. In India avis ad Sturni magnitudinem accedens, varijs colorib. picta nascitur, quæ & humanam vocem effingit, & Psittacis vocalior, & majore est docilitate ac ingenio: non tamen humanum victum æquo animo sustinet, sed libertatis desiderio famem potius quàm servitutem deliciis ciborum refertam amplectitur. Urbes, quas Alexander in India excitavit, & Macedonibus incolendas dedit, ut Bucephala cum adjacente agro, & Cyropolis, aliæque ideo Cercionem appellant, quod similiter caudam, atq; Cincus mover.

C A P U T IX.

De Pluviali & Charadrio.

PLUVIALIS, Rhintace fortè Plutarchi, quia nihil in ejus intestinis excrementi reperitur, in agro Bononiensi Pivier, Gallis Pluvier, Germanis *Pulver* & *Pulross* audit. Quomodo antiquis vocetur, ignorare se fateatur Bellonius.

Genera. Duo ejus genera, *flavesceus* unum, *cinereum* alterum, quod Itali montanum vocant. Pulli Guillemot privatim vocantur. *Illud* Palumbi est magnitudinè. Rostro brevi, rotundo, nigro, acuto, & in extremo nonnihil adunco, *lingua* triquetra, totam inferioris rostri canalem implente, prona parte ferè cornea retusa. Pennæ superne fusco albo luteoque colore ita distinguuntur, ut ferratæ appareant; cauda quoque lineis fuscis luteis intersectatur. Postico digito caret. Inter anticos tres membranula interjicitur, major inter medium & extremum, minor inter eundem & internū. Bellonius plumas ejus lutescere scribit, seu maculis luteis respergi.

Locus. Frequens est in Gallia, in Helvetia

rarissima. Bononiæ non rarè in foro venditur.

Rore *victitare* prodidere quidam, *Victus.* quod in ventribus earum nihil invenitur. Nihil falsius. Ex humidis campis vermes eruit. Scarabæos in dissecta. Invenit Bellonius. Lumbricos edere asserit idem, quia solum *intestinum jejunum* habet. Ideò in eo nihil invenitur. *Migratoria* est. Aestate nulla in Gallia cernitur, vere paucæ. Non minore numero, quam quinquagenario volant. *Volaturæ* ventum sequuntur, rarè adverso tendunt, ut Bellonius prodidit.

Vox ipsis huius, huius sibilo qui porrectis labijs edi solet similis. Noctu solæ degunt; summo mane diversis in locis sparsæ conspiciuntur, quartamque aut dimidiam milliarij partem occupant. Imminente die, ut simul conveniant, sibilum, sese mutuo vocantes emittunt. Vni in toto grege tanquam Regi obeditur. Huic vox maximè sonora. Ad auditum undiq; confluitur. Aucupes *Appellatorem* vocant. Inter Cupedias in Gallia ponuntur. Ita ut in hominem delicati cibi nimium appetentem, ne Pluviali quidem opposita contentum fore, alicubi tanquam proverbio dicatur. Apparanda non exenteratur.

Pluvialem Cineream Aristotelis Pardalum esse credit Aldrovandus, tum *Aldro. Ornith. l. 20.* quod tota ferè sit cinerea, quod de Pardalo prodidit Aristoteles; tū quod *c. 65.* maculata, unde Pardalo nomen. Pluviali simpliciter dicta est aliquāto major. Rostro paulò crassiori & longiori, postico digito admodum exiguo. Tota ferè cinerei est coloris, & multis undiq; respergitur maculis, quæ inter cinereum, & castaneæ colorem ambigunt. Alæ caudam quæ brevis est, excedunt. Magna ex parte gregatim *volat*, nec singularem videris, quod apud Aristotelem legimus. *Vocem* frequentem nec gravem emittit.

Huc refer illam, quæ *Pluvialis Major* Aldrovando. Rostro est procero, supina parte per pectus, ventremque candicat. Majores alarum pennæ nigricant, pedes sunt longi, & ad cæruleū vergunt. Digito posteriore ferè caret.

CHARADRIUS GAZA Hiaticula, quod circa fluminum alveum & rivorum hiatus versetur, qualis Aristoteli avis sit, ignoratur. Nam colore & voce pravam esse, noctu apparere, interdum aufugere, quod de suo Philosophus reliquit, multis avibus competit.

Arist. H. A. l. 9. c. 11. Et cum Aristoteles Icterus Chloream seu Galgulum vocet, haud verisimile videtur, eam avem Charadrium esse, quam in Perside & raro quidem reperiri; atque regum requiri, quod multi ei propter auxilium quod ictericis

Heliodor. l. 3. Histor. Aethiop. praeferre creditur, Albertus ex Heliodoro, Aeliano & alijs asserit. Aldrovandus pro Charadrio aviculam exhibet corpore toto ex cinereo fuscâ, Rostro brevi, si cum aquaticis, longo, si cum alijs conferas. Capite toto nigra vitta cinctam, cruribus oblongis & gracilibus, colore ad rutilum accedente, fronte & collo candicantibus, pedore nigrescente. Quia interdum latet, noctu progreditur, dedit proverbio locum: *χαράδριον μυστέρον*, qui rem utilem occultat, dicitur. Ictericos solo aspectu sanare multi produnt. Philes Rubetam spectantem ictericiâ affici, rursus Charadriion, liberari nungatur.

TITVLVS III.

De Avibus Fissipedibus Herbivoris.

CAPVT VNICVM

De Gruæ.

Martialis. **A**vis quam Gruem Latini à gruendo, Poeta Palamedis avem, quod is Trojano bello, quatuor literas φ & χ & θ, ordinem aciei, & resseras à Gruibus didicisse dicatur, vocant, Græcis communiter *γεγραυός*, quod colore cinereo & quasi cano tanquam *γεγραυ* appareat; Tyrrenis Tiris, & *αυγισός*, Polyrrenis *στέγης* appellatur. Genera ipsarum apud Tartaros plura Venerus observavit. Sunt quædam alis *nigris*: alia *candida*, pennas oculis aurei coloris plenas habentes. Nonnullæ parvæ, pennis longis rubro nigroque co-

Vener. Rerum Orient. l. 1. c. 64.

lore perunctis instructæ; quædam denique magnæ, grisei cinerei coloris, oculos rubros & nigros habentes. In Cuba duplo nostris sunt grandiores. In alia America parte rubras colore coccineo Columbus observavit.

De descriptione non est quod simus *Descriptio*. Collum ipsi duos dodrantes longum, quod Philoxenus seu os Eurixidis F. seu Cytherius, gulæ circa pifces mancipium, sibi optabat. *Athen. Diopnos. l. 1.* Anterior ejus pars ad latera nigricat, prona albet. Vertex cum macula rubente niger. Omnia reliqua cinerea præter majores alarum pennas. In alis retrò versus caudam pulvæ & crispæ sunt, quas auro & argento ornatas juvenes pilis affigere solent. *Arteria* aspera penitus in carnem ad os sternon inferitur. Ideò non mirum ex tam longinquo audiri.

Nulla non in orbis parte visuntur, *Locus*. universum enim ferè, caloris amicæ, peragunt. Circa Hebrum, Strymonem & Cnistrum magna ipsarum copia. Ex Thracia, ubi æstate vivunt, hyeme ingruente trajiciunt in Lybiâ: ibi in Ægypto & in Æthiopia hyemem transigere Aelianus prodidit. *Aelian. H. A. l. 3. c. 13.* De Tartaria superius diximus, quæ verò de Pygmæis Plinius habet, fabulosa sunt. *Plin. H. N. l. 4. c. 11.* *Cibus* ipsis fruges, & herbæ.

Illud & Suidas innuit, cum dicit, *Victus*. *γεγραυοὶ γεωργὸς κατέρευον τὸ χυμὸν ἐσθλαμένον, νεωστὶ πυγίφεισσι* Grues agricolæ depascabantur agrum noviter tritico satum; & Mantuanus cum scribit.

Mantuan. l. 1. de colum. temp.

Strymonia de more Gruis, quæ semina campi

laeta legens aqua tepido sub sydere libra.

Hoc apud Claudianum legitur.

E Nilo Pygmæa Grues post bella remenso

Ore legunt rubri germina carymaris.

Putantur tamen & serpentibus interdum vesci.

Moventur in Venerem cum obvio Partus. vento ad occidentem fugiunt. Fœmina stante ut Passeres; non sedente ut Gallinæ, coeunt. Ova bina, inter quæ lapidem fortuito etiam inventum deponere solitas, Albertus Colonia per annos

Aelian. H. A. l. 5. c. 2.

annos aliquot observavit, nec plura pariunt. Quomodo *excludant*, à nemine quantum sciam hætenus proditum est.

Vox. Vocem ipsarum Græci per κλαγγή-
Virgil. *Æ-ζεν*. vel κλάζεν; Latini per clangere &
neid. l. 10. clamare exprimunt, quod intenso &
Lucret. l. 4. magno cum impetu prolata vocife-
Aristoph. in rentur. Aristophanes γέρονον κλάζουσιν
Avib. nuncupat. Q. Calaber τανυφθόγγος, id
est longum & protensum sonum e-
dentes dicit.

Actas. Aetatem earum diversi diversimo-
dè definiunt. Honorius anno octavo
senescere tradit. Leonicus Tomæus
quadraginta continuis annis unam
domi aluit. Aristoteles pēnas Gruum
Arist. l. 5. in senectute nigrescere tradit. Seu
de gen. c. 5. quod pennarum earum natura albi-
cet, plusque humoris senescentibus
ijs constituitur, quam ut facilè putre-
dini pateant: seu quod terrestris hu-
midi ipsarum natura à calore immi-
nente non satis concoquatur. Solinus
fulvas reddi scribit. Ingrediendo
pedes ante se jaciunt, & implumes
tam celeriter aliquando currunt, ut
cursu hominem vincant.

Volatus. Nec minor Volatus velocitas. Cy-
rus per intervalla locorum suos tabel-
larios ita disposuisse legitur, ut fatiga-
tis recentes & nocturni diurnis succe-
derent; sic volantes Grues superar-
entur.

Plutar. in De Migratione mira ab Autoribus
Aristotele. produntur. Ex Græcia Mæmasterio-
Ælian. H. ne in quem Æquinoctium incidit, di-
A. l. 2. c. 1. scedere notavit Plutarchus; ex Helve-
Tzetzes. tia XI. Septembr. auditiv Gesnerus.
Thraciam relictam ad Hebrum flu-
vium conveniunt, & in turmas dispo-
nuntur. Maxima nata lustrato ter ex-
ercitu, corrui; sepultâ ad iter in Ægy-
ptum accinguntur. Volant altè, seu
ad prospiciendum, quod Plinio & Isi-
doro placuit, seu ut, cōspectis in tem-
pestatem nubibus in terram sese refe-
rant. Exactè secundum ventum ser-
vant, rarò contra impetum nisi fugi-
do nituntur. Et in tergo præter volan-
tium colla & capita reponunt. In vo-
latu trianguli formam efficere animi-
adversum ab Aristotele. Ejus autem
summo angulo aër ab iis adversus pel-

litur: deinde sensim ab utroque la- Cicer. 4. de
tere, tanquam remis ita pennis cursus Nat. Deor.
avium levatur. Basis trianguli tāquam l. 2.
à puppi ventis adjuvatur. Tempesta- Plutarch.
te motâ, vel in triquetram figuram l. c.
conducto agmine cuspide ejus cir- Lucan. l. 5.
cumfluum aëra scindunt, vel immi-
xtæ glomerantur in orbes, vel con-
tentæ in sinum falcataeque feruntur.
Literam ypsilon quibusdam expri-
mere; A vel Λ alijs creduntur. Unam
sequi ordine literato, & pennarum
notis inscribiaëra, certum est. Du-
cem quem sequantur ex robustis & se-
nioribus eligunt. Ubi cum defatiga-
tio, quia non habet, ubi nitatur, cœpe-
rit, proximam ijs quæ acquirere sub-
stituunt; eaque vicissitudo in omni
cursu servatur. In extremo agmine Arist. H. A.
per vices qui acclament, dispositos l. 9. c. 10.
habent, & qui gregem voce conti-
neant. Excubias habent nocturnis tē-
poribus, lapillum pede sustinentes;
qui laxatus somno & decidens indili-
gentiam coarguit. Cæteræ dormiunt
capite subter alam condito, alternis
pedibus insistentes, Dux cum alijs e-
recto providet collo ac prædicit. La-
pidem decessuras deglutire auri indi-
cem postquam deciderit utilem, seu
ut ita facilius ventorum turbini pon-
dere resistatur, quod Ælianus voluit;
seu ut de via fessæ, & quietem paran-
tes, jactu terram & aquas explorent,
quod Aristophanes Byzantius credi-
dit; prodidere quidam. Rostro eū su-
scipere, ne in volatu navis instar flui-
cent, Maximus Tyrius scripsit; ut vo-
cem Taurū montem Aquilis plenum
cohibeant, alij: Falsum id Aristote-
les reliquit: lapides pedibus comple- Plin. H. N.
cti, cum digitis ijs incurvantur ex l. 10. c. 23.
Solon. Po- bertto habemus. Certum est, inquit lybist. c. 10.
Plinius, Pontum transvolaturas, pri-
mum omnium angustias petere, inter
duo promontoria Criu metopon &
Carambim; mox saburrâ (sed non ut
alantur, quod Ælianus fabulatur) sta-
biliri. Cum medium transierint, ab-
jici lapillos è pedibus, cum attigerint
continentem è gutture & arenam.
Cum ab Aegypto in Europam avo-
lant: Duces non adhibent.

De Antipathia hoc duntaxat occur- Affectus.
rit,

rit, ab Aquila infestari. Ita inter se interdum ira exardescere, ut dimicantes capiantur. Vifus aliquando mas fœminæ ad internecionem usque undecim vulnera inflixisse, quod pullos quominus se sequerentur, abstraxisset, si Alberto fides est. Quæ de *Pygmaeorum* cum Gruibus pugna ab Aristotele, Philostrato, Menecle & alijs produntur, fabulosa esse ex Strabone cognosces. Adventus earum; Aëtionis tempus indicat. Si vel vociferantur, vel per apertum sponte trepidant; nec sese audacius æthræ committunt, vel vespere, & ad multum tempus volant, tempestatem minantur. Si manè & gregatim volent, serenitatem promittunt.

Vfus. *Vfus* earum olim in cibis expetitus. Indi ovis vesciebantur, ut Strabo habet. *Strab. l. 15.* Varro Grues Melicas apud Gellium *Gellius l. 7.* inter idopata reposuit. Grues oculis confutis in tenebris saginatos Plutarchus testis est. De suis temporibus *Plinius.* Cornelius Nepos qui Divi Augusti principatu obiit, cum scriberet turdos paulo ante saginari cæptos, addidit, ciconias magis placere, quàm grues: cum hæc ales inter primas expetatur: illam nemo velit attingisse. Sed & hodie hybernos apud Gallos *Plin. l. 6.* cibos nobilitat. Inassant caryophilis per fossas & pipere. Tenere scunt; si ex ficu suspendantur. Galenus, Aegineta, & alij carnem earum inter fibrosas & duras reposuere. Anaxandrides, cum Iphicratis nuptiarum cum *Præuier. l. 15. de re cib. c. 59.* Thraciæ Regis filia convivium ridet; Gruem ibi fuisse, quæ frontem distenderet. Hiante podice, discissis lateribus, dicit. *Athē. l. 12.*

Quantum ad Medicinam, Torminosis in cibo profunt. Jus vocem clarificat, & sperma auget. *Caput;* oculi;


ventriculus exusta in pulverem fistulis & varicosis ulceribus insperguntur. *Adeps* omnes duritias cum Anserino dissolvit. Pulmonis vulturini dextræ partes venerem excitant viris ad alligatæ gruis pelle. Penna serpentis stupidos reddit.

Et hæc de Grue in genere sufficiant. *Speciem* quod attinet, quia *BALÆARICAM* Plinius Cirrhos in capite more Pavonis gerere scribit; Aldrovandus eam substituit, quam Bellonius cuidam Ardeæ generi adscribit. Vulgaris est Gruis magnitudine, & eodem planè corporis habitu, rostro è cinereo fusco, vertice nigro, in quo cirrhus erectus nascitur, plurimis tenuibus & subtilibus aurei coloris pennis. Vtrinque in temporibus maculam habet oblongam, candidam, ex cuius inferna parte utrinque oriuntur palearia rosei carneivæ coloris. Collum, pectus, venter, cruraque tota ex cinereo fusca sunt. Circa caput viride invenitur. Alas erigit, & quandoque velocissimè currit. *Vescitur* herbis viridibus, quandoque fursuribus & hordeo. Sub noctem altos parietes aut arbores more Pavonum quatit. *Plin. H. N. l. 30. c. 15.*

De JAPPONENSI nihil singulare occurrit. Tota ferè candicat, rostro, collo inferiori, pedibus & alis internis exceptis. Vertex capitis insigniter rubet, ac nigris maculis respergitur. Media pars colli inferior nigricat. Sub alis pennæ dependent satis magnæ, multis insignitæ appendicibus, nigræ; cætera tota avis nigricat.

* *





HISTORIÆ NATVRALIS

DE

AVIBUS:

LIBER VI.

De Avibus Exoticis, Americanis imprimis.

TITULUS I.

De Avibus Exoticis Terrestribus.

CAPUT I.

De Manucodiatis in genere & in specie.

Oterant & istæ superioribus inferi, nisi accuratâ, plerarumq; descriptionem Authores nobis invidissent. Hæc quia destituimur, dicēdū promiscuè de illis erit, ne aliquid in historia Aviū scitū dignū omisisse videamur. Si quid occurreret, quod superioribus annecti possit, Additamentis Deo volente inferetur. Incipiemus à MANUCODIATIS sive avibus Dei ut Moluccani vocant. Hæc alijs interdum Apodes Indicæ: interdum Aves Paradysi, seu ob corporis speciem, seu quod ubi locorum nascantur, unde veniant, quo sese recipiant, ignoretur, vocantur; quamvis & ad Physonem fluvium quædam observatæ sint, quibus idem, ob miram corporis speciem, & plurimam colorum diversitatem, nomen inditum erat, & in Ægypto fuscæ & subrutilæ Moneculis minores, sub eodem nomine videantur. Magnitudo certa non potest illis adscribi, quædam hirundine paulò majores visæ sunt. In Java columbarum magnitudine observari, à se Pi-

ca maxima non minorem visam, Scalliger reliquit. Omnibus peculiare est, ut pedibus careant (quamvis Aristoteles nullam absq; pedibus avem dari asserit, & Pigaffetta pedes illis palmum unum longos assignet) & in cauda veluti fila quædam vel nervos obtineant. *Caput* ipsis non rotundum, sed pressum, nucis juglandis ferme magnitudine. *Rostrum* non omnibus æquè magnum, nequè ejusdem etiam coloris. *Alæ* & cauda expansæ Accipitrinis Milvinisque magnitudine respondent. Pennæ sunt tenuissimæ, & præter tenuitatem pennis Pavonum fœminarum extoto perfimiles. Alæ in arcum contrahi, vel in latum diffundi pro animantis lubitu nequeunt, sed naturaliter uno tantum eodemq; modo perpetuè consistunt. *Dorsū* fila gemina annectuntur, tres & amplius palmos longa, nequè exactè rotunda, neq; perfectè angularata, sed figurâ inter quadratum & rotundum media. Intus continuata ac perpetuâ, pinguedine totæ expletæ sunt. Fallo perpetuum *volatum* exercere, quod non nisi mortuè in terra vel mari inveniantur;

traduntur; nec verius affirmatur rore duntaxat *pasci*, & *ova* in masculorum dorſi cavitare incubari & excludi. Sanè quiete neceſſario indigent, & filiſ illiſ in cauda facilè ramis arborum annectuntur, nulla hætenùſ in viſarum dorſi obſervata cavitare; & cum tum altè volent, tum animalia ſint perfectæ, quomodo rure, qui propè terram naſcitur, nec ſolidum alimentum ſupeditat, illaſ ali dixeris? Magni à Mollucarum Regulis ſunt, qui ſe, ſi illarum pennas portent, in prælio vulnerari non poſſe, etiamſi in prima acie collocati fuerint, credunt.


Species.

Species ipſarum quinque deſcribit Aldrovandus. *Prima* hirundinem magnitudine, & forma, ſi corpus ſpectes, pene æquat. Pennarum ambitus diſcolor eſt, ſed admodum venuſtus, & viſu undique jucundiſſimus. *Caput* quale Hirundinis, & pro corpore parvitate majusculum: cujus plumæ, quæ ſuperiorem partem à prima cervicis vertebra ad roſtri uſque initium exornant, breves ſunt, craſſæ, duræ, ſpiſſæ, colore luteo egregiè micantes, & ad inſtar puriſſimi auri, radiorumque ſolarium more reſpondentes: reliquæ, quæ mentum contegunt, molliores, tenuiores, & ex cyaneo mire virides, ut in Anatum maſculorum capitibus, dum lucidiſſimo ſideri obvertuntur, conſpicimus. *Roſtrum* quam Hirundini prolixius. Alarum pennæ forma Ardearum ſimiles ſunt, ſed tenuiores tantum, ac longiores; fuſcæ, inter nigrum, & ruſtum fulgentes: quæ una cum cauda in orbem expanſæ, rotæ ſimilitudinem exhibent. Etenim planè immobiles ſunt, & veluti inſixæ quædam ſpicula cuti adhærent. Cæterum minores quoque aliæ pennulæ, eæque profecto haud paucæ juxta ſingulas majorum pennarum, quæ alas conſtituunt, origineſ, exoriuntur, quæ ſupra majorum principia extenſæ, ea obtegunt, dimidio quiſquiliatæ, ruſfæ, coccineęve, cætera crocæ, & fulvo auri colore ſplendide, multū mehercule gratiæ ac venuſtatiſ aviculæ ob eximiam illam & ſingularem colorum diſparitatem conciliant. Corporiſ reliqua moles tota penniſ fulviſ


in ruſſum vergentibus obducitur, ita tamen ut aliquid adhuc inter eaſ diſcriminis advertaſ. Nam quæ in pectore & ventre collocantur, & frequentiſſimæ ſunt, & pariter latiſſimæ duorum triumve digitorum amplitudine fulvo ſunt colore, & eo quidem nitidiſſimo, haud ſanè alio quam jecur ipſum ſplendentes. Quæ verò dorſo inſiguntur, rariores, neque ita frequentes ſunt, atque inſuper ampliſ diviſuriſ pennarum omninò Ardearum tergo adhærentium ſimilitudine hiant: neque etiam ad tam inſignem latitudinem accedunt: aut præſtatem illum hepatis colorem adæquant, quinimo puniceo potius colore, carni æmulo, obſcuriore etiamnum reſcent. Fila illa gemina quæ dorſo annectuntur, quodammodo nigra ſunt.

Alteræ caput habebat album ſerè, maculiſ luteiſ, aureiſque perfuſum, oculos pariter luteoſ, cilia rubicūda, roſtrum inter luteum, & viride medium, duoſ digitos longum, in ſupina parte quammodo recurvum; *linguam* rubicundam, longiuſculam, acutam; Picorum haud planè diſſimilem ad lancinanda animalcula perquam idoneam. In pectore aliquo pacto rubeſcebat. Venter, dorſum, & alæ candicabant, hæ tamen ſuperius ubique, & in fine erant ferrugineæ. Dorſum primo ad flavum quodammodo tendere videbatur; poſteaquam vero uropygium attingit, ad rubicundum, ſeu ferrugineum colorem vergebat. Alarum longitudine, utpote, quæ quinoſ palmoſ adæquant, primam ſpeciem ſuperabat. Caudæ pennæ, ubi dorſo inſeruntur, candicabant: cætera ferrugineæ erant. Ejus duæ pennæ reliquaſ duorum palmarum longitudine vincebant, & reliquæ etiā quam in prima longiores aderant. Carebat hæc avis geminiſ illiſ filiſ, quæ omniſ eſt dorſo enaſci ſupra dixi: quare vel itineriſ longitudine, vel temporis vetuſtate decidiffe ea judicandum eſt, non autem fœminam ideo dicendam, ut perperam vulguſ hætenuſ ſibi perſuaſit. Duarum vero longiſſimarum illarum pennarum fortaiſſis ad velociorem motum uſuſ fuerit.


Ter-



Monucodiata Aldr.




Monucodiata z Aldr.




Manucodiata longa.



*Paradisea auis
Maioris generis
Clus*



*Rex auium paradysea-
rum Clus*



Tertiam ob corporis longitudinem *Hippomanucodiatam*, quoniam longiorem videre mihi nunquam contigit, appellare placuit, quæ videlicet à principio rostri ad caudæ, & alarum extremitatem tres dodrantes longa erat; & ad duos palmos, cum alæ complicatæ sunt, lata. Rostrum erat satis aduncum, in supina maxima parte, tres digitos longum, in inferna vero paulo brevius. Tota vero avis erat alba præter nempe collum, & ventrem, quorum color est castaneus. Superior capitis pars ferruginea, quem colorem flavus excipit, ut hunc viridis. Propè dorsum pennæ admodum prominebant longitudine duorum, vel trium digitorum. Erat præterea unicum duntaxat Avi filum, idque asperiusculum, & admodum flexibile, quare alterum casu quodam amissum fuisse existimare debemus.

Quarta à rostri principio ad alarum extremitatem usque commensurata duos dodrantes explebat. Rostrum pro corporis exiguitate longissimum, nigrum, & quodammodo aduncum. Capitis, colli, & alarum pennæ nigrescebant, ubi tamen rostro adnectebantur, flavescebant. Cirrhum propè cervicem tres propemodum digitos altum habebat, rigidum, coloris flavi, quique ex setis potius, quam peninis constare videbatur, atque eo maxime à subsequenti *Manucodiata* differebat.

Vltima magnitudine est *Turdæ*, miræ levitatis, alis oblongis prædita, teneris & visui perviis, & pennis (si pennæ dici possunt potius quam setæ: deplumes enim sunt) duarum longis, angustis, nigris, duritie corneæ; pedes nulli, perpetuo volat, nec usquā quiescit, nisi in arbore aliqua, longis illis setis ramo implicata pendens. Nulla navis tam celeriter pergit, & tam procul à continente, quam nō circumvolet.

Huc *RHYNTACE* Ctesie pertine re videtur, quæ ovi magnitudine, galinacei fortè, in Persis nascitur. *Hesychio* & *Phavorino* avis est quam *ἡλικὸν πεγίσηρα* id est columbæ magnitudi ne. Nonnullis *Pluvialis* avis dicitur, nec solido cibo vescitur.

CAPUT II.

De Avibus Daje, Guitguit, Maja, Xochitenacatl, & la-jauhquitototl. &c.

Americanis nominibus utimur, quia de Exoticis nos acturos recepimus. Possent & Latina imponi, quod *Nieremberg* fecit; sed metumus, ne *Lectoris* iudicium turbetur. Unicusque ad sua genera unamquemque revocare licebit. Avis *DAIE* columbam non excebit. Nidum quatuor spithamas altum, locis sabulosis, cauda ac pedibus excavat. In eo ova perimbres anserinis majora, & pugnum ferè lata, quinquagena plurave, citra ullum albumen, crassæ & pinguis substantiæ, ponit. Excluduntur hæc citra incubantis parentis opem atque teporem. Exclusi pulli statim evolant. Avis est commodè edulis. Ova atla coctaque boni & pinguis sunt alimentum; trixa mali & concoctu difficilis.

GUIT GUI minima est avicula, *Regulo* similis, viridi colore, & suavi nutrimento. Ea est naturæ rerum *Nieremb.* vis, ut hæc tanta avis ac ferè nulla, *Natura* *Exot. l. 10.* *c. 6.* deat persequi corvorum examina, eosque cogat ubilibet latitare, & se adversus illam in arundinetis tueri. *Corripetam* *Nieremberg* dixit.

MAIÆ colore fulvus est, & in colli postica parte caput (dictu admirandum, & nulli alii animali concessum) ventriculus, primumque nutrimenti receptaculum, si *Authoribus* credendum. *Gregatim* in *Cuba* volant, & *Idem lib.* *Oryzæ* cujus maximus apud eas generis *c. 7.* proventus, fata devastant. Cedunt mensis, & grati multique nutrimenti esse dicuntur.

XOCHITENACATL columbæ est par, rostro crasso acuminato & nigro, *Oculis* nigris, iride luteâ, alis caudaque albo & nigro colore variatis, tæniâ nigrâ à rostro ad dextrum usque pectoris procedente, alis verò circa priores partes etiam luteis, ac universim reliquo corpore pallenti, si demas

pedes & crura quæ fusca sunt, & ungues ipsos, qui ex albo non nihil pallescunt. *Vivit* juxta arbores floridas, quarum melligine *viçtitat*. Educat sobolem, habeturque à Tototepocensibus apud quos est frequens, maximè.

Idem l. c. c. 10.

JAIAUQUITOTOTL corpusculo sturnum æquat. Viridi, cyaneo, fulvo & cinereo variegatur. Dum illi ab extrema cauda pennæ prodeunt reliquis longiores, priori parte depiles, in extremitate cyaneis ac nigris ornatæ pilis. Videtur ad Passeres Indicos referri posse.

C A P. III.

De Avibus Tuputa, Tentzon tototl, Tritono, & Hoactzin.

Nieremb. Hist. Nat. Exot. l. 10. c. 14.

INsolens in TVPVTÀ natura. Vivà tota vermibus farcitur. Hos pro carne habet, his singula membra imbuta: præter hos & pellem nihil carneum. Cutem non perforant densis exornatam pennis. In carectosis & herbosis locis versatur, ad proceras arbores nauscat. Hæc ab Hernando habemus, si eximiaz fidei is author est.

QVAPACHTOTOTL octo uncias longa est, ac totidem cauda; Rostrum è cyaneo nigrum, longiusculum incurvumque, oculi nigri, iris alba; pectus cinereum, ac inde ad caudam usque venter niger, cauda ex nigro fulvescens, alæ verò collum atque caput fulva. Risu humani est emula, hinc Ridibunda quibusdam. Et propterea inauspicati ominis infamia Indis erat infensa.

TENTZON TOTOTL appellatur avicula Passere minor, colore fusca, pilis quibusdam ad rostri radicem circumcirca propendentibus, barbæ instar. Inde nomen usurpavit.

Nieremb. l. 10. H. N. E. c. 34. **TRITONVS** pulcherrima, & mirifico colorum ornatu variegata proditur, Patria ipsi Hispaniola. Tribus vocibus canit. Scilicet pænè indivisibilibus modulis variat cantum, ab avita voco in alias subitu dilapsa, ut videatur unâ omnes edere, unoque spi-

ritu multos formare tonos, tanquam si à tribus gutturibus fabricarentur.

HOACTZIN Gallinæ Indicæ ferè est magnitudine, rostro incurvo, pectore candido in luteum inclinante, alis caudaque maculatis per intervalla pollicis, colore candido & pallenti, dorso ac suprema parte colli fulvis, sed utrisque in fuscum colorem inclinantibus, præterea etiam & temporibus usque ad rostrum & oculos. Vnguibus nigris, ac fuscis cruribus. Gestat cristam è plumis è candido in pallidum colorem vergentibus, sed dorso earum nigro. *Vescitur* anguibus. *Vivit* in calidis regionibus, qualis est Yautepecensis, magna ex parte arboribus juxta flumina confitis insidet. Apparet Autumno. *Vox* ei magna, & ululatum quendam repræsentans. Inauspicata ab incolis habetur. *Vsum in Medicina* invenit. Ossa dolorem cujusvis particulæ humani corporis lancinatione sedant. Suffitus quoque plumarum, mentem restituit his è morbo aliquo eâ parum constantès evasere. Pénarum cinis intra corpus sumptus, morbo Gallico affectis operâ mirabili medetur.

CAPUT IV.

De Ave Emeu.

AVem Emeu seu Eme Clusij potius verbis, qui eam accuratissimè descripsit, quam meis depingere malo. Hæc, inquit iste, dum surrecto capite incedebat, quatuor pedum, & aliquot unciarum altitudinem excedebat: nam collum à summo capite ad dorsum initium tredecim pænè uncias erat longum, ipsum corpus binos pedes latum, femora cum cruribus usque ad pedum inflexionem decem & septem uncias longa; corporis autem ipsius longitudo à pectore ad Vropygium trium pedum fermè erat. *Penna* seu veriùs plumæ totum avis corpus cum infima parte colli, dorso & pectori proximâ, atque femora regentes, perpetuò erant geminæ, ex eodem parvo brevique tubulo prodeutes, & sibi invicem incumbentes; supernâ quidem paulò crassior, infernâ verò tenuior,

nuior, & delicatior, illæque variæ longitudinis, ut in similis avis exuvio, quod Christianus Porretus Leydenſis pharmacopæus diligentiffimus, habebat, obſervabam. Quæ enim in infimâ colli parte breviores erant, quæ in medio corpore & lateribus longiores, ſex videlicet aut ſeptem unciarû, quæ autẽ in extremo corpore circa oropygium (nam caudâ carebat) novem uncias longæ, & reliquis durioreſ. Quamquam omnes duræ aut rigidæ, attamen non latæ, ſed anguſtæ, & rarioribus lateralibus pilis ex adverſo ſitis præditæ, nigri coloris, quæ tamen circum femora ad cinereum ſerè tendētiſ, nigro permanente nervo, ut in reliquis: eam verò formam, & ſitum habebant illæ plumæ, ut à procul aſpicientibus non plumis ſed villis duntaxat teſtum ejus avis corium exiſtimari poſſit, quale uſinum eſt, & alis carere, tametſi alas haberet, ſed ſub plumis latera tegentibus latentes, & quatuor majoribus pennis nigris præditas, ut in exuvio obſervabam, tametſi illæ abruptæ eſſent, nec de illarum longitudine certî aliquid pronuntiare poſſim; caules tamen contraſti ſatis craſſi, duriq; & ſolidi erant, atq; in extimam alæ partem altè penetrabant. Alæ verò pars ſuperior corpori contigua pennas ſive plumas veſtitrices, illis ſimiles, quæ adhuc in peſtore retinebat; ad hoc enim datas hujusmodi alas cenſendum, ut currentem adjuvent, quia hanc avem non eſſe volucrem, nec à terrâ tolli poſſe arbitror. *Cruca* in ambitu quinque unciarum craſſitudinem ſuperabant, crebrisq; corticibus ſeu ſquamis latis teſta erant, præſertim ſupra pedis inflexionem. *Pedes* habebat craſſos, duros, tribus craſſis digitis præditos, pronâ parte velut ſquamis teſtos, ſupinâ prorfus calloſos: quorum medius, qui reliquis longior, tribus articulis conſtabat, interior uno, exterior binis. Omnium *ungues* valdè magni, binas pænè uncias longi, craſſi, duri & cornei: Ejus *caput* exiguum pro avis magnitudine & ſerè glabrum, coloris ex atro cærulei cum colli ſupremâ parte, in quo apparebāt

rari pili nigri: oculi paullo ſupra roſtri fiſſuram magni, ardentes & truces, leonis oculis pænè ſimiles, quos cingebant nigri pili, quemadmodum & meatus illos aurium parvos & detectos, quos pænè oculos habebat. *Roſtri* prona pars quemadmodum arcuata erat. paulloq; ſupra mucronem binis foraminibus, narium uſum præbentibus, prædita: à cujus medio ad capitis uſq; verticem porrectum diadema aſſurgebat corneæ ſubſtantiæ, tres ſerè uncias altum, coloris ex flavo fuſci, quod cum plumario deſluvio cadere, & cum plumæ renaſcuntur, novum creſcere intelligebam. Supina roſtri pars, ab ejus ſciſſurâ ad extremum mucronem quinque uncias longa. Anterior colli pars quatuor pænè uncias infra roſtrum, bina velut membranacea palearia, ſeu barbulas, propendentia habebat duas uncias longa, coloris rubri miniati. Poſtea ſimiliter colli pars deplumis, à capite ſecundum longitudinem rubri miniati coloris erat; deinde infirma ejus pars aliquot rubris plumulis, quibus nigræ intermixtæ teſta. Cæterum tametſi hæc avis aliquas notas habere videatur cum ſtruthiocamelo communes, velut exiguum caput, naturâ pænè calvum, quodque ſine delectu vorat quidquid objicitur. *Pedes* tamen biſulcos non habet, ſed tribus digitis præditos, ut antè diximus, ſine calcari, otidis ſive rãdæ pedum modo: ideoque adeò firmos & robustos, ut in illuſtriſſimi Comitæ horto, (quæ cum ipſo Comite ingreſſus eram ut avem conſpicerem) arborem humani femoris craſſitudinem equantem prorfus contuſam viderim, & ejus corticem ſublato ab hujus avis, comite, id aſſerente, pedibus & unguibus: etenim non roſtro antrorſum, ſed oblique ſe convertens, averſis retrorſum pedibus, eos, cum quibus pugnabat, impetere ſolebat.

Licet verò quæcumq; objicieban- *Victus.*
tur voraret, ut aurantia mala integra, & ſimilia: ordinatius tamen ejus *cibus* erat ſimilagineus, ſive primarius panis, quem in magna craſſaq; fragmenta diviſum, objectum vorabat, maxime

enim recentibus gallinarum ovis delectari intelligebam, quæ integra cum ipsa testa glutiebat, si autem parum firma esset valetudine, illa ipsa integra per anum rejiciebat, deinde rursus ea vorans retinebat & concoquebat. Mihi autem affirmabant, hanc avem fuisse marem, & ex posticâ parte penem, cameli instar, interdû exereere esse conspectum. Audio porro, illas naves quæ anno à Christi natalitate millesimo sexcentesimo tertio ex Moluccis in Hollandiam redibant, binos simul aves quidem attulisse, sed in itinere mortuas projecisse; tamen si earum exuvix sive coria, ob raritatem, conservari potuissent: illius avis aliquot ova nihilominus relata certè terna aut quaterna eodem anno Amstelredami conspiciebam à mercatoribus redempta, & paullo etiam antè unum Leydæ apud Porretum videbam, omnium, mea opinione, maximum & pulcherrimum: dimens enim per longitudinem ambitus, quindecim unciarum erat; per transversum autem, duodecim, aut paullo amplior, ut propter amplitudinē pro quodam vase non minus haberi posset, quàm struthiocameli ova, quibus, teste Plinio, veteres nonnunquam utebatur, & adhuc nostra ætas ejus rei gratia usurpat; nam non semel videri memini struthiocameli ova argento excepta & inclusa, poculorum vicem præbere. Hujus tamen avis *ovi* testa non erat valdè densa, nec alba veluti ovorum struthiocameli, sed extrema parte virescentis ex cinericio coloris, & perpetuis, saltem creberrimis, quasi tuberculis satura viriditate præditis ornata: illorum autem qua Amstelredami conspiciebam, unum ejusdem pænenè erat cum illo magnitudinis, formæ & coloris, quædam verò magis orbiculata, aliqua minora, nonnullorum etiam color dilutior, & minus elegans. Porro mihi relatum, hujusmodi aves Moluccarum insularum non esse peculiare, sed etiam in Sumatra sive

Taprobana, vicinoq; illis insulis continente reperiri.

* *

CAPVT V.

De Avibus, Xochitototl,
& Auris.

XOCHITOTOTL, forma æmulatur passerem nostrum, multicolor est penna, pallet, nigrescit, candet: partim quoque est fulca. Ubiq; incola. Vermiculis & exiguis seminibus ^{Nieremb. l. 10. c. 41.} vescitur. Ex arborum ramis nidum ^{Herrera Decade 3 l. 3. c. 9. Historia Novi orbis.} construit pendulum. Ibi incubat ovis. **AURA** aliis Gallinassa aut Gallinasso, in maritimis locis Zamuro, Peruianis Suguntus, Mexicanis Tropicotl, dicitur. Corvinum est genus, & ad magnitudinem Aquilæ accedit, quibus vix Gallinas superat. Color illi niger, Rostrū Pittaci instar. Frons depilis plicatuli cute obtegitur, circumstant pili rari & nigri similes Æthiopum. Crus habet fuscum. Aduncum unguem & atrum. Hornandes incertæ originis esse credit, nec sciri ubi nidificent & educent prolem. Frequentissimas omnibus Hispaniæ novæ angulis hodiè scimus. ^{Pernoctant} in arboribus & rupibus, manè advolant ad urbes, & ab editioribus locis plateasq; eculantur.

Quicquid immundum est aut exa- ^{Victus.} nime devorant; nec à stercore humano abstinere, sæda ingluvies famosæ.

Pullos A costa albos esse scribit; a- ^{Partus.} dolescentes in corvinam nigredinem degenerant.

Gregatim volant, & sublimipetæ ^{Volatus.} sunt. Nec clamant, nec canunt raro murmure contentæ. Ingratus ab eis odor. Si quis insequatur, exonerant se ut leviores volatui sint, pari festinatione evomendo quicquid glutierunt.

^{Vsum} invenere in Medicina. Caro si ^{Vfus.} edatur, Gallicum morbum juvat. Pennæ exustæ cinis vetat pilos nasci, æquè ac sterco formicarum, vulnera quoque medicatur. Stercus drachmæ unius mensura potatum prodest melancholicis. Cor sole exsiccatum impensè odorum est. In aliquibus Provinciis lege lata poena infligitur occidenti has aves. Reginam Aurarum.

COZ.

Pica Brasilia
Toucan Xochi:
Tenacatl



Pua Bras.
alia.

Altera Xochi
Tenacatl.



Emeu Nieremb.



Emeu
Chus.



Anser Magella-
nicus


Gall. pergrin.
Chus.
Cygn. Cucu-
latz Nieremb.
berg.



Mergus arti-
Chus.



Ourisia S. Tomincio. Nieremb.



Skua
Hoieri.



De Laet. l. 5. India Occid. c. 4. COZQUAUKTLI Indi vocant. Accedit magnitudine gneſiſ Aquilis, alii gallinæ Ægyptiæ parem faciunt.

Nieremb. H. Exot. bel. 10. c. 56. Corpus univerſum præter collum & eas partes quæ juxta peſtus ſunt, ex nigro purpureſcens, fulvum eſt ac pullum. Alæ circa exortum nigræ, cætera cinerea; deſuper verò mixtim fulvæ nigræ, & nonnihil in purpureum vergentes. Roſtri extrema (quæ Pſittaci eſſe judices, tam eſt indiſtincta ſimilitudo) alba ſunt. Cætera ſanguineo colore tinſta. Amplum eſt narium foramen, oculi nigri, iris fulva, rubæ palpebræ, frons ſanguineo colore perſuſa, ac plicatilibus rugis torva, quas tamen nonnunquam explicat, qua in re vocatos Gallo-pavos æmulari videtur, & pilis quibusdam veluti retorridis rariſque. Æthiopum pilis haud abſimilibus. Cauda eſt Aquilæ, infernè cinerea, foris verò nigra. Crura rubra, ungues unci.

Locus & Viſus. Indigena eſt Mexicanæ provinciæ. Anguibus, muribus, lacertis, ſed morticinis maximè & humano ſtercore *viſitatur*. Sublime *volat* & nimium extenſis panſis que alis, vix volatum intermittens. Vi incredibili obſiſtit ventis, contra nititurque adverſantibus, eiſdem ſedibus perſtans immobilis. Unde ipſi apud Mexicanos nomen.

Viſus. Caro eſt inutilis, nutrimento, quantum compertum eſt, à nomine, niſi *Medicina* gratia deguſtato. Audio, inquit Author noſter, huius avis plumis ad motis mæderi Indos ulceribus, carnisque elixis durante affectu devoratis; quas etiam ajunt morbo Gallico præſentaneo quodam remedio mæderi.

CAP. VI.

De Avibus Garagay, & Quetzaltototl.

Nieremb. H. Ex. l. 10. c. 57. GARAGAY quæ dicitur, avis eſt Grapax, Milvi magnitudine, capite ex extremitate alarum albo. Crocodilorum & teſtudinum ovis inferſa eſt. Odoratur illa ſub arena in ripis fluminum condita, eruit & vorat. So-

livaga eſt, niſi quòd Auræ aves cam ſequantur, ut potiantur furto, auro enim ſcalpere terram neſciunt, ut effodiant ova.

QUETZALTOTOTL, criſtata eſt picæ columbæve magnitudine, pavoninis magna ex parte plumis ornata, roſtro incurvo & luteo, & pedibus nonnihil luteis, caudâ t̄zanatl plumis prælongis veſtita, atque virentib. *Descriptio.* tidisque pavonini coloris, iridis foliis formâ ſimilibus, opertisque, alis ſuperne nigricantibus, infernè verò, & quâ parte pavoninas attingunt, quæ in medio ſunt, inclinantibus in viro- rum, quali cavente natura meliorum pulchritudini. Criſta conſtat plumis ſplendentibus pulcherrimis, peſtus collumque infernè rubris & micantibus, ac pavoninis ſupernè, qualibus etiam tegitur doſum, nec non eę partes quæ ſubter alas ſunt, interque crura, ſed dilutis exilibus, & mollibus. Plumæ alarum prælongæ ſunt, virore tinſtæ diluto, & in acumen deſinentes. Pennæ regentes humeros vi- ſcunt, ſed ſubter ſunt nigræ, quæ verò alas interſtant, nonnihil incurvæ ac unguium colore.

Vivunt in provincia Tecolotlan ul- *Locus.* tra Quauhtemalan verſus Honduras. *Nernandes* Loca aprica amant, nec compertum in *Parali-* cicurari vel ali in domibus voluiſſe. *pom.*

Vieſcuntur vermiculis, pineiſque quibusdam ſylveſtribus, ex his quas Mexicanis matzatli vocare conſueverunt. Arbores excavare, & in earum cavitatibus ſobolem educare dicuntur. *Sonitum* proferunt Pſittacis non admodum diſſimilem: verum ſibila edūt alacria, ter de die, manè, meridie, & ſub occaſum Solis ceciniffe obſervatum eſt.

Agminatim *volant*, & viſco hærentes ne plumis detrimento ſint, non contorquentur, quaſi naturæ duæ divitiarum ſuarum cognitionem haberent. *Volatus.*

Et ſanè maximi plumæ apud indi- *Viſus.* genas habentur, & aurum precio ſuperant. Longiores ad criſtas & cætera corporis ornamenta, cæteræ ad textilia opera uſurpantur. Plumis captas exuere, nudas dimittere dominis, quibus

quibus loco prædiorum sunt, & ad heredes transeunt, licet, ne quisquam occidat, cavetur. Verè Reginam plumarum dixeris.

CAPUT VII.

De Avibus Tzinitzian, Totoquestal, Avemontana, & Longa.

Nierberg. H. Exot. l. 10. c. 65. **T**ZINITZIAN parva est avis, columbæ pæne par. Rostrum habet breve incurvum & pallidum. Columbinum caput & collum, sed quæ plumis virentibus ac nitidis vestiuntur, pectus & ventrem rubæ, præter partem caudæ proximam, quæ cyaneo candentique colore promiscuè tingitur. Caudam supernè virentem, infernè nigram. Alas partim albas partim sub nigro-atras. Crura ac pedes cinereos. Vivit in calidis juxta Oceanum Australem, vescitur fructibus. Alitur in caveis. Ex plumis miræ subtilitatis imagines intexunt indigenæ.

De Laet. Ind. Occid. l. 7. c. 4. **TOTOQUESTAL** columbina magnitudine minor est, viridis omnino. Caudæ pennæ longissimæ sunt, magno pretio habitæ & receptæ in commerciis. Depilata dimittebatur. Capitis reus erat qui occidebat.

AVIS MONTANA Indis Tepetototl, & Tecnecholi, Hispanis Phasianus, anseris est magnitudine, colore nigro splendenti, plumis tamen nonnullis infernè candentibus, circa caudam in postremis alis, cruribus pedibusque cinereis. Rostrum incurvo partim cinereo partim luteo, ac circum radicem velut tumenti, plicatili cristâ, oculis nigris, sed iride pallenti.

Alitur frumentaceis frugibus aliisque similibus. Mite animal. Nam apprehenso domesticorum pallio cibum exigit, & clausam januam ubi aliquo intrare opus sit, pulsât. Horum si liberum sequitur, reducem cum applausu excipit.

Edulis est ac pinguis caro, nec dissimilis illi chortalium Indicarum.

AVÈ LONGAM Indi Hoitlallotl dicunt. A rostri acumine ad caudæ us-

que exortum, quæ spithamam quoque longa est, dodrantem prolixa conspicitur. Rostrum desuper nigrum, subter verò cinereum, quadrantem longum ac mediocriter crassum. Cauda virens sed pavonino splendore. Plumæ totius corporis ex albo fulvescunt, fulvescuntque propè caudam è nigro: sed quæ corporis vestiunt superiora, nigrae sunt maculis candicantibus confersæ. Calidis regionibus vivit. Humipeta est, ac modici volatus, sed ad perniciem cursu, ut equorum velocissimorum agilitatem longè excedat.

C A P. VIII.

De Cygno Cucullato Clusii, seu Dodone Lusitano-rum.

CYGNUM Cucullatum, seu Gallum gallinaceum peregrinum Clusij, *Clusius Exot.* (Hollandi *Balghevogel*/seu nauseam moventem avem vocât) Mauritii insulæ, quam Lusitani Ilha de Cirne dixerunt, debemus. Magnitudine cygnum superat aut æquat. Caput habet magnum, membrana cucillum referente tectum. Rostrum crassum, oblongum, parte capiti proxima subflavum, extremo mucrone nigrum. Prona pars adunca est & curva, in supina quæ subcærulea, macula mediam partem inter flavam & nigram occupat. Raris & brevibus pennis tegitur. Alarum loco quaternas & quinas duntaxat longiusculas nigras pennas habet, posteriore corporis parte, quæ præpinguis & valdè crassa, pro cauda quaternæ aut quinæ crispæ convolutæque pennulæ cineracei coloris conspiciuntur. Crurum quæ crassa potius quàm longa, superna pars genu tenuis nigris pennulis tegitur, inferior cum pedibus subflavi est coloris. Pedes in quatuor digitos dividuntur. Terni longiores antrorsum spectant, quartus brevior retrorsum conversus est. Omnes instruuntur unguibus. De Cruce ejus genu tenus rescisso, ita Clusius. Erat, inquit, non valdè longum, sed à genu usque ad pedis inflexionem paulo

paulò plus quam quatuor uncias superabat: ejus verò crassitudo magna, ut cujus ambitus ferè quatuor uncias æquabat, crebrisque corticibus seu squammis tectum erat, pronâ quidem parte latioribus & flavescentibus, vero supina minoribus & fuscis. Pedis etiam digitorum prona pars singularibus iisque latis squammis prædita, supina autem tota callosa. Digni satis breves pro tam crasso crure. Nam maximi sive medii ad unguem usque longitudo uncias binas non admodum superabat, aliorum duorum illi proximorum vix binas uncias æquabat, posterioris sescunciam: omnium verò ungues crassi, duri, nigri, minus uncia longi, sed posterioris digiti longior reliquis, & unciam superans. In unius ventriculo lapilli inventi sunt, unus planus & orbicularis uncialis magnitudinis, alter inæqualis & angulosus, in maris littore lectos & devoratos verisimile est. Herbertus cū Lusitanis Dodonem vocat, & unam capitis medietatem ferruginei coloris plumis tegi, alteram nudam esse, addit.

Herbert.
in Itinera-
rio.

C A P U T IX.

*De Avibus Ceoan, Cenotzqui
& Pauxi.*

Ceoan seu avis nivea turdo viscivocro paulò major est. Circa pectus ventrem atque alarum exortum fulvescit, permixtis ad caudam cinereis plumis. Alarum extrema caudaque ipsa cinerea sunt, supernè verò universum corpus è fusco nigrescit. Rostrum quod parvum est atque exile, cruraque fulvescunt. Mentum candet, insertis tamen aliquot nigris pennis. Sermonem humanum æmulatur, veluti irridens transeuntes, quos tamen ubi licet, insequitur.

Avi CENOTZQUI seu evocatriei nivium dictæ color illustris variatione. Pectore fulvus, crure pallidus, ungue niger, ventre notis candidis & atris permixtus, sub finem albis notis conspersus, cauda subtus niger & candidus, super fulvo nigrore ma-

culatus. Caput nigrum est fasciâ cinctum cinerea. Rostrum parvum cinereum supernè atque infernè, sed supernè juxta exortum linea ambitur lutea. Quovis cœlo gaudet, montana colit, & roris tempore sobolem educat. Antequam ningat clamat, postea silet. Ita convolvit huc & illuc caput, contorto in varias partes collo, ut eodem situ immota perstans, cuncta circumspiciat.

PAUXI gallinaceum æquat aut superat. Nigra est, maculis nonnullis albis & nigris perspersa, collo nonnihil provento, capite amplo, quod aliis cristatum, aliis pro plumea crista lapidis aut globus insurgit, (lapidem vocant, licet non nimis durus) ovo similis aut major, ferruccineo colore, Hernandus tumorem quondam radici rostri affigi, qua parte est tenuior, pici firma, lapidis duritia, & caruleo colore, scribit. Alitur frumentaceis feminibus & libenter mansuefit.

Huc pertinet alia Avis Ciconiæ magnitudine, colore cinereo. Cristam gestat uncias octo longam, è multis subjectis aggeratam plumis ejusdem coloris, & in amplitudinem orbicularem, præcipuè circa summum dilatatis atque excrecentibus. Visam in horto Hispaniarum Regis descripsit Hernandus.

C A P U T X.

De Avibus Picicitli, Polyglotta, & Chicuatli.

Picicitli avis est parva. Cinerea tota nisi capite & collo, quorum utrumque nigrum; solum oculos nigros candens ambit macula. Est ignobilitate quadam originis nobilis. Nesciunt adhuc Tetzcoquenses ubi fatificet. Murta est. Educatur domi, brevi perit. Palato & stomacho est acceptabilis.

POLYGLOTTA quam Indi Cōcontlatolli seu quadringentas linguas vocant, sturnum non superat. Subtus albescit, superiore parte fusca, pullis & candentibus intermixtis pennis, maximè ad caudam & caput, quod imagine quadam coronæ argenteæ re-

Z dimi.

dimitur. In caveis ad blanditias auditus, ad ostentum naturæ servatur. Vincit omnes aves suavitæ & arbitrio gutturi, nullius non imitatur, nullius non superat. Calidas regiones amat, temperatas tolerat. Contenta est quovis cibo. Similis ei est Tzapan. Aliqui suspicantur fœminam esse ejusdem speciei, paribus magnitudine, cantu, formâ, nisi quod plumæ infernæ albæ sint, cineræ & nigræ: superne, pullæ, nigræ, albæ.

CHICUATLI nostratem rusticulam exæquat. Rostro est longo, tenui, & pullo, ac tæniis juxta utrumque oculum luteis & incurvis. Inferiora corporis pallida sunt, nigris quibusdam plumis circa collum interfertis. Iris lutea, ac nigri oculi. Cætera ex fulvo, fusco, & cinereo permixta. In montibus versatur. Calidis frigidisque regionibus capitur. Pane & vermiculis alitur. Humipeta est, & in vimineum alteriusve materiæ conjecta carcerem, haud vulgariter garrit. Pingue & non omnino aspernandum præbet alimentum.

CAPUT XI.

De Avicula Tominejo.

Gomara
Hist. gene-
ral. Indiar.
c. 194.
Oviedus
Hist. ge-
neral. l. 14.
c. 4.
Augustin.
Cerato Hi-
stor. Perua-
na l. 1. c. 5.
Lerius in
Historia
Brasilie.
Thevet.
singul.
Franc.
Antar. c.
48.
Joseph. A-
costa Hist.
Natur. &
Mor. Ind.
l. 4. c. 37.

Mira sunt, quæ de Avicula, quam Hispani Tominejum, Indi Hoirzi tziltototl, ut Hernandes scribit, Huitzitzil ut Ximenes, Vicicilin ut Gomara, Quenti ut de Laet, Brasilienses Gyonambuah, ut Lerius & Thevetus testantur. Oviedus Passerem molitum vocant, produntur. Tam parva est, ut quidam ei magnitudinem crabronis, alii cicadæ, nonnulli extremi pollicis articuli, & evulsis pennis vix dimidiæ ejus partis, alii scarabei Lucani assignent. Oviedus in monetaria trutina qua aurum appendi solet cum nidulo suo positam, bina tantum pondera. Acosta unum duntaxat dicit, Hispanis Tominos dicta, id est XXIV. grana, unde Tomineii nomen, pependisse vidit. Capitis & colli plumæ miram elegantissimorum colorum quocunque obvertas varietatem præsentant. Pectus igneum quen-

dam auro splendidiorem inprimis. Reliquum corpus sub cinericium est. Oviedus nigerrimum colorem tribuit. Rostrum habet oblongum, illudque acus quæ vestes farciuntur, exilitate. Linguam rostro duplo longiorem. Pedum & unguum exilitate, cum illarum avicularum pictura, quæ ornatus gratia in librorum marginibus interdum adjici solet, comparari potest.

Invenitur in Peruanis montibus & Brasilia. Melle, rore, & florum succo alitur. Rosæ tamen non insistit, at in præalto milio quod Auati ab incolis dicitur, & aliis similis magnitudinis plantis insidet.

Duplex earum proditur origo. Nam aliæ quidem ex ovis excluduntur uti reliquæ volucres. (Construunt autem è xyli flocco nidos) aliæ, quod haud dubio fabulosum, ex muscis transformari vulgò creduntur. Sunt qui dicunt visam esse partim muscam partim avem: primum ejus colorem nigrum, mox cineraceum, deinde roseum, tandem rubentem. Nullus Hispanorum cantus mentionem facit. Soli Levius & Theretus Galli valde canoram esse, & in cantu adeò assiduum ut nemo qui non audiret & cōspiceret, ex tantillo corpusculo tam suavem & sublimem cantum prodire posse sibi persuaderet.

Volat celerrimè, editq; inter volandum quendam instar apiculæ strepitum, ut apīs magis quàm avis videatur. Non diutius, quod maximè virum, vivit, quàm flores herbarum durant superstitēs, postquam marcuere, ad pinus aliasve arbores, quadam naturæ providentia sese confert, eiq; se rostro affixo servat appensam, donec sex plus minus quam transactis mensibus, ac decidentibus jam pluviis, vernantibus agris, denuò revirescat, similes vices pluries subitura. Gomara exspirare mense Octobri, pedibus ex aliquo ramo appensam aprico loco; renasci autem Aprili scribit. Hinc Renati nomen. Servata est sæpius avis affixa stipiti intra cubiculum, & cum sex menses exanimis jacuisset, quo tempore natura sibi comparatum est,

revi-

revixit, ac dimissa in agros volitat.

Quam Clusius describit, & Uru-
siam ac Tominejum vocat, an eadem
cum jam descripta sit, ignoro. Erat,
inquit, hæc avicula, ut ex pictura ob-
servabam, à rostri mucrone ad pennarum
caudæ extremitatem tres uncias
longa. Caput verò cum integro ro-
stro uncialis cum semisse erant longi-
tudinis: alæ ad extremam ferè cau-
dam porrectæ, parem habebant longi-
tudinem: dorsum vix unciam latum
erat, ejus & alarum color ex cinera-
ceo fuscus, ventris cineraceus. Pennæ
quæ in cauda obscurè rubescentes, earum
extrema pars nigra. Capitis, colli
gutturis plumæ elegantissimi coloris
ex auro rubro & flavo mixti, quæ Soli
expositæ, admirabilem varietatem,
prout obvertebatur caput, ostende-
bant: rostellum nigrum tenuissimum
& maximè acutum, pedes valdè exi-
les, nigri, quatuor digitis ut reliqua-
rum avicularum præditi, quorum tres
in anteriorem partem porrecti, quar-
tus in posteriorem. &c. Videtur ta-
men esse existis. Diversæ enim speciei
sunt istæ parvulæ aviculæ, & promiscua
nomina communicantur invicem. U-
rusia Solis radium significat.

Ajunt pulverem ejus intra corpus
sumptum epilepsiæ mederi. Pennæ
præsertim quæ in collo & pectore na-
scuntur, aureis staminibus à phrygio-
nibus intextuntur.

CAPUT XII.

De Avibus Cuntur, & aliis
quibusdam Insula Ma-
ragnana.

Cuntur avis est mole vasta. Visæ
quæ expansis alis xv. aut xvi. pe-
des occuparent. Pedes habet gallinis
similes, caret aduncis unguibus. Ro-
stro tam valido instruitur, ut eo vacci-
num tergus perforet. Plumis albis ni-
grisque mixtis ornatur. Cristam pa-
rilem instar novaculæ, & non serva-
tam instar gallinæ. Inter Carnivo-
ras censeridebent. Duæ illarum vac-
cam occidere & comedere valent,

nec ab hominibus abstinent. Non
modò ovem dilaniant, sed & juven-
cam. Pauciores sunt. Plures si reperi-
rentur, pecus universum in Peruvia
destruerent. In Insula Maragnana
quatuor inprimis occurrunt.

Prima quam Ouyra Ovassou (obser- De Laet,
va, barbaros Toupinambautios uni- Ind. Occid.
versas aves uno & communi nomine L. 16. c. 13.
appellare Ouyra five Ouyra) vocant.
Aquila est panè duplo major. Plumis
vestitos elegantissimis, Rostro valido,
Unguibus inprimis acutis. Visa pen-
na ex alis hujus avis extracta, quæ ul-
nam nostratam longè superabat, ele-
gantissimo colore, & rotundis macu-
lis distincta, instar Gallinarum quæ
ex Africa advehuntur. Tanti est ro-
boris, ut ovem integram abripiat at-
que dilaniet, homines faciliè proster-
nat, & nec à cervis absteineat.

Alter est Moyton seu Mouton pavo- Lerius in
nis nostratis magnitudine aut paulò Histor. Bra-
major, præaltà crista spectabilis, & per sil.
universum ferè corpus nigris albisque
plumis eleganter variegata. Carnes
illarum cibo sunt opportuna, & mul-
tæ ejus visuntur species.

Huic Toucan accedat, palumbi ma-
gnitudine; rostro oblongo atque lato,
ingluvie sub pectore tres quatuorve
digitos transversos lata, crocei colo-
ris elegantissimi & miniatis plumis
circa oras distincta, pectore candido,
dorso exquisitè rubente; alis atque cau-
dâ nigris, pulchra aspectu & carne pa-
lato admodum grata. Hujus & alia
species appellatur à barbaris Ovay-
cho, cui rostrum est paulò diversum
& è rubro flavescens.

Quartum, locum avi Ouru dictæ da-
mus, perdicis quidem magnitudine,
sed galli gallinæ in modum crista-
ta; plumis rubris, nigris atque candi-
dis insigni varietate. Sunt ibidem &
plures ejusmodi rapaces aves Aquil-
lis aut majores aut paulò minores,
singularis adhæc formæ, & plumis va-
riorum colorum elegantè distinctæ.

Sunt & quædam Perdicum forma,
sed majores paulò, cæruleis plumis
ornatæ, & cærulea ova ponentes. Ta-
ta Ouyra Ovassou, & Tata Ouyra mi-
ri, itemque Arou mara singula sunt

Z 2 colum-

Iohan. de
Laet. India
Occid. l. 10.
c. 5.

columbarum nostrarum magnitudine, sed singulari plumarum varietate & elegantia.

Iandou struthiocamelorum est species. Proceritate staturam humanam superans. *Salian* denique Turcici Galli magnitudine, rostro & cruribus ciconiæ, licet volare nesciat: tamen tam pertinaciter currit, ut venaticos canes effugiat.

CAPUT XIII.

De quibusdam Brasiliæ Avibus.

INter cæteras Brasiliæ aves, quarum alibi mentio facta & adhuc fiet, censentur *Guranhæ-engera*, *Tangara*, *Quereiva*, *Tucana*, *Guirapanga*, *Macucaguâ*, & *Mutu*.

de Laet. Ind. Occid. l. 15. c. 7.

GURANHÆ-ENGERA magnitudine est Fringillæ, tergo & alis cæruleis, pectore & ventre flavo, diademate supra caput flavo. Cæterarum ferè omnium cantum imitatur, & mille modis vocem flectit & mutat. Variæ ejus reperiuntur species, quæ omnes aviariis inclusæ summopere delectant.

TANGARA Passeris est magnitudine, colore nigro, capite subflavo, non canit. Epilepsiæ quia obnoxia creditur, ideò illius carnibus abstinēt barbari. Narrant iidem aviculas hæc inter se choreas ducere, & una mortuæ instar humi procumbente, inconditum murmur & strepitum edere. Hac confurgente, & eundem strepitum edente, omnes una avolare.

QUEREIVÆ totum pectus, pulcherrimo colore rubro tectum est, alæ nigro, reliquum corpus cyaneo. Propter exquisitam plumarum elegantiam maximi fit à barbaris.

TUCANA, quam Lærius & Thevetus vocant Toucan, picæ magnitudine, flavo pectore, reliquo corpore nigro. Rostro ingenti & minimum palmum longo, extus flavo, intus latè rubente. Cicuratur ita ut sub recto pullos suos excludat.

QUIRAPANGA est tota alba, & cum modicæ sit magnitudinis, stentoream

habet vocem, & quæ instar tintinnabuli, ad dimidiam pænè leucam exaudiat.

MACUCAGUA phasianæ avi non absimilis, Gallinas Europæas magnitudine superat, & triplici cute munita est. Ova quotannis bis tredecim aut quindecim ponit. Graditur quidem humi, sed perit ad conspectum hominum arbores. Largam delicatamque carnem habet. Multæ illius species reperiuntur, quæ capiuntur faciliè.

MUTU Gallinæ est species admodum domestica. Cristam instar galli, nigris atque albis punctulis interstinctam gerit. Ova illius sunt grandia, alba, & ita dura, ut inter se collisa instar ferri tinniant. Quare barbari Maracas suas ex illis conficiunt. Ossa illarum canibus sunt lethalia, hominibus nihil nocent. An eadem sit cum Moutone de qua superiore capite actum est, ex comparatione liquebit.

Huc pertinet *quedam ex rapacibus* magnæ molis & tam clamosa, ut ad dimidiam leucam audiat, tota nigra, pulchris oculis, rostro galli gallinacei, cui cornu impositum palmi pænè longitudine, quod iis qui linguæ vitio laborant, ad collum appensum occulta quadam naturæ vi mederi, experientia comprobatur volunt. Coronidis loco hisce *Bambiayæ* in Cuba insula frequentes accedunt. *de Laet. Ind. Occid. l. 1. c. 9.* Paullum supra solum feruntur magis quàm volant, ita ut incolæ ferarum instar illas venentur. Carnes costæ jus croceo colore inficiunt, saporis alioquin pergrati, & phasianarum avium æmuli.

TITVLVS II.

De Avibus Exoticis

Aquaticis.

CAPUT I.

De Passere stulto, & Ansere

Magellánico.

Passer stultus nomen ex eo accepit, *Nieremb. Hist. Exot. l. 10. c. 4.* quod manus apprehendentiū nec fugiat

fugiat nec timeat, admiratur solū aut stupet. Præter frontis partem rostro adjacentem, quæ cinerea est, palmipes, rostro tres uncias longo, tenui, obrotundo rectoque, sed propè extrema nonnihil incurvo, pedib. quoque qui ceterorum palmipedum sunt, & cruribus nigris, papillâ etiam nigrâ, & membrana oculos tegente in ambitu cinerea.

Vescitur pisciculis. *Voce* imitatur graculum. Magnitudine picam, formâ Larum. Nobilis est avium insulæ Mauritii mansuetudo. Appellentibus navitis perinde infident ac arboribus. Eadem securitas venatus est. Accedunt ac subeunt manus.

ANSER MAGELLANICUS à loco ita dicitur. Batavi fortè à pinguedine Penguinem vocant. Describam eum verbis Clusij. Marina est hæc avis, inquit, & ex Anserum genere, tamen si rostro dissimilis. In mari victitat: pinguis oppidò est, præstantis anseris magnitudine; nam adultiores in eo genere tredecim, quatuordecim etiam, sed decem interdum, juniores verò octo, decem & duodecim libras pendere observantur. Pronâ parte, nigris pennis tectæ erant. Supinâ & in ventre albis. *Collum*, quod crassum & breve habebant nonnullæ, albis pennis tamquam torque cinctum. Earum *cutis* crassa & densa inter suillæ. *Alarum* erant expertes, sed earum loco binas parvas coriaceas pinnas habebant, & latera tantquam parva brachia propendentes, pronâ parte brevibus, angustis & rigidis pennis confertim tectas, supinâ autem minoribus & rigidioribus, iisque albis, quibus nonnullis locis intermixtæ nigre; minimè quidem aptas ad volandum, sed quarum adminiculo velociter natarent. Maximâ enim ex parte in aqua *versari* intelligebam, & terram duntaxat petere fortificationis vel pullationis tempore, & plerunque quaternas aut quinas in una scrobe latere. *Rostrum* corvino majus habent, non adeò tamen elatum, & valdè brevem caudam, pedes nigros, planos anserinorum pedum formâ, non adeò tamen latos. *Erectæ* & sub-

limi capite incedunt, demissis in latera pinnis, tanquam brachiis, sicut procul intuentibus homunculi aut pygmaei appareant. Piscibus duntaxat *vesci*, referebant Diariæ; non ingrati tamen saporis esse illatum carnem, nec piscem sapere: scrobes verò valdè profundas in littore fodere, cuniculorum instar; totum solum adeò cavum interdum efficientes, ut per illud gradientes nautæ, sæpiusculè genutenus in eas scrobes inciderent. Hi sunt fortasse anseres, quos Gomara ait sine plumâ esse, nunquam è pelago prodire, plumæque loco villo longo protegi.

CAPUT II.

*De Avibus Iochualcuachili,
Xochitenacatl, & Tlauquechul.*

Avis quam Chillenses *Iochualcuachili* seu caput nocturnum appellant admirandi est opificii. Assurgit illi à rostri exortu corona quædam, aut orbis in tres divisus cuspides, superiori parte mediocriter crassus, & è luteo rubescens: ab anteriori alarum bini aculei contorti exeruntur. His armis avicula imbellis adversus fortiores defenditur. Nullius vitam natura contempsit. Avis est littoris Oceani Septentrionalis alumna, salforumve lacuum, è quibus victum sumit. Inventa apud flumen Tulpe, vix æquat sturni nostratis magnitudinem, sed collo constat tenui & longo, capite parvo, & in longum producto, prolixo rostro luteoque, prolixisque cruribus, & pedum digitis atque unguibus: ungues autem lutei sunt, digiti & crura cinerea cum inferiorum femorum parte, nam superior fulva est cum anteriori alarum parte, quarum posterior cyanea est. Reliquum corpus nigrum, quibusdam tamen fulvis circa ventrem permixtis pennis.

XOCHITENACATL, est eodem lumbæ magnitudine, rostro præ corpore mole maximo, superiori parte luteo, inferiori verò subnigro, & in

purpureum colorem vergente, oculis nigris, sed iride rubescente ex luteo, ac reliquo corpore cæruleo cinereoque. Vivit circa litora Oceani Australis; piscibus, quos rapit, vesci solet.

TLAUHQUECHUL dicitur avis peregrinæ gulæ: vivis dumtaxat piscibus vescitur, mortuos non attingit; raptu gaudet, specie similis est platæ aut pellicano, sed coccineo pulcherrimoque universi ferè corporis colore, aut ex albo rubescenti, lato atque obrotundo circa finem rostro, cinereoque pupilla nigra, iride rubrà rugosâ, fronte galli pavonis, auræve, depilipænè capite, candentique cum universo ferè collo, & parte pectoris, & fasciâ nigrâ latiusculâ, caput à collo distinguente. Circa littora maris aut fluminum vivit.

C A P. III.

De Avibus Acolin, Quachiltone, & Acacalotl.

Nieremb. Hist. Exot. l. 10. c. 22. 28. 24. **A** Colin, Coturnicis est magnitudinis fusca, prolixo rostro & curvo in inferiora, pedibus longis: juxta aquarum summitatem currit celerimè, nunquam ferè volat. Versatur in lacu Mexicano. Vescitur pisciculis & ipsa esca vulgò. Benè Coturnicem aquaticam dixeris.

QUACHILTONEM, seu *Avem siliquastrini capitis*, aliqui Jacacintli vocant. Color illi purpureus, ex nigro interfertis pennis. *Rostrum* initio pallet. Adolescentibus rubet calvitie juxta rostri exortum. Fulicam imitatur. Lutea crura in virorem allurgunt, in quatuor desinètia digitos pallidos, citra ullam membranam. Oculi nigri, iris fulva.

Lacustris avis est. Piscibus vescitur, ipsaque non ingrata palato. Intempesta nocte, & sub primo mane gallinaceorum ritu canit.

ACACALOTL mas seu corvus aquaticus à cauda extrema ad rostri usque acumen quatuor ferè spithamas

longâ, & mediocris amplitudinis; crura seîqui spithamea, *rostrum* arcus instar incurvum, duos palmos longum, ac mediocriter tenue: pedes in quaternos finduntur digitos nigerrimis munitos unguibus: crura minus nigrescunt digitis, rostrum cyaneum est, ac caput exiguum. Plumæ internæ fuscæ intertis rubris, superiores verò promiscuè purpureæ, subnigræ, virides atque splendentes: *cervix* est septem digitos longa. Caput collumque pennis fuscis, albis & viridibus teguntur ac paulisper fulvescentibus. *Oculi* sunt nigri, iris verò sanguineo tegitur colore. Ceterum ab externis oculorum angulis usque ad rostrum, uncie unius intervallo deplumis & glabra est, pelliculis rubescensque in albo. Alæ viridi splendentisque subtus pellucent colore, & qui pro variis solis percussibus evariet atque mutetur; supernæ verò prope exortum passæ sunt, deinde verò viridi atque pavonino spectabiles colores. *Indigena* Mexicanæ plagæ avis est: versatur circa lacus, ac piscibus victitat. Masculus fortassis est ejus avis, quam recentiores vocant Arcuatam, aut illi saltem congener. *Educat* filios veris tempore juxta lacustria loca.

Bonum præstat alimentum, nec valdè injucundum, crassum tamen, atque (ut lacustres aves decet) pisciosi odoris.

C A P U T IV.

De Avibus Xomotl, Acototloquichitl, & Acacahoactli.

Xomotl palmipes est, dorso & alis *Nieremb. l. 10. c. 41.* desuper nigris, pectore fusco. Crustatam iracundia facit. Pennas inter- 3536 xebant Indi suis vestibus.

ACOTOTLOQUICHITL seu *Passer aquaticus mas*, passerem similitudine & forma simulat. Rostrum tamen nigrum, crura & pedes fulvi, inferiora corporis plerumque candida. Cætera fulva, candore aliquo & nigrore variegata. *Reperitur* in Mexicanis pla-

his plagis. Juncetis & carectis infidet, ibique *nidificat*. Non minus occinit quam Sol pergit. Ab ejus exortu ad occasum contumaci garrit fonitu mures imitante.

ACA CAHOATLI seu *Avis aquaticararum sonans*. Halcyonum species illa est inquit Nierembergius, quam nostri marinetum Piscatorem vocare solent, circa aquarum fluenta victus gratia congenita quadam versantem naturâ. Anatē ferâ paullo minor est, colloque & rostro spithameo: hoc tres digitos latos prominet, medio, cum tortitur crassitudinem, in aciem desinit, ac morsui est per opportunum. Supernè verò nigrum est, infernè album, & pallescens circa latera. *Oculi* nigri sunt, iris rubra prope pupillam, deinde pallida, ac demum candens. Ab oculis ad rostri usque exortum fascia procedit viridi pallescens. *Crura* pedesque in digitos fissi virescunt, extrinsecus, intrinsecus verò inclinât ad pallorem, color totius corporis magna ex parte albus est, fulvis peninis insertis, verum superna magis fusca sunt, inferna verò candida. *Ala* infernâ cineræ, ac desuper circa extrema nigræ, mox è fulvo rubescentes, deinde pallescentes ex fulvo, ac demum fulvescentes ex fulvo, ac demum fulvescentes circa dorsum. Piscibus *vicitat*: mitescit minimo negotio, nec est *cantu* insuavis, indulgenter tamen ac blandè vermiculis & aliis animalibus exiguus, quæ in paludibus gignuntur, est alenda. Carne etiam vescitur, & aliis non paucis, ubi fieri aliter non possit. Crassi est nutrimenti, neque dissimile ei, quod anates feræ præsentare solent. *Indigena* est Mexicanæ plagæ, & verè educat inter juncta sobolem. Mirum est, cum sit cervix pro ratione reliqui coloris longissima, in quam brevitatem illâ. Cum libet contrahat, quod frequentius facere solet. *Cauda* pusilla est, nigraque, & nihil præ se ferens splendoris, quæ in majorem procedit amplitudinem. Patrio nomine appellant *tolcomotli*. Similis omnino esset hæc avis compari, nisi rostrum desuper nigricaret, subtus rubesceret, velut pedes & cru-

ra, nec per universum corpus fulvum, nigrumque promiscuè cerneretur.

CAPUT V.

De Avibus lacacintli, Xle-papantototl, & Hoactli.

Acacintli seu *rostrum spica mayzii*, tres *Nieremb.* *parnè* spithamas est longa, virentibus *H. Exot. l.* cruribus, capite ventrequ; cyaneis, 10. c. 43. sed in purpureum vergentibus, alis 44. 45. promiscuè fulvis nigrisque, luscis oculis ac rostro, sed in coccineum prope exortum vergente, quod tres parnè digitos latos longum est, anteriori parte capitis depili & calva. Piscibus juxta lacus & flumina vivit. Edulis est ejus caro, sed nec bono, nec grato alimento.

XLEPAPANTOTOTL Anatīs ferè species est, importuna Mexicanæ paludi, *rostrum* tamen in acutum finit: nullus illi negatus color. Pulchritudinem varietas dedit, pulchritudo nomen.

Nec contemnendi spectaculi est HOACTLI, sive TOBACTLI, id est, *avis sicca*, lacus Mexicani alumna, ternas spithamas à rostri ipsius acumine ad caudam postremam longa, ac gallinæ nostræ magnitudine. *Crura* proluxa, pedem, *rostrum* cum uncia tridentem, crassitudine verò pollicem æquans. Supernè id nigrum est, lateribus autem pallens, ac internè nigrum & subfuscum. *Oculi* sunt magni, iris lutea, & palpebræ rubeæ: vertex plumis nigris tegitur, itemque crista insigni, similiter nigra: *collum*, *venter*, corpusque universum candet: sed *cauda* cinerea est, velut & desuper alæ, nam infernæ sunt albidiores, superiores alarum partes virore quodam splendent. *Dorsum*, etsi candidis tegatur plumis, pennis tamen nigris in virentem splendorem inclinantibus vestiri solet. *Pedes* qui in digitos fissi sunt, & crura quoque, pallescunt. Alba fascia circumcingitur caput, à rostri exortu ad oculos usque procedente Lacus Mexicani advena est, vocaturque ab

Hispa-

Hispanis indigenis, velut & quædam aliæ aves, martinete piscador, ob piscium quibus alitur capturam. Arundinetis educat sobolem, gravem infert morsum, ac gravem similiter vocem edit.

CAP. VI.

De Avibus Heatototl, Achalalactli, & Amalozque.

Nieremb. H.E. l. 10. c. 47. 48. **I**Doneum quoq; conspectum HEATOTOTL, seu avis venti exhibet. Magna crista exornatur, orbiculari, ac coronæ modo eminenti, & paulisper candida. *Pectus* è fusco vergit in cinereum: venter albus est, ac pedes plani: crura fulva, & pennæ circa ea ortæ: cauda orbicularis, & variata infernè candido, pulloque colore, supernè verò fusca. *Alæ* subdus candentes, cinereæ ac pullæ sunt, desuper nigræ, candidis tamen quibusdam insertis pennis; reliqua verò eadem quæ aquaticis est natura.

Similis alteri HEATOTOTL, quæ anate domestica paulò minor est, *rostro* atro, tenui, obrotundo, ac prope extrema contorto, plumis infernè candidis, supernè verò juxta femora fulvis, lineis tamen nigris intercurrentibus; circa residuum verò, & caudam fulvis. *Alæ* sunt subdus cinereæ; supernæ verò fuscæ, nigræ atque albæ. *Caput* est nigrum cristatumque, sed ab occipitio teniæ albæ utrimque procedunt ad oculos, qui attri sunt, & lutea constantiride, cum cætera sint similes avibus incolentibus paludes.

Suus quoque torques argenteus honestat ACHALALACTLI, seu avempiscium vibraticem. Alij vocant Michalacti. Columbina est magnitudine, & forma, *rostro* nigro acuminato, tres digitos longo, & pro corporis proportionem crasso; *caput* crista ornatur è colore cyaneo in nigrum tendente, longaque. *Venter* candidis tegitur plumis, & collum torque candenti insignitur: *alæ* infernè albescunt, sed postremis partibus videntur fuscæ, &

candicantibus maculis interstinctæ, supernè verò sicut reliquum corpus sunt cyaneæ, extremis partibus nigræ, & albis undique respersæ maculis. *Cauda* partim nigra, partim cyanea est, sed maculis albis per intervalla quoque variata. *Crura* rubea sunt, *pedes* diversi in digitos, in atros ungues desinentes; oculi nigri, & iris candescens. Advena avis est huic Mexicanæ regioni, versaturque juxta fontes & flumina, pisciculis & aliis aquatilibus visitans edulis, sed reliquarum avium palustrium sapore atque nutrimento.

Neque exiguus decor est AMALLOZQUE, seu avi rubescentis colli. Palustris ea est, nostrati turturi magnitudine par, *cruribus pedibusque* in digitos fissis, atque ex albo rubescentibus, nigris unguibus, *rostro* medio circiter longo, exili & nigro, atris oculis, & iride rubra, pectoris & ventris, & alarum inferna alba sunt; sed cauda, quæ mediocrem magnitudinem nanciscitur, fulvo & nigro colore est inspersa: at collum pectusque torques bini, minimi ferè digiti distantes intervallo, nigrique cingunt, quorum anterior undiquaque circuit, posterior superna deficit ac disparet parte. Ex utroque latere maculæ binæ candentes, pari amplitudine, supra oculos versus collum, illud ferè attingentes, discurrunt. Superna corporis, adeoq; ipsa cauda, albo, nigro, fulvoque sunt colore; alæ verò desuper fulvo & fusco. Indigena est avis, lacus Mexicani alumna, ac veris tempore educans, sobolem. *Estur* caro, quæ eodem quo ceterarum aquaricarum est nutrimento. *Vescitur* ipsa culicibus, pisciculisque & vermibus lacustribus: vehementius *perstrepit* quam pro corporis ratione, nec tamen potest gar-rulis avibus adnumerari.

☉ (○) ☿

☿

CAPVT VII.

*De Avibus Farren-
sibus.*

INsula Farræ à plumarum copia no-
men adeptæ videntur. Cum enim
avium sint fœtura fœlices, non mirum
& plumarum abundare copiâ. Cate-
rum aves quæ ibidem reperiuntur, in

Hojerus in aliquot distinxit classes Hojerus.

Epist. ad Clusium. In prima CLASSE *Lundam, Alkam,*
& *Lomviam* invenies. Illa mole cor-
poris Anate est inferior, rostro ruben-
te & latiusculo, pectus candida, tem-
pus & alas nigra, pedes rubra. Rever-
titur primo vere. In præcipitibus cel-
sarum rupium cavernis nidificat. Ova
gallinaceis tum colore tum magnitu-
dine paria edit. Quo sub autumnum
abeat ignotum.

Alka illa aliquanto major est, ro-
stro lato & nigro, itemque corpore,
nisi quod sub pectore & extremis alis
albicat. Pedes nigri, caput deniq; fus-
cum, nisi linea alba ab utroque oculo
ad rostri partem proximam ducere-
tur. Nidificat in editissimis scopulis.
Ova ex albo & nigro maculata ponit.

Lomvvia quæ illa major, corpus to-
tum est nigrum excepto pectore quod
albet. Pedes nigri, rostrum nigrum a-
cutum, oblongumque. Ova in edi-
tioribus scopulorum marginibus ex-
cludit, cyanei quidem coloris, sed li-
neamenti undique diversorum co-
lorum mirè variegata ac velut picta.

In altera CLASSE, duas diversas
species ponit, quæ quod pedes ad in-
cedendum inutiles habeant, nūquam
terram ingrediuntur, & mole corpo-
ris minorem æquant Anserem. Prior
Ildbrimel vocatur. Caput ejus fuscum,
sub collo circulus albus, pectus can-
didum. Tergum & alæ nigricant, ma-
culata passimpunctis albis, pedes ni-
gri. Forrè est mergus Farrensis maxi-
mus Clusii. Creditur in undis marinis
Alcyonis more fœtum producere.

Altera est *Goisufgel* rostro admo-
dum lato & incurvo. Capite oblongo
atque nigro. Alis exiguis, pedibus ni-
gris ad incedendum ineptis. Oculo-

rum margines candido circulo tin-
guntur. Rarissimè & nonnisi aliqui-
bus annis visitur, nec ubi fœtura ope-
ram det, ignotum.

Tertiam CLASSEM tres species
forma discrepantur, tempestatum
prænunciæ, & quæ in alto tantum O-
ceano versantur, constituunt. Prima
est *Hafflert* seu Equus marinus, ut in-
convenienter appellant, quæ magni-
tudine gallinam mediocrem, forma
falconem utcumque æquat. Cineri-
cio est colore, maculis albis passim in-
terstincta, rostro incurvo velut falco-
nis sed brevior. Adejus conspectum
exhorrescere & littora legere pesca-
tores solent. Certi tempestatem in
propinquo esse noxiam.

Altera dicitur *Stormsnick* passere
paulo major. Tota est grisea, sive ma-
culis, rostro admodum exili. Pegalum
præ superiore rectius dixeris. Siquidẽ
super ipsos fluctus incredibili pedum
velocitate transcurrere, ac nimbi in-
star ferri solet. Videtur illi cognata
quam Oviedus Patines à Nautis vo-
cari reliquit. Catervatim si navigan-
tibus appropinquet, deponenda esse
subito vela innuit.

Tertiæ nomen est *Barnfiard*. Magni-
tudine hæc Passeri par, sub pectore
candicans, collo dorsoque nigricans,
rostro nigro & nonnihil latiore, pedi-
bus rubris. Tam velocem se natando
præstat, quàm Stormfinka currendo.

In quarta CLASSE duæ diversæ
Anserum species censentur. Prior
Helsingegans capite & collo nigro, cir-
culo albo cincto, pectore albo, alis
gryseis, tergo cyanei coloris, pedibus
rubris, magnitudine Anati respon-
dens dici

Altera *Erandgans* anserẽ sylvestri
pænè minor, capite & pectore griseis,
collo rubro circulo cincto, alis, collo,
pedibus rubris. Rarissime in Farris
conspiciuntur, neque ibi fœtificant.
Unde veniant, & quo nigrẽt, nemini
cognitum. Mutationem magistratus
ubi apparuerunt imminere, supersti-
tio ex longa experientia credidit.

Ultimum locum sibi *Skua* vendicat,
avis aquilino generi & corporis mole
& rapacitate respondens. Rostrum

Aa habet

habet curvum. Sed non admodum latum, pennas corpus tegētes griseas, sola alarum extremitate albicante, pedes griseos. Pisce vescitur, sed & in omne genus avium grassatur. Fœtum negligenter ex ovis griseis, grandioribus, anatinis similibus, quæ exilibus nigris maculis notata sunt, in apertis campis producit. Aliter eam describit Clusius, & eandem ferè cum vulture aquatico Oviedi existimat.

Clusius Ex-
oticor.

CAPUT VIII.

De Avibus Lomsbay, Vulturibus aquaticis, Flamencos dictis, & aliis quibusdam.

Navigat.
Holland.

AVES LOMSBAY ab Hollandis dictæ, corpore sunt magno, alis parvis, ut mirum sit, tam gravia corpora attollere posse. Frequentes circa portum Lomsbay in insula Aurangia, volant, unde & nomen invenere. Nidulantur in præruptis montium locis. Unicum duntaxat ovum pariunt. Ab hominibus nihil metuunt, etiam si in suis nidis comprehendantur.

Nieremb.
H. Exot. l.
10. c. 82.

VULTURES AQUATICOS

facit Oviedus mole tam grādes quàm magnus Larus est. Rostrum habent Larorum, sed magis mucronatum. Pedes diversi generis, sinistrum anatum & anserum instar planum, dextrum curvis unguibus instructum. Vescuntur piscibus & avibus, iidemque cum illis qui Astures aquatiles ab Hispanis vocantur, de quibus Hernandez in Paralipomenis agit, esse putantur. Frequentes sunt in Hispaniola & insula quæ à Divo Johanne nomen accepit.

De Laet.
India Oc-
cid. l. 1. c. 11

Avis quàm Hispani FLAMENCO vocant, grui est formâ non absimilis. Juniores habent plumas candidas, ubi adoleverunt, mirâ elegantissimorum colorum varietate distinguuntur. Gregatim volant, sed haud altè. Juxta littora insulæ Cubæ atque in ipsis marinis fluctibus victum quærunt, falsis undis ita afluatæ, ut quum ab Indis domi aluntur, (nam & cicurantur)

sal potui earum necessariò admisceatur. Habent & insulæ *Bermude maritimas*, quæ in subterraneis cavernis cuniculorum instar, nidulantur & ova sua ponunt, magnitudine & colore gallinarum ovis paria, ipsæ carne sunt obesæ, & grati nutrimenti.

Idem l. 1.
c. 20.

Colophonem isti de Exoticis Avibus promiscuæ historiæ imponant illæ in Peruano ciconiis majores. Plumis sine ulla mixtura candidissimis, cruribus altis. Rariores sunt. Binæ ut plurimum incedunt. Et piscib. victitant. De reliquis quæ ad sua genera referri poterant, vide Notas.

Idem l. 10.

TITULUS III.

DE AVIBVS BRASILIANIS:

Ex Georgii Marcgravij Historia Naturali Brasiliæ.

De Avib. Brasilianis in genere notetur: Vix ullibi elegantiores Aves reperiri quàm in Brasilia, si varietatem plumarum & colorum spectes; verum nulla ferè suave canit, ita ut cantu longè à nostratibus superentur.

CAPUT PRIMUM.

Nhandugvacu. lacana, variæ ejus species. Curicaca.

NHANDUGVACU Brasiliensibus, EMA Lusitanis; Struthio avis. Ingentes hic reperiuntur, minores tamen aliquanto Africanis. Longa illi crura, inferiora sesquipedem, superiora pedem circiter longa. Tres habent in pedibus digitos anterieus versos, unguibus nigris, crassis, haud acutis præditos; posterius unum digitum, sed rotundum, grossum, unde difficulter in area levi aut tabulato possunt incedere, sed faciliè labuntur. Collum gestât incurvatum, ut Cygnus vel Ciconia; Longitudine circiter duorum pedum: Caput anserinum, oculos

culos nigros habent pulchros; *rostrum* compressum, non admodum latum, duos & semis digitos longum. *Alas* habent parvas, & ad volandum ineptas, quarum tamen unam instar vel erigentes citissime cursum promoveant, ut vix, ac ne vix quidē à cane venatico superari possint. Plumæ habet gryseas per totum corpus, ut grus, in dorso longiores & elegantiores, & corpus plumis tectum ferè rotundum apparet. *Caudam* non habet ejusmodi cristis præditam, ut vulgo pingitur, sed plumæ sunt per dorsum expansæ ad anum usque.

Tesseræ lusorias, aliaque ferramenta lubenter deglutit, sed non concoquit, at integra per anum reddit: *Vesit*ur fructibus & carne.

Frequens in Capitanæ Serigippo campis, itemque in Capitanæ Rio Grande. In Pernambuco non visitur. *Caro* illius bona ad comedendum.

IACANA Brasiliensibus, gallina aquatica, *Waterhun* / diversæ reperiuntur illius species, colore differentes. Hæc elegantissima, magnitudine Columbæ, sed cruribus multo longioribus, flavi coloris, cui viriditas immixta. *Crura* inferiora plus quàm duos digitos longa, superiora (maximam partem nuda ut aquaticis) paulò minus: quatuor habet in pedibus digitos, quorum medius è tribus antrosum versis, duos digitos longus, reliqui duo paulò breviores, quartus retrorsum versus, pedem, aut etiam amplius longo: omnes autem unguibus semidigitum longis & flavis armanatur. *Cauda* brevis, ut gallinæ sylvestris; *pennæ* in dorso, alis & ventre ex viridi & nigro mixtæ, sub cauda albæ: versus collum, & in toto collo & pectore ejusdem coloris cum plumis quæ in collo pavonum aut columbarum quorundam visuntur. *Caput* habet parvum, ut gallina sylvestris, quod regitur membranaceo quodam tegumento rotundo, coloris ut gēma Turcois. *Rostrum* rectum gallinae, plus uno digito longum; ab initio ad medietatem egregij miniati coloris, reliqua pars eximij flavi, cui aliquid viriditatis admixtum. Frequentissima in

palustribus Brasiliæ locis ubiq; *Caro* illarum edulis, sed haud magni pretij, sunt enim plerumque macræ.

Alia species appellatur à Brasiliensibus *Agvapecaca*, priori figura & magnitudine par; verum colore diversa & inferior. *Pennæ* illius sunt ut in dorso prioris, *alæ* magis brunescentes: Carent autem mitella, at in qualibet ala interius habent corniculū directum, quibus se defendunt.

Tertia species prioribus figura & magnitudine æqualis, colore autem differens, totum *caput*, *collum*, *dorsum*, *cauda*, nigri sunt coloris, initium alarum brunni: reliqua viridis; extremitates remigum brunni: *pectus* & infimus *venter* itidem brunni coloris, uti & crurum superiorum medietas superior. *Rostrum* rectum, crocei coloris, cum cuticula ruffa in exortu illius & parte capitis anteriori. *Crura* nuda, *pedes* cinerei. In qualibet *ala*, antica parte habet corniculum simile flavū.

Quarta species itidem figuræ est ut reliquæ. *Rostrum* illi flavum, mitella cutacea in initio capitis propè rostri exortum rubens, processus habens ad latera extensos more gallinarum Numidicarum. Totum *caput*, *collum*, *pectus* & infimus *venter* plumis vestiuntur nigri coloris, *dorsum*, *cauda*, & initium alarum ruffum, seu dilutè brunnum; remiges alarum pennæ thalassici coloris cum extremitatibus nigris. Sed hæ remiges teguntur ruffis illis in exortu alarum, nec videri possunt nisi cum avis volat. *Crura* longa, digiti pedum longi, quilibet quatuor internodiis, cinerei coloris. Quælibet *ala* in anteriori parte habet corniculum acutissimum coloris crocei.

CURICACA Brasiliensibus à clamore dicta, *Masarino* Lusitanis, avis Numerio, judicio Clusij, similis: magnitudo illi mediocris Anseris: *capitis* autem magnitudo ut Anatidis: *collum* sex digitos longum, tres crassum, aut paulò plus: *Rostrum* sex digitos longum, incurvum planè ut ensis Hungaricus, coloris ex igneo fusci. *Corporis* longitudo à collo ad podicem undecim digitorum, *cauda* novem, desinentis cum fine alarum. *Crura*

octo digitos longa, pedes duos & semis; rubri instar anatis sed non plani, quatuor digitis & unguibus nigris, tribus anterioribus, uno posteriori verso. *Caput & collum* habet plumas albas flavo mixtas, & in superiore parte paulum oblongas: *Oculi* illi sunt nigri, circulo ruffo. Circa oculos & sub origine gutturis cutis nigra. Totum corpus nigris pennis vestitum, excepto dorso, capite & ventre, ubi cinereæ obscuræ, & in medio alarum albæ, cano mixtæ, ut in ciconijs. Reliquæ pennæ corporis, initij & finis alarum, & totius caudæ nigre. *Tibia* superiores ad medietatem usque carent pennis, nam aquatica est avis.

Carnem bonam habet; quam sæpè comedi coctam & frixam butyro.

Alia species reperitur huic similis, sed multo minor, & magnitudine ferè gallinæ, quæ vocatur *matui tui*.

Frequens est ad Flumen S. Francisci, in Itapua & alibi.

C A P U T II.

Tiepiranga. Iacapu. Iambu.

Gallina Africana. Gviratangeima. Iupujuba, Sayacu.

Ani. Gvira guainumbi.

TIEPIRANGA Brasiliensibus, Avis alaudæ magnitudinem paululum superat, & cantum passeris nostratis æmulatur. Totum corpus, collum & caput egregiè rubicundi seu sanguinei est coloris: *ale* verò & *cauda* splendide nigri; præterquam in initio alarum, ubi aliquid rubicundi admixtum est. *Crura* nigra, inferiora quidem nuda, superiora autem nigris penis vestita. *Rostrum* instar passeris, superiori parte nigrum, inferiori versus acumen nigrum, reliquæ versus caput album. *Pennæ* in capite breviores, quas crispare interdum solet more Passerum. Omnes pennæ totius corporis interius sunt nigre, exterius rubre, ita tamen complicatæ, ut exterius totæ rubre appareant. *Cauda*

longitudine ferè tres digitos æquat. Digni pedum quatuor & ut in plerisque avibus dispositi.


Alia hujus species reperitur passeris magnitudine; quæ pennis per totum corpus vestitur ex cinereo, carulescentibus; alæ tamen quodammodo ad thalassinum colorem accedunt. In ventre & inferiori parte colli seu gutturæ albicæ, vel potius argenteo colore nitet. *Crura* cinerei coloris, ut & *rostrum*, quod ipsi simile Fringillæ. Digni pedum quatuor secundum communem avium modum.

J A C A P U, Brasiliensibus; Avis magnitudine Alaudæ, cauda extensa, alis brevioribus: cruribus brevibus & nigris; unguibus acutis ad quatuor digitos: rostro paulum incurvato & nigro, semidigitum longo. Totum corpus vestitur pennis nigris splendentibus; sub gutture tamen nigredini illi maculæ coloris cinnabrij sunt admixtæ.

J A M B U Brasiliensibus dicta avis est perdix, nostratibus quidem, magnitudine par, uti & figura. *Pennæ* autem per totum corpus obscure flavescentes, verum fusco mixtæ atque maculatæ.


GALLINA Africana ex Insula do Majo, magnitudine nostratium gallinarum, figura corporis ferè ut perdix: *collum* item coronatum portans, & *caudam* perdicis habens inferius dimissam: *pedes* gallinaceos: *rostrum* flavum: & in capite mitellam cutaceam fuscam: ad latera porro capitis *alba*, ut & ad quodlibet latus propè rostrum cristam rubram ad latus protensam. Totum corpus vestitur pennis nigris, quæ elegantissimis maculis albis variegatæ sunt, in alis quidem oblongis, in reliquis autem partibus rotundis; suntque in dorso minores, quàm in reliquis partibus. Huic similes vidi è Sierra Lyona advectas, sed eorum collum circumligatum seu circumvolutum, quasi lineamine membranaceo coloris cinerei carulescentis. *Caput* regit crista obrotunda, multiplex, constans pennis eleganter nigris. *Punctula* albicantia per totius corporis ambitum,

Curicaca



Numenius.
Indicus.
Clus
Ardea Species

Jacamaeri




Jacana
Wasserhuhn.




Jupuiuba
Japu




Gallina Afucana.




Tyepiranga



Sayacu




Ibani Noitibo



Guira Guir-
mundi



Guira-
tangeima



Mituporanga



Jaguacati





bitum, quasi umbra thalassina variegantur.

Congenibus hæc avis dicitur *Quele*.

QUIRATANGEIMA Brasiliensibus; Avis paulò major Alauda, Picæ variæ æqualis. *Corpus* habet circiter tres digitos longum, *collum* sesquidigitum: *Caput* parvum, *rostrum* rectum, acutum, digitum longum, crura pedesque, ut reliquæ aves communiter: *Caudam* longam, rectam, quatuor digitos longam: Color *rostri* niger, excepta inferiori parte, ubi inseritur quæ aliquid fusci habet: *Caput* nigerrimum & collum usque ad initium pectoris. Colli superior pars à capite ferè ad initium dorsi uranica est: per initium dorsi transversam habet maculam nigram usque ad alas extendam: *alæ* autem sunt nigerrimi coloris, verùm in medio secundum longitudinem habent maculam albam sesquidigitum longam: *Cauda* quoque tota nigra: reliquum corpus coloris uranici: *Crura* subcærulea. *Oculorum* pupilla subnigra, albo subflavo.

Nidificat in altis arboribus *Acaya*, idque libenter propè ædes. Nidos egregios exstruunt hæ aves, cylindraceæ figuræ, & appendunt magno numero extremitatibus ramorum; qui constant è virgultis. Clamant ferè ut picæ variæ nostrates.

JUPIUIUBA seu **JABU** Brasiliensibus, ejusdem formæ cum præcedenti, & eodem modo in eadem arbore nidificans (una est fœmina, alter mas) cauda paulum breviori. *Corpus* habet totum nigerrimis pennis vestitum: in utriusque *alæ* medio maculam flavam digitum longam; in extremitate dorsi, & propè anum tota est flava (vidi quoque totaliter nigras, dorso sanguinei coloris) cauda inferius ab exortu ad medietatem flava, reliqua medietas nigra, superius nigra in totum, solum in ea ad latera utraque usque ad medium penniam habens flavam. *Crura* nigra & pedes. *Rostrum* sulphurei coloris: *Oculi* Saphyrini, pupilla nigra: *linguam* cæruleam habet antè fissam seu duplicatam.

Propè ædes domini Ingenij *Tupuraj* arbor *Vti* sita, in qua plus, quàm quadringenti nidi harum avium pendunt, máximoque numero sunt hæ aves, quæ ter quotannis ibi pullos excludunt: nidus autem quilibet ex aridogramine, & pilis equinis aut suillis mixtis est compositus, coloris fusci, figura cucurbitæ angustæ cum suo alembico, longus in totum sesquipodem circiter, & ab infimo ad unum pedem altus, cavus ut bursa, reliquum superius ad semipedem simplum est, & sua extremitate pendet à ramulo extremo: omnes autem nidi ex ramulis minimis extremis arborum pendunt.

SAYACU Brasiliensibus, Avis Fringillæ magnitudine: totum *corpus* vestitur pennis, coloris è cinereo & thalassino mixti, in alis autem & dorso thalassinum admiscetur, ita ut Sole illustratæ egregiè splendeant; *rostrillum* nigrum, *oculi* quoque nigri in totum.

ANI Brasiliensibus; Avis Turdellæ magnitudine, totaliter nigra, pennis, rostro, oculis, pedibus *Caudam* longam erectam habet, sex digitos longam: *Rostrum* altum, latum, digitum aut paulò plus longum: inferior pars directæ ferè, superior alta, lata, semilunaris figuræ, & compressæ, ita ut acumen ferè superius habeat. *Crura* & *pedes* satis exiles, & in ijs quatuor digiti, duo antè, duo postè, versimore psittacorum. Clamat elata voce *yiii* uno tono, in medio elevatiori.

Frequentes sunt in sylvis omnibus, verùm cibo inutiles.

GUIRA GUAINUMBI Brasiliensibus *Tupinambis*; avis magnitudine Columbæ ad visum, quia plurimas p'umas habet, sed revera corpus non superat magnitudinem Turdellæ. *Caput* paulò majus habet quàm Turdela: *rostrum* nigrum, duos circiter digitos longum, cujus superior pars paulò longior inferiore. Est autem *rostrum* superius & inferius in latere serratum instar ferræ, inservitque dentium loco. *Crura* habet breviora, haud multum digitum excedentia, nigra; quatuor in

pedibus digitos, quorum unus retrorsum vergit, tres antrorsum, sed primus versus interiorem pedis partem brevior, medius longissimus, & tertius iterum brevis, sed non æqualis cum reliquis exortus: primi enim exortus est ad pedem, secundi itidem, tertij verò propè tertium articulum medij, habetque primus tres, secundus quatuor, tertius ibidem tres articulationes, qui retrorsum vergit duas. *Ungues* nigri deorsum incurvati. *Cauda* longissima, directæ pennæ paucis rectis, digitum circiter lata, sed decem longa: & quidem duæ tantum pennæ extremam caudam constituunt, quæ ad duos digitos plumis carent, in extremitatibus autem rursus plumas habent ad duos digitos. *Corpus* totum sex circiter digitos longum est. *Pennæ* elegantissime: nimirum in capite quasi mitram gerit ex pennis Sapphyrinis, quæ propè exortum rostri Turcoidis colorem referunt: in medio autem hujus mitræ macula visitur nigra magnitudine grossi Misnici. Infra oculos (qui flavi sunt, pupilla nigra) etiam nigras pennas habet Sapphyrinis mixtas: *guttur* inferius, totum pectus & totus venter obscure luteum habet colorem; superior colli pars, totum dorsum, alæ & cauda viridis seu graminei est coloris, sed cui (præsertim in alis & cauda) thalassinus admixtus, ut in collis anatum & pavonum; à genibus ad ventrem crura superiora pennis virentibus sunt prædita. In medio collo inferius quasi pro insigni gerit tres vel quatuor pennulas nigras, & circum eas Sapphyrinas, quæ maculam quandam seu notam constituunt.


C A P. III.

Iaguacati gvacu. Mitu. Mituporanga. Ibijan.

IAGUACATI GVACU Brasiliensibus, *Papa Peixe* Lusitanis, nam piscibus victitat. Avis Turdelæ magnitudinem æquat; figura corporis ut *Picus* major. *Rostrum* habet nigrum, rectum, & in extremitate acutum,

tres fermè digitos longum: *Oculos* nigros & *crura* brevissima nigra: superiora crura ex parte carent plumis in pedibus digitos quatuor, (unum retrorsum) inæqualis longitudinis, duo enim versus exteriora pedis breves sunt, tertius interior longè brevissimus & remotior. *Ungues* nigri. *Cauda* duos digitos longa, excédens alarum fines. *Pennæ* totius corporis superiores, nimirum in capite, collo, alis, cauda sunt ferruginei coloris & splendentes: Circa collum transversum, annulum habet ex albisissimis plumis; guttur, inferius collum, pectus, & totus venter pennis vestiuntur albis, propè utrumque oculum etiam maculam habet ex albis pennis: in cauda autem albæ pennæ interfertur guttatum, ut & in alis, sed quæ vix videntur, nisi cum alas explicant & volant.


MITV vel MYTV Brasiliensibus dicta avis ex Phasianorum est genere, major gallo gallinaceo. *Corporis* longitudo à collo ad exortum caudæ est decem digitorum; colli longitudo sex digitorum, totaliter nigris pennis est vestita, excepto ventre & sub ano, ubi brunni coloris est, ferè ut perdix. Tenuiores sunt pennæ ad collum, caput, & in pectore, & holosericum villosum nigrum pulchritudine æquant. In summo capite habet pennas nigras complicatas in planissimam quasi mitellam, ut nesciens vix possit agnoscere, quas irascens, aut etiam aliàs in cristam erigit. *Rostrum* habet insigni, non crassum, incurvatum, sesquidigitum ferè longum; inferior pars ejus parva, superior fermè quadruplo major. *Rostrum* autem coloris est egregij incarnati, versus acumen tamen albicat. *Crura* habet gallinacea decem digitos longa, nimirum quatuor à pedibus ad genua, & sex superius, atque hæc vestita pennis nigris: digitos item quatuor gallinaceos, qui in exortu usque ad primam juncturam cuticula sibi invicem annectuntur, ut in alijs quibusdam avibus. *Caudam* habet pedem longam, instar gallo-pavi, quam semper in latum movet, *Kit, Kit*, clamando, ut il.



Mitu Mitu




Guara



Lacupema




Mituporango




Ibani magnitudine noctue



Matuitui




Guaimumbi




Soco



Guira quera



Lamacay



Jacurutu

utilli. *Caput* bene formatum, anserini magnitudine: *Collum* sex circiter digitos longum: *Oculos* habet magnos, egregios, nigros, & ponè aures maculam cutaceam albescentem ut gallinæ. Mansuescit facile. Lubenter in alto sedet ut gallo-pavi, scanditque arbores, utilli. *Carnem* denique habet admodum bonam. *Reperitur* & alia ejusdem species, quam *Mituporanga* vocant Brasilienses, solo rostro & pennis capitis differens, hæc *rostrum* habet haud longum, satis crassum, non tamen ita altum ut *Mitu*, neque sic lunatum: ejus extremitas utrobique nigra, reliquum totum crocea cute vestitum, qualem & circa oculos habet. *Oculi* nigri egressi: collum & caput nigerrimas habet plumas instar holoserici; & in summitate capitis crispates atque cochleatim tortas habet pennas usque ad initium colli; has erigere in cristam crispam potest. Reliquum totius avis nigrum, cui nigredini hinc inde aliquid viridis transplendet. Circa anum albas obtinet pennas. *Crura* cinerea, figura ut *Mitu*. *Cauda* nigra, sed extremitates illius pennarum albæ. Et hæc quoque avis optimè mansuescit.

IBIIAU Brasiliensibus, *Noitibo* Lusitanis: *Avicula* Hirundinis magnitudine: *Caput* habet latum & compressum: *oculos* magnos, elegantes, nigricantes, pupilla atra splendente ellipticæ figuræ, exterius autem oculos ambit circulus ex albo flavescens. *Rostrillum* minimum habet, quod non excedit crassitiem dentis aranei, nec tam est longum: nares tamen patentes in rostro: *Os* amplissimum, quod clausum non potest videri, at quando rostrillum aperit, os ad oculos diducere potest, ita ut digitum ferè sit amplum; *Linguam* habet minimam. *Crura* alba, & secundum corporis molem parvula, vix semidigitum longa; quatuor in pedibus digitos, tres antè, quartum retrorsum versum, unguibus incurvatis nigricantibus. Secundum longitudinem in unguiculo digiti medij cujuslibet pedis versus interiora habet pinnam quasi multipliciter sectam, seu dentatam, videturque un-

guiculus quasi plumatus versus interiora, sed non sunt plumæ, verum cutacea materia & aspera. *Caudam* habet elegantem, quam in latum potest explicare, duos digitos longam, cum ejus extremitate etiam alæ desinunt. *Pennas* in toto inferiori corpore habet ex albis & nigris mixtas, ut Nisus: In capite, dorso, alis & cauda nigricant, & albedo inspersa grata varietate: non nihil quoque flavedinis albedini admixtum: uno verbo, nigra est & punctulata subtiliter hinc inde.

Reperitur & species hujus magnitudine Noctux, ejusdem coloris & conformationis. *Os* quando aperit, pugnum humanum faciliè admittit.

CAPUT IV.

Guainumbi varia species.

GVAINVMBI quæ & *Guinambi*, item *Aratica* & *Arataratagvacu* vocatur à Brasiliensibus, à Lusitanis *Pegafrol*, à nostratibus potest appellari *Blocmen* *Specht*. Hujus autem multæ hic reperiuntur species.

Prima: Totius corporis aviculæ longitudo ab initio capitis (ubi rostrum est insertum) ad exortum caudæ, duorum digitorum. *Capitis* magnitudo unà cum pennis magnitudinem cerasi dulcis mediocris æquat. *Colli* longitudo tres quartas partes digiti, corporis longitudo unius digiti est & quadrantis. Magnitudo autem corporis cum pennis olivam grandem vix æquat. *Rostellum* habet sesquidigitum longum, subrotundum, æquale, tenuè, & valdè acuminatum, rectum, paululùm tamen versus extremam dorsum versum; color hujus niger, excepta inferiori parte prope exortum, ubi rufescit. *Linguam* habet duplicatam, seu bisectam, tenuissimam instar serici fili tenuissima, albam, longam, ita ut illam longè extra rostellum possit exserere: *Ocellos* parvos nigros. *Crura* & *pedes* minimos brevesque, nigri coloris; in pedibus quatuor digitos, tres antè, unum postè-

posterius versus, longis, femilunariibus, acutissimisque unguiculis nigris præditos. *Caudam* habet directam, digitum longam, quatuor ut plurimum pennis constantem. *Alæ* autem quæ duorum digitorum longitudinem habent, ad extremitatem caudæ ferè pertingunt, pennæ singulari arte à natura sunt cōpositæ. Ab exortu enim alarū ad tres quartas partes digiti circiter duplex ordo pennarum est, unus longior altero, & superpositæ sunt sibi invicem pennæ, quasi alæ breves super longas. Hinc post has pennas, alæ pennæ (quarum circiter decem sunt) sequens interior semper longior fit antecedente exteriori, ita ut intima sit omnium longissima finem alæ definientis. His alis expansis volare diu potest, ac in aëre quasi pendula manere; inter volandum strepitum edit instar *bruchi*, seu rectius *hur, hur, hur*, instar rotæ linteariorum quæ circumvolvitur: admodumque tenues apparent & transparentes pennæ alarum expansarum. *Color* plumarum aviculæ per totum caput, collum superius & ad latera, per dorsum totum & initio alarum est resplendens mirificè, nec à pictore bene exprimi potest; nam viriditati, qualis in Pavonum & Anatum collo, aureus, igneus, flavus mirè admixtus est, ita ut Sole illustrante mirificè splendeant. In gutture, inferiori collo, pectore & toto infimo ventre, cruribusque superioribus albæ sunt pennæ, quibus in collo inferiori eximij coloris simul sparsim admixtæ, in ventre albis subjacent nigrae. *Alarum* initium miro colore constare dixi, reliqua pars tota brunna est, seu spadicei coloris splendentis. *Cauda* pennis constat coloris instar chalybis politæ cærulescentis. *Vivitat* floribus solū, idèd capta viva detineri non potest, sed moritur. Frequentes autem in floribus arboris, quæ Mense Januario potissimum floret, & potest aliquis vel sexaginta uno die sclopeto figere. Inveniuntur & super alijs arboribus varijs. Toto autem anno, magno numero in silvis inveniuntur, & præsertim matutino tempore ingentem strepitum exci-

tant. Non autem canunt, sed clamant, *Screp, Screp, Screp*, uno sono & continenter, ferè ut passeris. *Volantes* velociter alas movent, & cum vix videantur, & per longum temporis spatium in aëre velut quietæ, vel se moventes hæere possunt alarum ope. *Flores* rostellis carpunt inter volandum. *Nidum* faciunt in ramis arborum solidi Hollandici magnitudine. *Ova* ponunt albissima testa, duo ut plurimum, ovalis figuræ, pisco haud majora.

Secunda: Pulchrior priori, ejusdem magnitudinis & figuræ. *Rostellum* tamen brevius, nimirum duas tertias partes digiti longum, ejusdem figuræ & coloris cum priore; *Lingua* eadem, ut & ocelli, crura, pedes, cauda & alarum figura. Plumarum color in capite, collo superiori, dorso, alis, cauda similis priori; at in gutture, seu collo inferiore, toto pectore & infimo ventre usque ad extremum corporis, tam eleganti & splendente viriditate cum aureo colore transplendente sunt plumæ, & mirè resplendeant. Propè anum macula est satis magna (respectu aviculæ) constans plumis candidissimis.

Tertia, minor reliquis omnibus. Ab initio capitis, seu exortu rostri ad exortum caudæ duos & semis digitos longa. *Collum* unum ferè digitum longum: *Caput* haud magnum. *Corpus* sesquidigitum longum. *Rostellum* paulò plus digito longum, nigrum, subrotundum, acutum ac ferè rectum. *Crura* & pedes, ut reliquarum. *Pennarum* corporis & alarum etiam eadem dispositio, sed color diversus. *Caudam* longiorem habet reliquis omnibus, paulò plus tribus digitis longam, pennis constantem, quarum ea quæ exortui ejus vicinior, brevior, secūda semper longior; estque cauda furcata, & avicula volans eam in duo amplissima cornua expandit, ita ut extremitates cornuum sesquidigitum à se invicem distent. Totum *Caput* & collum hujus aviculæ ex nigro serico colore elegantissimè cæruleum transplendet, ut in collo Anatum. Totum *dorsum* & pectus viride, aureum, & thalassino

trans-

transplendens, ut in secunda specie, atque etiam propè anum talis macula est è plumulis albis. *Alarum* color epaticus est. *Cauda* ex nigricante cœrulenti instar polito ferri cœruleo imbuti.

Quarta, paulò minor tertia: Corporis figura & plumarum dispositio eadem, sed alio colore, nec non differens rostro, & crurum colore. *Rostellum* sesquidigitum longum, deorsum incurvatum instar ensis Polonici, subrotundum, ubique æqualis crassitiei, & in extremitate acuminatum. Superior ejus pars nigra est, inferior flava, excepta extremitate quæ etiam nigricat. *Caput* superius, collum superiori parte, ut & alæ, colore sunt, ut prima species, guttur, collum inferius, totum pectus & infimus venter ex albo rufescentis sunt coloris. *Cauda* habet plus digito longam, desinentem cum fine alarum, constatque pennis ex nigricante virentibus, quæ in Extremitatibus albæ. *Crura* eodem modo disposita habet, ut cæteræ species, sed haud nigra, verum alba seu flavescens, similibus digitis, & unguiculis semilunaribus, acutis, & nigris.

Quinta, magnitudine par tertiæ speciei: *Rostello* nigro, paulò plus quam digito longo, & paulum deorsum incurvato, *ocellis* nigris, uti & cruribus & pedibus. *Guttur*, collum inferius, & totus venter nigris holosericis vestiuntur pennis, cui nigredini quasi paulum cœrulei transplendet. Propè anum macula est albis plumulis. Extremitates autem nigri, nimirum ad latera colli, pectoris & ventris mirè thalassino, aureo & viridi mixti resplendent. Totum *caput* superius, collum superius, & totum dorsum ornantur pennis, aureo, igneo & viridi mixtis, ut & initium alarum. Reliquum alarum ferreum est, seu fuscum. *Cauda* paulò plus digito longa, eleganter brunnis, cui cœruleus transplendet, pennis constat, circa oras autem pennæ illæ habent colorem, qualem chalybs politus cœrulescens.

Sexta, quintæ magnitudine par. *Rostellum* habet paulum curvatum, di-

gitum longum, inferius album, superius nigrum. Totum *caput*, collum, dorsum & venter, ac initium alarum, insignis coloris resplendentis pennis vestiuntur, nimirum plurimo aureo, dimidio ferè igneo, & minimo viridi mixto. In summa, splendet ut Sol. In ventre pennæ albæ paucæ mixtæ. *Crura* nigra sunt. *Alæ* nigricantes. *Cauda* sesquidigitum ferè longa, elegans & lata, constans pennis quibusdam insignis illius coloris, quo reliquum corpus, quædam ex viridi & aureo mixti coloris, & per oras albæ, quædam in uno latere, seu medietate albæ, altero virides, cui transplendet aureus.

Septima, paulò minor quinta & sexta specie. *Rostellum* habet non omnino digitum longum, coloris per totum corpus cinerei ferè, ut passer, cui hinc inde mirè resplendens rubrum instar Rubini perlucet.

Octava, omnium elegantissima. *Rostellum* rectum, nigrum habet, semidigitum longum; *Linguam* longam duplicatam: magnitudo & conformatio est ut secundæ speciei. Totum *caput* superius & collum superius miro rubini colore fulgent, ac si rubinus radiis solis illustraretur. *Guttur* autem & *collum* inferius merum aurum Hungaricum politum, & radiis solis illustratum exhibent, ita ut impossibile sit perfectè similitudinem horum colorum reddere, multò minus à pictore repræsentari. Initium *dorsi* holoserica nigredine tectum est, reliquum fuscis pennis, quibus tamen aliquid obscuræ viriditatis admixtum. Totus infimus *venter* ejusdem cum dorso coloris pennis vestitur; *Alæ* fusco ut in reliquis speciebus: prope anum maculam habet albam. *Crura* exilia nigra. *Cauda* digitum, & paulò plus longa pennis constat brunnis rufescentibus (seu leucomotis) quæ in extremitatibus per oras fuscescunt. *Cauda* lata, quam intervalandum egregiè explicat. *Alarum* extremitas cum cauda desinit.

Nona, figura & magnitudine, ut prima. *Rostellum* superius nigrum, subtus rufum. Totum *corpus*, exceptis alis, insigni illa splendet viriditate

cum aureo transplendente, quali secunda species in ventre. *Ale* fuscæ. *Cauda* digitum longa, latiuscula, pennis constans coloris, ut ferrum politum cœrulescens.

Sortitur autem avis hæc varia apud Brasilienses nomina, præter generale *Guainumbi*, ut *Guaracyaba*, id est, radius Solis, & *Gvaracigaba*, id est, capillus Solis. Fr. Ximenes scribit à Mexicanis appellari *Huitzitzil*. Avicula est, inquit, quæ habet plumas pictas variis coloribus, è quibus mixtis & compositis cum artificio, & admirabili industria faciunt Barbari imagines Sanctorum & aliarum rerum, atque ita conjungunt, ut optimè similitudinem repræsentent. Hujus aviculæ ea natura est & proprietates, quod non diutius vivat, quàm flores plantarum durant, cujus melle victitat, quibus decidens, rostro suo se affigit arborum truncis, & sex mensibus ita immota manet, donec flores renascantur: quod tam multis testimonijs confirmatur, ut de eo dubitari non debeat. Ajunt pulverem hujus aviculæ haustum, curare arthritidem coralloidè. Hæc ille. Vidimus plures ejusmodi icones artificiosè ex hujus aviculæ plumis concinnatas ita de trè, ut coloribus pictæ viderentur, si autem Soli obvertas, mirabiliter splendent.

CAPUT V.

Iacupema. Iacamacaj. Iacurutu. Soco. Matuitui.

JACUPEMA Brasiliensibus. Phasiani est species; paulò major gallina minore domestica nostrate. *Caput* illi gallinaceum haud magnum; *Rostrum* gallinaceum: *Oculi* nigrescentes, *collum* septem circiter digitos longum; *corporis* autem longitudo ab exortu colli, ad exortum caudæ novem circiter digitorum. *Caudam* habet longam & latam, longam nimirum pedem. *Crura* longa, superiora plumis vestita & quinque digitos longa, inferiora tres, aut paulò plus. In pedibus quatuor digitos gallinaceos,

quorum medius è tribus anterioribus duos digitos longus. *Plumis* tota avis vestitur nigris, quibus brunni aliquid mixtum. Ac capitis quidem plumas in cristam erigere potest. Cingunturque illæ nigræ alijs albis in ambitu. *Guttur* sub capite, & ad sesquidigiti longitudinem, in collo plumis nudum est, & rubra cute tectum. *Collum* totum inferius plumulis albis in nigris dispersis est variegatum, ut & totus infimus *venter*, ac alarum medietas posterior: superiora crura & cauda solis nigris constant, cui aliquid brunni mixtum. *Crura* inferiora & *pedes* elegantis rubri coloris. Cicurantur. *Carnem* habet bonam. Hæc avis à clamore suo nomen accepit, clamat enim *Iacu, Iacu, Iacu*.

JAMACAI, Brasiliensibus. Avicula Alaudæ magnitudine. *Corpus* tres digitos longum, *collum* plus digito, *crura* duos digitos, *cauda* ferè quatuor. *Caput* habet parvum: *Rostrum* digitum longum, directum, paulum deorsum inclinatum, acutum, nigrum quidem, at inferius prope exortum paululum cœrulescens. *Caput* nigris vestitur pennis, uti & *collum* inferius, superius luteis: totum *dorsum*, *pectus*, & infimus *venter* luteis, *ale* nigris, in quorum medietate albæ insertæ, quæ maculas albas faciunt, in qualibet ala unam: ad exortum alarum transversim per dorsum tendit nigra macula: *Cauda* etiam nigra. *Crura* & *pedes* fusci. Elegans est avis.

JACURUTU Brasiliensibus. *Bufo* Lusitanis. Noctua est, magnitudine æquat Anseres: *Caput* habet rotundum instar telis. *Rostrum* aduncum, nigrum, superiori parte longius. *Oculos* magnos, elatos, rotundos, & splendentes instar CrySTALLI; in quibus interius circulus flavus versus extrema apparet. Latitudo oculorum aliquantò major grosso Misnico. Propè aurium foramina plumas habet duos digitos longas, quæ instar aurium in acutum desinunt & attolluntur. *Cauda* lata est; neque alæ pertingunt ad illius extremitatem. *Crura* pennis vestita usque ad pedes: in quibus quatuor digiti, tres antè, unus postè, versus,

sus, atque in quolibet unguis incurvatus niger, plus quam digitum longus, & acutissimus. *Penna* totius corporis variegata est flavo, albo & nigricante perelegantiter.

SOCO Brasiliensibus, avis Aquatica, cujus multae hic observari possent species; haec cujus Iconem addimus, magnitudinem habebat Ardeae minoris. *Rostrum* obtinet rectum, nigrum, & in extremitate acutum, duos & senis digitos crassum, ubi crassissimum. *Caput* illi instar Ardeae, uti & *collum* pedem longum. *Oculi* nigri circulo aureo. *Ala* & *cauda* simul desinunt: Cauda enim brevis, nec supra quinque digitos longa. *Crura* satis longa, superiora quippe quatuor, & inferiora totidem digitos: in pedibus porro quatuor digitos, videlicet tres anterieus; unum posterius versum. *Crura* autem superiora ad medietatem sunt nuda pennis: caetera fusca cute tecta. *Caput* & *collum* brunnis quidem pennis, sed quae punctulis nigris variegatae sunt, vestiuntur. Per totum collum inferius ad pectus usque tendit linea plumis albis, nigris & brunis mixta. *Dorsum* & *Ala* nigris quidem, sed quae minutissimis punctulis flavescentibus variegatae sunt, vestiuntur; *Venter* quoque ad eundem modum: sub alis denique nigrae, & albo maculatae sunt pennae.

MATUITUI Brasiliensibus. Avis Alaudae magnitudine. *Rostrum* habet rectum, nigrum quidem, at in exortu inferius croceum. *Oculos* elegantes nigros. Totum *Caput* superius, collum, dorsum, ala & cauda superius coloris sunt obscurè grysei, & remiges alarum nigricantes. *Caput* inferius, guttur, pectus, & infimus venter albicant, ut & crura superiora, quae mediam partem pennis vestita, more avium aquaticarum. Supra exortum rostri in fronte maculam habet albam, & annulum album circa collum, & inferius semiannulum obscurè gryseum, huic contiguum: nam guttur totum album est, collum superius totum obscurè gryseum. *Crura* sunt sublateola; digiti autem pedum aliquid fusci admixtum habent. Tres solum-

modò digitos habet, in pedibus, omnes anterieus versos, qui in exortu cute ex parte junguntur: Unguiculi nigri.

Avis haec ad littora maris & ripas salforum fluminum discurrit.

CAPUT VI.

Iabiru. Iabirugvacu. Manucodiata.

IABIRU Brasiliensibus, Belgis vulgo *Negro*. Avis haec magnitudine superat cygnum. *Corpus* illius quatuordecim digitos longum; *Collum* totidem, & brachij humani habens crassitiem. *Caput* satis magnum, *Oculi* nigri, *Rostrum* nigrum directè extensum, & superius versus extremitatem paulum incurvatum; undecim digitos longum, duos & semis latum; versus exteriora acuminatum; estque superior rostri pars paulò altior, & major inferiori. Caret lingua, & sub gutture ingluviem habet mediocris magnitudinis. *Crura* longissima, duos nimirum pedes: superiora enim unum pedem & digitum longa, & mediam partem pennis nuda; inferiora undecim digitos. Sunt autem crura recta, nigricantia, & quasi squamata, digitum medium crassa. In pedibus digiti quatuor, tres anterieus, unus posterius versus; quorum medius quatuor digitos longus, caeteri paulò breviores. Tota avis vestitur albis pennis instar cygni aut anseris. *Collum* ferè totum, nimirum octo digitorum, longitudine à capite numerando, caret pennis; ac hujus medietas cum capite regitur nigra cute, reliqua alba cute. Sed puto in cute hâsuisse pinnulas albas, & fuisse abreptas. *Cauda* lata desinit cum extremitate alarum.

JABIRU GUACU Petigvaribus, *Nhanduapoa* Tupinâbis: Belgis *Deurvogel*. *Rostrum* habet magnum, septem & semis digitos longum, in extremitate teres, & inferius incurvatum; caret lingua, & rostrum inferius canum est. In summitate capitis mitram offeam coloris albi, & cinerei mixti gerit. *Oculi* nigri, & ponè eos aurium fo-

ramina ampla. *Collum* decem digitos longum, cujus medietas, utri & caput, plumis, ac cute squamosa cinerea est tecta, cujus squamæ albicant. *Corpore* æquat Ciconiam; *Caudam* habet brevem & nigram, cum qua alæ desinunt. *Crura* superiora ex parte albis vestita pennis, cætera tota cinerea, & quidem superiora crura longa sunt digitos octo, inferiora sex, aut paulò plus: digitipedum quatuor, ut in priore. Totum *corpus* & collum albis vestitur pennis, & à collo longiusculæ pennæ propendent & circum. *Alæ* albæ, remiges illarum pennæ nigræ, rubini colore transplendente in nigro. *Pellis* detrahitur huic avi, ac caro ejus cocta comeditur; pinguis est & sicca, boni saporis, præsertim si cocta butyro fricetur. Comedit sæpissimè.

MANUCODIATA, & quidem Rex creditus; ad aspectum Columbam, sed revera hirundinem æquabat. *Caput* habet parvum, *Oculos* parvos, rostrum rectū, satis crassum, acuminatum, sesquidigitum longum: *Collum* digitum longum; *Corporis* autem longitudo à collo ad caudæ exortum vix trium digitorum & semis. *Alæ* supra septem longæ; *Cauda* lata & sex digitos longa. *Crura* duo habet, quodlibet inferius duos digitos longū; quatuor digitos in pedibus, tres antrorsum, unum retrorsum versum, more communi; medius anteriorum paulò longior cæteris; posterior etiam satis longus; quilibet ungue lunato, seu ad unco accipitrino forti præditus. Suntque crura & pedes satis crassi, ac ad rapinam comparati. *Alæ* & cauda pennas habent latas & fortes digiti latitudine. Totum *dorsum*, infimus venter, alæ, cauda elegantis sunt brunni coloris; superius ad rostrum penulas habet holosericum leve referentes, viridi & fusco mixtas; inferius ad rostrum similes nigri coloris. *Collum* superius flavi, seu aurei est coloris, inferius viridis cum aureo transplendente. *Pectus* saturatè brunnium; sub alis in lateribus inter alas & crura, exoriuntur multæ pennæ, pedem plus, vel minus longæ, elegantis structuræ, quæ supra caudam longè ex-

tenduntur: sunt autem propè exortum flavi, seu aurei coloris, reliqua ex albo flavescences, brunno umbratæ, seu dilutè intermixtæ: inter has pennas duo quasi fila extenduntur; quodlibet longum duos pedes & amplius, ac versùs extremum incurvata, obscurè brunni coloris. *Crura* fusca sunt, unguibus magis albicantibus. *Rostrum* coloris est ex viridi & cæruleo mixti, versùs acumen tamen albicans.

Hæc est illa avis, quam alii Paradiseam vocant: cujus aliquod reperiuntur species.







CAPUT VII.

Guirapunga utraque. Guiraquerea. Iacamaçiri.

Cariama.

GUIRAPUNGA Brasiliensibus; Avis cujus sonus longè auditur; Turdelæ majoris magnitudinem superat, & columbæ ferè æquat. Rostrum habet digitum longum & latum, anterius acutum, cujus superior pars paulum prominere super inferiorem, ac deorsum est incurvatum, nigrum, naribus patentibus. *Oscillium* amplum, quod aperire potest usque sub oculos, ita ut oris apertura cum rostro triangulum formet. *Linguam* habet brevem. *Oculos* è nigro cæruleoscentes. Sub gutture autem, quod latum habet, & in collo inferiori, multas digitum longas propendentes particulas carneas nigras habet, figura spiculi hastæ, vel quasi ligulæ. *Caput* obscurè brunnis pennis vestitur. Totum *collum*, pectus, venter, dorsum & crura superiora leucopæis teguntur pennis, (quibus potissimum in dorso) nigricantes admixtæ, ac versùs caudam etiam virescentes. *Caudam* habet tres digitos longam, leucopæis ac nigricantibus pennis pauca viriditate admixta. *Alæ* (non multum post exortum caudæ desinentes) in initio sunt nigræ, reliquam partem nigricantes, quibus obscurè virescentes pennæ admiscentur. *Crura* inferiora nigricant, suntq; plus digito longa; digitos qua-

tuor



tuor habet cum cæteris communes, nigris unguibus: *Pectus* bifidum est, seu convallem habet per medium secundum longitudinem; tracheam amplam, unde etiam fortem clamorem potest edere. Duplicem autem sonum edit promiscuè, una vice quasi quis securi percuteret cuneum ferreum, in silva (*cock, cick*) altera autem quasi quis campanam fissam tangeret *Kur, Kur, Kur*, &c. Clamat autem solum media ætate, Decembris & Januarii initio per quinque aut sex septimanas, reliquis mensibus non auditur; unde Lusitanis *Ave de Verano* vocatur.

GUIRA PUNGA, fœmina; Turdelæ nostræ majoris magnitudine est & figura, & eodem modo carnosa. *Caput* habet latiusculum, *rostrum* quoque latum, haud longum, *oris* hiatus amplius quando aperitur. *Rostrum* nigrum. *Oculi* satis magni. *Cauda* tres digitos aut paulo plus longa, nec alæ ad illius finem pertingunt. Tota avis vestitur pennis nigricantibus, quibus fuscæ & dilutè virentes sunt mixtæ: magis tamen fuscus est in dorso color, in gutture, pectore, & ventre magis dilutè virens, & mixtus ut nostræ turdelæ, Avis est pinguis & copiosæ carnis. *Crura* & pedes nigricant, cætera nihil differunt à communi norma.

QUIRAQUEREA Brasiliensibus; Avis Alaudæ, magnitudine, sed quia longas alas, & caudam habet multo longiorem, videtur major. *Caput* latum, compressum, ac satis magnum habet. *Oculos* magnos & nigricantes; *rostellum* parvum, triangulare, compressum, & superiore parte aduncum. *Os* amplum, longè amplius rostro, quod apertum triangulum efformat. Ad utramque autem extremitatem rostri superioris ad latera digiti ferè longitudine, in quolibet decem, aut duodecim circiter setas crassas suillas habet protensas antè & ad latus. *Corpus* haud longum, sed rotundum ferè est. *Pedes* quatuor digitis more communi constant, quorum medius longior reliquis; & ungiculo suo (quos omnes habet nigros) pectine corneo subtiliter serrato do-

tatus est. *Alas* longas habet, nimirum semipedem. *Cauda* octo digitos longa, constans in extremitate duabus pennis longioribus reliquis. Tota avis ex fusco cinerei coloris cum maculis obscurè flavis aut albicantibus mixtis, more Nisi. Circa totum collum autem penè caput annulum habet obscurè aureum. *Crura* cinerea seu fusca. *Digiti* exigua pellicula connectuntur, non ita lata, ut in anatibus, nam non est avis aquatica.

JACAMA CIRI Brasiliensibus, Avis Alaudæ magnitudine. *Rostrum* rectum, acutum, nigrum habet, duos digitos ferè longum. *Lingua* brevem. *Oculos* cæruleos. *Alas* breves, quæ paulò post exortum caudæ desinunt. *Cauda* autem tres & semis digitos ferè longa, recta, septem aut octo pennis constans. *Crura* superiora pennis vestita, inferiora nuda, cute flava & viridi mixta. *Pedes* itidem. In quolibet pede quatuor habet digitos, duos antè, duos postèrè, versos; estque uterq; interior, tam antèrè, quàm postèrè, dimidiam tantum partem longus præ exterioribus. *Vnguiculi* nigri.

Totum caput, collum superius, totum dorsum, alæ, cauda superius coloris sunt viridis cum aureo & igneo mixti, ita ut mirificè resplendeat; ejusdem coloris annulus etiam circumdat collum. Sub gutture autem, in pectore & infimo ventre, & sub cauda obscurè flavi coloris est, ut cera vetusta.

CARIAMA Brasiliensibus, Avis Ardeæ majoris magnitudine; ex aquaticarum est genere: In capite super exortu rostri cristam plumatam gerit nigram cinereo mixtam, erectam. *Rostrum* breve, superius paulò aduncum, ex obscuro flavo fuscum. *Oculos* habet elegantes aureos, pupilla nigra, longis superciliis nigris. *Ala* desinunt paulò post exortum caudæ. *Crura* habet longa, superius mediam partem pennis vestita, cætera nuda & obscurè flava: *digiti* tres in pedibus, medium longissimum, exteriorè breviorè, interiorè adhuc breviorè. Suntque digiti ad partem cute connexi. In po-

stica parte pedis digitum parvum habet, altiori loco positum, & calcaneum rotundum, more Struthionis. *Vngues* digitorum breviusculi, lunati, fulci. Totum *corpus* pennis vestitur gryseis, seu cinereis fusco undatis, ut in falconibus, & obscure flavo mixto: extremitas alarum & caudæ fusca est, obscure flavo, & gryseo undata: in pectore & inferiore ventre plus habet grysei. *Caudam* demissam, collum erectum gerit. *Clamor* ejus instar gallopavi feminae, & longè auditur. *Carne* est valde probata.

CAPUT VIII.

Gvara. Urutaurana. Maguari. Gvarauna. Ajaja. Piciu pinima. Pica Cureba. Tuidara. Gvacagvacu. Tapera.

GUARA Brasiliensibus (in Marahoon frequentissima, & Rio de Ieneiro) avis est aquatica & terrestris, Albardcolæ magnitudine. *Rostrum* habet ensis Polonici figura, longum, ex albo subcinerelescens. *Oculos* nigros. *Collum* & *corpus* instar Albardcolæ. *Alæ* desinunt cum cauda, quæ brevis & demissa. *Crura* longa, quorum superior medietas pennis vestita, reliqua nuda. *Digiti* pedum quatuor communi modo, longiusculi, brevibus unguibus, prope exortum cute inter se connexi: crura autem nuda cum pedibus coloris ex albo grysei, uti & rostrum.

Tota avis vestitur pennis elegantis coloris coccinei, remiges tantum alarum nigras habent extremitates. Hæc avis primum exclusa coloris est nigricantis, hinc evadit cinerei, deinceps albi, sensim autem rubescere incipit, & secundo ætatis anno coloris est in totum, quem *Columbin* vocant, quoque magis senescit, elegantissimum illum colorem coccineum acquirit. *Vivitat* piscibus, carne, adjuncta semper aqua.

Brasiliani è plumis hujus avis varia componunt corporis ornamenta.

URUTAURANA Brasiliensibus, & *Vrutani cuquichu Caririri*, Avis Aquilæ magnitudine. *Rostrum* habet nigrum, cujus superior pars adunca, prope exortum tamen flavum; *Oculos* eleganter aureos, pupilla nigra, quos cuticula cinerea obducere potest, licet palpebras non claudat. *Caput* aquilinum quidem sed superius compressum, seu planum, in cuius summitate duas habent pennas nigras, duos circiter digitos longas, cum duabus parvulis ad latus quodlibet: illas autem quando vult, in altum surrigit, atque iterum componit. *Alæ* paulò post exortum caudæ desinunt. *Cauda* ei lata instar Aquilæ. *caput* superius fuscis tegitur pennis, quarum oræ subflavescent. Totum *collum* superius, & ad latera brunnis (ut perdix:) totum *guttur* cum collo inferiori est album, ita tamen, ut albedo ad latera pennis nigris sit variegata. Totum *pectus* & infimus *venter*, crura superiora & inferiora usque ad pedes pennis vestiuntur albis, quibus nigræ squamatim admixtæ sunt. *Alæ* & *cauda* fusci sunt coloris cum umbra mixti, atque oras habent subtiles albicantes. Remiges alarum pennæ sunt fuscæ & nigris undis variegatæ. In pedibus digitos habet quatuor flavos, unguibus lunatis fuscis. Clamat *Geb, Geb*, ut pullus galinaceus qui matrem perdidit. Rapax avis, crudam comedens carnem. Proiectam sibi avem, sive vivam, sive mortuam, unguibus arripit, & rostro egregiè deplumat, dein dilacerat, & carnem ossaque deglutit; unam harum diu vivam alui in munimento Mauritij ad Flumen S. Francisci.

ANNOTATIO. Icon hujus avis haud malè convenit cum Icone Nycticoracis Gesneri; non tamen Nycticoracis veterum, sed vulgo sic dicti circa Argentinam, & alibi circa Rhenum, avis piscatoriae) nisi quod in Capite tres pennas habeat.

MAGUARI Brasiliensibus; Avis Ciconiæ similis figura & magnitudine, atque etiam ex parte colore. *Collum* habet pedem longum. *Rostrum* rectum, acutum, novem digitos longum. *Crura* longa & nuda, ut ciconia.

Can-

Caudam brevem, cum qua alæ deficiunt. *Rostrum* in exortu ad medietatem usque ex viridi flavescens, reliqua medietas extrema ex cœruleo cinerea. *Oculos* habet parvos, argenteos, pupilla nigra, & circa eos cutem cinnabriam, ac similem etiam inferius prope exortum rostri, seu inter rostrum, & guttur: quam more *Senembi*, irascens dependere finit sub gutture.

Totum *Caput*, collum, & totum *corpus* albissimis vestitur plumis; ac inferiori parte colli pennæ albæ illæ sunt longiusculæ. *Cauda* autem quoque alba, at superius nigris aliquot pennis tegitur. *Alæ* in exortu albis teguntur pennis, sed propè dorsum nigris: nigredini autem persplendet viriditas. *Crura* sunt rubra, ut & pedes, quos cū *Ciconia* communes habet. *Rostro* crepitat, ut *ciconia* nostras. *Caro* illius edulis.

GUARAUNA Brasiliensib., Rusticola aquatica, magnitudine *Iacu*. *Rostrum* habet teres, paulò deorsum inclinatum, flavum, at in extremitate fuscum, quatuor & semis digitos longum; *corporis* autem illius longitudo est totidem. *Crura* superiora mediam partem pennis vestita, sex digitos longa: *Digit*i pedum quatuor ita dispositi, ut communiter; quorum medius tres digitos longus, cæteri breviores.

Tota avis vestitur pennis fuscis, multa umbra mixtis. *Caput* autem & collum totum ejusdem coloris, & præterea albo punctulatum, ut in *Iacu*.

Carnem habet satis bonam, quam sæpius comedi.

AIAIA Brasiliensibus, *Colherado* Lusitanis, Belgis *Sepelacr*. Avis figura conveniens cum Europæis, solo colore differens. Anseris magnitudine. *Rostro* instar cochlearis lato, albo: *Coll*o longo, pedibus latis. Tota alba est, se in dorso & alis dilutè incarnati coloris persplendentis. *Caro* illius edulis, & sæpè comedi. Frequens est ad Flumen Sancti Francisci, & alibi passim in locis palustribus.

PICUI PINIMA. Brasiliensibus. *Columbæ* silvestris species, paulò major *Alauda*, *Rostellum* habet columbinum, fuscum. *Ocellos* nigros, circel-

lo aureo. Totum *caput*, collum superius & ad latera, dorsum & alæ pennas habent obscurè cinereas, seu lividas, oris nigricantibus lunatis. Longioris autem alarum pennæ, seu remiges, quæ inter volandum videntur, rufi sunt coloris, uno latere nigricantes, ut & in extremitatibus. *Cauda* longiuscula ex pennis constat è cinereo fuscis, quarum & quædam nigra, & medietate exteriori albæ. *Venter* albas pennas habet oris lunatis fuscis. *Crura* & pedes columbini albescentes. *Carnem* habent bonam, & sunt admodum pingues.

PICA CUREBA Brasiliensibus, quoque *Columbæ* silvestris est species, coloris cinerei cum ruffo mixtis pedibus & cruribus rubris.

Avicula (cujus nomen *Auctor* non prodit) passeris magnitudine & figura, tota nigra, capite tamen albo, & cauda ex multo nigro & gryseo colore mixta. Clamat *zip, zip*.

TUIDARA Brasiliensibus; *Ululæ* est species; Germanis *Schleier-Eulen*/Belgis *Kerkuyke*. Capite rotundo, naso elato, & plumis complexis constricto; sub naso rostrum habet aduncum, album: *oculos* autem nigros. Tota avis faciei superficies, cordis, uti pingitur, habet figuram, plumulis obscurè ex albo flavis, cum paucis nigro mixtis, quasi fimbria circumdata essent. *Plumæ* totius avis mixtæ albo & pallide flavo ac gryseo: *Alæ* undatæ, uti & cauda. *Corpus* subtiliter punctatum cum fusco. Describitur & à Gesnero.

GUACA GUACU Brasiliensibus, Lusitanis *Gairvota*, Belgis *Meeuwe*. Avis gallinæ vulgaris magnitudine, rostro recto, longo, crasso, flavo. *Caput* superius nigris tegitur pennis, ut & ultima medietas alarum & *Cauda*. Guttur, totum collum, pectus & infimus venter, ac initium alarum sunt alba. *Ova* ponit in arena, gallinaceis figura, magnitudine & colore similia: quæ quidem boni sunt saporis, sed *caro* avis nullius est pretij.

TAPERA Brasiliensibus, *Adorinha* Lusitanis; *Hirundinis* specie, nostratibus similis, ejusdem magnitudinis, & eodem

eodem modo circumvolitans. *Rostrum* breve, latiusculum habet & nigrum. *Os* amplum, quod aperire ultra oculorum regionem potest, ut *Ibicus* junior. *Oculos* elegantes, nigros. *Alas* longas, desinentes cum fine caudæ, quæ latiuscula est. *Crura* & pedes ut nostratibus. Totum *caput* superius, collum, dorsum, alæ & cauda pennas habent coloris ex fusco cum gryseo mixti; remiges alarum & extremitas caudæ paulò magis fuscescunt reliquis partibus. Sub gutture & in pectore grysei est coloris cum albo mixti. *Venter* est albus, uti & sub cauda albet. *Crura* & pedes fusci.

CAPUT IX.

Psittacorum majorum & minorum varia species.

PSITTACORUM in Brasilia maxima est copia & summa varietas; quos Brasilienses communi nomine vocant **AIURU**. Aristoteles lib. IV. Histor. Anim. cap. X. scribit; *Eaque ovapariunt, an somnient incertum est, manifestum verò ea dormire.* Ego utrumque adfirmo cum Jul. Scaligero in Commentar. & quod ille de suo Turdo & Accipitribus, ego de meo Psittaco, quem Lauram vocabam, nam sæpius de nocte seipsum expergiscens semisomnus sublocutus est. Idem Lib. VIII. cap. X. scribit, Psittacum à Græcis etiam *αἰθραπύλοισιν* vocari. Psittaci nidificant in cavis arboribus, ubi foramen extra rotundum faciunt, ac ova duo aut tria columbinis similia imponunt sine nido aliquo ficto. *Ova* si tangas, nihilominus excluduntur, nec Psittacus ea deserit. Pullos excludunt medio Junio & sine plumati autem pulli inveniuntur apti ad eximendum sine Julij, & medietate Augusti. Psittaci juniores primùm exclusi vermes crassiusculos habent, in quolibet narium foramine unum, ac præterea in summitate capitis tuberculum, in quo itidem vermis crassus later. Omnes autem vermes brevi sponte excidunt, ac locus per se sanatur. Fiunt

varij coloris à Tapuyis, deplumando juniores, & cutem varijs coloribus inficiendo; Lusitani vocant *Papagios contrefeitos*. Nullus Psittacorum Brasiliensium, præter Curicos se manibus tangi in corpore permittit.

Prima species AIURUCURAU elegantissima est. Supra *Rostrum* in capite mitellam habet eleganter cœruleam: Guttur, latera capitis & superior illius pars eleganti flavo vestiuntur, totum corpus læto viridi. In alarum extremitatibus pennæ una medietate nigræ, altera crocæ, partim etiam in extremitate cœuleæ, partim hinc inde virides. In summa, eleganter variegatæ. *Cauda* viridis, sed quando illam explicat, fimbriata nigro, rubro, cœruleo: *Crura* & pedes cinerei coloris. *Rostrum* ex cinereo fuscum. *Oculi* nigricantes, circulo aureo. *Lingua* omnibus lata & crassa.

Secunda species priori similis, paululum aliter variegatur coloribus, nimirum in summo capite mitella flava, cui albedo mixta, super oculos & in gutture clarè flavo. Circa rostrum superius macula est thalassina.

Tertia species AIURUCURUCA. Mitram habet in capite ex cœruleo & paucò nigro mixtam, in medio mitræ maculam flavam. Intra oculos flava, & in gutture cœrulea est macula. Viriditas in pectore, alis & dorso paulò saturatior, in extremitatibus alarum & cauda dilutior. Extremitates penarum alæ flavæ & rubræ, & Indico colore mixtæ. *Cauda* inferius ex flavo & viridi mixta, superius dilutè viridis. *Crura* è cinereo cœulescentia. *Rostrum* superius cinereum, in extremitatibus nigrum, ungues pedum nigri.

TVI, vulgo Perroquet.

Prima species: Magnitudine Hirundinis: in totum viridis coloris: *cauda* longissima, *rostro* nigro, aduncum.

Secunda: Tui apud e juba, viridis in totum & quidem dilutius in reliquo corpore, in ventre flavescens, in alis obscurè viridis. *Cauda* longissima: magnitudinis ejusdem cum priori, *Oculis* magnis, subnigris, circello ex pennis circa oculos luteo, & supra rostrum, quod nigrum & aduncum, in capite

macu-

maculam habet magnam ex pennis Auraici coloris.

Tertia TVI TIRICA, paulò majores sunt Guineensibus, in totum viridis coloris, qui tamen in dorso & alis plerumque saturior; in reliquis partibus dilutior: *rostro* incurvato incarnati coloris. *Oculis* nigris; *Pedibus* cæruleiscentibus; *Cauda* paulum ultra extremitatem alarum protensa. Admodum hi mansuescunt; & cibum exalicujus ore capiunt, & manibus se tractari sinunt. Item instar Psittacorum garritum addiscunt.

Quarta: Magnitudine Sturni, ejusdem coloris cum secunda specie, sed breviori cauda.

Quinta JENDAYA: Sunt magnitudine Merulæ aut minoris Turdelæ; *rostro* & *cruribus* nigris, oculis nigricantibus, circulo aureo, exterius albo: Dorsum, alæ & cauda, ut & anus, viridibus pennis vestiuntur, quib. thalassinus mixtus: Extremitas alarum quodammodo nigrescit. Totum caput, collum & pectus flavi coloris sunt; cui luteus intermixtus.

Sexta TVI ETE, magnitudine Alaudæ, in totum dilute viridis coloris. At initium alarum egregie cæruleum est, & omnium pennarum in alis oræ cæuleæ, ita ut complicatæ, quando quiescit avis, maculam longam cæruleam prope oram lateralem alæ ostendent. In dorso ad exortum caudæ usq; etiam macula cærulea est. *Cauda* brevis. *Rosellum* incurvatum, incarnati coloris. *Crura* & *pedes* cinerei.

Septima: TVI PARA Tupinambis, magnitudine Alaudæ, in totum dilute viridis coloris, cauda brevior, ita ut cum alis desinat. *Rostro* incarnato; *cruribus* gryseis. Prope rostri exortum in fronte, maculam habet semilunarem miniatam, quasi coronam, quæ & inferius est; in cujuslibet alæ medio lutei, seu Vranici coloris. *Nidificant* in cumulis à formicis relictis, qui in arboribus reperiuntur.

Psittaci & *Tui* semper catervatim volant, nimirum bini ac bini juxta se invicem. Sylvæ his plenæ sunt, & sæpè quadringenti & quingenti simul volant, strepitum magnum clamore

excitantes. Confident in altissimis arboribus: nidificant potissimum in mediterraneis. *Caro* boni saporis; si assletur, maximè *Perroquet*.

ARARACANGA Brasiliensibus, Psittacus maximus, majores sunt corvis nostratibus. *Caput* magnum, superius planum, & latum habet. *Oculos* pulchros, cæcios, pupilla nigricante: Oculos autem exterius ambit membrana alba, ut & maxillas & rostrum inferius: hæc subter oculos semilunari forma est producta. *Rostrum* incurvum, magnum, superius albicans, inferius nigrum. *Linguam* habet ut Psittacus, & eodem modo edit. *Voces* etiam quasdam sonare discit. *Rostrum* superius tres circiter digitos longum, altum seu latum. *Crura* & *pedes*, ut Psittacus, habet nigros. Totum caput, collum, pectus, venter, crura superiora, & cauda inferius, ut & initium alarum superius elegantibus rubris pennis vestiuntur, per medietatem autem alæ testæ sunt viridibus, extrema autem medietas alarum usque ad finem cæruleis ornatur. Extremitas dorsi prope anum superius, & cauda cæruleis constant; quibus aliquot brunni coloris admiscetur. *Cauda* longa est decem circiter digitos, & longè prominent ultra finem alarum.

ARARAVNA Brasiliensibus. Figura alteri similis, sed alterius coloris. *Rostrum* nigrum, *oculi* cæcij, *pupilla* nigra. *Cutis* circa oculos alba nigris pennulis variegatur quasi acu picta esset. *Crura* & *pedes* fusci coloris. *Caput* anterius supra rostrum mittellam habet viridibus pennis: sub rostro inferiori ambiunt guttur pennæ nigra: *Collum* autem latera, reliquum guttur, totum pectus & infimum ventrem tegunt pennæ flavi coloris. Extremum caput, collum posterius versum, totum dorsum & alas exterius cæulei. Extremitatibus alarum plumæ flavæ sunt admixtæ. *Cauda* constat longis pennis cæruleis, quibus aliquot flavæ immiscentur. In genere autem cæuleæ pennæ interius sunt nigrae, & quodammodo etiam nigredinem ad latea de se spargunt.

ANACA Brasiliensibus: *Perroquet*,

Cc ma

magnitudine Alaudæ. *Rostrum* fuscum, aduncum. In capitis summitate epatici coloris pennæ, ad latera circa oculos brunni; *guttur* cinereum; *Collum* superius & latera viridia. *Venter* habet pennas ex brunno rufescentes. *Dorsum* viride maculam habet dilutè brunnam. *Cauda* quoque dilutè brunna. In alarum initio sanguinea macula sive fimbria est: reliquum alarum viride, extremitas thalassini coloris. *Crura* superius viridibus vestita pennis, inferius cute cinerea, unguibus nigricantibus. Elegans planè avis.

MARACANA Brasiliensibus, avis Psittaco planè similis (cujus & species) sed major, plumæ totius ex gryseo subcærulescunt, clamat ut Psittacus. Fructus amat; Murucuja imprimis.

MARACANA Brasiliensibus, item Araræ species minor; magnitudine Psittaci, figura Araræ, cauda longatili, rostro, & cute circa oculos. *Rostrum* nigrum, cutis circa oculos alba, punctulata plumulis nigris. *Oculi* flavescens, pupilla nigra. Totum *caput*, collum & alæ saturatè viridis coloris ut in Amururica; summitas capitis dilutior & quodammodo cærulescit. *Cauda* superius viridibus & in extremitate cærulescentibus, inferius saturatè rubris constat pennis. *Alæ* interius etiam rubræ, exterius virides, & extremitates cærulescunt obscurè. In exortu cujuslibet alæ maculatam habet miniatam. Super rostri exortum, superius maculam habet parvâ fuscâ. *Crura* & *pedes* fusci. Clamat *Oe, Oe, Oe*.

QUI JUBATUI flavus est totus, magnitudine Tuiapara; *rostro* incurvato gryseo, *Oculis* nigris. Extremitas alarum obscurè viridis est: *cauda* longa flava. *Crura* coloris incarnati. Facile & valde mansuescit.

PARAGUA Psittacus est niger, magnitudine Ajurucariu, pectore, dorso & ventre medietate anteriore insigniter rubro. *Oculis* nigris, circello rubro. *Rostro* fusco, seu obscurè cinereo. *Cruribus* & pedibus obscurè cinereis.

TARABE Brasiliensibus, Psitta-

cus est viridis, major quàm Paragua, capite rubro & pectore atque initio alarum. *Rostro* & pedibus obscurè cinereis.

AJURUCATINGA Brasiliensibus, Psittacus magnitudine pulli galinacei mediocris, totus viridis, *oculis* rubris, & circa oculos cute alba. *Rostro* albo, & cruribus albis. *Caudam* habet longam, viridem.

AJURUAPARA Brasiliensibus, in totum convenit cum præcedenti, sed minor est.

CAPUT X.

Ipecu. Urubu. Tamatia utraque. Gvirajemoja. Gurra-runtheengeta.

IPECU Brasiliensibus, Cortapao Lusitanis, Avis magnitudine columbæ. *Colli* longitudo duorum digitorum, *corporis* autem quatuor, & *caudæ* idem quatuor, crurum ferè sesquidigiti; in pedibus quatuor habet digitos, duos antrorsum, duos retrorsum versos, ut in Psittacis. *Caput* vestitur pennis cinabrij coloris, in quo & cristam habet instar columbæ: *Collum* ad rostrum usque inferius nigrum, ut & superius; In utroque autem latere linea est alba, crassa, quæ divisim ad dorsum protenditur. *Alæ* exterius totæ nigræ, interius albæ; *Cauda* nigra; in ventre & cruribus superioribus pennæ sunt nigræ, & albæ. *Rostrum* illius rectum, acutum, sesquidigitum longum, quo arborum cortices exscindit, ut Picus.

URUBU Brasiliensibus, vulgo *een Menscheneter*; Avis rapax, magnitudine Milvi & Nisi, pedibus gallinaceis subalbicantibus, *cauda* longa, & alis ea longioribus. *Pennæ* totius corporis sunt nigræ cum pauxillo ravi coloris hinc inde mixtæ. *Caput* habet parvum, figura penè gallinarum Indicarum, cute tectum paululum rugosa. In summitate autem capitis secundum longitudinem quasi dividitur cutis, & in sinistro latere capitis infra oculum crocei est coloris, supra oculum cærulei, in summitate item, reliqua

liqua parte ex ruffo subbrunni. In dextro latere capitis circa oculum superne & inferne crocei coloris, in summitate itidem, reliqua parte ex croceo albicantis. *Rostrum* habet satis longum, exterius aduncum, acutum, & ad medietatem usque à capite cute obtectum ex croceo cœrulescente. In mediate rostri superius narium foramen unum amplum transversum positum; extremitas rostri, quæ cute caret, est alba. *Oculos* habet elegantes rubiniferè colore, *pupilla* rotunda nigra: *Palpebræ* sunt croceæ: *Linguam* carinatham, in ambitu denticulis acutis præditam. Fœtet ejus *caro* instar cadaveris: nam & cadaverib. vescuntur, & in maxima copia statim advolant in Capitaniam Sirigippo, & Flumine Sancti Francisci, quando quis bestiam aliquam mactat. Fœda avis, semper macra, nunquam satura.

TAMATIA Brasiliensibus; Avis Alaudæ magnitudine, seu Pici. Tota punctulata, & variegata maculis ut Turdus minor, Germanis vulgò *Em Trosset*: in ventre albas habet pennas, maculis fuscis: sub gutture autem flavescit, uti & circa collum.

Rostrum habet longum rubrum, superius paululum fuscum; cuius superior pars paulò longior, quàm inferior. Supra nares subtiles aliquot extant pennulæ instar pilorum. In pedibus quatuor habet digitos unguibus aduncis. Caret *cauda*. *Caput* illius majus quàm proportio corporis requirat, uti & *rostrum*.

TAMATIA itidem Brasiliensibus dicta, avis aquatica, forsan gallina. Nisi *rostrum* obtinet, magnitudine Yassana asu: *dorsò* incurvato incedens & *collo* incurvato. *Caput* habet magnum, *oculos* magnos nigros, prope exortum rostri existentes. *Rostrum* duos digitos longum, plus uno latum, instar anaticis quidem, sed antèius acuminatum: estque superior ejus pars nigra, inferior flavescens. *Crura* superiora pennis nuda, satis autem longa: Digiti in pedibus quatuor, quorum tres antèius, unus postèius versus, more gallinarum, suntque longi ut in Waterhœn. *Crura* & digiti coloris ex

virescenti flavi. *Cauda* brevissima, & non longior quàm in Yassana. *Caput* nigris pennis vestitum, reliquum corpus brunni; in ventre autem albicantes pennæ intermiseruntur.

GVIRAIENOIA Brasiliensibus, Avicula magnitudine Fringillæ. *Rostrum* habet vix semidigitum longum & nigricans, *ocellos* nigros. Totum *caput*, collum inferius, pectus, infimus venter & dorso medietas extima pennis vestiuntur cœruleis: *Collum* superius & dorso medietas anterior nigris: *Ala* quoque nigræ, sed quibus in initio illarum inspersæ cœuleæ; reliquæ nigræ sunt, sed oras habent cœruleas. *Cauda* sesquidigitum ferè longa & itidem nigra, desinuntque *alæ* paulò post initium *caudæ*. *Crura* fusca; in pedibus quatuor digiti vulgari modo.

GVIRARV NHEENCETA, Brasiliensibus; Merulæ aquaticæ magnitudine, aut paulò major. *Rostrum* habet rectum, compressum, nigrum, plus dimidio digito longum: *Oculos* Sapphyrinos, *pupilla* nigra. *Crura* quæ superius vestita, sunt pennis cinereis, inferius nigra cute teguntur, uti & pedes, in quibus more vulgari quatuor sunt digiti, unguibus acutis nigris.

Totum *caput* collum, pectus & infimus venter pennis vestiuntur albis ad gryseum dilutum accedentibus, dorsum autem leucopæis sive cinereis. A rostro in utroque latere per oculum usque ad finem laterum capitis, macula oblonga tendit nigra. *Ala* nigræ, non tamen obscure. *Cauda* nigerimas habet pennas, quarum tamen extremitates sunt albæ, & superius quoque aliquot albis teguntur.

CAPUT XI.

Cocoi Ardea species: alia species.

Gviratinga. Ardeola. Iacarini.

Gviratirica. Gviran-
beemgatu.

COCOIBrasiliensibus, Ardeæ species est elegans, Ciconiæ ferè magnitudine. *Rostrum* habet rectum,

acutum, sex circiter digitos longum, quod in exortu ex flavo virescit: *Oculus* crystallinos, circello aureo: circum oculos cutem cineream. *Colli* longitudo quindecim digitorum; *corporis* decem; *cauda*, cum qua *alæ* desinunt. *Crura* superiora mediam partem plumata, octo digitos longa, inferiora sex & semis, cute tecta cinerea; digitos in pedibus quatuor, vulgari modo: quorum medius digitorum longus, cæteri breviores unguibus lunaribus, fuscis. *Guttur* & totum collum sunt alba, summitas capitis & latera nigri coloris cum cinereo mixti. Ejusdem coloris cristam elegantem gerit erectam; atque ab ea duæ elegantes plumæ deorsum posterius dependent, coloris ex nigro subcinerei, quælibet quinque digitos & semis longa. Anterius collum secundum longitudinem maculatum est plumis è nigro & cinereo mixtis. In colli parte anteriori & inferiori, elegantes habet plumas longas, albas, subtiles propendentes, quas in pileis gestare solemus. Totum dorsum, *alæ* & *cauda* cinerei sunt coloris diluti cum pauxillo albo mixti; superior medietas crurum superiorum, albis vestitur pennis. Per dorsum autem longitudinem cinereæ plumæ extenduntur subtiles, elegantes, figura similes illis in collo. *Caro* illius bona est, & sæpius comedi.

Reperitur hic & alia *Ardea*, Anatis domesticæ magnitudine, aut paulò major. *Rostrum* habet rectum, acutum, medietate anteriore, tam superius, quàm inferius, dupliciter ferratum, quatuor & semis digitos longum. *Caput* & collum habet *Ardea*: *Oculus* nigros, circulo aureo; *Collum* pedem longum; *Corpus* quinque digitos & semis, *caudam* quatuor, cum qua desinunt *alæ*. *Crura* tota novem & semis digitos longa, superiora mediam partem pennis vestita: quatuor digiti in pedibus vulgari modo. *Rostrum* superius est fuscum, prope exortum autem virescit è flavo. Totum caput & collum superius pennas habent longiusculas, pallidè flavas, nigro undatas; sub gutture albicat. Collum inferius, pedus, & infimus venter plumas habent

albas fusco undatas, quod in ambitu flavo est fimbriatum. Totum dorsum & *alæ* teguntur pennis fuscis flavo undatis, & remiges alarum pennæ sunt è nigro & cinereo, æquali parte, mixtæ, extremitatibus albis. *Cauda* constat ejusmodi pennis, qualibus extremitas alarum, sed transversim albo lineatis. *Crura* & pedes sunt obscurè gryseicoloris, ungues fusci. *Caro* comeditur, sapit ut aliarum *Ardearum*.

QUIRATINGA Brasiliensibus, *Garza* Lusitanis, *Ardea* species, Alberdeolæ magnitudine & corporis figura. Erectè incedit, collo longo, rostro extenso, recto, acuto, flavo, quatuor digitos longo, cujus pars superior nigra, inferior alba. *Crura* alta, ut *Ardea*, sex circiter digitos longa, pedum digiti ad vulgarem modum: crura exterius (ut & digiti) sunt flava, interius ex viridi & fuscomixta. Per totum corpus albissimis vestitur pennis: In collo elegantissimis plumis albis, quæ subtiliores sunt plumis *Struthionum*.

Aquatica est avis. *Crura* superiora sine pennis.

ARDEOLA columbæ magnitudine vix par: *Collum* habet longissimum. *Rostrum* rectum, acutum, superius fuscum, inferius ex albo flavescens, duos & semis digitos longum, linguam brevem, acutam. *Oculus* mediocres, circello aureo, pupilla nigra. *Caput* parvum, *Collum* tenue, ac septem digitos longum, cum corporis longitudo vix sit quatuor. *Crura* longa, quodlibet quinque digitos; superior medietas mediam partem nuda. In pedibus digitos quatuor communi modo dispositos, unguibus lunatis acutis. *Color* talis est: prope oculos, ubi rostrum inseritur, cutis melini coloris est. *Caput* superius vestitur pennis chalybei coloris pallidè fuscis inspersis: totum collum cum pectore & infimo ventre plumas habet, alas leucopæis mixtas & pallidis, ut variegatus appareat. *Dorsum* nigrum est, ex parte chalybeo fuscum cum cerei coloris pennis mixtum. Alarum pennæ longæ virentes, in extremitate maculam habent albam, reliqua superficie ex fusco, cha-


chalybeo, cereo, & leucopæo ele-
ter variegata. *Cauda* duos digitos lon-
ga, quam tegunt alarum extrema-
tes, quæ cum illa definunt. *Crura* su-
perius leucopæo & cereo mixta. Nu-
da pars & pedes cute melina recta
sunt. *Ungues* leucopæi. Erecta incedit
avis & decenter.

JACARINI Brasiliensibus, Avis
carduelis magnitudine. *Rostellum* ha-
bet crassum, cinereum. *Crura* & pedes
cinereos, cum quatuor digitis more
vulgari. Totum *corpus* nigris vestitus
pennis, sed in quibus resplendet color
instar chalybis politi. *Alæ* interius al-
bicant. *Oculi* cærulei, & ponè illos
amplum foramen loco aurium.

GVIRATIRICA Brasiliensibus,
Avis Alaudæ magnitudine. *Rostrium*
habet crassum, rectum, superius fu-
scum, interius album, & paululum in-
carnatum. *Crura* cinerea cum quatuor
digitis more vulgari. Totum *caput*
cum gutture, & colli inferiore & me-
dia parte egregiè sanguinei sunt colo-
ris: *Oculi* cærulescunt; aurium fora-
mina ampla. Latera colli, totum pe-
ctus & infimus venter albis vestiuntur
pennis. *Collum* superius habet nigri-
cantes, quibus paucae albæ mixtæ.
Dorsum gryseum est (inspersis nigris
paucis) ut & initia alarum: reliquæ ala-
rum nigrum, ut & *cauda*, quæ tres cir-
citer digitos longa: Oræ laterales in
alis sunt albæ.

GVIRAN HEEMGATU Tupi-
nambis; Avis passeris magnitudine.
Caput superius luteum, & guttur: *Col-
lum*, pectus, & infimus venter flavi
coloris, alæ ex virescenti & flavo mi-
xtæ ac fusco distinctæ, uti & cauda,
ocelli & rostrum sunt nigra. *Crura* fu-
sca; hic mas egregiè canens ut Frin-
gilla, vulgo *Vinde*.

Fœmina ejusdem magnitudinis
plumis passeris vestitur, nec ita ca-
nit, sed clamat 'tschrip, 'tschrip,
ut passer.



CAPUT XII.

*Curucui. Caracara. Tyegva-
cu. Teitei. Guiragvacu bera-
ba. Gviracæreba. Gvirape-
rea. Iapacani. Cabure.
Andiraaca.*

CURUCUI Brasiliensibus; Ele-
gantissima avis, ferè magnitudine
Picæ. *Rostrium* habet breve, latiuscu-
lum, coloris sulfurei. *Os* amplum, &
quando aperit, triangulatum. *Oculos*
pulchros cæruleos circulo aureo; &
sub quolibet oculo maculam cuta-
ceam albam, ut gallinæ: in palpebris
superius & inferius pilos nigros du-
rículos. *Collum* haud longum. *Cru-
ra* breviora, & ad pedes ferè plumata
pennis nigris. *Caudam* habet quinque
& semis digitos longam, latiusculam.
Sub rostro inferiori in medio, & ad
utrumque latus quasi barbam setis
compositam nigris, sed in qua trans-
splendet cæruleus, ut in Anatome colo-
lo: sub gutture autem plumæ tantum
nigræ. Totum *pectus* & infimus ven-
ter egregiè miniati sunt coloris; to-
tum *dorsum* & cauda superius ex cæ-
ruleo & igneo splendide virescunt.
Extremitas *cauda* oram habet nigram:
inferius autem cauda pennas habet
albas, nigro transversim eleganter
striatas. Initium alarum etiam insigni
illa viriditate splendet, media pars ca-
nescit, nimirum plumis nigricantibus,
minutissimis punctulis canis consper-
sis, ut anates esse solent. Ultima pars,
scilicet longæ alarum pennæ ex fusco
nigrescunt. *Crura*, ut dixi, ferè tota
vestita, nigris pennis, cætera cum pe-
dibus fusca sunt è cinereo. *Digitos* ha-
bet dispositos ut Psittacus. *Penna* sub-
ter alas sunt canæ.

CARACARA Brasiliensibus, *Ga-
via*on Lusitanis, Nisi species, Avis ma-
gnitudinis Milvij, *caudam* habet lon-
gam novem digitos; *alarum* longi-
tudo quatuordecim digitorum, quæ
tamen nondum ad finem *caudæ* per-
tingunt. *Color* pennarum totus est ravi-

coloris cum albis & flavis punctulis. *Cauda* albo & fusco est variegata. *Caput* Accipitrinum, *rostrum* adunco, mediocriter magno, nigro. *Crura* habet lutea, pedibus accipitrinis, unguibus semilunaribus nigris acutissimis & longis. Avis gallinis valde infesta.

Habui aliam ejusdem magnitudinis, & colore pennarum ut præcedēs, sed pectus & venter erant alba. *Oculi* aurei, & cutis circum eos flava. *Crura* lutea.

THEGUACU Brasiliensibus, Avicula passeris magnitudine, aut paulo major. *Rostrum* habet breve, triangulare, latiusculum, nigrum. *Ocellos* sapphyrinos: *Crura* & pedes cerei coloris, unguiculis fuscis, digiti dispositi more vulgari. Totam aviculam vestitur pennis coracinis: at in summitate capitis maculam habet clypeiformem splendentis sanguinei coloris. Totum *dorsum* autem ferè & utramque alam superius ad partem obtendit macula nigro-cærulea. *Cauda* brevis & nigra.

TEITEI Brasiliensibus; quam etiam vocant *Guiranhemgeta* & *Guraundi*. Avicula Rubeculæ magnitudine. Aviaro includitur pro canora ave, sed pipit tantum ut Rubrica, Germanis *Gimpel*. *Vescitur* paco & mamao. *Rostrum* habet breve, crassiusculum, nigrum. *Caput*, collum superius, alæ, & totum dorsum, & cauda nigris vestiuntur pennis, quibus aliquid cærulei, admixtum, ita ut splendeant instar chalybis. *Guttur*, collum inferius, pectus, totus infimus venter, & crura superiora sunt lutea: ad exortum rostri superioris post nares maculam habet è pennis luteis. *Crura* & pedes fusci sunt coloris; & hic est mas.

Fœmina proportionem & magnitudine planè respondet mari, eodem rostro, & iisdem cruribus; sed color plurimum differt; est enim viridis, ut *Acanthis*. Germanis, *Zyschen*. Alæ ac caput cum collo superius paulum fuscescunt & cærulescunt mixtim. *Delectantur* hæ aviculæ quinque aut sex conjunctim aviario includi.


GVIRAGVACV BERABA Brasiliensibus. Avis Carduelis magnitudine. *Collum* inferius *dorsum* & ventris

extremitas lutei seu aurei est coloris. *Caput* superius & collum, dorsi medietas anterior, alæ & cauda dilutè viridis. In alarum extremo fuscæ pennæ mixtæ sunt. Sub gutture ad oculos usque maculam habet magnam, nigram. *Rostrum* habet rectum, acutum, flavum, superna parte paulum nigricans. *Crura* & pedes fusci coloris.


GVIRACOEREBA Brasiliensibus. Avis Fringillæ magnitudine. *Rostrum* habet nigrum, tres quartas partes digiti longum, acutum, & paululum deorsum flexum. *Oculos* nigris. *Linguam* multipliciter fissam: In capite superius mitellam thalassinis pennis, reliquum caput, guttur, & totum corpus inferius, pectus, & totus infimus venter, cum dorsi medietate posteriori cæruleis vestiuntur pennis, lactescentibus, & à pectore per initia alarum ad dorsum, ubi incipit cæruleus color, linea lata cærulea transit transversim per exortum alarum: totum autem collum superius cum medietate dorsi anteriore profundè nigris subtilibus holosericeis vestitur plumis. *Cauda* sesquidigitum longa est & nigra. *Alæ* magnæ, quæ ad medietates laterales flavescunt. Flavedo autem illa tegitur, nec videri potest, quando avis confidet, quando verò volat, alæ ex nigro & flavo eleganter striatæ videntur. Inferius alæ ferè totaliter flavæ sunt. *Crura* superiora pennis nigricant, & cærulea quodammodo sunt: Inferiora nuda, & cinnabrij coloris una cum pedibus, unguiculi in pedibus nigri. Habent autem pedes digitos quatuor, vulgari modo dispositos.

GVIRAPEREA Brasiliensibus; Avis Alaudæ magnitudine. *Rostrum* habet breve, crassiusculum, nigricans. *Caput* superius & collum, totum dorsum & infimus venter, pennas habent obscurè flavi coloris, ut cera citrina: Caput inferius, guttur & collum inferius cum pectore nigras, quales & paucae in ventre flavis sunt intermixtæ. *Cauda* duos digitos longa, & præterit alas. Constat autem cauda & alæ pennis fuscis & nigricantibus, quarum

Tangara



Curucui



Guiragua cuberab




Tyegua cuparara



Atingacucamucu




Pitangui macu



Guiracangatini



Aracari



Pullus galli
naceus mon-
strosus




Ipcali Apoa



Matuntui



Aulunga



rum quælibet cum laterali extremitate thalassina, ita ut fusca alæ thalassino videantur striatæ. Cauda iridem. *Crura* superiora etiam cerei coloris; inferiora cum pedibus obscure cinerei. Digiti quatuor modo vulgari, unguibus nigricantibus.

JAPACANIBrasiliensis, Avis magnitudine *Bemtere* aut *Schanepue*. *Rostrum* habet nigrum, oblongum, acuminatum, & paulum deorsum incurvatum. *Oculos* aureos, pupilla nigra. *Caput* vestitur pennis nigricantibus, collum superius, dorsum, alæ ex umbra & nigro mixtis. *Cauda* superius nigricans, inferius albo maculata est. *Pectus*, & totus infimus venter ac crura superiora ex albo & flavo mixta, ac lineis seu strijs transversis nigricantibus intertexta. *Crura* fusca. Digiti in pedibus quatuor vulgari modo, unguibus acutis & nigris.

CABVRE Brasiliensibus; Noctua species: Avis magnitudine Turdelæ. *Caput* habet rotundum, rostrum breve, aduncum, flavescens, duo foramina narium. *Oculos* pulchros, magnos, rotundos, flavos, pupilla nigra. Sub oculis, & ad latera rostri multos habet pilos, longiusculos, fuscus. *Crura* brevia, totaliter pennis vestita, flava, uti & pedes. In ijs autem quatuor digitos, more vulgari, unguibus semilunaribus, acutis, nigris. *Caudam* latam, prope cujus exortum alæ desinunt. In toto capite, dorso, alis, cauda, coloris est umbræ dilutæ: ac in capite & collo minimis, in alis majoribus maculis albis variegatur. *Cauda* vero albo est undata. *Pectus* & infimus venter albicant, & maculis umbræ dilutæ variegantur. Facile mansuescit. *Collum* ita circumagere potest, ut rostri acies exactè dorsi medietatem ostendat. *Ludit* cum hominibus instar simiæ, & varios mimos facit ad spectu suo, & crepitus rostellis; præterea pennas ad latera capitis erigere potest, ut cornicula, seu auriculas representent. *Vivitat* carne cruda.

ANDIRA ACA Brasiliensibus, Vespertilio cornutus. Multi hic reperiuntur in Palmis nuciferis degentes; paulò majores nostratibus, præ-

pingues, cinerei coloris, mollibus & longioribus pilis, auribus latis. In singulis pedibus habent quinque digitos, acutis unguibus armatos. *Dentes* candidi, & supra nasum corpusculum, ejusdem cum auribus longitudinis, satis grande ex materia qualis illius rictus, flexile seu mobile. Alarum longitudo æquat semipedem Rhynlandicum.

C A P U T XIII.

Macuacagua. Columba silvestris species. Anas silvestris.

Urubitinga. Mareca utraque.

Tyegnacuparvata. Tangara utraq;

MACUCAGUA Brasiliensibus: Gallinæ silvestris species, magnitudine Gallinæ nostratis vel etiam major. *Rostrum* habet nigrum. plus sesquidigito longum, antè paulò incurvum, ut perdicis: In rostri medietate duo narium foramina ampla. *Oculos* nigros, post eos aliquanto spacio aures more gallinarum. *Corpus* crassum, *Ala* cum eo desinunt, nullam enim habet caudam. *Crura* inferiora nuda, duos & semis digitos longa. In pedibus tres habet digitos anteriorum versos, crassiusculos, unguibus brevibus, obtusis. *Calcaneus* rotundus, ut in Struthione, & paulum supra illum breviusculus digitus versus interiora, ungue obtuso. Totum *caput* & collum punctulatum est obscure flavo & nigro, sub gutture albicat. *Pectus*, venter & dorsum obscure cinerei sunt coloris. *Ala* umbræ coloris per totum undatæ nigro, præter remiges pennas, quæ totaliter nigra. *Crura* superiora pennis vestita, uti venter, inferiora cærulescat cum pedibus, ungues grysei. *Carnosa* admodum est avis, & tantum carnis habet, quantum duæ gallinæ domesticæ vix habeant: estque boni saporis. Sub cute crassa & pingui cuticulam habet, aliam qua caro tegitur. *Vivitat* variis fructibus, qui ex arboribus silvestribus decia-

decidunt. In ventriculo illius inveni fabas silvestres, semina Araticu. Humi currit, nam pedes inepti ad arbores scandendum. *Ova* ponit Gallinae paulo maiora, coloris cœruleo-viridis.

COLUMBÆ silvestris species ex Insula S. Thomæ allata, nostratum magnitudine & figura: sed rostro superius adunco, & coloris in medietate anteriori tota cœrulei, cum albo & paulo flavo mixti, in pœsteritate tota sanguinei. *Oculi* nigri, circulo, cœruleo. Pennis tegitur per totum viridibus, ut *Pittacus*. Remiges alarum ex viridi fuscescunt, ut & extremitas caudæ. Sub ano flavo habet pennas. *Crura* & pedes eleganter crocei coloris, ungues autem fusci.

ANAS Silvestris, magnitudine Anseris. *Rostrum* habet nigrum, *Crura* fusca, uti & pedes. Tota nigra est, exceptis principiis alarum, quæ albas. Nigredini tamen illi viridis color transplendet. *Crista* in capite gerit nigris plumis constantem, & massam carnosam corrugatam, rubram supra rostri superioris exortum. *Cutem* quoque habet rubram circum oculos. *Caro* bona & copiosa. *Figuntur* plerumque in altis arboribus confidentes; nam post lotionem in aqua frigida altas subeunt arbores, captandi aëris & Solis causa.

VRVBITINGA Brasiliensibus; (sed dubito adhuc de hoc nomine, nam nobilior est hæc avis quam *Urubitinga*) *Avis* Aquilæ similis, Anseris semestris magnitudine. *Rostrum* habet crassum, aduncum, nigrum, & circa nares cutem flavescientem. *Oculos* magnos, splendide aquilinos. *Caput* grossum. *Crura* & pedes luteos, in pedibus quatuor digitos vulgari modo dispositos; *Unguibus* lunatis, longis, nigris: *Alas* amplas: *Caudam* latam. Tota vestitur plumis fuscis & nigricantibus; Per alas autem undatim quasi cinereus miscetur. *Cauda* novem digitos longa, ad sex alba, in extremitate ad tres nigricans, in extremitate tamen rursus minimum est albi. Egregiæ staturæ est avis.

MARECA itidem *Anatis* silvestris species, sed parva. *Rostrum* habet a-

natum fuscum, ad cuius exortum in utroque latere macula rubra. *Caput* superius est leporini grysei coloris, latera capitis sub oculis tota alba. Totum pectus & infimus venter ligni querni sceti colorem obscure æmulatur, variegati præterea punctulis nigris. *Crura* & pedes nigri. *Cauda* grysea. *Alæ* elegantes, in exortu ex gryseo subfuscentis coloris, remiges autem sunt in uno latere prioris coloris, tota autem medietas extrema dilute brunescens, qualis in pedibus esse solet, in medio autem coloris viridis transplendentis, cum fimbria nigra, qualis in anatum collis. *Caro* valde bona.


MARECA alia species, ejusdem cum antecedente magnitudinis & figuræ. *Rostrum* habet nigrum splendens. Summitas capitis, collum superius, totum dorsum umbræ coloris cum fusco mixti. Sub gutture albicat. *Oculi* nigri, & ante quemlibet macula parva rotunda, plumis ex albo flavescens. Totum pectus & infimus venter obscure grysei coloris cum aureo mixti. *Cauda* nigra. Alarum pennæ fuscæ, quibus viride transplendet: & mediæ pennæ alarum eximia viriditate & cœruleo in fusco transplendent, hic & undam nigram habent, extremitas autem remigum tota est alba. *Crura* & pedes insigniter rubri seu miniati coloris. Assata avis pedibus apprehensa manus & lintamina tingit colore miniato sanguineo. Boni saporis habent carnem, sed paulum amaricantem.

THIEGVACV PAROARA Brasiliensibus; *Avis* Alaudæ magnitudinis. *Rostrum* habet breve, crassum, superius fuscum, inferius albicans. *Caput* superius, latera ejus & guttur ac collum inferius habent pennas flavas, sanguinei coloris pennis punctulatas (& hæc foemina quidem, mas enim hæc tota habet sanguinea.) *Collum* superius, & totum dorsum cinereas, umbra aliquatenus mixtas. *Alæ* fuscas oris albescens præditas, ut & caudæ; sed alæ teguntur cinereis, dorsum maximam partem exceptis extremitatibus. Latera colli, pectus & totus venter, & crura superius albis teguntur pen-


Macrocagua




Vruhu



Cocoi ardea Spenes




Caracara



Anhima



Ardeola



Tangara



Vriचितinga



Guna icnora



pennis. *Crura* inferiora & pedes fusci sunt coloris; quatuor digiti more vulgari positi. *Ocellos* habet nigros.

TANGARA Brasiliensibus. (Reperiuntur ejus aliquot species colore variantes.) *Prima* elegans, magnitudine Fringillæ. *Rostrum* habet rectum, crassiusculum, nigrum. *Oculos* nigros. *Crura* & pedes ex cinereo fuscis. *Supra* rostri exortum supernè maculam è pennis nigris. Totum *Caput* & collum splendentibus viridibus seu thalassinis pennis vestiuntur. Initium dorsi instar collaris ambiunt nigerimæ pennæ. *Dorsum* autem subalis usque ad exortum caudæ vestitur plumis luteis. Totus infimus venter egregiè cœrulescit. Alæ nigræ sunt, & earum extremitates laterales cœruleæ, ita ut totaliter cœruleæ appareant complicatæ, & sola extremitas nigra videatur. Initium alarum exterius etiam thalassinis pennis niter, & cuique alæ superius in dorso, seu in extremitate superiori laterali flavæ pennæ sunt mixtæ. *Caudam* habet latam, sesquidigitum circiter longam, nigram pennis, sed quarum extremitates laterales cœruleæ sunt. Extremitas caudæ est nigra. Includitur cavæ, & clamat *zip, zip*, seu ut Rubrica Germanis *Gympel*. *Vescitur* farina & pane.

Secunda species: figura & magnitudine passeris nostratis. *Rostellum* habet ex flavo fuscum, latiusculum, in extremitate acutum, cujus inferior pars multò brevior superiore. *Ocellos* nigros. Totum *caput*, egregiè miniatis tegitur pennis, totum reliquum corpus cum alis & cauda splendide nigris. *Crura* superiora albis pennis, & in latere exteriori maculam oblongam miniatam habent, quasi sanguine maculata. *Crura* inferiora & pedes cinerei sunt. In pedibus digiti quatuor more vulgari. *Cauda* brevis digitum longa, & alæ prope illius exortum desinunt.

CAP. XIV.

Anhima. Pitangua gracca.

Attingvacu camacu. Guiracangatara.

ANHIMA Brasiliensibus: Avis aquatica ex rapacium genere, major cygno. *Caput* habet haud magnum, Gallinaceo simile & rostro nigro: cujus superior pars paulò longior inferiori, & in extremitate deorsum incurvatum. *Oculos* pulchros aureos, pupilla nigra, & exterius nigro circulo. In capite prope exortum rostri cornu gerit erectum, extremitate sua antrosum versus incurvatum, paulò plus quam duos digitos longum, crassitie chordæ majoris in Viola majore, rotundum quasi tornatum esset, coloris albicantis, seu offei. Circum cornu plumellæ subtiles breves eriguntur albæ & nigræ. *Collum* habet plus septem digitis longum, reliquum corpus ad caudæ exortum ferè sesquipedem. Alas amplissimas, ut potè quarum plumarum longitudo sesquipedem superet. In cuiusque alæ antica parte duo cornua recta triangulata ex ipso osse alæ enata obtinet, crassa minimi digiti apicem, & conicè triangulatæ figuræ. Est autem quodq; anteriorum digitum longum, posteriora paulò breviora coloris fusci. *Caudam* habet decem digitos longam, instar anserinæ latam. *Crura* superiora quatuor digitos longa, & quoad medietatem inferiorem pennis nuda: Inferiora quinque digitos longa, ferè duos crassa. In quolibet pede quatuor digitos obtinet more Gallinarum dispositos, quorum medius trium anteriorum quatuor & semis digitos longus, reliqui duo tres & semis: posterior autem ferè duos. Quilibet unguem habet corniculatum nigrum, digitum longum, & in posterioribus digitis paulò longiorem. *Cute* fusca & squamosa teguntur & digiti, & crura nuda. *Capitis* vertex plumulis variegatus est albis & nigris: ad latera, in gutture & colli medietate superiori nigricat, inferior medietas colli & pe-

etus variegantur albis, cinereis & nigris pennis. *Venter* interior albas in totum habet pennas, ad latera sub alis, & in dorso sunt nigræ, sed quibus albæ hinc inde permiscetur. *Cauda* est nigra; *Alæ* etiam nigræ exceptis oris extremis (prope ossa) ubi ex albo flavescunt pennis variegatæ sunt. Terribilem clamorem edit *vyhu, vyhu* vociferando. Nunquam sola invenitur, semper par, mas & fœmina junctim incedunt, & una mortua, altera à sepultura nunquam discedit. *Cornu* quod in capite gerit, remedium est contra venenum, si in vino per noctem infundatur. Idem remedium est contra suffocationem uteri, & in difficili partu. Hæc quam descripsi, fœmina est; mas duplæ magnitudinis. *Nidum* suum facit è luto ad caudices arborum super terram, figura furni.

PITANGVA GVACV Brasiliensibus, *Bemtere* Lusitanis, magnitudine æquat Sturnum. *Rostrum* habet crassum, latum, pyramidale, paulò plus digito longum, exterius acuminatum. *Collum* breve, quod sedens contrahit. *Corpus* ferè duos & semis digitos longum. *Caudam* latiusculam, tres digitos longam, crura & pedes fuscas, quatuor digitos more vulgari. *Caput*, collum superius, totum dorsum, alæ & cauda coloris sunt è fusco nigricantis, pauxillo viridi admixto. *Collum* inferius, pectus, & infimus venter habent flavas pennas, superius autem juxta caput corollam (quasi monachicam) albi coloris. Sub gutture ad exortum rostri albicat. *Clamat* alta voce.

Quædam harum avium in summitate capitis maculam habent flavam, quædam ex parte luteam. Vocatur à Brasiliensibus Cuiriri, alias per omnia Pitanguaguacu similis.

A IINGVACV CAMACV Brasiliensibus: Avis Turdelæ ferè magnitudine. *Caput* habet satis grossum, collum mediocriter longum; *Corpus* tres digitos longum: *Rostrum* paululum aduncum, coloris ex viridi & flavo mixti. *Oculos* sanguineos, pupilla nigra. *Crura* cinerea mediocris longitudinis, superius pennis vestita. In pedibus digitos quatuor, vulgari mo-

do. *Caudam* longissimam nimirum novem digitos longam, decem circiter pennis constantem, quarum quædam inferiores sunt breviores superioribus. Totum caput, collum, dorsum, alæ, & cauda pennas habent brunnas seu fuligineas, quæ in cauda paulò saturatiores sunt reliquis. Extremitas cujuslibet pennæ caudæ semidigitum longa, alba est, & inter album & rufum nigro umbrata. Guttur, pectus, & infimus venter ac superiora crura cinereis pennis vestiuntur. In capite longiusculas habet pennas, quas instar duorum cornuum potest surrigere. Elegans avis ob longitudinem caudæ.

GVIRA ACANGATARA Brasiliensibus. Avis picæ variæ magnitudine. *Rostrum* habet digitum longum, cujus superior pars paulum adunca, totum autem obscure flavescit. *Oculos* crystallinos, circulo fusco. *Collum* duos digitos longum, *Corpus* tres. *Cauda* longissima, nimirum octo digitos, constans octo pennis rectis. *Crura* superiora pennis vestita, & sesquidigitum longa, ut & inferiora. In pedibus digiti quatuor, more psittacorum, & quidem versus interiora sunt duo breviores, versus exteriora duo longiores in quolibet pede. Totum *caput* pennis vestitur, quæ in medio secundum longitudinem (proximè scapum) fuscæ, in lateribus flavescences, ut crista. Collum & alæ è contrario pennas habent in medio flavescences, & ad latera fuscas. Extremitas alarum ferè planè fuscescit. Totus *venter*, dorsum, (exceptis alis) crura superiora, & exortus alarum, ad trium & semis digitorum longitudinem pennis constant ex albo pallidè flavescētibus, reliquum caudæ fuscescit, extremitas autem albas oras habet. *Crura* inferiora, & pedes thalassini sunt coloris. In capite longiores pennæ in cristam eriguntur. Ingentem in silvis excitat clamorem.

CAPUT XV.

Matuitui. Aracari. Anhinga. Ipecati apoa. Pullus gatlinaeus. Innominata tres.

MATVITVI Brasiliensibus, Avis sturni magnitudine. Brevis collo, pectore forti, cruribus brevibus, cauda duos & semis digitos longa. *Rostrum* habet rectum, forte, cujus superior pars paulum prominere acumine inclinato, cinnabrij coloris. Totum *caput*, collum superius, dorsum, alæ, & cauda constat pennis fuscis pallide flavo maculatis; apparentibus partim punctulatis, ut in Niso. Sub gutture flavas habet pennas. Pectus & venter albis vestiuntur, quæ fusco sunt punctulata. Crura obscure cinere sunt.

ARACARI Brasiliensibus: Avis magnitudine picæ Martiæ. *Rostrum* habet quatuor digitos longum, sesquilatum, seu altum, tres & semis crassum, ubi crassissimum, paulum deorsum incurvatum, instar gladii Turcici, & in extremitate acutum, instar psittacini; estque superior pars paulo longior inferiori. *Rostrum* superius & inferius plus mediam partem ab extremitate numerando serratum dentibus: superior pars rostri major inferiore; est autem rostrum canum, levissimum, levius spongia, superius album, linea in summitate crassa nigra secundum longitudinem distinctum: Inferior tota est nigra; totum inseritur in caput triangulatum, & ubi insertio est linea triangulata alba circumscriptum. *Linguam* habet quatuor digitos longam levissimam, aspectu planè pennam referentem, aut etiam plumata est & nigra, (si pennam habere lingua dici possit.) *Caput* non ita magnum habet, latum, compressum. *Oculos* magnos, pupilla nigra, circulo flavo, reliquas extremitates nigras. *Collum* haud longius Psittacino. *Corpus* à colli exortu ad caudam usque quinque circiter digitos longum. *Cauda* instar picæ latiuscula, & sex digitos, vel paulo plus

longa. *Crura* & *pedes* nigricantes ex viridi, Psittacorum similes, duos digitos habent antè, quorum unus longior altero, duos retrò, itidè inæqualis longitudinis; ungues incurvati, fusci, seu nigri. Crurum superiorum longitudo duorum digitorum, inferiorum sesqui. Totum caput & collum usque ad initium pectoris nigras habet plumas, & ubi desinunt, circulariter finiuntur. *Pectus* verò & infimus venter totus eleganter flavis vestiuntur pennis, cum pavonino mixtis: Per Pectus autem transversim linea digitorum lata sanguinei coloris ducta est ab uno latere usque ad alterum. Totum dorsum, alæ, cauda, & crura superiora vestiuntur pennis ex nigro viridicantibus, uti in nostratibus picis color esse solet. Extremitas dorsi ante initium caudæ etiam sanguinei coloris, plus uno imperiali in circumferentia. Alæ desinunt ad exortum caudæ, & interius è cinereo sunt subfusci coloris. *Rostrum* interius est nigrum. Avis hæc quasi suum nomen profert, clamando acuto sono; sed non admodum clangoso *Aracari*.

ANHINGA Brasiliensibus Tupinamb. Mergi aquatici species elegans; corpus, excepto collo, anatis domesticæ Europææ habet magnitudine. *Rostrum* rectum, haud crassum, acutissimum, tres digitos longum, & per rostri medietatem anteriorem tam superius, quam inferius duplicem ordinem acutissimorum hamulorum retrò versorum. *Caput* parvum, longiusculum, serpentine æmulum, paulo plus sesquidigito longum. *Oculos* nigras, circulo aureo. *Collum* tenue, teres, pedem longum, corpus autem tantum septem digitos, crura breviora, superiora duos digitos longa; pennata; inferiora vix sesquidigitum; quatuor digitos, tres antè versus, membranis junctos more anatum, aut corvi aquatici, quartus digitus brevior ad latus inferius extenditur, itidem membrana reliquis connexus; unguibus lunatis omnes acutissimis. *Caudam* latam, decem digitos longam; duodecim pennis constantem, alæ circa medietatem caudæ desinunt.

Rostrum gryseum est, & post exortum paulum flavescit. Caput totum & collum plumis subtilissimis tegitur ad tactum holosericum referentibus; Coloris in capite & collo superius ex gryseo subflavescentis: sub gutture, & in collo inferius grysei coloris, ut pelles illæ (*Berchfelle* vocant) ex quibus mitræ fiunt muliebres, & ad tactum, & ad spectum illius pellis pilos refert. Totum pectus, & infimus venter, & crura superiora plumis mollibus vestiuntur coloris argentei. Initium dorsi pennis fuscis, sed quarum quælibet in sui medio maculam habet oblongam ex albo pallide flavam, ita ut punctulatum appareat: reliquum dorsi nigras habet pennas. *Alas* obtinet longas, quarum initium totum ejusmodi brevibus pennis tegitur, uti initium dorsi, sequitur ordo mediam partem, id est, uno latere canarum, altero nigrarum: Remiges autem nigræ sunt. *Cauda* nigris splendentibus pennis constat, quarum extremitas grysea. *Crura* & pedes ex obscure flavescente grysei sunt coloris. Solertissima in capiendis piscibus: nam, more serpentum, contracto prius collo, ejaculatur rostrum in pisces, ac unguibus eos præhendit. *Carnem* illius comedi, sed haud melior est, quam caro Lari.

IPECATI APOA Brasiliensibus: *Pata* Lusitanis, id est, Anser, nobis Anas silvestris magnitudine anseris, octo vel novem mensium, figura planè ut nostrates anates. *Venter* & interior pars caudæ, collum totum cum capite pennas habet albas, dorsum usque ad collum, alæ, & summitas capitis nigras, cui viriditas mixta, ut in nostrarum anatum collis. In collo & ventre albis pennis nigræ passim sunt insparse. In his differt à nostratibus, quod sit *primò* major: *secundò* rostrum anatum quidem, sed nigrum, & in extremitate aduncum. Terriò super rostrum cristam gerit carnem, crassam, latam & rotundam ferè, nigram, albis maculis insignitam, *Cristæ* altitudo eadem; inter cristam & rostrum (in summitate nimirum rostri) foramen transversum magnitudine pisi est, ab utroque latere conspicuum, quod na-

rium vice fungitur. Quartò pedum & crurum color non ruber, sed è cinereo fuscus. *Carnem* multam & bonam habet, nam sæpissimè comedi. *Reperitur* passim ad fluvios.

Alium habui per omnia similem priori, excepto, quod longiores illæ pennæ in alis, insigni brunno splendebant colore, puto marem hunc esse, alteram fœminam.

ANNOTATIO. Gesnerus pene similem dedit iconem sub nomine Anatis Indicæ, cujus picturam sc à Cardano accepisse memorat. Sed color pennarum non nihil differt ab Auctoris nostri descriptione.

PULLUS gallinaceus monstruosus, magnitudine pulli recens exclusi. *Caput* habebat anaticum, superius tamen magis in acumen desinens, *rostrum* anaticum, latum, cujus superior extremitas deorsum inflexa. *Ocellos* parvos, collum breve; *alas* parvulas juxta priora crura positas: quatuor crura gallinacea, carebat pectore, quippe eo loco, quo pectus esse debebat duo crura habens, quodlibet superius tres quadrantes digiti longum, inferius quadrantem; & in singulis quatuor digitos gallinaceos. Posteriora duo crura ejusdem figure & longitudinis cum anterioribus mirè posita erant, sinistrum quidem more naturali, dextrum verò in exortu suo sinistro erat adnatum, & quasi sursum vergebat, eo modo quasi duo sinistra crura fuissent, & unum dextrum loco sinistri in exortui fuisset adglutinatum: atque ideo urypigio carebat, quia nullum intervallum inter crura hæc posteriora, & caudæ loco ipsi sinistro cruri exterius longiusculi pili canescentes erant adnati. *Pedes* habebat gallinaceos, & digitos eodem modo dispositos: sed quilibet pes totus inverso ordine positus erat, ita, ut inferior pars esset superior, & superior inferior, unguiculi que etiam sursum non deorsum vergebant. Totum *caput*, collum, venter, alæ, dorsum, & superiora crura non vestiebantur pennis, sed pilis nigris semidigitum longis, qui sub ventre & gutture paululum canescebant. In summa, plane monstruosus pul-

pullus. *Crura* inferiora & pedes fusci coloris, uti & rostrum, vitalia viscera habebat gallinacea, sed inordinate disposita. *Cor magnum*. Vivebat cum excluderetur.

Avis (cui *Auctor nomen non adscripsit*) magnitudine *Alaudæ*, figura *Matuituy*. *Rostellum* habet rectum, nigrum: *Oculos* nigros; *crura* communia fusca: *Caudam* latiusculam, & alis longiorem. Totum *Caput* superius, collum superius, dorsum, alæ, & cauda, rufescentis sunt coloris, ex rubro, umbra & albo mixti. Guttur, collum inferius, & infimus venter albi sunt coloris. Per oculus utrumque à rostro transversim maculam habet oblongam fuscam. Clamat *Gip, Gip*, ut junior gallo-pavus ferè.

Avis (cujus *nomen Auctor non prodit*) magnitudine *Patæ*, & ejusdem figure. *Rostro* nigro, crassiusculo; *capite* nigro, *pectore* & ventre cano; dorso, alis & cauda fuscescentibus, *cruribus* fuscis. Clamat *Zip, Zip*, ut *Passer*.

Avis (quam *Auctor non nominat*, sed tantum admonet esse speciem *Curucui*, de qua cap. 12.) magnitudine *Picæ* ferè. *Rostrum* habet breve, crassiusculum, paulum deorsum incurvatum, gryseum seu cinereum: *Oculos* nigros, circulo croceo; *Caput*, collum, dorsum superius, & cauda superius coloris nigri cum viridi cæruleo persplendente, ut in chalybe polito: *Alæ* fuscae; Totum *pectus* & infimus venter egregij coloris miniati: *Cauda* inferius albas habet pennas, transversim nigro ordine undatas. *Crura* brevia, fusca sunt; digitis quatuor, more *Psittacorum* dispositis. Reperitur hic & alia *ARDEÆ* species: tota alba, rostro croceo, recto, acuto: *Oculis* nigris, circulo aureo, *cruribus* & pedibus nigris. *Rostrum* habet quinque digitos longum, *collum* longissimum, nimirum quinque digitos supra pedem. *Corpus* septem digitos longum, *caudam* quinque, cum qua alæ desinunt. *Crura* superiora octo digitos longa, & ex parte pennis vestita, inferiora sex digitos. *Digiti* pedum communi modo se habent, quorum medius anteriorum quatuor digitos longus, reliqui breviores, omnes unguibus lunatis præditi nigris.



DE AVIBVS AQUATICIS BRASILIENSIS.

Inter Aves marinas quæ in Brasilia reperiunt, septem sunt notatu digniores.

Prima est *QUIRATINGA* grui magnitudine par, plumis candidis, rostro prolixo atque acuto, crocei coloris; *cruribus* oblongis è rubro subflavis. Collum ipsius vestitur plumulis tam subtilibus & elegantibus, ut cum struthionum plumis certent.

Alter est *CARIPIRA*, quæ quod *Nieremb.* in binas partes bifurcatam caudam *H. Exot. l.* distinguat, interdum explicans inter- *10. c. 38.* dum contrahens, sartoriæ forcipis instar, *De Laet.* *Raboforcado* ab Hispanis dicitur. *Ind. Occid.* Reperitur passim in utraq; India. *l. 15. c. 13.* *Plumas* ejus quod longo tempore durent, sagittis suis adhibent Barbari. *Ximenes adipem* ad cicatrices faciei delendas, & arthritidis dolores sopiendos, singulare esse remedium narrat. Et sibi donati alarum remigium ita ut volant distentum, amplius quam mortalis ullus distento utroque brachii possit complecti, occupasse spacium, addit. Non facile capitur, nisi fortè in deserta aliqua insula; in qua pullos excludit.

Tertia *CALCAMAR* columbæ est magnitudine sed volandi nescia. In fluctibus ova ponit & excludit; quos etiam alarum atque pedum remigio secati per velociter. Malacia & pluviis imminuentibus tanto numero naves circumfluitant, ut à nautis fastidiantur.

Quartam *AYAYAM* nominant, picæ magnitudine, longo rostro cochlearis instar, plumis candidis rubris maculis eleganter suffusis, singulari in piscibus capiendis industria.

CARACURA est quinta, exili corpore, subcinerei coloris, pulchris oculis, iride eleganter uberte, ita vocalis, ut majoris longè molis quis opinaretur. Ante solis forè ortum & sub occasum auditur, certo, ut volunt, serenitatis futuræ indicio.

Sexta est GUARA, picæ magnitudine, oblongo rostro, & anteriore parte recurvo, longis pedibus. Primum exclusa nigricat, deinde evadit cinerea; ubi autem volare incipit egregie candicat, sensim autem rubescit, donec ætate plumæ illius colorem induunt purpuræ æmulum, quem ad senectam usque retinent. Visitant piscibus, carnibus, & aliis eduliis semper aqua temperatis. Pariunt quoque sub testis. Gregatim volant, & soli expositæ pulcherrimum præbent spectaculum. Ex plumis diademata & alia ornamenta à barbaris conficiuntur.

Ultima est GUIRATEONTEON quasi dicas avem sæpius morientem & rursus resurgentem. Epilepsiæ enim obnoxia est admodum; alioquin candidis & pulcherrimis plumis vestita.



APPENDIX.

De Avibus Fabulosis.

CAPUT I.

De Gryphibus & Harpyis.

PLacet & de Fabulosis aliquid adnectere, ne & in hisce quicquam nobis desideretur. Præcedat Gryps seu GRYPHUS, cujus nomine major fortè Aquila, ut sanè in Oriente & Septentrione majora nostris animalia gigni experientia compertum est; venere potest. Ejus *formam* si spectes, fingitur esse quadrupes, antica parte, seu capite; alis, rostro, & pedibus aquilam referens; posticâ leonem. *Magnitudinem* a

a Philostr. l. 3. de vita Apollonii.
b Aelian. l. 4. c. 27.
c Apuleii. l. 11. Mile-
fiat.
d Aelian. l. 4. c. 27.

Nidos ex auro quod effodere con-
struunt, & ova duo Aquilinis majora

e duriora, calidiora & sicciora, ponunt. *Volatum* avium par viatum ipsis *Philostatus* tribuit. Non enim pennatæ, inquit, sunt, sed rubræ pelli-
f l. 3. de vita Apollonii.
culâ alarum costæ tanquam digiti cō-
g Solin. c. 25. *Polybi-*
nectuntur. Dicuntur aurum in Scythia *g Asiatica* custodire, ideo inter ipsos & Arimaspos internecinum vivere odium. Tractat de eo *b Aelian.* h. l. 4. c. 27
nus, & quomodo aurum illud auferant incolæ describit, sed & equis peculiariter infestos esse rumor est. Videtur huc M. Pauli *i Veneti* avis
il. 3. c. 40.
RUC dicta pertinere, aquilæ effigie, sed magnitudine immensa. Visitur certis anni temporibus in insulis ultra Madagascarem sitis, tanti roboris ut sola, sine aliquo adminiculo elephântem capiat, & in sublime raptum rursus ad terram labi sinat, quo carnibus ejus vescatur. Plæræque alarum pennæ passus XII. sunt longæ, ea crassitie, quæ longitudinis mensuræ cōveniat. Fides sit penes Authorem. Navigationes & præteriti & hujus seculi, omninò de tali ave tacent.

HARPYIS nomen à rapacitate inditum. Ex Electoo Oceani filia genitas & Hesiodus prodit. Ponti & Ter-
k In Theorâ filia aliis dicuntur. Tres fuisse Vir-
nid.
gilius dicit, Ocypeten, Aëllon, & Cælæno. Hyginus Alopen Acheloën & Ocypeten appellavit; Homerus quartam nomine, Thyellam addidisse creditur. De forma sic *l Virgilius* *13. Aeneid.*

*Virginei volucrum vultus, fædissima
ventris*

*Proluvies, uncaq; manus, & pallida
semper*

Ora fame &c.

Collocantur in Strophalidibus *m in* m Ovid. l. 1.
sulis. Apollonius fugatas conjecit. *l. 13. Metamorph.*
se in specie, qui in Creta sub Argimunte visebantur, tradit. De ipsarum rapacitate, ingluvie, & fecunditate vide *n Valerium Flaccum, o Virgilium, & alios.*

* *

* *

Ω (o) Ω

Ω

n l. 4. Ar-
gonaut.
o l. 3. Aeneid.



C A P. II.

*De Stympthalidibus, Sireni-
bus & Seleucidibus
avibus.*

S*tympthalidibus*, à *Styphala* palu-
de nomen datum est. *Magnitudine*
grues æquant. *a* *Ibibus* cætera sunt
simillimæ, rostra tamen, ejusdē nem-
pe duritiei, ut hominum scuta perfo-
rare, firmiora habent, & non ut *I-*
bis obliqua. *Plinius* eas *cirrhatas*
facere *b* videtur. *Marinas* eas *c* *Isi-*
dorus facit. *Apollonius* circa *Aretia-*
dem insulam collocat. *Timagenes* &
Pisander in *Scythiam* avolasse tradit.
Pausanias *Arabiz* quoque deserta in-
coluisse ait. *Vescebantur* humana car-
ne. *Hercules* eas ex *Stympthalide* pa-
lude abegit, seu crepitaculi æreisoni-
tu, sed quod multas sagittis confe-
cisset.

SIRENES qua forma fuerint, non
convenit inter Authores. *Alij* eas su-
periori parte virginis formam intulisse,
inferiore in piscis caudam defuisse:
alij d infera aviciam speciem habuisse
fabulantur. *Nonnulli* in superioribus
speciem passerum, in inferioribus
mulierum eis tribuunt. *Boccatus* pe-
des gallinaceos assignat. *Eustathius*
verò à *Venere*, quod virgineam sibi
delegissent vitam, in aves transforma-
ras tradit. *Bina* sunt quibusdam, *A-*
glapheme nempe & *Thelxiepeja*: tres
alias *Parthenope*, *Leucosia*, & *Ligia*. *Sunt*
qui quatuor & quinque fuisse fingunt.
Sed nec de eorum ortu eadem tra-
duntur. *Quidam* è sanguine è cornu
Acheloi destillante natas volant.
Nonnulli ex congressu ejus cum *Mu-*
farum aliqua, de *Venere* superius di-
ximus. *Habitavere* primum juxta *Pe-*
lorum *Siciliz* promontorium, postea
in *Capeis*. *Plinius* *Surrentum* *Cam-*
paniz oppidum, una cum promonto-
rio *Minervæ*, earundem sedem fuisse
scribit. *Finguntur* tam suavam har-
moniam voce, tibijs, & *lyra* edidisse,
ut & mare & ventos mulcerent. *Can-*
tu verò suo navigantes occidisse pas-
sim apud diversos Poëtas legere est.

De eorum cum *Ulyssæ* colloquio vi-
de apud *Ciceronem* & carmen.

cl. 5. de si-
nib.

SELEUCIDES aves vocantur, quarum adventum *Casij* montis in-
colæ, locustis fruges eorum vastanti-
bus, à *Jove* precibus impetrant nec
unde veniant, quove abeant, comper-
tum, nunquam conspectæ, nisi cum
præsidio earum indigeretur. *Voracita-*
tem eis antiquitas tribuit. *Ingestas*
locustas nullo negotio per alvum ex-
cernebant.

Plin. l. 10.
c. 27.

C A P U T III.

*De Phænice, Cinnamomo &
Semenda.*

P*HOENIX* fabulosa est avis. *He-*
rodorus a nonnisi pictum se vidisse
se testatur. *Plinius b* unum in toto
orbe, nec visum magnopere scribit. In
eius descriptione variant Authores.
Herodorus non tantum ei *Aquilæ*
magnitudinem tribuit, sed & toto et-
iam habitu eidem similem facit. *Alij*
Pavone c majorem scribunt. *Hero-*
doto pennæ rubore perfunduntur.
Plinio verò & *Solino* circa collum au-
ri fulgore micant. Cætera purpureus
dicitur, cæruleam roseis maculam
pennis distinguunt. cristis, faciem,
fauces caputque plumbeo apice co-
honestante. *Idem* *Claudianus*, *Ba-*
ptista *Mantuanus* & *Lactantius* pro-
dunt.

a Hist. l. 2.
b H. N. l.

c Tret. l.
5. Histor.
Chil. 6.

Locum ipsi quidam *d* *Arabiam* as-
signant: *alij e* *Heliopoli* civitate *Æ-*
gypti primò visum reliquere. *Qui-*
dam sub æquinoctiali ad Orientem &
Meridiem reperiri scribunt. *Claudia-*
nus, & *Lactantius* inaccessa loca ha-
bitare cecinerunt.

Locus.
d Amb l. 5.
Hexa c. 23.
Plin. H. N.
l. 10. c. 2.
Solin. Po-
lyb.
c Tacit. l.

Nec de victu convenit. *Plinius* pri-
mum atque diligentissimum togato-
rum. *Manilius* de eo prodidisse au-
thor est, neminem extitisse, qui vide-
rit vescentem, quidam rore victitare
dixerant. *Ovidius* thuris lacrymis &
succo amomi vivere scribit. *De Nidi-*
ficatione ejus & in parentem amore ita
f *Tacitus*. *Confecto* annorum numero
ubi mors propinquat, suis in terris struere
nidum, eique vim genitalem adfundere, ex
qua

14. Anim.
Victus.

Athene. l.
14. Dipnos.
Partus.
fl 14. A-
nimal.

a Pausan.
in Arcad.

b l. 11. c. 37
cl 12. Ori-
gin.

d Aelian.
l. 17. de A-
nim. c. 23.

qua foetum oriri, & primam adulto curam sepeliendi patris, neque id temerè, sed sublato myrrhæ pondere, tentatoque perlongum iter ubi par oneri, par meatui sit, subire patrum corpus, inque solis aram perferre atque adolere. Idem Herodotus, ex quo ille defumisse videtur.

Aetas.

Annorum illorum numerus variè definitur. Maximè vulgatum quingentorum spacium, sunt qui asseverent mille quadringentos sexaginta unum interici. Plinio sexcenti sexaginta placent; Philostrato sexcenti, Herodoto, Solino, Mele quingenti quadraginta. Alberto trecenti quinquaginta; Chæmoni Ægyptio, sex supra septem mille. *De terris* quoque variatur. Jarchas Indus apud Philostratum prope Nilum assignat. Alij in Æthiopia, ut Chæmon Ægyptius, & Orus Apollo. Alij in Phœnicia, ut Lactantius.

Partus.

Nido materia aromata, Cinnamonum, Cassia, thurisq; furculi. Ubi illum conscendit, solaribus sese exponit radijs, alarumque continua ventilatione ignem excitare fingitur: sic se cremat. Ex cremato novum oriri pullum convenit inter omnes; quomodo verò id fiat, ambigitur. Plinius ceu vermiculum ex ossibus & medullis veteris Phœnicis primò procreari, ex eo pullum nasci scribit. Philostratus nullâ vel ossium vel medullarum mentione facta, ex cinere vermem ex verme novam alitem generari nugatur. Oppianus ex cinere pullum exoriri refert. Orus ex effuso è patris vulnere, quod sponte sibi nimia ad terram allusione infligit, sanguine procreari affirmat. *Sexum* illi nullum attribuit antiquitas, sed inter vitæ remedia reposuit. Nam Plutarchus cerebrum ejus

Plut. l. de

dulce esse tradit, nescio à quo gustatum; & Plinius inter prima à Magis excinere ejus nidoque medicinas proditas esse scribit. Heliogabalus in conviviiis Phœnicem promittebat, aut M. auri libras pro eo.

CINNAMOMUS seu Cinnamonologus, avis hætenus nobis incognita est. Herodotus grandem esse dixit. Vincentius Bellunensis passere aliquanto majorem, coloris partim flavo, partim cœrulei, rostri longi ad flavum vergentis scripsit. *Herodot. in Euterpe.*

Locus ipsi ab Antiquis in Arabia assignatur. Dyonisius Periegetes terram ignorari una cum Herodoto memorat. Albertus in Æthiopia eum locat. *Albert. l. 23. de Animal.*

Nidum ponit seu in excelsissimis arboribus, earumque ramis, seu in montium præruptis, illumque ex cinnamomi furculis exstructum. Aromate hoc cum potiri Arabes volunt, boum, asinorumque; defunctorum membra minutatim concisa, juxta nidos ponunt, & abscedunt. Frustra aves in nidos comportant, quibus sustinendis illi impares decidunt, & ab incolis colliguntur.

De **SEMENDA** non est quod dicam. Multa quidem sed parum verisimilia de illa, Indica commeteria produnt. *Aldro. Ornihol. l. 12. c. 28.* *Caput* ipsius, quod esse putabat, quod Aldrovandus in Musæo Ducis Florentini vidit, erat curvum, & valde crassum, colore in anteriore parte albicante, in posteriore purpureo obscuro, figura ovali. *Rostrum* habebat palmum longum, admodum acutum, intus quidem cavum, sed sine tribus illis fistulis, quibus musicam harmoniam à Semenda edi, quidam fabulati sunt.

* *

MANTISSA

De Avibus Exoticis ad nostrates
accidentibus.

I. De Aquilis.

Nieremb.
Hist. Exot.
l. 10. cap.
30. 31.



D Aquilas perti-
nent *Itzquaubtli* & *Tla-*
coquaubtli Indorū, nec
non Leonis Africani
Ners. Venuustum illud

aquilæ genus; & insignito capite re-
gium. Rostro est ad radicem luteo,
deinde verò nigro, nigris unguibus;
pedibus pallidis, cruribus ventreque
è nigro & candido permixtis; collo
fulvo, dorso & caudâ nigris ac fuscis,
coronâ cristâ venigra. Magnitudinem
circiter æquat vulgaris arietis, & vel
ferocium audaciam animalium, adeo
ut homines etiam ipsos, postquam ci-
curata est, levi ex causa aggrediatur
& involer: mitefci tamen, & aucupio
non minus ac reliqui accipitres, quo-
rum genus videtur, idonea est, atque
inservire solet. Avis digna quæ à Re-
gijs aucupibus alatur ac circumferat-
tur. Vilior est *tla-coquaubtli*, seu a-
quila virgæ: frigidas amat plagas: astu-
ris magnitudine, fusca & cinerea, ra-
pax avicularum, murium, lacertarum,
colotorum, quibus vescitur. De *Nesir*
suo ita Leo Africanus. Avis est omnium
earum, quæ in Africâ reperiuntur, ma-
xima, grue procerior, crassiorq; præ-
dita rostro, collo & cruribus: adeo
sublime volat, ut oculorum aciem ef-
fugiat, & conspecto alicujus animalis
cadavere, supra terram jacente, illico
in illud irruat. Rarò sola, sed gregatim
volare solet. Longæva est, nam
pleræque conspectæ sunt calvo & de-
plumi capite, tanquam vulsæ fuissent

Leo Afri-
can. Africa
l. ult.

capitis pennæ: inde colligere licet,
præ nimio senio pennarum defluvium
pati: eâ de causâ suos nidos veluti re-
center natæ repetunt, unde à suis pul-
lis educantur. *Coronate* in provincia
Chiapæ habentur, ut apud de Laet in
Novo orbe habemus.

II. De Noctuis.

EXoticum Oti genus *talebicuatl* vi-
detur. Cornuta avis est sive auricu-
lata, parva corpore, resima, rostro bre-
vi, nigra lumine, luteâ erubescens iri-
de, fusca & cinerea plumis usque ad
crura, atra & incurva unguibus. Ce-
tera naturâ similis nostrati Oto. Apud
eosdem Americanos *Tecolet* genus est
bubonis auriti, spectaculo dignum,
nigro & fusco colore variegatur, huic
oculi magni & aurei.

Nieremb.
Hist. Exot.
l. 10. c. 39.
40.

III. De *Struthio* Ca-
melo.

SPECIES quædam *Struthiocamelorum*
in Insula Maragnana invenitur.
Proceritate staturam humanam supe-
rant, & maximæ sunt velocitatis. Ma-
gis supra terram feruntur quam vo-
lant. Barbari *yanden* vocant.

De Laet
Orbis Novi
l. 16. c. 14.

IV. De *Psittacis*.

PLacethic quædam de *Psittacis* ex
Hernando, *Ximene*, *Clusio* & *Nierem-*
bergio adicere. Ille primus ita scribit,
de *Tozæne*: *Psittaci* id genus, viridi &
luteo colore micat, oculi rubeo, ro-
strum vero candenti & nigro, fusco
pede, sed in candidum inclinante.

Ec

Pro-

Propensius est, aptiusque ad sermones humanos exprimendos cæteris, ac frequentius apud Hispanos. Alterum genus *Cocho* vocant viridi colore, rubro & candenti capite, ac minoris molis; quod loquax est, nec ad modum dissimile præcedenti, etsi sono distet. Hos *Psittacos* vocant Hispani catharinas. Tertium *Quilitoton*, tinctum virore, talandriæ vocatæ, aut galeritæ non cristatæ magnitudine. Frontem candidâ maculâ insignitum, rostro candido & nigris pedibus. Humanas voces imitatur, & gregatim cum congeneribus volat, cum reliqui compares tantum reperiantur. Omnes verò in excelsis arboribus nidificant. Primum de quo diximus genus, certas statasque arbores, quas nunquam deserat, eligit: quæ cum in heredes transeant, dominis illarum haud sunt parum utiles. Sunt & quas Haitini *Quacamayas* vocant, Mexicanenses verò *Alo*. Totæ rubæ, præter humeros & caudam, quæ cyanea sunt, & gallinæ corticalis nostræ circiter magnitudine, rostro magno candenti & refimo, pedibus nigris, ac carne similiter nigra, ex quibus nonnullæ offenduntur, quæ sermonem humanum doctæ æmulentur, rusticè tamen & inconditè: filiosque suos more aliarum avium domesticarum educunt in domibus ubi aluntur. Offendas & alios virore diluto tinctos, nigrante rostro pedibusque, humeris & cauda virore tinctis exaturato, nec præfatis minores. Vivunt hi juxta montium cacumina, excelsasque pinus. Acclamant vehementer, volantque bini. Sunt & montani inconditâ formâ, qui non cicurantur aut aluntur domi. Nullius eorum caro est edulis, nam & atra est, & gustus injucundi. Omnib. est commune, utramque maxillam movere, quod nulli aliorum contingit animalium. Sunt & alia genera, de quibus alij Auctores latius.

Ximenes sic habet de Hispaniola loquens. Innumeri sunt Psittaci virides cum purpureis maculis, quorum tria in hac insula genera, majores, mediocres, minimi. Majores ab Indis vocantur Higuaræ. Hi in eo distant ab alijs reliquarum insularum, quod maculam

albam supra rostrum gestent, non viridem aut miniatam. Valde locutuleæ sunt hæ higuaræ, si humanos doceantur sermones. *Minores* vocantur *xaxavis*, & viridiores sunt, à paucisque interstinguuntur miniatis plumis. Hi inquieti & turbulenti, mordaciores, iracundiores, & garruli, licet rudes humanis loqui vocibus, quas nunquam discunt. Decem ex his invadunt & fugant centum higuatarum. Nulla inter hos pax. Diversis gregibus pervolant quacunque pervadant, garriunt. Higuaræ integriorem & corpulentior emedunt sonum, xaxavis acutiorem & tenuiorem: & licet ignati humanis vocibus loqui, placent tamen in caulis assiduo garritu & inquietudine. *Tertia species minimorum* est, nec excedunt passeris mole, viridesque sunt. Hi silent, & pacatiores sunt: viror dumtaxat in illis placet.

Clusij Historia hæc est. Inter Neotericos autem, nemo mea opinione exactius & diligentius de hoc avium genere commentatus est quam Vlysses Aldrovandus Bononiensis, qui totum librum 40. Tomi primi Ornithologiæ suæ ei dicavit: Ille enim Philosophica methodo tradidit quicquid ad Psittacorum historiam pertinere potest, & quatuordecim diversas eorum species describit, tredecim vero icones exhibet, quarum duo priores maximæ sunt, & corvum magnitudine superant; tertia & quarta columbæ sunt magnitudine; quinta, sexta, septima, octava, nona, & decima mediocris sunt magnitudinis, caudamque brevem habent, saltem non adeo longam, ut tres subsequentes, quæ longiore cauda sunt præditæ: decima quarta brevem etiam habet caudam. Priorem illam elegantem, quæ Pectoris & ventris pennis flavas habet, tum & eas quæ alas dorsumque tegunt, tum etiam eas quæ in cauda cæruleas, non semel videre memini, & iconem habeo vivis coloribus expressam, atque illam ipsam esse arbitror, quam Joannes Lerus cap. XI. Historiæ suæ Americanæ, Canide à Brasilianis appellari scribit. Alteram speciem etiam videre memini in arce Cæsaris Ebersdorfiana ad Danubium

hubium sitâ infra Viennam, tum etiam Lugduni Batavorum apud Sionem Lucium Danistam binas aves ejus generis, quas postea Magno Duci Moscovitaram dono mittebat. Reliquæ vero species, (præter tertiam quæ illi alba cristata est, & decimam quartâ, quæ erythrochloros, etiamque cristata) mihi etiam conspectæ, dum plerumque aliæ ab ipso non descriptæ, tam brevior cauda præditæ, & majuscula corporis mole, quam minoris generis, quæ longiores caudæ pennas habent, & collum velut torque rubro atque atro ornatum. Humana verba exactè exprimere solitæ: quibus similem unam habuit nobilissimus vir Philippus Marnixius Sanct-Aldegodius, quam sæpe cacchinum humano more extollere audivi, cum ab adstantibus Gallico sermone compeliaretur hoc modo. Riez perroquet, riez; id est: Ride psittace, ride. Sed quod magis mirum, Gallico sermone etiam subiciebat illicò, tanquam ratione prædita, haud dubiè tamen ita edocta. O le grand sot qui me fait rire, hoc est. O magnum fatuum, qui me ad ridendum provocat. Illaque verba iterum ac tertio repetere solebat. Sed inter reliquas unam, psittacis primæ speciei magnitudine æqualem, apud Illustrissimam Dominam Mariam de Brimen, Ducem Croyam & Areschotensem felicissimæ memoriæ, priusquam ex Hollandia excederet, cui sane parem in coloris pennarum varietate & elegantia videre non memini. Etenim licet omnes ferè penne corpus tegentes rubro colore essent infectæ, caudæ tamen pennæ, quæ valde prolixa, partim rubræ erant, partim cæruleæ; at quæ in dorso & alis versicolores ex flavo, rubro & viridi, quibus cæruleus color etiam permixtus. Caput circum oculos albi coloris erat, sinuosisque lineis nigris, quemadmodum caudæ caput, distinctum erat. Psittacum, qui similis esset, apud nullum Auctorem descriptum memini. Eâ porro avis Annam Illustrissimæ Ducis neptem, nunc Comitem Megensem & Dominam de Grosbete, adeò diligebat, ut quocunque per concla-

ve spatiaretur, illam subsequeretur, nec quemquam vestem ejus attingere conspiceret, quin morsu illum appeteret; ita zelotypia quadam laborare videbatur. Ceterum psittacus ille majoris generis, quem Lerijs capite supra memorato à Brasiliensis *Arat* vocari scribit, valde elegans etiam esse debet: nam alarum remiges pennas, & caudæ, quæ sesquipedalis longitudinis, media ex parte coccinei coloris esse refert, altera prorsus elegantis cyanci tubo seu nervo, qui medias pennas per longitudinem fecat, diversos illos colores distinguente, reliquas vero totius corporis pennas prorsus cæruleo colore tinctas esse. Addit utrumque genus illud majorum psittacorum. *Arat* videlicet & *Canide*, magna esse in æstimatione apud Brasilianos, quia illorum pennas ter quaterve in anno vellunt ad vestem, pileos, clypeos & aulæa conficiendum, tamen domesticum non sit, quia tamen in vastis arboribus medios vicos occupantibus frequentius versari solet quam in silvis. Præter binos illos ingentes, idem Lerijs tria aut quatuor Psittacorum genera apud Brasilianos inveniri ait: *Primum* videlicet etiam majusculorum, & crassiore corporis mole præditorum cui *Aicurons* nomen indunt Brasiliani Tououpiamboutij, caput ornatum habens versicoloribus, flavo, rubro, & violaceo extremis alis suaverubentibus, & caudæ pennis oblongis & flavis, reliquo corpore prorsus viridi: hoc genus rarissime ad externos transferri, nullum tamen facilius & perfectius edoceri ad humana verba pronuntianda, quam istud. Addit etiam, Brasilianam quandam mulierem in pago, binis milliaribus ab Insulâ in qua ipse cum alijs Gallis habitabat, distante, similem psittacum in delicijs habuisse, qui eo intellectu & ratione præditus videbatur, ut comprehendere & discernere posset, quidquid ipsa diceret quæ illum educaverat. Nam cum, inquit, animi recreandi gratia, in illum pagum profecti, ante illius mulieris edes interdum transiremus, cõpellare nos ipsa solebat his verbis: Vultis mihi pe-

finem dare vel speculum, & illico efficiam ut meus psittacus coram vobis cantet & saltet? Si ejus petitioni annuebamus, simul ac quædam verba avi pronunciaverat, psittacus non modo in pertica, cui infidebat, saltare incipiebat, sed etiam garrere, sibilos edere, & Brasiliorum ad pugnam sese paratium vociferationes imitari. Brevis, quando in ejus heræ mentem veniebat ut diceret, Cane, canebat; Salta, saltabat; sin vero ægrè ferens, se quod petierat non impetrasse, paullo acerbius avi diceret, Auge, hoc est. Sile, immobilis filebat, nec ulla ratione eum ad linguam aut pedes movendum excitare poteramus. *Secundum genus Marganas* à Brasilianis appellatur, quale est eorum psittacorum, qui in Europam inferri solent, nec magni apud illos pretij, propter abundantiam: non vero minus istic frequentes sunt, quam apud nos columbæ. *Psittaci tertii generis*, ab ipsis *Touis* appellati, majores non sunt sturno, & universum corpus tectum habent pennis impenfe virentibus, caudæ verò pennæ, quæ valde longæ, flavum colorem admixtum habent. Illud etiam addebat se observasse, psittacos illius regionis nidos ex arborum ramis propendentes non construere, ut topographicis suis tabellis quidam persuadere conantur: at in arborum cavis, eosque orbiculari forma, satisque duros ac firmos. Ceterum cum sub extremum annum Christi millesimum quingentesimum sexagesimum quartum esse Olyssipone apud Sebaldum Linsium Germanum Ulmensem, meminisse filium ipsius Rodericum ex Fernambuco Brasilianorum, ubi commorabatur, eò appellere & navem mercibus onustam advehere, in qua etiam aliquod mancipia, & nonnulli psittaci quartæ speciei ab Aldrovando descriptæ, atque alii etiam minores, sturni magnitudinem non excedentes, prorsus viridis coloris pennis tecti, sed omnes brevi cauda præditi, & albo rostro: idque genus valde frugibus noxium referebat. Eos in itinere maizi granis alueret, cujus multas spicas eum adhuc habere observa-

ham. In *secunda navigatione*, quam Batavi in Indiam instituerunt Orientalem, in Javâ vicinisque quibusdam Insulis psittacos observabant longè illis elegantiores, quos è Brasilia advehere solent, eosque à Lusitanis, qui in Javâ & Moluccis versabantur, noyras appellari intelligebant: & illos quidem corporis mole non valde magnos, sed ad eò elegantis coloris, ut venustiores depingi non posse existimarent. Pectus enim & ventrem pennæ rubri coloris floridi splendentisque tegebant, dorsum aurei coloris pennæ, alas vero viridis & cœrulei commixtorum colorum pennæ ornabant, sub alis suave rubens color splendebat. Valde autem ingens erat istic illarum aviū pretium, ut non minoris æstimarentur, quam octo aut decem thaleris Germanicis. Linscotius scribit, Lusitanos sæpius periculum fecisse, an Olyssiponem transferre vivum aliquē possent, sed nunquam voti compotes factos fuisse, quod nimis tenelli & delicatuli sint: Batavi tamen eam Indutriam adhibuerunt, ut unum vivum Amsteldamum usque retulerint, qui tametsi non esset è selectissimis, centum tamen & septuaginta florenis ejus Provinciæ, hoc est, paulo pluris quam septuaginta thaleris venumdari potuit, quemadmodum in diario illius navigationis adnotatum comperio. Is in itinere pleraque verba Hollandica, quæ à nautis audiverat, pronuntiare didicerat, adeoque cicurem ipsum ejus herus reddiderat, ut rostrum in os & aures ejus infereret sine noxâ, pilosque barbæ ipsius componeret; at si quis alius manum admove vellet, illico morsu illam appetebat, haud secus quam canis quispiam. Anno porro Christi quinto supra millesimum & sexcentiesimum mittebat mihi Jacobus Plateau psittaci cujusdā iconem vivis coloribus expressam, cui cum similem hactenus non viderim, neque apud quempiam adscriptum meminerim, in hoc Auctario ad Exoticorum historiam typis jam expressam adjunctam volui. Eum autem se plus quam biennio aluisse scribebat, columbæque esse magnitudine: caput illud

Illud habere pæne instar accipitris, ejusmodi nempe coloris pennis testum, ardentes oculos. Collum & pectus versicolores pennæ obsidebant: quas, cum irascebatur, aut molestiam aliquis ipsi crearet, admoto ad cavæam, quâ conclusus erat, aliquo animali, surrigebat, ut cristatus quodammodo videretur. Erant autem illæ rubescens coloris, & extrema parte cærulei elegantissimi. Ventris pennæ similis fere erant coloris, fusco tamen insuper suffusa colore. Dorsi pennæ virides & alarum remiges pennæ sub cæruleæ: cauda frequentibus pennis viridibus, sed non longis constabat. Prætermittere nequivi, quin psittaci pusillum, genus ex Æthiopia locisque Manicongo vicinis, proximis his annis à Batavis naucleris allatum, simul & maris iconem, (fœmina vero multo est elegantior, utriusque enim sexus allatus) Lectoris oculis proponerem. Corpusculi moles fringillæ magnitudinem æquabat, hoc est, duarum unciarum cum semisse longitudinem habebat ab infimo collo ad uropygium usque. Omnes pennulæ corpusculum regentes viridis erant coloris, sed in quibus manifestum apparebat discrimen: nam quæ in dorso saturiores erant, quæ in ventre dilutiores. Remiges alarum pennæ trium unciarum longitudinem habebant: & tametsi pronâ parte, eo videlicet latere quo brevioribus villis erant præditæ, quoque sese invicem tegebant, viridi saturò colore essent tinctæ; altero tamen, quod longiores villos habebat, & totâ supinâ parte susceperant. Caudæ pennæ elegantissimæ erant & pæne binas uncias longæ, paulo minus semiuncia latæ, colore eâ parte, quâ uropygio infixæ, viridi cum flavo permixto tinctæ, deinde rubro eleganti, demum nigro, postremo viridi: & tres isti postremi colores ab invicem distincti, veluti in quorundam psittacorum viridum, majore corporis mole præditorum, caudæ pennis videre est: istæ autem vix conspiciantur, nisi cum caudam explicaret, quia ab alijs ejusdem longitudinis tegebantur, quæ prorsus virides. Collum breve & crassiusculum:

plumulæ caput regentes brevès admodum & virides, præter eas quæ verticem supra rostrum, quæque totum guttur tegebant; nam illæ rubrum, elegantem & floridum colorem habebant. De mare loquor, quia fœminæ pennulæ dilutius rubebant, neque tam amplum spatium occupabant, quàm in mare. Oculi erant nigerrimi: rostrum crassum & firmum, superna pars adunca & mucronata, ut in reliquis psittacorum generibus. Ejus color subrubens, crura brevè semuncia longitudinem vix æquabant, cineraceique coloris squamis erant testæ, ut aliorum vulgarij psittacorum pedes, iique in quatuor digitos divisi, quorum bini anteriores & imparis longitudinis, bini posteriores & illi etiam impares, brevioribus quidem articulis duobus præditi, hi interni; longioribus autem tribus, & hi externi. Ungues albi & satis longi. Valde exilem habere vocem, & dumtaxat pipire observabam. Gaudet consortio. Cum edebat, altero pede cibum non tenebat ut alij psittaci, sed rostro carptim cibum arripiebat. Cibus autem magna ex parte phalaridis semen: illo enim libetius vesci observabam, quam ullo alio seminis genere. Mihi autem quidam conspecti sunt adeò edocti, ut panem aquâ tinctum carptim mortificando ederent. Potus est aqua. Illud præterea in hac avicula animadvertēbam, quod fœmellæ senescentes vix edere volebant, nisi cibum jam à mare carptum, & aliquamdiu in prolobo retentum, & quasi coctum suo rostro reciperent, ut columbarum pulli à matre alii solent.

Apud Nirembergium de Gvacamayana hæc leges. *Gvacamayana* genus psittaci est pulcherrimi, qui cum pueris ludit. Incompositæ formæ est, solo vestitu in pretio habetur, neque prætermittenda industria & mirificus instinctus hujus alitis. In Potosi quidam psittacus, quem lorum vocant, admirandi ingenij. Vocabat Indos occurrentes patriæ suæ nomine Colla, leuca, Huayru, Quechua, &c. quasi qui ipsorum mores & vestimenti ritus dignosceret. Dissimulatam In-

Nieremb.
Hist. Exot.
cap. 63. &
64.

dam nobiliori natu & pænè Regio dignovit. Cum vidisset illam, dixit: Huayru, Huayru, Huayru. Ignobilior ista natio est, quam illa cuius generis se simularet femina. Finxerat se Pallam è Regia stirpe. Matrona partim pudens, partim irata, sputo & maledicto avem affecit. Hispali etiam alius psittacus agnovit Medicum indignum nomine & arte; quem, quotiescunque occurrebat, convitijs varijs proscindebat è fenestra; donec lite impetravit Medicus ne suspenderetur ibi. Alius Psittacus tabernarij vinarij solitus audire illum domi querentem vinum non vendi, quod acetum esset. Didicit hæc verba, atq; ad januam suspensus garriebat repetito præconio, Acetum est. Acetum est, quod facile fuit ementibus credere: donec herus madefaciens (aquam enim odio habent hæc aves) & castigans psittacum dictavit, Optimum merum, Optimum merum, quod psittacus sic animadversus didicit, & postea ad januam idemtidem publicabat, optimum merum esse. Multi psittacorum simplicissimi, ut ad crocitantem psittacum ex arbore, in cuius ramis auceps latet, multitudo ingens convolitet, capique facile patiantur: nil enim viso aucupe terrentur, sed ut laqueo trahantur ad collum coniecto expectant, nec aufugiunt uno captato, & in mantica, quæ præcinctus est Venator, ipsis cernentibus reposito. Psittaci faciem universim exprimit, quem quoq; cantu ad amussim æmulatur *Noyra*, quæ ex Moluccanis Insulis in Indiam importatur, pennis tamen rubris crebrioribus vestita est. Illarum una viginti aut triginta pardavis in India vænit, quæ postquam cum psittacis & aspectus amœnitatem, & garritus jucunditatem communem habeant, hoc sibi peculiare quoq; vendicant, quod educatorum suorum, aut aliàs quoque adstantium capita & barbas, ut & aures dentesq; linguis suis blande detricent aut allingant, quas partes studiose quasi ad vivum emungunt, & emundant, adeo ut illarum altioribus ex his gesticulamentis oble-

stationis emergat haud parum. Taceo, quod acutius attendenti coloris jucundâ varietate psittacos haud leviter exsuperare videantur.

V. De Picis.

PRæter enumeratas Picorû species dantur adhuc apud Americanos duo Picinempè *Salutiferi* & *Imbrifati*. Ille *Heuhqueholtototl*, seu avis capiti similis dicitur. Nobilis est à capitis dolore levando. Merula major est, rostro longo nigroq; sed infernâ parte longè breviori, vertice ac pænè toto collo desuper rubeo, infernis partibus omnino cinereis; alis vero ac dorso nigris, sed albistransversisque lineis variatis. Degit Pavatlanicis agris provincie Totonacapæ. Pici species est arbores perforans, cuius capitis plumæ rubescentes applicatæ & conglutinatæ, capitis feruntur curare dolorem; sive in eam sententiam venerint, quod vertici avis adhæreant, sive id ita se habere experimento aliquo prehenderint. Hic *Quatotoni* audit. Upupæ magnitudine & fusco colore variatur. Rostrum, quo excavat arbores perforatque, tres digitos longum est; firmum & candens, & infernè brevius. Caput est parvum, ac rubris contestum plumis, crista quoque rubra insignitum, ac tres uncias longa, sed superna parte nigra. Alterutro colli latere fascia candida descendit ad usque circiter pectus. Crura pedesque livida sunt. Vivit non longe à mari Australi. *Nidificat* in arboribus excelsis: *vescitur* cicadis, tlaolli, & vermiculis: imbrum tempore educat, hoc est à mense Majo usque ad Septembrem: edulis tamen non est, nec alium (quod acceperim) præstat usum. Pici Martij datur in Nova Hispania species maxima. Cujus pulvis salutaris est hydropicis.

In Nova Galacia *Pica* sunt exiles, nec passeribus multo majores, sed tanto numero, ut integram segetem, ubi semel aristas incubuerint, prosternant atque conculcent, neq;

Nieremb.
Hist. Exot.
l. 10. cap.
48. 49.

De Laet.
Ind. Occid.
l. 6. c. 1.

neque clamore aut alijs terriculamentis deterreantur. Est & *Pica Xochitenacatl* dicta columbæ magnitudine, rostro præ corporis mole maximo, superiori parte luteo, inferiori vero subnigro, & in purpureum colorem vergente, oculis nigris, sed iriderubescente ex luteo, ac reliquo corpore cæruleo cinereoque. Vivit circa litora Oceani Australis; piscibus, quos rapit, vesci solet. *Iconem* vide apud Nierembergium Historiæ Exoticæ pag. 209.

VI. De Sturno.

Nieremb. Hist. Exot. li. 10. c. 59. AD Sturnos videtur pertinere quæ *Pterophænicus Indiarum*, & *Acolchi* dicitur, de qua sic Nieremberg. Alarum insigne commendat acolchi, seu avem humerorum rubeorum, impetravitque ab Hispanis honorificum nomen, qui aves commendadoras illas vocant, quod æmulentur Equitum militarium insignia. Simili rubore ad latus fulgentia. Sturnorum, quos Hispani tordos vocamus, videatur species. Magnitudine, colore, & formâ parës sunt, & cum eis ubicumque versantur, quam humeri primo fulvi appareant in rubrum vergentes, & cum ætate processerint, in fulvum omnino mutantur colorem. In caveas conjecti, voces reddunt humanas, & lepide garriunt. Quavis re oblata vescuntur, sed pane maxime atque Indico frumento. Calidis frigidisque eas aves reperies regionibus, ab Hispanis colonis rubeorum humerorum commendadozas, ut dixi, vocatos, sed numerosis agminibus sunt oppidanis admodum molesti, eosque audacter incursant, præcipue regionibus fervidis & maritimis. Malum insuavemque præstant succum, & in arboribus non procul ab oppidis hominumque commercio nidificant, & sæta, in quibus forte confedere, devastant atque depopulantur. Cantant luduntque, seu caveis includantur, seu libere per domos permittantur incedere.

VII. De Coturnicibus.

DE Coturnibus ita idem Nierembergus. Coturnices vocabat Nova Hispania *Colin*, quarum genera ex Francisco Hernando dabo. Nostratibus sunt similes, etsi ad perdicum species sint citra dubium referendæ. Multa genera apud Novos Hispanos reperiuntur nonnulla fusca & cristata, quæ *quauhtzonocolin* nuncupant, mediocris magnitudinis; alia fusca quoque, sed cristarum expertia, & paulo minora; alia omnium maxima fulvaque, sed capite albo & nigro, colore variato, extremis vero alis dorsoque candentibus, pedes vero ac rostrum nigra sunt. Hispanis, ut dixi, coturnicibus assimilantur. Omnia & bono & grato constant alimento, si tamen jugules duobus tribusve diebus, antequam assa apponantur mensis. Exhibetur earum caro etiam male habentibus: nec est apud Indos ulla aliâ post cohortales, quæ illi possit anteferri, aut alimenti salubritate aut gustu. Canunt nostratum instar, etsi aliæ aliis suavius. Caveis includuntur: vescuntur Indico nostroque frumento, & sunt quam plurimis hujus plagæ locis familiares. Alibi idem Auctor de *Coyolcozque* seu colli sonali inquit: species est colin, seu coturnicis Mexicanæ, inter quamplures alias; de quibus loquimur seorsim. Ergo coturnicibus vocatis à nostris similis hæc est; magnitudine, cantu, nutrimento, volatu & moribus. Sed diverso colore, qui superne est ex fulvo candidoque commixtus, inferne vero tantum fulvus, etsi verticem & collum nigrantes albæque plumæ occupent; & tæniæ ab utroque latere adeoque à collo ad utrumque collum efforment atque constituent. Oculi sunt atrii, & fulva crura. Indigena avis est; campestribusque locis, velut & nostras, frequentans, ac simili etiam alimento, &

Ee 4 quod

quod ad illud perdicis Hispanicæ (est enim ejus species) proxime accedat. *Coleuicuiltic*, seu coturnicis simulacrum, coturnicis quoque nostræ species est, albis, nigris coccineisque variata plumis, & protrahitis desuper potius lineis quam circumscriptis maculis, subter vero potius maculis frequentibus, quam lineis, pedes cruraque cyanea sunt; sed cantu, magnitudine, moribus, cæterisque cunctis præcedenti omnino similis. Sturno est *Acolin* magnitudine par, cruribus pedibusque viridi pallescentibus, & in quatuor divisis prolixiores digitos. Rostrum est luteum, & longiusculum pro corporis proportionem, tenueque & mucronatum, oculi nigri, iris fulva, caputque parvum. Inferna corporis candida sunt, lateribus fusco macularis colore; superiora vero & cauda, quæ breviuscula est, fulva sunt, sed maculis nigricantibus distincta, & candidis lineis quasvis pennas circumambientibus, ejusdemque coloris punctis nonnunquam conspersis. Lacus incolit, piscosumque est, nec tamen admodum ingratum præstat alimentum. Vermiculis, muscis, & alijs parvis animalibus quæ volitant circa paludem, victitare solet. Indigena est Mexicani lacus. Caput mira colorum varietate micat. Quod medium atra linea secat, ac velut cineræ aliæ latera, maculæ vero parvæ & candentes canthos externos: collum pectusque cinerea sunt, cætera è fulvo in viride potius inclinant.

VIII. De Perdibus.

De Lact. Ind. Occid. l. 10. c. 5. Sunt in Peruvia Perdices quas à Sono *Tutu* vocant. Duorum generum. Aliæ majores, quæ mole accedunt ad Gallinas, & tantum in solitudinibus reperiuntur. Aliæ minores quam Hispanienses, sed carne longe optima. Utræque sunt coloris repardo, rostris & pedibus albis. Ibi-

dem sunt aviculæ plumis rubicundis, quos Hispani ob similitudinem nominant *Luscinias*, quanquam cantus harum sit adeo ingratus, ut mali augurij olim dixerunt barbari.

IX. De Turdis.

Nieremb. Hist. Exot. l. 10. c. 57. Genus Turdorum *Chrappam* incolit, quos vocant *passeres fabros*. Nigri sunt, solum in pectore & capite rubri. Fructu quercino dumtaxat vescuntur. Rostro perforant corticem pinnum, glandem singulis foraminibus aptissime accommodant, ut manu extrahi nequeat, sic omnem pinum ornatissime cingunt glandibus incis, Mox pedibus hærentes cortici, tendunt rostro glandem, & vorant. Alia sententia Gomaræ est de Passeribus, quos vocant Hispani *carpinteros*. In Dariene scribit nasci palmas, quarum truncus per extrema attenuatur: in medio nidificare quosdam passeres excavato rostris nidos. Hos passeres vocat ipse *Pitos*, & putat esse quos Plinius Picos dixit, Hispani Fabros. Addit ex Aliquorum sententia, vim recludendi nidos ferro impeditos non esse alicujus herbæ, sed ipsius pici, cujus tactu infringi metallum.

X. De Anatibus.

Nieremb. Hist. Exot. l. 10. c. 35. Genus est Anatis quam *Acitli* seu *aquatilem leporem* consueverunt vocare Mexicenses. Hæc cum descripta delineataque à quibusdam recentiorum eadem prorsus esset, nisi caput longemajori insigniretur cristâ, atraque, venter colore argenteo splenderet, & collum inferne niveo, superne vero è nigro vergente in fuscum. Lacubus innatat, ac juxta eos perpetuo versatur: nam neque volandi potis est, neque per terram commode incedendi; femoribus ita reliquo corpori connexis atque coalitis, ut natatui non incessui queant infer-

intervire. Piscibus quos involat *vescitur*, indequē victitat. Prolem in jun-
ceris atque arundinetis educat, nec
anatum nostratium vulgarem vincit
magnitudinem. *Masculus* aliquanto
longior est, corpore, collo ac crista
ampliori. Rostrum fœminæ brevius
est, nigrum & utrimque juxta oculos
plumis fulvis rectum, cum mas can-
dentibus tegatur. Hæc est avis illa,
quam Indi fabulantur ventos evoca-
re, ubi se peti ab aucupibus sentit, qui-
bus stantibus turbatisque undis ever-
rantur monoxyla, illamque insequen-
tes submergantur, si quinque prius
sagittis excussis arcu non contingat
attingatque trucidari. In ejus disse-
ctæ corde reperiri geminam arbitran-
tur ad multa utilissimam, & maximo
habitam in pretio, nec alijs quam Deo
consecrandam. Verum hæ nuge sunt,
& mendacia ab horum hominum pro-
fecta credulitate. In suavi parumque
salubri, velut & aliæ aves palustres,
nutrimento constat, atque ideo à nullo
sagacioris palati in cibos admit-
tenda.

Est & apud Indos *genus quoddam a-*
natis fere (hirundinem Hispani Indi-
genæ appellant) *tempatlahoac* domesti-
cæ magnitudine, quare idem usurpa-
vit apud Indos nomen; rostro lato est
& longo, unde quaque nigrante. Lin-
gua alba, cruribus palmisque ex pal-
lido rubescentibus, collo & capite vi-
ridibus, purpureis, & nigro splenden-
tibus colore, adeoque pavonino aut
heliotropiæ gemmæ; oculi nigri sunt,
& pallens iris, pectus candens, reli-
quum vero corpus inferre fulvum, &
binis maculis juxta caudam utrinque
candentibus insignitum, superne ve-
ro semicirculus quibusdam in ambi-
tu ex albo, tendentibus in fuscum;
intra vero è nigro in viridem splen-
dentem. Alæ initio cyaneæ sunt,
mox candidæ, & tandem virenti mi-
cantes splendore: earumdem tamen
extrema altero latere fulva sunt, al-
tero vero fulgida atque viridia: cau-
da desuper subtusque per ambitum
candescit, ceterum inferne nigra, pa-
vonacea vero superne. Advena est

lacui Mexicano, & qualē aliæ lacu-
stres aves solent præstare alimentum.
In Asia quoddam est genus anatum,
quod non immerito quis inter cor-
nicines retulerit, ita voce cornuum
sonitum imitantur, quæ inflare solent
per dispositos equos iter facientium
duces. Est ea avis, quamvis inermis.
Audax & strenua: quam etiam ma-
los Dæmones terrere, Turcis per-
suasum est: certè libertatis adeo re-
tinens, ut etiam per totum trien-
nium in corte nutrita, facultatem na-
cta, libertatem saginæ anteponat, se-
desque naturales & suctos alveos vo-
latu repetat.

XI. De Mergis.

AD Mergorum historiam perti- *Nieremb.*
nent Mergus Americanus, & *Hist. Exot.*
Mergus maximus Farrensis seu Ar- *L. 10. c. 27.*
cticus. Ille exiguis est alis, ideo mon-
strofa. Hic ita à Clusio describi-
tur. Avis marina est, & palmipes,
anserē domestico major, aut certe
magnitudine illi æqualis: nam à col-
lo quâ parte pectori coniungitur, us-
que ad oropygium, binos pedes long-
ga erat: corporis ambitus binorum
pedum longitudinem superabat. Al-
læ quatuordecim uncias longæ; cau-
da brevis, vix trium unciarum, col-
lum fere octo uncias longum, ejus
ambitus paulo major, caput breve,
tres uncias latum, rostrum nigrum,
mucronatum, quatuor unciarum ma-
gnitudinem superabat. Lingua pæ-
ne tres uncias longa, nigra, mucrona-
ta, cartilaginea, quodammodo ca-
rinata, superiore parte qua rostri par-
ti connexa erat, parvis dentibus in-
trorsum recurvis utrimque prædita,
media autem parte aspera: palatum
similiter quatuor exiguum & bre-
vium dentium introrsum spectantium
ordinibus constabat, quibus escam
retineret & conficeret: nam rostrum
dentatum non erat. Totum corpus
densis pennis tectum habebat, quæ
in pectore, toto ventre, & alarum su-
pina parte breves & candidæ, in dor-
so autem alarumque prona parte lon-
giores

giore & nigræ, singulæ tamen circa extremum, geminis maculis albis insignitæ, quæ in dorso quidem lateribus longiores, majoribus, quæ vero circa collum in medio dorso aliq; supra caudam, minoribus, sicut alæ aliis incumbentes, invicemque regentes ad maculas illas usque, eam fere varietatem repræsentarent, quæ in meleagride sive Numidica gallina conspicitur. Collum velut torquæ cinctum erat, è nigris pennis constans: caput etiam similibus pennis tectum: quæ tamen oculos & rostrum ambiabant, parvis maculis albis erant distinctæ; sub gutture etiam aliquas parvas pennas albas nigris permixtas habebat: prona similiter colli pars supra torquem illum nigrarum pennarum, ad uncie longitudinem parvis pennis nigris, latera tamen alba habentibus, erat ornata, quemadmodum & ea pars quæ infra torquem in pectoris lateribus, infra podicem, nigrarum pennarum transversam lineam habebat, quas alæ subsequabantur, deinde sub cauda alæ nigræ albis maculis notatæ. Crura habebat in extremo corpore sita, paullo longiora tribus uncis, plana, nigra; pedes quatuor uncias longos, plusquam tres latos, nigros tribus digitis præditos (quorum interiores tribus articulis constabant, brevioresque erant, medij quatuor, exteriores quinque) nigra membrana simul connexos ad ungues usque, qui plani. Singuli etiam pedes, in posteriore parte paullo supra inflexionem, parvum articulum instar calcaris habebant. Circa Færensem Insulam, quæ inter Norvegiæ & Islandiam sita, captam hanc avem scribebat Hoierus, fœtum in undis educare, nec nisi procelloso mari ac circa Autumnum, hiemisve initium conspici, terram verò nunquam attingere, nec volentem nunquam esse conspectam, adeoque nec alarum usum habere ad volandum, nec pedum ad incedendum: quo fit ut non nisi capite extet (eo referente) quando se conspiciendam præbet. Huic non valdè dissimilis videtur mer-

gus ille marinus, cuius meminit Gesnerus in Paralipomenis ad Historiam de Avibus pag. 767. nisi illi in dorso cinereas plumas nigris maculis conspersas tribueret. Huic similis est aqueus lepus, cuius jam meminimus. Iconem vide apud Clusium.

XII. De Hirundine.

Claudat agmen *Aviæ cucullata aquatica. Hirundo Exotica aquatica, & Gallinago silvestris aquatica.* Quas in suo Gazophylacio rerum Naturalium descripsit, & ære exprimi curavit Nobilissimus D. Doctor *Beslerus*, Amicus noster plurimum honorandus. *Besler. in Gazophylacio Rer. Natural.* De illa ita scribit. Animal hocce capite monstruosum, in aquis natare ex decubitu naturali conjicere licet. Comam quam in fronte cernis, ferruginei est coloris. Ex parte maxillarum plumæ flavescentes repullulant, quæ in extremitate nigriores, factæ, circulum egregiè repræsentant. Collum cum ventre albicat, dorsum cum aliis cineritii est coloris, extremitas tandem in albas desinit plumas, Pedes cum adnatis membranulis, semicirculis distinctis albicant, ubi in quolibet pede unicum tantum unguem animadvertere licet. De *Hirundine Exotica aquatica* hæc habet. Quis non in volucre palustris summam colorum varietatem miretur. A capite enim inchoando, superior pars, candet, inferior rubro intermixto cœruleo colore splendescit. Venter inferior floccorum nivis instar albicat. In dorso principio peninæ duæ nigricantes, albis punctis distinctæ exsurgunt. Alias dorsum universum, unà cum cauda ferruginei coloris; alæ quidem nigricant, punctis tamen niveis ornamenti instar distinguuntur. Pedes exporrecti subfusci coloris, rostrum nigricans, ad subulæ formam effigiatum, quo pisces quasi hamo excipere solet.

* *

XIII. De Gallina-
gine.


DE Gallinagine Sylvestri aquatica, ita
idem paucis. Rara hæc est avis,
in locis paludosis victum quæritans,
colore atro & rufco, per totum corpus
instar holoserici splendescence, ro-
strum oblongum, quodammodo in-
curvatum, crura alta & fusca, digitos
longos habet.




ET hæc sunt quæ de
Avibus dicere volui.
Quæ omissa sunt, stu-
diosus harum rerû Lector, ali-

unde supplere poterit. CEN-
SORI cujuscunque tandem
status & conditionis is fuerit,
hoc subsequens intersiat. *Ve-
ritatem ad suum arbitrium ex-
igere, & inter mendacia re-
ponere, quicquid palato non
arriserit, impudentis nimis,
& in DEUM, universam
naturam, & humanum ge-
nus, injurii homi-
nis est.*


F I N I S.





I N D E X

In Historiam naturalem de AVIBVS, jux-
ta seriem Alphabeti concinnatus: in quo prior numerus
historiæ paginam, posterior tabulam
designat.

	P.	T.		P.	T.
 Ca choatli	183.		Glaucius	145.	49
Acacalotl	182.		Herle	146.	49
Acanthis	97.	43	Muscaria	145.	49
Accipiter in genere.	18.	7	Nigra	146.	49
Afterias	20.	8	Penelope	146.	49
Fringillarius	21.	8	Platyrinchos major	145.	49
Palumbarius	21.	8	Plyrinchos minor		49
Sacer Ægyptius Bellonio	24.	9	Puffinus	146.	
Accipiter major		11	Querquedula	144.	49
minor		11	cristata	144.	
Achalalaçtli	184.		La Tardone	146.	49
Acitli seu aquatilis lepus	224.		Anas marina Meer Endle		49
Acolchis Indiarum	223.		Anas fera Seevogel		49
Acolin	182.		Anas fera Spiegel Endle		49
Acototloquichitl	183.		Andira Aca	205.	
Æsalonus accipitris species	22.	10	Anhima	209.	61
Æsalo falconum species		13	Anbinga	211.	60
Ajaja	198.		Ani	189.	
Ajuru species	200.		Anser Bassanus	131.	47
Alauda	99.	38	Domesticus	136.	48
cristata	100.	38	Magellanicus	181.	56
cristata senex		38	Sylvestris	140.	48
non cristata	100.	33	Anthus	122.	45
maxima seu Calandra		38	Apos	118.	
prætorum	101.	38	Aquila in genere	9.	
Alaudæ congener	101.	38	in specie	11.	
Albulus aquaticus		47	Aquila alba seu Cygnæa	15.	
Alcedo vocalis	156.	52	anataria seu Morphnos	13.	2
Alchata seu Filacotona	92.	32	anopæa	15.	
Aluco	50.	19	Chrysaëtos	11.	1
Amalozque	184.		Bellonij		5
Ampelides	126.		Gesneri		1
Ampelis Aldrovandi seu Garrulus			Haliætus	12.	2
Bohemicus Gesneri	44.		Heteropos Gesneri	15.	5
Anas	142.	49	Melanætus seu Valeria	12.	3
campestris Bellonij	64.		Alius	1.	3
Cairina	143.	49	Morphnos Bellonij	13.	4
Domestica	143.	49	Morphno congener	14.	5
Indica	143.	49	Percnopteros	14.	4
Lybica	143.	49	alius		4
Anas fera seu sylvestris	144. 208.	49	alius peregrinus		5
Boscas major	144.	49	Pygargus	13.	2
Caudacuta	146.		alius	13.	3
Circia, Bernell dicta	144.		Aracari	211.	
Fistularis	145.		Araracanga	201.	59
Fusca major	145.	49	Ardea	150.	50
			minor		50

I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
Cinerea major	151.	50	Cannevarola	122.	45
minor	151.	50	Capricalea	141.	48
alia seu congener	152.	50	Caprimulgus	55.	20
alba	152.	51	alius		20
Egretta Gallorum	152.		Capella Rynis		27
Garletta Itolorum	152.		Capo	85.	30
Garzetta bianca dicta	153.		Caracara	205.	61
Squajotta Itolorum	153.	51	Caracura	213.	
Congener	153.		Carduelis Distelfinck	97.	36.37
Nigra		51	cilijs albis		36
Ardea asteria seu stellaris major	153.	51	mas		36
altera minor		51	Cariamama	197.	59
Congerier	154.		Caripira	213.	
Cristata	154.		Catarrhacta	130.	47
Ardeola	204.	61	Caryocatactes Musbickler		27.40
Arquata	158.	51	Cenotzqui		177
Asilus	115.	42	Ceoan		177
Asio		18	Cephus	130.	47
Asio seu Otus Otterul	48.	18	Cercio	165.	53
Asio seu Scops	49.	18	Certhia	113.	42
Attagen	62.	26	Charadrios	166.26.53	
Atricapilla	125.	45	Chalandra	100.	33.38
alia		45	Chicuatli	177.	
Atinguacu Camacu	210.	60	Chloris Grunenfinck	101.	36.37
Aves diurnæ	9.		congener seu chloris Indica	101.	
nocturnæ	46.		Chloropos Gallinula aquatica	161.	31
Aves exoticæ Aquaticæ	180.		Ciconia	147.	50
Terrestres	169.		nigra		50
Aves Farrenses	185.		Cinclus	163.	53
Aves Granivoræ canoræ	97.		alius		53
Aves terrestres carnivoræ	9.		Cincl ⁹ Gallinago minima Bellonij		53
Avis cucullata aquatica	226.		Cinnamomus	215.	
longa	176.		Circus	22.	
montana	176.		Citrinella Citenile	101.	36.38
Diomedea (radetshvogel)	128.	46	Cocoiardeæ species	203.	61
Paradisfa seu Manucodiata Pa.	169.	55	Coccothraustes	108.	37
Pugnax	154.	52	Indica	108.	37
Scythica Witternächtscher Adler.	15.	5	Columba domestica		32
Stellata f. Stella Sternvogel.	64.	26	varij coloris		32
Avium natura in genere	4.		Cypria		32
Avosetta seu Spinzago d' acqua	135.	48	alia		32
Avosetta species		54	Indica		32
Aura	174.		Hifutis pedibus major		32
Aurivittes carduelis species	97.	43	Livia	92.	32
Ayayan	213.		Columba	86.	32
			Sylvestris	90.208.32	
B.			Columbus	89.	32
Barge Gallorum	156.		Collurio	24.	43
Boarina	121.	44	Colymbus major	134.	48
Boudree Bellonij	23.	7.11	major Bellonij	135.	48
Branta seu Bernicla	141.	48	maximus	135.	
Brenthus	135.		minor	135.	48
Bubo	47.	18	Coracia	42.	16
Bubo Berghu	47.	18	Cornix	40.	16
Bubo Nachtenle	47.	18	frugivora	41.	17
Bubo Kauz dictus		18	cinerea	41.	17
Buteones	23.	7.11	cerulea	41.	17
			Corvus	38.	16
C.			Aquaticus	131.	47
Abure	205.		Sylvaticus	131.	47
Calcamar	213.		Cotta Anglorum	147.	
Calidris Bellonij chevalier, rubra	159.		Coturnix	69.	27.28
nigra	159.				Crex
Canarias Zuckervogel/Canarivogel		36			

I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
C rex	158.		Gallina Patavina	83.	29
Cuculus	26.	10	Gallina Perlica	83.	30
alter	26.	10	Pumilio seu Nana <i>Krichhun</i>	83.	29
Cuntur	179.		Quinca	84.	30
Curicaca	187.	57	Gallinula Rhodopos aquatica	160.	31
Curucui	205.	60	Gallina Turcica	83.	30
Cygnus	136.	48	Gallinarum ova	77	
cuculatus Nieremb.	176.	56	Gallinago minor sclopax <i>Harschneff</i>	161.	31
Cynchramus	72.		sylvestris aquatica	227	
	D.		Gallinula chlorop ⁹ vide chloropos gallinula.		
D A aje	171.		Serica <i>Sammerhünlein</i> .	160. 23.	31
Diabolus marinus Parisiensis	147		terrestris	161.	31
Diomedea avis	128.	46	Gallo-Pavomas	59.	24
	E.		Gallus gallinaceus	72.	29
E Mbriza		35	Cornutus	83.	29
alba	97.	35	Iudicus	84.	29. 30
pratenfis mas	97.	35	Indicus mirabilis		30
foemina	97.	35	Monstrosus caudatus		21
Embriza pratenfis <i>Wissenmerg</i>		36	Palustris	84.	30
Emeu Clusij	172.	56	Patavinus	83.	29
Nieremb.		56	Peregrinus Clusij	176.	56
Erythra gallinula aquaticæ species		35	Perficus	83.	30
melana Indica		35	Scoticus sylvestris	83.	
	F.		Turcicus	83.	30
F Alcinellus seu Falcata	154.	51	Gambetta Aldrovandi Itolorum	159	
alias species		51	Garagay	175	
Falco	28.	12. 13	Garrul ⁹ Bohem. Gefn. vide Ampelis		
Albus	32.	12	Generatio pullorum (Aldrovadi	79.	
Alius (Baumfalc)		12	Goyrani seu Boudree Bellonij	23.	7
Arborarius seu Dendrofalco	33.	10	Graculus	42.	16
Cyanopus	33		Gracul ⁹ palmipes seu Corv ⁹ Aqua	132.	47
Gentilis	31		Granivoræ aves (ticus minor	56.	
Gibbosus	32.		Grigallus major	61	
Italicus	32.		Crus balcarica mas	168.	54
Lanarius Gallorum	32.		foemina		54
Falco lapidarius	33.		crispa		54
Montanus	30.	13	Japponensis	168.	54
Oenentanus		12	Vulgaris	166.	54
Passagir		12	Gryphus	214.	62
Peregrinus	29.	13	Guacuguacu	198. (58.	59
Rubeus	33.	12	Guara	198.	214.
Sacer	29.		Guarauna	198.	
Tunetanus	31		Guainumbi variaz species	191.	58
Ficedula		33	Guira Acangatara	210.	60
Ficedula, Canabia		33	Guira coereba	205	
Flamenco avis Hispanis dicta	186.		Guira guacuberaba	205.	
Fringilla <i>Sinct</i>	98.	33. 36	Guira guainumbi	189.	57
montana	99.	36	Guiranheemgatu	203	
sublutea	101.	36	Guiranejoa	203.	61
Fulica <i>Wasserhun</i>		31	Guiraperea	205	
Fulica seu Merigus niger	146		Guirapunga utraque	197.	59
	G.		Guira Querea	197. 59	
G Algulus		27	Guiraranheengeta	203.	59
Gallina	77.	29	Guira tangeima	189.	57
Africana	188.	57	Guira teonteon	214.	
Gallinula Aquatica	160.	31	Guiratinga	203.	
Gallina Corylorum <i>Hasselhun</i>	63.	25	Guiraticica	203.	
Gallinula Erythropus aquatica	160.		Guit Guit	171.	
Gallinula Hypoleucos aquatica	160.	31	Gulo <i>Sæssluder</i>	134	
Gallina Indica cum ovo ejus	84.	24. 30	Guranha-engera	180.	
Lanigera		30		H.	
Gallinula Ochra aquatica	160.	31	Hæmatopus Bellonij	156.	

		I N D E X.			
		P.	T.	P.	T.
Hamantopus mas			52	Milvus	11
fœmina			52	Larus	128.
Halcyon	156.	52		albus	129. 46
Harpa	26.			cinereus	129. 46
Harpyjs	214.	62		Fidipes	130. 46
Heatototl	184.			major	46
Helorius Creci	156.			minor Sterna	130. 46
Herle Bellonij	134.			niger	130. 46
Heuhquecholtototl	222			piscator	130. 46
Himantopus	159.			Ligurinus Gazæ	98. 36
Hirundo	115.	42		alius	36.37
Apos	118.	42		Limosa Venetorum	156.
agrestis	117.	42		Linaria	99. 36.37
exotica aquatica	226.			marina Aldrovandi	99. 38
marina		46		rubra	99. 36.38
riparia	117.	42		Lomsbay	186.
Hoactli	183.			Loxia	46.
Hoactzin	172.			Luscinia	123. 45
Horion	156.			Luscinola	123. 45
Hortulanus mas	72.	28		Lutea mas	101. 38
fœmina	72.	28		fœmina	101. 38
Congener	72.	28			
Hortulanus BrachAmstel/Troftel		37		M. Acucagua	207.
Hypolais seu Curruca	125.	45		Macucagua	180.
Hypotriorchis	23.			Maguari	198.
				Maia	171.
				Manucodiata Aldrov. prima	170. 55
				secunda	170. 55
				longa	170. 55
I. Abiru	195.	59		Mareca	208.
Jabiru guacu	195.	59		alia species	208.
Jacacintli	183.			Matuitui	159.211.58.60
Jacamacaii	194.	58		Meerganser Gefneri	134. 47
Jacamaciri	197.	57		Mergus	132.
Jacana	187.	57		Arcticus Clusij	225. 56
Jacarini	203.			Bellonij	47.48
Jacapi	188.			Albus	134.
Jacupema	194.	58		Cirrhatius	134. 47
Jacurutu	194.	58		Glacialis	133.
Jaguacati guacu	190.	57		Longirostratus	133. 47
Jaia Uquitototl	172.			Niger	134.
Jambu	188.			Raucedulus	133.
Japacani	205.			Rhenanus	133. 47
Ibijau, Noitibo	191.	57		Ruber	134.
Ibijau magnitudine noctuæ	191.	58		Merops Seeschwalb	27
Ibis	149.	50		Merops Zimbenfrasz	113. 42
Jochualcuachili	181.			Congener	42
Ipecati Apoa	212.	60		Merula	104.39.40
Ipecu	202.	59		mas	104. 39
Ipida Eyßvogel	157.	31		fœmina	104. 39
Itzquauhtli	217.			alba & nigra	104. 39
Juncus Bellonij	163.	53		bicolor	107. 39
Jupujuba	188.			brasiliica	107. 40
Iynx seu Torquilla	112.	42		Indica Apos	107.
Congener	113.	42		aquatica WasserAmstel	53
				montana	106.
L. Agopus	68.	28		rosea mas	107. 40
altera species		28		Merula faxatilis SteinAmstel	107. 39
Lanarius prior	24.	9		torquata mas	106. 39
alter	25.	9		fœmina	106. 39
Lanius albus	25.	9		Merula congener duplex	107. 39
Cinereus	25.	9		Merulus, passer solitarius	105. 39
minor		10			Mil-
alius		11			
Lanius collurio		11			

I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
Milvus	25.	11	alvus		34
Mituporanga	191.	57	Solitarius, merulus Steinamsel	105.	14.
Mitu mutu	190.	58	Mas	39.	39
Monedula	42.		foemina		39
aliud genus	43.		Congener	106.	
Montifringilla	99.	33.36	Passer stultus Bononienſium	96.	
Congener		38	Torquatus	96.	
Morfex	134.		Passer Troglodytes Bellonij	115.	42
Mofſen		27	Armeniacus	115.	42
Motacilla		43	Passer in juglandibus degens	96.	
mas	120.	44	Passeris species seu congener	96.	34
alba	120.	44	Passeres fabri	214.	
flava	120.	44	Passerculus Brachyurus nostras	96.	34
Muscipeta	121.	45	Passerculus Troglodytes Zaunſchlüpfſerle	42	
Mutu	180.		Pavo	56.	22
N.			foemina	56.	22
NHanduguacu	186.		albus	58.	23
Noctua in specie ſic dicta	51.	19	ſine cauda Chinenſis		21
Noctua Rüßlein		19	Japonenſis mas	59.	23
Noctua faxatilis Steinſang		19	foemina	59.	23
Numen? Indicus Cluſ. ardeę species			Pauxi	177.	
Nycticorax (vide Curicaca	20		Pelecanus ſive Platea Joſſelgañſ	126.46.62	
Gefneri	132.		Perdix	65.	27
O.			alba ſeu Lagopus	68.	28
OEdionemus Bellonij	65.	26	altera		28
Aldrovandi	65.		Cinerea	68.	28
Oenanthe	123.	45	Damaſcena	68.	28
Oenas ſeu Umago (gañſ	92.	32	Græca Bellonij	68.	27
Onocrotalus ſive Pelecanus Rüßſ. 126.46			Ruffa	68.	28
foemina	46		Phalacrocorax	131.	47
Oſifragus	14.	5	Phalaris	135.	
alvus	14.	4	Phaſianus	60.	24
Otis cum Ciceré Arietino		26	alvus		24
Otis ſive Tarda		26	Phœnicurus	121.	45
Ouriffia S. Tomincio. Nierëmb.	178.	56	altera ſpecies		45
P.			Phœnicopteros	150.	50
PAlumbus major	90.		Phœnix	215.	62
minor	90.		Phytivorę aves	56	
Paradiſea avis majoris generis Cluſ.	55		Pica	43.	17
Parus caudatus	120.	44	braſilica	46.	56
ater	120.	44	alia		56
cœruleus minor	120.	44	caudata ſ varia	44.	17
cristatus	120.	44	caudata Indica mas	44.	17
Indicus	120.		foemina		17
major	119.	43	caudata alia Elſter Agel		27
paluſtris	120.	44	Garrulus Argentoratenſis	44.	17
Sylvaticus	120.43.44		Glandaria Heger	17.43	
Passer	93.	34	ſpecies alia	17.43	
Albus	95.	34	marina	44.	17
Albicilla	95.	34	Perfica	44.	
Canarius	98.	34	Pica Cureba	199.	
Domesticus		34	Piciciti	177.	
Alius		34	Picui pinima	199.	
flavus	95.	34	Picus Cinereus	111	41.43
Illyricus	95.		Chlorio-Indicus	112.	41
Indicus macrourus duplex	96.	35	luteus cyanopus	111.	41
Brachyurus Indicus	96.	35	Martius	109.	
Cyanerij thromelanus	96.	35	Maximus niger	110.	41
Erythromelanus	96.	35	Major bundier Specht.	111.	41
Porphyromelanus	97.	35	murarius	111.	41
Maculatus	95.	34	Nidum ſuspendens	112.	41
Montanus	95.	34			

2 T

[illegible]

I N D E X.


	P.	T.		P.	T.
Vespertilio	53.	20	Vulturum differentia	17.	6
lactans	54.	20	Vultur alpinus vel aureus	17.	6
pullus		20	boeticus	17.	6
Ulula Bel/Huhu/Eule	50.	18.19	aquaticus	186.	
Ulula Kircheule		19	Cinereus	17.	6
alia		19	Leporarius	17.	6
Upupa	118.	27.42			
Uria	135.		X Lepapantototl	183.	
Urogallus major	61.	25	Xochitenacatl	171.	56
minor	61.	25	altera	171.	56
alius	61.	25	Xochitototl	174.	
Urubitinga	208.		Xomotl	182.	
Urubu	202.	61			
Urutaurana	198.	59	Y Andeu	217.	
Vulpanfer	141.		Y Yutu	224.	

F I N I S.

Index :

Quibus paginis Tabula avium sint subiungende.

Tabula	I.	pag. 10.	XXXII.	pag. 88.
	II. }		XXXIII.	92.
	III. }	12.	XXXIV.	94.
	IV. }		XXXV. }	
	V. }	14.	XXXVI. }	96.
	VI.	16.	XXXVII. }	
	VII.	20.	XXXVIII. }	98.
	VIII.	22.	XXXIX.	102.
	IX. }		XL.	104.
	X. }	24.	XLI.	110.
	XI. }		XLII.	114.
	XII. }	30.	XLIII.	120.
	XIII. }		XLIV. }	
	XIV. }	36.	XLV. }	122.
	XV. }		XLVI.	128.
	XVI.	38.	XLVII.	130.
	XVII.	40.	XLVIII.	136.
	XVIII. }		XLIX.	142.
	XIX. }	48.	L.	148.
	XX.	52.	LI.	152.
	XXI.	54.	LII.	154.
	XXII. }		LIII. }	
	XXIII. }	56.	LIV. }	166.
	XXIV.	58.	LV.	170.
	XXV.	60.	LVI.	174.
	XXVI. }		LVII.	188.
	XXVII. }	62.	LVIII.	190.
	XXVIII.	68.	LIX.	196.
	XXIX. }		LX.	206.
	XXX. }	82.	LXI.	208.
	XXXI. }		LXII.	214.



HISTORIA NATURALIS
DE PISCIBUS ET CETIS
LIBRI V

Cum aeneis figuris

IOHANNES IONSTONVS MED. DOCTOR
Concinnavit.

FRANCOFVRTI AD MOENVM
Impensu
MATTHEVS MERIANVS.



ILLVSTRISSIMO AC CEL-
SISSIMO

PRINCIPI ET DOMINO,
DOMINO

WILHELMO
VI.

HASSIÆ LANDGRAVIO,
COMITI

CATTIMELIBOCIÆ, DIEZÆ, ZIGEN-
HAINII ET NIDDÆ, &c.

MAGNORVM IMPERII PRINCIPVM, ET
LIBERTATIS GERMANIÆ VINDICVM,
POSTERITATI,

MAXIMORVM REGVM FOEDERATO,
LITERARVM MEGOENATI,
OMNIVM BONORVM DELICIO,

PRÆMISSO, DE FELICI AVSPICATISSIMI
CONIVGII INITI CVM CELSISSIMA PRINCIPE
BRANDEBVRGICA SVCCESSV, VOTO:

DEVM SIMVL PRECATVS, VT CELSITVDI-
NEM SVAM IMPERIO ET ILLVSTRISSIMÆ DO-
MVI HASSIACÆ DIVRNARE ET PERENNARE VELIT:

HANC HISTORIÆ NATVRALIS
DE PISCIBVS PARTEM

Humillimè dicat & offert, utque Sua Celsitudo qualescun-
que hos conatus vultu Celsissimæ Familiæ erga literas
fucto, excipere, & se, suaque studia commendata habere
dignetur,


Demissè orat

CELSISSIMO PRINCIPI
Devotus Cliens

JOANNES JONSTONVS M.D.

A 2

PRÆ-



PRÆFATIO

AD LECTOREM.



ECCE Tibi Historiæ naturalis specimen, studiose Lector. In piscibus id exhibere voluit Typographus: ego non multum interesse arbitrabar, in quibus darētur; modò & reliqua, quod Deo volente fiet, prodirent. Suscepti laboris tuum mihi commodum causa; cui fortè per diffusa volumina hactenus incumbere molestum erat. Taceo jucunditatem; quâ melioribus ingeniis, dum inexhaustam specierum naturalium varietatem, & stupendum eorundē genium exhibet, illabitur:

*Deum, eruditionem, conversationem, & naturæ imitationem, si respexeris, summè eam necessariam comperies. Deum dico. Cultor quotidianus infinitæ Dei Potentiæ & bonitatis esse teneris. Hic Naturæ liber tibi eius post sacrum codicem admiranda aperit. Machinam hîc tantæ vastitatis invenies; tantæ & eius partes molis, ut difficile sit judicare, quid magis in stuporem nos agat, infinita partium à se invicem distantia, an tanta earundem in se magnitudo. Videbis aspectu vilia, & tantæ subtilitatis corpuscula, ut nulla planè esse appareant; sed quarum virtutes maximis illis controversiam faciant. Sol centies sexagies, vel ut alii, centies quadragies major est Historico naturali terrâ: tantæ velocitatis idem, ut unâ horâ decies mille milliarium conficiat. Proximum et si terris Sydus, Luna; ab iisdem tamen, dum minimum distat, LXXI. terræ semidiametris; hoc est, milliarium astronomicorum 178698. remove-tur: quæ si in nostra milliaria per 52. reduci deberent, quanta quæso distantia non exsurget? Terra & aqua in unum globum redacta; et si gravia corpora, ita tamen in medio aëre suspensa librantur, & ad polos mundi disponuntur, ut ne latum quidem unguem, vel ab oriente in occidentem dimoveri; aut à septentrione in Austrum, vel vice versâ, propelli possint. Pisciculus est Eche-neis, quem Remoram dicimus. At idem, gubernaculo navis affixus, immobilem eam reddere creditur. Ferruginea gleba Magnes. At quæ non miracula eius beneficio patramus? Imbellis populus formicæ: tamen iis Reip. ratio, memoria, cura. *Semina erosa condunt, ne rursus in fruges exeant è terra. Madefacta imbre proferunt & siccant. Et quoniam ex diverso convehunt, alterâ alterius ignarâ, certi dies ad recognitionem mutuam, velut nundinis, dantur.* Exiguum insectum A-pis, nec ullius si solo aspectu æstimari debet pretii. At si earum naturâ, Remp. opera excusseris, exclamabis: *rerum naturâ nusquam magis quàm in minimis totam esse.* Infinitæ hæc potentiæ argumenta, quæ Historicus naturalis suggerit. *Bonitatem* si attendas, grande illius documentum, quod nulla re natura ad con-servationem sui destituatur; quod omnes huius universæ partes, singulari ne-xu inter*

xu inter se colligentur, & sibi mutuū ad conservationem totius præstent subsidium: quod superiora, etsi mole, loco & qualitatib. nobiliora videantur, inferioribus quasi inserviant; & denique, quod cuncta homini tanquam regulæ suo famulentur. Rem se ita habere, per universam corporum naturalium seriem, in Historia deducitur. Bona *eruditionis* nostræ pars naturalium peritia. In eo desudat intellectus noster, ut quænam sit sublimium, elementorum, subterraneorum, plantarum, animalium, hominis denique ipsius conditio, penitus cognoscat. Spinosa illæ de materia primâ, infinito, loco, tempore, motu, generatione, &c. quæstiones huic desiderio non sufficiunt: historia, si exactè instrui velis, consulenda est. Generalia sunt quæ præcipiuntur, & isagoges primò vicem tenent: in adyta, per singularia inducimur. Ab his illa abstrahi, per eadem restringi, confirmari, refutari, nemini ignotum. Nullæ nobis metallorum, lapidum, terrarum, succorum, fluorū, plantar, &c. differentiæ essent, nisi à singularib. eorundemque inter se comparatione peterentur. Non poterat Aristoteles & ex eo Plinius scribere, *Capita piscibus proportionem corporis maxima: Nulli animali cui cornua exsertos dentes, sed omnibus concavos, piscium omnibus serratos præter scaro: volucrib. nullos præter vespertilionem: Quibus longa crura, iis & longa colla: Cornigera una parte dentata, & quæ in pedib. talos habent, sævopinguere: bisulca, scissifve in digitos pedibus, adipe; &c.* nisi Historiam consulisset. Inde ergo tibi & in hoc puncto necessaria; quod fortè accuratissimè explicatum, ut omnia solet Excellentissimus D. Sperlingius Amicus noster singularis in specialiorib. Physicæ, quas adhuc premit, partibusque dabit. De *Conversatōne* res clara est. Eo sæpius de naturalibus miraculis inter familiares sermones agitur, quo magis ingenia oblectant. Quantum olim apud veteres in conviviis in usu, Plutarchi symposiaca, & Athenæi Dipnosophistæ docebunt. *Naturæ imitatio* summus sapientiæ nostræ apex est. Hæc indigentia humanæ subvenit, opes auxit, ingenium supra sortem mortalem extulit. Deo quasi similes reddimur, dum ipsius naturæ machinamentis usi, eandem, generando, corrumpendo, transformando, provehendo, impediendo, divertendo, resolvendo, seducendo, &c. nobis quasi subiici & famulari cogimus. Ausum est hætenus ingenium humanum, cælum perpetuo & uniformi motu æmulari; signes perpetuos, deducta quasi astris facce, accendere; ventis, pluviis, iridibus, fulguribus, tonitribus, minari; aërem in unum coactum librare; aquas in declive ire solitas, in sublime propellere; monstra & novas species formare; lapides preciosos fundere; corpora in sua principia, plumbum in hydrargirum, ferrum in liquorem rubiginosum resolvere; arbores argenteas & aluminosas subito producere; plantarum incrementa retardare vel accelerare; easdem in seipsas transmutare; ex cineribus resuscitare; facultate purgativa, & venenata imbueri; ex stupidis, lignis, & mineralibus, Deos, cœlites, heroas, Aquilas, columbas, muscas, mundum adeoque ipsum efformare, iisque animam inspirare; oculum syderib. inferre; exilibus stupendam molem adaptare; Musica affectis varios excitare & sopire; dæmonum denique apparitiones, spectra, & nescio quas *πλῆμορφίας* ad instar Morganæ Rheginæ in freto Mamertino, de qua ingeniosissimus Kircherus, Artis Magnæ Lucis & umbræ l. 10. c. 1. agit, mentiri. An hæc absque naturalium cognitione peracta? Falleris. Non potest agricola suum agrum bene proscindere, effringere, tertiare, occare, runcare, sarrire: non hortulanus suum hortum plantare, opilio ovibus prospicere; pecuarius pecori subvenire; venator feras sectari; piscator squamigero gregi insidiari; auceps aviculas allicere; &c. absque huius subsidiis si fuerit. Huius beneficio convenientia animantib. Adamus nomina imposuit: & Caini posteritas artes fabriles invenit. Non est ergo mirum, & Salomonem tantum huic studio impendisse, ut de plantis & animalibus libros, quos nos perisse dolemus, Urreta in Bibliotheca Preteganis habere nugatur, scripserit; tan-

rum & Alexandrum M. indagandi Animalium per Aristotelem natura; sumptum, ut summa ad plura talenta excreverit: tantum & præterito seculo Franciscum I. Gallorū Regem, ut *Gyllium* & *Bellonium*, viros eruditissimos, & quorum quædam in hac materia scripta extant, in remotas Europæ partes, quin Asiæ & Africam miserit. Huius etiam sine dubio admiratione factum, quod præter Reges & Principes, præcipui Philosophi in eam inquisiverint, & posteritati commendarint. Habemus præter eos, quos in Bibliothecis, Alexandrina, Constantinopolitana, Pergamensi, & aliis perisse, dolemus; quiq; fortè adhuc cū blattis & tineis conficiantur, inter veteres Geographos, Aristotelem, Theophrastum, Dioscoridem, Ælianum, Oppianum, Columellam, Varronem, Palladium, &c. & qui omnium instar est Plinium, cujus Solinus simia appellatur; inter recentiores, Gesnerum Germaniæ Plinium, Aldrovandum, Wottonum, Turnerum, Mouffetum, Agricolam, Boërium, Baccium, Ruveum, Schönfeldium, Freygiū, Mathiolum, Tabernmontanum, Bauhinum Ximenem, Bustamantium, Rondeletium, Bellonium, Cæsium, Thevetum, Marggravium, Pisonem, ab Horto, &c. & qui utriusque Indiæ Navigationes scripsere. Hinc fit, ut sæpè mirari soleam, quod nullam huic Historiæ in Academiis, Bononiensem si excipias (in Wittebergen si quoque eam caput urgere. Cl. Sperlingius) Professionem assignatam videam: & malimus sæpè inter quæstiones de generalib. motis consensescere, nulli vitæ generi prompti, quam naturæ abdita scrutari, quæ omni inserviunt. Et tantū de Historia naturali. De *Labore* meo hæc paucis habe. Totam me naturalem historiam pertexere constituisse, si mihi ad tantas curas Deus vitam producere voluerit, eamque ex vastis illis tam recentium quam antiquorum, Plinii inprimis, Aristotelis, Oppiani, Gesneri & Aldrovandi, voluminibus excerptam, & brevioribus gyris inclusam, ut te quasi scripta introducerem: illa præcipue quæ ad naturalium cognitionem spectant omittis alii attingere, ne te distraham: ordinem qui mihi videtur commodissimus sequi, ut memoria tua juvetur: Paralipomena ex recentioribus illis inprimis qui Indica nobis dedere, addidisse, ne quid omittum esse conqueraris: in descriptionib. authorum ipsorum plerumque verbis uti, sæpe & breviora capita inferere, ne quid secus acceptum occurrat: Authorum loca etiam ab istis neglecta adiecisse, ne te ab his abduci per compendia, imaginere: Figuras & quidem elegantes ut Chalcographus adiiceret persuasi, ut descriptiones facilius conciperes, & impressam memoriæ imaginem, specie ipse visâ depromere posses. In hoc de Piscibus volumine adjectos quosdam ex Schönfeldio, habebis: Liber verò quartus ex Marggravii, in cuius nimis matura morte, ingentem Resp. literaria jacturam fecit, Historia Brasiliæ naturali totidem verbis depromptus est. Cur ad suas classes reduci non potuerint, dixi. His interim frui, studiose Lector, & ad sequentes nundinas, Avium, Quadrupedum, & Aquaticor. Exanguium, quæ jam parata, Historiam expecta. Benè vale, & studiis nostris fave. Dabam Lesznæ Polonorum ex Museo, in cureotide Nativitatis Salvatoris nostri, Anno M, DC. XL.



HISTORIÆ NATVRALIS
De
PISCIBVS,
LIBER PRIMVS,
DE PISCIBVS MARINIS.

Titulus I.
DE PELAGIIS.

CAPUT I.
DE PELAGIIS SQUALIOSIS.
ARTICVLVS I.
DE ASELLIS.

TAB. I.
TAB. II
1.



PISCES, qui Latini *Aselli* dicuntur, Græci ὄνως & ὀνίσκος, seu ab asinino colore, quod a Varro placet, seu a torpore, ut b oppiano,

a. Varro
l. 4. de LL.
b Oppian. vocant.

l. 3. Hæliant. Genera eorum duo e Plinius, & d Dorion, faciunt, *Callariam* & *Bacchum* seu ὄνον quem *Gadon* alii dicunt, & *Galleridam*, ὀνίσκος, & μάχυνος; tria Oppianus, nisi Oniscum pro parvo sumpserit: Nos eis *Asellum nigrum*, *Molvam*, *Morhuam*, *Gobergum*, adjicimus, iisdemque *Mustelam*, & *Tincam* socios quasi damus.

c. Plin. H. N. l. 9. c. 7. item. l. 32. c. II. d Athen. Dipnos. l. 7.

Onos, qui nonnullis ὀνίσκος, *Asellus*, Plinio, seu quod Libero Patri facer, seu ob tumidum ventrem *BACCHVS*, Dorioni *Gadus*, Hollandis juvenculus *Bolck*, adultus *Cabellian*, dicitur, magnitudine est insigni, tres enim cubitos sæpe excedit; colore in tergo, nigricante, ad latera & in

ventre albicante, capite amplo, ore, ante quod cirrum habet, (radiolū & virgulam quidam vocant) grandissimo. ἀνὴρ ὁμοίως τῷς γαλαῖς, e Aristoteles dicit, ventre non variegato (ma- H. A. l. 9. lē *Epicharmus* apud *Athenæum* ποικιλοχάσσορες vocat) sed tumido, ut πελοχάσσορες legendum sit, jecore maximo. *Degit* in alto mari, in aliquo latibulo; sub f *Sirii* maximè exortum latitat, f *Plin. H. N.* cum alii per summum hyberni tem- l. 9. c. 17. poris frigus se abdant, sæpè se avenā *Aristot.* obruit, unde forte *Sandi* apud *Borus* H. A. *Ælian.* fos nomen. H. A.

Vsus eius in cibis apud Romanos post *Acipenserem* commendatus, hodie apud Septentrionales frequentissimus. Carne est alba & friabilis. quod si mari puro & alimento probotatur, carnis bonitate cum saxatilibus contendit, si Galeno credimus. *Galen. de Difficilem* tamen esse concoctu, vide *Alim. rosūq;* aliquid habere *Diphilus a- facult. l. 3.* pud *Athenæum* prodidit, Exsiccatus 30. osseam duritiem contrahit, nec nisi fustibus verberatus coquitur; unde piscis fustuarii, & Germanor. *Stockfisch* nomen. Sale inveteratus, & sal-fugine abluta ex nova aqua elixus, *Laberdanus*; (*Laberdan*) in Germaniam superiorem devedus, *Rhein-fisch* seu *Rheni* piscis, vocatur.

Callarias seu *Clarias*, *Galaria*, *Galerida* & *Galaxia*, Hollandis *Schelfisch* Mur-

TAB. I. Murmelio *Piscis capitosus*, Gallis Mer-
2. 3. *lucius*, longitudine plerunque est cu-
TAB. II. bitali, teres, ventricosus, squammas
2. 3. habet minutas, in lateribus & dorso

ad cineritium colorem vergentes. *Caput* maiusculum, & in eo lapillos duos oblongos, latum, pressum. *Oris* rictum maximum, *Oculos* maximos, *branchias* utrinque quaternas, duplices; in interiore oris parte post linguam ossa parte inferna, superna, aspera, & in gula, regione cordis duos alia reliquis longiora, quæ obstant ne pisces dum devorat, in gulæ angustias compulsi, aculeorum asperitate cor vulnerent. *Ventriculus* est magnus, crassus, superiore parte latus, inferiore in acutum desinens, albus, in interna capacitate tenuissima ac nigerima membrana obducitur. Pinnis natat quatuor, quar. quæ in supina parte, ori sunt propiores, quam quæ ad branchias. Unicam habere spinam ex dissecto se dedidisse Salvianus prodidit. *Interiora* si spectes, *cor*, quod inter branchias situm est, pericardio involutum, figuram ossis dactylorum exprimit. *secur*, cui fel committitur, est album, *intestina* rubent, *uterus* bifidus nec admodum longus conspicitur. Ex vertebrarum extremitatibus, quæ admodum retusa sunt, crassa utrinque membrana, scapulæ formam dissecta adamussim representans, suboritur; quæ capacitem insignem intus vacuam, extuberantemque adeo efficit, ut piscis ipse ventriosus reddatur. *Degit* plærumque circa canosa ac herbosa littora. Gobionibus, atherinis, & marinis reiectamenris vescitur. Carne est candida & friabili.

Aldrovand.
l. 3. de
Piscib. c. 3.

Huic similis est quidam, quem Veneti *Pisces mollem*, Romani vulgo *Ficum*, Galli *Merlangum* vocant. Albus est, argentei coloris, mollis, squammis tam parvis, ut visum fugiant, tectus, oculis magnis, argenteis; ore medio-cri, dentibus in maxillis, parvis, albis, acutis, ordinatis. In capite calculos oblongos habet. *Pinnas* ipsi tres inter-gore, duas ab ano ad caudam, in late-ribus ad branchias utrinque unam, Bellonius tribuit. Spina tergoris sexaginta vertebris constat. linea à branchiis ad caudam sinuosa ducitur.

Ventriculū habet magnum cum multis appendicibus. *Epar* ex candido rube-scens, vulvam bifariam secundum Rondeletium, quadrifariam secun-dum Bellonium divisam. Ascendit sæpè ex alto ad littora, & Aphyis, Ca-ridibus, Gobionibusque, quos inte-gros devorat, pascitur.

Gallia tam frequens est, ut à carnis levitate, vulgari proverbio locum fe-cerit. Hominem duodenis merlan-gis probè pastum, minore ab his pon-dere in cursu fatigari, quàm si senos tantum *Zonæ* appensos gestaret.

Asellus NIGER Anglis ideo *Collis* Aldrov. *fisch* / à carbonibus sic dictus; squam- Gesner. mis est latioribus, tergo nigrican- TAB. II. te, ventre candidiore. Linea à capite 3. ad caudam atra, & ad latera aliquan-tulum inflexa producit. *pinnæ* reli-quis sui generis piscibus duriores & robustiores sunt. Parvus carnem ha-bet planè inspidam, profectus habe-tur in pretio.

Asellum virefc. v. Tab. 46.

ARTICVLVS II.

De *Molva*, *Morhua*, *Mustela*,
& *Tinca marina*.

MOLVA, Rendeletio *Asinus va-* TAB. II. *rius*, & *Molva maior*, dorsum ha- 6. bet cinereum multis maculis nigris con-spersum, *ventrem* candidum fal-catum, *pinnas* in dorso tres, à podice unicam, duas ad branchias, duas in ventre. *dentes* in maxillis, internas partes Asino similes.

Morhua seu *Molva altera*, Anglis Aldrovand. *Morchuel*, plærumque est sesquicu- de Piscib. bitalis longitudinis, pedis unius, *O* 1. 3. c. 6. ipsi magnum, *dentes* in maxillis, *oculi* magni. Ex inferioris maxillæ extremo *appendix* carnosa ceu pilus è barba propendit. *Pinna* ad branchias & in ventre binæ, parte prona tres, à podice duæ conspiciuntur. *Dorsum* cine-reis fulvisque maculis notatur. *Venter* est falcatus. Caro coctione propter humoris tenuis consumptionem, glu-tinosior, ut farina aqua diluta, & sac-charum *dissolutum* evadit, butyro im-merfa adeo digitis adhærescit, ut vix inde avelli possit. *Intestina* & folliculi ichthyocollæ conficiendæ inserviunt.


Gober-

Tabella. I.

Asellus Cabellau.
Bolch.




Callarias Asellus minor.
Schel fisch. Rheinfisch.




Asellus alter sine Merlucius.

Ein ander art Schelfisch.




Mustela.

Meer Frösch



Hippurus. Roden kopff


12




Har engus

Hering

6




Tinea marina.
Meer Schleye.




Siparis Schmalz fisch.

7




Ayer
Meereber

8




Scolopax Meer Schnepf




Glaucus.
Meer Stichelng.

11



Monoceros.
Meer Einhorn.

10




Asellus.

Cabeliau.

1


Tabella. II.



Asellus minor.

Gulleken.


2



Asellus mollis.


Wjlingh.

3



Asellus alius


4



Reuersus

indicus Anguill formis.

5



Molva. ein art stockfisch.

6



Rutilus

Wjff. 3rste.


8

Coruulus.

raplein




7



Salpa.


Stockfisch.

10



9

Coruulus. raplein andre art.



Gobergus duorum cubitorum magnitudinem superat. *Colore* est cinereo, ventre falcato, *ore* sine dentibus mediocri partibus internis Merlucio similis. *Carnē* duriorē quā A-sinus.

TAB. I. 4. Quem Mustelam Genuenses vocant. Illyrici *Pegorellam* dicunt. Bel-lonius Aristotelis & Galeni *Calla-riam*. Rondeletius *Afellum* veterum esse opinatur. Trium interdum pal-morum est longitudinis, cruris hu-mani crassitiei, colore ex livido in o-pacum abeunte. Duas in tergo *pinnas* gerit, minimo capiti vicina est, præ-ter has alia ad caudam usque proten-ditur, ad latera utrinque una rotun-da, ut & cauda visitur, sub quibus pos-tremis crassiores ac carnosius quidam cirri bifidi conspiciuntur. Maxillæ ip-si mobiles. *Dentes* confusi; in supe-riore labro, *maculam*, cordis figura, denticulis circumfultam, linguam albicantem & in cuspidem efforma-tam ostendit. *Branchias* distendit utrinque quatuor. *Interiora* si spectes, sub branchiis *cor* delitescit trique-trum, bursâ suâ involutum. *hepar* pal-lidum ac ferè lacteum in tres lobos divisum, diaphragmati appensum. Si-nistra eius pars, cæteris maior, vesicu-lam fellis oblongam admittit. *Lien* prægrandis sanguineus, gracilis, ob-longus, pastorum instrumentum, cui cornutæ Musæ nomen referens, à ventriculo dependet. In *pyloro*, tri-ginta & aliquot apophyles nume-rantur. *Intestina* tribus revolutioni-bus circumflectuntur, priusquam re-ctum attingat. *Vesicula* quædam cæ-teris Afellis communis, gemino velu-ri folliculo tergori coniuncta, com-modum nationis usum exhibere cre-ditur.

TAB. I. 5. Tinca marina, propter corporis cum palustri similitudinem sic dicta, *Pesce fisco* Italis quod passi ficus instar mollis sit, vocatur. Salvianus *Afellum Callariam* esse sed falsò, contendit. Vix pedalem mensuram excedit. *Cor-pore* est toto oblongo, latiusculo, squammis minutis contexto, coloris cinericii. *Capite*, in quo duos lapil-los gerit, lato & pressò. *Ore* magno, &

valdè denticulato. *Oculis* aureis. Ex inferiore maxilla appendix cum bar-ba propendet. *Branchias* habet utrin-que quaternas, & ad eas binas latiu-sculas pinnis, unam scilicet utrinque. Ex anteriore ventris parte pinnarum vice bini longi admodum atque ro-rundi cirri propendent. In primo dor-so pinna parva erigitur; post eam alia una enascitur, per dorsum totum ad caudam usque extenditur. Inferio-ri ventri singularis pinna ab ano orta, ad caudam etiam usque producta, subnectitur. Cauda in unicam ro-tundam desinit. *Hepar* magnum & subalbidum visitur.

Caro concoctæ est facilis, sed ex-crementitia.

ARTICVLVS III.

De Harengo, & Lipari.

Piscis, quem Germani HAREN-Aldrovand. l. 3. c. 10. *cvm* fortè à Græcorum *πτερυγ*, quod falsamentum sonat, alii Hale-cem vocant, qui apud antiquos sit & vocetur, ignoratur. *Chalcidi* marinæ seu Sardinæ quidam congenerem faciunt. *Thrissis* sive Alofis nonnulli.

Dorso est quodammodo cæruleo, TAB. I. 6. *ventre* albo falcato, *squammis* acutis pertinaciterque hærentibus. *Bran-chiarum* scissuram, quia pro corporis ratione magnam habet, citissimè a-quæ extractus emoritur. Jeiuno dun-taxat intestino instructum Albertus author est.

In Oceano Germanico circa Bri-tanniam, Hiberniam, Scotiam, Nor-vegiam, Daniam inveniuntur, in Me-diterraneo quoque capi, & Romæ, Massiliæ, Venetiis prostrare falsò Bel-lonius prodidit, formæ similitudine, quam cum *Trissis* habeat deceptus. Puro aquæ elemento *Nutriti* volue-runt quidam, quod in aërē protracti in momento expirent. Magnis simul agminibus natant, & tanta ipso-rum copia, ut ad c c m. coronatorū in sin-gulos annos capturæ precium ascen-dere Cardanus prodiderit: In terra sancta Oceanici maris Insula *ixm*. ho-minum vitam harengis sustentabant.

B Cūm

Cum per petulantiam unam ex capitis virgis cecidissent, adeo corruptus est imminutus, ut post illa vix centum ex eo quæstu vixerint. Lucent in aqua, ventribus versus summum æquor, obversis. imò tantum de se splendorem, squammis maximè quæ circa oculos, emittunt, ut mare fulgurare videatur. Lucem emorien-
te mori, credidere quidam, per aliquot post mortem superesse dies, quidam experti sunt. Semel anno teste Alberto pariunt.

Caradenus
in Brigan-
tibus.
Lansius de
Principatu
Europæ.

Mira de eorum natatu prodita sunt. Proavorum tempore ad Norvegiam sua quasi stativa habuerunt, nostro tempore Britanniam totam im-
mensis exercitibus circumnatant. Circa solstitium æstivum ex alto Scotiae littora petunt: inde Anglica littora adeunt, & ab Augusto medio ad Novembrem à castro Scarborough ad Thamesin capiuntur. Postea aliqua vehemètiore procella in Britan-
nicum mare deferuntur, & in eo ad Christi natalicia piscantibus se offerunt. hinc Hiberniam utrinque per-
natantes, in Septentrionalem Oceanum, circumnavigata quasi Britan-
niâ, se transferunt. & ibi ad Junium occultantur. postquam fretificavere, redeunt.

Vfus ipsorum in cibis, apud Septentrionales frequens. Recentes, muria conditi, & exsiccati, mensis inferuntur. Solent & saliti aqua macerari: sal-
fugine deposita, in craticula asside-
duntur. Conspiciti in novo orbe vol-
antium nubes. Miserahorum, inquit
Thuan. Hi- Thuanus, conditio, quibus nec in mari
stor. l. 117. natantibus, nec in aëre volantibus, tutus
unquam receptus, naturamque in utroque
elemento novæ experti, cum ut se à
perniciæ cognatorum piscium asserant, in al-
tum evehunt, mox ab avibus circumvo-
lantibus rapiuntur; quarum si rostrum fu-
giendo evaserint, arefactis alis deficientes,
rursus se in aquas precipitant, & volando
fessi, à piscibus in festis glutuntur. Ita-
que mediam sortem eligentes plerumque in
obvias naves involant, & præda hominum
sunt.

Plin. H. N.
l. 32. c. 12.

Liparis piscis à Plinio memoratus, à pinguedine, quasi λιπαρός nomen in-

venit. Capite terrestrem curriculum TAB. I.
refert. Os ei parvum, sine dentibus, 7.
maxillis asperis. virga à capite ad cau-
dam satis lata. Squammæ parvæ. pinna
ad branchias & in ventre binæ. alia à
podice ad caudam, alia à cervicis lo-
co ad eandem continua sine aculeis.

Cauda in duas definit. Adeo pinguis
est, ut sub cute pinguedinè loco car-
nis habeat; asservatus, totus in oleum
abiverit.

ARTICVLVS IV.

De Apro Scolopace & Monocero.

APER Rondeletii, quem ille cum TAB. I. 8.
Apro vetetum eundem, se falsò ut Aldrovand.
l. 3. c. 12. de
piscibus.
Aldrovandus ostendit ponit, piscis est
squamosus, ferè rotundus, com-
pressus corpore præduro; & aspera ve-
luti ac villosa cute prædita, rostro suis
instar, oblongo & obtuso, sine denti-
bus. aculeis præacutis, duris, longis, re-
ctis. setas inæquales esse diceres, qui
mox à capite secundum dorsi longi-
tudinem decurrunt. Pinnas habet ad
branchias duas, in ventre duas alias,
multis firmisq; aculeis & à se disjun-
ctis constantes. à podice tres aculeos
breves & acutos. Cauda in unam pin-
nam definit.

Iconem porci supini Salviani tradit Tab. XXXI. 1.

Qui Rondeletio SCOLOPAX, seu TAB. I.
Ascolopax est, hunc alii Elephantem, 9.
sed perperam. rostrum enim rigidum
est; Gesnerius Serram Plinii quod ra-
dium caudam versus ferratū habeat,
nominat. Semper ferè parvum esse,
exinde coniicit Rondeletius, quod
tres eiusdem magnitudinis ovīs di-
stintos viderit.

Corpore est rotundo, Erythrini mo-
do rubescente. rostro prælongo, rigi-
do. In dorso habet aculeum longū du-
rum, præacutum, altera tantum par-
te ferratum. denticulis serrâ referen-
tibus, utpote contiguis basibus quæ
latiusculæ sunt. Cauda habet tenuem.

Caro ei substantia Pagro similis. bo-
nifucci & facilis concoctionis. Cum
rarus sit, exsiccatus potius servatur,
quam editur.

Monoceros Clusii, ob confimilem TAB. I.
potius 10.

Clusius l. 6.
Exot. c. 27.

potius cum Sclopacæ formam, quam ut quod inter squamosos censeretur debeat; aspero enim corio est; priori subiungitur. Ex orientali India allatum Clusius ita descripsit. Ab extimo ore usque; ad caudæ pinnas, paulo longior erat tribus uncis, medio corpore paulo plus uncia latus, &c.

ARTICVLVS V.

De Glaucō veterum & Hippuro.

TAB. I. GLAUCVS piscis à colore cæruleo seu Cyanéo ita dictus, ὑπόλευκος. Interdum à Græcis teste Eustachio, dicitur, & benè à *Glaucisco*, cum ille ætate lateat, si Aristoteli & Ovidio credimus; hunc ætate & hyeme Damosenus Comicus in cibis laudet, distinguatur. Mnesitheus apud Athenæum inter ἰμνιτῶν, Volaterranus serratorum & carnivororum genera, eum ponit; Aristoteles squamosum facit, & paucas appendices supernè circa ventriculū exeuntes habere adjicit. Plinius austero & irascenti mari simili colore, esse prodit.

Plin. H. N. l. 9. c. 36. Apud Rondeletium tres ipsius habemus species. Prior provincialibus Cabrolle dictus, tricubitalis quandoque; corpore est longo, ventre compresso, dorso falcato, cæruleo, cute nitida, squammis vix apparentibus, ni cutis exsicceatur. ventre candidissimo, maxillis asperis potius quam dentibus munitis. Statim à capite aculeos habet; quorum duo qui juxta anum sunt, velut in vaginā conduntur. Aculeos pinna sequitur, ad caudam usque; continua, initio magna, maculā nigrā notata; inde brevis & tenuis, tenuibus quasi villis constans. Ad branchias pinnæ aurei sunt coloris, pro podice rimam potius quam formam fortitus est. Ventriculū habet magnum cum uno appendice. Vesica fellis intestino adhæret. Splen parvus, caro candida & pinguis visitur. Salvianus Amiam veterum esse credit, Jovius centrinam quibusdam videri dicit.

Alter minor, unde γλαυκίδιον apud Athenæum esse conjicit, septem aculeos in dorso, ad caudam spectantes habet; à superiore branchiarum par-

tē ad medium corpus lineā tortuosa admodum dimittitur, hinc rectā ad caudam protenditur.

Tertio quem *sinuosum* vocat, quod lineā à branchiis ductā, serpentum corporis flexibus gradientium instar tortuosa sit, dentes sunt acuti, dorsum ex cæruleo nigrescit,

Lecum in petris etiam & arenis pisci Oppianus scripsit. Numenius apud Athenæum κατὰ μνία σφαλόνεσσι, id id, per algas molles, fluctibus minimè agitata & muscum versari, tradit. Aristoteles, & Athenæus pelagium fecit. Cibus quidem ipsi, carnes. Sed nec algam vel muscum contemnit. Unde Tarentinus escā ad Glaucos capiendos præscribens, partem ex musco & farina, partem ex piscium carne componit. Fœtum suū ore, ubi metuit recipere, iterū emittere, tradidere quidam; quia spinosus est, de Glaucō Galeo sumendū id videtur: sanè solū ex Galeis Acanthiā fœtus suos propter spinam non recipere, author est Aristoteles. Ætate circa 14. dies nō conspicitur. Plinius alibi dictor. immemor, nunquam apparere scripsit.

Esus ipsius expetitus in cibis, siue uterum gerat siue non. Caput tamen potissimū, apud Anaxandridem, Sotadē Comicū, in primis si in Olyntho, & Me aris captus esset, cōmendabatur. Eustathius palmā oculis tradit. ut ut sit, difficulter si Tralliano & Mnesitheo credimus, concoquitur. Concoctus permultū alimentū præbet. Ex jure sumptū seu Glaucum seu Glauciscum, copiam lactis mulieribus facere, Plinius Author est.

ARTICVLVS VI.

De Hippuro & Reverso Indico.

HIPPURUS seu à similitudine equæ caudæ, seu ἵππος ὅτι ἴσως δίκην ἢ οὐκ ἔχει, quod equi more feratur & faliat, ita dictus, aliis ἀγνέσιν ab agnis saltus urinantibus similes exercentibus, Dorioni & Epeneto κορυφαῖον, à pinna quæ à vertice incipit, in eoque; veluti cristā erigitur, Hicelio Hippurea, Hispanis Lápugo, Gazæ Equilis vocatur. Glaucō colore internisque; partibus si-

milis est, & facile inter cæteros pisces ex pinna quæ à capite incipiēs in pro-na parte ipsi unica est, & caudæ equi-næ simillima, villis multis constat, cuiusmodi in nullis aliis piscibus reperitur. Vēter in medio corpore situs est.

Aristot.
H.A.I. 9.
6.10.

Degit in pelago, mari Mediterra-neo ignotus. Carystius ab Archestra-to maximè celebratur, quod mirum, cum cæteri ibi pisces viles sint. Dele-ctatur carnibus, & nassis inclusus tāt-opere crescit, ut inde incrementum cepisse videatur. Vere parit. hyeme laet. in natatu celer est, & nunquam nisi certis diebus capitur.

TAB.
III. I.
Clusius
Exot. I. 6.
6.18.

REVERSUS Indicus duplex est, An-guilliformis alter, de quo inferius di-cemus; alter, de quo hic, squamosus. Nomen inde, quod retractus veni-tur, accepit. Magnitudine est palmi. Squammis contegitur rugosis, spinis in dorso, & ab umbilico ad caudam maximè acutissimis. Docilis est, & fa-cilè cicuratur. Magnam Indis in ve-nandis piscibus præstat operam. Te-nui sed valido funiculo alligatus ad mare defertur, blandis animatus verbis in piscem conspectum, etiam magnum, emittitur, eiusdemq; lateri seu ventri sese affigit. sic extrahitur. Præda blandè avellitur, ne, quia vali-dè adhæret, descerpta intereat.

Niremberg.
Nat. Exot.
I. II. 6. 18.

REVRRSVM Indicum anguilliformem
vide Tab. II.

CAPUT II.

De Pelagiis Lavibus.

ARTICVLVS I.

De Thunno.

Thunnus, seu à Græcorum θύνν, quod est magno impetu moveri, seu ab Ebræorū ἄ Thannia, quo Ce-raceum piscem intelligunt, sic dictus, multa apud Authores pro diversita-te ætatum sortitur nomina. Thynnus seu Thynna simpliciter sive mas est sive fœmina, Pelamyde major, Thun-no propriè dicto minor. *h Cordyla* appellatur partus, q̄ fœtas redeuntes in mare autumnō cōitatur, Byzantii αὐξιδας, ἡ δὲ τὸ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις αὐξάνουσα ut testatur ἑ Aristoteles, seu quod

a Aldrov.
I. 3. 18.

TAB.
III. 2.
3. 4.

b Plinius
H.N. I. 9.
c. 15.

c. Aristotel.


paucis diebus augefcant (Gaza An-H.A.I. 6.
xum vocat) dicunt. Redux in Pon-c. 16.
tum ex magno mari Cordyla, Pelamy-dis nomen, seu ὅτι τὸ ἐν τῷ πηλῷ μένει, i. e. quod in limo se abdat, seu ὅτι τὸ πέλειν αἶμα, quod gregatim degat, ut d Plutar- d Plutarch.
cho placet, (Limosam, Limariam, & Lu-de solert.
tariam alii vocant) fortitur. Pelamy-Animal.
des cum annum excessere tempus, Thunni vocatur. hisce pauld maiores Tritones. e Orcynus, Apolectus, Sarda, e Aldrov.
Synodontis, Cybia seu Cybios, Cete, Melan-l. 3. c. II.
drys, Triton, Chelidonas, Xanthias, pro-priis suarum appellationum rationi-bus non carent. sed & variis eorum sale asservatis partibus, singularia no-mina indita, apud Authores inve-nies.

Lubricos eos Plinius facit. f Ron-f Rondelet.
deletius suum Orcynum, ut & eum in Hist.
quem Pelamydis veræ seu Thunni Pisc.
Aristotelis nomine exhibet, squam-mis magnis ita ad amussim compa-ctis, ut iis carere videatur, tegi, co-ctione easdem dehiscere, tuncque perspicuè apparere tenui membrana contextas, scribit. Pelamydem verò Sardam cute levi esse, & sine squam-mis, ea parte, quæ à pinnis ad bran-chias sitis, incipit excepta, adjicit. Sed nec vel de sexuum notis; vel de Pe-lamydum, & Thunnorum differen-tiis inter Authores convenire vide-tur. f Aristoteli g Plinio & h Athe-f Aristot.
næo mas à fœmina eo distinguitur; H.A.I. 5.
quod hæc sub ventre pinnulam ha-c. 9.
beat ἀφαγέως dictam, quæ mas caret. g. Plin.
Rondeletius in utroque semper pin-H.N. I. 9.
nam sub ventre deprehendi ait, indi-c. 15.
visam in mare, divisam in fœmina, ut h Athen.
podicis foramen dilatari, fœtusque Dipnes. 4.
commodius in lucem edi possit. Ligu-res & Massilienses piscatores nun-quam ex Pelamydibus Thunnos fieri apertè ostendisse, author est i Sca-i Scaliger.
liger: à Pelamyde hoc unum distare in Exerci-
tut.
Thunnū, q̄ hic sit lividus lateribus, illa undaribus maculis transversis atq; obliquis eidē destinato gerat, asseret k Bellonius. Captus An. M. DC. LXV, k Bellonius.
circa Gaditanum fretum, pedem cir. Aldrov.
xxxii. longitudine, latitudine xvi. in cuius pelle integra classis delineata conspecta est.

Locus

Puerfius Indicus.
squamosus

Tagfisch. Tab. III



Thunmus.


Thunfisch. Meer Thunnen.



Pelamis Cœrulea.

3


Thunfisch.



Orximus.

Waldthun.


4



Pompidos

5


Einseit fisch.



Ania.

6

Streit thun



*Locus Thunnorum varius pro-
te esse videtur. l* Oppianus, qui eos
piscib, pelagiis annumerat, ex Ocea-
no in mare Mediterraneum, cum ve-
read sobolis propagationem instiga-
tur, venire, ideoque rum plurimos in
Tyrrheno & Iberico capi, author est;
mense Majo Xiphiis cogentibus ir-
rumpere, Jovius adjicit. Pelamydes
æquora fluvio aut paludi vicina inco-
lere, ideò in Pontum ad dulciora pa-
bula gregatim intrare, ex Plinio *m*
habemus, ibidè, ut & in Mæoticis pa-
ludibus nasci, * Strabo retulit. te-
pore gaudere ideò per summa maris
natare, aliquando flumina subire, ex
m Plin.
H.N.l. 9.
c. 15.
** Strabo.*
Geogr. l. 7. *n* Aristotele discimus, Visos qui Aga-
n Aristotel. thopoli ad pontem usque, qui aliquot
H.A.l. 8. millib. passuum à mari distabat, con-
c. 19. scenderent, *o* Rondeletius prodidit.
o Rondelet. sed & in Rheno, Nilo, Pado, Platina
scripsit. in algosis quibusdam locis.
Gaditanis extra Herculis columnas
sub folano vento eò delatis, ingenti
numero, magnitudine & crassitie in-
credibili, occurrissè, Admiranda A-
ristot. *p* vèditant. Vix credèdū Thyn-
norum multitudinè in Indico mari
tantum, ut Magni Alexandri classis
haud alio modo, quàm hostium ac-
cie obvia contrariū agmen adversa
fronte direxerit *q*, apud * Pliniū legi-
mus. Græci scriptores enim Cete
& Physiteres fuisse innuunt. De eo-
rum circa Byzantium & captura &
mora ita *q* Strabo, &c.
Cibus eis aliquando *r* alga; sæpè,
circa Hispaniam imprimis, (ex ante-
riore * ad columnas delati pelago,
esca deficiente macerantur) glan-
des. ex quercubus ad mare nascen-
tibus *s* delapsæ quibus vehementer
pinguescunt. & ex harum ubertate,
ubertas Thynnor. colligitur: ut plu-
rimum caro. Tepore fœturæ *t* quic-
quid attigerint, liguriunt. quin &
partu soluto, ne propriis quidem par-
cunt natis, sed læti tempore veris *u*
Ova vorant subito, & lacerant sub
dentibus atris. aliquando præ pingue-
dine rumpi *x* Aristoteles author est.
Vitam ad biennium duntaxat pro-
ducere, quod *y* Plinio ex Aristotele
placuit, vix verisimile videtur.
Ad tantam enim excrefcunt magni-

tudinem, ut xv. talenta pendeant,
caudaque duo cubita seu ut apud *z* Aristot.
Aristotelem extat, quinque palmum
latitudine, expleat, & visi capi, quos
corporis magnitudine, squammarum
crassitie & corporum duritie bien-
nio multo provectiores fuisse fateri
oportuerit.

De *Generatione* habemus, Thun-
nos coire mense * Februario post idus
Junij initio parere *a* semel, & quidè *b* *a* Aristot.
in Pôto Thunnos, bis credi, quia par-
tim tempestivus partim cordus eius
fœtus est. prior soboles mense De-
cembriante brumam exit, posterior
vere. *Ova* edunt quasi in utriculo. Ex
his sunt, quas Scordulas vocant, By-
zantiij Auxiadas quod paucis diebus
augefcant.

Exeunt Autumno cum Thunnis
simul, verno autem tempore repe-
tunt, jam factæ Pelamydes. Quan-
tum ad *animales functiones*, concessit
& istis singularia quædam Natura.
Dromades esse, seu ut Gaza reddit
cursores, ex superioribus cognosci
potuit. Non vagantur tamen *a* bru-
ma; ubique deprehensi usque ad
æquinoctium, ibi hybernant. Ex Pon-
to exituri lævam tenent, & Aquilo-
nem operiuntur, ut secundo fluxu
exeant. ingressuri eundem, ad dex-
tram flectuntur, quia dextro oculo
plus cernunt, utraque natura hebe-
te. Eadem *b* debilitas in causa, quod
ad saxum illud miri candoris, à vado
ad summa perlucens, quod in Euripo
Thracii Bosphori, quo Propontis
Euxino iungitur, in ipsis Europam A-
siamque separantis freti angustiiis,
juxta Chalcedonem in Asiæ littore
visitur, exhorrescant, & sic repente
territi, adversum Byzantii promon-
torium, ex ea causa appellatum Auri-
cornu, præcipiti petunt agmine. No-
ctu proficisci & vetustissimum Am-
phyliti vatis apud *c* Herodotum ora-
culum, & nummus à *d* Bellonio vi-
sus, in quo altera parte spica, altera
Thunnus cōspiciebatur, & supra hūc
Luna cū inscriptione PHILIPPENZE,
innuit. nec de nihilo est, quod Plinius,
postquam *e* dixisset, capturam illo-
rum à vergiliarum exortu ad arctu-
ri occasum durare, reliquo tempore

f Plutarch.
de solert. A-
nimal.

g Ælian.
H.A. l. 15.
c. 3.

h Aristot.
H.A. l. 4.
c. 10.

i Oppian.
Haliect. l. 2.
c. 5.

hyberno latere in gurgitibus imis, nisi tepore aliquo evocatos, aut pleniluniis, adjiciat. In natando figuram cubicam, si gregatim vagantur, f servant, atque sex lateribus cōprehensi, soliditatem ex semetipsis constituunt. Ad promontorium g Bubonicum, maximi, suum instar, soli vagantur. alii more luporum bini proficiunt. nonnulli more caprarum, gregatim pascuntur. Exoriente canicula, in Euxinum natate contendunt; & marinis fluctibus, & fervidè radiato sole calescentibus, inter se velut contexti, confertis turmis sese invicem opacant. Dormire h in imis gurgitibus, sub saxo aut littore abditos, i Aristoteles prodidit; & quidem tam profunde, ut ne jactā quidem fuscina, moveantur. Sub Caniculæ exortum æstro exagitantur. Hæret ille ubi curis tenuior, sub pinna, & ita miseros divexat, ut sæpè in terram ἀσπαίνοντες saliant, sæpè in naves se conjiciant.

De Sympathia & Antipathia non est quod multa dicam. Dicuntur Cepphos habere comites, qui carunculas pisciculorum, à Thunnis discerptorum, aquis innatantes, depascuntur. Cum gregatim præter Italiam acti elabuntur, à Sicilia prohibiti, in majores incurrunt belluas. Majo Mense à Xiphiis ex Atlantico Oceano in mare mediterraneū pelluntur. Non aliter ab iis gregatim in fugam agi, quàm ovium greges à lupis Mathiolus auctor est. De captura Thunnorum agere alterius loci est.

k Plin.
H.N. l. 9.
c. 15.

Usum reperere in Cibis. Olim membratim cæsi k cervice & ab domine (τὰς ἡγεαίας Athenæus vocat) commendabantur, atque clidio (clidia Thyum Festus, Petimen ex Nævio Petimen piscinū, quod est inter duos armos ad pectus, claviculas Medici vocant) salitis, Omotarichi nomen impositum est) recenti duntaxat, & tum quoque gravi ructu scætera parte plenis pulpamentis asservabantur. Melandria vocabantur, cæsis quercus affulis, simillima. Vilissima ex his, quæ caudæ proxima αὐρίαι dicebantur, quia pingui carenti hinc ἀπρονον nomen, probatissima, quæ faucibus, Pelamides in aplectos, particulatim-

que confecti, in genera Cybiorum (sic dicuntur seu falsamenti frustra quæcunque in formam αὐβοειδῆ dissecta; vel quæ ex dorso partibus cerviciclidioque proximis) dispertiebantur. Alexis caput, cōmendabat, caudam Antiphanes. Falconius Hetruscus eruditioris gulæ ganeo, novum & sapidissimum obsonii genus ex iis commentus est. Athenæus ἐμυττάτω (intritum hoc, ex aliis & aliis condimentis) aliis piscibus prætulit. Alii falsamenta, quæ θυνναία seu θυννια potius, quàm recentis piscis quamlibet partem præferunt. Sunt quippe Xenocrati apud Oribasiū stomacho inepti, mali succi, flatulenti, ad excernendum difficiles. Galeno, durā carne præditi, & insuaves. Arcestratus tamen nobilem Thunnum circa Byzantium, Carystum & Siciliam; præstantiorem circa Cephalen & Tyn-daridem oram; præstantissimum circa Hipponium Italiæ, nasci, circa Samum ingentem, & deorum conviviis dignum capi, prodidit.

Præbent & in Medicina usum. San- m Plin. guis, m fel, & jecur, sive recentia sive H.N. l. 32. servata, vim psilothri obtinent. Non c. 10. pubesciturum, qui in pueritia his illitus est, n Ælianus affirmat. Omota- n Ælian. richus o largius sumptus, Presteris H.A. l. 13. serpentis venenum retundit. Cybio- c. 27. rum cinis, cum melle ad Condyl- o Dioscor. l. 2. c. 30. mata confert.

ARTICVLVS II.

De Pompilo & Amia.

POMPILVS seu αἰγά της πομπῆς à TAB. III. transvehendo, (fabulantur enim Pompilum hominē πορθμῆα a portito- a Ælian. rē, vel ut b Athenæo placer θαλασσεργόν, H.A. l. 15. ab Apolline* quod Ocyrhoën puel- c. 23. lam trajecisset, in sui nominis piscem b Athen. transmutatum) seu quod navigantes Dipn. l. 6. in alto mari ad continentem usque* Apollon. comiteretur; aliis sacer piscis, aliis Rhodius in Argon. πύμφυλα dicitur, & à c Plinio inter c Plin. H.N. l. 9. c. 29. Thunnos reputatur. Athenæus d Athen. l. c. se inquit. Rondeletius e pro eo- e Rondelet. dem, piscem squamis carentem, in Hist. in dorso varium & maculosum, in Piscium. quo à branchiis ad caudam linea magna

magna curva, à qua ad ventrem lineæ multæ transversæ interpunctæ descendunt, ducitur. pars quæ supra & inter oculos est, flavescit, aurique colorem imitatur. Cauda in unicam non divisam; neque crescentis Lunæ figura, Thynnorum & Pelamydum more, desinit.

Locus ipsis ima maris sedes est. Sæpe navigia *f* velis euntia comitantes, mira aliqua dulcedine per aliquot horarum spacia, & pascuum millia à gubernaculis non separantur, ne tridente quidem sæpius in eos jacto terri. ubi terram *g* persensere, recedunt, nec longè abesse nautis colligitur. Inimicos experiuntur Delphinos *h* sed magno horum exitio. Degustatis enim illis; continuò convelluntur, furoreque incensi, pelluntur, ad littora, esca marinis avibus futuri.

Amiam *h* seu ἰσομαίην αἰνῶς ποταμῶν, quod una cum sui generis piscibus eat; sive quod καὶ μίαν φέρειται ἀπὸ ἀγγέλων, quod non solitaria sit, sed gregatim vivat, ita dictam, *Ælian* *i* Troctam, Hispani *Bizam* quasi Bizantium, alii *Bonitam*, vocant. *Jovius* & *Salvianus* pro ea *Lechiam*, alii *Sphyrænam*, quidam illum piscem qui Hispanis *Lambugo* dicitur, perperam substituunt. Piscis est *k* Pelamydi, vel Thunno vel Scombro corporis specie, pinnis caudæ similis, cute lævi, ea parte quæ circa branchias est dempta, rostro acuto, oculis parvis auri æmulis, dentibus serratis, acutissimis, in os recurvis. branchiis opertis, ventre crasso, argenteo, rugoso, longo, ad podicem usque demisso, cuius appendices sunt innumeræ scombro-
rum appendicibus tenuiores. dorso cæruleo, & dum vivit splendens; à quo ad ventrem lineæ ductæ sunt obliquæ, nigrantes, certis intervallis à se distantes. Caudam habet tenuem, in

figuram lunæ in cornua curvatæ, in testina gracilia, epar rubescens, splendentem nigram, fel toti intestino atextum, vel ad illud porrectum *l* pari cum eo longitudine, sæpe etiam replicatum.

Degere in mari, stagnis & fluviis affe-

firmat *m* Aristoteles, & cum eo *n* Scaliger. vicinum fluviis & stagnis ob dulcem aquam & limum amare, *Oppian* *o* Pontum subire, atque ibi cum suis ducibus æstatem traducere; tum quod ibi bellæ magnæ pauciores, tum quod ob dulcium aquar. permissionem, pastus gravior, unde eor. incrementum *q* singulis diebus intelligitur, certum. Circa Provinciam in maris angustis quas insulæ frequentes efficiunt, capi, *Rondeletius* author est.

Vescuntur *r* aliquando algæ, ut plurimum carne. Audaces & celeres sunt. quin Troctam saltu valere *Ælian* loco supra citato scripsit.

Pugnam cū Delphinis apud *f* *Oppian* *pianum* eleganter descriptam invenies. idem de Troctis apud *t* *Ælian* num legitur. Captæ prostrantur, & arrosâ lineâ aufugant. Apperantur à quibusdam piscibus in escam, *Glauc*o inprimis, si Tarentino fides est.

Adhibentur *u* in cibis tanquam boni succi ad excernendum medii, sed parcè nutrientes. *Archestratus* autumnī tempore post Vergiliarum occasum, Byzantiasque inprimis commendat. procul à mari Hellepontico deteriores scribit. si vicinum *Ægei* maris tractum pertransieris, pristinā gloriam maculare invenies,

ARTICVLVS III.

De Xiphia seu Gladio.

Piscem qui à figura rostri *XIPHIAS* communiter, *σχιόλας* *Epicharmo*, à *Menandro*, *Gladius* Latinis dicitur, *Homerus* *b* *κύνα*, *Hesychius* & *Varinus* *θόγιωνέας*, alii *Thranin*, *Hermolaus* *Tomum Thurinum*, ita enim apud *Plinium* legit. fortè à *Thuriis* *Italix* oppido. *Albertus* *Militem* appellat, *Galeum* à *c* *Plinio* vocari; *Salvianus* & *Massurius* perperam oppinantur. Magnitudine interdū est insigni. Ad decē nonnunquā cubitos accedere, tradit *Rondeletius*. Delphini magnitudinē excedere, *e* *Plinius*; naviculas æquare, *f* *Strabo*. Corpus habet teres, à capite statim valdè crassū, deinde ad caudā usq; tenuius, in extremo ante caudæ exortum eminentia quædam extube-

Aristotel. de part. Animal. l. 4. c. 2. *Aristotel.* H. A. l. 2. c. 18. *ex Scalig. sect.* *Oppian.* Halieut. l. 1. *Ælian.* H. A. l. 2. c. 15. *Athen.* l. 7. *Plutarch.* in tra animal. *Ælian.* H. A. l. 1. c. 6. *TAB.* III. 6. *Rondelet.* de Piscib. *Oppian.* Halieut. l. 1. *Ælian.* H. A. l. 12. c. 53. *Archestratus* c. 8. *Plinius* c. 4. *Homer.* Odyss. m. *Plinius* c. 11. *Rondelet.* in Hist. *Plinius* c. 11. *Strabo.* l. 6.

extuberat. *Corium* caudam versus, ducta manu læve est, os versus asperum. *Squamme* sub cute latent plurimæ, *adeps* in dorso suis more residet. Utraque *maxilla* rostrata est, superior magis ossæa, durior, aliquando bicubitilis, (*Athenæus* f totius corporis magnitudini æqualem esse, scribit) inferior brevior & triangularis, plerumque illa habet se ad totam magnitudinem ut tria ad decem, ista ut unum. *Gladius* g est ferro acutior, sed extincto pisce corrumpitur. Gellius eius mucrone dura excavavit saxa. *Dentes* ipsi falsò h *Ælianus* tribuit, non admodum curvos, nec admodum inanes. Nullos enim habet, eorum loco ossa oblonga & aspera in palato resident, absumtâ in tantum gladium materiâ, quæ dentibus cedere debuerat. *Oculi* ipsi orbiculati prominentes, & ante eos foramina. *Branchia* i octonæ & duplices, *tergus* ex cinereo nigricans, & serici instar splendens. *Pellis* tenuissima, *venter* argento micans. *Fellis* vesicula intestino committitur.

f *Arhen.*
Dipnos. l. 7.

g *Oppian.*
Hæteut.
l. 2.

h *Ælian.*
H. A. l. 14.
c. 23.

i *Aristot.*
H. A.
l. 2, c. 13.

k *Plin.*
H. N.
l. 32, c. 11.

l *Ælian.*
H. A. l. 14.
c. 23.

* *Ælian.*
l. c.
m *Oppian.*
Hæteut.
l. 2, v. 509.
n *Plin.*
H. N. l.

Oppian.
l. 2, v. 509.

o *Ælian.*
H. A. l. 9.
c. 40.

Degunt in mari, & k raro adeunt littora. Copiosius verò juxta Scilæum promontorium apud Siculos & Zophyrium quod Italiæ extremum est, hodieque Spartiventum à nautis nuncupatur, capiuntur. Tribuuntur tamen ab *Æliano* l & *Danubio*, sed & in *Dania* in lacu *Sueri* nensis notissimi dicuntur.

Vittitant * piscibus, quos rostri incursum interficiunt, ne prius comedunt, quam spiculo m transfixerint.

Exortu *Caniculæ* n divexantur ab oestro seu asilo (Animal est parvum, scorpionis effigie aranei magnitudine) tantoque infestantur dolore, ut in naves sæpenumero exiliant. Balænam exhorrescunt, eamque conspicati, gladium suum in terram, aut obvium quemcunque vadi locum impingunt, sic infixo capite sese continent. Nec o tamen sua ignorare arma credendum. Utitur rostro tanquam gladio. Sæpe in mari Indico validissimas Lusitanorum naves, ad sesquipalmum aliquando perforant. Visus in mediterranea iuxta navim na-

tantem, medium rostro discidisse. Græcanicum sermonem ab Italico distinguere, illum minimè reformidare, ad hunc diffugere, *Joannes Marius Cætaneus*, qui *Locrensi* in littore *Xiphianum* piscationi interfuit, prodidit, & *Brutii* testantur.

Vfus in cibo rarus. Carne enim est arida, & difficulter concoquitur. *Archestratus Byzantinum* commendat.

ARTICVLVS IV.


De Remora & Cetorum

Duce.

DE REMORA, quæ *Echeneis*, *Remi-Taf.*
ligo, & *Nauarates*, dicitur, vix quic- IV. 3.


quam certi scribere possum, adeò Authores in diversa scinduntur, tria tamen occurrunt, descriptio, facultatis naves retinendi, & causa. Variè à veteribus describitur. Quibusdam est parvus piscis, assuetus petris. Quibusdam p eum pedes ex *Aristotele* habere opinantur, ita positâ pinnarum multitudinem. *Mutianus* muricem esse, latiore purpurâ, neque aspero, neque rotundo ore, neque in angulos prodeunte rostro, sed simplice concha, utroque latere sese colligente, quibus inhærentibus, plenam ventis stetisse navem, portantem nuncium à *Periandro*, ut castrarentur nobiles pueri, conchasque quæ id præstiterint, apud *Gnidiorum* *Venerem* coli, prodidit. *Trebius Niger* pedalem esse, & crassitudine quinque digitorum credit. Tres eo nomine celebrari, haud perperam inde colligas. Nec inter recentiores de eodem convenit. *Rondeletius* inter ignotos reponit. *Gillius* nunquam se piscem, vel piscatorem qui ipsum vidisset vidisse profitetur. *Bellonio* est totus exossis, mollis, lubricus, coloris herbacei, inferiore parte planus, dorso repandus, in gibbo convexus, limacis rubri testa carentis effigiem referens. Eidem ad spitam longitudinè & manubrii ligonis crassitiè plerumque excrescit, circa saxa in mari, sed lentè serpit, & iter cornibus præterdit, mucaginemque ut *limax* serpendo relin-

p *Plin.*
H. N.
l. 9, c. 25.




Gladus.

Schwerdtfisch. Meer Schwert.




Remora. Schiffhalter.




Myxistius


Leithen der walfisch



Serpens Marinus. Meer Schlang.




Serpens Marinus. Meer Schlang.



Conger.

Meer Aal.



7.

C partem

partem Oppiano & Aristoteli dici falsò opinatur Bellonius, Hermolao Iulus, aliis *Myssicetus* dicitur. Longus est, colore albo, capite longo, angusta cauda, si *Æliano* credimus. Aldrovandus i dodrantalem, rostro acuto, capite prælongo & plano, cauda angusta & tenui, toto corpore aspero, squammis experte, sed osseo corio recto, proponit.

Fabulosum ne id, quod Rondeletius arbitratur, an ambiguum, quod
 * Scaliger. * Scaliger, natura talem dederit, an
 ad H. A. amicitia adscribendum sit, non
 Aristot. l. 2. dispuo. *Amicitia exempla sunt Balena,*
 c. 16. *pusculus, quando prægravi superciliorum*
pondere obrutis, eius oculis, infestantia
magna vada, prænatans demonstrat, oculo-
rumque vice fungitur, apud *Plinium*
legimus. Agnitum, ore velut ancho-
ram à Balænis recipi, in faucibus dor-
mi; hoc quiescente, illas non mo-
veri, hoc gubernatore, destitutas, ad
terram delabi & perire, Plutarchus
l & m Claudianus prodidere.

l Plutarch.
 l. utra
 animal.
 m Clau-
 dian. in Eu-
 trop.

ARTICVLVS V.

De Serpente Marino.

TAB.

IV. 5. 6.

TAB. V.

I.

a Plin.

H. N. l. 32.

c. 1.

b Ælian.

H. A. l. 18.

c. 28.

c Aristot.

H. A. l. 2.

c. 15.

d Aristot.

H. A. l. 8.

c. ult.

e Plin.

H. N. l. 6.

c. 23.

f Solinus in

Polyhist.

g Arrian. in

Periplo ma-

ris rubri.

h Virgil. l. 2.

Æneid.

Serpens marinus, a Plinio *Draco*
marinus, *Æliano* *μύς* & *Hydrus*
ἄριστος dicitur.

Notabilis ipforum quibusdam lo-
 cis magnitudo. Eius sunt in Africa, ut
 boves d' insectentur, & triremes ap-
 prehenfas evertant. Circa Norve-
 giam ducentorum pedum longi visi,
 tantas aliquando supra mare spinas,
 erigentes, ut navis per unam transire
 possit, si Olao Magno credimus.
 Conspicitur in sinu Codano quidam
 flavicoloris x l. pedum, innoxius, nisi
 irritaveris. Apud insulas quas dā ante
 Persidem, vicenum cubitorum, ter-
 ruere classem. Tales in f Carmanix
 promontorium & Arabiam circa
 tres insulas e mari egrediuntur. Ba-
 races sinus g navigantibus pernicio-
 sus, quod ad eum e pelago tendenti-
 bus prægrandes & nigri serpentes oc-
 currant. Maximi cuiusdam descri-
 ptionem & in Virgilio h invenies. Is
 de quo hoc loco, terrestri similis est,

capite & corpore congrī *ἀμυρότερος*
 duntaxat, ore acutiore, si i Aristote-
 lem sequimur. Si Salvianum, habet
 dorsum subrubrum; latera subflava,
 ventrem sub albidum. Rondeletius
 eū triū cubitorū facit, corpore fulvo,
 quàm Anguilla rotundiore, colore
 quē & sceleron apud Aldrovandum
 exhibebat, capite congrī, oculis fla-
 vescentibus, ventre & rostro cine-
 reis, maxilla superiore longiore. Den-
 tes muranæ modo, sed rariores ha-
 bere, addit: pinnulas ad branchias
 veluti Anguillæ duas. A Castellero
 ad k Aldrovandum missus, colore c-
 rat congrī, sed ad cæruleum inclinā-
 te. Ore intra rubido, dentibus acu-
 tissimis instructo, sub mento apophy-
 sis barbæ modo propendebat, altera
 ad ani orificium.

Maris est incola: nec tamen *ἐν τοῖς*
σφοδρότεροις βάθεσιν, seu profundissimis; l Aristot.
 gurgitibus nascitur: Qui in aquis flu-
 viatilibus reperiuntur, Hydri sunt & c. 14. ex
 toto cælo ab istis differunt. Degit
 tamen aliquando & in terra, ut terre-
 stris m quædam species. toto ferè die
 in mari vivit, somni causa in terram
 egreditur. Vehementior est congro, si
σφοδρότερος ira placet vertere. Captus
 n atque immisus in arenam, caver-
 nam sibi rostro mira celeritate exca-
 vat.

Pugnare aliquando in Turcia tē-
 pore Bajazetis à solis ortu ad occasum
 cum terrestribus; Occisorum utrinq-
 ue octo millia numerata sunt. Aqua-
 tici concessere victoriam.

Comedi quidē potest: sed propter
 similem cum terrestri formam reji-
 citur.

ARTICVLVS VI.

De Congro & Ophidio Pli-
 nij.

TAB.

IV. 7.

Congri, qui Græcis à γῆς, quod est
πυρό; & πεδίσσι * γὰρ τῶν πολυπόδων τὰς
 * Ritters-
 πλειάντας, κόγγε & γόγγε * aliis Gryl-
 lus, quibusdam à corporis & coloris i. Habent.
 similitudine, *Anguilla marina*, dicitur, Oppian.
 duogenera; Vnum Album & pelagium, alterum Nigricans, quod haud
 rectē vel littorale vel pelagium dixe-
 ris.

a Aristot. ris. ambigit enim ut scribit *a* Aristoteles: recentiores unum duntaxat, in quo omnes notæ congruæ veteribus attributæ, reperiuntur.

** Scaliger.* Longus est & lubricus seu lævis. sæpè in quatuor aut quinque cubitorum longitudinem excrefcit. Visus ** ad Arist.* à Scaligero quem utraque manu nequiffes amplecti, ut non mirum multos in Sycyone quos homo vix ferat, aliquos plaustri magnitudine capi, *b Eudox.* Eudoxus; circa Cartejam in exterioribus locis augeri supra minarum octoginta, *c Strabo* prodiderit. Toto dorso rubet, *ventre* & lateribus pallet. Binis natat pinnis. Linea nigra in

exteriore parte membranaceæ pinnae per dorsum extensa conspicitur. *Oculi* sunt Anguillis longè majores. In extremo *roftro* duo brevia cutacea cornicula gerit. *Dentes* habet parvos pectinatim coeuntes, *branchias* utrinque binas, *pinnarum* rubent, quæ verò corpus ambit fusca est, & ad cæruleum inclinat. *Interiora* si spectes, *Gula* d ipsi exigua, qua alii pisces carent. *fellis* vesica ab epate pendens.

In nullo non *degunt* mari, fluminibus inprimis *f* vicinum si sit. nam & hos juvenes subire solent: ne de paludibus dicam, quarum illustis alumnus à Matrone *g* Parodo vocatur. In terram egredi non absonum, cum idem & de serpente marino superius dixerimus, & de Anguillis ex Aristotele colligatur. *Vescuntur* pisciculis, idèò vehementiore spirante vento, quo tempore numerosiores pisciculi mare intrant, pinguescunt.

h Oppian. *Coitus* eorum Anguillar. coitui *b* comparatur, non quod ex simili spumæ sanie in arena obruta nascantur; sed quod circumplexu mutuo supinar, partium coitum peragant, quod

i Aristot. *σοδοις & μύρροις τῶν ἑῶων* i solenne est: *Ova* * longa serie inter se protensa, pinguedine ita obducuntur, ut vix appareant. Si in ignem conjeceris, ab it in vaporem pingue; ova exiliunt, & elisa crepitant.

k Aristot. *Latent* hyeme, *k* nec, eadem, præterquam stas diebus paucis, & iisdem semper, capiuntur. *Gregales* ne sint, an solitarii ambigitur. *Causam*

l Mnesitheus præbuit. Modò gregarios esse posse dicit; modò nec inter hos nec inter illos recenset.

Inimicitias cum Polypo, Locusta, & muræna exercet. Polypum devorat. *m* Neque enim ob lævitatem ac eodem apprehendi potest. A Locusta laceratur, licet valido sit corpore. Ipse & Muræna caudas inter se prærodunt.

Vfus ipsius apud Græcos in *cibis* laudatus, inprimis si è Sicyone adferbatur, Italum tantum cæteris præcellere putabant, quantum pinguis Thynnus vilissimis coracinis. Tanti denique æstimatus, ut Nereus quidem Chius Diis eum elixasse legatur: Dorion verè opophagus, cum puer optimor. pisciū nomina dicere iussus, Congrum inter cæteros recensuisset, piscium se non Deorū nomina dicere iussisse, reposuerit; Nūc in vili admodum sunt, apud omnes, *Hispanis exceptis*, precio. Angli pusillos cum aceto & sinapi comedunt. *Congener* congris est, qui in mari circa Canibales insulas capitur. Cute intensè viridi & elegantissimè variegata, rictu patenti, & dentibus acutissimis. Caro detracta cute candidissima est; sed qualitatis adeò virulentæ, ut sæpè in mortem gustantes coniciat,

Ophidion Plinii, quem Salvianus & Bellonius cum serpente marino confundunt, quemque Tragum Oppiani quidam esse opinantur, duorum est apud Rondeletium generum. *Vnum* est barbatum, quod gemina barba à maxilla inferiore pendente instructum sit; *Alterum* imberbe & flavum, de cætero superiori simile. Bellonius palmum non excedere, pelle lubrica esse, pinnas carnosas habere, integram in gyrum caudam ambire, & multa nigredine perfundi, testatur. *Linguam* habet parvam, acutam. *Cor* trigonum ruberrimum, *hepar* ad sinistrum latus exporrectum, *stomachum* oblongum, *pylorum* permultis apophysibus circumdatum, à quo tres intestinorum revolutiones ad anum pertingunt, *lienem* rubrum, & oblongum. Cætera ad ipsos Afellos accedit.

ARTICVLVS VII.

De Muræna.

TAB.
V. 3. 4.

Muræna, quibusdam *Draco mari-*
nus, quod corporis specie serpē-
res æmuletur, Græcis *μύρινα*, *σμίρινα*
& *ξύρινα* (multæ n. dictiones quæ ab *σμ*
a *Eustach.* incipiunt, olim per *ξύ* scribebantur) a
in *Homer.* *μύριον* vel *μύριον*, quod, b præ pin-
b *Macrob.* guedine in summa aqua fluitent, & à
Saturnal. sole terrefactæ, qua curvare se ne-
queant, mergi non possunt; quod tamen de optimis quæ Latini *Flute*,
Græcis *πλωταί*, quasi navigabiles vocantur, potissimum sumi debet, quavis & *rhyades* pisces Flutas Gaza vertat, dicitur.





Externæ si attendas, ad duorum cubitorum longitudinem accedunt; circa Cartejam locis exterioribus minarum supra octoginta reperiri, c *Strabo*
Geogr. 1. 3.
d *Aristot.* H. A. l. 2.
e. 13. l. 4. de partib.
e. 13.
e *Plin.* H. N. l. 9. c. 11.
f *Plin.* H. N. l. 9.
e. 23.

Curis quæ e tenuissima diversi coloris, qui nec in omnibus sibi respondet, seu quod alius vivis sit, alius in mortuis (sanè Plinius, f in Gallia septentrionali, Murænis omnibus, in dextra maxilla septenas maculas ad formam septentrionis aureo colore fulgere, duntaxat viventibus, pariterque cum anima extinguere testatur) appareat. Mas paucioribus maculis distinguitur, & quibusdā veluti stellis cōspicitur, fæmina plurib⁹ veluti aureis guttis, quas Ovidius auratas notas dixit, variatur; g *Bellonio*; eidemque ut plurimum fulvescunt. Rondeletius colore fusco, ideò *κελαινή* ab *Oppiano* dici; *Massurius* maculis luteis & nigris; *Gillius* alium colore subnigro, luteis alium, albo nigris quasdam colore distinctas, prodidere. h *Aldrov.*
de *Piscib.* l. 3. c. 27.

loco obtinuit. *Maxillam* superiorem aquilinam in cuius extremo duæ sunt breves apophyses seu verrucæ *Oculos* magnos. *Dorsum* cultellatum, ut *Pytheas* ait, hoc est, spino acuto, & pinnulam ferè constituyente. *Pinnas* & branchias, adimitipfis i *Plinius*.
i *Plin.* H. N. l. 9. c. 20.
k *Athen.* sed malè. Quaternas enim has habent. Sed k parvas; utpote ex quaternis minutis osculis, sive foraminibus paulum modo se exferentes; seu ut l *Theophr.*
l *Dipn.* l. 7. *Aristoteles* dicit, non *διηρθρωμένας*, id est Aristot. est explicatas, sed præter alior. pi- H. A. l. 2. scium morem confusas. Illas non ad c. 13. latus sitas, neque tales ut natere possint.

Quantum ad *Interiora*, carnem habet candidissimam, sub cute obliquis & transversis ductibus disposita, variis musculis hinc & inde abeuntibus munitam, multis spinulis brevibus & recurvis conspersam. *hepar* subfulvum, oblongum, stomacho incumbens, longiusculum; *fel* Cyaneum, magnitudine avellanæ, quod *Bellonius* jecoris; m *Aristoteles* intestinis in- m *Aristot.* hærere, à jecore meatibus quibus- l. 2. *Histor.* dam dependere, scribit. Habet & lie- c. 15. nem oblongum nigricantem, stomacho annexum. *Ventriculum* longum, à cuius medio intestinum sine spiris ad anum protensius, juxtaque eum cellulæ, instar intestini coli, habentur. *Vertebres* quæ minus frequentes, sed oblongiores quàm *Anguillæ*, processus insunt transversus ac sursum spectantes præter aliorum piscium morem *Aristas Scaliger* * vocat, quæ si * *Scalig.* ad corium inversum detrahatur, cum eo A. H. l. 2. simul omnes educuntur. In Oesophagi c. 16. l. 108. qui latus, & à rictu incipit, orificio, hamuli leviter uncinati, ad gulam citra fauces spectantes, linguæ vicem supplent, ac statim à branchiis folliculus teres, spinæ incumbit, flatu turgidus, commodioris natationis usum præbens.

Vivunt quidem in mari, circa petrosa n loca; videntur tamen & flu- n *Synef.* viorum ostia petere. In Oceano ra- *Epist.* rissimæ sunt. o *Tartessus* & è Siculo p o *Clem.* freto, unde ad piscinas Romam ac- *Alex.* in cersebantur, antiquis in pretio fuere. *padagog.* minus ex *Tarsensi* & *Carpathio* mari p *Varro* de probabantur. Exeunt & in terram fre- R. R. l. 2. quenter,





q. *Arist. H.* quenter, in eademque q capiuntur.
A. l. 5. & diu, quod parvas branchias ha-
c. 10. beant, parum aquæ admittant, nec
 multum refrigerii desiderant, vivunt.

Cibus ipsis caro, ideo in petris quæ
 Channis, & Patellis plenæ domici-
 lium. Nec ab humana abstinent. Cu-
 ius * *reignarus Vedius Pollio*, Eques
 * *Plin.* Romanus, & ex amicis Augusti, inve-
H. N. l. 9. nit in hoc animali documenta sævi-
c. 23. tiæ, vivariis earum immergens da-
Tertullian. mñata servitia, non tanquam ad hoc
de pallio. feris terrarum non sufficientibus, sed
Seneca l. 1. quia in alio genere totum pariter ho-
de Clem. minem distrahi spectare non poterat.
 Cùm rabie agitantur, sævissimè per-
 sequuntur squamosos; ita verò
 morfu valent, ut partem nisi tota am-
 putetur, ab ea liberari posse neget,
 Rondeletius. In Sicilia * in summa
 * *Macro.* aqua præ pinguedine flutantur. Un-
Saturnal. de manu capi murænas flutas Papi-
l. 2. c. 11. rius apud Varronem prodidit.

De Murænæ cum vipera congres-
 su à multis r sparsa opinio. Muræna
 inquit libidinis, impetu plena, lā-
 tibulum vipæræ intrat. Vipera mas-
 stimulus concitata ad mare accedit,
 & sibilo edito amatam evocat. sic am-
 bo invicem colligantur. Falsitatem si
 discrepantia (alii marem cum vipera
 * *Plin. H.* fœmina congregi, a ii fœminam cum
N. l. 9. c. 23. viperamare produnt) non ostendit,
c. 2. at certè illud, quod Nicander famæ,
Nicand. in Plinius & Ælianus vulgo eam tri-
Theriac. buant. Andreas s apud Athenæum,
Ælian. H. quod vipera nemor. secreta amet.
A. l. 1. c. 5. nec à quoquam id observatum esse,
l. 9. c. 6. vel piscatore vel littorū ubi frequen-
Athen. l. 7. tes murænæ, accola, neget, ostendere
Oppian. l. 1. potest. Coeunt autem more t ser-
de Venat. pentum, & ova parva, eaque *de abvege*
& l. 1. Ha- seu arenacea, numerosa * & quocun-
lieut. que tandem tempore pariunt. u Mu-
Orus Ap- rænulæ recens prognatæ, celeri ado-
pol. l. 2. * *Arist. H.* lescunt incremento,
c. 111. *Arist. H.* *l. 5. c. 4.* Latitant y hyberno tempore, quo,
Isidor. l. 12. *Orig. c. 6.* paucos dies si excipias, non capiun-
f Andreas tur. Quia z pinnis carent, flexuoso
de falsò corporis impulsu *moventur.*
creditis.

Ad Ingenium & Mores pertinet,
 quod, è vivariis a egressæ piscatores
 adoriri, & è navibus in mare pronos
 a Nicand. dejicere; reti circumdatæ b macu-
 in Ther.

las appetere ipsas, conscia teretis ac
 lubrici tergi, cum multiplici flexu
 laxari donec evadant; ut hæere in
 hanc amplius devorare quàm ha-
 mum, admove reque dentibus lineas,
 atque ita erodere; infixas hamo,
 quod sunt cultellato dorso, sese inver-
 tere; cauda ictas, celerrimè exani-
 mari, capite ictas difficulter unde a-
 nimam in cauda habere certum c
 Plin. H.
 Plinio concentu & tintinnabulis, q
 N. l. 32. c. 2.
 ex fabula de viperæ sibilo natum ef-
 se credo, à piscatoribus evocari; di-
 cuntur. Docilitatis argumentum,
 L. Crassi, qui cum Cn. Domitio Cen-
 sor fuit, Muræna Inauribus d & gem-
 d Ælian. H.
 mis distincto monili ornata, tan-
 A. l. 8. c. 4.
 quam eximæ pulchritudinis puella,
 Macro-
 vocem Crassi cognoscebat, ad eum
 Satur. l. 2.
 adnatabat, & porrecta cum gaudio
 c. 1.
 accipiebat. in piscina mortuam, atra-
 Tzet-
 tus tanquam filiam luxit. Idem de
 Chil. 8.
 Antonii Drusi in villa apud Bau-
 c. 173.
 los, in parte Bajana, Muræna, di-
 Plutarch.
 citur. l. utra a-
 nimal.
 Porphy-
 l. 8. de ab-
 fin. ab a-
 nim.

Antipathiam ipsarum cum Locu-
 sta, Polypo, Ozena, Congro, Aceto,
 & Ferula notarunt authores. e Vin-
 cuntur à locustis. Ad carnes f Po-
 c Ælian.
 lyporum Ozænarum g inprimis præ-
 H. A. l. 1.
 properæ feruntur. Pugnas Ælianus
 c. 32.
 descripsit; addidit Kiranides incre-
 Foppian.
 dibile, evanescere Murænam, si cum
 Halieut.
 Locusta coquatur. Cum Congro
 l. 3. v. 190.
 sæpissimè congressam Puteolis, spe-
 g Plin. H.
 ctavit Perottus. Acetigustu præci-
 N. l. 9.
 puè h in rabiem aguntur. Licinius
 c. 30.
 Macer pinguescere iactatu, (alias
 h Plin. H.
 iactatu) fuisse non interim, easdem
 N. l. 9.
 ferulâ protinus, prodidit. Mirum
 c. 23.
 quod ex i Æliano habemus, cum i
 Ælian.
 plagam unam, acceperit torpescen-
 H. A. l. 1.
 tem persistere; sin plures inferas,
 c. 37.
 funditus ira accendi.

Summis olim apud Romanos fue-
 re in deliciis, seu ut gulæ irritamen-
 ta, seu quod diutissimè & magna co-
 pia in variis servari possent. vel
 unus C. Hirrius duodena k mil-
 k Varro de
 lia sestertia, ipsis alendis insume-
 R. R. l. 3.
 bat, & uno tempore Cæsari
 c. 17.
 vi. m. Murænarum mutuo dedis-
 Plin. H. N.
 se in pondus dicitur. nam per-
 l. 9. c. 55.
 mutare pretio vel aliâ merce noluit.

C 3 Huius

Macrob. Huius villam intra quam modicam
Satur. l. 2. quadragies piscinæ venierant. Tri-
c. 11. patinus summa cœnarum lautitia, ex
l. Plin. H. Fenestella *l* appellatur; unaque fuit
N. l. 35. Murænarum, altera Luporum, tertia
c. 12. Myxonis piscis. Heliogabalus *m* ea-
m Lam- rundem lactibus in locis mediterraneis
prid. in He- rusticos pavisse creditur, ut totum Romanum imperium perderet.
liogab.

n Macrob. Piscis *n* æstimum Liciniis Muræna-
Satur. rum nomen imposuit, ut Sergio O-
l. 2. c. 11. rata. Commendatas maximè præ-
o Horat. gnantes ex *o* Horatio potest colligi.
l. 2. ferm. sed & à lactibus summam obtinuisse
Saty. 8. carnē. Nam siue molles illar. carnes
 statuas, siue duras, opprobrium vira-
 ren non poterunt. Illæ inflationes, hæ
 cruditates difficiles concoctu pa-
 riunt. Galenus *p* tamen mediocres
 posuit, si in puro mari versentur.

p Galen. l. Reperere & in Medicina usum.
decibis bo- Nam Marcellus pellium cinerem ex
ni & mal. aceto fronti illitum, prodesse adver-
fucci. l. 3. de sus capitis dolorem prodidit.
Aliment.

ARTICVLVS VIII.

De Myro, Reverso Indico Anguilliformi & Tania.

TAB. V. *M*YRUS, seu *μυρὸς*, καὶ τὸ *μύρεν* siue
5. *μύρεσθαι*, fluere, quod præ nimia
 pinguedine mari supernatet, dicitur.
 Volaterranus, falso Plinio & Gazæ
 Oculatam, Plauto Ophthalmiam vocari scripsit. Alicubi Myrinus, sed
 perperam, *μύρεν* enim legi debet, vocatur. Siue Murænarum mas, quod
a Plin. H. a Plinius, Hesychius & alii *p*didere,
N. l. 9. ex descriptione colligetur. Aristoteles concolorem, muræna robustio-
c. 23. rem, colore piceo, dentibus intus & extra instructum prodidit. Athenæo
λεόντως seu colore leonis & *ῥύγγ* seu torquillæ, esse creditur.

b Athen. Duo eius apud Dorionem *b* gene-
Dipnos. l. 7. ra. *Nigrum*, quod Galli piscatores serpentem vocant, & *Ruffum*, quod deterius. Ille serpenti magis similis est
 quàm Murænæ, corpore nigricante, rotundo, sine maculis, sine squammis.

c Athen. Carne tenerrima, sine ullis *c* spinis.
Dipn. l. 7. *Pinnulas* habet valdè exiguas cutis substantiâ, unam à cervicis loco ad anum usque, & alteram ab ano ad

eandem, quarum ora nigra est: unicum utrinque branchiarum imperfectarum foramen, *puncta* in utroque latere aliquot aurea, quæ magis in viventibus quam mortuis apparent. *gulam* ventriculo præpositam, *intestinala* longa, rectâ ad podicem porrecta. *jecur* longum, rubescens, sine felle. *splenem* longum, tenuem.

Alter serpens rubescens Rondeletio (Dorionis Myrū *ὀπαρὲς* εντα, nō absurdè dixeris) piscis est rarissim⁹, corporibus specie serpētib. terrenis similis, colore rubro vel phæniceo, lineis obliquis & sinuosis à dorso ad ventrem ductis, eam lineam quæ à capite ad caudam protensa est, secantibus; scissura oris non admodum magna. *Dentes* habet acutos, serratos, *branchias* squammosorum piscium instar opertas. in *dorso* à capite ferè ad caudam capillamenta tenuia à sese diiuncta, in ventre similia. *Cauda* in pinnam unam desinit.

REVERSUS INDICUS Anguilliformis, inter Pelagios non squammosos. ab Aldrovando refertur, inter Galeorum genera ab Hernando. Instar Anguillæ Columbus facit, nisi grandiusculum caput haberet. Capite autem pelliculam quandam crumenæ similem gestare scribit. Si Hernandum sequimur, *d* tres spithamas *d Niremberg. Exot. Nat. l. XI. c. 18. ex Hernando.* est longus, Corio nigro, figura mirabili: vix possis divinare an natet supinus vel pronus, imo iudices, cum supinus est pronum jacere, & cum pronus supinum. Rostrum habet acutum, labrum inferius superiori longius, latius, & ad superiora contortum. Caput compressum, ac rostellum spinifero octo uncias longo, tres lato insigne, quo tuberoni & aliis piscibus adhærere solet, pinnas circa branchias quaternas, singulas, juxta ventrem & dorsum, caudam nonnihil lunatam. Vivit in Oceano Septentrionali. & piscibus vescitur. Vfuseius in piscibus capiendis, Viso fulgore aëris statim prædam deserit. *e Martyr. l. 3. Decad. Ocean.* Modus piscationis à *e* Martyre descriptus est.

TANIARUM, quæ à similitudine fasciæ & vittæ ita dicuntur, Gaza vitas

TAB. II.

5.

d Niremberg. Exot. Nat. l. XI. c. 18. ex Hernando.


e Martyr. l. 3. Decad. Ocean.

TAB.

VI.


1. 2. 3.

Tania altera.




Meer haub

Tania.




Tania Bellonij.



Tania falcata Imperati

3



Canis Carcharias

Großer Merkhund.


4



Canis Carcharias species alia


Ein ander art.
Meer oder Wallhunds.

5



Canis Carcharias. aliis

6



ras reddidit, tres apud scriptores *descriptions* sese offerunt. Vna est corpore longo, tenui, stricto, flexili; tenuitatis tantæ, ut ossa vertebrarum spinæque quibus firmatur, carne non recta, appareant. Caput ei depresso, ossibus multis constans. Oculi magni, rotundi, pupilla exigula ad branchias pinna utrinque unica ad notandum data. in prona parte villos habet ad caudam usque, in quos & cauda terminatur. Flammæ modo cum natat movetur; inde nomen Flambo à Gallis accepit. Altera corpore est priori similis, eoque argenteo, ad tres interdum cubitos excrefcit. branchiæ ei, præter quæ ad pinnas, sub maxilla inferiore duæ ruffæ eius coloris dorsi villi & cauda, maculæ in parte prona purpureæ, rotundæ, certo spacio à se distantes. Venter magnus & longus. *Intestina* sine ullis gyris. Cor *compressum*, hepar ex albo rufescens. *Lien*, & *fel* adeo parva, ut ferè visum effugiant.

Tertia Falce nuncupatur, quod falcem mesfoream referat. Est ulnam longa, palmum lata, tota in gyrum quibusdam veluti crenis ferrata, Capite deformi, ut simiam dicas oculis magnis. In lateribus linea visitur aspera. pinna in tergo unica, continua, sub rubra, duæ sub branchiis totidemque sub sterno. Polypi modo mollis est. & perfrixus vel assus in quoddam veluti gluten resolvitur. Huc pertinet Piscis, quem *Iridem marinam* non absòne dixeris. Solis quodammodo aristis & cute constat, & rubro, amethystino, cæruleo & aureo colore variat. quin rectius quàm præcedens *Tenia falcata* dicetur.

CAPUT III.

De Pelagiis Cartilagineis.

ARTICVLVS I.

De Cartilagineis in genere.

Cartilaginei pisces dicuntur, qui pro dorsi spina spinea Cartilagine habet Græci χορδράκων ολιμ dixeret; Aristoteles σελάχιον & σελάχια primus,

a à splendore cutis, ut testatur Galenus, qua noctu lucent, vocavit. Duo aplin. H. N. l. 9. c. 24. a. taliū sunt genera. Planū unū, in quo alii aspera, alii lævi cute sunt præditi; alii spinis carent, quidam iis armantur; Alterum longum & rotundum, qui Galeno γαλεοὶ & γαλεώνιοι, Aristoteli γαλεοί, γαλεοειδείς, aliquando & γαλεώδη, Σπὸ τῆς γαλῆς, id est, mustela terrestri, seu quod corporis similitudine eam referant, seu quod quædam communia habeant, inter quæ jecur adiposum, in oleū resolubile, dicuntur. Tribuitur hoc nomen & Canicularum generi, quod b Ælianus secundum & varium, Oppianus c tertium ponit, utrumque in cœno volutari, addit. b Ælian. H. A. l. I. c. 55. Magnitudo etiam minorum inter mares ultra cubitum. Spinam Cartilagineam d branchias detectas, quod cartilagine tegumenta earum constent, pinnas duplices & utrinque quid nashabere, nullo discreto adipe carni ventrive adhærescente pinguescere, ova ea specie, qua aves habere, cōmune omnibus. Locum illorum variat. Plana parte inferiore supinaque habent; oblongis in lateribus adhærent, & tegumeti loco quinque habent foramina. Cor pentagonum, jecoris, & eius gemini substantia e adipea, fel in jecore situm, appendices supra ventriculum exeuntes, Galeis propria sunt. Vulvæ, quas qui ova pariunt, in binos sinus partitas, & sub præcordiorum septo constitutas habent, ad avium naturam vergunt. ad easdem in gravidis veluti mammæ albidæ visuntur. Os supina parte esse, non omnibus convenit, in extremo quædam rostro habent. quibus ita fitum est, cibum corripere, nisi conversi resupinētur, nequeunt. sic & pisciū quos insectantur saluti, & ipsorum cōmodo cōsultuit Natura. Immodica fatietate isti interirent. illi, dum moram sese convertendo nectunt, effugiunt. Sexus duplici dignoscitur nota. Maribus bina quædam circa excrementi ostium propendent: minores iidem. Fœminæ maiores, illis destituuntur. Locum cartilagineis mare est. sed alii in pelago, alii in profundo cœno morantur. Cum pariendi tempus instat, vada & littora petunt.

Cibus

Cibus ipsi pisces, hos resupinati, ut diximus, *f* capiunt. Quantum ad *g* *Plin. H.N. l. 9. c. 24.* *Generationem*, ore parere per ram sibi *Ægyptii* persuadebant. Coitus diversus, visa ex cartilagineis nonnulla, quæ *g* averfa canum terrestrium more cohærebant. Plani qui caudam habent, non solum admotis supinis, sed etiam terga fœminarum, marium supinis superpositis, modo caudæ crassities nihil impediatur, coeunt. Quia femine non abundant, nec fœminæ suos conceptus, nec mares suū semen spargere, quod generis non vivipari pisces facere solent, visuntur. *Ova* *h* eodem tempore & superiore parte ad præcordiorū septum omnibus, cum maiora tum minora multa, & inferiore iam exclusi fœtus; diversitas inferius patebit. quod non omnia simul, sed sæpè numero ac diu edunt; interim quæ in ima matrice sunt, concoquuntur; eodē mense sæpè & parere & coire crediti sunt. Superfœtare, & senis complurimum uterum ferre mensibus, author est *i* *Aristoteles*. Ex alto terram repetunt, ubi pariant. Sic teporē captant, & proli provident. Pariunt autem vere animal. hinc partus viperino *k* similis. si quid in quibusdam differentiæ occurrit, in sequentibus dicetur. discrimen sanè ipsi pisces inter se ostendunt. senos vel ostenos, undecim interdum si *Rondeletio* credendum, fœtus suis partibus absolutos pedali longitudine diversis temporibus parere scribit *Bellonius*. per sæpè vivo emergente fœtu, ovis adhuc crudis, scatere uterum, superiorem eius partem, quæ ad septum est occupantibus, eorumque alia dextro alia sinistro matricis cornu concludi, adiicit. quod *Galei* metu insidiarum catulos devorent, his *l* evanescentibus revocent, prodidere antiqui, & ad *Ingenium* referri potest. *Antipathiam* cum *Pastinaca*, quā nihil venenatius ex mari, exercere, apud *Plinium* *m* invenies. Tanta est aviditas ipsius veneni.

Vfus Cartilagineorū in *cibus* rarus. Caro est concoctu difficilis, diuturno usu, visum hebetare, proditum à

Diphilo. Exenteratos quosdam absque sale insolari ex *Ephippo* colliges. *πρωχίμς* ipsi est.

ARTICVLVS II.

De Cartilagineis Longis.

PUNCTVM I.

De Cane Aristotelis, seu Carcharia.

*PR*imum inter Cartilagineos longos locum *Galei* seu *Musteli* inter hos *Κύων* seu *Canis*, vel quia hoc in genere *maximus*, sibi vendicat. *Galeus* hic simpliciter a *Aristoteli*; *Galeus* a *Aristot.* *Canis*; *b* *Oppiano*; *Canicula*; *c* *Plinio*; *Carcharias*, quia dentibus plurimum valet *Theophrasto*: *d* aliis *Scylla*. *Peram* *Rondeletio*, ex *Nicandri* auctoritate, *Lamia*. Nam & interpretamur, & incredibile est tantæ magnitudinis piscem, qui loricated etiam homines devoret, planis ab eo accenseri posse. Potuit *Nicæder* *Carchariam* *Lamiam* propter aliquam naturæ similitudinem vocare, & *Siculis* *Ranamarina* *Lamia* dicitur. Cete non esse, vel ex inde colligas, quod & branchias habeat, & ova concipiat.

Magnitudine *Galeos* omnes excedit. Visus mille librarum pondere mediocris. Captus, qui ad quatuor librarum millia accederet. Inventus in quodam loricated homo est. alter, curui impositus, vix à duobus equis trahi potuit. Cute aspera integitur. *Os* ipsi non in rostro, quod in mucronem exprorectū, sed supina parte est.

Caput amplissimum. *Dentes* trianguli forma, durissimi, acutissimi, utrinque serrati, seno ordine dispositi. Prioris ordinis extra prominent, & in anteriorem partem vergunt. secundi rari sunt. tertii, quarti, quinti, & sexti, in os maxima ex parte recurvi, in utraque maxilla carne molli contiguntur. quælibet maxilla duos & septuaginta comprehendit.

Oculos habet maximos rotundos; in quibus tunica cornea parte anteriore, poste-

Plutarch.
libro utraque
animal.

Tzetzes
Cheliad. l. 3. c. 126.

Plin.
H.N. l. 32. c. 2.

Tab. VI. 4. 5. 6.

Aristot. H. A. l. 5. c. 11. b
Oppian. Halient. l. 1. v. 374. c
Plin. H.N. l. 13. c. 15. d

Theophr. Hist. Plant. l. 4. c. 8. c
Plin. H.N. l. 9. c. 24.

Tab. VII. 1. 2.

posterioreque dura est, quæ humorem crystallinum involvit, telas arnarum tenuitate superat. *nervi optici* ex substantia cartilaginea & dura constant. muscoli qui eos quodammodo intra trahunt, & fixos tenent, non radicem nervorum opticorum ambiunt. sed à superiore ossis regionis oculorum parte orti, in longum extenduntur; quem situm in humanis quoque videmus. Laterum & tergoris *pinna* longè quàm in sui generis maiores sunt. binæ earum haud procul à cauda, binæ aliæ ad branchias & podicem, aliæ in medio ferè dorso. *Cauda* duabus constans pinnis cubitalem longitudinem æquat, & eius pars superior, quæ vetebis communita, altius attollitur quàm inferior, hæc crescentis lunæ figuram exprimit; quarum inter capedinem dimidia linea explere potest. *Hepar* adipatum, in duos maximos lobos dividitur. *Degit* in alto. sed ad littora refugit. Amnes nonnunquam adire, fortè dum prædam insequitur, Wottenus author est. *Vescitur* carne, & pisces adoritur ex insidiis. benè ἀρπακίτης Oppianus vocavit: quia Archestrato ἀνθρωποφάγος, carne humana delectari, facile crediderim. Pugnam cum Urinantibus apud Plinium f legimus. Cum caniculis, inquit, atrox dimicatio. Inguina & calces omnemque candorem Thunnos inprimis persequitur, & ex eorum venatione cum gregatim præter Italiam acti elabuntur, Siciliamque attingere prohibentur, pinguescit. Vidit Bellonius undecim fœtus uno *partu* edidisse, non tunicis involutos, sed umbilicali tantum in ea cum utero matris coniunctos. Caput ut in aliis animalibus primò prodibat. In *Cibis* non adeò expetuntur. Divinum quidem g Archestratus cibum vocat; & Mnesitheus iis quifacile concoquuntur annumerat; h Galenus tamen, excrementitiæ carnis esse, asserit. Facile in apparatu peccatur. Dentes argento inclusi, sub nomine dentium serpentis, dentitione juvare, & puerorum pavores arcere, vulgo creduntur. Dentifricia optima ex iis parari Rondeletius tradit.

PUNCTVM II.

De Galeo Aristotelis, & Catulis.

Quem Oppianus γαλεὸν κύνα seu TAB. Mustelum seu Galeum Canem VIII. 4. vocat, is Aristoteli simpliciter γαλεός est. Quia apud Latinos nomen non habet, poterit vel simpliciter Mustelus, aut Galeus, Mustelusve Canis vocari. Fortè est Græcorum σκυλόφαγος. Corpore est oblongo & rotundo cinereo, à podice ad extremam usq; caudam gracilescit. Centenas aliquando libras excedit; nec squammis, sed corio tegitur. Oculos habet oblongos; retrò eos bina foramina auditui inservientia, ex parte inferiore tunica enascitur, quæ, palpebræ avium modo, totum oculum operit. Os ipsi in supina parte, denticulatum, ante ipsum duo alia foramina olfactui dicata. Branchiæ utrinque quinæ detectæ, juxta quas duæ pinnae, aliæque rursus duæ supina parte enascuntur, præter has maribus duæ appendices, ex podice pendent. *Hepati* bifido & pallido, vesicula fellis subnectitur. *Splen* subrubescit. In cœnosis maris locis habitat. Ova vitellis ovorum Gallinæ similia, ex quibus fœtus, donec foras prodeant, nutriuntur, parit. Quia Carne *vescitur* gregalem ne credas. Natantes homines adoritur. In cibis plebi inservit.

CATVLI a Aristoteli γὰ σκυλίας, a Aristot. Athenæo & Oppiano σκύμνοι, aliis νε- H.A. l. 6. βείροι γαλεοί, Hinnulos vertunt nonnulli, c. 10. li, quibusdam Caniculæ dicuntur. TAB. Bellonius Nissolas Massiliensium est. VIII. se, quod albas maculas per dorsum 1. 2. 3. dispersas habeant, putat. Galli duos pro iis, Roussettes dictos ponunt. Maior ad cubitalem magnitudinem excrescere solet, interdum binos superat; Cute est adeo asperâ & durâ, ut eâ ebur perpoliri possit. Dorsu & latera subnigricant, nigerrimisq; & latissimis maculis insigniuntur. In petris & alto mari frequentius degit. hinc Saxatilis Canicula Rondeletio dicitur.

Minori cubiti aliquando magnitudo.

b Aristot.
H.A.I. 6.
c.10.

tudo, dorsum & latera subrubent, notisque viventibus, & multò quàm in maiore minoribus, consperguntur. Cutis, si à cauda sursum ad caput macrum ducas, aspera; si à capite ad caudam, minimè. Oculis, ore, branchiis, pinna, caudaque similes, ab aliis parum differunt, *Generationem* si attendas, b ova ipsis in medio matricis circa spinam hærent, aucta circûducuntur. In binos enim partita sinus matrix cum sit, atque sub præcordiorum septo constituta, in circumstantem utramque partem abscedunt. Gerunt testacea quædam, in quibus ovis specie, humor inest; quem colore & perspicuitate cornu, figurâ pulvinaribus quæ capiti dormituri supponimus, similem, facit Rondeletius: Ova nulla continguntur secundina: à venosa umbilica partē ipsis nutrimentum est. testæ facies similis tibiæ ligulis, atque in ea sunt meatus, capillamentorum tenuitate. Testa intus rupta dilapsaque foetus exit; & ex ovo vivum protruditur animal. Caro Maioris ferinum edit odorem. Uterque etiam à plebe relictur.

PUNCTUM III.

De Mustelo Lævi & Asteria.

TAB.
VIII. 6.

MUSTELVS seu Galeus LÆVIS, non à cutis Lævore, sed ut ab Acatia cui per q̃ similis est, distinguatur ita dicitur. Romæ *Pesce Columbo* vocatur. Vix ad viginti libras pervenit. Colore est albicante, *Corio* lævi, ore edentulo, dentium vicem asperæ maxillæ obtinent, foramina pro naribus habet; quibus minora sunt alia post oculos, rostro, branchiis, pinnis, caudâ, intereanisque cum Cane Galeo convenit. *Vicitat* piscibus, etsi inter gregales habeatur. De *Generatione* sic a Aristoteles. Ova in medio matricum continent, ubi circumstetere in utrumque matricis finem descendunt, & evadunt annexa per umbilicum ad matricem ani-

a Arist.
H.A.I. 6.
c.10.

malia, ita ut absumptis ovis, non alio modo quam quadrupedes foetus habere videantur. Annexus est longus umbilicus ad matricis partem inferiorem, unusquisque tanquam appensus acceptabulo. Et ad foetus medium qua jecur habet, quem si feces, intus alimentum quasi ex ovo deprehendas: etiam cum amplius ovum non est. Tamen secundæ membranæque sua cuique foetui, more quadrupedû. Foetus p initia caput in superiore parte habet, adultus autē atque perfectus devexum. In læva mares generantur, in dextra foemina, quin eadem in parte simul tum foemina, tum mas. Dissecto foetu, quot habet viscera, puta jecur, ea interius magna, & sanguine constantia, sicut in quadrupedibus. Propter duram insuavemque carnem plebi relinquitur.

GALEUS ASTERIAS, Oppiano TAB. Πονηλῶ, Æliano simpliciter γαλέ, VIII. nisi Galeos omnes maculatos vocet, 8.9. Bellonio *Mustelus stellaris*, qui etiam Oppiano *Pardalim* dici credit. Lævi mustelo internis & externis partibus est similis, cute tamen læviore. Dorsū maculæ aliæ stellarum speciem referunt, aliæ sunt rotundæ. Locum vitæ, partum, Ingenium, & Mores, communia cum cæteris habet. Itceus Galeorum optimos & tenerrimos esse opinatur.


PUNCTUM IV.

De Glaucæ Æliani & Maltha.

GLAUCUS Æliani vel ideo inter Galeos refertur, quod sit Cartilagineus, tota corporis figura cæteros Galeos referat, & parvulos periculo instante, ore hiantē excipiat, præterito, revomat. a Piscis est quatuor aut quinque cubitorum magnitudine. Cute lævi. Dorsō cæruleo *a Rondeletius Hist. Aldrov. H. Pisc. 42. 6. 37.* exsaturato, ventre candido. Rostro acuto. Ore in supina parte posito. Oculis magnis, ex quorum inferiore parte enascitur membrana candida, quæ ad oculum sursum attollitur, eisque

TAB.
VIII. 7.

Catulus maior. großer hündfisch.




Catulus.

2

Canicula Aristot.


Kleiner Meerhund.



Canis

Marinus.

3




Canicula.

4

Galeus canis



ein art der kleinen Meerhund.



Mustelus Spinar.

5


Stachelhund.



Mustelus Lewis.

6


glatt Seehund.



Galeus.

7

hündfisch




Galeus Astorianus seu stellatus Sternhund.






8

Galeus Glaucus *Galeus Stellaris* *Donatianus* Gfr.



*Canis Carcharias
dentium series.
Meerhunds gebiss.*

*Mandibula
Canis marini
des meer hunds.
gebiss.*



*Galus
Centrina. dilus.*

Sawhund.


Vulpecula Marina.

Fuchs Hund: Meerfuchs



*alipr. Galus
seu Centrina*


Sawhund. 5. ander art.



Simia Marina.



Meeraff.




Simia

marina Danica.





Meerwag.



Zigana Meerfchlegel

Zigana seu Libella

altera.



eisque veluti nubes caliginem offundit. Dentium acutor. latorum, quodammodo ferratorum, ad latera spectantium ordines sunt duo, in palato substantia fungosa & mollis, quæ supernam inferamq; oris partē replet. *lingua* crassa & aspera. Branchiæ detectæ; propè has *pinnae* duæ magnæ, ad podicem totidem minores. duæ intergore. *Cauda* ex duabus constat. superior multò longior est quàm inferior, sursumque spectat. *Interna* si attendas, videbis *ventriculū* amplissimum & longissimum; *splenem*, qui ventriculo annectitur, longum, ex multis particulis carnosus rodundisque racemi instar compactum. *Hepar* adiposum, in duos lobos dissectum, quor. alteri vesicula fellis adhæret. *Fel* viride. parte ventris infima in maribus feminis vasa in duas partes divisa, in foeminis *vulvam*, in maribus substantiam carnosam, digitali magnitudine, penis specie. *Intestina* primo sunt gracilia, dein lata, sine ullis spiris. Ex venis meseraicis rami duo oriuntur; quorum alter ad hepar, alter ad ventriculū tendit, & in multos ramos diducitur. *Cor* quoque angulatum est. Carnis humanæ avidissimus, & ad littora deambulantibus inhians. Exemplum militis cuiusdam præbuit, à quo cum calces apprehendere frustra tentasset, occisus est.

MALTHAM inter belluas marinas numerat Oppianus. Suidas cum Presti aliquando eandem facit. aliquando ab eodem distinguit, *δυσπλάγιον* belluam appellans, Rondeletius Cetaceum esse piscem, & ex Galeorum numero colligit, quod caro ipsi sit laxa, mollisque. Pinnis, cauda, internis partibus, à Cane Galeo non differt, nisi quod alba oculor. macula destituatur. Rostro est brevi, dentibus latis & acutis. *Os* habet in supina parte, non multum infra rostrum. *dentium* multos ordines.

PUNCTUM V.

De *Vulpecula marina*, &
Galeo Acanthea.

Piscis, qui Græcis ἀλώπηξ, Oppiano TAB. VII. 3. *ἀλωπηκίας γαλέος*, Bellonio *Simia marina* Latinis *vulpecula marina*, vel à caudæ a longitudine, vel insuavi b ingratoque gustu, vel ab c astu ingenioque, nomen sortitus esse videatur. Distinguitur ne ab d Archestrati vulpecula, quam circa Rhodum lapidissimam, & alio nomine *κύνα πύονα*, id est canem pinguem appellari scribit; an cum eo sit eadem, ignoro. Piscis est aliquando ad centenas libras excrecens. Cum Cane Galeo, oculis, foraminibus auditui, & olfactui inservientibus, & branchiis conveniens. Crassior & brevior. Cute testus. Dorsum habet cineraceum, ventrem candidum, *caudam* falcatam, & quodammodo ensi formem, quæ magnitudine reliquum corpus superat, & in cuius exortu pinna conspicitur, Rondeletius ita eam exprimit, ac si ex binis pinnis constaret, quarum illa, quæ sursum abit, toto corpore longior est, altera decuplo minor. Pinnas ad branchias & anum quam in dorso longiores. Ventriculū amplum. *intestina* lata, jecur pallidum & in duas fibras divisum. Iconem apud Aldrovandum vide. nos hicalterius cuiusdam subiicimus. *Locis*, in marigaudet cœnosis à littoribus magis remotis. Pisces etiam grandiores pro cibo. In *Conceptu* & partu spinacem imitatur. Sobolem metu periculi intro recipere, præterlapsa emittere, Rondeletius oculatus testis est. *Cauda*, longitudo ob mollitiem quæ in tenellis facillimè e Plin. flectitur, impedit. *Hamo* e de H.N. l. 9. vorato glutunt amplius ad infima c. 43. lineæ, quæ facile prærodunt. Caro Oppian. Halieut. virus resipit. l. 1. v. 381. l. 3. v. 144.

GALEUS ACANTHIAS Gazæ Mu- TAB. VIII. 5.
stelus Spinax; Scaligero *Mustelus Spinus* est,

est, *Æliano Centrines* nomine venit. Nunquam viginti libras implet. Corpus sensim gracilescit. Dorsum cinereum apparet, venter albicat. Rondeletius in mari argenteo colore esse, cum exspiravit ex cinereo rubescere, author est. *Rostrum* ipsi primò latum, mox in acutum desinens. Retro oculos, qui mediocres, bina foramina auditui dicantur. Ante os, quod in supina parte, & dentibus validissimis armatur, bina alia olfactui inserviunt. Branchiæ à lateribus utrinque quinæ & detectæ, *Pinna* duæ natatui destinatæ branchias sequuntur; in parte supina nullæ sunt, præterquam expodicis utraque parte, quæ in fœmina minores, in mare maiores sunt. hac nota, quia in cæteris omnibus Galeis inter podicem & caudam, imo ventri singularis commissa conspicitur, ab aliis, ut mas appendicibus parvis, quas illic obtinet, à fœmina, distinguitur. Utraque in dorso pinna, aculeum longum, triangularem magis, quàm rotundum annexum habet. *Cauda* est gemina, superiore parte longior, inferiore brevior. *Splen* in duos lobos dividitur. Cæteris partibus cum aliis convenit. *Locus* ipsi cœnosa maris receptacula, flumina nunquam subit: nec in Euripo Pyrrhæo reperitur. In septo præcordiorum supra mammæ *ova* continere; ubi ovum descendit atque absolutum fuerit, in eo catulum fieri, author est *f* Aristoteles. Sex in ventre fœtus perfectos observatos, multis aliis ovis non exclusis, pendentes, qui ex ovis per venam umbilicalem excludantur. Ova nullo vinculo alligata esse, observavit Rondeletius. Ex ovis alimentum trahere, donec perfecti foras emittantur, haud malè colligi potest. *Gregalem* esse, quod multi simul capiantur, certum est. Quod fœtus suos nec recipere, nec emittere possit, *g* spinæ faciunt. Carne est dura & insipida; minus tamen quàm vulpecularius respicit.

f Aristot.
Hist. A. l. 6.
c. 8.
I. Scaliger.

g Arist.
H. A. l. 6.
c. 10.

PUNCTUM VI.

De Centrine.

NOMINE CENTRINES, * *Ælianus* TAB. VII. 4. 5.
Mustelos aculeis præditos intelligit, cum duo Canum genera, in Galeos & Centrinas dispescit: nos eum intelligimus, quem *a* Aristoteles *πναγλεόν*, *νωπίδανον*, esse, *b* Athenæus ab Epæneto *ἑπνωπίδεα* vocari, docet. Romæ & tota Italia *Pesce Porco* dicitur. Plinius nusquam eius meminit, nec apud Aristotelem quicquam invenias, quamvis scriptisse Athenæus prodiderit. Quantum ad descriptionem brevis est, crassus & spissus, à capite ad podicem *trianguli* figura. *Cute* integitur asperriam, brevibus crebrisque aculeis horrida, qui in capite & dorso robustiores sunt, colore ex cinereo nigricante. *Caput* habet exiguum & depressum. *Oculos* splendentes, post eos duo foramina auditui destinata, duo supina rostri parte pro naribus conspiciuntur. *Caput* supina parte, rotundum, magnum, semper ferè hians. *Dentes* latos, acutos, quorum in superiori maxilla triplex, in inferiori simplex ordo est. Branchias utrinque in lateribus quinque, eademq; detectas. *Pinna* prior à capite statim enascens, aculeo longo & ad caput sese inclinante armata, cristæ instar multum surrigitur, quæ è podicis regione minor, minore & ad caudam vergente aculeo, instructa est. In caudam & podicis pinnas, imo ventri, nulla alia pinnula subnectitur, quod ei cum *Acanthia* commune. *Cauda* in pinnam inferiore parte latam, superiore parte in acutum angulum desinentem degenerat. In partibus internis, ventriculus est oblongus crassus. *intestina* haud multis gyris reflexa. *Hepar* præpingue, magnum, in duos lobos ad infimam ferè usque ventris sedem extensos divisum, albicat. *Locus* ipsi in cœnosis pelagi domiciliis potius quàm littore; ideò varius capitur.

Ova

Ova primum in se gignit numerosissima, vitellis gallinaceorum ovorum similia. animal reliquorum cartilagineorum more excludit. Venenum fundere ex *c* Oppiano discimus. quos ille *κέντησιν ἐπονύμους* vocat, hoc *κέντησιν* vocari, vetus scholiastes adscripsit. Vix aliquis eius in *cibus* usus. nerveâ potius quam carneâ substantia constat. In *Medicina* oleum ex hepate frixo collectum, ad duritiem humani hepatis emolliendam conferre, & articulorum dolores lenire ex Rondeletio habeo. Cinis urinas vehementer movet.

PUNCTUM VII.

De Simia marina, & Zy-
gena.

TAB. VII. 6. *S*IMIARUM MARINARUM duas habemus descriptiones a *Æliano* est bellua in mari rubro, cartilaginea, terrestri tum tum colore tum facile similis; in hoc differt, quod variè distinguatur, cervicemque & branchias ruffas habeat. Tegmen corporis testudinis involutum est. Cum natat, volare videtur. *b* Gesnerus piscem sibi ex Dania allatum scribit, coloris corpore toto viridis, dorso magis fusci, ad latera pallidi. *Os* sinum habebat. *pinnas* tanquam volans extendebat, & inter duas in dorso *pinnas* aculeum retrò tendebat. branchiarum foramina quina apparebant, obliquo inter os & oculos descensu. Testudineum involutum si accessisset, *Æliani* simiam fecisset.

TAB. VII. 8.9. *ZYGÆNA* piscis monstrosus, à capitis figura, qua *πύγρον* imitatur, quo transversum librile, ex quo lances dependent significatur, nomen obtinuit.

GAZA Libellam vertit. Massilienses piscem Judæum à similitudine tegmenti capitis, quo olim Judæi in provincia utebantur, dicunt. Galenus, *Ælianus*, *Oppianus* & eosque secutus *Suidas*, cetis annumerant. Galeis, quia multa cum

illis communia habet, haud male subnectitur. Corio tegitur. Ventre est albo, dorso cinereo, pro spinis cartilagineas obtinet. *Cervicem* & *gulam* habere scripsit Rondeletius. *Os* ipsi non rotundum, non rostratum, nec in latera compressum; sed in ea extensum, atque transversum habet. Pars frontis anterior, quæ utroque oculo, magno, & deorsum potius quam sursum vel ad latera vergente, clauditur, in semicirculum ferè extuberrat, & sic in aciem acuitur, ut obvios pisces secare posse credatur. *Os* subtus, inferiore parte, per magnum, dentibus validis sinus planis, in latus ferræ modò vergentibus, triplici vel quadruplici ordine digestis armatum, latet. *Lingua* lata, humanæ haud absumilis. *branchie* utrinque quinquæ & detectæ. *Pinnas* icon ostendit. in dorso nullam esse tradit Rondeletius. *Cauda* duabus inæqualibus pinnis constat, quarum superior vertebris fulcitur, ac multo longior est; inferior vertebris caret, & brevior extat. *Versatur* d in profundo. Pisces obvios, d *Ælian.* & homines natantes frontis suæ a *H.A.I.10.* cie subvertit, & Leoni quod ad vires, c. 2. ab Oppiano e opponitur. Occursus *Oppian. l.1.* eius olim, navigantibus f inausustus v 367. habebatur. c *Oppian.* l 5. v. 37.

Ab ista *ZYGÆNA* plurimum ille f *Ælian.* differt, qui ventre candicante, ore l. c. miniacei coloris, cætera niger esse, scribitur.

PUNCTUM VIII.

De Mola Salviani, seu Or-
thragorisco Rondeletij.

TAB. IX. 1.2. *M*ONSTROSO pisci monstrosiorem subijcimus, sed & istum toto corpore cartilagineum. *Mola* quibusdam, seu quod informem molam referat, seu quod retunditate corporis molæ molendinariæ similis sit, ut Rondeletio placet, dicitur. Apud Massilienses, *Luna*, vel quod extrema corporis parte, quæ pinnis subest, crescentis figurâ referat, vel q̄ demptis pinnis toto corpore plenæ instar sit,

D 3 vel

a *Ælian.*
H.A.I. 15.
c. 4.
b *Plin.*
H.N. l. 32.
c. 2.
c *Aldrov.*
de Piscib.
l. 3. c. 44.

vel quod corporis extremū in cornua curvatæ respondeat, vel deniq; quod noctu splendeat, vocatur. sed cave pro a *Ælian* ifumas. Porcum, quem *Lacedæmonij Orthragoriscum* vocant, quemque b *Appion* maximum piscium esse, & cum capitur grunnire, credit *Rondeletius*, nec abludit cōparatio. Nec c longus, nec planus est, sed in latera comprimitur. brevis adeò, ut solum caput potius quàm piscem repræsentare videatur. Centenas sæpè libras superat. Cute tegitur asperâ nō secus ac *Squatina*, argentei coloris, ventre est subalbido, dorso cineraceo. Os habet exiguum. dentes tantum geminos, utramque universam oris partem munientes, quorum inferior retusior, superior magis acutus ac secans est, latos continuosque *Rondeletius* facit. Oculos parvos ac orbiculares. De branchiis ita *Salvianus*. Branchiarum internum orificium utrinque, unum est parvum & semicirculare, prope quod etiam utrinque pinna una parva & rotunda sita est, quæ alia prorsus ratione quam aliorum piscium laterales pinnæ, moventur. Cum enim illæ in piscibus à cauda ad caput, in hoc nostro à dorso in imum ventrem deducuntur. In extremo præterea dorso propè caudam alia multò major pinna, non rotunda sed sublonga erigitur: è cuius regione altera eiusdem magnitudinis & figuræ imo ventri statim ab ano subest, quæ alio etiam modo quàm dorfi & ventris aliarum piscium pinnæ mobiles sunt. Non enim ut illæ à cauda ad caput eriguntur, & à capite ad caudam inclinantur, sed in utrumq; latus moventur.

In caudam carneam non degenerat: nam postrema eius æquè ac latera lata sunt: pinnata tamen cauda, non oblonga sed lata, atque omnem postremam piscis partem amplexante, in latereque mobili munitur. Crescentis lunæ figuram referre; superiore parte articulatam esse, ut tam in dextrum,

quam in sinistrum moveatur, *Rondeletius* addidit.

Quantum ad *Interna*, quæ ob corporis rotunditatem conglobata sunt, Carne est candidissima, nerveam potius, quàm carneam substantiam præ se ferente. Cocta gluten ex tergoribus boum confectum refert. Adipe ut in porco, multo carni corium firmissimè adhæret, & difficillimè avellitur. Iecur habet pallidum, magnum, & tenerimum, dum coquitur in densam pinguedinem faceffit. Noctō ex internis partibus cæruleus è longinquo splendor, imò ignis splendidissimus enitet. Grunnire dum capitur, dicitur. Pinguedo eius est multa & candidissima; liquefacta, lucernis inservit, solo pisculento odore molesta. Speciem aliam *Gallus* quidam *Venetis* descripsit. Iconem exhibeo. Forma, inquit, in orbem vergebat. Corio sine squammis, &c.

An huc Piscis *Cadamusti* suem referens dolium crassitudine, duo longitudine superans, formæ obrotundæ, suilla cute, Oculis parvis, edentulus, loripes, branchiis brachii mensuram excedentibus, cauda longa, & lata spectet, aliis iudicandum relinquo.

ARTICVLVS III.

De Cartilagineis planis.

PUNCTUM I.



De Torpedine.

Ab solutis Cartilagineis longis, TAB. IX. Ad Planos progredimur, prius occurrit *Torpedo*, quæ veteribus Græcis *νάρκη* & *νάρκη*, ad differentiam affectus, *θαλασσία*; modernis *τρυπάνια*, & *Margotir*, Alber-
10 *Stupefactor*; mixto barbaris, *Torpigo*, *Terpigo*, *Stupor*, *stupefaciens* & *stupefcor*, dicitur. Ex Cartilagineis planis esse,

ex

Mola Peregina.



Mola Zitterfisch



Torpedo maculosa
gefleckte Zitterfisch



Torpedo.

Zitterfisch.



Torpedo.

Torpedo.




Aquila.


Adlerfisch.

Rajinaca.

Angel fisch.
Meer angel.




Meer adler



Aquila spe
cies alia.

Meer Adlers. ander art.



ex *a* Aristotele & Plinio habemus. Lævem, apud *b* Athenæum legitur. Corruptus Aristotelis *c* locus ex quo colligitur spinosa. nec vacat errore *d* Cardanus. Duo olim ipsius genera. *Nigrum* quod ad capitis dolorē commendatur, & subruſſum, ſeu ad rubricæ colorem accedens. In *Maculoſas*, & *Non maculoſas* optimè diſpeſcuntur. Tria illarum genera. *Macula* in quibuſdam diverſarum figurarum & albicantes, huc & illuc ſparguntur, in quibuſdam quina rotundæ, nigricantes, pentagoni figurâ locatæ, oculos tam egregiè repræſentant, ut Oculatam Plinius dixerit; benè dictum Bellonius defendit. Omnium corpus ſi caudam exceperis orbiculare eſt, ſenas libras vix excedunt, molli & lubrica cute reguntur. Venter eſt ſubalbidus, *dorſum* ſubflavum, & ad rubricæ fabrilis colorem accedens, partes quæ ad caudam mediis corpulentiores apparent. hæ *cartilaginem* quandam tabidam in ſeipſis habere videntur. *Ore* ſunt in ſupina parte parvo, ante quod foramina duo odores deferunt, dentibus minutis & ſerratis. Oculis in ſuperiore parte antèrius exiguis, quos retrò foramina duo, ipſis grandiora, patula, & in palatum pervia. Cerebro non carent. *Lingua* deſtituuntur: *Branchia* in medio ſunt corpore (ob ipſius tenuitatem ad latera locari non poterant) utrinque quina & detectæ, quarum oriſcia parva & ſemicircularia, tenui quadam cuticula conteguntur: *pinna* juxta caudam duæ; pro reliquis latitudine utuntur, & utroque ſui corporis ſemicirculo quaſi pinnis natant, poſtex in caudæ exortu, ipſa brevis & latiuſcula. *Intus* Carnoſum habent ventriculum: *intestinum* breve & amplum. *hepar* pallidum, & in duos lobos diviſum. *Fellis veſica* illaque magna hepatis committitur & dextrò annexa lobo, in ſiniſtrum quoque venulas quaſdam immittit. *Lien* eſt parvus & ſub rubens. Uterus oblongus & bifidus. *Habitant e* in mari, locis cœnoſis. reperiuntur & in *f* Nilo. ut haud male in *Marinas*

etiam & Fluviales, diſtinxeris Piſcibus *veſcuntur*, quoaſtu, ut poſt dicam, capiunt. *Pariunt* circa æquinoctium, & quidem ova intra ſe præmollia, quæ in alium locum ulterius transferunt, & excludunt. Sic animal pariunt, ova concipiunt. Oetogenos fœtus habens, inventa eſt. Hyeme propter frigus in terra *latent*. Latitudine ſua quaſi geminis pinnis *feruntur*, natant ſed ægrè, nam *h* *Oppian.* *νατὴς βαρύνται βαρύνονται*, *pigra tarditate* *Hal. l. 2.* *gravantur*, ideò *βελὴν κεραλέην καὶ πολυμήχανον* Natura conceſſit. Singularis ipſis torporem vel tremorem inferendi, unde nomen habent, facultas. Merſæ in *i* limo ſe occultant *i* *Plin. H.* & piſces, qui ſecuri ſupernatantes obtorpuere, corripunt. Idem *κ* *procul & è longinquo*, vel ſi haſta virgave attingantur, quamvis prævalidos lacertos, torpidos, & quamlibet ad curſum veloces pedes, aligatos reddunt. Et illi qui, rete, in quo una ex iis capta fuerit, attigerint, torporem patiuntur, quod *l* *Æliani fide dictum ſit*: & ſi inter mortuos piſces vivens Torpedo ſeſe moveat, qui tacti fuerint, interno quodam motu cientur, ut videantur vivere, quod Godignus de rebus Abyſſinis prodidit. In torone corpore, quod *m* *Diphilus*, *n* *Oppianus* & *Cardanus* prodidere, incertum. Exiguam plerarumque, quæque quavis corporis excitatione reſellatur; nectorum corpus inſeſtantem, *Gillii* & *Kircheri* experienciâ docemur, ut vel inde *Albertum*, qui hoc veneno hominem interfici prodidit, reſellere liceat. Cauſam in cæcam facultatem, quod mortua eadem deſtituitur, conjecere alii; in narceticam *o* & inſenſibilem qualitatem, nervis & maſculis contrariam alii. *Uſus* Torpedinis in *cibus* commendatus *p* à *Galeno* & aliis, quod carnem mollem, jucundam, & mediocriter per ventrem ſubeuntem habeat; à *Diphilo* & aliis reſectus eſt. Partes duntaxat quæ circa caput laudantur, Venetiis ne in foro

Oppian.
l. c. Hal. v.
104.
f Athen.
Dipn. l. 7.

m Athen.
Dipn. l. 7.
n Oppian.
Hal. l. 22.
v. 55.
o Kirchnerus l. 3.
Magnet.
artisp. 6.
l. 4.
p Galen.
l. 3. de A.
lim.

qDiosco-
rid.l.2.
mater.
medi.
c.17.

Plin.H.N.
l.32.c.10.

foro piscario vendatur, præfecti sanitatis auctoritate cautum est. Genuæ, Massiliæ, & alibi à tenuiore fortuna expetitur. In *Medicina* diuturnis caput q doloribus admovetur: & sedem prociduum coercet. idem apud Marcellum Empiricum invenies. fortè & arthriticos demuleat; eodemque modo Anteroëa Cæsaris libertum supra fidem podagram curasse, Scribonius Largus testatur. & Diaturpænos ceratum apud Æginetam ad podagram habemus. Mirum, si verum, quod ea Plinius. si capiatur cum Luna in libra fuerit, triduoque asservetur sub dio, facilis partus facere postea, quoties inferatur. fortè quòd velut induciis dolorum datis, natura ad excludendum fœtum firmatur. Corium nuper decorticatæ, si parti matricis prolapsæ involvatur, ipsam reducere, Aëtius ex aliis habuit.

PUNCTUM II.

De *Pastinaca marina*.

TAB.
IX. 7.

QUEM Græci *πρυγίον*, seu ut D. Ambrosius vertit, *Turturem*, ab alarum expansarum similitudine vocant, is Latinis *Pastinaca marina*, seu à colore, seu quod radio suo ceu pastino instrumento fossorio fodiat & pungat: Gallis *Raja*, ob similitudinem quam cum *Rai* habet, dicitur. Duas eius species Bellonius & Rondeletius agnovere. hic capite tantum & rostro differre ait: ille in *levem*, cuius cutis perpolita, dorsum liver in corticis platani modum, venter albicat, plurimis velut striis, per carnem hinc inde deductis; & *Asperam*, quæ tota aculeis horret, atque ad caudam præsertim permultis uncinis in gyrum dispositis scatet; dispescit. Magnitudine vix denas libras superant. Corpora sunt quadrilatera, ventre albicant, dorso livent. Superiore parte aliquod capitis vestigium antè cernitur, capiti palustris ranæ non absimile: in eo non nisi oculi oblongi & grandiusculi, à quibus fora-

mina bina, oculis maiora, semper patula, in palatum deducuntur, pars oculis anterior in rostrum carnosum acuitur. Os habet parvum & edentulum, (mendum in Dioscoride, si dentes habere innuit) solaque maxillæ asperitate illorum vice utitur. *Pinnis* carent circa caudæ exortum unam orbicularem si excipias, idè latitudine sua * natant. *Branchias* in medio ferè ventre quinquæ, in partibus flaccidis & carne vacuis, (partes circa caudam mediis partibus carnosiores habere, cartilagineis planis commune est,) sitæ sint. Caudam habent longissimam, spinosam, muris caudæ persimilem, Crassa primum, paulatim in magnam tenuitatem stringitur, super eam, in medio ferè aculeus, osseus, longus, acutissimus, & ferratus, quincunciali magnitudine, Dioscoridi *κέντρον*, Horo Apollini *ἀκανθα*, Plinio radius eminet.

Quantum ad interiora, Ventriculū habet parvum, augustum, cui, quia satis ab ore dissitus est, *stomachus* præponitur: idem in ecphysin à qua breve & gracile intestinum dependet, quod aliud initio angustius, mox sensim latius, dein priusquam maximè dilaretur, angustum postremum in rectum intestinum desinens, & unde excrementa porracei coloris rejiciuntur, desinit. *Iecur* amplum, ex albo flavescens, in duos lobos, quorum dexter latior & maior, sinister brevior & minor, divisum. *Fel* hepati adnexum, ex viridi flavescens. Uterum oblongum, quo ova continentur.

Degunt in cœnosis maris locis. Carnibus vescuntur * & latrocinantur * ex occulto, transeuntes radio (quod telum est eis) figentes; nec quæquam * attingunt, nisi telo suo vulneratum.

Ex insidiis venari, quod Mugilem velocissimum piscem assequantur, argumento esse potest. Coeunt ut *Rajæ*, admotis invicem non solum partibus supinis, sed etiam tergo fœminarum supinis marium, superpositis. Fœtus aliorum cartilagineorum more non recipiunt. Enim

* Arist.

H.A.l.1.

a c.5.

a Galen.

l.3. Ali-

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

ment.

enim acuties caudæ phibet. *Volatum*
d quoq; exercere, falsò apud *Ælia-*
H.A.l.8. num dicitur: sed *e* radii sui veneno
c.26. se tueri, tam certum, quam Musicæ
e *Ælian.* dictæ & saltationibus *f* delectari;
H.A.l.9. ambiguum videtur. De ejusdem radij
c.40. venenositate non est quod dubite-
f *Idem l.1.* mus. Nullum usquam execrabilius,
c.30.l.17. arbores, infixus radici, necat, arma,
c.18. ut telum perforat, vis ferri & veneni
 malo, non tamen, ut nulli remedio,
 quod *Ælianus g* prodidit, succum-
g *Ælian.* bat; & necesse fuerit *h* Leonidam.
l.1.c.56. Bysantium ictum occumbere. Bene
h *Ælian.* radii cinis cum aceto vulnere admo-
l.2.c.50. veretur, feliciter furfures in eodem
 cocti auxiliantur. Lauri decoctum,
 Theriaca Andromachi, Galeus, cum
 quo inimicitias gerit, haud frustra
 adhibita. Cauda, quæ idem intulit,
 in arborem, quercum inprimis, infi-
 xa, aut de eadem suspensa, emarci-
 dam eandem evadere, sanari ægrum,
 Aëtius prodidit. De *Vsu in cibo*, ne
 falsò *i* Galenus mollem & jucun-
i *Galén.* dam carnem eius faciat, vehemen-
l.3.Alim. ter metuo, gustus in suavem & feru-
 num quid respicientem, testatur. In
k *Diosco-* *Medicina* mitigat *k* dentium dolores
rid.Mat. radius, quos frangit & extrahit,
Med.l.2. Torreri eum, mox conteri resina-
c.22. que excipi, debere, apud Celsum le-
 gimus.

PUNCTUM III.

De Aquila.

TAB. *Q*uid per Aquilam piscem, seu
IX. 8.9. *æteru* veteres voluerint, difficul-
a *Plin.* ter sciri potest, planum *a* duntaxat,
H.N.l.9. & cartilagineum, animalque pa-
c.24. rere, ab omnibus proditum est, ra-
 dium aliquem in cauda habuerit,
 nec ne, reticere. Non mirum i-
 taque in diversa recentiores tra-
 hi, & unam à Salviano, quam Ron-
 deletius alteram Pastinacæ spe-
 ciem facit, duas ab Aldrovando,
 monstrosam à Bellonio & Paræo
 describi, *Salvianiana* magnitudine
 trecentas libras non superat. Læ-
 vi & molli cute tegitur, inferiore

parte alba, superiore livida. *Caput*
 habet exertum, capiti bufonis simili-
 mum: oculos magnos, rotundos &
 prominentes, post quos bina, ma-
 gna, & patula foramina insculpta
 sunt. *Os* supina parte mediocre &
 denticulatum. *Latera*, quæ acu-
 ta, expansas volantis Aquilæ alas
 æmulantur. In caudæ exortu u-
 trinque una parte & rotunda pin-
 na exoritur, in *maribus* ex utroque
 podicis latere, una appendix pen-
 det. Cauda pastinacæ tenuior &
 longior; in dorso paulo post prin-
 cipium pinnatam unam erigit, at-
 que hac deinceps *aculeus* offeus,
 longus, acutissimus atque serratus,
 eminet. *Intra*, Jecur est subflavum,
 lien subater. Aldrovandi *prior* vi-
 detur *ἀνέφαλ*, latissimis alis, qua
 corpori hærent cæruleis, in ex-
 tremirate rubris. *Alter*a supra o-
 culos & in fronte aculeata est, in
 cauda binos gerit radios. Cænosa
 hipfices in mari loca incolunt, re-
 supinati piscibus aliis vescuntur,
 quos ex occulto figunt. Vivos fœ-
 tus cartilagineorum more pariunt.
 Radio lædunt, ideò publicè cum
 eo non divenduntur. Caro quia
 tetrum & gravem spirat odorem, à
 mensis exulat. Quæ de lapide in
 capite eius à Kiranide scribuntur,
 fabulosa sunt. Bellonii verè monstro-
 sus est, descripsit eum Gesnerus. *TAB.*
XII. 2. Piscis hic rarus (inquit) & ignotus
 omnibus, & Paræus volantem facit,
 rostro viridi.

PUNCTUM IV.

De Raijs in genere.

R Ajarum nomen fortè à radendo *TAB.X.*
 Latini sumere. Græci à qua-
 12.
 dam cum rubo similitudine, sunt
 dorso asperæ, ut recurvas supina par-
 te rubus, spinas gerit; *βάρν* marem,
 fœminam *βαλίδæ* dixere. Plinius *a* *Plin. H.*
N.l.23. Græco vocabulo utitur. Ex cartila-
 gineis *b* & planis esse nullum du-
 bium. Albertus in pectinum ge-
 nere posuit. Tria verò illarum
c.13.
 E apud

apud antiquos *genera*. *πάτων* unum
 Plin. H. N. simpliciter, *λειόβατον* Alterum Aristo-
 I. 9. c. 24. teles & Galenus vocavere, *stellatū* A-
 thenæus addidit. Rondeletius post-
 quam in *leves* & *asperas* easdem divi-
 fissit, mox stellulis notatas, iisque ca-
 rentes addidit; & ex *asperis*, alias mo-
 dicè tactum vellicante lanugine, a-
 lias robustis sed raris aculeis; quas-
 dam robustissimis & densissimis aspe-
 rari dixit. Magnitudine inter se diffe-
 runt, bicubitales aliquando Salvia-
 nus vidit, haud minores c Aegolico
 c. 4. clypeo in India nasci, Ælianus pro-
 didit. Cuticulari teguntur operi-
 mento, omnibus membranula, quam
 nebulam vocant, *oculus* obtenditur,
 juxta oculos foramina sunt magna
 ampla, ad oris usque intima patentia,
 quibus operculum interiore parte à
 natura additum est. Ore aperto
 dilatantur, clauso magna ex parte oc-
 cluduntur. *Cauda* omnibus proce-
 ra atque aspera, in eius dorso duæ
 pinnulæ, totidemque, sed exiguæ &
 orbiculares ad ejusdem exortum.
 Quod cartilaginei generis plana,
 pinnis destitui scripsit Aristoteles, il-
 las quibus natâdo corpus impellunt,
 intellexit, quæ ad caudam, dirigendi
 itineris gratia data sunt. Si quid in
 contrarium apud eum occurrit, men-
 dum in causa; *πάτων* pro *πάτων* le-
 gendum est. *Interiora* si lustremus,
fellis omnibus in hepate vesica. *Splen*
 in verticuli plexu; intestina crassa; in
 ecphyfi & recti intestini extremo an-
 gusta, genitale vitulæ marinæ simile.
 TAB. Circulariores ex exsiccatis Draconū
 XII. 1. & Basiliscorum figuras effecerunt, sic
 plebeculæ imponunt.

Commoda Raiis in cœnosis maris
 locis, non procul à littore *habitatio*.
 Hyeme latent, & quia numerosæ ca-
 piuntur, gregales haud malè colli-
 gas.

Coëunt d non tantum ad motis in-
 vicem partibus supinis, sed etiam ter-
 go sceminarum supinis mariū super-
 positis, nec inter suum duntaxat ge-
 nus consistunt. Cum Squatina quoq;
coire scripsit Aristoteles. Gerunt ute-
 ro testacea quædam, testa tibi-
 arum ligulis similis est. Pariunt animal, cum

primum ova intra se pepererint. *Ova* TAB.
 quæ flava, sine testa primum in supe- XII. 4.
 riore vulvæ conspiciuntur, quædam
 magnitudinem ovorum gallinæ æ-
 quant, alia his minora, nonnulla cice-
 ris magnitudinem nō excedunt, plu-
 racentenis in singulis aliquando nu-
 merantur. Quæ à perfectione prop-
 rius absunt, in inferiorem matricis
 partem dimissa, testâ, & in qua albu-
 men & ovum continentur, operiun-
 tur, quadrati formia hæc, demptis an-
 gulorum, quæ variæ sunt appendici-
 bus. Unius lateris appendices lon-
 giores, sunt foliis gladioli herbæ si-
 miles; alterius, breviores, latiores,
 replicatæ, quibus undique summotis,
 laterum anguli, tibi- arum repræsen-
 tant ligulas. Unū aut ad summū duo
 pariunt, quod maximus earum in ma-
 tri proventus, infinita ovorum in supe-
 riore vulvæ parte series facit, ex qui-
 bus tempore perfectis, iterati fœtus
 excluduntur. Abditas, pinnas exertas
 movere specie vermiculorū, allapfos
 ad eas pisciculos capere, sic tardita-
 tem motu astu compensare c Plinius
 e Plin. H. author est. Aristoteles radiolos vo- N. l. 9.
 cat. Mendum tamen hisce locis sub- c. 42.
 esse, suspicio est, cum nec pinnas nec
 radiolos habeant, vel pinnas Plinius
 improprie vocavit, & radiolis ab A-
 ristotele tributum, quod rostri acu-
 mini cōpetere viderit. Olaus quon-
 dam depingit; quæ homini in septen-
 trionali Oceano circumvento sup-
 petias tulerit. *Vfus* etiam in *Cibis*. Co-
 piosioris nutrimenti & concoctu
 difficiles f Galenus facit. Rondele- f Galen. de
 ritius de Rajæ bonitate quæsitus; victu at-
 perinde ac si quis pallium elixum tenuante.
 comedat, respondit. Archestratus
 scapulas & hyeme laudat. Laterum
 extremas partes à divitibus comedi,
 reliquas plebi relinqui, ex Gesnero
 habemus. Apud Hollandos potis-
 simum elixantur, butyrum, acerum,
 & sinapi condimenti loco sunt. Ca-
 seo & Silphio veteres condiebant. In
 Medicina a tribus fel est utilissimum,
 hepate ad pruritum felici-
 ter Rondeletius u-
 sus est.



PUNCTUM V.

De Raijs Lævis, & in specie de Lævi Raja, Undulata, & Oculata.

TAB. X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. **R**AJÆ in Læves & asperas optime distinguuntur: Inter illas, quarum alia acuto, alia obtuso rostro sunt, prima est quæ λεοβατῆς simpliciter Græcis, LÆVIRAIA Latinis, *Mucosa*, & à lata fascia qua mucus seu potius coryza in laborantibus excipifollet, *Bavosa* Romanis dicitur. Omnium est sui generis piscium post bovem maxima.

Corpore quidem tenui, sed in amplissimas alas expanso. Cute ab aculeis nuda. Uterque oculus, media dorsifilinea, & cauda tenuioribus & raris aculeis muniuntur, sed & in supina parte quidam in os, quod latum est, cibi sine dubio retinendi causa, recurrunt. Rostrum tenui & pellucida cartilagine, constat. Alæ utrinque expansæ tenues sunt, & prona parte nigricant. Cauda, quæ tribus aculeorum ordinibus, instruitur, tota supina parte alba est. Rima quæ podici, pudendum muliebrem refert. Quam Aldrovandus describit, maculis supina parte nigris undique variabat. Rostri pars in obtusum angulum, figura depressa, & quasi quadrangula tendebat. Branchias quinque detectas, habebat. Inter cutem & peritonæum albida caro mucosa, panniculi carnosus vicem obtinebat. Intra, hepar erat in latitudine ventris, ex albo rufescens, tribus lobis, linguarum figuram referentibus, quorum medius brevissimus, distinctum. Sub hepate figuræ planæ ventriculus, pars convexa ad sinistrum vergebat latus, concava in spinam. Mesenterium ad connexionem ventriculi & intestini medio hepatis lobo colligabatur, sub ventriculo caro cernebatur rubicunda, lienis fortè vice fungens. Cor thoracis

sinu exiguu triangulari, exiguum, trunco unico veluti pediculo appensum continebatur.

RAIA UNULATA à maculis flexuosis ita dicta, à colore *Cinerea* dicitur. Corpus ovi potius est, quàm Rhombiforma, prona parte multis sinuosis lineis describitur. Aculei in linea dorfi pauci, parvi, & rari; circa oculos nonnulli; in cauda majores & densiores triplici ordine disponentur.

RAIA OCLATA & lævis, Asterias quibusdam, sed perperam dicitur. Nam & *Galeus* à maculis, Asterias à maculis stellatim dispositis ab Aristotele nominatus est: quales in ista minimè deprehenduntur; & Asterias veterum tenerior est bonique succi; quod de hac dici non potest; & Galli hoc genus Miralet à speculorum parvorum similitudine vocare solent.

PUNCTUM VI.

De Oxyrincho majore & Rajæ stellari.

DUO OXYRINCHORUM genera TAB. X. 8. (à rostri acumine ita dicuntur) Rondeletius facit. *Maiorem* unum, *Minorem* alterum. Bos ille Bellonii est; non quod quadrupedem representet; sed quod Rajarum generis maximus, ad Bovis magnitudinem excreseat. Ligures *vaccam* vocant, in quibusdam Galliarum locis *Eleno*, quasi subulam, quod piscis rostrum tale sit, dicitur. Ex a planis cartilagineis Bovem esse dubitari non debet. Ad duo. a Aristot. H.A. l. 5. decim ulnas latitudinis excrecere, c. 5. b Oppiani autoritate affirmo. In Plin. H. N. l. 9. c. 24. descriptione non conveniunt Authores. Dorso, facie, lateribus admodum niger est. Supina partes albi- l. 2. v. 143. cant, si Eliano credendum. Bel- c. Elian. lonius toto corpore lividum facit. H.A. l. 1. Eidem dentes habet truces, hami in modum inflexos, triplici ordine in maxilla dispositos, eosque mobiles. d Oppiano sunt obscuri & exigui. d Oppian. Eliano adeo inclusi, ut in conspe- l. c. v. 145. ctum

Etum non veniant. Rondeletio Major Oxyrinchus minori similis est, alis amplis & extrusis, ipso corpore strictiore, acutioreque dorso longiore. *Aculeorum* in sola cauda unicum habet ordinem. Pelagii sunt e Ovidio boves; in cœnosis locis degunt Oppiano; Eliano in lutosiis gignuntur. Piscibus *vescuntur*, sed humum maxime appetunt. *Parvum* statim faminal. Corpore etsi sint magno, ideo quibusdam inter Cetaceos, imbelli tamen, mollitie conscii, sola corporis mole feruntur, sic & piscantes pondere suo opprimunt, & capti, renituntur. Carne sunt quam ceteræ molliore, & sale fumoque conditi exsiccantur, exsiccati diu incorrupti remanent.

TAB. X. **OXYRINCHUS** Minor corpore est maximo, & maculis multis lentis specie, notatur. *Dentes* habet in os vergentes. Ad oculos quatuor aculeos; in cauda tres eorum ordines, diversos & inæquales; primus medii ordinis maior est secundo, tertius primo, quartus secundo respondet. Utrinque per transversum recti sunt, ad latera conversi, qui per hos sequuntur in cauda extremi, in caput recurvantur. In supina parte rostri, alii sunt ad capiendos pisces recurvi, alii acutiores. Ceteris partibus cum reliquis conveniunt. Ad Oxyrinchos referri debet ille, quem Gesnerus Venetiis accepit, corpore cinereo, maculis distinguentibus fuscis, ambitu corporis subrufo, Normannis Hal, Lusitanis Huga dictus.

Iconem hic vide.

TAB. X. 7. **RAIA STELLARIS** lævis, Græcis Asterias, quam Gellius Rajam oculatam esse vult, capite, dorso, & cauda ab aliis distinguitur. Dorso pars prona alæque expansæ, stellulis, elegante, depictæ conspiciuntur. Aculei in eodem mox à capite incipientes, in priorem caudæ pinnulam desinunt. *Caput*, quia crassius & latius, Pastinacæ quàm aliis Raiis similis est. Cauda tenuis, & quàm reliquis brevior.

PUNCTVM VII.

De Raijs Asperis: & in specie de Raja aspera Stellari, Oculata, & Clavata.

RAJA aspera STELLARIS tota aculeis horret. In oculorum intervallo multi sunt, breves, frequentes, peracuti: in medii dorso lineæ alii magni, in cauda tres magnorum ordines, alii plurimis & minoribus distincti, infiniti alii sine ordine per totum corpus resperguntur, pro *dentibus* ossa dura & aspera gerit. Duæ huius generis esse videntur. *Vna* quæ stellulas habet in medio albas, sed quas ambit circulus ex nigris punctis constans, totumque corpus aculeis horridum est. *Alteræ*, stellulas prorsus candidas, cum multo paucioribus aculeis obtinet.

O C U L A T A lævi maculis similis est. *Aculeos* in alis extensis è regione macularum utrimque habet, alios in lateribus capitis utrimque, alios in dorso, in cauda, maiores, frequentiores, & validiores visuntur.

Raja CLAVATA duplex est. *Vna* quam Massilienses Clavade, Gallii Raje bouclier vocant. Corporis specie reliquis est similis, sed multo brevior minusque acuto, &c. Colore nigricante, alis valde expansis. *Hepar* habet flavescens in duas partes dissectum, in quo vesica, fel aqueum & renue continens. Pingue est illud, & inter cibos delicatissimos, in oleum resolutum, hepatis duritiem resolvit. Carne est durum. Posset Aquilæ conferri.


Alteræ à superiore differt (Verba sunt Rondeletii, cui multas Rajarum species debemus,) &c. Congener hisce est & illa. Cuius icon Venetiis ad Gesnerum missa est. Maculis distinguitur fuscis, reliquum corpus obscure subluteum est, reliqua apparent.

PUN-

Raia.

Roche.


2



Raia.

Roche.

1




Raia laevis

glatt Roche.

3


Raia Oculata et levis

4



Glatt Spiegel Roche

Augen Roche.



Raia Oculata et levis


Gefnari.

Spiegel Roche.

Raia asperima.

Raucher Roche.


6



Seitel Roche.

Raia Aeterna Aspera


7



Raia Oxyrhynchus maior.

Großer Spitz Raie Wall rock Meer ochs.


8




Raia Oxyrhynchus minor.

Kleiner Spitz Raie


9



Raia. Roche. 1 Tab. XI.




Raia Clauata. Roche.




Raia Clauata alia. 3




Raia spinosa. Doren Roche.




Raia Fullonica. Karten Roche.




S. evis Raia. alia species. 6



Squatina. Angelus marinus. 7



MeerEngel.




Rana. Piscatrix. Sue Marina.

Meer Krotte. Meer Teufel. Fischer Krott.


Rana Piscatrix.

Aldroundt.




Raja exiccata et conciuata ad formam.

Monstrofi Pifcis Volantis. Tab. XII.




icon.

2




Raja Olaij.

3




Oua Raiaurum

4




Raja Laevis. Spiegel Roch.

5




Squatina. meer Engel.

6



Rana piscatrix minor.

8




Oryzichus

7

minor. alijs

Kleine Meerkröt.



PUNCTUM VIII.

De Raja spinosa, Aspera,
Fullonica, & Asperri-
ma.

TAB. XI. 5. *Aldrov. de Piscib. l. 3. c. 59.*
RAJA SPINOSA Gallis Cardaire, quasi Lanifica, à spinis seu aculeis quorū multi infixi sunt instrumentis quibus lana carminatur, figura corporis lævi rajæ similis est, si longas cutis spinas excipias. *Spinæ* non in alis solum habet, ut clavata altera, sed etiam in lateribus circa caput, duo oculis præfixi sunt, & in media dorsali linea, & ad priorem usque caudæ pinnulam continuus est aculeorum ordo unicus. Carnis substantia & succo ab aliis non variat.

TAB. X. 7. *Aldrov. lib. cit. cap. 60.*
ASPERA, illa à Rondeletio cognominatur, quæ à cæteris eo differt, quod *aculeis* parvis latera confersa habet, corporis verò truncum nullis. *Rostro* est acutiore. In cauda tres sunt longorum & firmissimorum aculeorum, ad extremum usque caudæ ordines.

TAB. XI. 4. *Aldrov. lib. cit. 61.*
RAJA FULLONICÆ ab eonomine inditum est, quod ubique in alis, corpore, capite, cauda, tota frequentissimis aculeis confersa sit, instrumenti illius, quo fullones pannos poliunt instar, quod totum aculeis ferreis confertum est. *Rostro* est satis longo & acuto. Caudæ aculei incurvi sunt, triplici ordine dispositi. Rara est, & pugnacissima esse creditur.

TAB. X. 6. *Idem c. 62.*
RAJA ASPERRIMA, à præcedente eo tantum differt, quod non solum prona, sed etiam supina tota aculeis peracutis ita horret, ut manu tolli non posset, nisi pinnulis cauda apprehensis, ideo supina in icone exhibetur; pro dentibus maxillas habet asperas & osseas.

PUNCTUM IX.

De Ranamarina.

TAB. XI. 8. *Aldrov. de Idol. l. 4. c. 28.*
RANAMARINA. Græcis βαταρχος θαλασσιός, Plutarcho βαταρχος ἀλιεύς nomen ranæ ex eo forte meruit, a quod gyrinas sive ranulas recenseditas, & imperfectas, oculis quidem & cauda notabiles, sed quibus postea demum accessuri sint pedes & cau-

dæ notabiles, sed quibus postea demum accessuri sint pedes & caudæ fissura, referat. A venandi solertia *Piscatrix*, quod & à Plutarcho factum; ob sedam corporis monstrositatem *Diabolus marinus* Dalmatis; ob oris hiantis amplitudinem, *Lamia* Siculis; ob carnis molliem *Maltha* Bellonio, sed perperam dicitur. Magnitudine est ubique ferè pedali & cubitali, allicubi tricubitali inveniri, *Salvianus* auctor est. Cute capitis, *aculeis* exceptis, lubrica & molli, infernâ parte subalbida, superna verò ex nigra flavescente tegitur. Unde molles, *Ovidio* tergo *Ranæ*. Caput habet toto corpore longè grandius, ut nihil in eo præter caput & caudâ conspicias aculeatū, asperū, orbiculatū atq; depressum. Os in promptu, seu anteriori parte, secus ac aliis cartilagineis, vastum, pro corporis proportionem grandissimum, ac quàm maximè hians. *Dentes* permultos magnos, acutissimos, in os recurvos, utrique maxillæ, duobus palati ossibus, & linguae radici infixos. *Bellonius* mobiles, albos, & confusis ordinibus dispositos facit. *Maxille* ipsi retusi, semicirculares, quarum superior brevior est, inferior longior & prominens. *Lingua* maxilla superiore longior. Membrana quædam gingivanum interiore parte enata, & in os complicata, quæ à maxilla separari non videtur. *Oculi* ampli in capitis vertice potius quam in temporibus siti, *aculeis* sepiuntur: Ante eos duæ propendent appendices, tenues, albæ, tetri odoris, si *Oppiano* credimus. In medio nasi * *pinna* oblonga prædura, & * *Kircher.* versatilis, visitur: à cuius extremo musculus quidam ceu cirrus instar fili subtilissimi deducitur, per eius cavū humorem certum in fundum usque cirri derivât, ubi coacervatus ad vivi vermiculi similitudinem tumet. Omnia hamum piscatoris exactè expriment. Parvæ ex rostro albicantes carunculae, & eminentia sub oculis cornicula *Plinio*, fila capilli specie referentia, postremis quibusdam præpilatis, *Aristoteli*; gracilla quædam cornua *Bellonio*; pilli *Gilio*; geminae rigida albæque setæ *Salviano*, dicuntur.

cuntur. *Branchias* neque detectas, *c* neque supina parte cæterorum planorum cartilagineorum more, sed in lateribus, non spineo operimento, sed cuticulari intactas habent. *Pinnas*, contra cartilagineorum planorum morem, in medio corpore, ubi cauda capiti jungitur, membranaeas & crassiusculas duas, propter amplitudinem partis superioris: in superiore caudæ parte una non admodum lata, sed longiuscula conspicitur. A capite illico *cauda* sequitur, rotunda, brevis, carnosâ in pinnam, rotundam, crassiusculam & latam definens. Ex huius & capitis lateribus, appendiculæ carnosæ, certis intervallis à se distantes, dependent, quæ, natante ranâ, supernatant. *Intra*, si spectes, *peritonæum* videbis nigrum; *ventrem* magnum, carnosum, appendice utrinque unica & brevi instructum; *intestina* gracilia, multis gyris circumvolata; *jecur* parvum, rubescens, in quinque lobos, ut Bellonius scribit, divisum. (Rondeletius sectum negat) eorum utrinque bini ad latera protrahuntur. *Fellis* vesica longo meatu ex hepate propendens, intestinis annectitur. *Vulva* est bifida, anfractuosa, duas ulnas longa, tribuit & vesicam, sed nescio quam verè Bellonius, & addit, totidem in Rana numerari cartilagineas, quot in quovis sceletto, ossium animalium terrestrium formas referentes, quæ prorsus medullâ, præter vertebrae careant; totidem item nervorum conjugamenta in eius cerebro, multò tamen liquido, numerari, quot in reliquis animalibus numerantur. *Ventriculus* & interanea, si per os examantur, corpusque quoad eius fieri potest, distendatur, totum perlucidum, & instar carbunculi fulgens evadit, immissoque lumine, laterna horrendo aspectu apparet. *Locus* ipsi herbose & maris partes & *e* littus. *Cibus* carnes humanæ etiam. Natantem aliquando virili mēbro apprehensum in profundum detraxisse, Gesnerus *f* se de Aquatil. lib. in Ran. audivisse refert. Contra cæterorum cartilagineorum morem, *Ova* non animalia g pariunt. Caput corpore

grandius & aculeatum in causa, quod *A. l. 2. c. 13.* ut aditui sic exitui, ineptum est. Ovum unum solidum, durumque ut foris servetur, cum cæterorum cute molli tegantur, Aristoteles *h* prodidit. Univerſa simul juxta terram edunt; ortus cum iis, quæ extra perficiuntur, & iis, quæ intus, idem. Numerosius *i* quidem fœtificat: sed *i* Aristor. quia de facili pereunt, pauciores reperiuntur. Aliquando extra aquam *H. A. l. 6. c. 17.* vivere, Rondeletius restatur. Vix duos in littore dies inter herbas vixisse, vulpeculæque terrenæ noctu victum querentis pedem, dentibus arripuisse, & ad aurorâ detinuisse. *Solitarias* esse ex eo, quod plures una capi non soleant, colligitur. Plana quamvis, non sola tamen latitudine natat, sed pinnulis etiam, quas in lateribus habere dictum est. Singulari in venando *k* astu utuntur. Inter saxa conditæ, aperto immani rictu, mentitum vermiculum musculo annexum, per pinnam in faucium rictum conjiciunt, eo viso pisciculi ceu ad escam accurrunt, rictum, cavitate alicuius saxi reputantes subintrant, piscatores retracto, qui vellitur hamo, orisque rictu clauso, totum pisciculorum gregem devorant. *Macilentiores*, quæ præ pilatis villorū capitibus destituuntur. *Vfus* earum in cibo ferè nullus. Insula, mucosa & ferina saporis carne præditæ sunt. Anaxandrides tamē eas in Coryis Thracum Regis cōviviis reponit. Ventrem inter lautissimos cibos Antiphanis recenset. In *Medicina* fel adversus suffusiones utile est. Quod strumas utiliter pungi, piscis eius qui Rana in mari appellatur, officulo de cauda, ita ut non vulnerentur; idque fiat quotidiè donec percurentur, apud *l* Plin. *H. N. l. 37. c. 8.* nium occurrit; Rajarum potius aculeis convenit. Nullum enim officulum Rana habet. Diversa est ab istis tum illa castanei coloris, ventre candicante; tum Rana *MINOR* dicitur. Tota tam supinè quàm ponè asperâ cute tegitur, supinè aculeata est, & albicat, pronè colore est cinereo. *Os* habet exile & planè edentulū: *Caput* erectum & velut cornu in extremo pro-

d Ovidio in Halieut. e Martial. l. 10. c. 37. f Gesner. de Aquatil. lib. in Ran. g Arist. H.

procerum, sub eo cuteus nervus, quem velut ex vagina exereſe, rursusque contrahere videtur. *Oculi* ad latera ubi angustum valde caput, velutin fovea quadam latent. Foramina olfactu distincta, supra os coeunte extremitate hærent, auditui infervientia oculis sunt contigua Pinnae ex icone cognosces.

PUNCTUM X.

De Squatina.

TAB. XI. 7. **S**QUATINA piscis, *πύμα* Græcis, *Squatrus*, quod sit squammis acutis, *Ισιδορό, Λιμά Βαλλά, Celtes* in veteri lexico, dicitur. Media inter Mustelos & Planos à Rondeletio ponitur. Magnitudine ad centum sexaginta sæpe libras excrescit. Coloris est pænecineri ad fuscum vergentis, asperrima: ut * cute lignum & ebore poliantur, supinè alba & lævis. Partem corporis anteriorem habet latam, circularem, retusam, ut *roſtro* prorsus careat. *Os* prima parte obvium, brevibus sed acutissimis, iisque aliter quam in aliis piscibus dispositis *dentibus* munitum. Maxillarum ossa in anulum obtusum desinentia, in lingua extrema carneum tuberculum. Ex superioris maxillæ extremo, quod cute non integitur, apophyses duæ in alias divisæ demittuntur. Post oculos, qui in superioris capitis parte, ad latera parvi, foramina ad os usque patentia videntur. *Pinna* utrinque binæ sunt, & utræque in lateribus. *Cauda* longiuscula in aliam lunatam pinnam desinit. *Mares* à foeminis appendicibus cartilagineis, quæ circa anum, distinguuntur. Intranihil à cæteris cartilagineis differt. *Hepar* habet in duos lobos divisum, in quo *fellis vesica* a felle viridi plena latet. *Liēnem* medioerem ex rubro nigricantem. *Cor* angulatum, compressum, & unico sinu instructum. De dentium situ ita Rondeletius, sunt eorum ordines, &c. *Cænosa* incolere loca *b* Oppianus prodidit, in alto versari apud

Rondeletium legitur. *Coit* etiam * *c Aristot.* cum Raja. Sic *πρωβατ* * nascitur, *H.A.L. 6.* inter se mutuo partim supinarum at- *c. 11.* tritu. Bis *c parit* autumnò occaſu * *Plin. H.* vergiliarum, qui partus secundus est; *N. l. 9.* primus enim verno fit tempore; sed *c. 51.* secundus felicior. Singulis foetibus ** Arist. H.* septeni aut octoni prodeunt. Singu- *A. l. 6.* laris & his in venando astus est. Ob- *c. 11.* ruunt se arena, sic latentes verberant *d Aristot.* oris vir radios (pinnae exereſe vermi- *H.A.L. 5.* culorum specie apud Plinium extat) *c. 9.* his pisciculi visis, quasi ad algam adna- tant, sic capiuntur. Colorem mutare & piscium quidem solas, prodidit *e Aristot.* e Aristoteles; quod nec corpore sint *H.A.L. 9.* pellucidæ, nec cute ita tenui, ut hu- *c. 37.* morum spirituumque perturbatione vari- earum colores perluceant, negavit Rondeletius. Concedi in metu potest. Nam & tum in hiatum pinnis subiectum recipiuntur foetus, ut apud *f Oppian.* f Oppianum legimus, in ven- *Halieut.* trem recipi *g Aldrovandus* credidit. *L. l. v. 742.* Rejiciuntur à *mensis*, quod flatuum *g Aldrov.* crassorum humorum proveniunt, quod *de Piscib.* cartilagineis omnibus commune, *L. 3. c. 66.* proferant. Unde oculorum acies obtunditur. Olim Smyrnæ secundum Dorionem, Mileti secundum Arcestratum ortæ, cæteris præferebantur. In *Medicina* invenere in tertio tabis genere locum. Oleum ex hepate ad hepatis duritiem confert. Ova exsiccata sistendo alvi profluvio. Ex cute optimum fit in psora & scabiæ sinegma. Illitæ mammas crescere non patiuntur, si *b Plin. H.* fides est; duriusculas reddi, utrum- *N. l. 27.* que experientiam comprobasse, Ron- *c. 10.* deletius author.

PUNCTUM XI.

De Squatino raia & Lamia.

PISCIS QUI SQVATINORAIADICITUR TAB. XI. 12. Latinis, Græcis *πρωβατ* ex Squa- *a Aristot.* tina & Raja procreatus creditur, *H.A.L. 6.* Parte priore Rajæ similem facit a *c. 10.* Aristoteles, posteriore Squatinæ. Absurdum id Rondeletio, quod & Philosophus dubius pronunciet, & ex Galeno *b* fieri secundum naturam non posse, ut tantopere dissidètia corpora *b Galen. 3.* *de usu* com- *com-parti.*

* *Aristot.*
H.A.L. 2.
c. 25.

b Oppian.
Hal. l. 1.
v. 380.

commisceantur didicerimus. Stant tamen ab Aristotele plerique, Bellonius, Gellius, Jovius, Aldrovandus, Columna præcipui. Castelletus nudum eius sceleton misit & paucis ita descripsit. Neapoli frequens est, quod miror, &c.

c Athen. l. 7. LAMIA M, quæ *αἰετὸς τοῦ ἀγύλα* quibusdam dicitur. Nicander *c Carchariam & Scyllam* vocari scribit, Rondeletius eandem cum Cane Carcharia facit. Plinius inter Cartilagineos planos enumerat. Descriptionem eius nemo veterum suppeditat. Maximam evadere, cute integi scabra os in anteriore capitis parte habere, *dentibus* plus minus ducentis in utraque maxilla per quaternos versus dispositis, ad radicem latis, in acutum & pyramidem desinentibus, ad latera crematis, referunt Bellonius prodit. Verè an falso, non dixerim. Generis Galeorum certè, qui longi pisces sunt, eandem pronunciat.

PUNCTVM XII.

De Lumpo Anglorum & Pisce gibboso.

TAB. XIII. 1. Piscem qui Anglis Lumpus, quasi massa informis dicitur, sic describitur à Turnero. Piscis edulis est Lumpus noster, &c. Dorsum rubicundum, ventrem album habere, & in magnis delicis reputari Massarias addidit. Noseum molli & in ore diffuente carne, esse experti sumus, cum Andream poli in Scotia studiis operam daremus.

TAB. XIII. 2. Piscem GIBBOSUM Græci *γαστήρα* vocant, reperitur in mari Balthæo corii portiuncula, quam Fabricius Gesnero misit. Crassiuscula & tenax est, punctis multis seu tuberculis exasperatur. Eminent etiam Spinæ quædam ceu rubi, sed mucrone recto, pyramidis formâ, aliæ magnæ aliæ parvæ ex fusco albicantes. De sua pictura sic Gesnerus, &c.



TITVLVS II.

De Piscibus Marinis Saxatilibus.

CAPVT I.

De Saxatilibus Squammosis.

ARTICVLVS I.

De Scaro.



Ab soluta Pelagiorum natura, Saxatiles sequuntur, XIII. inter hos primos Scarus, 3. 4. qui seu *σάρκω τῷ σκαίρειν*, id est, tripudiando, seu quod Athenæo placet, quod inclusus nassis, crebris caudæ ictibus, qui *σκαέθμοι* seu *σκαέλισμοι* 1. 7. vocantur, aversus, fores laxat, atque ita retrorsum erumpat; seu quæ algam, aliasque herbas depascatur; *σκαίρειν* enim interdum est *νέμεσθαι*, ita dictus; *Meryx* quoque seu *Ruminax*, ut Scaliger vertit, ab Aristotele *b* quæ latis utriusque maxillæ dentibus solus ruminet, *Cerebrum Iovis* Ennio vocatur. Serò olim Romanis & toti Italiæ visus; ideò nec latinum piscis nomen habetur. Duo illius sunt genera, unum quod *ὄνις*, benè ab Onisio distinguendus, quod asino concolor sit, dicitur. Alterum, cui *ὀνίας*, ex Nicandro Thiatyrenonomen imposuit c Athenæus. d Oppianus modò *σίσλον*, modò *βάλιον* cognominat. *Onias* squammis est magnis tenuibus, colore ex cæruleo nigrescente, ventre candido; Sargo, corporis forma ad rotundam accedente, aculeorum pinnarumque situ, & numero, similis, maculâ duntaxat nigrâ, in cauda, & quod lineis nigris in dorso ad ventrè careat, distinguitur. *Oculos* habet magnos, supercilia coloris Indici.

Dentes hominis modo planos imo solus latos, superioribus dentibus carere, quæ Michael Ephesius prodidit, falsum, si Meryx est, & habere comperit. *Branchiæ* ipsi binæ, simplices alteræ, alteræ duplices, plura & majora in maxillis ossa tubercula.

Cauda

Cauda lata in duas pinnas non divisa. Cor angulatum, hepar album in tres labos divisum, à quo fellis vesicula intestinis alligata pendet. Fel coloris nigri. Splen ater, ventriculus cum quatuor appendicibus parvus. A. 10. & seu Varius oculis, ventris inferiore parte, in qua podex, purpurei est coloris, cauda coloris Indici, reliquo corpore partim ex viridi, partim ex nigro cæruleo. Squammis veluti notis obscurioribus aspersis. Ore mediocri, dentibus latis in superiore maxilla densis, in inferiore raris & acutis. Ventre in medio duabus purpureis notis insigni. A dorso & cauda ferè aculei tenui membrana connexi, æquis interval- lis dispositi, conspiciuntur. In singulorum summa parte membranula pendet vexilli instar. pinna ad branchias sita lata sunt, & veluti ovi ea figura. Intus habet ventriculam satis capacem, hepar subalbum, intestina lata & multa, fellis multum, splenem magnum. Quem Bellonius in Creta observavit, corpore erat ex livido rube- scente, a squamis latis & translucidis. Capite utrinque compresso, den- tibus obtusis, quorum incisorii no- stris erant perfimiles. gula non valde magna. Ad caudæ latera appendices transversas atque eminentes, quales in nullo se observasse pisce ait, utrin- que habebat Gigantis Scarus, den- tes habebat utrinque quatuor. La- tos in inferiore maxilla, in superiore

brus capiatur. A Carpathio advectos, Claudio Tiberio Principe, f (Octavium Macrobius vocat) è libertis eius præse- ctus classis, inter Ostiensem & Campaniæ oram, sparsos disseminavit. Quinquennio ferè est cura adhibita, ut capti redderen- tur mari. Postea frequentes inveniebantur Italia in littore, non ante ibi capiti, ad- movitq. sibi gula sapores piscibus satis, & novum incolam mari dedit, ne quis pere- grinas aves Romæ parere miretur. Saxa- tilem esse vix dubitandum. Sig Op- pianus dum inter littorales recenset, contrarium innuere videtur, vitium est, & bene è σινδὸς & pro Scaris legitur. In dulcibus quoque nutritum aquis inuere h Columella videtur, nisi pro Scarò Squalum legi debere velis. Sanè haud perperam ex i Varrone id conicere, licebit. Vicitat k herbis, & algæ pifis, phaeolisque plurimum inhiat Mercuriali adeo, ut ea capia- tur. Pythagoras τρυφάζον facit, si Gyraldo fides est. Diphilus lamen carnivorum esse & lepores marinos captare scribit; nisi error committi- tur. potius namque Mullo ista quàm Scarò conveniunt. Quod m solus in- ter pisces ruminet, superius dictum est. Gregales esse vel exinde quod so- dales e nassis liberare conentur, c. 54. colligas. m Caudam capitis morden- dam porrigunt. apprehensa edu- cunt. Quod nocturnum capiuntur, vigilantia ipsorum debetur. malè Gelenius ideo solum inter pisces dormire scripsit. Melius dicēs, solere

--πῶς ὕπνιον

Εὐνύχιον κοίλησιν ὑπᾶν κενθρῶσιν ἑαυτέων alicubi somnum nocturnum sub la- tebris capere, sic insidias vitare. Sa- lacissimum esse Ælianus prodidit. ideo n fœminæ capiuntur. Parere bis in anno fatendum. hoc o Saxatilibus commune. Vocalem esse, quod apud Athenæum Oppianum Tzetzem proditur, dubium, cum pulmones non habeat; nisi ore aquam impel- lendo sonum edere dicamus. Vsum si attendamus, in delicatissimis olim apud Romanos cibus erat; & iecino- ra eorum in Vitellii Principis patina inter lautiores primitias enumera- tur. Primas inter Saxatiles tenere, &

F

mollis

d Columel- ferratos. Locum si attendas, d Asiae la R.R. l. 8. Græciæque littoribus Sicilia tenuis frequentissimus exit, nunquam in Ligusticum, nec per Gallias enata- vit, in Ibericium mare. In mari Car- pathio † est semper obviu, & quod † Plin. H. miramur promontorium Troadis Lecton nunquam sponte transiit. nullibi tamen quàm in mari rubro frequentior. Bellonius in Proponti- de Ponto & Hellesponto, Galliæ lit- toribus, & in Oceano inficiatur capi, in Euripo e Aristoteles, Arcestra- tus tamen maximum circa Byzan- tium evadere prodidit. In Creta cir- ca eum ubi ladanum colligitur lo- cum, tam frequens, ut nullus cre-

Plin. H. N. l. 9. c. 17

g Oppian. Halcut. l. i. v. 109.

h Columel- la l. 8. c. 16.

i Varro de R.R. l. 3. c. 3.

k Aristot. H.A. l. 8. c. 2.

Plin. H. N. l. 9. c. 17.

Oppian. Hal. l. 2. v. 109.

Ælian. H. A. l. 1. c. 2.

l Athen. l. 8. in Ælian. H. A. l. 2.

c. 54. m Plutar. de solert. a- nimal.

n Ælian. H. A. l. 1. c. 2.

o Aristot. H. A. l. 4. c. 2.

p Celsus.

mollis ac friabilis carnis esse, nullum videtur dubium: quamvis p Celsus & Philotimus aliter credidisse putentur. Insuper esse nisi cum suis faciibus edantur, creditum apud Græcos. Jecur in cibo sumptum ictericis prodesset, apud q Ælium legimus.

q Ælian.
H.A.l.II.
c.2.

ARTICVLVS II.

De Turdo.

TAB.
XIII.



5.6.7.8.9.
to.ii.
aAthen.l.7

Turdus Græcis *τιχλη* à macularum similitudine sic dictus, s.6.7.8.9. *πλανώνυμ* olim teste Nicandro & Pancrate apud a Athenæum fuit. Duo ipsorum Genera constituit Salvi-
an. l.7. *Maiores* & oblongum, qui vel viridis vel ruber est. Rondeletius duodecim species pinxit. Veteribus, apud Athenæum *μελανόστιχ*, seu nigris oculis varius. Eratostheni *πέγκας* seu nigro distinctus, Pancrati *οινώδης* quasi vini colorem referens, Numenio *αλειδής*, id est purpureus dicitur. Phavorinus *ποικιλόστιχον* vocavit. Mutare tamen colorem dicuntur. b Circa ver magis exsaturatos, dilutos magis æstate videas. Branchias ipsis quaternas Aristoteles c tribuit omnes duplici ordine excepto novissima. Quinque sunt ab Aldrovando observati, duodecim à Rondeletio. *Primus*, qui magna ex parte aureus, amethystino, cæruleoque ac rubro variat, os intus habet ruberrimum, dentibus carens. Oculos maximos, quorum auream pupillam circulus ambit niger, nigrum rursus aureus, aureum cæruleus, hunc iterum aureus, ac tandem niger, alias omnes ambit. Habet & duas è mento dependentes apophyses cutaceas, subflavi coloris. tres præ cæteris lineas sanguineas, & denticulatas. Pinnas ad branchias omninò aureas, in pectore totas cæruleas, nervos earum aureos. Cuius coloris sunt & illæ, quæ ab ano, in dorso & cauda, qua uropygio junguntur, maculis duntaxat parvis sanguineis resperfas, cæteras cæruleas conspicias. Se-


b Aristot.
H. A. l. 8.
c. ult.
c Aristot.
H. A. l. 2.
c. 13.

cundus ad latera nonnihil albicat. in capite vermicularibus, alibi rotundis, ubique cæruleis maculis insignitur. Tergoris pinna ex aureo rubet, sicuti & cauda, quæ in extremo cærulea est. Utrunque dentatus est. *Tertio* Corpus subviret, venter albicat. Squamarum extremitates cæuleæ sunt. *Caput* pro corporis proportionem parvum, totum cæulei sed dilutioris coloris, præter branchiarum opercula, quæ candidant, maculisque oblongis & semicircularibus aureis consperguntur. Eiusdem coloris lineæ decussatim & transversaliter per corpus ducuntur. Dentes habet maximos, acutissimos, ingentemque oris ritum. *Quartus* toto corpore sanguineo, aureoque distinguitur. dorsum & corporis maculæ ex cæuleo nigricant. *Quintus* *πολύγεσμον*, totus ruber saturatus. Maculæ in extremo tergo conspicuæ, orrisicis non absimiles, sunt nigrae, in capite longæ, & serpentis in morem ferè contortæ, cæuleæ. Lineæ à capite ad caudam recta ductæ, rubrae sunt.


Turdus Rondeletii *Primus* admodum varius est. Unde *αἰολ* dictus. adauratæ figuram accedens, pinnarum situ numeroque cæteris saxatilibus similis, dorso fusco, ventre ex albo livescente. Dentes habet recurvos, labra crassa, & rugosa. Oculos sub quibus pars variis coloribus est illustris, magnos & rotundos. Pinnas ad branchias aureas, ad podicem & in tergo flavas, nigris cæruleisque maculis asperfas. *Alter* colore est ex viridi cæruleo, & quia colorem colli Paræus in pinnis & in cauda refert, Pavo dicitur. *Tertius* qui Pulcher dicitur, & à quibusdam *ferculum regium*, multas colorum differentias habet. Viridis est magna ex parte, sed punctis purpureis, cæruleis, Indicis, & aliis confusis coloribus conspersus. pinnis ad branchias flavis seu rufis, aliis omnibus partim cæruleis, partim viridibus, partim rufis. Branchiarum operculis punctis & lineis




Scarus onias. Meer Brachs men.




Scarus Varius.




Turdus. Kramet fisch.




Turdus. Meer Pfaw.




Turdus.




Turdus.



Turdus.





Turdus.





Pauc. Meer Pfaw.

Turdus.



Attagus. Lepras. Roter Kramet fisch.

Attagenus. alius.



re. Non quælibet tamen Saxa a-
mat, sed quæ propel littora sita, mu-
sco & alga obducantur, nec longè
ab hoc domicilio recedit. In Pon-
to cum Merula desideratur. Non
foliis herbis vel alga vivere, sed in-
terdum pisciculis, loliginibus; &
aliis crustaceis pasci, Salvianus au-
thor est. Hyeme aliorum saxati-
lium more latere aiunt. quo tem-
pore etiam fœtificant. A Merula
specie non differre, hunc marem,
illam fœminam esse; inter Oppia-
ni errores poni potest. Singulare
idem e in eis conjugalis amoris ex-
emplum, notat. Mortuo marito
progressæ de thalainis fœminæ, er-
rant, communemque cum iisdem
mortem appetunt. Carnem habent
mollem, tenerâ ac friabilem, ut Ga-
lenus prodidit, Trallianus cibum fa-
stidientibus eum commendat, & Pri-
sannam marinam vocat. Platina quo-
vis modo coqui, sed assum sinapum
requirere scribit.

*De Pavone Salviani, &
Leprade.*

Pavo piscis, quem Salviano debe- TAB.
mus, cuius & a Ambrosius & Ili- XIII. 12.
dorus Hispalensis meminere, di- a Ambros.
versus est à Pavone b Philostrati, Hexam.
qui in Phaside Indiæ flumine repe- b Philo-
ritur, & cæruleas quasdam cri- stratus l. 3.
stas, squammas versicolores, cau- de vita A-
damque auream in quacunque poll.
voluerit partem versatilem, habet.
Romæ *Papagalo*, à Lusitanis *Budia*
vocatur. Bilibris sæpè est, ad cu-
biti mensuram perrarò ascendit. fi-
gura corporis, lacustri Tinca absi-
milis non est. Squamvis latis regi-
tur, & variis coloribus depictus est.
Corpus enim ferè totum, inæquali
varietate viret. Ventris pars poste-
rior viret ex albo, anterior ex albo li-
vet. dorsum & cauda, ex viridi nigri-
cant. latera ex viridi partim flave-
scunt, partim livent. *Caput* quod cras-
sum est ex cæruleo viret, maculis
F 2 quam

quam plurimis rubentibus, nonnullisque cæruleis piscem totum nulla habita ordinis ratione pingentibus. *Rostrum* extensum, sed non acutum. *Labia* crassissima, quorum superius duplex apparet. *Oculos* magnos & aureos. *Branchias* utrinque quaternas, & juxta eas *pinnas* latas & rotundas, duasque alias minus latas in ventre. In dorso una satis longa erigitur, cuius anterior pars stricta & aculeis munita est: posterior latior & aculeorum experts. A podice, qui in medio ferè ventre una quoque, duobus aut tribus innixa aculeis, per imum ventrem ad caudam explicatur. *Cauda* in unam *pinnam* latam ac ferè rotundam violaceam & maculis atque lineolis plurimis cæruleos insignitam definit. *Interiora* si spectemus, *ventriculum* habet magnum, appendices multas, *intestina* ampla, *hepar* subalbidum, cui fellis vesicula hæret. *Lienem* subatrum. *Viscus* ipsi præter algam, & alia marina excrementa, pisciculi. Solitarius est, & sæpe singuli capiuntur. Verno inprimis & autumnali tempore, fortè quod æstate ab caloribus, hyeme ob frigoris impatientiam lateant. Ignobilis inter cibos censetur.

TAB. XII. 13. *Aldrovand. de Piscib. l. I. c. 5.* LEPRAS seu *Pforus*, quod iisdem præditus sit suggillationibus quibus qui lepra & pfora laborant, sic ut nonnullis, sed metu ne perperam videretur dictus, *Lelepris* Latinis, si vera prodit Rondeletius dicitur. Ex Turdorum est genere. Vix ad dodrantem in mari Adriatico excrecere solet, cum pedem & amplius in Oceano excedat. Totum corpus habet maculis nunc cancellatis, nunc rectis, nunc in obliquum sparsis variægatum. *Squammas* ad oram rubore suffusas, latas. *Caput* non ita multis coloribus cancellatum, quod lineas hinc inde ductas, ex cæruleo, viridi, ac rubro mistas, ostendit. *Oculos* parvos, rotundos: iridem oculorum aëri similem, quam si quando in gyrum contorqueat, cyaneum, deinde aureum, tandem argenteum circulum in crystallini coloris fulgorem referre conspicias. *Os* ipsi parvum, *dentes*

albi, acuti. *Maxilla* superior tubi in modum cranio infarcitur, ut penè duobus labia carnosae esse credas: *lingua* alba & penè soluta. Contiaquam tergoris *pinnam* gerit, sedecim aculeis munitam, atque aliam sub ventre ano vicinam. Omnes *pinnæ* transparentes sunt, molles, leves, rubro, cæruleo, viridi, & aliis coloribus maculatæ. *Linea* quæ piscibus utrinque latera dividit, nequaquam in hoc pisce recta procedit, sed à superiori branchiarum angulo arcuata, secundum tergus deducta est: mox ubi tergoris *pinna* definit, illuc quidem *linea* reflectitur, & arcuatur, deinde recta per mediam caudam deferretur. Quantum ad *internas partes* peritoneum habet album, *hepar* expallido lacteum, ad sinistram magis protensum, tribus lobis, uno tantum longo duobus brevibus, constans. *Lienem* planum, oblongum, minoris digiti magnitudine, rubrum. *Intestina* eiusdem capacitatis, ut propriè stomachus in eo videri non possit, semel à stomacho ad anum revoluta, multisque omentis obducta. *Lactes* copiosas, & vulvam bicornem. Hanc ex Bellonio, qui eundem cum *Marzapani* dici credit, fortè quod æquè in deliciis ob carnis suavitatem appetatur, ac panis Martius vulgò dictus. Est tamen alius TAB. XIV. 1. *Marzapani* piscis, qui *Rosa* dicitur, & totus maximè in dorso rubet, minus in ventre.

ARTICULVS. IV.

De Merula.

MERULA, Oppiani interpreti & TAB. XIV. 2. Apicio *Merulus*, Plinio medico prodente Bellonio *Piscis Aspratilis*, Venetis *Tincamarina*, Græcis κόσσιφ & κόστιφ & κόστιφ & κόστιφ dicitur. De illius colore differunt authores. Numenius apud Athenæum a *Nigram* cognominat. Oppianus αἰθώνια. Varinus μελανό-^{a Athen.} σινδόν, vocant. Salviano & Rondeletio ex colore Indico & cæruleo nigricant. Hic & sexu distinguit, in mare, colorem ad violaceum magis accedere, fœminæ ex vario nigrescere, scri-

scribens. idem colorem Indicum aut purpureum exsaturatum nigrum ab antiquis vocari, quod purpuram nigram. Circæam flore nigro, qui tamen purpureus est, aut Indicus, prodidit. invenitur & quoddam genus dorso nigro, ventre Indico, quibusdam partibus cæruleis, *b Aldrov.* *I. de Pis-* dus totum viridem exhibet. Virentē *ib. c. 6.* & Ovidius reliquit. Colorem mutare apud *c. Ælian.* *H. A. l. 12. c.* omnes in eo conveniunt Tincas figurā corporis referre, & squammas latiores quam Turdum, vertebrae dorsi valde erectas habere. Hoc unum in eius Anatomia dignum occurrit, quod cum *hepar* habeat album, in duos lobos grandes divisum: sed tamen exerat tenui vasculo inclusum, & reuolutionibus duplicatum, cuius longitudo est sesquipedalis. Quam Aldrovandus describit, magis in cauda, obscurius in dorso virescit. pinnarum extremitates cæruleas, branchiarum opercula in fine rubentia habet. Oculorum pupillam circulus ruber, rubrum cæruleus ambit. Inter Saxatiles inque Petris stabulantes *a Arist. H.* *A. l. 8. c.* ab *c* Aristotele & *d* Plinio referri certum est, quibus & *e* alij accedunt. Pōtum *f* tamen non intrant. *Vescuntur* *N. l. 9. c. 15.* iisdem quibus Turdi. Comeſtum *e* *columel.* *ro g* primo tentant & premunt, mox *de R. R. l. 8.* iacere sinunt. ubi non palpitare viderint, devorant. *Generationem* *c. 16.* quod spectat, marium *b* quisque cum multis congregitur fœminis. Medicam aut Perficam vitam agere diceres. Zelotypia semper vehementer laborant mares, cum partus tempore instant maximè. Fœminis domi quiescentibus, incubant quasi illi foribus, ne insidiæ tendantur. sub crepusculum vespertinum (nocte fieri scribit *i* Oppianus) intermissa custodia, cibum exquirunt. solæ coniungunt quæ sunt intus, algas in cavernis & circum petras ad victum reperiunt. Mortuo mare, foras egrediuntur, quæ semper antea domi manebant, fœminæ. Impetuntur à Squilla. ideo piscatores, cum eos fœminas observare vident, Squillam vivam hamo affixam demittunt. Merulus,

dum se de illo ultimum sperat, arripit, sic capitur, & exigui animi voluptas fit ultio.

ARTICVLVS V.

De Iulide.

*I*ουλίς, piscis Synesio *ισαθ.*, Hermip- *Tab.* *po Smyrno* *Hicca*, quo nomine *XIV. 3.* Hermolaus Sturionem intelligi arbitrabatur, aliis *Iurella*, & *Iura*, dicitur. Quia non vna ipsorum species, ideo in descriptione variari, non mirum. Rondeletio digiti non excedit magnitudinem. Varius est, dorso violaceo. Squammis regitur parvis pinnarum numero, situ, labiis, dentibus recurvis, cauda, aliis saxatilibus est similis. A capite ad caudam subauream lineam ductam habet, hinc inde rostri modo dentatam, cui pars quæ subest colore est cæruleo, ventre candido flavescente. Bello- nius addit, corpore esse gracili & oblongo; tanto in tergore *colorum* varietate, ut in eo iridem vtriusque depictam videas. Squammis tenuissimis, multorum colorum, super quibus ductæ lineæ rectæ, cæruleæ, virides, melinæ, rubræ ac fuscae apparent, contegi. Caudam rotundam habere. Salviani descriptio ista est. Iulis rostro est acuto, & *c.* Saxatilibus accenseri ex Oppiano *a* colligimus. Antipoli & in toto Ligustico sinu frequentissimum esse nec Adriatico mari infrequentem Rondeletius prodidit. *Vescuntur* minoribus pisciculis, & eorum inopia, alga. Voraces Numenius testatur. Singulares in saxis vivere prodidit cum Salviano Bellonius, gregales facit *b* *Aristot.* *H. A. l. 9.* *ristoteles*. Cavent sibi ab hamo, *halient.* *124.* haud tamen escam sæpe præripiunt. Os veneno refertum habere, & in piscatu urinatores & piscatores pertinacissimè persequi, eorumque sanguinem appetere, *c* clarè ab Oppiano & *d* *Æliano* affirmatur. Lævia, quæ in adversum Aldrovandus prodidit. *Ægris* in albo iure elixari, *f* *Ælianus* *H. A. l. 2.* *6. 44.* *nis* in sartagine frigi & assari prodidit Salvianus, forte si caput amputa-

e Dioscor.
in facile
parabil.

tum. Ius alvum emollire apud Dioscoridem; urinas apud Plinium reperio.

ARTICVLVS VI.

De Phycide.

TAB.
XIV. 4.

PHycis, qui forte à Phycene solo sexu differt, *Fuca* Theodoro, dicitur. Nostri temporis Græci *Phycida*, ut Gellius ait, *Phocida*, ut Rondeletius, *Phyceam* ut Massarias, *Pephycatismenā* ut Hermolaus, *Lampianam* ut Bellonius, appellant. Nomen, quod in musco marino (φύκη βρύον ἐρυθρὸν θαλάσσιον Neophyto & aliis) nidificet, invenisse creditur. Idē est cum *Tinca marina* & pisce Ficu, Romæ vocato. (nomen huic quod passī ficus instar, carnis sit mollissimæ & succi plena) Rondeletio refragatur Salvianus, & illum ipsum esse, qui ob magnam cum *Perca marina* similitudinem *Percia* dicitur, contendit: nec abludit Aldrovandus. Sane æque repando est uterque tergore, color idem est. Rostro acuto & extento, pinnarum situ, numero, & figura conveniunt. Non credendum tamē eisdem prorsus esse. Caput crassius Phycidi os maius, maioribusque dentibus in superiore maxilla munitum. Venter non ita prominet. Pinnæ parvis & ruffis maculis non insigniuntur. Lineis transversis nigricantibus, quibus *Perce* latera notantur, caret. In capite & branchiarum operculis, lineolæ & puncta quædam cærulea, conspiciuntur. Marem nigriorem & squammis amplioribus dixit a Aristotele, sed nec idem perpetuo color. Vernotempore satur, reliquis dilutior videtur. Quod ἀκαιοσεφῆ apud Athenæum dicit, de aculeis quibus dorsi vel imi ventris spinæ horrent intellexisse, dicendum est. quia nunquam palmi magnitudinem excedunt, ideo φηκίδια ab Aristotele dicuntur. Bellonius non vnum genus esse ostendit. Vidisse enim se fuscis, rubentes, virides, πολύχρους testatur. Addit, omnes pinnam tergoris continuam, duodecim aculeis, muni-

a Aristot.
H.A.l. 6. 6.
13.

tam, rursus ad branchiarum latera utrinque vnam, & sub ventre duas, quarum singulæ squammis tegantur latis, firmis, sæpe vliginosis, gere, dentes in superiori maxilla utrinque ad latus unum vel duos videri; in inferiore plures; retro in maxillis molares multos. Omnibus lacteum est *jecur*, ad sinistrum magis extensum, fel lateri dextro, oblongo folliculo inclusum, colore subluteum, incumbit. Inter saxatiles Aristoteles, Plinius & Diocles posuere. λιμενίλιυ Suidas vocat. & Ovidius inter littorales recenset. Luto, alga, & musco, quod b καύλιον, vocatur, vescuntur; & quanquam cætera abstineant carne: squillas tamen sapissime appetunt; Parituræ, *Nidum* † ex alga sibi construunt, in eoque pariunt. Sic foetus contra tempestates tuentur. † Bis anno parere c Aristoteles author est, Eunuchos apud Oppianum dici falsum. Cynædum enim piscem illis verbis verecundo circumscribit. Laudantur à Xenocrate in cibis, Diphilo etiam ἀπαλόδια ἰχθύδια καὶ εὐφθαλά, tenera carnis pisciculi, ac faciles concoctu, dicuntur. Sed & d Hippocrates inter raram & levem carnem habentes recenset, eūq; viri mulierosi, seu ἀνδρὸς † θυλύφρονος, ἐπανίμιλυ & cognomen tum à piscatoribus ferre, innuit. Recensentur & in Cotyis Thracum Reges convivio. hodie procerum patinas raro implent.

b Arist. H.
A.l. 8. c. 2.

† Arist. H.
A.l. 8. c. ult
† Plutar.
dololert.
animal.
c Arist. H.
A.l. 6. c. 13.

d Hippoc.
2. de vict.
ratione

ARTICVLVS VII.

De Perca marina.


PHycidi PERCAM, quæ Græcis TAB. XIV
πέγκη, Dioscoridi & Paulo Ægineτæ περκίς, licet Plinius in piscium catalogo pro diversis habuisse videatur, dicitur, & nomen à colore, quæ Græci πεγκὼν dicunt, fortita est, propter similitudinem de qua superius subiungemus. Nota ipsi cum paucissimis piscibus communis, quod transversis per tergus lineis conspergatur. Propter istam varietatem Aristoteli est. γεραιμαποικίλη, ut apud Athenæum invenies, quod eadem vivida,

ἀνδρῶσι

5. 6. c. 6.
Aldrovand.
de Piscib.
l. 1. c. 9.


Marzapanus.

Tab. XIII.




Iulis.

Meer-Lunckerlein.




Merula.
Mer Amjel.

Amel-fisch.




Fuca.
Phycis.

Meer-Egle.




Perca Marina.

Meer-Perfisch.




Perca Marina.




Perca

Perca Marina.

Meer-Perfisch.




8




Channe.

Hichula.

10.




Perca.



Canadella.

Kleiner grüpfisch.


11.



Channe.


Grün-fisch.
Grün-maul.

12.



Hepatus.


13



Hepatus.

Leber-Brämen.


14



Melanurus.

Brund-Brämen
em andrer art.


15



Melanderinus.

Das erste geschlecht
der bränt brämen.

16



ἀνδρείου Matroni Parodo dicitur. Duo vero ipsius sunt genera, *Fluviatile* nempe, de quo postea, & *Marinum*. *Marina* nunquam ad eam ad quam fluviatilis magnitudinem excrescit, Ex colore veluti sanguineo nigricat, & vnam duntaxat eandemque continuam pinnam intergore habet. Squammis tegitur parvis. Venter livet, latera purpurant. tergus ex flavo nigricat. Aldrovandus tres proponit. *Primæ* caput, pennæ, cauda ex rubro flavescent, seu potius aureo perfunduntur. Supremum dorsum ferrugineum est, deinceps flavescit, mox per latera & ventrem albicat quidem, cæterum maculæ amethystinæ albedinem operiunt. Pinnarum tergoris nervi argenteo colore, reliquarum & caudæ aureo perfunduntur. Lineæ transversales quæ à dorso per latera descendunt, ad instar labentis ex alto aquæ, argento emicant. Os habet intus album, labra rubicunda. *Alteræ*, quæ Maioris nomine venit, rostro intus & extra rubet, in ambitu flavescit. Tergus rufescit, latera & venter albicant. Squammarum extremitates rubent, dorso pinna tota, & tota fere in extremo crocea. qua Uropygio hæret, dorso concolor est. Branchiarum opercula flava, latis vermiculatisque lineis cineritiis conspersis fuggillantur. *Tertiæ* insigniter dentatæ est, Tergus & caput ex cinereo flavescent. Pennæ & cauda nigricant. Latera cærulea. Venter ad amethystinum inclinat. Lineæ laterales obscure rubescunt, quæ vero à branchiis ad caudam feruntur, in dorso rufæ sunt, reliquæ virides. *Degit a* circa muscosa & algosa faxa. Ad littora Oceani Germanici dum, reperiri Albertus scribit, de petrosis duntaxat & asperis id intellexisse credendus est. Saxatilem esse ex Galeno, Plinio, *b* Oppiano, & Diocle clarum est. Carnibus vescitur. Tam mas quam fœminas faxatiliū more hyeme conditur, quo tempore *c* quoq; satiscat, Marcellius Ficinus celerrimi cursus esse prodidit. In *cibis* salubritatis laude resplendet, hinc proverbium vetus

δ' ἀνδρείου σκορπίον, cum optima possent habentur: sed saporis infulsi gratiā reiicitur. Plinius in *Medicina* invenisse usum testatur. Nam cinerem è capite falsæ, addito melle, verendorum pustulas discutere. eundem admixto sale, cunila & oleo vulvæ mæderi, & suffitione secundas extrahere prodidit.

ARTICVLVS VIII.

De Channe, & Cana-
della.

CHANNE Græcis χάννη si fœmina, TAB. XIV. χάννη si mas, dicitur: (χάννη & 10. II. 12. χάννη corruptū esse videtur) quibus Aldrov. d. *Hiarula* ab hiando nomen indit. *Piscib. l. II. c. 9.* tum habet, non quod moriens tantum hiet, vt Bellonius credidit, sed quod mandibulas ita constitutas habeat, & perpetuo hiare videatur, hinc Epicharmus μεγαλοχάμνονας vocavit. A Speusippo Percæ & Phycidi ob colorum varietatem confertur. Unde Aristoteles citante Athenæo, ποικιλέρυθρον ψήλαται, & ποικιλόχραμνον appellavit. De figura nihil apud veteres occurrit. Tantam ei cum Perca similitudinem tribuit Bellonius, vt pisces penè eosdem esse credas, & pro iisdem vendantur. Salviānus rostrum acumine, pinnarū situ, numero, & figura, oculis, branchiis, cauda, atque pictorato corpore, Percæ & Phycidi similem Channen prodidit mediocritate oris, paruitate dentium, tenuitate capitis, exiguitate Squammarum ouata totius corporis figura, Percæ. Colorum varietate, inferiore maxilla, & branchiarum aculeis, manifestè ab utroque distinguitur. Tergus Channæ ex rubro minus quam illarum nigricat. *Venter* & latera violacea quodam albedine notata sunt. Pinna dorso flavet, quæ vero in imo ventre est, & cauda, rufis maculis insignitur. Ab ore per branchiarum opercula & latera, rubræ quædam lineæ, neque æqualis latitudinis, neque æquis distinctæ intervallis vsq; fere ad caudam dedu-

a Oppian. Hal. l. I. v. 121.
b Oppian. Hal. l. I. v. 121.
c Arist. H. A. l. 8. c. 15.
d Zenob. Diogenian. & Suida.
e Plin. H. N. l. 32. c. 9.

deducuntur. Maxilla inferior non solum rubet, sed superiore etiam prominentior est. ideo perpetuo hiare videntur. In posteriore branchiarum operculi parte duo sunt *aculei* albi & acutissimi, non magni tamen, quibus Phycides & Percæ destituuntur. Ventriculorum & intestina ampla habet, *hepar* subalbidum. *lienem* subrubrum. *Calculos* in capite gerit, quod ex Bellonio habemus. *Locum* ipsi in pelago † Aristoteles assignavit; sed † Arist. H. A. l. 8. c. 13. a Oppian. nec piscatorum experientia abludit. Hal. l. 1. v. 124. Sola carne *b vescitur* carcinis inprimis, & dum per impetum pisces infestatur, sæpe in os ventriculus † pro- Natur. fa- cidit. *Sexus* discrimen c ambiguum in cult. l. 3. eis. Omnes enim vulvas habere traduntur. & omnes ovis capiuntur gravidæ. Rem se ita habere, ex plurimarum sectione Rondeletius didicit, in- b Arist. H. A. l. 8. c. 2. usitatumque hunc conceptum plurimæ horum piscium fecunditati ad- Plin. H. N. scribendum retur. Mare ova perficit, & vice maris fungitur. DE CANADELLA, (sic Martegue stagni accolis vocatur) sic Bellonius. Ligustico mari cognitissima Canadella elegantem ac varium habet colorem, &c.

ARTICVLVS IX.

De Hepato.

TAB. XIV. 13. **P**isces qui Græcis à colore & magnitudine hepatis Hepatus, à colore rutilo & subobscurο λεβίας vocatur, Hermolaus *jecur marinum*, Gaza *jecorinum*, Galeni interpres *jecorarium* nominat. Diuersum ab Hepato Æliani, pisce a breui & oculis conuenientibus, cuius pupillæ ad cyanæum colorem accedunt, sequentia ostendunt, Anille, qui ἐν τοῖς μύχοις τῆς θαλάττης, b Ælian. in, b habitat, quia ad natandum, quavis magnus, segnis, circa latibula sua duntaxat volutatur, idem sit, affirmari vix potest. Descriptionē si spec- c Athen. l. 3. & l. 7. tes, Phagrum c Erythrinum & Hepatum pro similibus posuere veteres; sed illum rostro breuiorem, ferratis dentibus, colore nigro, oculis habi-

ta totius ratione maioribus, cauda macula nigra insigni, corde trigono, eodemque quod de suprema forte parte, quam αὐλὸν φλεβοενεργόδα vocat Aristoteles, sumendum est, nisi de hepate potius id dici debeat, albo, felle nullo, additum: nec omiflum calculos in capite gerere, solitarium esse, & paucas ventriculi d appendices habere. Hæ notæ an Belloniano, H. A. l. 2. c. 17. qui Gesnero describente. Piscis est unde quaque fermè rubicundus, circa ventrem albicat, in dorso dimidia sui posteriore parte tribus maculis atris notatur, ultima caudam attingente addente Bellonio. Squammis integitur asperis. Dentes habet quā Phycidis obtusiores, qui pectinatim coeant. Calculos in capite gerit, penes lectorem sit iudicium. Aldrovandus hunc cuius icon apponitur, ponit, & Rondeletii Hepatum, qui modernis Græcis δειπυγῶ, verum Hepatum esse opinatur. Et sane piscis est Pagro similis, oculis maioribus, quam pro ratione corporis ut Melanurus; colore obscuro seu ex caruleo nigrescente, pinnarum numero, situ aculeisque Pagro similis, latiore maioreque cauda, in qua maculam Melanuri instar nigram habet. Dentes ipsi non lati sed rotundi & ferrati, Branchiæ utrique quaternæ, ventriculus cū appendicibus quatuor magnus. Intestina tenuia, *hepar* album sine felle, cor angulatum, in cerebro lapides duo. Verbo, optime cum illo quem ex veteribus descripsimus congruit. *Moribus* videtur esse insulsis, & parum ad vindictam pronus, quod apud Athenæum facete Eubulus innuit. Carnis in medio duræ & mollis esse, apud e Galenum legimus. Frixi e Galen. l. 3. de Alim. & paucosale aspersi in cibo sunt suavissimi. Hepar tritum & emplastri modo impostum, omnem tumorem & podagram sanare mentitur Kiranides.

* *

ARTICVLVS X.

De Melanuro, & Alpheste.

MELANVRVS à nigredine caudæ quasi Nigricaudam voces, ita dicitur. falso *oculatum* Gaza appellavit, quia tanquam diversi pisces à Plinio ponuntur. An Plauti Ophitiam recte dixeris, quod Ronderetius fecit, iudicio Tuo relinquo.

Athen. I. *μελανόραμνον & πολύραμνον* Athenæus dixit, quod nigræ lineæ latera eius pingant. Hicestius Sargo similem seu corporis figuram, seu nigram caudæ notam spectes, fecit: sed hæc & in sparō, qui *ὀρροπρόσικτος*, invenitur. Palmi magnitudinem aliquando superat, nec amplius quam vnam vel sesquilibrium pendit. *Squammis* tegitur, latis, nec facile deciduis. Os habet parvum, dentibus parvis minutum. *Oculos* secundum corporis proportionem maximos ex cæruleo nigrescentes, pinnarum numero, situ, & figura, branchiis, & cauda cū Aurata convenit, hæc latam ac nigerrimam notam habet, latera lineis nigricantibus à branchiis ad caudam deductis pinguntur. Ventre est subalbido: dorso ex cæruleo nigricante. Quantum ad *interranea* Hepar habet magnum, ex quo fellis folliculus pendet. Venter medium. Cor angulatum, in ventre *vescam* aere plenam, crassam, & densam. Quæ Aldrovandus depinxit, & cuius hic Iconem damus, totus ex cæruleo amethystinoque nigricat, præter squammarum extremitates & extremum oculorum circulum, caudæq; initium, quæ auro resplendent, pinna nigricant. Uropygium supinum candicat, primum intense violaceū, & velut nigram maculam constituit, *Vescitur*, prope littora in arenosis locis balgæ. Ideo vix vere saxatilis dicitur. *Ælianus* c. varias incolere sedes tradit. Bellonius in Oceano Gallico perrarum, in Mediterraneo frequentissimum. Iovius Romæ ra-

ro videri, sæpe Neapoli prodidere. Tempestate fervente d. *Ælian.* cibis quos e. *H.A.L. I. 6.* faxis cruunt vivunt, & abiectissima quoque, quæ alii pisces nisi urgentē fame non attingerent, sectantur; feno mari in solo fabulo pabulum inquirunt, imo quia vagabundi pisces sunt, non vno solo pabulo contentos esse verisimile est. Sane in e. Stabiāna Campaniæ ad Herculis petram Melanuri in mare panem abiectum rapiunt. Timidissimos esse piscatores testantur, f. hinc *ad egees* g. Op. f. *Ælian.* piano. Neque massa capiuntur, nec ad eum accedunt. Mari quieto, in ima eius sede ad petras & algas qui-escunt, quocunque tandem regumēto protecti, fluctuante, cæteris ob impetum descendentibus, ad petras adnatant, & spumam ad sui tutelam tum sufficere, ac si natura edocuiisset, nec tētari iratum à piscatoribus mare, arbitrantur. Hepate tamen caprillo, & massa ex pane & caseo facta capi, Tarentino & h. Oppiano debemus.

Laudatur in cibo à Xenocrate, cui Hicestius i. accedit: à Matrone Paro- do reiicitur, illi forte si alga viscatur, huic si cæno & sordidis maris excrementis.

ALPHESTES piscis ab inveniēdo, TAB. nescio quare dictus, *Cynadus* quoque XV. I. quasi præpostera libidinis studiosus (fama est k semper binos capi, & al- tērum alteri ad caudam comitem vi- deri) vocatur.

In *Descriptione* variatur ab authoribus si calorem sesteris. Veteres omnino cerei coloris, purpurascētes tamen, quibusdam in partibus faciunt. *Plinius* solos piscium luteos esse testatur. Apud *Rondeletium* & *Bellonium* corpore est Pagro strictiore, figura Mœnis similis, pedali magnitudine, dentibus ferratis caninis similibus; dorso purpureo, cæteris partibus luteis, squammis in gyrum crenatis, multascabritie horrentibus. A cervice ad caudam spinas tenui membrana connexas, unde *μονάκων* habet.

Aldrovandus Cinædum totum fere Pagri modo rubentem, & aureis, argenteisque maculis exiguis, rotundis re-

TAB.
XIV. 15.
16.

Athen. I.
7.

b Columel-
la R.R. I.
16.
c Ælian.
H.A.L. 2. c.
17.

h Oppian.
Haleut. I.

3. v. 459.

i Athen.

l. 7. Dipn.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

l. 7.

dis respersum, quam Illyrici Sebeni-
censes Cagnizam quasi Catullientē
vocat, profert: dat tamen & *alium*
tergore amethystino, lateribus ferē
cæruleis, ventre candicante punctis
cæruleis notato, pinnis tergoris & re-
tro anum viridentibus, illa etiam ma-
culis rotundis viridibus insignita.
Cætera pinnae & cauda ex aureo ru-
bescunt.

Rondeletij Cinædo similis est ille
qui Venetis *Brasavola*, Lusitanis *Sal-
moneta* vocatur. Rufus est toto cor-
pore, cauda lutea maculis fuscis di-
stincta, extremitate æquali non ar-
cuata. *Macula* nigræ ad pinnarū, quæ
luteæ sunt, iuxta branchias initia ha-
bentur. *Linea* ruffa à branchiis ad
caudam tendit, punctis intercepta
nigris. De natura Alphestis nihil pla-
nè occurrit, *Rondeletius* carne &
substantia eadem cum saxatilibus ef-
se dicit, tenera nimirum molli, &
minime glutinosa.

ARTICVLVS XI.

De Coracino.

TAB. **C**oracinus, Gazæ, *Corvulus* &
XV. 4. 5. *Gracculus*, Salviano *Corvinus*, Au-
6. sonio † *Corvus*, Tarentino forte κορ-
† *Anson. E-* κινός, seu à colore nigro, vt Oppiano
pist. 4. a placet, qui apud Vitruvium Cora-
a *Oppian.* cinus; seu quod ὁ ἀσ κόρος κινεῖ, quod
Hæut. l. pupillas moveat, vt Athenæo b vi-
I.V. 139. sum est, nomen sortitus videtur, nisi
b *Athen.* forte iliud amnico, hoc marino ma-
Dipn. l. 7. gis conveniat. Anidem σαπέρδης, πλά-
γισακός, Nili accolis πέλτη, Alexandri-
nis ἡμίτης, quod *Rondeletius* volu-
it, dictus sit; an vero, quod Aldro-
vando probatur, Saperdæ nomen
Coracino amnico Platistaci eidem
profecte ætatis, Peltæ & Hemineri,
Nilotico duntaxat sit proprium, in
dubio relinquo. Μύλον, non esse Do-
e *Plin. H.* rionis apud Athenæum verba osten-
N. l. 32. c. dunt.

In eo ponitur à *Rondeletio* censu,
f *Athen.* qui mare simul & flumina frequen-
l. 8. tant: quod & apud e *Plinium*, f *A-*
g *Strabo.* thenæum, & g *Strabonem* inveniri
Geogr. l. credit, sed quia saxatilem esse ab e
17.

Oppiano & Aristotele proditum, &
excitatis authoribus Coracinum dū-
taxat in Nilo esse; quin quod apud
Pliniū legitur, Nilo peculiares, col-
ligitur; nec vllum piscem ex mari in
Nilum ascendere propter Crocodi-
lorum metum, præter Mugilem, A-
losam, & Delphinum *Strabo* affir-
mat, duo potius Coracini vt Percæ
genera dari credendum est, quam
easdem anni & mari communes. Et
sane multos in Mæotide palude de-
gere & Dorione: plurimos in lacunō
procul Oceano è monte inferioris
Mauritanix originem trahente sta-
gnante, quam Nilidem vocant, ac
Nili ortum credunt, ex *Plinio* disci-
mus.

Quis *veterum* genuinus Coraci-
nus sit, haud tuto affirmari potest.
Speusippus Melanuro similem, dixit.
Aristophanes ob alarum nigredinē
μελανπέρυγον, *Numenius* ob varieta-
tem linearum ἀόλην vocavit, A *recen-*
tioribus quoque diversimode descri-
bitur. *Bellonius* pro eo piscem mari
& fluminibus communem ex Glau-
corum genere, *Pesce Scarpa* Comen-
sibus nominatum, obtrusit. *Ronde-*
letius suum ita describit. Coracinus
piscis est marinus &c. *Salvianus* du-
plicem dedit. Prior qui Romæ sim-
pliciter Corvo & Corvetto dicitur,
rostrum habet breve & tetusum. Os
&c. Alter, qui Corvo de Fortiera Ro-
mæ, Niger, iure merito, vt prior al-
bus, quia multo minus nigricat, cen-
sendus est. Rostrum, ore, Capite, oculis,
pinnis, cauda, totius corporis figura, &
interaneis omnibus cum priore cō-
venit; in eo discrepat, quod totus fe-
re nigricet, aculeum, cui ani pinna
inhæret, maiorem & validiorem ha-
bet. Pedalem magnitudinem nun-
quam superat, & saporis suavitate,
carnisque teneritudine inferior est.
Gesnerus Corvulum colore rubro de-
pinxit.

Inter h gregales ponuntur Coraci-
ni: hyeme i latent, nec nisi statis die-
bus, iisque semper capiuntur, quod
& *Rondeletius* affirmat. Nunquam
messe Tritici pariunt, sed autumno
foetificant inter algas; longo tempo-
ris spa-

h *Aristot.*
H. A. l. 9.
c. 2.
i *Aristot. H.*
A. l. 8. c. 15.

ris spacio vterum ferunt, & inter mi-
nora genera piscium celerrimo in-
cremento perficiuntur. Anno squal-
lente melius valere, quia per siccita-
tem tepor accidit, ab Aristot. pro-
ditum est.

An aduersus arborum formicas
polleant, quod ex Palladio Caelius
Rhodiginus, qui pro Coracina pice,
Coracinum piscem legi debere ait,
affirmat, ignoro. Rondeletium cer-
te experimētum tesellit, sed & huic,
vero veterum Coracino fidem non
tentasse, obiicitur. Meliores sunt cū
vterū gerunt. Nilotici marinis, e-
lipsis assi, præferuntur, m Hicēsius,
parum alere, facile excerni, succi ef-
se mediocriter boni, dixit.

Vsum in Medicina quod spectat, la-
pides in capite repertos calculos cō-
minuere, vel pituitam ex qua cal-
culi gignantur exsiccando vel pon-
dere seu pellendo, idque sibi experi-
entia cognitum, reliquit Rondele-
tius.

N. Corvuli iconem refert Tab. 2.

ARTICVLVS XII.

De Exocato seu Adonide.

TAB. XV. EXOCAETVM, qui Adonis & Cirr-
his, fortè & κίρρα, & κίρρα, aliis, in-
ter saxatiles esse Athenæus testatur.
Squamosus sit an lævis dubium.
Nomen ab eo invenit, quod in litto-
re seu sicco dormiat. Subruffum ef-
se, corpore tereti, littoralis & pusilli
Cestrei magnitudine, cui digitorum
octo longitudo maxima est, piscicu-
lo Hirco, (Mœnam marem, quo tē-
pore dat operam soboli hunc putat
Casaubonus) præter nigram sub al-
vo maculam quam Hirci barbam vo-
cant, simillimum facit Athenæus, a
inque eodem à branchiis in vtraque
corporis parte lineam albam vno
continuo tractu ad caudam vsq; du-
ci addit. Rondeletius sequentem I-
conem pro Adonide posuit. Piscis
vero est semipedali magnitudine,
forma tereti σκοπύρι secundum A-
thenæum, secundum Oppianum
ξωθός, seu colore aureo, partibus

quibusdam virefcente, magis rube-
fcente aliis. Corpore Mœnis iam fortis
aut Gobionibus similis Branchias ha-
bet parvas, à branchiis ad caudam li-
neam candidam continuam.

Miratur eum Arcadia, tamen &
in litore Monspelium stertentem,
sæpissimè vidit Rondeletius. Quod
vero Exocætum circa Clitorium vo-
calem & sine branchiis tradit Plin-
nius, impossibile videtur, & habere
ostendimus. Nec quicquam de istis
Pausanius de vocalibus in Arcadia
creditis duntaxat agit, & diversus ab
Exocæto marino fluvialis ποικιλός.
Diutina in sicco vita; quod magna
aeris copia aqua suffocari possit, ob
rimæ branchiarum angustiam non
trahatur, causa, d Rondeletio. Pro-
pter eandem & Anguillas diutissime
etiam sub terra vivere, credit: sed,
quia in aqua, quæ frigidius elemen-
tum, sueti vivere pisces, & anguillæ
sine easenis diebus & Aquilone spi-
rante, qui frigidior ventus est, Au-
stro paucioribus, reliqui diutius ver-
no quam æstivo tempore vivunt, dif-
ficulter, nimia aeris frigidi attractio-
ne extra aquas lædi posse pisces, per-
suadere poterit. Vide e Scaligerum.

b Plin. H.
N. l. 9. c. 19

c Pausan.
in Arcad.

d Rondelet.
l. 4. de pi-
scibus mæ-
rinis c. 9.
Plin. H. N.
l. 9. c. 19

e Scalig.
Ex. 273

ARTICVLVS XIII.

De Sciæna seu Umbra, & Glauco Bellonii.

Piscis qui Græcis vulgò σκοινα, Xe-
nocrati σκίνας, σκινάδης & σκινάδης. Græ-
cis modernis σκίνα, nonnullis μυλοπόσσι-
ος, is alicubi Ovis marina, commu-
niter Latinis Vmbrina & Umbra, seu à
colore nigrescente, quam vmbro-
sum Isidorus, luteum Ovidius vocat;
seu à lineis quibusdam obliquis à
dorso descendentibus aureis & ob-
scuris, quæ aliarum apparent vmbre;
seu quod dum movetur adumbran-
tem quandam oculis colorem iridis
in morem rutilat; seu à proverbiali
ioco, quo σκίνας dicebantur, qui non
vocati ad convivium veniebāt, quasi
multi convivas secuti essent, cum de
hoc pisce edendum erat, dicitur.

TAB.
XV. 9.

Aldrov. de
Piscib. l. 1. c.
17.

Piscis est cetaceus, LX. plerumque librarum, quatuor plus minus cubitos longus. *Squamma* eius veluti obliquæ apparent, in Oceano nigriores & quasi opacæ; in Mediterraneo argentei, aurei, atque interdum ab his varii coloris, iridem dum piscis agitur imitantur, quod Bellonius prodidit. Rondeletius ei lineas obliquas quasdam aureas, manifestas, alias aliarum veluti umbras attribuit. Aldrovando fere unicolor est, tota videlicet ferruginea, in dorso, supremo capite, pinnis, & cauda obscurioris coloris; in ventre, lateribus, & branchiarum ossibus dilutioris, quia ad amethistinum inclinat. Salviano, dum parva est argentea ferè tota apparet: maior facta, ventre argenteo, dorso verò & lateribus subliventibus ac veluti opacis conspicitur. *Caput* ex descriptione Salviani habet magnū: in dorso duas *pinnas*, quarum prior ostionis aculeis, nullis altera munitur, ad branchias, quas quaternas utrinque habet, vna utrinque enascitur; duæque aliæ in ventre conspiciuntur, imo ab ano vna alia hæret. Coracino tam similis est, ut ichtyopolæ vnum pro alio substituant, magnitudine differunt. Sed & pro Glaucosupponitur, in eo diversus, quod *dentes* in oris ambitu raros, firmos, acutos, prominentes, terrestres, caninis longiores, & graciliores, quæ habeat; (negant habere Aldrovandus & Rondeletius) quorum superiores inferioribus maiores, sic maxillæ inhærent, ut ipsius pars esse videantur. De *Verruca* sub mento cōtroversum: affirmant quidam habere, negant alii. *Caudam* in angulos veluti desinentem gerit, ut Scari & Iulides. *Calculos* in capite habet prægrandes, quorum Aristoteles & Plinius meminere; *ventriculum* magnū & carnosum; *intestina* mediocria & pingua; *jecur* pallidum, ex quo felle vesica pendet. Lienem subatrum.

Columel.
R.R. l. 8.
c. 16.

Marinum piscem omnes fatentur, sed de loco non conveniunt. Arenosos gurgites melius eas pascere, Columella prodidit. Oppianus petræā

cognominat, & saxa herbosa incolere asserit, hisce & Galenus accedit.

Quia perraro plures capiuntur, *solivaga* potius quam gregalis esse creditur. *Carnivora* & agilis, & propter lapides in capite frigoris impatiens. Dum caput recondidere, latere se totas Struthionum & Phasianorum instar, putant. Oppiani id fide asseritur. Cibos quod spectat. Inter nobiles ab Ennio, Epicharmo, & Numenio pisces numeratur. Romæ inter sapidissimos, canicularum inprimis tempore censetur, & paritum cum Siluris precio venundari solet. Capita Triumviris rei Romanæ conservatoribus dono dantur, de quo facta est apud Iovium de Tanusio historia. Apud Pictones ex aceto & capis minutim concisis editur. Salvianus cum læucophago comestam, caryophyllis transfixam, ac verrubus assatam laudat. Arcestratus gulæ suo tempore procerum princeps, nobilem capitis condituram multis carminibus expressit. De *Carnis* salubritate non conveniunt Authores. Galenus Philotimum quod eas mollis carnis piscibus adnumerarit, reprehendit. Xenocrates bonum ex eo nec admodum copiosum succum generari, & saporis esse iucundi scribit.

Oppian.
Halient.
l. 4.

Galen. l. 3.
de Alim.

Invenit & in Medicina usum. *Interranea* & *squammæ* combustæ, pannos teste Plinio discutiunt. *Lapides* argento inclusi tanquam colicæ amuletum gestantur. Non emptos, sed dono datos gestari debere, nugacis vulgi delirium est.


Tab.
XV. 10.

GLAUCVS Bellonii pelagius est piscis, ex eorum qui plures patinas implent numero, Luræ in visus, Genuensibus frequens, apud quas *Fegarus*, ut apud Venetos Corberus, quasi Corvulus dicitur. Massiliensibus & Romanis nullo alio quam *Vmbrina* nomine venit. Ita de eo Bellonius.


* *
* *

ARTI-


Alphgetes Cinctus. Steinfisch.




Cinctus Alphgetes. Tab. XV




Coracinus. Meer Rapp Sa rapp.




Cinctus alio




Coracinus niger. Schwarzer Meer Rapp.




Coracinus minor.




Ammocatus. Exocatus Sandaal. Ammodites.




Adonis Exocatus Ballenij alaudis adnumerandus.




Glaucus. Meer Bleuling.





Umbra. Meer Schatten.




Gobius maior. Gofn. Paganelus. Großer Meer Groppe.



Gobius minor. Kleiner Meer Groppe.



Acus. alia Species ein ander Hornfisch. Meer Nadel.




Acus minor. Kleiner Hornfisch.



Acus maior Meer Nadel der groffer.




Acus alia Meer Nadel ein ander art.




Tab. XVI.

Anthias Rondelli. rond Kopf.




*Anthias Rond.
asellus conformis.*




ein art bolch.


Anthias tortus.



Anthias prior.




Anthias secundus.





Anthias quartus.

meertrofel.



Anthias Conger.





ARTICVLVS XIV.

De Anthiis.

TAB.
XV.
1.2.4.5.6.
7.

ANthiarum nomen omnibus piscibus latis imposuit Bellonius, sed malè: nec idoneum testem habet; nec omnes lati tam pulchri, ut vel Anthiæ, vel Callichtydes, vel Callionymi dici possint. Ex squammosarum esse genere, dubium; à corporis floriditate nomen apud Græcos accepisse, certum. Ἀνθωπίαν eundem ipse Aristoteles facit. Athenæo κύνικτος & κακυνόμω & dicitur, ἔλκωτα vocavere quidam, quo nomine & ille cui squammæ contra aliorum piscium morem ad os versus tribuuntur, insignitur: *sacrum* alii seu quod magnus sit, ut morbum comitiale, qui magnus est *sacrum* dicimus: seu quod quo loco Anthias est, ibi nullam bestiam esse confessum sit, vocant. Hicetius λύκων dicit tradit, quod malè in λύκων Rondeletius vertit. Hesychius enim ἰχθύν ποιόν λύκων appellari asserit. Quatuor ipsorum genera ab Oppiano ponuntur.

Oppian. Ζαντοὶ δὲ γεννοῖτε, τὸ δὲ πρῶτον ἄμα κα-
Halicut. λαινοί.
l. l. v. 254. Ἀλῆες δ' ἐν ὀπίσῃ τε, καὶ ἀνθωπῆς κα-
λαῖσιν.

Sunt flavæ & niveæ, sunt atro sanguine fusæ

Euops atq; Auceps alios hoc nomine dicunt.

Totidem & Rondeletius posuit; quorum vix aliquis, cum omnes dentati sunt, Anthiæ verò Oppiano edentuli, probatur. Prior totus corpore & pinnis rubens, Pagri aut Cinædi modo, ad imberbes Mullos referri potest. Alter Afelli species est: quod neque salitus, neque vento siccatus, servari potest, vel calidiori in Gallia cælo, vel occultæ qualitati adscribendum est. Tertium ad Turdos pertinere stellulæ, quas in pinna ad anum gerit, & corporis forma testantur. Oculos habet magnos, rotundos, purpureos, & rubros. Podicem magnum è quo *intestinum* rubro viridique distinctum excidit. Pro quarto, (huius generis

Oppianus ἐν ὀπίσῃ καὶ ἀνθωπῆς vocat, id est ἐν ὀφθαλμοῖς & ἐν πτερύγεσσι καὶ ὀφθαλμοῖς, ut Scholiastes meus exponit, Alianus *Alian. H. A.* cetacci generis & ore robusto facit, l. 13. c. 17. squamosus & latus piscis, quem ex eo, quod supercilia oculos ambient, Aulopiam esse colligas, ponitur. *Aldrovandus* quatuor quoque Anthiarum nomine è diversis locis sibi missos ponit, sed pro iis non obtrudit. *Primi* venter totus argenteis squamis resplendet: lateribus aureæ intermiscentur. In dorso, quod fuliginosum, unica tantum pinna duodecim armata aculeis visitur, ventris pinnæ ad castaneum vergunt. Branchiarum opercula ex auro & violaceo variant. Labrum inferius tum intus, tum foris ex flavo virefcit, quod peculiaris notæ loco esse potest. *Alter* toto dorso pinnis duabus dorso & quæ retro anum est, viret. Vertice capitis aterrimo, cervice & labro inferiore interna parte purpurascens. Ossibus branchiarum auro resplendentibus, ventre toto argenteo purpura permixto. *Tertius* tam amplis violaceis toto corpore variegatur, ut violaceus quasi totus videatur. Pinnarum numero cum superioribus convenit, quæ ad branchias, vergunt ad violaceum, & in extremo rosæ sunt. Iris oculorum & mentum roseo sanguineove colore, specificam & ob quam solam dignosci potest notam, in eo constituunt. *Quarto* inuistata est oculorum ac præsertim pupillæ magnitudo & pulchritudo: iridem ex auro roseoque permixtam habet. In capite retro oculos, cervice, & ad branchias, amethystin, o aureo, argenteo, cæruleoque variat. Labrum superius habet viride, inferius cæruleum: *linguam* maximam candicantem. Ventrem primum viridem, dein argenteo & auro ad podicem usque splendentem, ad caudam usque roseum & sanguineum. *Locus* Anthiis in saxis, quæ tamen aliquando, cum ἀνθωπῆς οἱ σπέρματα εἰσὶν, deferunt. *Ανάγκη* δὲ πᾶσι τὸν χῶρον ἀχρεὺς εἶναι, † locum absque bellicis † *Alian.* esse ubi habitant: quod fortè inter *Hist. Anti-* φύσεως ἀπὸ τῆς ἰσχυρῆς reputandum est. Unde *mal.* l. 8. c. 28.

facri, ut superius dictum dicuntur.
 Plin. H. N. Cum unum hamo teneri vident, lineam se-
 1. 2. c. 59. care asperitate dorsi fortè, traduntur, eo
 qui tenetur extendente, ut secari possit.
 Capti οὐκ ἔστιν εἰς θαλάσσιον, ἢ ἀποθησισκόντες
 ἑαυτοὺς εἰκόασιν θένειν καὶ ἄποδον πνὸς ἱκετέειν.
 Ælian. H. miserabile præbent spectaculum & mor-
 A. 1. 12. c. tem suam lugere, & quodammodo suppli-
 47. care videntur.

De ipsorum capiendi modo ita
 Plinius. De Anthiæ piscis sileri convenit,
 quæ plerosque adverte credidisse. Chelido-
 nias insulas diximus Asiæ scopuli maris
 ante promontorium sitas, ibi frequens hic
 piscis & celeriter, &c. : Censentur ab
 Eustathio inter eos pisces, qui ἀντρω-
 πῶ φασι, quod ob magnitudinem sum-
 ptuum, ganeorum opes exhauriant:
 sed & θεοὶ Dii, quod preciosissimi sint,
 vocantur. Carnis est solidiusculæ.
 Unde χονδρώδης apud Athenæum
 (malè χυδρώδης) dicitur.

Fel cum melle inunctum, exan-
 themata, tubera, scrophulas, & do-
 thienas sanat. Lapidēs capitis ad col-
 lum ligati, Cephalalgiam domant.

ARTICVLVS XV.

De Gobiis squammosis saxatilibus.

TAB.
 XV.
 II. 12.

Gobiorum historiam loci & tegu-
 menti differentia intricatam facit.
 Nobis desquammosis saxatilibus
 hic res est, eisdemque littorales
 adjiciemus, ne de iis pluribus in locis
 agere cogamur. Græcis dicitur κορίος,
 Numenio apud Athenæum κορίδιον,
 quem per κορίδιον Phavorinus explicat;
 Athenæus Dipnos. 1. 7. Latinis Gobius, Gobio, Govius, ut apud
 Tzetzes Ovidium, & Cobio ut apud Plinium
 Varior. Ælian. H. A. legitur. Parvi sunt tam illi, qui in ma-
 1. 17. c. 6. ri, quam qui in aquis. Tzetzes tricub-
 itales fama accepit, quod fortè de
 illis, qui in rubro mari, prout ab Ælia-
 no proditum, sumendum est. Bello-
 nius ex saxatilibus album quendam
 facit, quem Græci χαλῶρον & καυλίνην,
 Rondeletius flavescentem seu pal-
 lidum vocat. Est is palmi longitudi-
 ne, toto corpore rotundo, non com-
 posito & spisso, squamis rotundis te-
 cto, colore vario. Nigris maculis

conspergitur, oculis sursum potius
 quam deorsum spectantibus. Ad
 branchias pinnas duas habet, in ven-
 tre non duas cæterorum more, sed
 unicam non divisam, quâ notâ Go-
 bii maximè à reliquis piscibus inter-
 noscuntur; à podice aliam, in dorso
 non unicam velut alii saxatiles, sed
 duas, prior minor est, altera ad cau-
 dam usque extenditur. Dentes ei
 parvi, os magnum, ventriculus; cum
 multis appendicibus capax. Aristot-
 oteles complures supernè circa eum
 exire scribit. Hepar ipsi album non
 sine errore tribuit Hicetius. Qui Al-
 drovando Venetiis missus est, pinnas
 habebat intergore binas coniunctas,
 quarum prior aculeis vigeat, altera
 levis erat, binas item in pectore, toti-
 demque ab ano omnes nigras. Cau-
 dam & superiorem partem corporis
 nigra. Ventrem candicantem.

Ex littoralibus duplices apud Au-
 thores invenio. Albos & nigras.

Illos Rondeletius ita vocat, non
 quòd tam candidi sint, ut cum aliorum
 piscium candore contendere
 possint, sed quòd candore cæteros
 Gobios superent.

Nigras ita Bellonius describit. E-
 minentes ac turgentes supra caput
 oculos gerunt. Cornea tunica alba, &
 ut serpentibus dura obductos, ad-
 versus aquarum impetum, & ut sur-
 sum facilius ut Uranoscopus cer-
 nant. Vix excedunt duorum polli-
 cum crassitiem aut palmi longitudi-
 nem. Rarè enim pedales & brachia-
 les evadunt. Et si autem lubrici sunt,
 tamen squammis integuntur hirtis,
 pinnamque habent unam in tergore
 continuam mollem & sine aculeis.
 Pinnae utrinque quatuor latas atq;
 obtusas, ac præter has sub ventre et-
 iam duas; sed ea, quæ caudam con-
 stituit, rotunda est. Dentes exerunt
 parvos, tenues, & subrubros. Corpus
 teres est, paucis spinis refertum, Color
 varius. Etenim qui Gobiones circa
 algam versantur ad viridem incli-
 nant, alii ad cinereum accedunt,
 nonnulli albicant, alii ex fulvo in ni-
 grum degenerant. Omnes grandio-
 res sunt capite & lata cervice. At
 quod

Aristotel.
 H. A. 1. 2.
 1. 2. c. ult.

quod ad internas eius piscis partes attinet: peritonæum Gobionibus foris album est, intus nigerrimum, *Hepar* dextro lateri magis incumbit, pallidum, de quo *se* pendet veluti *janthinum*. *Intestina* multis circumvolutionibus inflectuntur. *Stomachus* est oblongus, pylorus multis apophysibus præditus vulva undecunque ovis referta.

Facit & Rondelietius Nigri mentionem, quia Venetis Go, à Gallis Boulerot nuncupatur. Digni is est magnitudine & crassitie, corpore rotundo ferè, non compresso, loco binarum pinnarum, quæ cæteris sunt in ventre, unicam habet nigram, barbam inquit dices, & exinde Athenæi *πέρδον* seu hircum, cui *Exocærum* confert, esse judicat. Vivit in littoribus & stagnis marinis.

De *Loco* proprio ambigitur. Ovidio littorales sunt, Diocli saxatiles, cui *Synesus* accedit, dum circa Africæ quoddam littus, loco petroso capiscribit. Aristoteles in fluviis quoque pinguescere ait. A Theophrasto proditur in Ponto regione apprehendi in glacie Piscium maximè Gobiones, non nisi patinarum calore vitalem motum fatentes; quod fortè de lacustribus vel fluviatilibus sumendum erit. Oppiano *λαμψοίσι καὶ πέτρῃσι* gaudet. Pariunt juxta littora, suaque ovaliuscula & arenida, ut Aristoteles prodidit, lapidum amplexibus mandant.

Ab Æliano inter illos ponitur, qui *πικρὸν ξαντὸν ἰόν ἀφ' ἑαυτοῦ*. *Venenum pungendo immittunt*, annumerantur; Oppianus quoque *κέντρον ἀδύνατον*, *aculeos lethales* ipse tribuit, quod nec cum Ovidio, cui, *spina nocivis non gobius ulla*; nec cum Martiale, cui in terris Venetis, *principium mensæ gobius esse solet*, congruit. Et sanè invenit, & in cibis usum, et si Juvenali vilissimus videatur Alexandrides in Cotyis Thracum Regis convivio eos nominat. Antiphanes laudat, Phalericos in primis. Archephonti parasito, qui in Ægyptum ex Attica, à Ptolomæo Rege ad cœnam invitatus, navigavit, Gobiorum frusta tria non sine stupore convivis o-

mnibus visa, apposita sunt. Iovius enim persuavem, & pingui ténertudine delicatum facit. Galenus ad voluptatem, digestionem, & probum succum gignendum præstantissimum, ait. Mnesitheo *ὕδαρ* sunt & *πρόφιμοι*, Hicestio facile externuntur, & non multum nutriunt, flavescuntium substantia rarior & magis putredinis experts. Apud Hippocratem parem in alimonia cum Dracone, Callionimo & Cuculo vim obtinet. Assus & sine sale mansus, nimia egerendi desideria sedat, si Kiranidi credendum, illitum, canum rabidorum, serpentiumque moribus prodesse Dioscorides prodidit. Dorycinii vim, crudum, tostum, elixum infringere, apud Nicandri scholiasten legimus.

ARTICVLVS XVI.

De *Sphyrana* sive *Sudi*.

SPHYRÆNA, cuius præter Ovidium nullum alium meminisse, *TAB. XVIII.* perperam scribit Plinius; nam inter Græcos Aristoteles, ex Latinis M. Varro meminere; Atticis *κίσσες*, ut Athenæus affirmat, (significat hoc, ut & *κίσες* stimulum aut stylum item reli genus bello Persicò inventum) Latinis *Sudis*, ut apud Plinium videmus, Gazæ *Malleolus*, sed malè, Romanis *Lucius marinus* vocatur, sunt qui pro Oxyrincho, quia acuminato est rostro, sumunt.

Duas ipsarum posuit species Rondelietius ex Oppiano, sed tam dissimiles, ut an ex eodem sint genere dubitari possit. Prior enim squamosa à capite ad caudam lineam habet, altera squamis omninò destituitur. Totidem & Bellonius innuit, quarum una Trachurum colore refert, atque eodem modo sub ventre albicat. Altera senescens Mormyri laterales picturas colore assequitur. Quaternæ vix libram pondent, ut optimè Plinius magnitudine inter amplissimos rarum scripserit: visi tamen aliquando bilibres, Colore Afellum æmulatur. *Rostro* est foris cœlato, in extremo cuneato, nigro. *Ore* valdè rescis-

Galen. l. 2. de Aliment.

Hippocr. l. de inter. affect.

TAB. XVIII.

Athen. Di. pnos. l. 7.

Plin. H.N. l. 9. c. 2.

Plin. H.N. l. 32. c. 11.

Athen. Di. pnos. l. 8.

Aristot. H. A. l. 8. c. 19. Theophr. l. de piscib. in sicco.

Oppian. l. 2. Halieut. v. 457.

Martialis in Xenis.

Athen. l. 7.

rescisso. *Maxilla* superior quæ obtusa & brevior, cum inferiore, quæ acuta & longior ita coit, ut vix oris rostrive scissuram ullam diceret. *Dentes* utrinque habet, in superiore maiores, in inferiore minores. In ipso oris hiatus unus est, cæterorum longissimus & acutissimus, qui ore clauso in foramen anterioris ac membranae partis ita fuscipitur, ut extrinsecus etiam paululum emineat. *Lingua* scabra est, denticulisque aspera. *Linea*, quæ à branchiis ad caudam usque per latus deducitur, & initio flavescit cum dorso, squammis parvulis & duriusculis, mira arte contexta est. De numero *pinnarum* Authores non conveniunt.

Aldrovandi Sphyræna per dorsum nigricat, cætera ad amethystinum vergunt, & eiusdem coloris maculis interstinguuntur. *Linea* flavescit, ruberrimis infra supraque punctis exiguis notata. *Caput* caruleum. *Oculi* & *pinnæ* pallescunt. *Cor* oblongum est, sub quadam vesicula alba inclusum. *Pylorus* à stomacho confurgit tam multiplici *apophysum* seu cæcorum cæsarie intertextus, ut penitus stomachum contegant; nec à quocquam numerari possint. *Fel* ab hepatis loco dextro latere in folle oblongo dependet. *Follem* ei natura vento plenum oblongum, anteriore parte bifidum, utrinque in acutum exeuntem donavit, ne ad imum sideret. Spina dorsi raris vertebrais coagmentatur.

De loco non est quod multa dicamus. *Ælianus* dum pelagias dicit, *Smyrænas* potius innuere videtur. *Oppian.* *Halient.* l. 1. v. 168. Expresse enim ex quo ille de piscibus *Aristot.* *H.* ferè omnia ἐν πέτρῃσι καὶ ἐν ψαμάθοισιν νέμονται. Gregatim degere & *Aristoteles* testatur, & piscatores comprobant. Captis an ὀλισθηροῖσι μελέεσσιν διεκπίνειν *lubricis excidere membris*, quod ex *Oppiano* *Ælianus* prodidit, an comperat, ex superioribus colligi potest. Non fallitur, qui pro *Sphyrænas* *Smyrænas* legerit.

Quantum ad usum *Romæ* ceu plebeius negligitur, nec peculiarem habet condituræ modum. *Hicesius* a-

pud *Athenæum* περιμοπέεος congris esse, ἀπειθείς δὲ τὴν γλῶσσαν καὶ ἀσώμους, ἐνχυλίαι δὲ μέσους gustui ingratos, ori insuaves, succum mediocriter laudabilem generare dicit: sed cum congris ex cartilagineorum sint genere, *Philotimo*que δουκαπεργάστεροι dicantur, & *Rondeletius* carne esse candida suavi, quodammodo friabili, & *Aselli* carnem referente, cui simul cum *Lupo* præcipuam authoritatem fuisse *Cornelius Nepos*, & *Laberius Poeta* tradiderint; quin *Cestræ* lumbi cum aliis lautissimis obsoniis ab *Antiphanē* nominentur, vel librarios, vel *Athenæum* attactum superius errorem commisisse, verisimile est.

ARTICVLVS. XVII.

De Acu.

PUNCTVM I.

De Acu Aristotelis.

Piscis quem Latini Acum vocant, TAB. Græcis longitudine & tenuitate XIV. 13. Βελόνη, Ραφίς, Athenæo Ἀ'ελεινής, quasi sine muco, dicitur, sunt qui βληθὸν ut *Varinus* citat, & βελὸν nuncupant.

Vnam eius duntaxat speciem *Salvianus* agnoscit. *Bellonius* cum *Rondeletio* duas. Nos de *Acu* *Aristotelis*, *Oppiani*, & *Bellonii* agemus. Hinc autem *Rondeletius* illum piscem esse credit, quem *Bellonius* *Typhlinen* & *Ceciliam marinam* ob corporis figuram, *Plinii* *Spondylem*, Græcorum vulgo *Herophidiam*, *Massilienses* *Gagnolam*, quod quoties piscantur, si alios pisces præcedere viderint, lucrum portendi credant, vocant. Piscis est longus, cubiti longitudine, digiti crassitudine, totus subflavus. *Corpus* utriusque sexus angulosum, oblongum, à capite ad meatum excrementorum semper crassescens, sexangulum, sed deinceps, ut tenuius efficitur, pro sexangula quadrangulam formam induit. *Caput* habet exiguum, *Rostrum* oblongum, durum, nec acuminatum. *Extrema* pars latiuscula exstat, rictus in altitudinem deli-

dehiscit, figura tubæ æmulatur, in extremo tubæ veluti *foramen* conspicitur, tam pusillum, ut tum propter ipsius parvitatem, tum propter rostri magnitudinem angustiamque; ne minimus quidem pisciculus ingeri possit, eo veluti per fistulam, ex humore alimentum attrahit. *Oculi* sunt tam exigui, ut vix mili magnitudinem æquent. *Branchiæ* utrinque quaternæ, podex in medio ferè corpore. De *pinnis* disputatur. Salvanus cum Aldrovando unam parvā & tenuissimā in medio dorso ponit. Bello-nius cum Rondeletio duas in lateribus juxta branchias, eam quæ intergo tam tenuem & exiguam; iste addit, ut vix nisi cum vivit, aut in aquis movetur, conspiciatur. *Internas* inspectes, habet *gulam*, qua plurimi pisces carent, ventriculum parvum, oblongum. *Hepar* pallidum, sub quo dextra parte *fel* cælium hordei magnitudine continetur. *Cor* vix milio maius. *Vulvam* cæterorum piscium more bicornem; ovis sesami magnitudine, rotundis, rubris, transparentibus plenam. De *intestinis* inter Bellonium & Rondeletium non convenit. Iste gracilia, recta, in spiras non contorta prodit, hic unum tantum album, recta exporrectum, multa pinguedine circumfessum scribit.

Quantum ad *Generationem*; ova se in dissectarum, rima, seu *σπὸν τὴν γαστέρα* *ἀφ' ὧν*, de qua superius, multa invenisse, & multos fetus jam profectos, quorum maiores partes omnes perfectas habebant, & movebantur; Alii tam tenues & exigui erant, ut oculi duntaxat & rostrum cernerentur, testatur Rondeletius. Emitterit illa eo, & Aristot. H. A. l. 6. c. 13. quasi in altero sinu fovet donec excluderit, dilatat natura rimam, donec pepererit: à partu vel ita coit ut coaluisse videatur, vel revera coalescit, quod & in cæciliis serpentibus traditur, huicque omnino tribuendum est, quod dehiscenti propter multitudinem ovorum utero; adscripsit Plin. H. N. Plinius; ex Aristotele; malè de eodem vertit Gaza, nec melius Ælian. H. A. l. 11. c. 13. *ἀπὸ τῶν ὠν*, id est, ut

Scaliger vertit. *Multa earum parturientes disrumpuntur ab ovis.* Quid si frequentia verba velint, καὶ ὡς περὶ τὰ φάλαγγια ἀεὶ κίχονται, καὶ ἀπὸ τῶν βελόνων. ἐκπύλει δὲ πρὸς αὐτὴν καὶ τις θύγῃ φύγουσιν. *Fetus circa parentem quasi phalangia circumfusi sunt.* Ita enim parit, ut ei adhæreant, sed si tetigeris, fugiunt, difficile est dicere. *De usu in cibo & Medicina* dixisse sufficiat, Carnis esse duræ ac siccæ eoque difficulter concoqui. Unde Hicetio *αχὺς* & boni succi, & combusti cinerem in potu ad stillicidium urinæ à Galeno commendari.

PUNCTVM II.

De Acu Oppiani.

ACUM Oppiani ab Acu Aristote- TAB. XIV.
lis debere distingui, tum quod hic dentatus sit, tum quod rima destituitur, ostendit. Haud in multam magnitudinem excrescit, seni vix libram pendeat. Vidit tamen & trilibrem Salvanus. *Ventre* est plano, candido & argenteo, reliquo corpore quodammodo ob lineam è squamis contextam utrinque protensam; quadrato, reliquis partibus lævibus, & sine squammis. *Dorso* cæruleo ad viride inclinante. *Rostrum* habet acutum, tenue, longum & durum, ut ait Athenæus. *Caput* triangulare viride. Inferiorem *maxillam* superiore longiorem, & in mollem quandam substantiam, degenerantem. *Dentes* utrinque parvos & frequentes. *Oculos* magnos, rotundos; luteos ante quos meatus ad audiendum vel odorandum triangulari figura observavit Rondeletius. *Branchiæ* sunt quaternæ duplices. *Pinnæ* ad branchias duæ parvæ; duæ aliæ sub ventre breves, quas rursus alia sequitur, longè à podice ad caudam se extendens, è cuius regione in dorso alia. *Cauda* brevis est in duas pinnulas terminata. *Podex* non admodum conspicuus. *Rimam* illam quam Aristoteles Acui tribuit circa podicem huius Acus foris quidem conspicuam esse, sed intus minimè videri, Salvanus author est, Rondeletius diligentissimus omniū
H circa

Oppian.
Halieut. l. 3
v. 605.

circa Acum indagator eius non me-
minit. *Partes interiores*, ventriculum,
hepar, intestina, quæ appendicibus
carent, longa habet. *Hepati* vesicula
fellis oblonga adhæret. *Cor* angulo-
sum est. In arenosis, saxosisque locis
degit. Solemne ipsis *ὅτε κελπὸν διαπύς ἐκ-
πεσφύγων*, quando sinum retis effugerint,
iterum reverti, & dum ira velut per-
citi id dentibus lacerant, in laqueos
iterum impingere. Carnè est dura &
sicca. Frixus & omphacio vel succo
mali aurantii irroratus edi solet; nec
ingratus palato invenitur.

ACUS MINOR. Bellonii *Lacertus*
est, seu *Saurus Acubus similis*. Rondele-
tio. Piscis est marinus, pedis magni-
tudine, Acubus brevior & crassior.
Rostro acutiore sed brevior & sur-
sum recurvo. *Dentium* loco maxillas
ferratas habet. *Branchias* quaternas,
septem etiam, ut in superiore, quem
Bellonius Maiorem vocat, supernè
ac infernè & in cauda propendentes
pinnulis; his, oculis, & ante hos forami-
nibus, ventrisque squamis ac lineis,
quæ ventrè ferè quadratum efficiunt
firmatque, Acubus est similis; carnis
substantia, & posteriore corporis
parte Scombris. *Intra* ventriculus est
oblongus. *Intestinal* longa gracilia, in
gyrum convoluta. *Hepar* longum ru-
bescens; *fel* & *splen* nigricantia. Cuius
Aldrovandus Iconè dedit, toto cor-
pore subviret, maculis ex amethisti-
no & cæruleo mixtis, in dorso inten-
sius, in pectore remissius variantibus.
Rarus est, & in insula nomine Lissa,
olim Phuna affatim capitur. Inde sa-
litus navigiis transfertur, & maximo
quæstu divenditur.

ARTICVLVS XVIII.

De Fabro.

TAB.
XVII.
1. 2.
Aldrovand.
de Piscib.
l. 1. c. 25.

FABER piscis, seu exinde quod om-
nia fabrilia instrumenta in eo re-
periantur, teste Salviano, seu pro-
pter multiformes dorfi ac ventris a-
culeos atque varia capituli ossa, qui-
bus fabrilia omnia instrumenta re-
præsentantur; seu ab atræ fuliginis co-
lore, quod tamen, si ex Oppiano de-

sumptum est, Coracino potius tribui
debet, ita dictus est. An *χαλκός* sit,
quod Salviano placet, dubitatur.
Cum eum Gadibus principatum ob-
tinere scribat Plinius; rotundum vel
orbicularem, Athenæus faciat. Si
est, utique & *ζεύς* seu Jupiter dicetur,
nam & hoc *ἔχεται* nomen est, seu
à *χαλκός* formatum; seu quod fortè,
ut nunc sit, olim etiam in templi
Iovis tanquam sacer suspendere-
tur. Quidam *χρυσόφων* nuncupant,
an propter maculas laterales, di-
gitorum Divi Christophori ut aiunt
vestigia, vel quod eum quem iussu
Salvatoris Div. Petrus cepit (macu-
læ prædictæ numismatis illius quo-
dammodo figuram exprimere cre-
duntur) opinentur, nescio. Ro-
mæ *Citula*, Liguribus *Rotula*, Hollan-
dis *Gallus marinus* dicitur. Qui Chal-
ciden, Acanthiam vel Citharum,
vel Porcum marinum esse judicant,
falluntur. *Primus* enim inter viles pi-
sciculos à Columella; ab Aristotele
inter fluviatiles reponitur. *Alter* car-
tilagineus & rotundus. Citharum
piscem inferius dabimus. Porcus in-
ter magnos pisces recensetur. *Zajō*,
Hesichii idem fortè cum isto. Cum
nec inter *ψαλλοειδείς*, qui una parte can-
dicant, nigricant altera, nec inter
planos, à quibus oculorum situ dif-
fert, referri possit, benè inter latos
censebitur, quamvis maximè com-
presso ac plano sit corpore.

Coloris est varii. *Caput* & dorsum
obscura sunt, pinnæ nigricant, latera
partim ex cæruleo virent, partim
aurea sunt. In medio corpore ma-
cula nigra, orbicularis, vel ovata
nummi minoris magnitudine, colo-
re cælesti, cum tribus imagunculis,
figura quodammodo Hippocampi,
colore aureo, visitur. *Squammis* tam
exiguis tegitur, tenuibusque ut nisi
digito scalpas vix appareant. *Caput*
ipsum compressum, extensum, osseum,
ossibus quàm plurimis, variis, angu-
losis, tenuibus, atque perlucidis con-
structum, maculis quibusdā exiguis
purpureis exornatum. *Linea* obliqua
à capite ad caudam ducitur. *Oslatifi-
sum*, plurimum hians, edentulum,
etli

etfi quodammodo dentatum pinxerit Bellonius. *Oculi* magni, rotundi, aurei. *Branchiæ* utrinque quaternæ, quarum ossea opercula in aculeos desinunt. *Pinna* duæ mediocres ad branchias, duæque aliæ in anteriore ventris parte paulò longiores, ac in quinos velut longos pilos aut setas porcinas degenerantes, ab ano rursus duæ aliæ quarum prior pars quinque duntaxat aculeis constat; altera multo longior, & ad caudam ferè usque extensa, aculeis caret, in *dorso* unica tantum & magna, ut quæ paulò ante medium dorsum exorta, ad caudam usq; ferè extenditur, figura huic pisci propria, & aliorum piscium dorsipinnæ dissimilis. Primum namque in longissimos pilos eius ferè modo, quàm in anteriori ventris parte conspici diximus terminatur; deinde plurimis robustissimis aculeis intertextis armatur; postremò aliis etiam aculeis osseis multò brevioribus, bifidis atque recurvis, secundum eius exortum in dorso præmunitur. Pars *ventris* utrinque ossibus instar acuti cultri secantibus firmatur. *Cauda* in unam pinnam desinit. *Ventriculum* habet mediocrem, gulam manifestam, intestina parva tenuius in gyros convoluta, inter quæ ova rubra late re Rondeletius ait. *Hepar* candidum sine felle, lienem rubescentem exiguum, mesenterio hærentem. *Cordis* pars infima rubet, suprema & media ex albo rubescit, quod in paucis piscibus spectatur.

Oppian.
Halicut. l. I
v. 133.
In faxis cum degere tradidit Oppianus, in Atlantico & Gaditano generosissimis piscibus adnumerari Columella. Ita carnivorus est, ut nec alia maris purgamenta spernat. An ei stridor competat, quem Chalcidi Aristoteles tribuit, ita ut pro χαλιδῆς legatur, quod Aldrovando placet aliis judicandum relinquo: mihi, cum brachiæ opercula tam horrida habeat, ut dimota sonitum edant, & verò plurimi ex piscibus τὴν δοκῶσαν φωνὴν τῇ τριψεί των βραγχίων (ἀπανθῶ δεισθῶ δι τῶν πῶπι) hoc quod vox videtur, attritu branchiarum quippe loca spinea sunt emittunt, verisimile videtur. So-

livagus est, & erectus, non passerum more in latus conversus natat.

Reputatur inter pisces carne satis tenera & friabili, concoctu facili, & boni succi. Apud veteres in multa fuisse æstimatione ex Columella dum dicit, *Atlantico pascitur Faber: qui & in nostro Gadum municipio, generosissimis piscibus adnumeratur, eumque prisca consuetudine Zeum appellamus*, didicimus. Cum ob corporis tenuitatem, commodè assari nequeat, aut frictum & omphacio aut aurantii mali succo irroratum, aut in aqua & vino partibus æqualibus, oleo, sale, beneque olentibus herbis atq; aromatibus elixum comedi, Sallivianus tradit.

Columella
R. R. l. 8.
c. 16.

Plin. II. N.
l. 9. c. 18.

CAPUT II

De Piscibus saxatilibus
lævibus.

ARTICVLVS VNICVS.

De Alaudis & Pholide.

Inter Saxatiles læves, Alaudæ duntaxat, cum iis qui ad eas pertinent Gutturoso nempe pisce, & Exocæto Bellonii, & Pholis reperiuntur. *Alaudam* duplicem facit Rondeletius, *Cristatam* & *non Cristatam*.

TAB.

XVII. 3.

Aldrovand.

de Piscibus

l. 1. c. ult.

Illæ corporis specie Scorpioidi admodum est similis. Colore fusco, multis maculis partim rotundis, partim oblongis & tortuosis notato, tenui, lævi & lubrico, ore parvo, *dentibus* anterioribus feratis, posterioribus exertis, oculis parvis cæruleis, in vertice dum vivit erecta est *crista*, mollis & cærulea. *Pinna* ad branchias latæ sed breves; in ventre parvæ & tennes. *Podex* non procul à branchiis distat, à quo pinna ad caudam protenditur, alia in cervice ad caudam continua. *Peritonæum* ex nigro viride est. *Cor* angulat-

H 2 tum.

tum. *Hepar* ex albo rubet, à quo *fellis* vesica pender, perspicuitate & coloris jucunditate smaragdum referens. *Intestina* lata sunt, coloris lutei. Ob parvam branchiarum scissuram sat diu extra aquam vivit.

Carne est molli, sed ob parvitatem negligitur.

TAB. XVIII. 3. Ad hanc Piscis GUTTUVROSUS dictus referri potest. Nigricat quidem ferè undiquaque: sed & punctis cæruleis distinguitur, & color luteus per totam superiorem dorsi pinnae partem, circa branchias & summo ventre visitur.

Littoralis est, & foramina lapidum aut ædificiorum littoralium subire solet, vel carne vasi iniecta mox exempta capitur.

TAB. XVIII. 2. ALAUDA NON CRISTATA capite est parvo & rotundo, ore & oculis parvis, dentibus anterioribus ferratis, posterioribus longiusculis, acutis, exertis. Pinnulas duas habet ad branchias, duas in ventre, aliam statim à capite ad caudam continuam, item aliam à podice oris fati propinquo ad caudam usque ductam.

Cauda in unicam definit saxatiliū more. *Maculae* multae mediae corporis parti aspersae sunt.

Aqua, muco, parvis Atherinis & Aphyis vescitur. Carnis substantia & mollitudine cristatae par. In petrarum rimis degit, hinc nomen Percepere sortitus est.

TAB. XV. 7. 8. Huc & Exocætus seu ADONIS Bellonii, quicum Vrticis plurimum delectetur, & istæ circa littora inter cautes hæreant, mari profundius mergi recusat, in rupibus Bononiæ, in cavis cautium quiescit.

Species illarum sunt plures, quarum una *Cristata* est Massiliae frequens, primo aspectu Gobium referens. *Cute* glabra obducitur. Vulgus *Glinos* vocat, colore est sub-ruffo, ut Scorpæna multis aliis coloribus confuso. *Dentes* habet ut Scarus, firmos, continuam tergo-

ris pinnam, ac nescio quid supra *oculos*, quod veluti à pellis laxitate procedit, laterum pinnae inversas, duas sub ventre duabus tantum cirrhis radiatas. *Cristati* caput ad Chamaeleonem accedit, in cuius cacumine pinnam Galli cristam referentem videas. *Dentes* habet anteriores acutissimos.

Cauda pinnam, & laterum rotundam, sub sternone duas; alteram in tergore continuam, maximè latam. *Branchias* tectas, & parvo foramine pervias, sed & detectæ quatuor numerantur utrinque. *Cute* integitur laxa, multis coloribus ut Draco variegata. Chamas & conchyliis conficit: sed & urticis interdum pascitur. Triduum vel quadriduum absque aqua vivit.

Tertium Exocæti genus, piscatoribus Byzantinis *Glini*, aliis *Chelidonii* nomine venit.

Rarè sex digitorum longitudinem, & duorum pollicum crassitiem excedit. *Squamis* caret, & lituræ melinæ cyaneæ & fulvæ per tergus diffunduntur. *Pinna* tergoris continua est & mollis, caudæ & laterum latæ, varii coloris omnes. *Branchia* sunt contextæ Spinea exterior, ut in Dracone marino, duobus aculeis obfirmatur: sed ab eo dissidet, quòd quilibet aculeus duobus ferratis denticulis repandis & aduncis fulcitur. *Caput* habet polymitum, Os grande, inferiorem maxillam latam & planam. *Dentes* Glini priorè aliquantulum minores. Dum scinditur, *branchias* non ostendit integras, sed rudimenta coloris paulò magis rubra quàm in Muræna. Non malè ad *Basiliscos* Oppiani referrentur.


PHOLIS à muco ita dicitur, quem emittit. *Θεωράται τε καὶ ἀντὶ τῆς πίνας*. In circuitu eius is concrevit, ac fit quasi cubile. Antipoli & ab Italis *Bavosa* vocatur. A lauda paulò maior est, dorso fusco, cutelævi, maculosa, ventre pallido. Pinnis aliisque partibus à superioribus non differens.

Nec

Tab. XVII.


Mullus Minor.

Kleiner Rotbart.




Faber.

Meer Schmidt.



Mullus maior.

Großer Rotbart.




Liparis

Schmalz fisch


Faber marinus

Meer Schmid.



Alauda

Meer Lerch.




Pholis.

alauda species

Schleim Lerch.


Cuculus.

Redfisch Meerhyren.



Hyrundo.

Meer Schwalb




Milius.

12

Meer wog.

Cuculus.

Redfisch.




Hyrundo. alia

9

Atherina.

15


Kleiner Hering art.



Chronis.

14


Feste Brämen.



Phagrus.

13

Rote Meer Brämen.



Nec ablutit ab his SCORPIODES Rondeletij sic dictus, quod capitis forma Scorpionis marini similis sit, totidemque supra oculos apophyses licet molles habeat. Galli *Leporem marinum*, quia rostrum terreni leporis *ωελόμῃ* sive *scissura* admodum simile habet, nuncupant. Differt à Scorpione dentibus, quos serratos quidem habet, sed tenues & densos admodum, & in superiore maxilla duos exertos, ab eodem & Galerita pinnæ dorsum magnitudine, duabusque eiusdem pinnæ nigris maculis distinguitur. Littoralis est, muco vescitur & aqua.

TITULUS III.

De Piscibus Marinis Littoralibus.

CAPUT I.

De Squammosis non planis.

ARTICVLVS I.

De Mullo.

Mullo inter littorales pisces locum dari, quam Scaro inter saxatiles datus est, inferius patebit. *Nomen* apud Latinos non tam à mulleorum colore, (calcei erant quibus priores Albanorum Reges, postea patricij vsi sunt) quod Fenestellæ teste Plinio placet; quam à mollicie invenit. Servitutis est indignatissimus; ut Columella loquitur, & in piscinis nihil vel parum saltem crescit. Græcis *τείγλα* non *τείγλα*, & *τείγλις* quod de tæmina sumendum est, quod ter pariat. Hinc Oppianus *τεργόνισιν ἰππωνυμὸς γονῆσι* dicit; vocatur. Cretensium vox *Στεργλημ-ωαρόν* ex Græca & Veneta composita est. An *γενίωλαι* dicantur, quod Hesychius innuere videtur, cum

Triglas Græci *γενεαῖδας* cognominant, in medio relinquo.

Duo ipsorum sunt genera. Alii sunt *Barbati*, quos *γενεαῖδας* vocant, qui que sola succi bonitate, siquidem alii alga, alii carne vescuntur, differunt. Vnde *Lutarii* apud Plinium nomen. *Imberbes* alii, quos quidam *ἀπογώνες*, *τεργόλας* Sophron, & quidem, *ὀμφαλοτόμους*, quod umbilicus podexve aut magis quam aliis congeneribus patet, aut minus rotundus est; *ενδιαίτες*, quod in summo mari natantes tranquillitatem promittant, nuncupat. Dari tales Salvianus negat, nullum alium ex veteribus eius meminisse, perpetam prætendens. Xenocrates enim saxatilem barba destitui innuere videtur, dum pelagium describit. Mulla stros recte dixeris, quorum alium imberbem, alterum à squammis asperum Rondeletius facit. Figuræ est totus oblongiusculæ, magnitudinis mediocris; binas libras raro exuperare, apud Plinium habetur, quadrilibris Seneca, sex librarum Iuvenalis meminere. Si verum est octoginta librarum in mari rubro captum, ut Lucius Mutianus apud Plinium prodidit. Alterius is generis fuerit necesse est, dorso repando, vnde *κύφας* gibbosas Epicharmus in nuptiis Hebes dixit, ventre plano albicante, cætera purpureo, hinc *ροδόχρσα φύλα* Mullorum apud Oppianum. Matronus Parodus *μυλ-ιοπάρενον* colore miniaceo fecit. *Squam- mis* magnis, tenuibus, serratis, obliquo situ dispositis, facile ut apparet deciduis, robustis tamen. (Tiberius piscatori sibi secreto agenti insignè adferenti Mullum, eo faciem perfri- cari iussit) Pallentes eadem seu ad viredinem vergentes, virgis quibusdam paralellis insignitæ. Si vivus desquametur, *colorem sanguineum* sortiri, hinc *χερσώπας* apud Plutarchum, & *ξανθοχρσός* apud Nausicratem nomina, Massurius auctor est. *Mortuum* versicolori quadam & numerosa varietate spectari, rubescentiumque squammarum multiplici mutatione pallescere, utique si vitro inclusus spectetur, à Seneca & Plinio

Iuvenalis
in Satyra;
Plin. H. N.
l. 9. c. 18.

Oppianus
l. 6.

Sueton. in
Tiberio.

TAB.
XVII.
5. 6.
TAB.
XVIII. 4.

Plin. H. N.
l. 9. c. 17.

Oppian.
Halieut.
l. 1. v. 590.

Seneca N. proditum est. *Caput* habet repandum, multis velut cancellis aureis Q.L.3.c.17. exornatum, in quo *spinam* Canisimilem, quæ renibus apposita, miro fit remedio, Marcellus Empiricus asserit. *Os* parvum, edentulum, *oculos* mediocriter rufos, in Aldrovandi ex Hispania misso, nigricant. Duo *cirri* cutacei albi in quibusdam, in nonnullis rubri, molles, rotundi, longi, atque barbæ similitudinem gerentes propendent. *Branchiæ* utrinque sunt quaternæ, ad quas pinnae sunt duæ aurei coloris, in ventre totidem candidæ; à podice rursus alia; in tergore duæ, prior ex firmioribus, posterior mollioribus aculeis constat.

Scalig. Exerc. 22 G. l. 15. *Cauda* rubet, & in lunatam pinnâ degenerat, ac propterea laterum pinnas, velut in acutum tendere Belonius autumat. *Interiora* si spectes, gula est parva. *Ventriculus* cum innumeris appendicibus itidem, *hepar* ex albo rubescit, *Splen* exiguus est & nigricat. Scaliger, sinistro illud ventriculi lateri adiacere, dextro hunc, scribit. *Intestina* sunt mediocria, cor triangulare.

Que huic adscriptus Minori quoque Salviani Mullo conveniunt, hoc discrepat, quod purpureo pingatur, aureis lineis careat, & lituris quibusdam flavis ac liventibus notetur, & squammis modico contactu deciduis vestiatur.

Plin. H. N. De Loco ambigitur inter Authores. Septentrionali Oceano & proxima occidentis parte gigni Plinius dixit; Galeno sunt pelagii. Oppiano modo χαμαλῶσι παρ' αἰγιαλῶσι νέμονται humilia prope littora degunt: modo inter saxatiles cum Seneca referuntur; nec abludit Ælianus, λεπρώδεις ei à loco, quem incolunt nonnulli, πέτρης λεπρῶς καὶ ἀργαίας minuta & rara tubercula, aspera illa habere, scribit.

Per incerta maris spacia vagari, & circa littora, eorundemque saxa, ut plurimum vel quosdam duntaxat degere, verisimile videtur. Sane Ælian. H. A. l. 1. c. 26. Xenocrates, & Cantharo ἀσπερ tri-

buit Ælianus; πέτρῃσιν αἰεὶ λεπρῶσι μέ- Oppian. μιν, petris semper asperis delectatur a- Hal. l. 3. v. 340. pud Oppianum idem: quam tamen Arist. H. A. littoralibus annumerare Aristoteles l. 8. c. 31. non dubitavit.

Procreantur & in marinis lacubus, Varro R. R. detinuit & in vivariis Hortensius ad l. 3. c. 17. Baulos, & maiorem sibi habebat curam, ne ipsius esurirent Mulli, quam Varro se habere proficitur, ne sui in rosca esurirent asina. Gregalis est & autumno viget. Pamphagi sunt, & præter cœnum, unde ipsi Sargus, comes, ostrea, algam, & conchas, quibus apertis inhiant, piscium & hominum cadaveribus vescuntur, & μάλλον τοῖς μεμιασμένοις καὶ κακῶς οἰή- Oppian. δεσι, magis sordidissimis & male olētibus, Hal. l. 3. adde betarum folia, delectantur. 435. De cadaveribus apud Oppianum Ælian. H. & Ælianus legimus, & videntur A. l. 2. c. 41. id pugnae navales & naufragia, quæ & l. 12. c. magna copia subsequi solent, Rittershus. tershusio declarare. Antiphanes ad Oppian. tamen inter Helenæ cibos, quod l. c. homines non insectarentur posuit. Oppian. Pisces insectari nullum dubium Or. Halient. l. phum ἐπέφηνε inquit Oppianus. 3. v. 188.

Vescitur lepore marino unum tantum animalium ut non intereat nullus piscis, tenerascit duntaxat & ingratorior vi- Aristot. H. A. l. 9. c. 37. liorque fit, verba sunt Plinii. Dum Plin. H. N. itaque carnivorum Aristoteles negat, exiis, qui vel præter carnes nihil attingunt, vel viva tantum maris animalia venantur, eximere videtur. & 15.

Ter parere anno constans est Authorum opinio, his certe toties fœtura apparet. Aristoteles ἐπὶ τῷ πον- Arist. H. A. λῷ διὸ ὅτε τίθειν πολὺν γὰρ χρόνον ὀπηλὸς l. 6. c. 17. συχρὸς εἶναι, in cœno, itaque sero parere, diu enim frigidum est, addidit, solus Ælianus apud Aldrovandum, sterilem reddi postquam ter pepererit, natis in utero vermiculis, qui semen exedunt, prodit, quod mihi nondum apud eundem invenire contigit. Antipathiam cum lepore marino habere ex præcedentibus cognosci potuit; addit Aphrodisæus Torpedinem, cuius viribus stupefactivis ista resistere creditur.

Insignis

Insignis est prodigo veterum luxu seu precium, seu coquos seu lances consideres. Argenti pari pondere sæpius à privatis etiam Quiritibus emptum, cum pedis longitudinem superaret, Iovius prodidit. *Asinius celer Claudio Principe unum octo millibus nummum*, id est, quadringentis plus minus Caroleis, *mercatus est*, licet magis luxuriam æstimare, quod Plinius suis temporibus neget facile Mullum repertum, qui duas libras excederet. Crispinus Ægyptius ex servili conditione ad equestrem dignitatem Domitiani indulgentia evectus,

—— Mullum sex millibus emit

Æquantem sane paribus sestertia libris.

Publ. Octavius ingēris formæ (quatuor pondo & ad selibram esse aiebant (à Tiberio Cæsare in macellum missum, quinque millibus sestertii mercatus est. Idem tres, triginta millibus nummum vænisse, graviter conqueritur & annonam macelli Senatus arbitratu quotannis temperandam censeret. Néc satis soluta luxuria videbatur, nisi & coci maximo conductorentur pretio. *Reputatio hac inquit Plinius aufert transversum animum ad contemplationem eorum, qui in conquestione luxus, coquos emi singulos pluris quam equos quiritabant. At nunc coci triumphorum pretiis parantur, & coquorum pisces. Nullusque prope iam mortalis æstimatur pluis, quam qui peritissime censum Domini mergit.* Lances quibus inferebatur, *Chrysendeta* Martialis vocat, vel crustis aureis ornabantur; vel gemmatæ fuere; gemmæ auro confertæ & contestæ tenebantur, vt Turnebus explicat. Non eadem tamen omnibus præstantia. Polluci Iōnici maxime placent. Actio Syncero qui ad rupes Herculeas capiuntur. Nausicrati Æxonici: Æxoniam Magnesiæ urbs est, sed Cratinus eos improbat. Archestratus laudat Tichuntinos; Tichus castellum prope Tachinam Campiæ oppidum est. Corsicæ &

Taurominitanæ rupes à Iuvenale celebrantur. *Iuvenal. Satyr. 5.*

Perothus præstantissimos in mari Tyrrheno iuxta Corniculū, & Tarquinius capi prodidit. Iovius Romæ hyeme & suburbano mari captos maxime prædicari; Ligusticis, Venetis, & Neapolitanis non eam saporis gratiam esse; quanquam multo grandiores in convivia veniant, scribit.

Sed & longius à littoribus captis sua quoque gloria. Purior enim aqua in causa, corporis rubicundus, igneus, aureusque fulgor argumento. Magnas parvis gulæ procures præferebant, seu propter maiora capita, & iecinora; summopere ista expetita ex Galeno habemus: seu quod ita subtilioribus pabulis placeret; seu vt inexplibilem gulam preciosissimo obsonio explerent, quas Philoxenum Poetam apud Dionysium fecisse legimus. Heliogabalus non integros, sed quod præci, ue stupendum Lampridius scribit, barbas eorum plenis discis, palatinis suis apposuit.

De carnis qualitate inter scriptores non convenit. Xenocrates obsoniorum præstantissimum, stomacho idoneum, origratum, boni succi, carne plana, difficilem ad corrumpendum, mediocrem ad excernendum pronuntiavit. Celsus medium inter duras & teneras carnes habentes reponit. Diocli, Philotimo & Psello difficulter concoquitur. Durissima est & valde friabilis, boni nutrimenti, si benè concocta fuerit, Galeno. Apparatus ad Oeconomiam pertinet. *Olim parum videbatur recens Mullus, nisi qui in convivio vā manu moreretur. Vitreis ollis inclusis offerebantur, & observabatur morientium color, quem in multas mutationes mors luctante spiritu vertit.* Apicius ad omne luxus ingenium mirus, in sociorum garo (nam ea quoque res cognomen invenit) necari eos præcellens putavit.

Venit & inter Remedia. Sanguinis & hæmorrhoidum fluxus promovet. Sæpe sumptus oculorum aciem hebetat.

Galen. de Aliment. facult. 1. 3. Achias 1. 2. 6. 79.

Seneca Quest. Natur. 1. 3. 6. 17.

Plin. H. N. 1. 9. c. 17.

Macrob. Saturn. 1. 3. c. 16.

Iuvenal. Satyr. 4.

Seneca Epist. 96. Sueton. in Tiberio.

Plin. H. N. 1. 9. c. 17.

Martial. 1. 2.

Turneb. Adv. 1. 14. c. 3.

Impotentia virilis.

hebetat. Vinum in quo suffocatus est inter virilis impotentiae causas, numeravit Trepfates, nec mulieres si biberint concipere; ideo Dianæ in facris offertur. Afflus torminosis peculiariter prodest, à Tralliano descriptur. Carnes excapitibus decoctæ & cum melle subactæ, ani tollunt vitia. Percussis denique à Pastinaca cum lasere medetur.

IMBERBEM duplicem nobis descripsit Rondeletius. Prior, quem Occitani *Imbrigo* à rubore, quo ebriosorum facies inficitur, vocant, rarus est, veteribus parum notus. Hirundini & Cuculo corporis figura similis, colore magis rubro, capite magno stellulis cæato. Oculis magnis, Ore parvo, edentulo, pars inferior Cinnabaris colore inficitur. Os branchias operiens in aculeos ad caudam spectantes terminatur, ad quas pinnae duæ sunt rubræ cum appendicibus aliquot, in ventre duæ alia. Cute aspera & rubra in dorso & lateribus contegitur. Ventre est candido, ad quem è dorso lineæ multæ ducuntur. A capite ad caudam dorso medio acutorum officulorum ordines, cavum efficiunt; è medio pinna rubra aculeis ferratis constans erigitur, quod non nisi in Sagittario videbis; quam alia veluti è mollioribus pilis constans sequitur. Cauda rubra est Scorpionis caudæ similis. Ventriculus parvus cum multis appendicibus. Venter vere multis ovibus distenditur.

Alter à squammarum asperitate, Asper nominatus, corpore est brevi, terti, digiti magnitudine, colore minij vel valde purpureo. Capite, branchiis, pinnis descripto similis, squammas habet parvas, ferratas, oblique sitas, à capite ad caudam lineam ex squammis contextam, pinnas ad branchias extra candidas, intra ex viridi nigrescentes. Ventriculum cum appendicibus paucis parvum, hepar candidum, & sine felle. Splenem parvum ex rubronigricantem.

Aldrovand. Histor.

Diversus ab hoc Aldrovandi asper Mullus est, utpote totus fere ruber,

capite aureis cancellis ornatus, in vertice aculeatus, dorso planus & asper, ventre candicans, branchiarum cæruleis striis pictis, cætera flavescens.

ARTICVLVS II.

De Hirundine & Cuculo.

Quænam sit Græcorum Hirundo, TAB. XVII. seu ut illi vocant *χελιδών* ambigitur. Rondeletius eandem cum *Lu-8.9.* cerna Plinij, quod noctu luceat, facit, & in Plinij loco transpositionem arbitrantur. Aldrovandus eum piscem esse, quem pro corace sive corvo Salvianus, pro Lucerna Gesnerus posuere; iudicat, & Hirundinem. Plinii ab Hirundine Græcorum distinguit, illamque Rondeletii Mugilem alatum, Bellonii & Salviani veram Hirundinem opinatur. Ut ut sit, videtur *Lucerna* dici, non quod lingua eius per os exerta tranquillis noctibus luceat, (piscibus enim explanata ista, si Aristoteli credimus; & fieri id, piscatores negant,) sed quod vel pinnae versicolores noctu fulgorem quædam emittant; vel quod speciem antiquæ lucernæ gerat, vel denique quod oculi eius noctu luceant, quod verissimum esse iudico. Caponem Romani à capitis asperitate & magnitudine dixere.

Duæ ipsius sunt species, quæ in omnibus ferè cum cuculo conveniunt. Ore, rostro, capite osseo, anguloso, cæato, aculeorum, pinnarum, cirrorum cartilagineorum numero & loco. Maxima in appendicibus, utrinque ternis, similitudo: in eo distinguuntur, quod binæ rostri eminentiæ, quæ in cuculo longiusculæ sunt, in hoc vix conspiciantur, pinna lateribus hærens, primum sit viridis, in extremo cærulea, tergus quoque variegatur. Cuculus denique sæpe tres libras attingat, duas nunquam hirundo. Squammis tam exilibus teguntur, ut Gesnerus pro iis asperam habere cuticulam scripserit.

Alterà Hirundo duas latas & cæruleas ad latera pinnas, Milvinis brevior.

Piscium l.

2. c. 2.

Plin. H. N.

l. 9. c. 16.

Aristot. l.

2. de part.

tib. Ani-

mal. c. 16.

breuiores habet, has per medium fere corpus expandit. *Corpore* quoque est recuruo, & crassiore, grandiore ventre.

Ælian. H. A. 6. 2. 6. 3. *Solitarios* esse captura arguit, singuli & pauci capiuntur. Cum aliquid metuunt, ex mari exilire dicuntur, sed humiliter volant.

TAB. XVII. 10. II. *Cuculum* Græci *κόκκυρα*, seu à sono, quo avis eiusdem nominis more obstreperit, ut Aristoteles & Athenæus testantur; seu quod cum retibus capitur vocem *κὲ* exprimat, dicunt. *Psella* *κόκκυριον* nominat. *Typhōn* apud Athenæum cum *τῇ τέργῃ* sit similis, cum *Trigola* eundem à quibusdam haberi prodit.

Totus piscis rotundus est carnosusque, vix tres libras superat. Toto corpore præterquam in medio latere, in quo virga ex tenuibus squamis contexta protenditur, glaber est, in dorso à capite ad caudam duo squamarum ordines deferuntur. *Caput* ipsi magnum, ossium, angulosum, totum cælatum, alicubi aculeis munitum. *Rostrum* in duas longiusculas eminentias semicirculum constituentes terminatur. Super utrumque oculum supercilii loco brevis, sed acutissimus & durissimus aculeus extat.

Utrumque branchiarum operculum alio & quidem longiori armatur. *Maxilla* extrema sui parte asperiores dentium vice funguntur. Ante pinnas, cartilaginei cirri; utriusque terni dependent. *Ventrem* habet planum. *Caput*, dorsum, latera & pinnas rubra. *Ventriculum* cum multis appendicibus satis carnosum. *Intestinalata*, inter se convoluta, & multa pinguedine obducta, *hepar* subalbidum sine felle. *Splenem* rubrum & paruum.

Oppian. Hal. l. i. v. tit. 97. *Aristot. H. A. l. 8. c. 13.* Littoribus ab Oppiano accensetur. Aristoteles & Ælianus inter illos & pelagios ambigere dixerunt. Inter Brasiliam & Portugaliam densis agminibus volant, & aliquando milleni, sæpe centeni capiuntur. Pinnarum magnitudine adiutus innando celer est.

Carnem habet plurimam, albam,

duram, & siccam. *Diphilus* Milvo præposuit, quia friabilis, haud temere salubrem censeas. Ab Hipocrate in pituitosis morbis conceditur. Romæ frixus & arantii mali succo irroratus, editur, quidam necelixum aspernantur.

ARTICVLVS III.

De Milvo, Hirundine Plinii, & Lyræ.

MILVUS seu *Milvago* Plinii idem est cum *Hirundine* Græcorum *Rondeletii* Aldrovando; Græcis *εἰραξ*, *Oppiano* *εἰραξ* id est Accipiter dicitur, quod Accipitris species inter aves *Milvus* sit. *Pinnis* caudaque expansis *Milvum* avem omnino refert, latis nimirum & maculosis. *Corpore* est rotundo, oblongo, maiori ex parte nigro rubescente, aliquando omnino rubro. Sesquipedalem mensuram, vel maxime auctus non excedit. *Caput* habet ossium, quadratum, durum, asperum, cuius pars posterior duobus iisdemque magnis & robustissimis aculeis, ad caudam spectantibus armatur. *Branchia* quæ tectæ, opercula ossæa in duos aculeos robustos desinentia gerunt. *Pinna* stellulis maculisque variis asperguntur. *Squamma* ossæa, asperæ & triangulares serpentium more inter se committuntur. *Cauda* unica atque latâ pinna terminatur. Quantum ad interiora, *Lingua*, & palatum splendore Sandaracum vel Cinnabarim superant, his noctui lux, ac si candentes carbones ore continerentur. *Ventriculus* mediocris multis appendicibus munitus est, *hepati* pallido vesicula fellis committitur. *Lien* est oblongus & subruber. *Vterus* bifidus, ovis rubentibus refertus. *Cor* angulatum.

Qui *Hirundinis* nomine Aldrovando ex Hispania missus erat, sub oculis ex violaceo albicabat, cancellis quæ ad aureum colorem vergebant, exceptis. *Alas* habebat longissimas & latissimas, ex cæruleo viri-

I descen-

descendentes, maculis plurimis rotundis cæruleis conspersas maiores aureis punctis oculorum qui in Pavonis cauda conspiciuntur similitudine amiebantur. *Tergus* asperum partim aureo, partim ferrugineo colore tinctum erat.

Quem hic describimus, solo in mari *degit*, & raro, si Salviano credendum, capitur. Licet edentulus, Carnivorus tamen est. Iuxta littora ubi minor insequetium piscium metus est, humilem exercet *volatum*: altum, ubi maior. Ad lapidis ictum volatum protulisse, quatuor extra summam aquam cubitis emines, in Gallico maris interni littore visus est. Qui ad Herculis columnas navigant, tantum aliquando ibi horum piscium volantium turbam affirmant, ut aves aquatiles esse videantur.

A mensis propter carnis ingratitude reicitur. A nautis templis offerri, ibique ob raram formam suspēdi, Gillius author est. Rondeletius fel contra *oculorum suffusiones* efficax esse comperit.

Oculor. suffusiones. TAB. XVIII. 5. **HIRUNDINEM** Plinij eum piscem Aldrovandus esse judicat, qui Romæ Pisce *Rondine*, Agathensibus *Falco marinus*, Massiliensibus *Landola* dicitur. Si alas auferas ad Mugilis Cestrei inprimis accedit figuram, hinc Mugil alatus Rondeletio. Cubiti magnitudinem attingit. *Squamis* contegitur magnis. *Caput* habet rotundiusculum, *rostrum* acutum, os parvum, prorsus edentulum. *Pinna* quibus volatum exercet, totum corpus longitudine adæquant. *Cauda* pinna est lata, magna, lunata, & ceu in duas pinnas definens. *Linea* quæ in cæteris piscibus à branchiis vel à capite per latera ad caudam dicitur, in hoc pisce à pinnis ventris orta per imum ventrem ad caudam fertur. *Venter* albicat, *dorsum* quod latiusculum est, ex cæruleo nigricat.

Describit & alium Aldrovandus, sub nomine *Mulli alati* seu *Lyræ* misum, *alis* rotundis, intus virentibus, extra nigricantibus, pinnis pectoris & cauda fulcis, ventre argenteo. *Latera*, *branchiarum ossa*, & *Synciput* au-

ro resplendebant. Non omnibus *locis* capitur, & Romæ rarissimum ajunt. Alga & aliis maris quisquiliis victitat, sed carne abstinet. *Mugilibus* carne & succo similis esse creditur.

LYRA piscis, qui quibusdam *Ce-* TAB. XXIV. 3. *phalus*, *Orphus*, *Erythrinus*, imò *xiθap* falso creditur, vel à cornibus anterioribus, quibus similitudinem *lyræ* repræsentat, vel quod veluti *lyræ* sonum edat, ita vocatur.

Species eius duas Rondeletius posuit. *Prior* *lyra* piscis est teres, ruber, *capite* ossico, magno: *rostro* in duo cornua lata protenso, quibus *lyræ* antiquæ formam refert: quem veterum *Lyram* Salvianus esse credit: quique squammis parvis & asperis contegitur, & plus ossium quam carnis habet. *Alterâ*, quam superioris marem quidam esse arbitrantur, sed falso, quoniam in huius quoque ventre ova rubentia reperiuntur; palmi est magnitudine. *Corpus* habet quoad vivit rubrum extincto color evanescit. *Caput* osseum, angulosum, aculeis & eminentiis plurimis asperum, cuius anterior pars in duo longa, lata, & retusa cornua degenerat, sub quorum exortu os est satis amplum, rotundum, & edentulum. Ex inferiore maxilla *cirri* quidam breves, molles & carnosii dependent. *Oculi* & branchiarum ossæa opercula aculeis muniuntur. Ex duabus in dorso pinnis prior brevior in longas & rubentes setas degenerat, posterior à medio dorso ad caudam, sed inermis decurrit. *Cauda* in unicam pinnam illamque parvam definit. Tegitur ossearum atque grandium squammarum, quæ Media sui parte acutissimo, recurvo, atque ad caudam spectante aculeo muniuntur, octonis ordinibus; unde sicuti asper totus ita octangulus creditur. Quantum ad *internas partes*, *ventriculum* habet parvum, cum parvis & paucis appendicibus. *Hepar* pro corporis ratione magnum, album, & in eo fellis vesiculam. *Splenem* parvum & subrubrum. Carnis porum, ideo facile exsiccat, & sit levissimus.

Vesicula

Aristot. H.
Al. 9. c. 9.

Vescitur maris excrementis. Plures capi non solent. Vocem grunitui similem omittit, seu attritu brachiarum, seu suis anterioribus, quas circa ventrem habent. Spiritus enim inclusus in his est, quem dum attulerunt atque agitant, sonos illos elidunt.

Utraque quia dura est, daminari ferè in cibis solet.

ARTICVLVS IV.

De Phagro & Erythrino.

TAB.
XVII. 13.
Aldrov. de
Piscib. l. 2.
c. 8.

PHAGRVS seu Pagrus, ὁ φάγρος, quia vorax est Græcis; à colore fragorum, rubeo enim est, Italis ita dicitur. Cave cum Paguro confundas.

Tanta est inter ipsum & Erythrinum similitudo, ut, cum eiusdem sunt magnitudinis, etiam peritis imponant. Distinguuntur tamen eo, quod Pagrus hyeme à ruffo ad ceruleum magis vergat, toto corpore sit latiore & retundiore, Sargi instar recurvus, rostro spissiore, rotundiore, & ad aquilini nasi figuram accedente. Habet insuper tergoris pinnam crassiorē: oculorum pupillam crystallinum, iridem rubram, peculiaremque lituram, nigricantem, tactu asperam, in lateribus circa cervicem, ubi linea est, quæ corpora piscium interfecat, latam. Squammas gerit rotundastenuēs & latas. Superior maxilla in tubi modum cervici veluti infarcta est, neque cranio inhæret. Cum oscitat exeritur, postea contrahitur. Dentēs quoque habet acutos; quatuor exteriores parum falcantur; molares, qui rotundi & obtusi, duplici ordine disponuntur. Interiora si scruteris, sunt ei lapides in cerebro, lingua in ore veluti rudimentum, hepar sine felle. Cor angulatum, vesica aere plena. Numenius λοφίαν quasi cristatum dixit, quod ea corporis pars, quæ cervici respondet, sublimis sit & alta.

Quem Aldrovandus exhibet, is pinnis omnibustergore & cauda rubet. Oculorum ambitus ruberrimus, argen-

teus lituris conspergitur. A branchiis ad caudam linea excurrit, aurea, serrata. Ambigit inter littorales & pelagios, inter hos Mnesitheus locat. Oppianus in saxis degere scribit. Quod ex Indico mari salitum afferri Oribasius prodidit, de illo potius, quæ Syenitæ in Ægypto sacrum habent, eoque, quod una cum crescente Nilo apparens, incrementum eius denunciet, abstinere, intelligendus est.

Vivitat alga & luto, sed & sapiolas, squillulas, loligunculos appetit. Echinis an vescatur, quod nimis aculeati sunt, dubito. Isidorus tam duros ei dentes tribuit, ut & ostreis in mari aliqueat. Hyeme prægelida, quod lapidem in capite habeat, latet. Inescatur channis sive hiarulis.

Quid sibi Aristoteles velit, dum citante Athenæo Pagrum ἀκμαῖον τὸ ἔαρ, id est vere vigere scribit, difficile ter intelligi potest, nisi τὸν ἔαρος parere vere innuatur.

Archestratus Syrio exoriente comedendas esse suadet. Suaves & media carne Hicesius posuit. Gellius inter delicatos habuit Sanazarius ex Dicarchi, nunc Puteolos vocant littoribus, celebrat.

ERYTHRINVM, qui peculiare hoc nomen à colore invenit, moderni Græci λέβρινον, Cyrenæi authore Zenodoto apud Athenæum ὄκκινον, authore Clitarcho δίκκινον vocarunt. Theodorus satis ambigue Rubeculam, Plinius rectius Rubellionem dixit. Idem ne cum Ruburno & Ruscupa, de quibus Murmelius, non disputo.

Palmi mensuram raro excedit. Ruber est ut Mullus, dilutior tamen, unde fortè ξανθὸν Oppianus dixit, latus ut Aurata. Rostrum habet acutum, sed non valdè extensum. Os parvum, mediocribus dentibus munitum. Caput utrinque compressum. Ante oculos, qui magni, foramina patula. Branchia quæ in dorso unica est, multis aculeis horrescit. Bellonius duodecim, quindecim Rondeletius, viginti duos, Salvianus, novendecim Gesnerus numerat. Cauda in lunatam pinnam definit. Intus candidissimus est.

Peculiaris est mari, hyeme in alto

Oppian.
Halieut. l.
1, v. 140.

Oppian.
Hal. l. 3. v.
185.

TAB.
XVIII. 6.

Arist. H. A. degit, æstate circa littora capitur.
l. 4. c. 11. l. Diversus est ab isto ille qui in lacu
6. c. 13. Suerinum alluente, non procul O-
l. 2. de ge- ceano Germanico visitur.
ner. An. c. 4

Plin. H. N. Carnivorus est. Cancellis & aliis
l. 9. c. 16. pisciculis insidiatur, nec locustis &
 cicadis parcit. Gregalem esse Athe-
 næus Aristotelis autoritate memi-
 nit. *Sexu* non distinguuntur. In om-
 nibus enim reperiri ova Aristoteles
 author est. *Pariunt* ineunte æstate.
 Cum sesquipalmum excesserint in-
 denticles seu Synodentas abire, fal-
 so Iovius credit. Ad formam dun-
 taxat coloremque accedunt, minus-
 que solito rufi, canescunt veluti.

Quantum ad *usum* copiosum ali-
 mentum præbent Xenocrati: nunc
 inter mediæ substantiæ pisces nume-
 rantur, si sint recentes, frixi & frigi-
 di inter saporis iucundi cibos. Ace-
 to & aromatibus in Gallia consper-
 gere mos est. *Plinius* in cibo sumptū
Plin. H. N. Venerem concitare & alvum sistere,
l. 32. c. 10. quod à Xenocrate mutuatus est, scri-
 bit, in vino putrefactus, vini tædium
 adfert, cui illud propinatum fu-
 erit.

ARTICVLVS V.

De Acarnane & Orpho.

TAB. *P*iscis quem Hicetius apud Athe-
XVIII. næum Acarnanem vocat, Di-
7. 8. philo ἀκάρναν, Athenæo alicubi ἀχάρνης
Athen. l. 7. ex Gallia, Ethymologo ἀχάρνα, Pli-
& 8. nio *Acarne*, dicitur. Scribitur quo-
Dipnos. que ἀχάρνη, ἀράχνη, & ἀράχνης, sine
Arist. H. A. dubio mendose. Mugilibus infe-
l. 8. c. 9. stum esse, si is est, quem Aristoteles
Plin. H. N. innuit, & æstate extenuari, veteres
l. 32. c. 11. prodidere.

Rondeletius pro eo piscem exhi-
 bet, album, squamis argenteis, ore
 mediocri, teauibus dentibus, rostro a-
 quilino Pagri modo, spacio quod in-
 ter oculos est compresso, oculis pro
 corporis proportionem magnis, aure-
 isque pinnis candidis.

Erythrino adeo similis est, ut pro
 eo vendatur. Capitur æstate & hye-
 me; illa extenuatur, & laborat.

Carne est candidissima, media

substantia, facile concoquitur & di-
 stribuitur, & bonum succum gignit.

ORPHUS Polluci ὀρφος, vel quod
 magis Atticum est ὀρφις, Gazæ *Cer-
 nua*, quis apud veteres piscis fuerit,
 difficile est conicere, pauca enim
 quæ ad cognitionem eius faciunt, re-
 perias. Benedictus Tincis similem
 credidit. Alii *Capitonem* ab oculorum
 aspectu & rubro colore dixere, qui-
 dam quia maiorem Capitone opi-
 nantur, sui generis piscem esse tra-
 dunt. Gellius ab eo qui hodie in
 Græcia ita vocatur, non distinguit.
 Rondeletius maiorem hunc veter.
 Orpho, qui à *Mullo* devoratur, (vi-
 ginti enim libras pendet) nec litto-
 ralem postquam dixisset, piscem Pa-
 gro similem, colore ex purpureo ru-
 bente, oculis magnis, dentibus serra-
 tis, podice adeo parvo, ut rinula vix a-
 nimadverti possit, seminis meatibus
 carentem, pro eodem ponit; eidem-
 que omnia quæ veteres de suo dixe-
 re, competere scribit. Bellonius de-
 nique alterum compressum magis
 quam teretem, squamis asperis, &
 corpori firmiter inhaerentibus te-
 ctum: Capite rubeo; pinnis tergoris, la-
 terum ventris, & caudæ variis colori-
 bus insignibus; labris scabrosis, ma-
 culam in radice caudæ gerentem,
 quem Cretenses *Cheluda*, *Acheluda*, &
Petroparo nominant, pro eodem ob-
 trudit.

Urut sit, de veterum Orpho sci-
 mus, Aristoteli & Athenæo littora-
 lem, Æliano marinum, Ovidio pe-
 lagium esse. Numenius thalamis &
 cavernis delectari; Oppianus in pe-
 tris cavernosis, quæ plenæ sunt Cha-
 mis & patellis, degere scripsit. Car-
 nivorus idem. In Myrinensi Lyciæ
 sinu ad Apollinis templum, ad spar-
 sas virulinas carunculas adnotant,
 easdemque comedunt; brevi tem-
 pore adolescit, hyeme latet; in bien-
 nium vitam non prorogat, & tarde
 moritur, ideo ὀφιογών γένος Oppiano.

In ciborum fuit deliciis. Nam &
 Dorion Opsophagus inter cæteros
 veluti ex piscibus, Deos ponit; &
 Lynceus Samius Attico Glauci-
 sco, Ellopem & Orphum Rhodios
 oppo-


Arist. H. A.
l. 8. c. 13. l.
5. c. 10.
l. 8. c. 2. c.
l. 8. c. 15.
Athen.
Dipnos. l.
3. & 7.
Oppian.
Halieut.
l. 1.
Ælian. H.
l. 1. c. 18.

Sphyraena. *fusc* *Sudis*. ein art meerhecht.




Piscis gutturosus.

3 dickhals.





Alauda non cristata. meerlerch ohne Kan.



Hirundo Plinij.

4


Mullus umbos. glatter rothbart.



rother meer brasmen.


Erythrinus.

6



Acarnan.
fleck brasmen


7



müneh brasmen
ein ander rother
meer brasmen.

8


Orphus.



Dentex.


Sinodus.

9



10


Synagris. zin brasin
ander art



Sparus.


11

Sparbrasin



12

Scorpius *Scorpius minor*
Scorpena Kläner
meerscorp.



Aristoph. in Vespiis. opposuit, & Aristophanes inter re-
gios pisces retulit. Athenæus *εὐχολον*,
πολύχολον, *γλήχρον*, *δύσφραστον*, *πλύντρονον*
& *ἀρηπικόν* facit, quæ sequuntur trans-
posita esse, ut Rondeletius obser-
vavit, videntur, qui enim potest a-
liquid esse *γλήχρον* & *εὐπεπλον*, gluti-
nosum, & concoctu facile. Phi-
lotimus tamen inter duræ carnis pi-
sces reposuit.

ARTICVLVS VI.

De Synodonte sive Den-
tice.

TAB. XVIII. 9. **S**YNODON piscis *αἰχὴ τῶν ὀδόντων* no-
men invenit, quod si prima syl-
laba per iota scribatur, *αἰχὴ τὸ σινεδυ*
καὶ βλάπτειν τοῖς ὀδῶσιν, quod dentibus
noceat, ita vocatur. Gaza *Denticem*,
Albertus *Dentatum*, alii *Dentalem*
nominavere. Plinius Græcam no-
menclaturam retinuit. In Adria-
tico mari in insignem magnitudi-
nem excrescit; in littore Auratam
non superat. Vulgarium pondus
 trium aut quatuor librarum esse so-
let: decem librarum pondere ob-
servavit Salvianus. *Dorsum* habet
rependum; *latera* satis compressa.
Caput nonnihil fastigiatum, in quo
lapides, qui *Synodontides* vocantur,
gerit; *rostrum* acutum, *Os* satis am-
plum, valdeque denticulatum, præ-
ter minores ac ferratos, superior
maxilla quinis aliis, inferior octo-
nis permagnis, caninis simillimis ar-
matur. *Oculi* sunt magni, bran-
chiæ utrinque quaternæ. In *dorso*
pinna unica viginti aculeis muni-
tur. *Cauda* est falcata. *Venter* ar-
genteus, unde album Numenius
vocavit: *latera* & *dorsum* ex al-
bo rubent. Unde ruber Ovidio *ἐρυθροπικίλ* Epicharmo.

Aldrovandus duos alios fortè con-
generes huic addit; quorum priori
tergus viride, *Synciput* aureum,
branchiarum ossa violacea. *Alteri*
os intus & extra subatrum, supra
id macula cærulea: sub branchia-

rum pinnis macula insignis, pur-
puraceis, aureis decorata squam-
mis. *Venter* flavus, *squamme* ar-
gentææ.

Pelagium quidem Columella fa-
cit cum Ovidio, sed Aristoteli &
Oppiano, quibus littoralis est, suf-
fragantur piscatores. Probantur ex
Dalmacia & Illyrico, præsertim
Salana atque Tragurio. Colu-
mella Punicas & indigenas nomi-
nat.

Carne tandem vescitur, & tanta
cum aviditate, ut venter in os pro-
cidat. Polypi carne inprimis dele-
ctatur, quem cubili suo extrudere
non possit, ante ostium tanquam
mortuus fluctuat, brachium exten-
dentem, arripit, sed & in ostrea ac
pisces innoxios grassatur: nec Bo-
ce, quod ab Oppiano proditum,
parcit. Gregales sunt, & *συναγελά-
ζονται κατ' ἡλικίαν* solent: per adolescen-
tes κατ' ἡλικίαν νεχόντας, separatim à re-
liquis natant. *ἐντελέστεροι πάλιν κρινῶν*
firmiori ætate inter se vitæ com-
munitate junguntur. Cibo à pi-
scatore demisso, in orbem consi-
stente, & signum quasi eo arripiatur,
dant.

Ab Antiphonē inter lautissima
obsonia recensentur. Hicæsius co-
piose esse alimenti, & difficulter ex-
cerni scribit. In Italia peculiare
condimentum quod amarinare vo-
cant. In Dalmatia concisus & se-
micoctus multo croco & perspicuo
gelu conditur, detestatum Aponensibus
obsonium.

ARTICVLVS VII.

De Synagride & Chro-
mi.

DE SYNAGRIDE pisce diversæ *TAB.*
sunt apud Authores opiniones. XVIII.
Theodorus Gaza pro eodem cum *IO.*
Synodonte sumit. Massarius & Gel-
lius adeo similes, ut vix discerni que-
ant, volunt. Rondeletius sola æta-
te distingui iudicat. Diversos pisces *Piscib. l. 2.*
vel *c. 13.*

vel ex Aristotele colligas, qui diversis in locis, duobus his nominibus utitur. De Bellonio tacebo, qui & modernos Græcos distinguere scribit. Antonius Gigas sequentem iconem pro Synagride misit.

Piscis erat insigniter dentatus, squammis undique latissimis, & facile deciduis tectus. *Capite* superius sanguineo, inferius ex albo & cæruleo variante. *Ventre* ex albo flavescente, lateribus candicantibus. Bellonius Synagridem, Cyprini in modum, veluti circino ita circumductum, ut pro longitudine ac latitudine magis crassus appareat, facit. Caput, inquit, utrinque compressum habet &c.

TAB.
XVII.
14.

CHROMIS & Cremis *χρῆμις* idem esse piscis, vel propter nominum similitudinem esse videtur. Agrun- nitu, quem edit ita dictus est, quod & apud Isidorum qui eundem cum corvo marino facit, legimus; sed is, ne, quem Rondeletius describit, pin- nis, spinis & figura Metaurino simi- lis, oculis tamen minoribus absque macula in cauda, toto corpore nigri- cante; anis, quem Bellonius, Chro- mis sit, dubitatur. Accedit tamen huic Aldrovandus, sola grunnitus ra- tione habita. Tenuibus autem is squammis vestitur ex auro nitenti- bus, ac cæruleum interdum colorem concinnè vibrantibus. Binas (ver- ba sunt Bellonii) *pinna*s gerit in ter- gore, quarum anterior quæ minor est &c.

In herbosis degere Ovidius au- thor est, quia immundum nominat, & luto gaudere credibile est. Virentibus herbis vescitur. Parit quotan- nis semel. Exquisito esse auditu apud

Aristot. H. Aristotelem legimus. Grunnire su- A. l. 5. c. 9. perius dictum est.

l. 4. c. 7.
& 8.

Vilem suam Chromin Ronde- letius facit. Bellonii inter lauda- tissimos censetur.



ARTICVLVS VIII.

De Aurata.

Aurata, seu Orata, Græce *αὐρά* TAB. XIX. 2. *φῆς*, quod iis in locis, ubi in cæ- teris animantibus supercilia esse so- lent, aureo colore resplendeat, E- phesiis teste Archestrato *αὐροῦ* Hesychio *ἐπὶ* dicitur. Ad denas libras cum maximè adolevit, vix un- quam pervenit. *Dorsum* habet re- pandiufculum, ex cæruleo nigre- scens. *Latera* compressa, argentea. *Ventrem* lactei coloris. Partes oculis superiores auro, in adulto maximè, resplendent. *Dentes* anteriores sunt longi, rotundiufculi, serrati, inter- næ utriusque maxillæ partes, pluri- mis offeis tuberculis duris & inæ- qualibus muniuntur. *Ventriculum* ha- bet amplum cum paucis, ut Aristot. H. A. l. 3. c. 17. teles notavit, appendicibus. *Intestina* ampla pinguedine involuta. *Iecur* ma- gnum & pallidum, à quo *fellis* vesicu- la, longa, pinguedine obducta pen- det. *Splenem* subatrum.

Sic est marinus piscis, ut & in la- Aristot. H. cubus etiam marinis nascatur, quod A. l. 8. c. 13. tales convectis marinis seminibus. Romani replessent. Commachium Athen. Di- Bonnoniensibus eas subministrat, & pnos. l. 1. olim Velimus, Sabatinus, Vultinen- sis, & Ciminus eas procreabat. Sed & Aristot. H. circa Berenicem Libyæ fluvium, qui A. l. 8. c. 2. *αἰθῶν* dicitur, inveniuntur.

Cibus ipsi sola caro. Tellinas & conchyliis robustis maxillis frangere; Menide tanquam eius esu vehemen- ter oblectetur capi, certum ferè est Scari modo *ruminare* asserit, sed fortè sine authore, Rondeletius.

Æstate circa fluviorum ostia Plin. H. N. parit. Æstus impatientia, me- l. 9. c. 16. diis fervoribus, sexagenis diebus latere à Plinio proditum est: tem- pus Aristoteles non expressit. Ti- Aristot. H. midiffimos esse captura ostendit. A. l. 8. c. 19. Recedente maximè sub Arcturi tempus mari, arborum ramos fron- dibus vestitos, in arenam piscatores Ælian. H. A. l. 13. c. 28. difigunt: accedente plurimæ attra- hun-

hantur; réciprocante ramorum
tu, quiescunt, & ab imperitissimis
quoque capiuntur.

Macrob.
Sat. l. 2. II.
Columella
R.R. l. 8.
c. 16.
Athen. l. 5.
In precio fuere olim, Ephesiæ in-
primis, quas Archestratus celebra-
vit. Sergium Romanum patritum,
cognomentum inde sibi adscivisse,
quod carissimæ ipsi essent Ora-
tæ, apud Varronem Columellam,
Valerium Maximum, & Macro-
bium legimus. De *nutrimenti* qua-
litate non convenit inter veteres.
Mnesithæus difficulter coqui, con-
coctam multum alere. Celsus du-
riorem esse. Diphilus cum Melanu-
ro, qui succi bonitate Sargo, Hicesio
iudice, minus nutriente, inferior est,
proportionem habere, asserit. Ideo
Rondeletius carne media esse pro-
nunciavit, saxatiliū duriorē. No-
stra ætate marinæ & quæ hyemē ca-
piuntur, laudantur. Lacustres pin-
guidiores quidem, sed lutum, quod
in eo degant, olent. Apparatum in
Aldrovando vide.

ARTICVLVS IX.

De Sargo.

TAB.
XIX. I.
Aldrovand.
de Piscibus
l. 2. c. 16. 17
Σ *Αργός* an *σάργος* dicendus sit pi-
scis, dubitatur. Is quem Mela-
nuro Hicesius accommodat, vo-
catur *σάργος*. Rondeletius gemi-
num nomen agnoscit, à multa car-
ne id habere iudicans. Sparo
squammis tenuibus, lato corpore,
linea à branchiis arcuata, pinna con-
tinua affinem Bellonius pronuncia-
vit. *Rostro* acutiore, *dorso* magis re-
pando, *ventre* prominentiore, *denti-*
buss latis humanisque simillimis, li-
neis quibusdam, unde *πλόγος*,
& macula juxta caudam nigra, unde
μελανόγος, & *ὀρροπυγίστις* Ari-
stoteli dicitur, distinguitur. *Colore*
aliàs est argenteo. *Pinna* quæ ad
branchias sunt rubescunt. *Branchia-*
rum exterius tegumentum spineum
est. Hepar subrubescit: ab hoc *fellis*
vesicula pender. *Lien* subniger est, &
ferè circinatus. Ad multam magni-
tudinē excrefcere affolet.

Aldrovandus binos exhibet. Prior

ὀρροπυγίστις, pinnas omnes, præter
eam quæ ab ano est, habet aureas:
maculam juxta Uropygium viola-
ceam, totum caput ad eundem colo-
rem vergens.

Alter πλόγος, aureis & argen-
teis quæ ferræ figuram exprimit li-
neis, elegantissimè condecoratur,
pleræq; ad rubiginem vergunt. Gef-
nerus in *mortuis* lineas evanescere
tradit. Ægyptio eum mari vendicat
Festus, sed & in Adriatice nascitur.
Pelagius nescit an, saxatilis vel littora-
lis inter Ovidium, Ælium, Oppia-
num, & Aristotelem non convenit.
Ita littore gaudere dicerem, ut &
cautes sæpè frequentet, quod radiis
solaribus ibidem commodius frua-
tur. Sæpè quidem *cæno* à Mullo exci-
tato contentus est, sed & carnivo-
rum esse certum, quia Lycofomo
pisce inescatur. *Gregalem* Ælianus
facere videtur: dum confertos capi
scribit. Ad motum ut ut benè *νοήσις*

Oppiano dicatur, in evitandis ta-
men piscatoriis insidiis *λινωπληγίστις*
est, seu quod lineam ad scopulos te-
rat, quod apud Plinium legimus: seu
quod vel retibus proximus spei pi-
scatorum illudat, *λινὸν* sanè & pro
voti, & pro linea cui hamus affixus
est, sumitur. Plures sibi adsciscunt
uxores, pro his tempore verno pu-
gnant. Vere & autumnō *parere*, a-
pud Aristotelem legimus, si quid
aliter ab eodem dicitur, de Sargi-
no non Sargo fumendum est. Tam
vehementer capras amare Ælianus
prodidit, ut ad illarum in aqua um-
bram, odore fortè illecti, adna-
tent, & saltu contingere conentur.
Ne itaque mirere pellibus earum
capi.

Fit eorum ab Epicharmo in
nuptiis Hebes mentio. Et sanè gra-
ti esse stomacho creduntur, pro-
bique succi. Cæterum ægriusculè,
quia durioris carnis, concoquun-
tur. Hydropicis Garyopontus præ-
scribit. Dentes gestatos dentium
avertere dolores. Kiranides fabula-
tus est.

Adiungit Aldrovandus Sargo pi-
scem, quem pro Melanderino, Athenæo
nomi-

Ælian. H.
A. l. 1. c. 23.
Aristot. H.
A. l. 8. c. 17.

Oppian.
Halieut. l. 1.
v. 132. l. 4.
v. 267.
Plin. H. N.
l. 9. c. 59.

Aristot. H.
A. l. 5. c. 9.
Ælian. H.
A. l. 11. c. 11.

nominato, si exemplat mendosum non est, (Causabonus Melanderini nomen ab aliis exemplaribus exulare scribit.) Rondeletius depinxit. Melanuro iste similis est. Toto corpore nigrescit; circa caput ex nigro purpurascit. Cauda saxatiliū more in unam latam pinnam definit. Hepar habet ex rubro candidum. Splenem nigrum, felleum, lapides in capite.

ARTICVLVS X.

De Sparo.

TAB.
XVIII.
II.

QVem Græci *σπάρων* ὄντο & *σπάρειν* quod est palpitare, ut Euthatius author est, Latini Sparum, seu à spargendo, seu aliunde vocant: hunc eundem cum *Rhyade* Aristotelis, & Æliani *Aspargo*, sed perperam, Rondeletius facit. Nec enim vel *σπάρων* speciale alicuius piscis nomen est, quod Salvianus opinatur; nec videtur isto vocabulo in singulari uti. *σπάρειν* verò, quos Aristoteles, fugere quoties vel piscium loturā vel navis sentina eiecta est, quasi fœdo tactos odore scribit, & quos Gaza modo *flutas*, modo *Spargos*, aliquando *fusaneos*, id est, *χύτας*, quod fusum retibus capiuntur, vocat: ii sunt, qui frequentes quidem & simul natant, fusimque & retibus capiuntur; ducem tamen, quod *ἀγέλαος* proprium, non habent.

De Aspargo nihil apud Ælium A. l. 9. c. 46 invenies. Gyllius duntaxat *Rhyades* *Aspargos* interpretatus est, & multis errandi occasionem præbuit. Haud parvam cum *Aurata* & *Sargo* habet similitudinem. Ab illa, corpore minore & magis rotundo, rostro acutiore, & quod circa brachias nullam neque purpuream, neque nigram maculam gerat, distinguitur. Ab hoc verò, quod ex auro refulgeat, lituram in cauda habeat, capite sit magis protenso, tres *aculeos* sub spina quæ est ano vicina ostendet, lienem rubrum, gracilem, oblongum, rectum, in dextro latere habeat, differt.

Littoralem Oppianus facit, Plinius inter marinos recensuit. Ovidius pelagium voluit, sed & marinis stagnis gaudet, inque iis frequenter capitur. Gregalis est, *carnivorus*, venatur & marinos pulices. Æstate circa saxosa littora parit. Haud olim ignobilis in cibo. Coquus apud Antipppum inter lautissimos recenset. Epicharmus inter eos ponit, quorum ne stercorea quidem fas sit Diis abjicere. Diphilus acrem esse *ἀπὸ λόςου κενὸν ἄβρωμον, εὐσμάχον*, pronunciat, elixum coctu facilem, *πυρηνιστὸν* difficilem addit. Rarò ob parvitatem elixatur.

ARTICVLVS XI.

De Mormyro & Cantharo.

DE Mormyro, qui Oppiano *μορμύριον*, Ovidio *Mormyr*, Gazæ *Mormur*, pauca prodiderunt veteres. Quem Bellonius describit, Constantinopoli & alibi, nomine veluti per manus tradito, Mormyrus dicitur, videturque notas ab antiquis traditas. (*αἰολοῦ* seu maculosum Oppianus, *picturn* Ovidius nominat) sibi vendicare. Piscis est corpore quam *Aurata*, *Sparus*, *Sargus*, & *Melanurus* longiore, & minus ad latera compresso. Capite item (utor verbis Aldrovandi) tenuiore & cæ lato, rostroque acutiore. Os mediocre habet, dentes exiguos, labia crassa, oculosque medios, brachias utrinque quaternas &c.

Littoralem esse, præter Arcestrati apud Athenæum & Oppiani auctoritatem, Cottidiana piscatorum experientia testatur. Nullum non *cibum* attingit, parva animalcula, conchulas, & minora crustacea venatur; nec à terrestribus sordibus abstinet. Parit æstate, capitur verriculis, & plagulis, ut Plutarchus ait. Retibus inclusus, imis in vadis, sulco, crebro caudæ motu depulsis arenis facto, subterlabitur. *τροφιμώτατον* Hicæsius facit, quia lutum olet, vilis nostro tempore habetur.

CAN-

K vestre

vestre quid & ferinum resipit: circa Ebusam tamen capta haud spernitur. Alexandrina pariter maximè si in Autumno nata fuerit, humidum quid & album, idque non virosum emittit, ut Diphilus refert, sed & circa Mytilenem tempore messis capta haud ingrata est. Omnium tamen dura caro est, ut Plinius percoqui posseneget, nisi ferula prius verberetur.

Plin. H. N.
l. 9. c. 19.

TAB.
XVI. 7.
Athen.
Dipnos.
l. 7.

Huc STROMATEUS pertinet, piscis in rubro mari teste Athenæo nascens, Salpæ similis, & universo corpore, aureis lineis productis distinctis, unde nomen invenit. Rondeletius pro eo subsequenter piscem pinxit, sed non descripsit.

ARTICVLVS XIII.

De Fiatola Romæ dicta.

TAB.
XIX.

8. Piscem qui *Fiatola* Romæ dicitur, quidam veterum Callionymum, alii *Ellopon*, nonnulli *Lycon*, Bellonius καλιδον esse opinatur. Aurei est & argentei coloris, multisque lituris variegatur. Latus item est ac planus, ut Bellonius scribit, rotundum ferè & compressum, Seferino non valde ab similem, Rondeletius facit. *Lingua* habet carnosam Delphini modo, ad humanam accedentem, suisque partibus omninò absolutam, quod inter cæteros branchiis præditos solus habere videtur. Vendicat & hoc sibi peculiarare, quod *pinnis* sub ventre careat, sitque omninò inermis. Gerit quoque branchias utrinque quatuor superiorem maxillam immobilem, Caudam, lunatam, lineam à capite sub ventre ad umbilicum extensam, atque utrinque in cervice maculam nigram, Squammis in eo duntaxat lineæ ductu, qui piscis latera distinguit. Hepar ipsi unius lobi nullo felle præditum. *Stomachus* in litteram V. efformatus, cuius infima pars, in mucronem terminatur, & ad pylorum tam numerosas *appendices*, ut nulla arte numerari possint, habet. Intestina fulcit glandulosum pancreas. Lien stomacho subest. Benè in hunc pi-

cem καλιδον Bellonius vocet, non disputo, hoc tantum addo, Cetaceis hunc ab Oppiano annumerari, dentes feratos habere & gregatim degere, quod fortè *Fiatolæ* non competit. Adjicio tamen Bellonij in icone Callychtin, quem Gesnerus pro Hepate primo habebat. Quod reliquum est, frequens est Romæ *Fiatola*, alibi rarus & incognitus. Rondeletius suis littoribus nunquam visum asserit. Fertur expulmone marino nasci, & optimi saporis esse.

ARTICVLVS XIV.
















De Scorpio & Scorpide.

SCORPIUS piscis, qui Plinio aliquando *Scorpio*, ab insecto nomen traxit, non quod vel corporis figura id, vel colore æmuletur; sed quod, ut aculeo Scorpis terrestis, quem habet in cauda, ita hic spinis quibus in tergore & capite armatus est, venenum vulnerando infligat. Putatur à Scorpide sexu duntaxat differre, ut hic sit fœmina, ille mas: sed videntur specie distingui, & Scorpis cum Scorpina pro uno pisce habebuntur. Tribus quandoque datur; in mari rubro ad duorum & trium cubitorum magnitudinem excrescere, *Ælian.* nus: ad tantum & apud Inos *Tzet.* scribit. Corpus habet rotundum, anteriore parte crassissimum, posteriore tenax. Squammas tam exiles & tenues, ut nisi advertas, iis carere videatur. Solo ventre albicat, cætera rubet, unde Plinio rufus, Numenio *ἔρυθρος*, Hicetio *πυρρός*, Diphilo *κίρρος* nominatur, quia nigras quasdam propicius notas habet, benè Epicharmus *πικρίλον* dixit. Caput ipsi magnum, angulosum, durum, osseum, plurimis acutissimis aculeis munitum. Os magnum, dentes confusos, densos, in inferiore maxilla triangulares, superciliorum loco aculeus acutissimus Cuculi instar, cum appendice cutacea molli, branchiarum utrinque quaternarum, osseo aculeatoque exprimento contritarum: juxta eas binarum latarum pinnarum, totidemque ex harum regione in ventre sed minores, in dor-

TAB.
XVIII.
12.
TAB.
XIX.
9. 10.
TAB.
IV. 7.

Ælian.
H. A. l. 17.
c. 6.
Tzet. l. 17.
p. 144.

so uni-



fo unica à cervice ad caudam usque
excurrent, anteriore sui parte unde-
cim vel duodecim firmis aculeis hor-
rida, cetera obtusa & innoxia. Cau-
da unica ac lata pinna constat. Duo
ipſius genera poſuere veteres, *λεζανώδης*
nempe, & *pelagium*, ut apud Athe-
næum legitur; ſed videtur idem u-
trinque eſſe. Alii fortè duntaxat ſunt
littorales, & nigri; alii ruſſi, & in al-
tum quoque ſe efferunt. Inter litto-
rales ergo neſit, an pelagios ambi-
gitur, cum & Mneſitheus apud Athe-
næum ſaxatiles eſſe teſtetur. *Carni-
vorus* eſt & Aphyis, Spatulis, Gobio-
nibus, Cancris inprimis veſcitur, nec
algam ſpernit. *Fætiſcat* in alto ma-
riteſte Ariſtotele; bis, eodem au-
thore, *parit*, vere & autumnò, ſecun-
dum Oppianum *αἰετὸς φέρει βέλῳ*,
*ωδὶναι quaternis ſuſtinet telum partus
doloribus*. Ictum eius venenatum
peſtiferumque apud Dioſcoridem
& Avicennam legimus. Graviffi-
mos infert dolores, quandoque & in-
flationem ventris accerſit. Mullum
diſſectum & impoſitum remedio ef-
ſe Aetius & Paulus tradidere. Ron-
deletius cum ipſius Scorpionis he-
pate, & lentifco conuſo, ad vulne-
ris ambitum applicato, expertus eſt.
Uſum & in cibo & in Medicina invenit.
Hiceſius apud Athenæum abſterge-
re, excoctu facilem, multi ſucci, plu-
rimi nutrimenti, quod *χορδωδής*, id eſt,
carnis ſolidæ, firmæ, calloſæ, ac velut
cartilagineæ (malè inter *σπλάγχ* &
χορδωδής referres) ſit, facit. Com-
mendatur, qui hyeme, locis ſaxoſis,
& puro mari captus eſt. Duritiem
diuturna mortui aſſervatio emen-
dat. Calore naturali evaneſcente,
externo colliquante humidior ef-
ficitur. Archeſtratus in Thaſo non
longiorem pygone (viginti digito-
rum meſura eſt) emendum cen-
ſet. *Medicinam* ſi ſpectes, juſ alvum
apud Plinium & Dioſcoridem emol-
lit. *Fel* ad menſes vel ſecundas tam
exceptū ab Hippocrate uſurpatum.
Plinio verrucas tollit, & unguiū ſca-
britiem emendat. Marcello à nebu-
la & caligine liberat. Lapis, qui in
capite è ſtrangurioſis utiliter bibitur.

SCORPIDEM & SCORPENAM
pro eodem piſce Aldrovandus ſu-
mit. Specie à Scorpio, ut ſupra di-
ctum, quod colore & ſucco diſſe-
rant, ut Athenæus ait, diſtinguit.
Scorpidium Piſellus vocare videtur.
Cinericia eſt Bellonio, & multo
Scorpio minor, de cetero (tam et-
iam vivax, ut exenterato & corde ca-
rens moveri non deſinat) Scorpio in
omnibus ferè ſimilis. *Veſcitur* algâ
& ſordibus marinis. Caſtitem im-
maculatam generi ſuo ſervat, itaque
habet pudicitiam ſui generis, ſed ve-
nenum ſui generis non habet. Non
enim percutit Scorpæna ſed reficit.
Apud Athenæum Scorpio in cibo
poſthabetur.

Ambroſ.
Hexam.
l. 5. c. 2.

ARTICVLVS XV.

De Blenno & Pectine Ro-
manorum.

BLennus Oppiano *βλένῳ* contra
aet. à *βέλενῳ*, Athenæo fortè
βαίων, quod præ corporis craſſitie bre-
vis (*βαίος* idem quod minutus) So-
phroni *καθῶ* potius qui idem cum Go-
bio, quam *καθῶ* ſpecie ſimilis, dicitur.
Corcyrenſes & Zacynthii *Cepolam* à
Cepæ ſimilitudine propter turgidū
ventrē appellant, exinde *Bulbum* Pli-
nii eſſe Bellonius coniicit. Rarò Go-
bium magnitudine ſuperat. Colo-
re eſt vario. Licet totus ferè liveat,
plæriſque tamen locis rubet, quibuſ-
dam etiam flavescit. Squammis pau-
cis, tenuibus, & tam facile deciduis
tegitur, ut tum ad hoc, tum quod ob
plurimum mucum, quo oblinitur,
adeò lubricus ſit, ut vix manibus ad-
ſtringatur. Caput habet magnum, o-
culos eminentes, nigros.

Labrum ſuperius capite ceu tubum
quendam infixum. Dentes ferratos,
ſed adeò exiguos, ut os aſperum po-
tius, quàm denticulatum appareat.
Lingua albam conſpicuam. In la-
tiore pinnae tergoris parte, macula
nigra, albicante circumdata circulo,
parvi argentei numiſmatis magnitu-
dine, oculorum in cauda pavonis fi-
gura conſpicitur. Reliqua in icone

K 2 viſum.

Athen.
Dipnoſ.
l. 7.

Athen.
H. A. l. 8.

Ariſtot.

H. A. l. 5.

c. 9.

Plin. H. A.

l. 9. c. 51.

Oppian.

Halieut.

l. 1. v. 590.

Dioſcor.

l. 6. c. 61.

Plin. H. N.

l. 32. c. 9.

Hippocrat.

de morb.

mulier. 1.

Oppian.
Halieut.

l. i. v. 109.

visuntur. In algofo littore *versatur*. Romæ rarus, in Græcia frequentior. Non longè à loco, quo degit evagari solet. *Vescitur* apuis, squillis, similibusque pisciculis, horum inopia ipsas depopulatur herbas. Gulosus est; sed & stultus Plauto, nisi Blennium ibi melius pro mucoso & pædido sumferis. Carnis est mollis glutinosæ & excrementiæ. Cinis cum ruta vesicæ vitia & calculos sanat.

TAB.

Quem PECTINEM Romæ vocant, XXVII. hunc *Novaculam* Plinii Rondeletius esse suspicatur, quâ tacta ferrum o-
1. lent, quod dorso sit cultellato; Ges-
Plin. H. N. nerus *Paronis* nomine sibi transmissum Româ scribit. Piscis est latus, &
l. 32. c. 9. Fabri instar compressus. Tegitur magnis squammis, & variis pingitur coloribus. Caput maxillæ & branchiarum opercula plurimis cæruleis lineis insigniuntur; Synciput coloris est punicei saturati, latera albicant. Imis ventris & caudæ pinnæ subflavis & virentibus lineis inter se cancellatim commissis decenter admodum depicta sunt. Pinna dorsî rubra nonnullis cæruleis conspergitur maculis, dorsum ipsum est puniceum, cætera ex albo flavescit. Palmi mensurâ excedere nō solet. Capite est magno, valdè cōpresso, & prorsus omni rostro carente. Linea nāq; anteriore capitis totiusque corporis partem terminans, longa sit & recta, atque fere ad perpendiculum, è summo capitis vertice ad inferiorem usque maxillam defertur; in cuius inferioris atque ferè perpendicularis partis loco inferiore, os positum est parvum, dentibus acutissimis, recurvis, exiguis munitum. Branchias utrinque habet quaternas. Ventriculum mediocrem. *Intestina* valdè pingua, multis gyris circumacta; hepar pallidum, cui vesicula fellis annectitur. In saxosis & arenosis littoribus degit. Rarus in Italia, in Rhodo, Siculo, & Hispano marifrequentior. Solus vagatur; & quia parvo est ore, loligunculis, sepiolis, & Apuis duntaxat vescitur. *Carne* aiunt esse tenera, friabili, boni succi, & concoctu facili. Nullis ferè aliis spinis quam iis, quæ dorsî

spinam constituunt, interciditur, planorum more.

ARTICVLVS XVI.

De Aphyis seu Apuis in genere.

A Pua, sive pro parvo piscitio, sive pro peculiari aliqua specie tantum accipiat, & ἀφύη potius quam ἀφύα, ut Suidas & Aristophanis scho-
liastes pronunciant, dicitur, Atticos in plurali, in singulari rarissimè protulisse; quod cumulatim edi soleant, Eustathius author est; nec aliam ob causam ἀφύα vocavit Aristophanes. An vel ὡς ἀν ἀφύης ἔσται quasi non nata, quod Rondeletio & Aldrovando placet; vel quasi δυσφύης, bis nata, quod malignè & nimis pusillo corpore nascantur; vel ὡς τὰ τέλει, quod ex pluvia generentur, quod Plinius videtur velle, unde Gaza *Apluas* Latine reddidit; vel quasi ἀφύη, id est spuma, ex qua ab imbre excitato oriuntur, dicantur; non disputo: nec ἀφύη, cum Apuis quas *Cobites* veteres nominant, specie iidem sint, inquirō: hoc certum λιπαρὸν à pinguedine Varino; γόνον θαλάσσιον, quod eum semper sint exigui, semper foetus recens esse existimari possint, ab Athenæo dici: nec fortè à vero aberrant, qui ἰγγερίαις Oppiano vocari, credidere. Plura ipsarum à veteribus recensentur genera, quorum ferè nomina sunt, *Apua vera*, *Apua Gobitis*, *Engraulis*, seu *Encrasicholus*, *Apua Phalerica*, *Apua Mugilum*, *Mænidum*, *Mullonum*, item *Hepsetus*, *Atherine*, & *Membras*. Commune omnibus, candido colore esse. Caput majusculum & oculos elatos & nigros habere. Archippus apud Athenæum σεγγύλας vocat; veteres, quosdam ex semine, alios sponte nasci prodiderunt. In scopulis, quorum sinus multiplices unda excavavit, ad littora *versantur*, tamque densis natant agminibus, ut tam γλαυκὴ λευκάνειν ἀμφιπέτῃ cæruleum mare album reddi videatur, ita aliquando se implicant, ut earū compactarum oc-
Oppian. Hal. l. i. v. 290.
Oppian. Hal. l. i. 4. v. cursio, 470.

Aldrovand.
de Piscib.
l. 2. c. 29.
30. 31. 32.

curfu, vel nāvis retardetur, ut de aliis quæ Oppianus ponit taceam. Quantum ad *Generationem*, spontè sine coitu ex imbris spumefcente mari nasci; alias èlimo putrescente scilicet & ipso, vel quicquid in fundo collectitium est oriri, prodidit Oppianus. Nec aliter Aristoteles, illud si excipias, quod quandam è piscibus oriri addit. Nam apud eum *δὴ τῶν ἀμυγδαλῶν γῆς* seu ex sabulone, id quod apud spumam vocant, prodire legimus. Argumentum ortus, quod frigidis temporibus non capiantur; & trāheis sculpta humo, sæpenumero & copiosiores & præstantiores sint prædæ. Oriuntur autem opacis tepidisque locis, *ὅταν ἐν ὑμῶν ἐκείνῃ γῆς* cum calli clementia terra concalescit, veluti in Atheniensis agri Salamine, ad Themistocleum, & in Marathone. Ejusmodi omnes sunt, ut neque gradescant, neque generent, neque diu durare queant, priore turbā abolitā altera succedere. In nullo apud Athenienses patinarum honore erant, si Chryippo apud Athenæum credimus, fortè ob copiam. Arcestratus *μύθας* seu oleti instar aspernabatur. In mediterraneis expetebantur, inde pinguium Athenis nomen. Nicomedes eorum desiderio flagrans, cum haberi non possent, figuris ex rapis fœminis ad earundem speciem ab Apitio dissectis, ex oleo coctis, & sale atque papavere conditis, ventrem explevit, referente Suida. Apparatum apud Aldrovandum vide. De cætero humidum & flatulentum alimentum præbent. Diphilus gravis & difficilis coctionis esse putabat.

ARTICULUS XVII.

De Apuis in specie, & in primis Vera, Phalerica, Membrade, Cobite, & Hep-
teto.

Genera Apuarum præterito recensuimus articulo.

prima est *APUA VERA*, cui, quæ generatim de Apuis dicta sunt in primis conveniunt, quam Græci propriè ἀφρον, Athenæus ἀφελόν, aliqui ἀφρόνην à spuma nuncupant. Suidæ ἀφρόνη ἢ πρεσβυτέρη, quasi nullis orta parentibus dicitur. Pisciculus est vix auricularis digiti longitudinem adæquans, oculis nigricantibus. Duo eius genera. *Album* in Hollandia frequentius; & rubicundum; *Aphyia Triglitis* Bellonio.

Altera est *APHYA PHALERICA*, vel ab Atticæ portu qui Phalereus appellabatur; vel *ἀπὸ τῶν φαληρῶν* (alba hæc est & spumea Græcis) ita dicta. Sardinis est similis, minor, tenuior. Squammas in mari habet, sed statim excidunt remanentibus earum vestigiis, & iis quæ ventrem firmant. Adeo est mollis & pinguis, ut si aliquando digitis tractetur, liquefiat; aut si magna copia in navicula vehatur, supernatans oleum piscatores colligant. Vidit Rondeletius unius diei capturam, quinquaginta coronatis aureis venditam. Erat apud veteres in precio si Pollucicredendum.

Tertia est *MEMBRAS*. Has Phrynichus apud Athenæum *βερεχθας*, Epicharmus & Sophron *βερεχθονας*, Attici *μεμβροθας*, Trallianus *μεμβροθας* appellasse videtur. Aristoteles ex *Aphyia Phalerica* nasci author est; & inter *μύθας* pisces, id est haud migrare solidos recenset, Cum verò Phrynichus *χερσικαφalus* cognominet, ac Aristophanes *πολιογυρῶνας*, id est, cano corpore, Rondeletius eos pisciculos esse conjicit, qui Gallis *Celerias* vocantur. Sunt corpore admodum candido, capite auri colorem æmulante, Sardinis valdè similes. Coquantur ex præcepto Dorionis, mutilato capite, si corpulentiores fuerint, & lotæ sale minuto & aqua. Contemptos fuisse Antiphanes ostendit.

Quarta est *APHYA COBITES*, *κωβίτης* Græcis, Theodoro Gobionaria. Putatur ab ignobili quodam & terram subiente Gobio procreari. Rondeletio est ille quæ Galli *Logis demer*, ad differentiā fluviatilis vocant.

K 3 Nun-

TAB.
XIX.
12. 13. 14.
15. 16.

Nunquam ad Gobionum magnitudinem accedit, alioqui marinis Gobionibus simillimus. Corpore est rotundo, pellucido, dorso latiusculo, colore candido, nigris aliquot maculis asperso, caudâ variâ, oculis quodâmodo supra caput positis. Pinnæ eadem illi, quæ Gobionibus, maximè illa, quæ his peculiaris, barbæ instar ex ea ventris parte; in qua binæ sunt in aliis piscibus, propendens. Hepar est lactei coloris, & in eo felle vesica, splen, rubet, intestina & peritonæum ex albo nigricant. Cor ex albo rufescent. Gravis est, & difficilis concoctu.

De Encrasicholo sequenti capite agemus. De Aphyis Mugulum inter istos agitur.

Apuas MULLORUM exiguos admodum Mullos arbitratur Rondeletius, qui in stagnis marinis ex putredine nascuntur.

Aphyas MÆNIDUM verò pisculos Mænidum specie sine mare & fœmina sponte nascentes esse iudicæ, etsi contra sentiat Aristoteles.

HEPHETI seu Hephseti nomen, ad multos parvos pisculos extenditur; peculiarem aliquam speciem esse, exinde, quod apud Athenæum pro parvo pisciculo Aphyarum generis ponatur. Rondeletius à Gallis Iouil appellari credit. Est digiti magnitudine, argentei coloris, corpore pellucido, dempta ea virgâ, quæ à branchiis ad caudam extenditur. Oculos habet depressos, pro parvitate corporis magnos. Os ita fissum, ut inferior maxilla superiori sit prætenfa, sitque velut oris operculum.

ARTICULUS XVIII.

De Encrasicholo & Atherrina.

TAB. XVII. 15. TAB. XIX. 17. 18. Plin. H. N. l. 31. c. 8.

ENCrasicholos, Græcis ἐγκρασίχολος, quod χολήν ἐν τῇ κεφαλῇ ἔχει, seu *bilis folliculum* in capite gerat, hoc est, quod eius caput impensè amarum sit, unde eo mutilari assolet, dictus; aliis λυκόσμοις, quod dum oscitat, amplum os aperiat, ut serpentis potius quàm piscis videatur; Plinio, multorum eruditorum iudicio *Lupus*

nuncupatur. An Chalcedoniis ἐπὶ μὲν dicatur, quod Callimachus apud Athenæum prodidit, ἐγγεφυλεις quoque, Ælianus vocat. Magnitudine est plerumque digiti, palmi longitudinem nunquam assequitur. Argenteo colore micat; tergore ad caruleum accedit, si soli opponatur transparet; dempta argenteâ lineâ, quæ spinæ vertebrae comitatur, quæ sanguinem continet. Squammis carere falsum, vel in sale adservatis argenteæ micant. Rostrum habet acutum; os amplum, utramque maxillam ferre modo asperam, branchias parvas duplices. Cor oblongum & acutum, hepar rubrum, maculis rotundis conspersum. Ventriculi appendices multas & nigras. Ventrem molliissimum, ideoque plerumque absumptus in salitis conspicitur. Oviscatet rubentibus. Spinis caret, eâ exceptâ, quæ in dorso est, & ipsa tenuis, adeo ut vix dentibus negocium faceat. Arenâ, spurcitiis, atque cæno vescuntur. Capiuntur hyemæ à Decembri ad quadragesimam usque, in Provincia numerosissimè, noctu igne è naviculis accenso. Quam confertis turmis densi, metu insidiarum natent, de Aphyis in genere dictum est. Hanc tam confertam Lycostomorum natationem, βόλον à peritis nominari, Ælianus tradidit. De *Ortu* dissentiant Authores. Suidas & Athenæus ex Apua Cobite; Aristoteles ex Phalerica oriri tradit. Satiùs est sui generis piscem statuere, quàm vel species in infinitum multiplicare; vel ex Apua Phalerica duos diversos pisces generari, concedere. Nam & ex hac Membradè oriri Philosophus auctor est. In magno plerisque in locis habentur precio. Comeduntur & crudi & sale asservati. Minutatim concidunt, capam pariter tritam addunt, sic ex oleo & aceto asperso pipere sumuntur, saliantur truncato capite, & fel aufertur simul. De Garo quod ex iis, vide Rondeletium. Huc referunt nonnulli λυκόσμοις, cuius effigiem exhibet TAB. XLVII. 19.

Ælian.
H. A. l. 8.
c. 18.

ATHERRINA.

ATHERINAM, Græci ἀθερίνη, & per pleonasmum literæ ν ἀθερίνην, seu & transverso, quem alterum Atherinæ genus in ventre habet aculeo, quod Gillio placet; seu ab aristis (ἀνθήρες idem est quod ἀνθή, id est, arista, pars spicæ acuta, seu ut Erotianus explicat, tenuissimum illud, quod in hordeo acuminatum est) per metaphoram pro spina sumpta, quas multas & Sardinis duriores Atherinæ habent, quod Rondeletius voluit, dicunt. Posset & ab ἀθερίξεν, quod pro καταφρονεῖν, floccipendere & contemnere deduci, quod nimirum ἀθερί ξενεῖ πῶς καὶ αὐτὴ ἀφ' οὗ τοῦ πλεονασμοῦ ob vilitatem negligatur. Gaza *Aristam* & *Aristulam* vertit. Callimacho, in nomenclaturis diuersarum gentium ἰατρίαι & ἰαλῆς sine dubio à parvitate, (ἰαλῆς Adverbium Græcis sonat propè) vocatur, Romanis Laterina. Quid per suum Acerinam Plinius Medicus intelligat, difficile est dicere. Bellonius recentiorum Cernuum esse credit; ego mendum esse, & Atherinam legi debere iudico. *Descriptionem* si attendas, ita de eo Rondeletius. Pisciculus est marinus, litoralis: reperitur & in marinis stagnis, Aphyis similis, dodrantali magnitudine, parvi digiti crassitudine, dorso spisso, ventre leviter depresso, ore parvo sine dentibus, oculis magnis. *Colore* est vario: nam venter argenteus est, dorsum fuscum, circa caput, ex flavo rubescit Sardinarum modo. Locus qui inter oculos est, cæclatus videtur. *Pinnas* habet quatuor, duas ad branchias, duas in ventre, aliam à podice, præter has, alias duas in dorso. Omnes candidæ sunt. Cauda duabus pinnis constat. (contra ostendit apposita icon) Pro linea medio corpore à branchiis ad caudam protensa, spissum quid habet sub cute, q̃ non possum aliter quam fasciam per similitudinem vocare, quæ cum cocta Atherina editur, evidendissima est, & cum lumini obiiditur; quia reliquo corpore pellucida est, hac parte opaca. An Aphyæ Meletæ mas sit, quod piscatores credunt, dubito, tum quod illæ sine

mare & scemina nascantur, hæc distinguantur sexu: tum quod molissimum & depresso corpore sint illæ; itæ solidius & spissius habeant. Bellonius suum, quem vulgus Cræcum, Romani Latharinum, Massilienses Sencle vocant, ita describit. Pisciculus est digiti crassitudinem excedens, neque extenso digito longior: Argentei coloris, translucente corpore, & quod soli obiectum, ut vitrum transpareat, lineamque ostendit internè obscuram, rectam, à capite ad caudam, à sanguine, qui in spina profunditur, provenientem. *Oculis* est grandibus, lingua candida. Pinnam utrimque in lateribus & geminam alteram habet sub ventre, quæ piscem in partes æquales secat: ac præterea tenuem aliam, & parvam fert in medio tergore pinulam. Cæterum *Cor* gerit, ut semen oxalidis triquetrum & oblongum, pericardio perbellè inclusum: branchias utrimque quatuor: *Costas*, item utrimque decem omni capillamento teneriores: vertebrae adeo exiles, ut vix ab acie oculi perspicacissima discernantur.

Pascuntur in algoso litorè, ἀνὰ πᾶσι Oppian. ὅπου εἶσιν ὑπὸ χλορεαῖς βοτάναι, ut Oppianiani verbis utar. Quam Rondeletius descripsit, non tantum in vicino Monspelio mari, ubi Melet dicitur, sed & Massiliæ, & in stagno quod Martegne vocatur, frequentissimè capitur, & nomen Senclez obtinuit. Aristoteles gregales facit, eodemque teste inter Rhyades circa æquinoctium vernum ἀφ' ἧς τῆς γῆς juxta terram, alvum arenæ attrerentes pariunt. Vilem in cibo Phavorinus fecit, & contemptum; delicatissimum suum Rondeletius, nisi spinæ negotium facefferent. Bellonius quoque quæstuosissimam suarum ob suavitatem piscationem scribit.



ARTICVLVS XIX.

De Lavarono Bellonij.

Piscis, quem Romanum vulgus Lavarorum vel Lavonum, seu à beata quæ Lavarono, quod non videtur, cum marinus sit, seu aliunde, Massilienses Cabassonum, Genuenses à capitis magnitudine Capassonum, vocant, ita à Bellonio describitur. Grandiore sunt capite, quem Atherinæ, magis recurto ac compressiore ad ventrem corpore, & paulo latiore transparent, ut Atherinæ, maximamque habent cum iis affinitatem. *Squamis* multis integuntur, quæ detectæ argenteum colorem præse ferre videntur. Duas intergore gerunt pinnulas, utrimque ad latera unam. *Dentibus* carent, ut Harengus: *Cor* exiguum, oblongum, triquetrum, habent: *hepar* pallidum, cui stomachus subest, pisciculis & Cardibus parvis nonnunquam refertus. *Intestina* ad anum tribus revolutionibus reflectuntur. *Fel* ob eius exiguitatem conspicuum non habent: *spinæ* quoque ferunt nullas. Carnem albissimam & levissimam. Calculos duos in capite gerunt, Sesamino minores: squamas paulo quam Atherina latiores & numerosiores. Magnam cum fluviatili Lavareto affinitatem habet.

ARTICVLVS XX.

De Sarda seu Sardina.

TAB. XX. **S**ardæ nomen, si benè ex Galeno colligo, omnibus pisciculis, qui ad saliendum apti sunt, competere videtur; idque inde fortiras apud veteres credo, quod ex Sardinia in alias regiones, eveherentur. A Sardinis & Sardellis magnitudine duntaxat & ætate differunt. Cum nondum adolevere, Sardinæ & Sardellæ dicuntur, adultæ Sardarum nomen capiunt.

Galen. Facult. A. lim. l. 3. e. penult.

Plin. H. N. l. 32. c. 11.

Unde Apicius Sardam farciri solere dicit, Sardenam ob parvitatem non posse. Fateor tamen, & Pelamydi longæ apud Plinium Sardæ vocabulum impositum inveniri. Qui *Trichias* & *Trichides*, quas Dorion apud Athenæum non distinguit, Aristoteli dictas, cum nulli tam vulgaris pisciculi tam diligens naturæ explorator meminerit, credunt easque *ὀπὸ τῶν τριχῶν*, quasi à capillis, seu parvis illis & capillaribus quibus abundant spinulis, à quibus etiam *δελίας* dicunt, quas recentiores Alosas nominant, deducunt, vix falluntur; nisi forte hoc obftet, quod idem ex Membradibus *Trichides*, ex his *Trichias* nasci dixerit. Nam quod * alibi *τριχίας*, * *Aristot.* (Sardas Gaza vocat) quædam adscribit, quæ Sardis nulla ratione competunt, ea *δελίας*, seu Alosis, cōpetunt, ut mendū subesse, & malè Gazam vertisse sit evidentissimum. *Chalcidas* quoque marinas Sardinas nuncupari, vel ex Callimacho colligitur, hæcque Columella intelligit, dum dicit, *Piscibus in piscinis præbere oportet, tabentes Haleculas, & salibus exesam Chalcidem putremque Sardinam.*

Arist. H. N. l. 6. c. 15.

Aristot. H. A. l. 8. c. 13.

Invenio & à Dorione *χαλκιδίαν* dici. *Eritimum* vocari, vix ex Epeneti apud Athenæum loco *χαλκιδας τας* (legendum *ας*) *καλῶσι καὶ σαρδίνους ἐρλίμους, ἕρεκα*, inquit, colligi potest. Bellonius etiam cum Chalcidibus easdem ponit; sed dum fluviatiles à Celerinis sola magnitudine differre, specie convenire putat, argumento sumpto, quod Galli qui ad Oceanum siti sunt, nullum piscem Sardinæ nomine agnoscant, præter eum, qui aliunde sale asservatus, ad eos perfertur; Celerinus verò in Gallia tam sit popularis, quàm in mari mediterraneo ipsa Sardinia, ex Aldrovandi opinione fallitur. Sunt enim Gallorum Celerini (verba sunt Aldrovandi) ab Allobrogum Celerinis diversi, illi marini sunt, & nostro & Rondeletii etiam iudicio marinis Membradibus in Aquarum genere non Chalcidibus five Sardinis iidem;

iidem; hilacustres, & Chalcides Aristotelis, Sardella, & Aquo Fracastorii. Anglorum Sprat, & Hollandorum Sprot, ad quos fumificatus adferri solet, haud aliumputo quam Sardam aut Sardinam sicuti & illum quoque, quem Rondeletius scribit Agathopoli magna copia capi solere, nominariq; Calliques vel Lafchez; & Massiliæ Garengades, licet ipse Membradem esse velit: ut enim Calliques ex Chalcis corruptum esse videtur, ita etiam Lachez ex Laccia; quo nomine in multis Italiæ locis Alofa appellatur, cui simillima est Sardina, & ipse quoque cum Alofæ similem esse proficitur. Harengades verò etiam dici videtur, quod & Harengo similis sit, & similiter salita per mediterranea loca venalis effertur. *Icones & Descriptiones* diversas quinque apud Aldrovandum invenies.

Prima, pisciculus est Aphyæ Phalericæ omninò similis, nisi paulo major, & spissior esset, à parva Alofa, ore, branchiis & oculis, pinna- rum numero, situ, squamis, caudâ minimè discrepans, sed in hoc tantum quod Alofa sit latior. Sardina igitur squamas magnas, tenues habet: colore est vario, nimirum capite aureo, ventre albo, dorso cum viridi cæruleo, utroque splendido, rutulanteque dum viva è mari extrahitur: una enim cum vita viridis evanescit, cæruleoque manente, eoque hebescente & splendorem suum amittente. Intestina habet parva & recta, Alofarum intestinis similia.

Altero loco picta, in qua pictor pin- nas nullas expressit, capite est rubi- cundo, corpore toto subviridi, præ- ter duas quæ in ea conspicuæ sunt, lineas, quæ sunt cæruleæ. Cau- da ad castaneum in extremo ver- git. Sardæ Flandricæ nomine mis- sa est.

Tertia eodem quoque nomine, sed majoris cognomento commu-

nicata, pinnas habet nigras, quarum situs (dum modo pictor rectè ex- pressit) alterius speciei piscem esse indicat. Colore est vario, viridi nimirum violaceo, paleari & ruffo. Maculæ in lateribus sunt nigræ: in pectore croceæ.

Reliquæ duæ species, dorso sunt vi- ridi, ventre argenteo. Prior in ex- tremis ossium, quibus bran- chiæ teguntur, rubent. Oppianus *Oppian.*
dum scribit: *Hal. l. i.*

*Chalcides & Thrissæ passim Abrami-
desque feruntur,*

*Et curvis habitant scopulis & littora
visunt,*

*Atque catervatim percurrunt aquo-
ris undas,*

*Alternantque imas ponti, curruntque
per aquor,*

*Hospitium mutant semper, pontoque
vagantur.*

iis qui vagabundam vitam agunt, accenset. Capiuntur Malsâ ex er- vis frictis & myrrha vino odorato excepta, confecta; aliquando fo- liis betæ, quâ impensè delectantur. Adhibentur quidem *in cibis*, sed re- vera, ut Hicæus apud Athenæum dicit, ἀχνυόμεναι καὶ ἀλυνεῖς καὶ ἀχνυοί, id est squalidi, nec multum pin- gues sunt, nec copiosum succum in

alimentum præbent. Apicius far- *Apic. l. 9.*
cire eas docuit, Galenus ad salien- *c. 10.*

dum aptissimas dixit. *Medicum u-* *Galen. de*
sum quod spectat, in prima men- *facult.*

sa sumptæ, alvum subducunt. Ca- *Alim. l. 3.*

pite, in puero quodam, loco bala- ni feliciter usus est Brasavolus. Mar- *Marcell.*

cellus exustas sine osse, vel fassamen- *c. 11. 19.*

tum, & confrictas, si varicibus sup- ponatur, statim prodesse scribit. I-

dem Sardæ caput combustum, me- dicamento ad gingivarum tumo-

rem, foetoremque admiscet. Pri- vatum, contra presteris mor-

sum valet, si Plinio credi-

mus.



ARTICULUS XXI.

De Mæna.

TAB.
XX. 4. **M**æna, Græcis *Μαίνα*, Theodoro Gazæ Halec est; metuo ne peram. Alecis enim nomen, vel omnibus pisciculis qui muriâ conduntur, quod Rondeletius docuit, competit; vel illis, qui apud Græcos Anthracides, seu Carbonarij vel prunarij pisces, quod in pruna & craticula commodè coqui possint, dicuntur, quod ex Hermolao discimus; vel ipsi piscium fœti, unde Plinius. *Landatur & Clazomene garum, Pompeiique & Leptis: sicut muriâ Antipolis ac Thuria: jam verò & Dalmatia. Vitium huius est Alex, imperfecta nec colata fax: vel denique pisciculo fluviatili seu dulcium aquarum, quem Plinius, ad ostreas, echinos, urticas, cammaros & mullorum jecinora pervenisse scribit.*

Columella inter parvi incrementi fluviorum animalia reponit, & piscibus maioribus præberi jubet, ut de Martiali taceam. *Descriptio nem & Differentias*, quod spectat, Mænam inquit Gillius, non modo speciei, sed etiam generis nomen esse conjicio; quod varium & multiplex est earum genus. Aliæ in utroque latere nigram maculam orbiculatam habent, quas ii, qui Adriaticum sinum accolunt, vulgò Mænas sclavas appellant: aliæ leucomænides, hoc est, albæ Mænæ à Græcis sive Smarides nuncupatæ; itemque sunt Mænæ Boopes appellatæ. Bellonius duas observavit differentias in colore: alias enim luteo, alias lituris cyaneis aut azureis conspersas esse ait. Spensippus Mænidi similes facit Boacem & Smaridem: idem tradit Rondeletius, nec non Bellonius, nisi (inquit hic) paulo latiores & breviores cernerentur, & squamis Smaride tenuioribus contegerentur, breviorique essent capite, rarif-

sime siquidem palmum excedere; (Antiphanes quoque Mænas exiguos pisces esse dixit, & Martialis breves) lineam in lateribus rectam habere, quæ in Smaride arcuata est: pinnae tergoris, laterum, & caudæ diaphanas esse, & maculatas. Os si clausum contineat, minimūquidem apparere: sed dum hiat, rictum magnum ostendere, labrumque superbius tubi in modum, ut in Harengo infractum esse: Oculos habere rotundos, iridem subrubram; maxillæ asperitatem quandam dentium vicem præ se ferre: si desquametur albißimam argenteam, quæ spectari: sed tergus livore quodam sub oculis in purpureum gemmante depingi.

Addit Rondeletius, utrimque magnam & rotundam maculam habere in medio corpore, quam etiam in icone expressit, Bellonius omisit, & in descriptione non meminit, nisi eam intellexerit, dum inquit, utrimque lituris notari, quod tamen non assero, quandoquidem icon mea cum Belloniana satis convenit, & eiusdem coloris lituras habet, item circum oculos. Pinnæ omnes etiam verficolores. Venter candicat. Cauda fusca est. Idem Rondeletius hyeme candidam esse scribit, vere & æstate variam: maculis cæruleis toto corpore & potissimum in capite & dorso sparsis: item lapides habere in capite, maremq; in eo fœminæ dissimilem, quod latior sit & porrectior, fœmina rotundior: cum fœtura fœmina impleri incipit, maris colorem in varietatem quandam & nigrorem mutari. Aristoteles verò hanc mutationem tempori adscribit, & de Mæna simpliciter id tradit, nec fœminæ nec maris facta mentione.

Mæna & Smaris (inquit) mutantur, ut ex albedine rursus æstate ad nigredinem redeant, idque maxime suis pinnis & branchiis declarant. Ita & Plinius: Mutant colorem candida hyeme Mæna, & sunt æstate nigriores. Quem locum



Sarda Flandrica maior

Section Tab. XX.


2 *Sardthum*

1

Sarda. Sardthum.





Mania



Sarda. Flandrica minor.

5 *Smaris* *Meer Baiser Bizling.*

Smaris. alia. ein ander *Bizling.*




peregrina.

Smaris.

Boops.

Hautink




Boops peregrina

fremder Hauteng.



Solea.
Pecten salu.

Maerfel Meerzang.



Solea lingulata. *Meer Zünglein.*



12



Solea. Oculata.
Augfölen.

Rhomboides.

Winkelbrutt.




Citharus.

Meer. Harpf.

Citharus flavus.
sive Asper

Raiche Meerharpf.



13
Solea. alia.





cum Massarius explicans : dixit, inquit, æstate nigriores : quia suscipiunt colores cæruleos, qui quod ad albedinem sunt obscuriores, & nigriores.

Et rursus: Mæna pisculus est digitalis longitudinis, hyeme candida, æstate varia, picturis cæruleis obliquis. Quomodo autem colores mutant, in Merula ac Phycide (ni fallor) explicatum est. Testatur denique Rondeletius, cum aliquando Româ Venetias venisset, Mænas tanta colorum varietate conspexisse, ut vix primo aspectu agnosceret, quod suo in littore minus pictæ sint. Quod ad *partes internas* attinet: Mænæ *hepar*, ut Bellonius observavit, fungosum ex lacteo pallescit: sub cuius lobo dextro fel luteum oblongo vasculo includitur: *Splen* niger, *stomachus* oblongus. Rarò in Oceano capiuntur: in mari tam supero quàm infero frequentes esse, nomenclaturæ apud utriusque maris accolæ indicant. Mænaria insula ab earum frequentia nomen sortita est. Inter herbas in littore algofo, seu ut Ovidius, in herbosa arena *viçtitare*, Oppiani fide tradimus. A carne non omnino abstinere, quidam prodidere. Gregales esse apud Aristotelem legimus. *Parit* brumâ, vel ut Bellonius, post brumam, & omnium piscium fœcundissima esse censetur. Cum fœtu fœmina impleri incipit, ob malignum fœtorem, *redy* seu *Hircus*, ut apud Aristotelem extat, dicitur. Singularem cum vespis sympathiam habere ex eo quidam colligunt, quod illæ nassa, in quæ mænna cum Chalcide reperta est, capiuntur, prodente Æliano: singulari in Xiphias odio ferri, ex eo non nulli, quod eam balænx metu, gladio suo in terra hærentem, conficiant, ut Oppianus testatur. Inter plebeios *ibos* reputantur, adeò, ut acervatim, vitato etiam emptore Venetiis vendantur, tum quod parvisint, tum quod cum uterum fe-

runt, exquisiti fœtoris. Unde Martialis

Fuisse gerres aut inutiles menas

Odor impudicus urcei fatebatur.

& in Majali L. Pomponius Atellanarum Poeta, ut dicitur Agellio

— *Cænâ queritat, si nemo eum*

Vocat, revortit mæstus ad manam miser.

Succitamen bonitate Gobiis præstare Hicetius, teste Athenæo author est; quod forte deiis, qui in littore petroso aut arenoso, & suo tempore capiebantur, sumendum est. Nam aliàs, Gobius friabili est carne, & saxatiliu non multò inferiore. Li-quamen seu gari speciem ex ipsis fieri solitam, Plinius innuit, dum scribit. *Saleriam è muria salsamentorum recoquitur, iterumque consumpto liquore, ad naturam suam redit, vulgo è Menis incundissimus.* Apud Perlium quoque aliquid simile invenies, sit visceribus piscium in vas aliquod iniectis, & sale conditis. *De usu in Medicina* hæc habeto. Jus assumtarum alvum solvere; ut & salsas, si umbilico illinantur. Capitibus inveteratarum ustis ad sedis fissuras, & columellam inveteratam Galenum uti: ad uvam diu jacentem, cum gallæ & floris æris, denariis duobus, Marcellum Empyricum: ad Anginam cum melle illitis eundem. Plinius earundem cinerem, admixto sale & cunila, oleoque, vulvæ mederi, & suffitione secundas extrahere, testatur. Cum alio tritus verrucas tollit, & verendorum pustulas discutit. In dysenteria quem præbeant Mænæ usum, apud Galenum invenies.

Martial.

l. 12.

Epigr. 32.

Plin. H. N.

l. 31. c. 7.

Plin. H. N.

l. 31. c. 9.

Galen.

simpl. l. 11.

Plin. H. N.

l. 32. c. 10.

ARTICULUS XXII.

De Smaride.

Smarides qui & Marides apud A-TAB. thenæum dicuntur. (Bellonius XX. Græcos Anconæ se convenisse scribit, qui etiam Maridas appellabant) ex Mænarum sunt genere.

L 2 Vocan-

Vocantur & *Leucomanides*, nempe, quia semper albæ sunt, cum Mænæ colorem immutent. Eum docti pisciculum esse volunt, quem Antipolitani hodiè *Garum*, Veneti hirtulam seu herrulam, Massilienses hiarer, Galli Narbonenses & Hispani Picarel, quod fumo induratus & salitus, linguam acrimoniâ vellicet, Neapolitani Cerrum, quod vocabulum Gaza retinuit, nominant. Rondeletius *Garum* veterum esse putat, tum earundem nomenclaturarum affinitate, tum quod ex eo *garum* fiat, idque teste Plinio, optimum. Trium descriptionem Aldrovandus tradidit.

Plin. H. N.
l. 31. c. 7.

Primus, Mænæ & Boopi simillimus est; notis tamen quibusdam ab iis distinguitur. Boops enim lituris caret; quibus prædita *Smaris* est. Boopi rostrum quasi recisum, *Smaridi* longiusculum. Boops item quam *Smaris* rotundior est corpore, quamobrem *Rotundetus* Romæ nominatur. Differt vero à Mænâ etiam, quod & asperiores & paulo latiores squamas habeat. Lineæ laterum utrique rectæ, sed in *Smaride* quadam serie, in Mænâ nullo plane ordine dispositæ: suntque argenteæ & subaureæ, obscuræ, à capite ad caudam ductæ. Estque Mænâ minor, digitum nimirum vix superans, corpore item strictiore. Est denique peculiaris ei nota, quâ & à Mænâ & à Boope discernitur. Cum enim os aperit, labia exerit tanquam ex tubo pyxidatim infarcto. Pinnis alioqui, aculeis, cauda, partibusque internis Mænæ similis est: eodemque modo colorem, teste Bellonio, mutat.

Altero loco exhibitus piscis, *Smaris* Bellonii videtur. Capite est ferè violaceo, prono nempe, nam supino albicat. Eodem colore totum corpus, sed multo dilutiore tinctum est. Lineæ quinque insignes flavescentes à capite ad caudam perferuntur. Pinnæ etiam flavescent. Exiguam habet & vix conspicuam lituram.

Tertius *Smaridis* peregrinæ nomi-

nemissus, tergore est caruleo; cætera subviridi, nigris & argenteis punctis cōspersus. Prone capite ad violaceū vergit, supino vero candicat. Pinnæ omnes fere crœci coloris sunt, punctis cōspersæ nigricantibus. *Degunt* inter herbas in algoso littore; eodemque cum Mænæ cibo vesci, verisimillimum est. Inter fœcundas recenset Ovidius. Pastâ, ex pane, caprillo caseo, & purissimo polline, inescantur. Optimos pisciculos esse *Hesychius* scripsit. Optimum & suavissimum ex iis gaviū, apud Guilielmum Pelicerium Episcopū Monspeliensem Rondeletius vidit. *De usu in Medicina* proditum, caput tostum ad pilorum defluvia cum adipe ursino conferre; excrecentes ulcerum oras, ab eiusdem pulvere reprimi, thymosque & clavos absumi. Plinius alieubi cum ptisana sumptas, vel cum fœniculo decoctas mulieribus lactis copiam facere scribit, alibi, tritas illitas, verrucas tollere, & verendorum pustulas discutere tradit.

Plin. H. N.
l. 32. c. 11.

ARTICVLVS XXIII.

De Boope, seu Boce.

Piscis, quem nos *Boopem* dicimus, is *TA B.* Aristoteli citante Athenæo βώξ, XX. Numenio βόνξ, qua etiam appellatione Oppianus utitur, Speusippo & *TA B.* aliis Atticis βόαξ, seu βόα την βονν à voce, ideo Mercurio sacer habetur; seu *TA B.* quod βόας ὀφθαλμοὺς ἔχει, id est bubulos oculos seu magnos habeat, dicitur. *Athen. Dipnos.* Tertia est Mænæ species, pedis ut *l. 7.* Rondeletius scribit magnitudine, qui etiam tres describit. Prior piscis est marinus, littoribus gaudens, ex Mænarum genere, pedali magnitudine, corpore satis rotundo, non cōpresso, quale fere est *Mugilū*. Capite brevi, & parvo. Oculis maximis, p corporis magnitudine, utpote qui totam fere capitis regionem occupent. Colore est vario. In dorso à branchiis ad caudam lineas ductas habet, alias aureas, alias argenteas, minus quam in *Salpa* illustres: ob quas ab Aristotele in libro

libro *ἡ ἰχθυὶς, ὑπογαστήρ*, id est, in dorso pictus cognominatus est. In ventrenullæ apparent lineæ; sed hic squamis tegitur argenteis. Pinnae sunt Spari, Canthari, Sargi, pinnis similes. Cauda subaurea. *Ventrisculus* magnus cum multis appendicibus; intestina tenuia admodum, hepar rubrum, splen ex rubro nigrescens. Nutritur alga, carne, luto. *Altera species* in multis priori similis; suis Bogueravel appellatur, cuius cognominis significationem, non omnino assequi se potuisse ait; peritiores tamen piscatores credere, sic dici quia cum Ravalle vulgo vocatis piscibus, id est, (inquit) minutis, quique simul elixantur, & apponuntur, nec propter parvitatem eliguntur, capiatur, & vendatur. Boopi (inquam) vel Mænæ similis est; rostro magis acuto, dorso ex caeruleo rubefcente: oculis magnis & variis, nimirum circa pupillā nigrā circulo ex aureo nigrescente corpore totolatiore q̃ Boops sed brevior. Boopishæc nostra species peregrina dorso fere est violaceo, aut amethystino, lateribus & ventre candicantibus punctis amethystinis, conspersis: pinnis omnibus flavis præteream quæ intergo est, cuius quidem aristæ flavæ sunt, membrata vero viridescit. *Tertiam*, quia squammis caret, huc pertinere non iudico. Bellonius quoque *duas species* describit, dum dicit.

Due huius piscis cognoscuntur differentia: siquidem earum altera minor est, & perpetuo parva, altera paulo maior. Boces à Mænīs ita distinguere poteris, quod Mænā videas esse latori corporis compage, nigriore colore, & utrinque lituram unam habere. Boca perpetuo parva est, & pro sua magnitudine crassiori constat capite, corpore magis tereti. Boces & Mænæ seu Gerres eandem corporis constitutionem, hoc est, pinna, squamas, & capita habent. Boopes nullā liturā variantur, sed ambo tereti cor-

porpore præditi sunt. *Giruli* autem seu Smarides magis nigrescant, & lituris variegantur. Boces teretiores sunt. Giruli magis plani. Bocum color hilari ac quodammodo aureo fulgore nitet, ut tergora colore ad aurum inclinante micare credas. *Gregalis* est, & litoralis piscis, herbosis gaudens. Piscis est parvus, oculos pro corporis ratione grandes habens. Duos habet in capite calculos non prorsus rotundos, ut in Passeribus, sed oblongos, ut in Merlangis. *Alter Boops* Orpho aut alicubi ex rubris cognatus est. Littoralis, (inquit) pisciculus, qui Bogue & Renæu (cum icone scriptum est Bogue Renæu sine copula) Massiliensibus dicitur, is Genuensibus Ruello vocari solet. Coloris est eiusdem cum Erythrino pisce, dentibus, pinnis ac capite consimilibus, sed reliquo corpore differunt. Nam Box vulgarem Bocam refert, eodemque circino tornata esset, nisi magis ad Erythrinum accederet. Verum linea quæ corpus Erythrini interfecat, per medium utrimque arcuata est. In hoc autem recta prætenditur, neque Erythrini gibbum habet: Dentes præterea anteriores breves & acutos ostendit, sed tam superiores quam inferiores molares sunt, ut Sargo, quod etiam Pagro & Erythrino accidit. Hanc quoque peculiarem notā insignem habet, quod eius branchiarum exterior spina ad radices nigra est. Putat Ovidii Bogyrum esse, q̃ Massilienses à Boopa & Gyro, id est Smaride, nomen ipsi indiderint, sed mendum est in Ovidio, & Cercyrus legi debet, qui apud Oppianum, circa petras conchulis plenas degit. *Iis Hal. l. i. dem cum Mænīs locis gaudent, eodemque cibo vescuntur.* De Car. Athen. *nīs eius qualitate ita Athenæus.* *Boops δ' ἰσθῆος, ὑπερήλκτος, ἐναντίοντος, ὑγρὸν ἀνέκτος, ἐν γαστρί. ὁ δ' ἀπ' ἀνδρῶν γλυκύπικτος, καὶ ἀπαλώτερος.* Bos elixus facile coquitur, facileque excernitur, iurulentum quid emittens, facilem alvum reddens. Assus succensis carbonibus suavior est & tenerior.

In Provincia etiam ægris apponitur. Anconæ, Bellonii prior, multis modis condita, carnis privi tempore, potissimum Anconæ, Illyrico more, ex gelu conservata divenditur. Psellus tamen inter excrementitios pisces retulit.

CAPUT II.

De Squammosis planis.

ARTICVLVS I.

De Piscibus Psittaceis spinosis in genere.

Pisces, qui in latera compressi, latera ipsa in tenuem & latam extremitatem degenerantia habent, & quorum dorsum spina, non in dorsum & ventrem, ut in piscibus reliquis, sed in latera, suas pinnas seu apophyses transmittit, Plinio *Planis*, Columellæ, *jacentes, prostrati, & cubantes*. Dorion apud Athenæum *πλατείς*, id est, lati, quibusdam, quod supinâ parte candidi, prona verò terreisunt, ut passeris aves, *Passeres*: aliis *Psittæ* vel cum Aristotele *Psittacei* pisces, dicuntur. Duo ipsorum genera, Spinosum unum, Selache seu Cartilagineum alterum, non eo tamen sensu, quo Ælianus & Artemidorus, inter Cartilaginea, quæ squammis carent, ut Muræna, Conger, Torpedo, & cætera, referunt. Spinosi ovipari sunt. Cartilaginei ova quidem intus concipiunt, sed viperæ more fœtus, postmodum vivos excludunt. Sethorum alii levi cute præditi sunt, alii squammis reguntur. Videntur omnes è duabus pellibus compositam habere corporis speciem, & spina per medium dividi. Omnes item quaternas pinnas habent, more squamosorum, duas in prona, totidem in supina parte, sed præter aliorum

morem pinna earum in gyrum circumvallantur. *Branchiæ* utrimque quaternæ, *lingua* nulla, *oculi* in supina corporis parte. *Dentium* loco maxillæ in plerisque rugosa quadam scabritie asperæ sunt. *Gula* veluti ingluviei cuiuspiam per similis, ventriculo contigua est. *Os* quamvis pro corporis portione exiguum omnibus, qui tamen in hoc genere maiores sunt, nullum non concharum aut crustatorum genus deglutiunt integrum, sicuti minores, qui in utroque genere minoræ sunt. Nullæ ad pylorum apophyses: *Cor* ab una parte gibbum, huic quædam caruncula atra quadrangula pulvini modo subsidet: ad cuius superiorem partem vesiculam annecti Bellonius testatur, & pulmonis officio fungi arbitrat. *Hepar* latum est & ventriculum amplectitur. *Vesicula fellis* ab eius extrema parte dependet. *Lien* ater, sub ventriculo situs, qui latus est, & cum intestinis anfractuose circumducitur. *Degunt* in mari, sed & stagna & fluvios, quod lutum appetant, & commodè ibidem pariant, frequentant. Ideo Columella, *Cænosa regionem planum educare piscem* scripsit. Quia in arena & limo latent, ideò reciprocante mari facillimè capiuntur. In Belgii officinis tanta eorum copia, ut universo orbi sufficere posse videatur. Quia ova in omnibus reperiuntur, ideò sexu masculino carere scripsit Aristoteles; quod tamen de certo duntaxat genere sumendum est. Conchyliis & crustatis, piscitiis item vescuntur. *Pariunt* teste Aristotele semel in anno.

De natatu eorum ita Aristoteles. *Aristot.*
Pisces Psittacei eo modo nant, quo Coclites, alteroque ocu- *H.A.I. 5. c. 9.*

lo capti incedunt, quia natura eorum transversa, distortaque est: itaque transversim natant, convolvuntque se strabonum more, suaque propriis latitudine, quam pinnarum adminiculo, cursum dirigunt. Ingenium resipit,

Plin. H. N.
l. 9. c. 20.
24.
Columel.
R. R. l. 8.
c. 17.
Aristot.
H. A. l. 4.
c. 11.

Aristot.
H. A. l. 4.
c. 11.

Aristot. de
Anim. in-
cessu.

Aristot.
H.A. l. 9.
637.

resipit, quod se arenâ obruant, & postquam se totos occultaverint. Τοῖς ἐν τῷ ὁμαλῇ οἱ καλῶσιν οἱ ἀλιεῖς ῥαβδία, *oris sui virgulis*, ut vocant piscatores, *verberant*; τὰ δὲ μικρὰ ἰχθυῖδια προσέχονται ὡς πρὸς φύκια, ἀφ' ὧν τρέφονται, id est, ad quas pisciculi adnatant, tanquam ad algas, quibus vescantur. Certissimam securitatem esse Plinius tradit, vidisse planos pisces, quia nusquam sint ubi maleficæ bestiae, eaque de causa, ab urinantibus *sarcos* appellari.

ARTICVLVS II.

De Planis Squamosis in Specie.

PUNCTUM I.

De Solea.

TAB.
XX.
10. II. 12.
13.

Planorum piscium alii sunt *squamosi*, quos fortè Aristoteles *σπιδας* vocat; alii *leues*, quos *ῥαβδία* dici conijcimus. Illi iterum vel sunt oblongo corpore, vel rotundo. Inter illos est *Solea*, à figura, quæ solo pedis ita subiicitur, dictæ, quæ Varroni *Lingulaca*, Gallis teste Bellonio, *Perdix marina*, fortè, quod in lautioribus conviviis magnam obtineat claritatem, nuncupatur. Græci hodie *γλωτταν* linguam appellant; veteres *βόγλωττον* aut *βόγλωτταν*, non tam ob bubulæ linguæ figuram; quàm ob longitudinem, dixere. Quidam sub nomine *σινδαλιν*, ab Alciphronē in epistolis piscatoriis nominari opinantur. Matroni Parodo, in descriptione Cœnæ Atticæ, *σινδαλιν* generis vocabulum est, quod omnes planos deliciores exprimit. Sex ipsius species Rondeletius exhibuit.

Prima, quæ *Solea* simpliciter dicitur, longiore contractioreque corpore est quàm *Passer*; & sin-

stagnis capitur, à maritima, parvitate, & odore lutum respiciente differt.

Alteram oculatam vocat, quod licet corporis habitu, & internis partibus superiori sit similis: in pronata tamen parte, magnas habeat maculas, oculorum effigiem cum iride & pupillâ referentes, squamæ tam tenaciter hærent, ut nisi diu in aqua calida maduerit, desquamari non possit.

Tertia à prima, ut *Rhombus* à *Passere*, situ corporis differt, si enim juxta eodem situ componas, os eius in sinistram, prioris in dexteram latus vergere conspicias. Haut tamen ex *Rhombis* aut *Passeribus* esse, forma ipsa, qua plane *Soleæ* similis est, satis arguit, Galli *Polam* dicunt: ipse *Epicharmo* apud *Athenæum* *Cynoglosson* appellari conjicit. Vel si *Cynoglossos* huius non sit: (nihil enim certi ex tam paucis verbis, quæ citat *Athenæus*, colligi potest) optimo tamen jure, ut à cæteris *Buglossi* generibus distinguatur, *Cynoglosson* appellari posse, neque aliud esse genus, cui hoc nomen aptius quadret. Nam cum vera *Solea* suavitatis saporis *Perdici* comparetur, hanc ferino plane esse saporem, viscidamque duram, contumacemque coctioni, insuaveque quid & grave olere. Nec probat *Rondeletius* eos, qui pabuli tantum ratione differre credunt, quandoquidem pabuli varietas, etsi saporem succumque immutare potest; ad corporis tamen habitum formamque immutandam nullam vim habet. Frequens est in Oceano. *Bellonius* in *Mediterraneo mari* etiam *capi* scribit, & à *Massiliensibus* *Servatin* appellari, quod tamen falsum esse *Rondeletius* asserit. Totus, ut ipse etiam ait, fusco colore est.

Quarta eidem *Rondeletio* *Arnoglossos* sive *Arnoglossus laevis* dicitur, quod

quod quemadmodum plantagini herbæ à figura vel foliorum lævitate Arnoglossi, id est, agninæ linguæ nomen impositum est, ita species isthæc Soleæ, Arnoglossus à levitate vel figura rectè (inquit) nominabitur; squamis enim carere videtur, prorsusque lævis esse. Suis Perpeirevocari ait, & ex Solearum genere esse, ex corporis habitu, figuraque cognosci: Differre autem ab aliis, quod multis squamis tenuissimis & statim deciduis, integatur: corpore esse valde gracili, candido.

Quintam diminuto nomine *Ligulam* dicit, quod sit in hoc genere omnium minima; negatque maiorum Solearum foeturâ esse, quandoquidem semper parva sit: nunquam dodrantalem magnitudinem excedens. Lineam quæ corpus dirimit, spinamque firmat vel tuetur, huic ex squamis ait esse compositam longe eminentioribus, quam in toto corpore, dempta ea parte, quæ circa maxillam inferiorem est: durior carne esse quam Buglossus lævis, glutinosique nonnihil habere: satissimum esse piscem, & ob corporis tenuitatem vilem.

Sextam ac postremam *Gallis Fletam* dictam quod fluitando natet, antiquis (ut putat) incognitam, solisque Oceani accolis notam, Græcorum imitatione, qui rei magnitudinem βε & ιππο particulis indicant, Hippoglossum appellat, quod cæteras non solum Soleas magnitudine vincat, verum etiam quatuor digitorum longitudine quandoque inveniatur. Esse autem ex Solearum genere vel ex primo aspectu judicari posse scribit: oblongo enim (inquit) contractoque est corpore, parte altera candida, altera nigricante, in qua oculi sunt. Ore est contorto, dentibus munito cithari modo, quibus Buglossi carent. Carne est dura, sed suavi, ad Rhombi naturam proximè accedente. Ossa habet spongiosa, quibus inest medulla, quæ à cupediarum amatoribus appetitur. Pi-

scis est maris Oceani, Antverpiæ salitus, & in frusta dissectus venditur. Capitur etiam sæpe in Oceano juxta Galliæ Bononiam. Ibi huius frusta farinæ massæ probe subacta & pasta inclusa, aromatizque condita in furno coquantur, ut diutius servari possint & exportari. Aldrovandus, non tantum aliud Hippoglossi genus, squamis prædictum minoribus, undique sibi concolor, flavescens scilicet; quodque à latere uno lituras nigras, pinnam & caudas in extremo cæruleas, habet, exhibet: sed & alterius Soleæ genus, quod squamis tegitur latissimis, estque unicolor & albicans. Quam Bellonius *Taniam* vocat, illa tenuis gracilisque piscis est; & quod Athenæus de Tænijs prodidit, Alexandria, Canopi, & Seleuciæ in Antiochia, frequentissime reperitur. Benè ab Aristotelis & Rondeletii *Tania*, in qua pinnarum numerus cum Anguillis convenit, distinguitur. Omnium ferè marium piscis est, sed cum Rhombis Pontum ingredi Plinius negat, flumina ingressos multum pinguescere, Londini Bellonius didicit, in stagnis deteriores evadunt. *Littorales* sunt Oppiano, Ovidio in herbosa arena degunt. Terrâ, hoc est vado maris excavato per hyemem condicreditur.

Nam quia lapides in capite habet, & corpore est tenui, frigus exhorrescit. Quantum ad usum incibus, Matron Parodus apud Athenæum, mediocrem succum præbere, ut saxatiliū vicem supplere possint, scribit. Galenus Passerem molliorem, perperam asserit.

Duram enim esse, vel exinde, quod diutius serverur, longa vectura putrescat, sic melior reddatur, colligitur. Facile tamen concoqui & minimè excrementitiam esse, apud

Rondeletium lego. Patinam ex soleis apud Apicium vide.



PUN-

Aristot. H. A. l. 2. c. 13.

Oppian. Halieut. l. 1. v. 99.

Athenæ. Dipnos. l.

Galen. de Alim. facult. l. 3. &

l. de Cibis bonis & malis succi c. 3.

Apic. l. 2. c. 4.

PUNCTVM II.

De Citharo.

TAB. XX. 14. **C**itharus, Aeliano *καθάρου*, Op-
piano, cui littoralis est, *κίσση* di-
15. citur. Nomen à lineis quibus à sum-
Elian. H. mo capite vertice, ad extremam uf-
A. l. 11. c. 23 que caudam distinguitur, invenit.
Oppian. Gaza, ex Aristotele, qui inter eos,
Halieut. l. quibus complures appendices cir-
8. 98. ca ventriculū exeunt, numerat,
Arist. H. A. *Fidiculam* vertit. Quatuor eius no-
l. 2. c. ult. minis pisces, ex planorum genere
omnes, esse, Rondeletius luculen-
ter ostendit. Galenus planum &
Rhombum similem facit, & quod
Philotimus eum inter *μολακίσκους*
omiserit miratur. Aelianus Buglof-
fo seu soleæ assimilat. Galeni Ci-
tharum, Rondeletius eundem esse
Elian. l. 6. arbitratur cum eo quem Athenæus
Athen. Di- ex Aristotelis libro de animalibus &
nos. l. 7. piscibus sic delineavit: Citharus fer-
ratis est dentibus, solitarius, alga ve-
scitur, linguam solutam habet, cor
album & latum: esseque illum Psit-
raceum piscem, qui Romæ fatis fre-
quens, *Folio* nominatur. Cum enim
lingua piscibus à natura data sit of-
fesa, & non soluta: vel dura, spinea &
adhærens: isque unicus sit ex planis,
cui lingua soluta sit teste Aristotele,
contra omnium aliorum piscium na-
turam: haud temere sese iudicasse
existimat, cum ex hoc, tum quod re-
liquæ memoratæ notæ ex asse re-
spondeāt, hunc verum ac genuinum
Citharū esse. Quod si verò quis hunc
Rondeletii piscem pro Citharo non
accipiat, quoniam squamosus cum sit
ex Rhombis ut pote lævi cute prædi-
tis, quibus à Galeno assimilatur, esse
nequeat; huic responsum esse volo,
assimilationem ad Rhombum, non
ad corpus, sed ad carnis qualitatem,
referendam esse. Aelianum vero suos
Citharædos squamosos facere: quā-
obrem etiam admiror Rondeletium
suum hunc piscem Rhombo quodā-
modo similem esse dicere, cum neq;
tegumento, squamosus enim est; neq;
figura, oblongus enim; respondeat:

quare prudenter subiunxit, Buglossus
similiorem esse, si squamas excipias,
quæ Citharo magnæ sunt, Rhombi
instrumenti figura. Ab hoc Aristote-
lis Galenique Citharo differre putat
idem Rondeletius, eum qui Arche-
strato apud Athenæū rufus sive sub-
flavus cognominatur, assandusque &
caseo multo, oleoque condiendus es-
se dicitur, quiq; sine sumptu apparari
non potest: esseq; eum quem alii ve-
rum Buglossum esse volunt, non ob
figuram solum, sed etiam ob asperita-
tem: Est enim bovis lingua magna &
aspera, quomodo buglossum herba
etiam nomen invenit. Superiori simi-
lis est figura, lingua magis soluta, oris
scissura magna, dentibus ferratis,
squamis intectus rotundis, aquarum
asperitate *Citharum asperum* etiam ap-
pellari posse existimat, buglossiq; no-
mine comprehendi. Virgam habet à
capite ad caudam protensam, latius-
culam, maioribus squamis constan-
tem. Partibus internis superioribus
similis est. Venetiis optimus reperit-
ur. Carne est inter duram & mollem
Galeno media. Stomacho ingratus
malique succi Xenocrati. A Diocle
assus commendatur. Rondeletius,
quod salpæ modo alga pascatur in-
suaviorem prodidit. Apollini qui Ci-
tharum invenit sacrum, apud Athe-
næum legimus.

Athen. Di-
nos. l. 7.

PUNCTVM III.

De Rhomboide Rondeletii,
& Passeribus squa-
mosis.

RHOMBOIDES Rondeletii, TAB.
Rhombi nomine Romæ ab ich- XX. 16.
tyopolis venditur. Fortè melius, Aldrovand.
rotundus Buglossus, vel *rotunda solea de Piscib.*
aut *lingulaca* vocaretur. Squammis l. 2. c. 45.
parvis integitur. Oculi multum invi-
cem distant. Linea à capite ad cau-
dam per medium corpus ducta ini-
tio sinuosa: dein recta, corpus in
duas æquas partes dirimit. Cor-
pore est exiguo & brevi: nunquam
M enim

enim palmi magnitudinem superat, quantum Rondelerio licuit observare. Internis partibus à Rhombo non differt. Carne est media, neque molli nimium, neque dura. Eius nullam à veteribus mentionem factam fuisse credit. Junius in suo nomenclatore Belgico vocat Scarde. *PASSERVM SQVAMOSORVM* tres idem Rondelerius species ponit. *Priorem Limandam* Galli dicunt, ob corporis tenuitatem, ut Bellonius conjicit, quam cum diffisis dolabra ascribis communem habet. Angli un Brut. Hic, teste Junio, Batavorum Grieta est. Ego enim id non satis memini. Flavas in pinnis, quæ corpus ambiunt, & in reliquo corpore maculas habet. Linea corpus interfecans, sinuosa. Magnitudine ad Quadrantulum (de quo mox) accedit. Lucidiori aeri expositus, pellucidus videtur. Dentes teste Bellonio inter cæteros sui generis pisces, longiores habet: squamas conspicuas valdè tenues atque asperas, quæque difficillime cuti adimuntur: quod cum solea quidem magis, cum cæteris vero minus, commune habet. Vento indurati ingenti quæstu ad mediterranea loca Germaniæ superioris venales feruntur. Gallis ex Britannico littore recensentes adducuntur. Italiæ planè ignoti sunt. Carne aiunt esse candida, humida, molli, parum glutinosa; non multum Buglossis sive Soleis inferiori.

Alterà species Gallis Flez, Anglis Phlonder teste Bellonio, qui *Flesum fluviatilem* vocat, verum improprie; & contra piscis naturam: non enim in fluminibus nascitur, sed in mari, ex quo in flumina migrat, cæterorum planorum more. Corpore est, quam vulgaris passer, paulo longiore, & ubi adlevit, crassiore. Squamis integitur parvis: colore est nigro. In corpore pinnisque in ambientibus maculas rufas habet. Officulis munitur in capite, medioque corpore in parte supina.

Tertiam Britanni *Helbut* dicunt, Hollandi *Heilbut* vel *Eelbut*, Germani *Heiligbut*, Galli *Fletelet*, nomine (ut apparet) diminuto à *Flez*, cum alioqui sit maior, cætera similis est. Utraque in Anglia & Belgio frequens: nobis, Gallisque & fortassis antiquis etiam incognita, quia ad Oceanum usque non pervenerunt, nec in Oceani piscibus cognoscendis multæ operæ studiisque posuerint. Utriusque caro candida & mollis, salubris & delicata: *Fleteletus* tamen paulo durior est.

CAPVT III.

*De Piscibus littoralibus
lævibus.*

ARTICVLVS I.

*De Piscibus littoralibus
non planis.*

PVNCTVM I.

De Sandilz Anglorum.

Piscis, quem jam descripturi sumus, Anglis *Sandilz*, id est *Tab. XXI.* *guilla de arena*, tum quod longo *Aldrov. de Piscib. l. 2. c. 49.* sit corpore, tum quod sese occulturus sub arenam se citissime mergit, dicitur. Gesnerus *Ammodytē* vocabulo Græco vocavit. Capite est tenui ac rotundo, rostro longiusculo & acuminato: ore parvo: corpore reliquo oblongo, si latitudini conferatur. Nam cum eius medium (caput enim & cauda arctiores sunt) pollicis crassitudinem non superet, longitudo ad palmi mensuram extenditur. Quamobrem sicuti longis, sic etiam & parvis annumerari piscibus debet. Cum neque pollicis latitudinem, neque palmi longitudinem excedat unquam. Dorsō præterea (in quo pinnæ duæ reperiuntur, in eo medio

medio una, ac prope caudam altera) subcæruleus. Ventre verò in quo præter binas, quas utrimque habet pinnas, una etiam alia post excrementorum orificium subsistit argenteus conspicitur. Frequentissimè in Britanniae littoribus capitur. Sæpè etiam in Bononiensi, ubi idem nomen obtinet. Quibusdam anni temporibus, seu maiorum piscium iniurias fugiens, seu naturæ impulsu, aqua derelicta, sub arenam penetrat: inde pedalis & pectinatis incisus lignis, ab incolis extrahitur. Pauperum duntaxat necessitatibus inservit.

Huc pertinet alter piscis *Mersuyn* id est, *Porci* marini nomine missus, quod Porci more rostro terram fodiat. Lituris & specie corporis Lucium imitatur, sed aculeum rectum in fronte gerit. Lituræ omnes nigrae sunt. Pinnæ ventris, caput supinum & cauda rubent: cætera flavescent. Marinusne verò, an dulcium aquarum piscis sit, non satis memini, quamobrem historia ad priorem piscem pertinet. Marinum tamen esse nomenclatura docet.

PUNCTVM II.

De Dracone.

TAB.
XXI.
2.3.4.5.6.
Aldrovand.
de Piscib.
l.2.c.50.

DRACO piscis, Græcis veteribus *δρακων θαλάσσιος*, modernis *Δράκων*, unde Siculi, Neapolitani, & Romani suum Trachine deflexerunt, dicitur. Iovius Trachurū, qui in cauda, non cervice aculeos habet, perperam vocavit. Plinius qui Draconis marini nomine duos diversos pisces, ut ex libro nono capite vigesimo septimo colligi potest, intelligit, quorum unus serpens marinus est, quem Aristoteles libro nono capite decimo septimo describit, ab Araneo male specie distinxit, quem & Isidorus, qui Araneum ita describit, ut Draconi huic marino omnia competant, securus est. Quod ab Araneo Aristotelis distinguere debeat,

mirum non est, cum eius Araneus, à nullis Græcis authoribus venenatus esse tradatur: hunc omnes post Pastinacam venenosissimum asserant.

Salvianus duo ipsius generæ ponit. *Primus* piscis est oblongus, & ut Bellonius ait, forma pugionis modo compressa, unde à quibusdam Gallis Poignastre vocatur quasi pugio. Salvianus squammis carere dicit, item Bellonius, vel saltem exiliiores habere, quam sint serpentium. Rondeletius parvas ei tribuit ac tenues, *Ælianum* (ut apparet) secutus, qui asperas habere scribit *φολιδας*, quæ fere serpentibus tribuuntur, & ipse etiam Rondeletius sine squamis & planè nudum Draconem pingit. Percam marinam quodammodo refert capite, magnò scilicet & rotundo. *Oculus* non in longitudinem, sed in obliquum, nec recta sed curva scissura fissum habet: Connexa enim latera inferioris maxillæ (quæ paulò longior est superiore, nec recta nec oblique sursum porrigitur) à concavis superioribus lateribus, dum illud clauditur, suscipiuntur. *Dentibus* ut in Dracone serpente id communium est. *Oculi* magni sunt, quibus magnitudine supercilia respondent, sursum spectantes, ac adeò splendide virrescentes, ut smaragdum pulcherrima viriditate superent, iidem brevi intervallo à se distant, in quo triangulum expressum & aculeos parvos cernas. *Branchiæ* utrinque quaternæ, quarum exteriora opercula aculeo ad caudam spectante armantur, ut dictum est: quæ opercula post articulationem cum ossibus capitis, tenui membranæque simili substantia potius quam ossea constant, quamobrem Draco ea cum extra aquam aërem trahit, inflat, non aliter quam nos buccas inflamus. Ad branchias *pinnae duæ*, eo situ, ut in fluvialibus, hoc est, inferiores multo quam in marinis esse solent: inter has & scissuræ oris finem, in parte superna, duæ aliæ minores, candidæ. In cer- vice vel dorsi principio quinque ha-


bet *aculeos* tentues, nigros, præacutos, tenui membrana anteriori parte nigra, posteriori vero alba connexos, quibus venatum vulnus infligit, multoque perniciosius quam branchiarum aculeis. Ab hac, pinna incipit ad caudam usque continuata, quæ magna est, lata, atque adeo bifurca, Alia denique est à *podice* ad caudam etiam usque: qui diverso in hoc quam in aliis piscibus loco situs est: cum enim alii in medio eum habeant ventre, alii vero inferius versus caudam, in Dracone non procul à branchiis distat: unde fit quod brevis admodum ventris eius sit capacitas interna, cum tamen carnosus sit & satis amplus *ventriculus*. Colore est vario. Dorso enim fusco est, ventre candido, lateribus lineis aureis transversis pulchre distinctis. *Alter* qui fortè non malè *Dracunculus* Plinii vocari poterit, quemque *Salvianus* minorem vocat, in nonnullis à priore differt. Cum enim maior crebrò ad libræ unius & duarum etiam aliquando magnitudinem excrescat, (Rondeletius in Oceano aliquando cubiti magnitudinem attingere tradit) minor ne dimidiam quidem libram implet: præterea capite & corpore reliquo non rotundo, ut maior; sed in latera compresso est: cuius denique latera non subluteo solum colore, quo maior ille insignitus est, sed frequentibus etiam & obliquis ad cæruleum colorem vergentibus lineis pulcherrime depicta sunt. Aldrovandus *quatuor* Draconis species exhibet. Prior aculeo ad branchias, pinnarumque numero cum præcedenti convenit, colore vero & maculis lineisque differt. *Offa* branchiarum colore sunt roseo, sed in extremitatibus aureo. Aculeus item aureus, sicuti & pinnae, quæ sunt ad branchias: quæ vero in pectore conspiciuntur, albicant, cæteræ subvirent. *Os* pronè quoque viride, supinè albicat. Dorsum ex subviridi fuscescit, maculis rotundis ad castaneum vergentibus densissimis conspersum, *Venter* argenteis lineis crassiusculis contrario invicem ordine oppositis decoratur.

Aldrovand.
h.c.

Cauda tota ex cæruleo ad amethystinum tendit. *Alter* species invertice insignem habet aculeum; colore est in dorso subcastaneo, ventre albo, valde maculosa. Pinna cervicis inter quatuor priores aculeos in summitate atra est, cætera fusca: quæ verò ad caudam usque protrahuntur, & cauda etiam ipsa, coloris ferè sunt violacei. *Tertia*, capite est castaneo, præter os quod pronè supinèq; ferè violaceum est. Oculi, in vertice ferè ut in Callionymo, inter duos locati aculeos. Pinnae branchiarum & pectoris, item quæ in ventre est, roseo sunt colore: Quæ verò in cervice cernitur, ad quartum usque aculeum violaceo, cætera albicat, & rotundas, fusci coloris maculas ostendit, quemadmodum & subsequens, quæ ad caudam usque excurrit, Dorsum ad castaneum vergit, & nigricantibus maculis insignitur. Latera & venter viridescunt. *Quarta ac postrema*, magna ex parte castanei est coloris, dilutioris in capite, intensioris in dorso. Lineæ quæ à branchiis sunt ad caudam usque plane ferrugineæ. Tota pars supina candicat. Pinnae ad branchias & ad pectus, rubrae sunt: cæteræ cæruleæ, sed aristas habent rubras. Cauda præterea in extremo ferruginea est. *Locum* si spectes, Bellonius pelagium æquè ac littoralem scribit. Aristoteli simpliciter talis est. Oppiano in petris, & arenis pascitur. Loliungulis & aliis minutis piscibus vescitur, ideoque Nicander ἀλιφαῖνον, *maris vastatorem*, Epicharmus ἀλιμον nominat. Gregalè non esse vel inde cōjicies, quod nunquam plures capiantur. Mirum etiam, si verum est, si manu dextra attrahere coneris, violenter reniti; si sinistra, cedere & capi, quod Ælianus prodidit: nec minus, eo tempore cum piscium genus amore tenetur, in vulnere quod iste inflixisset, pisciculos illi similes procreatos fuisse, quod multorum piscatorum testimonio narrat Gillius. Idem eius venenatum esse, piscatorum periculo certum est, sæpe nomas, sæpe febres & inflammationes excitat, plusque à vivo quam mortuo periculi. Remedia varii varia ostentat. Plinio Mullus

Ælian. H.
A. l. 5. c. 37.


Sandich Anglorum.



Tab. XXI

Draco marinus. maior

Größer Meer Drach.





Dracunculus. araneus
nei species

Ein Art Mer Drach.

Draco minor.
Araneus Randel.


Kleiner Meer Drach.



Araneus.

Meer Drach.

Araneus minor.





Dracunculus.

Kleiner Drach.

Vronosopus.

Sternfischer.

Meerpfaff.





Scomber.

Macrell.

Tenchurus.

Bayland Macrell.

8




Lacertus peregrinus vel Ruber

maris.

12

Macrell.

10




Meer Heydex.

Scombrus. alijs.

11

Saurus.

Meer Heydex.



Mullus illitus aut in cibo sumptus prodest. Dioscoridi & Galeno Draco proprio ictui applicatus placet. Aeginata cerebrum piscis in potu præscribit & sulfur cum aceto imponit. Aetius locum affectum cum plumbo fricari jubet. Piscatorum experientia jecore illito dolor mitigatur, foliorum lentisci affricu punctura curatur. Genuenses exiguum Thlaspios genus, quod in ipsis litioribus nascitur, admovent. Recentis piscis è capite cinis, contra omnia venena prodest, mirabili discordia, si Rondeletio credimus. Plinius, ossibus gingivas scarificare jubet, ut dentium dolores sedentur.

PUNCTUM III.

De Dracunculo.

DRACUNCULI Plinius inter veteres meminit. Inter Recentiores à Rondeletio describitur. Est piscis marinus inquit, dodrantali magnitudine, cotto fluviatili non multum absimilis, rostro acutiore, & capite latiore, Ranæ etiam piscatrici quodammodo similis; sed Rana piscatrix ore est majore, pinnis concoloribus, quæ in Dracunculo variæ sunt. *Capite* est magno, compresso, *rostro* prominente, *ore* parvo sine dentibus, sine ulla ad branchias scissura; sed huius vice supra caput utrimque *foramen* est, ut in Hippocampo, quod, nisi dū piscis vivit, eoque aquam trahit, & emittit, manifestum est. *Oculos* magnos supra caput positos habet: capitis os in aculeos definit ad caudam spectantes. *Pinnas* longissimas pro corporis magnitudine habet, partim aurei, partim argentei coloris emulas. Quæ ad branchias sitæ, aureæ sunt, in radice argenteæ. Quæ in supina parte, à cæterorum marinorum piscium pinnis, situ magnitudineque dissident: nam & ori propiores sunt, & longiores ijs quæ sunt ad branchias. In dorso duæ eriguntur: prior (hæc in pictura vix apparet) parva est, aurea & argenteis lineis distincta; posterior magna admodum in medio dorso, papilionum alis non valde dissimilis, radiisque quinq; hordei aristis similibus,

membranaque constans. Radij priores longiores sunt, posteriores breviores, contra quam in membrana, quæ singula radiorum intervalla, veluti intertexta occupans paulatim crescit. Eadem quoque varia est, lineis etiam argenteis in medio duarum nigrarum sitis distinguitur. Hæc in medio dorsi cavo veluti in vagina conditur. *Alia* est à podice ad caudā, etiam aurea demptis eius fimbriis, quæ nigricant. Corpus totum sensim gracilius fit, & in pinnam longam terminatur, cuius fimbriæ nigricant. Est & picto corpore: nam ab huius medio, argenteæ lineæ ad ventrem ductæ sunt. In maxillis partibusque anterioribus veluti punctis argenteis notatur. *Ventre* est lato, plano, candido, cuticula tantum tegitur. Capitur in Agatesi littore, in primis Caniculæ vigentis tempore. Venuetas & summum Dei in eo artificium pretium ei fecere. Carnis substantia Gobionibus parvis similis est, iisdem alimentis vescitur. Ictum minus venenatum habet.

Icon Dracunculi Tabula XIV. 2.

PUNCTUM IV.

De Uranoscopo.

PISCIS, quem *Uranoscopum* seu coeli speculatorem dicimus, Aristoteli, Dioscoridi, & Aeliano καὶ ἀνέστημι, Theodoro pulcher dicitur, nō tam ob corporis pulchritudinem, deformis enim est; quam vel quod Uranoscopinomen sit pulchrū, & homine quā pisce dignius; Massilienses *Tapecon* quod, cum pessi instar conformatus sit, aliquam cum pudehdis similitudinem habeat; & *Raspecan*, quod caput ob asperitatem ad scalpenda pudenda muliebria accommodari possit vocant; Oppianus ἡμεροκόιτον, quod interdiu dormiat, noctuque vigilet, Hesychius & Varinus φαμμοδιτήν seu Arenarium dixere, quidam Ἀγρον, id est, castum, Athenæo vocari credūt, sed mendum subesse putat Gesnerus. Piscis est levi cute, eaq; dura, & quæ facile excoriari potest, præditus: corpore fere rotundo: *capite* magno os quoque & duobus aculeis ad caudam spectantibus aspero, quo Ranam pi-

Aetius l. 13. c. 36.

Aldrov. de Piscib. l. 2. c. 50.

TAB. XXI. 6.

TAB. XXI. 7.
Arist. H. A. l. 8. c. 13.
Ælian. H. A. l. 13. c. 4.

scatricem quodammodo refert: vertice admodum lato.

Roſtro quodammodo caret. *Os* alio quam in aliis piſcibus fieri ſolet, loco ſitum eſt, nimirum ſupra caput, & (ut Oppianus ait) inter medios oculos; eſtque magnum & valde patulum & inferiore maxilla ſuſum maxime attrachta clauditur. *Dentes* habet exiguos, *linguam* brevem ſed latam, quæ internas oris partes ita occupat, ut niſi digito eam comprimās & ſubmoveas, non videantur. Ex ea parte quæ inter linguam eſt, & maxillam inferiorem oritur, teſte Rondeletio, *membrana* in principio latiuſcula, ſenſim in carnoſam rotundamque apophyſin deſinens, extra os propendens qua piſciculos allicit, allectos devorat. Eandem cum vult, retrahit, & exerit, veluti ſerpens linguam. Pars inter oculos interiacens depreſſa eſt & concava. *Branchiæ* utrimque quaternæ ſunt, quarum oſſea opercula, poſteriore parte aculeo robuſtiſſimo ad caudam ſpectante horrent. Iuxta branchiarum ſciſſuram *pinnae* duæ magnæ & robuſtæ, craſſæ, & mucoſæ & variæ exoriuntur. Subſunt in parte ſupina duæ aliæ minores, albæ, maxillæ inferiori propinquæ. Has pinnas ſequitur os veluti ſternum, quod tribus aculeis horret. Succedit pinna alia à podice ad caudam. In dorſo duæ ſunt, quarum prior capiti propior parva eſt & nigra, ut in Araneo: poſterior ad caudam eandem uſque porrigitur, dorſo concolor.

Cauda in pinnam latam deſinit, Pavonis caudæ dum piſcis vivit, æmulam, ſimbriæ purpuſcunt, *Venter* eſt ſubalbidus: dorſum vero ac partes reliquæ ex cineraceo fuſcæ apparent, qui colores, dum vivit manifeſti ſunt, alioqui una cum vita pereunt.

A capite lineæ duæ ex ſquamulis conſtantes ad caudam protenduntur. *Ventriculus* amplius eſt, craſſus & carnoſus, cum appendicibus plurimis, *inteftina* ter revoluta, *hepar*, candicans, à cuius exteriori parte fellis veſica pender, admodum magna pro corporis ratione, felle

valde diſtenta, quod ſubſtantia & colore oleum æmulatur: cuius rei meminit Plinius, nulli piſcium hoc copioſius eſſe ſcribens: citat autem Menandri authoritatem in comædiis, immemor fortaiſſe eiufdem mentionem fieri ab Ariſtotele, qui nempe Callionymo in iecore fel inefſe tradidit proportionem corporis omnium copioſum: addit Ælianus hunc philoſophi locum recitans, jecur ipſum tradere ad dextrum latus collocatum eſſe Menandrumque, huic rei teſtimonio eſſe in Meſenia, his verbis: *Facito te fel habere Callionymo copioſius*: item Anaxippum in Epidicaſi zomeno dicentem, *niſi moveas & ſic ut Callionymi ſer vere efficias omne fel*. Lien exiguus, rotundus atque rubens ventriculo hæret. *Vulva* bifida eſt & longa.

Non multum excreſcit, & raro pedalem longitudinem excedit. *Littoralem* eſſe Ariſtoteles prodidit, poſtea Rondeletius, Carne *veſcitur*, & piſciculis apophyſi illa quam extra propendere diximus, inſidias ſtruit. Adnatant tanquam ad vermem, & capiuntur. Si cibum capto obieceris, eo uſque ſe infarcit, ut cibus ad ipſum os redundet. Adeo vivax eſt, ut ſi omnibus internis ſpolies, moveatur adhuc. Comeditur à plebeis, quia viroſi odoris eſt, unde *βαρυς* gravis Diphilo apud Athenæum vocatur. Nec mirum, cum cænofiſ aquis veſcatur. Hippocrates tamen non ſolum non improbat, ſed & in viſtu præſcribit. Nonnulli felle oculos Tobia curatos fuiſſe volunt. Cicatrices ſanare & carnes oculorum ſupervacuas conſumere Plinius tradit.

PUNCTUM V.

De Trachuro.

Tραχῦρος ſeu ut Oppianus & Galenus ſcribunt τρυχῦρος, quo nomine apud Latinos veniat, ignoratur. Lacertum malè vocari vel exinde patet, quod iſte καλιδες, ſi pro peculiari ſpecie accipias, vocatur. Male & σαύρος dici Oppianus, qui tanquam

Ariſt. H. A. l. 2. c. 15.

Ariſt. H. A. l. c.

Aldrov. Hiſtor. Piſcium l. 2. c. 51.

Hippocr. l. de affect. intern.

TAB. XVII. 12. Aldrov. de Piſcib. l. 2. c. 52.

Oppian. Hal. l. 1. v. 106.

quam diversos pisces appellat, testatur. Forma eius nisi paulò longior esset, *ovata* dici posset. Cum enim eius medium corpus latiusculum sit, deinde utroque versus arctatur, donec rostrum ore clauso, atque extrema pars caudæ carnea, acuetur. Inferior autem maxima, quæ superiore paulo longior est, cum os clauditur, non recta sed oblique sursum excurrit, unde os etiam non in longitudinem, sed in obliquum scissum est, dentibus adeo paucis & minutis munitum, ut edentulum videatur: revera tamen maxillarum pars denticulata est. Est autem ut Scombri admodum magnum: item oculis, ut in Melanuro. *Branchiæ* utrimque quaternæ. *Pinnis* natat quatuor, quarum duæ maiores ad branchias sitæ sunt, duæ aliæ minores in ventre: aliæ item duæ in dorso eriguntur; prior latior & brevior, in eminentiore dorso: altera paulo inferius arctior, sed longior, nam per dorsum reliquum fere usque etiam ad caudam porrigitur. *Podex* in medio ventre est, à quo alia denique pinna ad caudam usque demittitur. *Cauda* autem bifurca est, similis Acus vulgaris. In medio corpore *lineam* habet à capite ad caudam deductam, multis officulis, ita horridam, ut ferra esse videatur, non rectam quidem sed media sui parte inflexam & obliquam, in cauda eminentiorem, asperioresque quam in aliis partibus, quæque ob id *caudam quadratam* efficiat. Squammis caret, *levi* tantum cute præditus. Dorso subcæruleus, ventre verò & lateribus argenteus est, purpureoque aliquantulum ementitur, ut inde *ἀνδοπίνη*, id est, varium forte dixerit Numenius. Trachurus, cuius hic iconem damus, colore fere est albicante, aureis ubique lituris varius. Cauda ex violaceo fere ad cæruleum vergit. Ad pedalem magnitudinem perraro excrescit. Versantur circa littora. Numerosi omnibus anni temporibus seu nassis, quod veteribus apud Oppianum fuerit, seu retibus quod hodie in usu capiuntur, ut inde gre-

gales esse coniicias, & Romæ *Fritturnæ* nomine venundantur. *Ælianus*, *Al.* 13. 63. equam in utero habentem, si ei cauda Trachuri appendatur, piscis mox liber in mare dimittatur, non multò post arborum pati, prodidit, vere an falso non dicam. Inter duræ carnis pisces, à Philotimo censentur, ideo Diocles apud Athenæum aridos vocavit, nec dissentit experientia, nisi forte externa pinguedine, aut iusculò tener aut iurulentus fiat.

Æthenæus
Dipn. l. 7.
Galen. de
Alim. fac-
cult. l. 3.
c. 31.

PUNCTUM VI.

De Scombro.

Qui Græcis *σκόμβος*, is Latinis *Scomber* & *Scombrus*, *Hor.* XXIV. 97. *Piscis Iberus*, plerisque nationibus, *Macarel* & *Maquereau* non tam à Græco *κομάνιος*, quod Scaligero placet, hoc enim nomen iis potius conveniret, qui veteribus *Opfophagis* *Dii* vocantur; quā, leno, quasi, quod verò tempore parvas *Alaufas*, quas virgines dicunt, subinde subsequi solent, dicitur. *Corpore* est terete, denso, carnosum, utrimque in acutum desinente, *rostro* scilicet atque corporis extremo, cui cauda annectitur: & si parva magnis cōparare licet, *Thynn* (ut *Scholias* *Aristophanis* scribit) similis. *Oris* scissura ingens pro corporis portione; *dentes* exigui; *caput* rotundum; inferior maxilla in superiorem recipitur, & clauditur pyxidis modo. *Oculi* magni, aureo colore micantes. *Branchiæ* utrimque quaternæ: juxta quas *pinnæ* binæ, totidemque in ventre. A podice alia est, eique supra posita in dorso similis: quas ordine certisque intervallis, aliquot aliæ *pinnulæ* subsequuntur, quod tamen huic soli proprium non est, sed cum *Thynnis*, *Pelamydibus* commune, Alia denique est in dorso initio aculeis nonnullis horrida.

Cauda in lunatam *pintiam* degenerat. In ipsis aquis sulphurei coloris est, extra non qui cæteris, (ut *Plinius* ait) sed ferè cærulei, sulphureum autem colorem quem intelligat, alias

lias explicat, inquiens : Fulmina & fulgura, sulphuris odorem habent, ac lux ipsa eorum sulphurea est. Est vero cæruleus ille eorum color potissimum in dorso: nam venter lateraque argentea sunt. Totus lineis nigricantibus, obliquis, insignis est: squamisque caret, licet apud Athenæum squammatum esse quispiam velit, negandi vocula videlicet librarii omissa. Ad cubiti magnitudinem accedit. Sunt *mari peculiares*, & aliquando iuxta arenosa littora degunt, sæpe in petris, quæ chamis & patellis plenæ sunt. Et si autem tam in Oceano quam mari mediterraneo, sinu Adriatico, & Hellesponto, capiuntur: iuxta Herculistamen insulas, prope Carthaginem novam tam copiosi & frequentes sunt, ut una earum Scombraria teste Strabone dicatur: In Oceano tanta crassitudine proficiunt, ut pari cum Pelamydibus magnitudine, authore Bellochio evadant, in Adriatico parvi sunt. Existimavit aliquis in minore maris ambitu frequentes prædas exerceri, ideo non crescere. Vix ad Tergeste ac proximum sinum comparent Scombri: atque ilico capiuntur. In Oceanilaxitate fuga moram, mora parit incrementum, ideo grandescunt quia non capiuntur. *Gregales* † sunt, & à locis † frigidioribus calidioribusque, tanquam Thuani, ut qui † Arist. H. A. l. 9. c. 2. imbecilliores, dulcioris pabuli gratia, discedunt. *Beneficii* memores esse, *Ælianus* exemplo singulari, prodidit. Mane à piscatoribus cibati, feras Scombros gentiles suos cogunt, & corporum suorum abiectu ita cōcludunt, ut fuga sibi consulere non possint, hinc capiuntur. *Inseruiunt & mensis*. Diphilus leves esse, & facile è stomacho descendere dixit. Hiccius multum nutrire, minus verò facile excerni iudicavit viscosiores & crassiores, concoctu difficiles, & excrementitios esse, experientia eos docuit. Venetiis verno tempore quo pinguiores sunt, in delitiis habentur. Romæ ob siccitatem inter ignobiles reposuit. Quia graves & ventriculo refractarii, *tagixia*, id est, sale in-

veterari scripsit Athenæus, habenturque inter *tagixia* optimi. Veteres ex iis *garum* quoddam habebant, de quo ita Plinius. Est etiam num liquoris exquisiti genus, quod garum vocare, intestinis piscium cæterisque, quæ obicienda essent, sale maceratis, ut sit illa putrescentiū sanies. Hoc olim conficiebatur è pisce quæ Græci Garum appellabant (ut supra ostendimus) Nunc è Scombro pisce laudatissimum in Carthaginis Spartariæ cætariis: sociorum appellatur: singulisque millibus nummum permutantibus cōgios peno binos: Nec liquor ullus pene præter unguenta maiore in pretio esse cœpit, nobilitatis etiam gentibus. Scombros quidem & Mauritania, Bæticaque & Carteia ex Oceano intrantes capiunt, ad nihil aliud utiles: Laudantur & Clazomenæ garo, Pompeiique & Leptis, sicuti muria Antipolis ac Thurij: jam vero & Dalmatia. Vitiū huius (garinempe, non muria, ut Rondeletius vult) est alex, imperfecta nec colata sæx. Cœpit tamen & privatim ex inutiles pisciculis, minimeque confici, Apuam nostri vocant: Foroiulienfes piscem ex quo faciunt Lupum (super quo nostrum iudiciū supra diximus) appellant. Transiit deinde in luxuriam, creveruntque genera ad infinitum: sicuti garum ad colorem mulsi veteris, adeoque dilutam suavitatē, ut bibi possit. Aliud vero ad castimoniarum superstitiorem, etiam sacris Iudæis dicatum, quod sit è piscibus squama carentibus. (*legendum apparet non carentibus, nam Iudæi hodieque nisi squammosos edunt, & non squamosis, abstinent, ut duo gari sint genera, unum è squamosis, ut ex Lupo sive Encrasicholo, Manag, & Smaride consimilibusque alterum ex levi cute præditis, ut ex Scombris*) hic lex pervenit ad ostrea, urticas, gammaros, Mullorum iecinora, innumerisque generibus ad saporem gulæ cœpit sal tabescere. Hæc obiter indicata sint desiderijs vitæ, & ipsa tamen nonnulla usus in medendo. Huius usus apud nos desit, apud Turcas Constantinopoli non item: quia pisces piærof-

Scaliger in
Exercit.

† Arist. H. A. l. 9. c. 2.
† Arist. H. A. l. 8. c. 12.
c. 13.
Plin. H. N. l. 9. c. 15.
Ælian. H. A. l. 14. c. 1.

Plin. H. N. l. 3. c. 8.

plerosque frixos vendunt, iis intestina & branchias eximunt, immittuntque muria, ut in garum vertantur. Sociorum verò Garum vocatur, seu quod ganeones & lurcones eo sociati uterentur, ut quidam Galeni scholiastes putat, seu quod à sociis populi Romani, Hispanis nempe deferretur. Fæcosum ac plane fœtidū fuisse, faciliè Martialis indicavit, dum dicit

Vaguentum fuerat, quod Onyx modo parva gerebat,

Nunc postquam olfecit, Papilus, ecce garum est.

Ælian. H. *Vsum in Medicina* si spectes, arquato morbo correptis comestos opitulari
A. I. 2. c.
16.
Plin. H. N. *Ælianus* scribit, in aceto putrefactos mulieres strangulatu oppressas excitare Plinius.
32. c. 10.

PUNCTUM VII.

De Coliasive Lacerto.

Γ AB.
XXVIII.
12.
Aldrov. de Piscib. l. 2. c. 45.
Arist. H. A. l. 9. c. 2. l. 8. c. 13.
Columell. R. R. l. 8. c. 13.
† Arist. H. A. l. 5. c. 9.
† Arist. H. A. l. 8. c. 13.
† Galen. l. Alim. facult.
Martial. Epigr. l. 7. Athen.
Dipnos. l. 3.
Piscis quem *κολίας, κοιλίας, & κοχλίας* in vulgatis Aristotelis exemplaribus, seu a. *pica* varia, quam *κολιον* aut *κολίαν* dici, nescio quo authore Bellonius credit, quod variegata latera habeat, unde *καλιόγραπτι* Athenæo, seu aliam ob causā vocatur. Theodoro *κολά*, seu *Monedula*, & *Graculus*, Latinis ut C. Celso, Columellæ, ac Martialis, *Lacertus* audit. Magnam eorum cum Scombris affinitatem esse, non tantum inde colligere licet, quod ab Aristotele & Columella semper simul nominentur: sed etiam quod Lemni incolæ magnitudine duntaxat à Scōbris differre asseruerint, & Plinius Coliam Lacertorum minimum faciat, quod & apud Athenæum, qui Sardam Coliæ magnitudine esse scribit, habemus. Pariunt semel † anno. In cibis laudantur, qui in Propontide † antequam pariant, Amyclani, Hispani; quos † Sexetanos (Sexi authore Plinio, Bæticæ Hispaniæ oppidum est) Martialis vocat, ex quibus forte Salsamentum. Gaditanum, cuius apud Hippocratem mentio, & Parij seu Pariani, unde Parium apud Archestratum nutritrix Coliarum dicitur. De Carnis qualitate non conveniunt Authores. Xenocrati est

stomacho ingrata, arida, mali succi, excretu facilis, & copiosè nutrienda. Athenæo glutinosa, acris, mordax, & deterioris succi. Cornelio Celso, gravissimi alimēti. Saliri solitas apud Martialem invenies. Muria ad dentium dolores Medici utuntur. Patinam ex Lacertis apud Apicium vidē.

PUNCTUM VIII.

De Sauro.

Quem Saurum Græci vocāt, hunc **TAB.**
XXI. 13.
Aldrov. de Piscib. l. 2. c. 55.
Ælian. H. A. l. 2. c. 25.
Quædamque Latini *Lacertum* vocant, XXI. 13. A Trachuro distingui vel exinde patet, quod & Oppianus de Trachuro & Sauro tanquā de diversis piscibus agat; & Speusippus apud Athenæum Acui & Sphyrænæ similem esse, quod Trachuro non convenit, scribat. Duo eius esse genera Ælianus tradit, videlicet *nostras*, & *peregrinum*, in rubro mari nascens: *Nostras* caput habet (inquit Salvianus) tenue & rotundum; rostrum oblongum, & acutum. *Os* magnum plurimis atque exiguis dentibus munitum: *Oculos* mediores, rotundos & aureos: *Branchias* utrimque quaternas: prope quas binæ & parvæ sunt *pinnae*, utrimque scilicet una: aliæ duæ & maiores in ventre; in medio dorso una haud magna quinis senisve aculeis horrida erigitur, aliaque una multo minor in medio dorso caudæ vicina reperitur: è cuius regione abano, qui in hoc pisce caudæ fatis proximus est, alio paulò maior imo ventri hæret. *Cauda* in unam lunatam pinnam degenerat. Corpus oblongum est & rotundum. Unde non ineptè à Speusippo in secundo similitum, Sphyræna, Acus & Saurus similes esse dicantur. Sphyrænæ enim satis similis est hic noster Saurus: similis & Acui, si Acus illam rostri dempseris tenuitatem. *Ventre* est subalbido, lateribus luteis, dorso ex viridi nigricante, maculis quam plurimis virentibus, rubeis, cæruleis, luteis atque nigricantibus, dorsum, caput, & latera, nonnullorum serpentum instar, variè admodum pingentibus: Quamobrem non solum ore, rostro, capite, atque reliqua corporis figura, sed colorum etiam

iam varietate proximè adeò ad terrestres Lacerti accedit similitudinè, ut ei simillimus, si pedes exceperis, videri possit. Ventriculum habet oblongum & satis magnum: appendices non multos: intestina medio-cria: hepar bifidum, & subrubeum: Lienem subatrum. Pedali mensura majorem adhuc non vidimus. Ab hoc nostro Sauro aliquantulum diversus est, qui in rubro mari reperitur, quem his verbis describit Ælianus: Rubri maris Saurus (interpres reddit Lacertum) est, cuius magnitudo ei qui nascitur apud nos, æqualis est virgatus, spectatur, lineis nimirum aureolis circumdatur à branchiis ad caudam pertinentibus, quas media argentea distinguunt: ore est hiant, maxilla inferior eminet in superiorem, virides oculos habet, quos aureo fulgore palpebræ ambiunt. Ab hac delineatione non omnino abhorret peregrinus iste piscis, supinè subviridis, prone castaneus, lineis si velituris, maculisque orbicularibus subviridibus decoratus. Rictum oris habet maximum, Lacertorum terrestrium plane æmulum, & validissimis dentibus instructum. Branchiarum opercula flavescunt, punctis referta ferrugineis. Pinna tergoris & branchiarum, & caudæ ex ferrugineo rubent. Quæ vero in ventre sunt, eiusdem fere cum ventre sunt coloris. In mari vivit, & cœnotis locis delectatur. Carne vescitur, nec à putridis abstinet. Aristoteles inter gregales reposuit: sed cum in mari mediterraneo singuli capiantur, solivagos melius dixeris, tam raro capiuntur, ut vix annis singulis Romæ in foro piscario bis deni capti videantur. Inter pisces molli carne præditos Philotimus reposuit; inter molles & duræ medium, Galenus. Editur assus & frigus. Alexis apud Athenæum, branchiis exemptis, cæsis spinis, lotum atque incisum, & laesere probè pulsatum, caseo, sale, & origano implendum esse docet.

Athen.
Dioscop.
l. 7.

Ælian. H.
A. l. II. c.
49.

† Oppian.
Halieut.
l. 2.

Galen. A-
lim. facult.
l. 3.

PUNCTUM IX.

De Corace Rondeletij, Mil-
voeiusdem, & Boopis
rara specie.

CORAX Rondeletij, Romæ no-
mine cum Lyra communi, Ca-
pone vulgò à capitis magnitudine di-
citur. Piscis est marinus, corporis
forma Milvo Rondeletij similis, a-
culeorum pinnarumque magni-
tudine discrepans, ossa, branchias inte-
gentia, cæolata, in aculeos desinunt.
Pinna quæ ad branchias, minores
quàm in Hirundine Rondeletij, majores
quàm in Milvo sunt, ex viridi nigricantes
parte interiore, exteriori albescunt,
cum maculis rubescentibus. Dorsum
ex cæruleo nigricat, latera rubescunt,
Venter lactei est coloris. Caput est ma-
gnum: locus inter oculos cælatus. In
dorso virgas ex officulis contextas,
instar Cuculi habet: in eodem pin-
nas duas: prior est brevior, cum a-
culeis longioribus, acutioribusque, po-
sterior longior, cum longè minoribus
aculeis. Linea simplex à capite ad
caudam ducta est. Palato minus est
flavo quam Milvus. Ventriculum par-
vum habet cum multis appendicibus,
intestina tenuia, hepar ex albo rube-
scens. Carne est, si Athenæum sequi-
mur, durior: si Celsum, teneriore,
dura tamen. MILVUS Rondeletij,
qui Gallis Lucerna, quod noctu luce-
at, piscis est marinus corporis forma
Corvo per similes, corpore magis ru-
bro, capite minus lato, utrinque com-
presso. Pinnarum numero caudaque
similis, magnitudine & colore dissi-
dens. Quantum ad colorem attinet,
parti pinnarum quæ ad branchias
sunt externæ, nullæ maculæ rubræ
insunt: interna ex viridi non nigri-
cat, sed pinnæ istæ partim flavescunt,
partim nigricant. Linea à bran-
chiis ad caudam ducta simplex non
est, neque lævis ut in corvo: sed ex
acutis brevibusque aculeis horret.
Non squamis, sed cute aspera con-
tegitur. Partibus internis Mullo im-
berbi

TAB.
XXII. l. 2.
Aldrov. de
Piscib. l.
2. c. 56.

Aldrov. de
Piscib. l. 2.
c. 57.



Corax seu Corian

Meer Rayf.

Miluus alius

Fligender. Relfifch.


Tab. XXII.



Miluus.

3

FligenderFisch.




Miluus
alatus.

gefingelter fisch.

Miluus.


Schwabb fish.

4



Boops.


Glatte Houtink.



Pajser

Blatteis. Meer-bult.


7



Pajser
alius

8


Meer- Bulten ander
geschlecht.



Rhombus.

10


Plateys. oder Meer bult.



Pajser -3-


9

Blattftein 3
geschlecht



Rhombus.
alius

11




Rhombus. Lævis uerus.

glatt bult.


Rhombus.
anuleatus.

12

Platteis. dornbutter



13



berbi similis. Palatum parvum flavum est. Carne est dura & sicca.

TAB. XIX. 6. Boopis species ita à Rondeletio describitur, Rarus est piscis, cuius nomen neque à piscatoribus nostris neque ab aliis potui unquam extorquere propter raritatem. Palmi maioris est longitudine, totus à squamis nudus, ore parvo, oculis valde magnis pro corporis ratione; in pronis partibus pinnam habet ad caudam usque continuam, cauda lauta spissaque est. Ad branchias & in ventre binas pinnas habet. Sapore, carnis substantia, oculis Boopem refert.

ARTICVLVS II.

De Piscibus littoralibus lævibus planis.

PUNCTUM I.

De Passere lævi.

TAB. XXII. 7. **P**asser lævis, Aufonio Plateffa, alijs *Pecten*, quod eius pinnæ rectæ & parallelæ pectinis speciem præ se ferant, Hollandis Scholle, dicitur. *Bina* eorum apud Gallos *genera*. *Vnum*, quod communiter *Plya* vocatur, & magnitudine excellit. *Alterum*, quod alibi Cariet, alibi à quadrata corporis figura Quarrelet, *Quadratul* nomen sortitum est. *Ætate* tantummodo differre, à quibusdam proditum; ex corporis forma, quæ Quadratulo magis quadrata, & pluribus maculis ruffis sive subflavis, ostendit Rondeletius. A Rhombis situ differunt. Si hos ita in latus componas, ut oculi in cælum suspiciant, & mentum deorsum versus spectet, pars supina erit dextra, si Passerem similiter constituas, supina pars erit læva. Ita *marinus* est, ut & dulcium quoque aquarum sit studiosissimus: In Oceano tamen numerosior quam alibi reperitur, Iuxta Livoniam sunt pinguiissimi, & inde vento indurati ad mediterranea exportantur. Saxatilibus Mnesitheus accenser, Ovidius in herbosis. Oppianus ἐν πηλοῖσι καὶ ἐν τεργάνεσι degere credit, Vadum,

ubi piscatorem sensit petere, terræ adhærescere, aquam, ne videatur, turbare, Alberti M. fide habemus, Carnem eius mollem Philotimus dixit, sicciorē Diocles, duram & probi succi Xenocrates, mediam Galenus. Optimi marini, qui etiam nigriores, secundum qui in stagnis albidiores & lutum resipiscentes, locum fortiuntur, molliissimi & insipidi, qui in fluvijis vivere. Nonnulli in cibum, cum iam putrescere, & male olere incipiunt sumptos, alvum perturbare asserunt.

Gesner. de
Aquatilib.

PUNCTUM II.

De Rhombo.

Rhombus piscis, à figura quadrata, cuius latera omnia sunt æqualia, anguli verò obliqui, nomen sortitus est. Nonnullis *ψῆστα* dicitur, ut ex Plinio & Athenæo, qui Romanis Rhombum vocari testatur Græco nomine piscem, qui aliis Græcis *ψῆστα* nuncupatur, colligimus. Duo sunt ipsius *genera*, *Aculeatum* unum, *læve* alterum. *Illud* prona parte multos habet aculeos, circa caput, quod grandius & elatum est, & ab hoc caudam versus maximè. Magni in Oceano & mari mediterraneo capiuntur, ideo forte Rhombus latior est patella Martiali Rondeletius vidit, qui quinque cubitos longus erat, latus quatuor, spissus pedem. Optimos Adriaticus sinus maximè circa Ravennam alit, & hos veterum exornasse mensas arbitratur Platina. Celebrantur & Artici circa Eleusyniam, quos Lynceus Samius Psettarum nomine dignatus est. Ei qui *verus esse* putatur, pinnæ & cauda in extrema rubescunt, Cætera est unicolor, subviridis, rotundis punctis stellulisque undique plenus. Omnium *locorum* & temporum piscis est. Ovidius in herba algosa, Iovius circa pinguiorē terram extremosque littorum margines versari scribit, in fluviorū ostiis frequentissime piscibus insidiantur. Voraces sunt, & piscium, cancrorum imprimis avidissimi. Abditi

TAB. XXII. 10.
II. 12. 13.
Aldrov. de
Piscib. l. 2.
c. 48.

† Plin. H.
N. l. 9. c.
42.

† pinnas exertas movent, specie vermiculorum. Terra, seu vado maris per hyemem condi, à Plinio sub nomine pſettæ proditum. Tardiſſimè propter corporis latitudinem moventur. Inter delicatiſſimos olim fuiſſe cibos, ex Horatio, & Iuvenali poteſt colligi. Tempore Iovij, *Aquazilem Phasianum* quidam appellare erat ſolitus. Galenus inter piſces mollicarnes retulit, ſed aliter Xenocrati, & Villanovano viſum. Ille duræ eſſe carnis, & difficulter concoqui ait. Hic inter craſſos viſcidos excrementitios, reſoſuit: niſi forte ſuperiores de lævi, cuius pulpa candida & preſſo quodam humore ſucculenta; hos de aculeato, qui revera durior, locuti ſint. Vivus impoſitus medetur lieni, ſi remittatur in mare, ſi Plinio credendum.



HISTORIÆ PISCIVM

LIBER II.

*De Piſcibus, qui in mari
& fluminibus degunt.*

TITULUS I.

De Squamoſis.

CAPUT I.

De Salmone.

TAB.
XXXI. 12.



PIſCIUM, qui in mari æque ac fluminibus degunt, alijs quam longiſſimè à mari recurrunt, & ad fluviorum origines uſque penetrant, alijs in marium proximis morantes, mox ad id regrediuntur. Utrorumque qui-

dam ſunt *Squamoſi*, alijs *Læves*. Ex illiſ ſunt *Salmo*, *Lupus*, *Latus*, *Aloſa*, *Ziga*, *Albis fluvij*, *Mugil*, *Capito Anadromus Geſneri*, *Caper*, *Sturio*, *Galeus Rhodius*, & *Cataphræctus*.

SALMONIS ſolus inter veteres Plin. H. N. Plinius mentionem facit. Aufonius l. 9. c. 18. hoc nomen adultæ ætatis ut Sario- niſeu quod melius Farionis mediæ, & Salaris primæ impoſuit, illud tamen Truttæ convenit. Circa Rhenum & apud Helvetios ætatis tempore ad Iacobi uſque feſtum vocatur, *Salm*/ inde ob feſtum Andrææ Lachſi *Lachs*/ nomine gaudet. Cum *Eſſoce* Plinije undem, quod Georgio Agricolæ placet, vix credo, cum alibi eum ſuo nomine appellet, & per *Eſſocem* Lucium intelligere videatur. An *Anchorago Caſſiodori*, difficile dictu, nam à Rheno duntaxat venire ſcribit. Apud Græcos nullum invenio nomen, qui aut *Salangem*, cuius piſcis tanquam delicati mentionem facit Heſychius aut *καταβάδες* vocari poſſe putant, ſuo iudicio fruantur. *Descriptionem* ſi ſpectes. Piſcis eſt ſat magnus, Bicubitalis quidem ut plurimum eſt: apud Miſſenos tamen & Deſſaviæ à XXIV. libris ad XXXVI. accedit, in Helvetia circa Tigurum gravioreſ capiuntur. Baſilea quinque aut ſex pedes longos dat, nec temerè Cetaceum piſcem dici poſſe Bellonius reliquit. *Squamis* tegitur exiguis, & maculis ita notatus, ut totus ferè piſcis ſubruſis & luteis notis inſignis videatur, quia verè in capite ijs caret, ideo *frontem lubricum* Poëta dixit. Os habet amplum, & valde denticulatum; nam præter id quod maxillæ magnis & validis armatæ ſunt dentibus, palatum etiam quadruplici eorundem ordine munitur, linguaque hamatis dentibus horret. Hunc quadruplicem dentiũ ordinem Bellonius huic piſci præter aliorum fluviatilium morem, peculiarem eſſe ait, & cum ceraſte ſerpente communem: additque plures eſſe in inferiori maxilla, quam in ſuperiori. *Tergus* colore fere eſt cæruleo, aut ex cæruleo nigricat. *Oculi* magni ſunt. *Narium* foramina utrimque gemina;

Mina : *Branchia* utrinque quaternæ, quarum opercula lata, & rotundis puniceis maculis plena sunt. *Pinna* juxta easdem binæ, totidemque in dorso, quarum prior in medio fere dorso est, altera caudæ proxima, cutacea, carnosaq;. In *ventre* tres sunt, binæ fere in medio, tertia à podice qui in imo ventre est. *Caudam* in unam latam, & rotundiusculam pinnam definere Salvianus ait, Rondeletius verò bifidam esse testatur, indeque Salmonem jure *μαρύνσθω* nominari posse putat. Quoad *internas partes*, *Cor* angulatum est, ventriculus oblongus & angustus : hepar in nullos lobos divisum : rubrum Rondeletius tradit, Salvianus & Bellonius pallescere dixerunt : huic vesicula fellis ex viridi nigricantis annexa est. *Splen* ex rubronigricat. Alvus ipsi prodiga nutat, & opimato abdomine fluit venter. Gesnerus à faucibus patulis *duos* se observasse *meatus* scribit, deorsum protensos, unum ad ventriculum, quem œsophagum vocant; alterum anonymum, (cuius usum ignorat, quandoquidem nihil in eo reperit, nisi forte ruminat (inquit) hic piscis & alimenti sui partem ibi repositam habet) qui cute candida & tenui constat. De *Maris & femina* differentia ita Aldrovandus. *Fœminam* à mare differre Rondeletius & Salvianus volunt, quod illa rostrum habeat magis aduncum, hami modo, indeque vulgo in Gallia Beccard appellari. Bellonius verò dum dubitat, num sit diversa species: *fœminam* esse interea insinuat, inquiens: Est & alius prægrandis Salmo (fœminam esse autumant) quem vulgus Gallicum ab eius ore prægrandi Beccard vocare solet: alii à fereendis ovis *Bortiere* (Portiere forte nimirum à portando.) Differt is à mare Salmone, quod labrum inferius in hami modum aduncum habeat. In superiore enim labro foramen est ad palatum tendens, in quod hamus maxillæ inferioris fere capit, pixidatimque in tubi modum insinuat. Alii aliter de hac rostri curvitate sentiunt. Gesnerus testatur suos piscatores in mare tantum

incurvari insigniter, in fœminâ perparum. Rondeletius quoque mari recurvum esse ait, sed fœminæ magis. Quidam vero eruditus in epist. ad Gesnerum, in qua de Albi fluvii piscibus ad ipsum scribit utrumque sexum id ceu quid præter naturam pati arbitratus inquit: Salmo in Milda (hoc flumen ex Albi ingressus) si obstaculum seu præcipitium aquæ juxta Dessaviam, secundo ac tertio frustra saltu superare conatus fuerit, vadum petit, eoque in loco sub lapidibus & saxis delitescens, emaciatur, & contabescens maculis ruffi seu ænei coloris impletur & rostrum inflectit in magnum hamum, eo quidem maiorem quo diutius manserit. Verumtamen credit vir ille doctus idem ei tandem contingere, etiam si obstaculis omnibus superatis ad summas fluviorum partes eluctatus fuerit. Ex rostri itaque curvitate sexus non satis tutò distinguetur, tutissime vero ex ovis. Addit Bellonius fœminam crebrioribus mare, iisque subrubris & rufis orbiculis in cute variegari: atque in Lepradis (de quo suo loco diximus) modum multis coloribus sugillari. *Marinus* magis quam fluviatilis piscis est. Nam & in iis duntaxat fluminibus quæ in mare se exonerant reperitur: & observatione notum est, si supra annum in eis perseveraverint, insipidos fieri; si diutius, post annum secundum ceu fideratos interire. Observatus in Albi adeò tabidus, ut exanguis & nullis ferè intestinis appareret; nati verò ex eo pisciculi, nec longiores nec crassiores digito evasere, quamdiu ibi vel juxta stagnantibus aquis immorabantur. Uberrima eorum in Bothnico mari versus Lappones captura, circa solstitium in extremis littoribus circa Thornam tanta magnitudo capitur, ut fortissima retia pondere suo rumpant. Apud Vestrogothos quoque, in provincia Vermlandia, in qua dulcium aquarum locus certum millibus passuum in longitudine, & quadraginta latitudine patet, magna Salmonum est copia.

In Albi quoque Vistula, Duna,

Rondelet.
de Piscib.
l. 2. c. 17.

Multavia, Sala, & Milda apud Misenos habentur. Rhenus & Mosella gratissimos alunt. Minus commendari quos Scaldis, Thamesis, Garumna, Sequana, & Ligeris exceperunt. In Rhodano qui capi existimant, falluntur. Hoc præter Rondeletium & Scaliger pater prodidit. In Occidentalis quoque Indiæ fluminibus numerosissimi capiuntur. *Cibum* ipsi Salvianus pisciculos tribuit. Alii ante XXV. Iulii pediculis aquaticis vesci, à partu obvios pisciculos comedere, eosdemque in ventre repertos, prodidere. Nonnullis in dissecto spissus quidam humor, subflavus, & lapillus candidus, visus. Quidam in maioribus nihil unquam, in parvis nescio quid reperiri tradunt, illos sola aquæ turbidiore victitare opinantur. *Vita* est tenacissimæ, sub uno corde pulsante, recenter captorum indicio, plures in frustra disseci à piscatoribus venduntur. Robertus verò Constantinus, exenterati, aquosa sanie aspersum, ultra diem vivere vidit. De *Partu* proditum, per autumnum & hyemem, ad veris interdum initia, in fluviis, & minoribus rivis lubentius parere. An & in Oceano nemo tradidit. Scrobs excavatur. Ova pisorum magnitudine fœmina ponit: mas rore genitali irrigat. Ova paulatim auferunt, & spiritu vitali inflata, ultro per aquam deferuntur, & Salmulos producant. Salmulos mares aliquando genitura plenos reperiri, & cum fœminis adultis coire, eorumque ova rigare, cum in Salmulis fœminis nulla ova reperiantur, admiratione dignum est. De eorum *Saltu* ita Gessnerus. Mildam flumen præ cæteris diligit Salmo, & (ut quidam putant) ab aqua Albis fluvii qua cum permixta in mare se exonerat, discernit. Itaque plurimi eo in loco, ubi in Milda in Albim influit (Dessaviam vocant, quod oppidum est principum Anhaltinorum) capiuntur, hoc modo. Ad Mildæ in Albim ingressum principes vallum sive obstaculum quoddam excitarunt, ut ita redundans aqua ad molendina revertere-

tur, octo cubitis aliquando altius: vallo graves & magnas arbores imposuerunt, & perticis magnis intus cancellarunt, ne Salmo transiliat. Inter perticas alicubi nassæ sunt collocatæ. Hunc locum cum attigerit Salmo, qui per Albim ascendit, saltu adversus aquæ præcipitium se proripit in altum, ubi vel in nassam incidit, & capitur, vel arborem perticasve contigit, indeque violenter in Mildam se trajicit. Hoc si prima vice non successerit, secundo etiam tertioque experitur, & si ne tum quidem transilire aut assequi altitudinem valli poterit, vadum petit, inibique sub laxis delitescens emaciatur ac contabescit. Si tamen flumen Albis augeatur & crescat, adversus illud subinde fontium & originis cupidus ascendit, parit, & consumptus tandem macie ac siccitate moritur. Adeò verò nativus huic pisci saltus est: ut Salmunculi etiam, si in vase aliquo venales cum aliis permixti in aqua fuerint, aqua eis adempta exiliant, unde & ab aliis piscibus dignoscuntur. Alii saltus causam in Robur, quidam in Hirudines, à quibus mense Iunio & Iulio infestantur, nonnulli in loca abrupta conscendendi libidinem, conjiciunt, quod apud Hectorem Boethium invenies. Singularem *in cibis* habent gratiam, ita ut omnibus piscibus præferantur, suavitatem si spectes. Habenda tamen ætatis, loci, & temporis anni ratio est. Salmunculi, qui sex vel septem digitos non excedunt, Aprili & Maio in deliciis habentur: adulti, tenuiores in fluviis evadunt, si ea non longè subiere. Moderati tum exerciti, si longius progressi sunt, nimio labore tabescunt. Plinius Aquitanicis palmam detulit, *Plin. H. N.* Rhenanis Albertus, qui mense Maio *l. 9. c. 18.* suavissimè eduntur. Miseni post Pentecosten placent. Partui vicini, cum & rostrum curvatur, & maculas ærei coloris gerunt, damnatur. Salitos & infumatos bona Europæ pars distrahit.

N. Icon. Salmonis Salviani ad Tab. 31.

CAPVT

CAPVT II.

De Lupo & Lato.

TAB. XXIII. **Q**uem Latine à voracitate *Lupum* vocant, Lucill. Catillonē vocavit, is Græcis λέων, aut λέων, ut Athenæus author est, ab ipsa vehementia: aut quasi λιωνβορ, valde vorax, ut Eustathio placet, vel λέων κέχρυεν αὐτὸ τὸ φόμα, καὶ ἀθρόως καὶ ἐν χειρὶ αἰλιονετῶν, quod illi os hiet, & repente cumque impetu avide voraret, ut Suidas vult, dicitur. Nec *Lucium* esse, quod Philadelphus voluit, quod hic in fluviis & lacubus degat, nec *Sturionem*, quod Volaterraneus & Poggius Florentinus tradidere, quod hic squamis careat, nec carnivorus sit; nec *Lacciam* seu *Chiepan*, quod hæc dentibus destituitur, certum est. Piscis est squamosus, squammæ argenteæ sunt, mediocres, & ferratæ, quæque carni & inter se validissimè coherent. *Rostrum* habet oblongiusculum, *Os* cum hiat valde patulum. *Linguam* oblongam, si Athenæo ex Aristotele fides, osteam, & adhærentem. De *dentibus* non conveniunt scriptores. Carere *Massariis*, & *Rondeletius*, quod ob oris magnitudinem facilè prædam devoret, tradiderunt; tenues confuso ordine undecunque Bellonius posuit, plurimos, tenuissimos, multiplici ac vario ordine dispositos, pectinum instar, quibus lanarii utuntur, *Salvianus*. *Oculi* sunt magni. *Branchiæ* utrimque quaternæ. Harum operculum duobus osibus constat, quorum superius postremâ sui parte squamatim committitur. A summis brachiis per utrumque latus linea fere recta ad caudam ducitur. *Pinnas* Aristotele teste, binas habet parte prona, totidemque supina. Quæ prona parte capiti proxima est, octo vel novem acutis & inæqualibus aculeis tenui membrana colligatis horret: altera unico tantû. Contra supina parte caudæ vicina aculeos habet ternos. *Cauda* in unicam pinnam degenerat. In parvulo, ut diximus, nigræ apparent *macula*, quæ in paullo adultiore prorsus delitescunt, *Grandiusculus* enim argenteus est, dorso tamen paullo minus quam vē-

tre cādido. Locus etiā *colorem* mutat; nam qui in mari capitur, ex cæruleo candicat, in ostiis fluviorum, totus albus est. *Carnem* habet secundū Ioviū lacteam, secundum Bellonium rubeſcentē, seu is diversæ speciei, sive Oceanus aliquid mutat. *Cor* triquetrum, ut Athenæus ait: *ventriculum* amplū, & longum: appendices binas maximè conspicuas, *jecur* subflavum, in duos lobos divisum, quorum dextro fellis vesica committitur; *Lienem* rubrum & longum, *intestina* lata nec multis complicata anfractibus: *folliculū* plurimo aere tumidum, spinæ dorsī validissimè annexum. Bellonius è pusillo *magnum* ac cetaceum, Salmonis more evadere solere testatur, ut ex Oceano libras quindecim non nunquā pendere visus sit. *Salvianus* ad viginti libras, aliquādo excreſcere observavit. Quomodo *Columella* quosdā sine macula, varios alios faciat; & quid Plinius perſuum *Lanātū*, intelligat, facilè hinc colligi potest. Ita marinū esse piscem, ut & λιμνογαλασας, & ostia fluviorum nō refugiat, *Galenus* præter *Oppianum* author est. Sed & in dulcibus, Letho nempe *Lybiæ* circa *Berenicē* fluvionasci, Athenæus memorat: nihil de *Columella*, qui *Velinum*, *Sabatinum*, *Vulsinēsem*, & *Ciminum*, eosdem procreare innuere videtur, dicā: secus n. inſequenti sentire creditur capite. In dulci portū quē *Phanarium* vocant, longè maiores vulgaribus reperias, apud *Miletū* quoque prægrandes & plurimos, ut apud *Aristophanis* *Scholiastē* & *Suidā* legimus. *Archeſtratus* apud *Arche-næū* γεοπαίδας vocavit. Solet & mediæ cryptum penetrare saburræ. Qui in fluviis capitur. *Lanei* à *Martiale* nomē accepit, & expresse de iis *Plinius*. In *Lupis* in amne capti præferuntur. In *Tyberiamne* inter duos pontes tanti precii, ut *Philippus*, apud hospitem *Cassino* in oppido, authore *Columella* *Lupum* sibi in cœna appositum gustabundus expuerit, dicens, *Per eam nisi piscem putavi: quasi innueret, solos Tyberinos lupos piscis nomine dignos esse. Lucillius* isti Catillonis quasi Catillorum liguri-

Columell.

R.R. l. 18.

c. 17.

Plin. H. N.

l. 9. c. 17.

Galen. A-

lim. l. 3.

Oppian.

Haliut. l. 1.

Columella

R.R. l. 8.

c. 16.

Colum. R. R.

l. 8. c. 16.

Varro R. R.

l. 3. c. 3.

Juven. Sa-
tyra 5.
† Elia. H.
A. l. 16. c. 12

guratoris nomen, teste Macrobio, imposuit. Solet enim cloacas subire, & obvia quæque devorare. In India exundantibus in agros fluviis, † in planis camporum vagantur, & ab aqua destituti prædæ sunt. *Vescitur*

† Arist. H.
A. l. 5. c. 10.
† Aristot.
H. A. l. 6.
c. 17.

carnibus præcipuè, nec piscibus, vel corruptissimis escis parcat. In exenterati ventre serpens aliquando in-

Idem l. 5.
c. 9.

ventus est. Tangit & † algam, & ster-

Plin. H. N.
l. 9. c. 51.

cora: Ἀλγίμον ἰχθυόν Oppianus vocat. Iis

Aristot. H.
A. l. 5. c. 2.

maximè locis † qua flumina in mare

Plin. H. N.
l. 32. c. 2.

exeunt, ova parit ætate † & hyeme,

Oppian.
Halieut. l.

ideo alicubi bis † idque inter fusa-

Plutarch. l.
utra ani-
mal.

neos solus facere creditur, sed poste-

rior partus infirmiorum. Sublimes

natant. Athenæo sunt *μυνηρεὶς* solivagi,

Aristoteli *χύποι*, fusiles seu fuscanei.

Mugilum, Luporumque capturam

uno retis jactu centum aureis coro-

nis venisse, Rondeletius oculus testis est.

Solertia & ingenio non destitui, docilesque sequentia docebunt.

Rete circumdati harenas arant cauda, atque ita conditum transeunt rete.

Et quamvis minus in providendo

solertiæ quàm mugiles habeant; magnum tamen robur in pœnitendo

habent. Nam ut hædere in hamo, laxant vulnera, donec excidant infidix, quod præter Plinium, Oppianus, Ovidius & Plutarchus tradidere.

In Eloro amne tam mansuetos esse, ut è manibus porrigentium cibum capiant, Nymphodorus author est.

Et quia lapidem in capite hyeme sibi infensissimum se habere sentiunt; idè in abditos se tum gurgites demergunt, qui in sublimi natant, frigore congelati moriuntur. Cur inter alios pisces cum Mugile, Salpa & Chromide *clarissime audire*, post Aristotelem Plinius scribat, & in vado vivere addat, nescio, nisi fortè sublimem natatum in causa ponat. *Capiuntur sæpe*

Aristot. H.

A. l. 3.

Plin. H. N.

l. 9. c. 70.

Plin. H. N.

l. 9. c. 62.

numero dormientes fuscina. *Inimicitias* cum Mugile & Squillis gerunt.

Caudam illi prærodere Nigidius apud Plinium author est. Pugnantes invicem sæpè Puteolis, præsentente Belsarione, Perottus vidit. Statis tamen mensibus concordēs sunt, & in unum gregem, si abundè cibarii, coeunt. Ab his cornu quod fronte exit, punctus

interimitur, quem Oppianus & Æ-

lianus describere: Magni olim apud Romanos Opsophagos æstimmī erant.

Plinius post Elopen & Acipenserem præcipuam iis & Asellis auctoritatem tradit. Archestratus Mile-

sium *Γεόπαιδα* & quidem *ὅς τὸ πολὺ πικρὸν* vocat, & Tripatinum summam cœ-

narum luxuriam ingrediebatur. Sed maximi, lactes, cerebrum & epar sic-

bant. Illo Eliogabalus rusticos in mediterraneis pavit, Huius gratia, Hermæus Ægyptius piscium institor,

non nisi exenteratum vendebat. *Carnis qualitas* non nisi loci, temporis, & Ætatis ratione habita, definiri potest.

Locus si spectetur, in mari puro qui sunt, boni sunt Hicetio succi, sed

pauci nutrimenti, † sanguinem consistentia tenuiorem gignunt, & diutissime citra putredinem, in primis si

nive circumdantur, servantur. Inter duos pontes Romæ capti, ob vitiosam aquam, graviter olent, & facile putredinem concipiunt. Illaudati, qui in piscinis habentur. *Tempus* si respicias, deteriores sunt dum in utero habent: summa hyeme & Ianuario captis gratia, nisi fortè nimio exercitio soliditatem carnis acquisiverint.

Lanatas Plinius dixit, si ventrem attenderis, quo mollitie & pinguedine blandiuntur. *Ætatis* ratione, tenelli

suaves & stomacho grati sunt, copiosè nutriunt, & facile per corpus descendunt: mediocres optimo se commendant callo. Apparatum alibi vide.

Ægris in albo jure aut ex aceto optimè elixantur. An quod *αερεμολόγοι*, à Pythagora reiecti fuerint, dubito. Plutarchus certè postquam sic sententium sententiam exposuisset, patrocinari ipsis videtur. De usu in Medicina pauca occurrunt. Tantæ est, si Marcello credimus, adversus strumas efficacix, ut ad quamlibet corporis partem ad motus, earum vitium perfanet. Lapilli capitis dolorem levare, Euporist^{ων} author tradidit.

LATVS, inter Nili pisces à Strabo bone numeratur. Esse & marinum Archestratus apud Athenæum prodidit. Candidissimus est, ducentarum sæpe librarum magnitudine, &

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

quo-

† Galen. de
Alim. fa-
cult. l. 3.

Strabo
Geogr. l. 15.

quovis modò paratus suavissimus. Rondeletius pro eo, Coracino ac Umbræ simillimum substituit. Tarentinus *Latili* piscis meminit.

CAPVT III.

De Alofa, & Ziga Albis
fluvii.

TAB. XXVII. **A**lofa nomen, huic de quo jam acturi sumus pisci, post Strabonē Aufonius ex vulgari imposuit, Gregorius Tiphernas in Strabone, & Theodorus Gaza in Aristotele, *Θελωσαν*, quam moderni Græci *πελωσαν*, fortè quod spinis seu aculeis aliquando soleat inhorrescere, eius nomine donarunt. Rondeletius Archippo & Mnesimacho *Θελωσαν* appellari tradit; quam tamen à Thrissa diversam, ut Trissam cum Trichide eandem, Gesnerus, *varium* ut Panthera & *Panthera*. Aristoteles facit. Nec *Lupus* est, quod Platina voluit; quod hic Mugili caudam prærodât, illam edentulam sciamus; nec *Clupea*, piscis magnus, qui crescente luna albus est, decrecente nigrescit, corpore minimum aucto à propriis spinis interimitur, in Areni Galliæ fluvio nascitur, in capite lapidem grano similem, qui ad quartanas sinistro lateri decrecente luna alligatus facit, & † Attilum Padi, venam quandam in faucibus eius mira cupiditate appetens, morsu exanimat, obrationem eandem. Universi corporis figura, si cum latitudine conferatur, ob longiuscula apparet, & in latera ita compressa, ut imus venter, rectâ lineâ præacutis aculeis & constructâ, & propterea non asperâ solum, sed serræ etiam modo secante (si adversa deducatur manus) terminetur. *Spinis* sive *aristis* etiam scatet innumeris, & inter vescendum admodum molestis; quod cum Trichidibus quoque commune habet, unde Albertus, & Murmellius latinum eius nomen

Aristosum sive Aristosum confinxerunt. *Caput* habet in latera valde compressum, *rostrum* acutum. *Oscum* maximè hiat, admodum parvulum, edentulum, atque omnis asperitatis expertus. *Branchiæ* utrinque quaternæ. *Squamis* regitur magnis, tenuibus & facillè deciduis. In capite supra oculos, utrinque veluti gemmæ smaragdinae relucunt. *Lingua* nigricat, superiores mandibulæ dorsum prominent. *Ventre* & lateribus argentum æmulatur. *Dorso* verò & capitis vertice ex albo flavescit. Romæ cum maximè aucta bipedalem mensuram non superat. *Marinus* est † piscis, sed ex mari ineunte † *Strabo* vere cum in utero habet, subintrat, *Geogr. l. 15.* inchoante ætate revertitur. In Tyberim delapsæ strigosæ sunt, & quadam marinæ saluginis ariditate parum amabiles, paucorum dierum mora, Tyberinis undis pinguescunt. Laudatas Arnus & Umbro in Hetruria, Liris & Vulturnus in Campania præbent. Galliæ & Hispaniæ flumina maximas, Mosa in Hollandia suavissimas. In Aquitania ob frequentiam *plebis obsonum* Aufonius vocat. In Arvernæ fluvio juxta Marignensium oppidum, supra mille ducentas uno retis jactu capi, Rondeletius author est. In Euripo reperiri negat Aristoteles. Burdigalæ & Lugduni succulentiores quàm Massiliæ venduntur. *Pariunt* in fine ætatis in mari. Athenæus *μωρίσπος* Thrissas dixit, Oppiano, alternant vias Ponti curruntque per æquora, Hospitium mutant semper, Pontoque vagantur. Figulus veris adventum Mossellanis nunciare, & mense Maio tonitrubus, adeò terreri, ut plurimæ in ripa exanimatæ reperiantur, scribit.

In Arvernæ Oppido Maringnesio ad restudinis sonos adnatasse, & saltasse Rondeletius vidit, quod & de Thrissis Æliano & Porphyrio proditum, nec de mendo in Athenæo, qui Trichidi hoc quicquid est adscribit, dubitandum est. In nullo apud Veteres fuisse

O

precio,

Ælian. H.
A. l. 6. c. 32.
Porphy.
ωεί δον
χρῆς 1. 3.
Aufon.

Oppian.
Hal. l. 2.

TAB.
XXVII.
3. 4.
Strabo
Geogr. l. 15.

Aristot. H.
1.

Plin. H. N.
l. 4. c. 4.

precio, Aufonius testatur. Postquam pingues evasere, succum mediocriter bonum, & qui facile distribuitur gignunt: sed quia glutinosioris alimenti excrementa non facile atteruntur, ideò ab ipsis exhalationibus, intempestiva somnolentia inducitur, & sitis excitatur. In pisculariis Bavarorum legibus, teste Gesnero, interdicitur, ne duobus palmis vel septem digitis, propter aristarum & parvitatem & multitudinem capiantur. Vida prudentissimum, quod non nisi obesus, maximeque idoneo tempore, cum esu carnum interdicitur, appareat, dixit.

Aldrovand. ZIG A Albi fluvii, qui & *Goldt-*
de Piscibus *fisch* ab aureo circa caput colore di-
1.4. c.5. citur, sic à Kentmanno describitur.

Zige piscis est tenuis & fuscus, paucæ carnis: colore pulchro, argenteo, dorso tamen subfusco, oblongus est, non ita latus, ut solent esse pisces Goldfisch dicti, qui in Marchia capiuntur: longitudo enim eius ad latitudinem quintupla est. Caput eius si foris aspicias, Harengi capiti non dissimile est, nisi quod in parte superiore oris scissuram habet. Lingua eius parva, quæ colore nigricat. Dentes utrinque ad latera in faucibus, mandibulis duabus duri adnati: sicut in eiusdem fluminis piscibus (de Capitonum fluviatilium genere) Ieseno & Dibelo, ut vulgo nominant. Caput & oculi ad aureum colorem, paucoviridi permixtum, accedunt. In summis lateribus utrinque maculæ quaternæ nigræ digeruntur, quarum prima ad summas branchias, ultima paulo sub initio pinnæ dorsi. Ex Oceano in Albim *subir* hic piscis & paulatim consumitur ac deficit. Capitur ut plurimum in hoc flumine, à festo Pentecostes usque ad Divi Iohannis diem quo tempore Sturio migrat.

A Sturione enim è mari in Albim pellitur. Quamquam autem ad velocitatem & fugam præ omnibus in Albi piscibus, comparatus sit, mollis est tamen & quam primum ex aqua

in aerem subductus perit. Maximi huius generis in Albi apud nos (Misenos) duabus cum dimidia libris (sedecimunciarum) ad tres cum dimidia (quod tamen rarum est) perveniunt. Sive *assus* sive *elixus*, non boni saporis est. Si tamen præparatum, sale intus aspergās, tum in fumo aut sole leviter sicces, & ita butyro unctum super craticula asses, melius (ut in hoc genere) sapit. Et quoniam aridi hi pisces sunt, sunt qui in aqua elixant, deinde exemptos condunt jure è butyro, zinzibere, aqua & modico aceti, sicuti etiam alios quosdam pisces siccatos condire solent, ut Truttas, Thymallos, Lucios, & Cyprinos latos. Quomodocunque paratur, nullus tamen in Albi piscis æque ferini aut virosi saporis est; & à quo etiam nomen ei impositum conicio, ut Zige, id est, Hircus dicatur, hircum enim præsertim insolatus, olet. Capitur & in lacu Sverinenfi. Alosam Gesnerus credidit, metuo ne perperam.


CAPVT IV.

De Mugilibus.


Historiam Mugilum, nomenclaturarum diversitas obscuram facit. TAB. XXIII.
cit *Κερφός*, *λδοκίσκος*, *κέφαλος*, *νήσις*, *πε- 4.5.*
γαίας, *μυξίνος*, *στέργος*, *χελών*, *βακχός*, *Aldrov. de*
σφυλδός, *δακτυλός*, *κεφαλίνος*, *βλεβίας*, *Piscib. 1.4.*
πλάτης, quæ apud Aristotelem, & *A. c.6.*
thenæum, ex Hicesio, Dorione, Eutydemo, Polemone invenies, præcipuæ sunt. *κέρειος*, Aristoteli & † *γε- † Aristot. 11.*
neris & speciei † nomen est. Hicesius speciei, Dorion generis duntaxat mentionem fecit, & in *marinum* *H. A. 1. 8.*
& *fluviatilem*, illam iterum in *Ceph- c.2.*
alum & *Nestin*, divisit. Appellationem *Στόν* & *κέρειος*, seu telo, belli Perfici tempore invento, sortitus est, quod eo teli modo in anum immisso apud Athenienses publicè adulteri pœnas luerent. *Leuciscis* seu Alburnis & Albulis ab albo colore nomen impositum est, perperam *γλαυκίσκοι* dicuntur; Galeno

Salmo. Salm. Lachs


Tab. XXIII.




Salmo. albus Salms. Ein ander geschlecht.




Mugil Meeralet. 4




Mugilis. Species alia.



3 Lupus. Meer Wolff.




6 Capito Anadromus. Elbnasen Meer-nasen.




7 Caper. capri-
Scus

Sawfisch.



Acipenser


Zeelandicus.



Stoer. Sturio.


Acipenser. 1.

8



Stoer.

Acipenser seu.
Sturio. 2.



10

Acipenser. seu

Sturio. 3.



Galen. de
Alim. fa-
cult. l. 3.

Galeno sunt fluviatiles, κεφαλῶν γεν-
neris quidem nomen est : sed quia
πολλὰ τὸ βαρύτερον τὴν κεφαλὴν ἔχον nomen
obtinuit, nec id omnibus magnum,
non omnibus etiam comperet, nisi
fortè ideò dictum esse putes, quòd
in metu capite abscondito totum se

Aristot. H.

A. l. 9. c. 17.

† Arist. H.

A. l. 8. c. 2.

† aliquando peculiaris & unica Mu-
gilum species est; aliquando duas † sub
se species complectitur: nec fortè ma-
lè Mugiles marinos in Cephalos &
νῆσις distinxeris. Νῆσις epithetum est
omnibus Mugilibus commune, quod
omnibus carnibus abstineant. περι-
στῆς speciei nomen est, sed speciem Ce-
phali alteram, quæ muco suo vivit
Epithetum, & idem cum μυξίνω vide-
tur. Sargus seu ut apud Aristotelem
σαργῶν, quid sit, dubitatur, Rondele-
tius eundem cum νῆσις seu jejuno fa-
cit, Aldrovandus discernit. Chelones
cum Bacchis Hicelio iidem, & Pli-
nius Banchos inter Mugiles recen-
set, sed cum Myxone eosdem fa-
cit. Rondeletius Bacchum quintam
quandam speciem Hicelio esse, in-
finuat. Σφινγες, Salviano cuneatus,
Gesnero Cunealius, quod λαγάρδης καὶ
περὶ γόνυ, gracilis & quadratus sit, ita
dictus, à solo Eutydemo inter Mug-
iles reponitur. Alii σφινγες legunt, ut
à σφῆς vespa, non σφῶν cuneo, isti pi-
scis dicti fuerint. Δακτύλιος nomine
Salvianus minorem aliquem in eo-
dem genere ab Eutydemo ponit
putat, alii διδακτύλιος, sed perperam le-
gunt, cum duos in latitudine digitos
non excedat: nec alii fortè fuerint,
quàm quos Padi accolæ Canistrel-
los, quod in Canistris vanales ferri
soleant, vocant.

Cephalinus quibusdam cum Blæ-
psia, teste Dorione idem, nisi men-
dum sit, & pro Blæpsia βλέννα, quod
idem quod μύξα, ut Galenus scribit
significat, legi debeat, & sic Ceph-
alinus inter species Nestium nume-
retur.

Platarum nomen Cestreis à qui-
busdam imponitur, si Polemoni libro
de fluminibus Siciliæ credimus. Ac-
tum de illis in capite de Murænis.
Species Mugilum seu Cestriorum sunt

quinque, apud Aristotelem, Cestreus
nempe propriè dictus, Cephalus co-
ghomento Chelon seu Labeo, Cepha-
lus pereas, sive translitoranus, Sargus
sive Sargo, & Myxo seu Muco. Caput
nonnullis est magnum & depressum,
rostrum breve ac retusum, ut Capito-
nibus, aliis minus & rotundius, ro-
strum magis extensum & acutius, ut
Cheloni, Os omnibus parvum, rotun-
diusculum & edentulum. Squammis
omnes teguntur. Cestreus magnas &
crassas habet, quæ numismatis spe-
ciem mentiuntur. Pinnae utrinque
binas gerunt, illos si excipias, quos la-
cus Sipharum gignit, quibus teste A-
ristotele, una tantum utrinque est, &
supinis carent. Præter binas illas pin-
nas, quæ utrimque consistunt, unam
habent ab ano; in dorso duas, qua-
rum altera aculeata est, altera acu-
leis caret; ad caudam spectans. Om-
nes à branchiis lineas aliquot subob-
scuras ad caudam deductas habere
videntur, etsi haud æquè in omnibus
sint conspicuæ. Dorso sunt subnigro:
ventre vero candido. Venter teste
Aristotele carnosus est: cui parte al-
tera plures appendices exeunt: alte-
ra una tantum, ut idem ait. Rondele-
tius longè alium esse scribit quam in
carnivoris piscibus, densum nempe
& carnosum instar ventriculi avium,
foris planum, intus rugosum, figura
verticilli vitrei, quod mulieres fusis
appendunt. Intestina quoque crassa
sunt, pinguique & in gyros acta; in
quibus splen latet, ut idem observa-
vis, & sub pinna locum aere plenum
reperit. Hepar pallet; parvum, & tan-
quam manu ventriculū amplectens.
Fel rufum sive flavum, aquæ confi-
stentiæ. Cestreo eiusdem Rondel. he-
par ex albo rubescit: caro mollior, la-
xior, minus candida, minusque pin-
guis quam Cephalo, additque gulam
habere; ventriculum in longam ap-
pendicem desinere, semper inanem
esse, uti & intestina. Lapis quem Ce-
streus in capite gerit, Echinus & Sphon-
dylus, ab echinata specie dicitur. Li-
neæ quæ à branchiis ad caudam du-
cuntur, Cephalo breviores sunt. Che-
lon sive Labeo nigricantes à capite ad

Arist. H. A.
l. 6. c. 13.
Arist. de
part. l. 4.
c. 13.

Plin. H. N.

l. 32. c. 7.

Galen. de

usu part.

l. 8. c. 6.

caudam æqualibus spatiis distantes protensas habet. Habet & labra crassa, spissa, prominentia, unde *χελών* *Labeonis* nomen. Capite est paulo minore quàm Cephalus, oculis prominentioribus, sine pellicula illa concreta, quàm veluti palpebram habet in capite. Marinos pisces esse nullum dubium, sed an omnes fluvios & stagna subeant, incertum. Capitonum alius translittoranus Aristoteli, quasi in alto mari degat. Galenus in stagnis quoque nasci scribit. Ut ut sit, Cestreum propriè dictum esse judico, qui longius à mari, ut in † Nisum ita in alios fluvios recedit. Cephalii in eiusdem vicinia, propter dulcem aquam & limum morantur. Etsi autem aquas amēt, ab imbribus tamen adeò vehementer læduntur, ut *visum* amittant, ut Aristoteles prodidit. Cephaloni inprimis oculi per hyemem albescunt: ipse tum & macer & cæcus, quod in Nauplio terræ Argivæ agro accidit, capitur: inprimis, si hyems asperrima fuerit.

Marinos à fluviatilibus, spinarum numero & quantitate distinxit Galenus, plures his & minores innuens: certius indicium sapor ipse suppeditat. Acriorem & pinguedinis expertem Cephalum dicunt qui præstantior.

De *Cibo* non convenit inter auctores. Carne abstinere Aristoteles tradit, vivente duntaxat Oppianus & Ælianus. Idem Cestreum alga & limo vesci scripsit. Gulosus autem maximè est & infatigabilis, ideò in proverbium abiit, aviditas sæpè tanta, ut cauda verberando excutiat cibos.

Tanta iisdem salacitas, ut in Phœnice & Narbonensi provincia, coitus tempore è vivariis marem linea longinqua per os ad branchias reli-gata emissum in mare eundemque linea retractum, fœminæ sequantur ad littus, rursusque fœminam mares partus tempore.

De ipsorum *Generatione* ita *Aldrovandus*. Quod ad ortum generationemque eorum pertinet: scribit Aristoteles esse qui omnes sponte oriri opinentur, quorum opinionem re-

fellit, quoniam unicuique tantum eorum genus sit, quod non coitu, sed ex limo arenave enascatur: cæterorum veræ fœminæ ova, mares semen genitale habeant. Pariunt autem eodem teste semel anno: sed an eodem omnes tempore, difficulter ex ipso colligas; alias enim Capitonem vere parere tradit ultimum, quoniam novissimè eius fœrus appareat: alias omnes Decembri mense gravescere ait, tricenisque diebus gerere, & in iis Capitonem quoque enumerat, alias Cestreos ait inter primos partum accelerare, parere hyeme, locis iis maxime quæ flumina exeunt, dum uterum ferunt, præcipue graviter laborare, ideoque fieri, ut tunc potissimum ruant in terram ac excidant: feriri porro gravi stimulo agitados in terram, atque omnino in temporis motu perpetuo incitari, donec pariant, sed requiescere à partu continuo.

De *Ingenio* & aliis hoc habet. Tam veloces esse, ut jeiuni transversa navigia superiacent, & ubi dispositas piscatorum sensere insidias, retia supervolent, ut veluti sagittæ arcu emissæ videantur. Curvos hamos habere suspectos, ideò postquam diu circumnavare, cauda prius escam percellere, & quod avulserunt deglutire, mox ore in angustum collecto, summis tantum labris ac vellicatim escas stringere. Irritati, in sublime feruntur, & effugia quærant; si aberrare, quiescunt, & necem prostrati expectant. *Visum in Cibus* quòd attinet, Hicæsius omnes Leuciscos & Mugiles boni succi esse, faciliè excerni, nec multum alere, scribit, nempe si mari puro capti sunt. Nam qui in cœnosis locis, quales tum illi, qui in Etruria in Prillino lacu apud Orbatellum ad mediterraneam deferuntur tum hi, quos Padusæ atque ipsi luculenti Fossæ Clodiæ canales viscere prætere-ro, Ferrariensibus & Venetis copiosissimè præbent, pinguedinem humanæ naturæ infestissimam habent. Aristoteles in fluentis & lacubus, quod pinguiore fiant, præstare dixit. Lynceus Samius hyeme post partum laudat.

Æsta.

Aristot. H.
A. l. 8. c. 2.

† Strabo
Geogr. l. 15.

Aristot. H.
A. l. 8. c. 19.

Ælian. H.
A. l. 1. c. 3.
Oppian.
Halieut. l.

Plin. H. N.
l. 9. c. 17.

Plutarch.
Lutra anti-
mal.
Oppian.
Hal. l. 2.

Ætate lutum quod stagna exci-
centur, olent. Septembri, quod lu-
to putrescente pinguiorcs evadant,
insalubres sunt. Optimi qui circa
Abderam, deinde qui circa Sino-
pem capiuntur. Romæ maxima ovo-
rum gratia, quæ teste Iovio, geminis
folliculis circumcisa parte feminis,
recentibus Cephalis eximuntur, &
nomen *ὄων τριγύρον*, *ovorum salitorum*
apud Græcos obtinuerunt. Quantum
ad *Medicinam*, Ventriculus Mugil-
lum, seu in cinerem redactus, seu in
fumosiccatus, & vel vino albo, vel
aqua absynthij ablutus, & in cibo
sumptus, ventriculi exsoluti vires
non minus quam ventriculi gallina-
rum potus interna reficit. Elixus in
vino & ex aceto sumptus vomitum
compescit, prodente omnia Ronde-
letio: Lapilli in cerebro contra Ne-
phritim valent.

CAPUT V.

De Capitone Anadromo
Gesneri.

TAB.
XXIII. 6.
Aldrov. de
Piscib. l. 4.
c. 7.

Capitonem Anadromum, Gesne-
rus & Kentmannus descripsere. Na-
sutus, inquit, ille, videtur, promi-
nente & carnosâ superiore oris par-
te, ut in nostris fluminibus, is quem
Nasi nomine descripsimus: cui etiam
reliqua corporis specie per omnia
adeo similis est, ut discrimen nullum
animadvertam, ne colorum quidem
ferè, nisi quod Albinus hic Nasus
magis albicat, noster fluviatilis, ve-
ro magis fuscus est. Sed noster plane
fluviatilis est, Albinus è mari ascen-
dit: præterea noster vilis & plebeius
est, Albinus vero inter laudatos,
præsertim assus. Hoc etiam notan-
dum, cum Albinus alio nomine *Blic-
ca* dicatur, longe alium piscem eo-
dem nomine à nostris vocari, de
quo egimus inter albos pisces. Miseni
etiam Zertam dicunt, quod nomen
etiam Polonis usitatum audio. *Zerta*
inquit Kentmannus, piscis longi-
giulculus, argentei nitoris, *squamis*

parvis tegitur, dorso subfusco: *pinnis*
quæ ad branchias sunt & parte superi-
ora rutilis, pauco caruleo admixto.
Linea utrinque à branchiis ad cau-
dam tendit, in qua puncta fusci co-
loris digeruntur. *Caput* crassiuscu-
lum, oculi pulchri, magni, albicantes,
nares magnæ non procul ab ore. *Os*
molle prorsus, in quo nec dentes
sunt, nec alia asperitas, sed ab initio
gulæ seu faucium, maxilla utrinque
valida, dentibus senis oblongis val-
lata. Maximi huius generis pisces qui
apud Misenos capiuntur, bilibres
sunt. Libram XVI. unciarum dico.
Anno toto ex Oceano in Albim a-
scendit hic piscis, maxime vero circa
Pentecostem, qui tempore parit, mi-
grare solet, tunc etiam ad cibum præ-
fertur, quod fœminæ ovis plenæ
sunt. Manent & pariunt in Albi, pro-
ficiuntque ipsi & soboles: augentur
enim & pinguescunt. Vescitur omne
genus pisciculis, qui nullis præser-
tim spinis & aculeis rigent: item mu-
scis aliisque insectis, quibus intra aut
proxime supra aquam potitur. Ha-
betur inter optimos qui in Albi sunt,
assari solitos pisces. Caro enim eius
optimi saporis est. Ritè etiam elixus
non male sapit. Desquamatus nemi-
pe, exenteratus & elutus, in aquam
fervere incipientem immittitur, cõ-
ditusque ac salutus ad iuris ferè con-
sumptionem coquitur, quo modo
permulti etiam alij fluviatiles pisces
elixari solent. Sunt qui iuri haud fe-
re cõsumpro copiosum butyrum ad-
dunt, eoque liquato piscem inferunt.
Potest & aceti aliquid affundi, &
Zinziber aspergi, pro cuiusque pala-
to. Assus vel simpliciter, vel cum
embammate è cœpis minutatim cõ-
cis, vino, croco, saccharo & Zinzi-
bere, sapidissime estur. Nec displicu-
erit desquamatus, in frustra concisus,
quæ in polenta aut secalis pollinè
volvuntur, atque ita in butyro sive
crudo sive liquato frixus. *Hæc omnia*
Kentmannus. Addit Gesnerus non in
Albi tantum, sed Sala etiam apud
Misenos flumine Zertam
capi.

CAPUT VI.

De Capro sive Caprisco.

TAB.
XXIII. 7.
Aldrov. de
Piscib. l. 4.
s. 8.

CAprum & Capriscum eisdem Salvanus, diversos Rondelerius facit. Maxima hic nominum affinitas, & uterque duram pellem habere traditur. An vere *καπρίσκος*, *χοίρος* Strabonis, *ὄς* aliorum, & *μῦς* Oppiani & Æliani sint iidem, dubitari potest. Equidem Athenæus Aristotelis *καπρον χοίρον* vocat; alij tamen *σκάθρον*, quidam *σιάθρον* legi debere opinantur, nonnulli *Chalcidem* piscem vocalem & in dulcibus aquis habitantem credidere. *Porcus* etiam Niloticus Strabonis potius porca fluviatilis minor est, piscis rotundus, spinis in capite noxiis, *ὅν* vero *ψαμμάθιδας*, quasi in arena fodientem facit, quod terrestribus suis more rostro arenam fodiat, Numenius facit, eandemque cum *σινκίον*, cui Simeon Sethi eas in nutriendo facultatis rationes attribuit, quas alij fere Rhombo tribuunt, Aldrovandus posuit. Salvanus cum *καπρίσκος* & *χοίρος* eundem iudicat, *μῦν* denique inter *σελάχη* seu cartilaginea Athenæus ex Aristotele recenset, inter quos, quis Caprum nostrum retulerit? Athenæus eundem cum Capris, cum ait *καπρίσκος καλεῖται μὲν καὶ μῦς*, esse censet. *Descriptionem eius* ex Salvano, eamque accuratissimam damus. Caper, inquit, Molę piscis instar, *caput* utrinque admodum compressum habet: *Oculos* rotundos, atq; in superioris capitis parte locatos: *Os* parvum, & valde denticulatum: utraque enim maxilla octonis dentibus validissimis, magnis, latis, non ferratis, sed continuis, atque humanis simillimis minuta est. *Branchiis* utrinque quaternas non osseo & dearticulato (reliquorum squamatorum instar) operculo sed cute contectas, nec latas, sed modica scissura (Molę piscis more) pervias habet. Nec si Aristot. dicat: *Habent quibus paucissimæ sunt, singulas branchias utrinque easque duplices, ut καπρίσκος*, (sive Aper, ut Theodorus vertit) *aliis binæ utrinque sunt, alteræ simplices, alteræ duplices, ut Congro*, Suspiciari debemus hunc nostrum piscem Congrum non esse, cū

neque etiam verum sit, quod binæ utrinque branchiæ Congro sint. Et propterea mirari potius cōvenit, cur hæc ita tradiderit Aristoteles. Utrunque una tantum *pinna* & rotunda ad branchias conspicitur: nam illis, quæ in piscibus aliis utrinq; in ventre sunt conspicuæ, caret prorsus. In dorso ferè medio tres, membrana inter se iuncti reperiuntur *aculei* robustissimi & magni, quorum prior reliquorū duorum triplus est, quosque omnes non solum ubi vult, deprimit, sed in sulcū etiam osseum, in dorso ob id sculptū, recondit. Depressi autem & reconditi uti quam facillimè simul eriguntur, ita eorum unus dūtaxat erigitur. Et pari ratione erecti omnes deprimi possunt, cum eorū unus nequeat; suntque ea arte fabrefacti, ut cum prior & maior quantumvis impulsus deprimi nullo prorsus pacto possit: postremi tamen depressione, quæ facillima est, statim deprimuntur, non secus quam in arcubalistis vocatis, in quibus parvo ac inferiori ferro vecte compressus, tensus ilico remittitur arcus: ob cuius similitudinē hic piscis noster Romæ *Pesce balestra* vocatur. Et quod maiore dignum est admiratione, si postremus aculeus non prorsus deprimatur, sicuti prior quoq; proportionē duntaxat deprimatur, sic ibidem etiam ita rursus consistit atque obfirmatur, ut nullo impulsu ulterius deprimi possit, nisi reiterata postremi depressione. Hosternos aculeos pinna sequitur, ad caudā utque deducta. *Osse* autem valido, lato & recurvo, ex cordis loco ad eam ventris partem, quæ è branchiarum regione est primum reflexo, deinde per ventrem sub cute usque ferè ad podicem extenso, ibidemq; postremo in acutissimum & conspicuum aculeum desinentē, tota anterior ventris regio roboratur atque munitur. Quæ verò inter prædictum aculeum & podicem, ventris portiuacula relinquitur, plerisque aliis longè minoribus, sed satis robustis atq; ferratis aculeis armatur. A podice per ventrē reliquum ad caudā usque alia singularis pinna deducitur. *Cauda* quæ non sensum, ut reliquorum pisciū, sed repente

pente extenuatur, in unicam & latā pinnam degenerat: *Ventriculum* habet amplum, & crassum: intestina lata & valde reflexa: hepar subalbidū, cui felle vesica hæret.

Corio tegitur squamoso, cuius tamen squamæ serpentis potius quam piscis videntur; nam præterquam quod eo ordine sunt commissæ, ut lineas, cancellatim sese interfecantes constituent, firmæ etiam & valide adeo hærent, ut desquamari nequeant; unde ita durum & asperum efficitur eius corium, ut vix disseccari queat. Rondeletius sese experiri esse scribit, ne acutissimo quidem gladio penetrari posse, utq; ligna & eboræ eo poliri possint. Quāobrem jure Ælianus atque Oppianus marino Muripellem præduram tribuere; & Athenæus Aristotelis testimonio, etsi apud Aristotelem id nunc non legatur, inter pisces qui aspera cute teguntur, κατὰ τὸν recensuit. Quod ad *colorem* attinet, ex livido viret, nonnullis parvulis notis cæruleis & rubentibus maculis quam plurimis insigniuntur. Estque totius piscis figura valde compressa, & lata, atque fere orbicularis. Ad multam magnitudinem non excrescit, duas enim libras rarò excidit, unde merito Oppianus & Ælianus eum haud magno corpore esse dixerunt. Ha-

tenus ille. Non maris duntaxat, sed & fluviorum accola est, ut Plinius & Aristoteles scripsere. In amne Acheloo grunnitum habet. Vesceitur carne, cancris, squillis atque testatis. *Solivagus* est, & raro capitur. Pugnacissimum esse, tum quod pelle prædura tegatur, tum quod dentium robori confidat, Ælianus & Oppianus sub nomine Muris marini prodidere. Carnem habet duram & suavem. Virus namque olet. Athenæus inter αλιγοτάλα retulit.

gerat dicimus, is Græcis nostri temporis ξυρίχ, quasi Oxyrinchus, Cyprijs teste Bellonio *Morona* vocatur. Nec est veterum *Lupus* quod Poggio Florentino placuit, ut capite quarto huius tituli innuimus: Nec *Attilus*, ut Franciscus Philelphus voluit, cum Attilus sit, qui hodie ab accolis Padi, veteri servato vocabulo Attina, Adilo & Ladino vocatur, piscis ipso Sturione amplior, effigie, sapore, pretio & tota fere natura ab eo dissimilis: Nec, *Turfo* Plinij, quod credidisse Theodorus Gaza creditur, cum hic Car- Plin. H. N. l. 9. c. 9. chiz, id est, Caniculæ, ut Arche-
stratus apud Athenæum comprobat, species sit, & cum Turfo sive Phocænæ in Ponto catulos pariat, hic oviparus sit, & ubique nascatur. Nec *Hycca* seu *Hysca* ut Hermolaus Barbarus in epistola ad Cortusium prodidit, cum vel ipse Athenæus, qui solus Hyccæ meminit, qui piscis Hycca sit ignoret, & duntaxat, à Callimacho sacrum piscem, à Cyræneis *Erythrinum*, ab Hermippo Smyrnæo Hyccam Iulidem vocari scribat.

Nec *Delphinus*, ut Carolus Figulus voluit, quamvis in multis quoad formam conveniant, quod iste omnium veterum autoritate, inter cetos referatur. Niloum tamen Delphinum, de quo apud Solinum leges, quemque Delphino potius similem, quam Delphinum Marcellinus vocat, Sturionem existimare, nihil forte oberit.

Nec *Oxyrinchus*, veterum, cum hic Carnivorus sit, & hamo, ut apud Athenæum legimus, capiatur. An pro Oxyrincho Caspio Æliani, haberi debeat, comparatio ostendere poterit. Circassi sane cæteri-
que Mæotidis accolæ, Sturionem Oxyrinchum vocant, si Gesnero & Scaligero credimus. *Silurum* veterum esse Salvianus contra Manar-
dum apud Aldrovandum ostendere conatus est, quæ proluxissime agentem vide. Aufonij esse nullum dubiū, & ita Sturio à Venantio Fortunato Pictaviensi Episcopo, qui duobus post Aufonium seculis vixit, vocatur: Ve-

CAPUT VII.

De Sturione.

Piscis quem nos Gothico vocabulo Sturionem, quasi *σειρίων*, quod rostro suo proræ rostratæ speciem

TAB.
XXIII. 8.
9. 10. II.
Aldrov. de
Piscib. l. 4.
c. 9.

Arist. H. A.
l. 4. c. 9.
Plin. H. N.
l. 11. c. 51.

Ælian. H.
H. A. l. 9.
41.

Ælian. H.
A. l. 17. c.
32.

Iuvenal. tur : Veterum non esse, tum ex eo
Scalig. 14. colligas quod non tantum teste Iu-
& 14. venale & veteri eius interprete, sed
 etiam Antiphane & Theodoro Si-
Scalig. in nopenſi apud Athenæum, vilis apud
Leſt. eos piscis fuerit ; tum quod eum in
Auſon. l. 2. Garumna non inuenias , quod &
c. 1. Scaliger monuit. *Γαλαζίαν* seu *γαλε-*
Galen. de *ξίαν* vocari Galeno crederem , nisi
Alim. fa- eandem in Græciæ mari, in quo Stur-
cult. l. 3. riones dantur nasci, negaret. Acipen-
 serem esse, qui ab Elope & An-
 thia distinguitur, Rondeletius eru-
 dite ostendere conatur, quem sequi-
 tur Iunius: obſtare eius ſententiæ vi-
 detur, quod rarus inventu, & unus
 omnium squamus ad os verſis contra
 aquam nando meare, apud Plinium
Plin. H. N. dicatur, & id Nigidius Figulus, refe-
l. 9. c. 17. rente apud Macrobiū Sammonico
Macrob. Sereno, confirmet. Aldrovandus
Satur. l. 2. Sturionem Acipenserem Romanis
c. 12. cum recens & in Italia captus eſſet
 vocatum fuiſſe; Silurum Græco no-
 mine cum ex peregrinis Græciæ in-
 primis oris allatus, opinatur. *Deſcri-*
ptionem eius Paulus Iovius hanc de-
 dit. *Corpore* eſt tereti oblongoque,
 inter rotundos & planos ambigente,
 ut qui ſubtus quodammodo planus
 ſit, dorſo verò ſemirotundo. *Caput*
 quadratum eſt, & ad effigiem parvæ
 pyramidis protenſum. *Oſilli* eſt ſine
 maxillis, ſine dentibus, diverſum
 penitus ab reliquorum piſcium for-
 ma, idque ſub mento in ipſa prope
 iugilum parte, ad ſimilitudinem fi-
 ſtulæ arundinacæ rotundum, ſem-
 perque patens, & cartilagineum &
 ſummæ candidum; cuius hiatum in
 procerioribus haſta brachij haud fa-
 cile implet: cæterum totum caput
 dura potius & calloſa cartilagine
 quam certis oſſibus conſtat, quod ex
 lento quodam & præpingui mucore
 concretum eſſe videtur. *Naribus* o-
 mnino quæ illi prætenues ſunt ſupra
 roſtrum, refrigeratur. Sunt autem
 branchiæ utrimque quaternæ oſſeo
 operimento, non ſecus quam ſqua-
 moſis piſcibus contactæ. *Oculos* ha-
 bet parvos. Ex roſtro gemina barba,
 ut in Mullo dependet. Toto dorſo
 craſſiores quædam ſquamę oſſea du-

ritie certo numero ordineq; diſtin-
 ctæ, intercurrente ſpinæ acie, ad e-
 legantiam eminent, ut in magnificē-
 tioribus valvis hodie videmus, quas
 ferrei atque inaurati clavi certa ſerie
 confixi decentiſſimè figurant. Cæte-
 ræ corporis partes cuticulari & ſca-
 bro admodum operimento potius
 quam perpetuis ſquamis integuntur,
 idque ad ſubviridis attrique coloris
 ſpeciem. *Venter* cute levi & argentea
 tegitur. *Linguam* habet craſſam &
 duram, *gulam* unde quaque rugoſam.
Pinnæ ſunt ad branchias duæ & toti-
 dem in ventre ad podicem : præter
 quas in dorſo prope caudam alia u-
 nica erigitur, e cuius fere regione i-
 mo ventri alia etiam una ſubnecti-
 tur. *Cauda* vero in duas pinnas dege-
 nerat, quarum ſuperior craſſior atq;
 duplo longior extat. *Ventriculus* eſt
 carnoſus ſoliduſque atque pertinaci-
 ter inhereſcens tergori, ut niſi diſciſ-
 ſus divelli inde poſſit. *Oeſophagus* in
 rugas contractus. *Hepar*, in duos lo-
 bos oblongos pallidi coloris dividi-
 tur, quorum dextro veſica fellis va-
 lidiſſime connectitur. *Lien* ſubruber:
intestina craſſa, & ternis gyris convo-
 luta. Magnis piſcibus annumerari
 debet, cum crebro & plerisque in
 locis centum librarum, & alibi lon-
 ge maior capiatur. Ego aliquando
 Ferrariæ Sturionem mercatus ſum
 centum & quadraginta librarum,
 donavique Illuſtriſſimo pariter ac
 Reverendiſſimo Ioan. Baptiſtæ Că-
 pegio Epſcopo Majoricenſi Domi-
 no meo nunquam ſatis celebrando,
 qui paucis ante diebus ut labores
 meos promoveret, mille aureos do-
 naverat. † Quantum ad *Differentias*
 refert Bellonius, Ponticorum, A-
 driaticorum, Gallicorum, & Ger-
 manicorum inter ſe eſſe differentiã,
 quæ magnitudine, craſſitie, cutisque
 aſperitate, & ſubnigro, ſubſtavo, aut
 argenteo colore diſtingui poſſit: Se-
 quanicum & Ligerinum adultum
 interdum tres orgyas excedere, Ga-
 leum piſcem pinnis & forma referē-
 tem, exili corpore, hirta ſurſum pel-
 le, deorſum plana ac levi: apud Fer-
 rarienſes, & Bononienſes argenteo
 colore

† *Hæftenus*
Iovius.

colore fulgentem, dorsum, & latera tribus veluti carinis distincta ostendere. Scaliger quoque tria Sturionum genera, in Occa Sarmatiae fluvio tradi scribit, & pretiosissimum illum, qui Bialarybitza vocatur ponit: sed Herbersteinus Bialarybitzam à Sturionibus distinguit. *Locum* si attendas, In Ponté, & circa Mæotidem plaudem frequentissimus est, inde ova in molem coacta, salita, & cadis conclusa, per Turciam & Italiam distrahuntur. Tyrreno & Adriatico mari si Bellonio fides, raro videtur.

Maiores tamen in fluminibus, quæ non nisi quinque aut sex dierum itinere subintrat, quam Oceano, Tyberim si excipias, in quo parvi capiuntur. In Albi (hunc circa Penteosten gregatim, auctore Kentmanno ingrediuntur) capti, ducentas interdum libras singulas sedecim unciarum appendunt. Captus tempore Iohannis Friderici Electoris sexaginta supra ducentas librarum pondere, quem totidem florenis Princeps redemit. In Ligeri quoque & Rheno delicatior. In Tanai, Danubio, Rheno, Tibisco, Vistula, Garumna frequenter capitur. *Cibus* Sturioni non pisces & conchylia, edentulus enim, sed sordes & mucus, quidam sed perperam aëris tranquillitatem ei ad cibum sufficere crediderunt.

Dum escam quærit, suis more terram sub aquis fodere Isidorus prodidit. Cum branchiis omnino latet careat, naribus refrigeratur, & si quam hauriendo recipit aquam, eandem prono ore statim regerit. De eiusdem Robore, ex relatione Kentmanni ita Gesnerus. Sturio in aqua validissimus piscis est: & in terra quoque cum ventri innititur. Cauda concussa hominem ut cunque robustum prosternit, ubicunque contigerit, perticas etiam magnas & ligna per medium frangit. In terram extractus, lapides aliquando tantavi cauda ferit, ut ignis exiliat, attritum nimirum ossiculorū, quibus toto corpore mucronatus horret. Quā-

obrem cautè tractandus est à piscatoribus, ne vel crura eis confringat, vel retia disrumpat. Peritiores in aqua captum reti ad ripam impellunt, ita ut rete, non adversum, sed ad latuseis sit: secus enim rete vel sextuplex laniaret. Cum ripam attingere, caput eius omni contentione in altum levant, & piscem totum in latus declinant: sic enim robore suo nocere non potest. Videtur cum Salmonis Amicitiam colere. Ducem enim istorum pisces vocant. Zigam è mari pulsam, per flumina persequitur, sed frustra. Agilis enim hic & velox prævenit. Tanti olim in cibis apud Romanos, Traiani tempore, † si excipias, æstimij, ut cum tibiis, † Macrob. † & coronis in cœnis circumferretur, & Gallonij mensa, teste Horatio, eo famosa fuerit. Mares tamen scæminis præstant, hæ ovis plenæ probantur, Poggius Doctoris Poggij filius caput commendavit. *Caro* duriuscula est, præpinguis, viscosa, & ægrè concoquitur. *Hepar* adeo dulce, prodente Alberto, ut nauseam nisi felle tingatur, pariat. Græci sale inveteratos tribus nominibus insigniunt. *Rachis* ipsis dorsi portio pleura, costæ & latera; *hypocelium* alvus cum pube. Caviario, quod ex ovis paratur, Græci & Turcæ vescuntur. Iulio II. Pontifici mirifice idè placuit. Paratur & ex Cyprinorum ovis in Iudæorum gratiam. *De usu in Medicina* nil occurrit. Quæ enim de Siluro Plinius, huic vix competunt.

CAPUT VIII.

De Galeo Rhodio.

DE Galeo Rhodio ita scribit *Al. Tab. XXIV. 1. Aldrov. de Piscib. l. 4. c. 10.* *drovandus.* Rondeletius hunc piscem, cuius modo icon exprimitur, Galeum Rhodium esse eruditissime ostendit, propter maximam nimirum cum Acipensere sive Sturione similitudinem, non solum quoad corporis speciem & partes, verum etiam quoad gustum, & saporem, dempta, inquit, unica differentia,

P.

quæ

quæ non nisi ab ijs potest percipi, qui citra ingurgitationem huius cibum sumpserint, quique exquisito gustatu fuerint: ferinum enim quid resistit, quod tamen etiam non nisi paucissimum esse potest: nam Archestratus, qui in nullis non terrarum Orbis angulis gulæ cupedias diligentissime perquisivit, id observasse in eo non videtur, quandoquidem Acipenser plane eundem esse credebat, ut Athenæus tradit, qui illius sententiam refellit. Athenæi verba non solum Acipenseris à Galeo Rhodio discrimen indicant, sed verum Galeum Rhodium hic depingi comprobant: Archestratus, inquit, qui Sardanapali vitam vixit, de Galeo Rhodio scribens, eundem esse opinatur cum eo, qui apud Romanos cum tibiis & coronis in cœnis circumferebatur, coronatis etiam ijs, qui gestarent, vocantque Acipenserem. At hic quidem Acipenser parvus est, & porrectiore rostro, & figura triangulari magis quam ille. Et paulo post, Archestratus de Rhodiensi Galeo loquens, amicis patrio more consulens, ait: Galeum in Rhodio quem Vulpem vocant, si tibi vendere noluerint, vel mortis periculo rape. Nominant illum Syracusani *κυά πλω-
να*, id est, canem pinguem. Hæc ille. Quod si Galeum Rhodium cum Sturione seu Acipensere contuleris, nullum planè comperies, (inquit Rondeletius) qui ei similior sit eo quem proponimus; his exceptis quod Sturio est longior rostro & corporis figura magis triangulari. Nam alioqui Sturionem totius corporis figura, tergi ossibus acutis, & clypeorum modo efformatis, aliis item in lateribus dispositis, pinnis, cauda, ore in supina parte sito, omnino refert. Is quemadmodum Sturiones, relicto mari, amnes subit. Reperitur enim in Pado, & Rhodano, & pro Sturione venditur; nec ab eo distinguitur, nisi ab exercitatissimis & exquisitigustatus hominibus. Hanc differentiam docuit ipsum Guilielmus Pelicerius Monspelienfis Episco-

pus, vir singulari doctrina præditus: tum ex capite crassiore, & rostro breviori, obtusiorique; tum ex gustu Galeum Rhodium sive Vulpem deprehendi. Ferinum quid recipit, quod de Sturione dici non potest, carneque est durior: à quo sapore Galei & Vulpis nomen habet, Galei enim & Vulpes ex Galeorum genere ferini sunt saporis & ingrati. Si tamen in dulci aqua diu nataverit, in cibis haud aspernandus est. A nonnullis eodem Rondeletio teste *Cops* vocatur, eoque nomine designatum atque optimè figura expressum ad ipsum Ferraria misit doctissimus medicus Antonius Musa Brasavolus. Alij nominis affinitate decepti *Copso* appellant. Est enim id nomen alterius piscis.

CAPUT IX.

De Cataphracto.

Pisci huic Schonveldius nomen TAB. XXIV. 2. imposuit, sicque eum descripsit. Schonveld. Ichtyol. p. 31. Est palmorum duorum longitudinis ad limum, Capitis fere triangularis, depressi, angulosi, ac lati pollices vel digitos duos, cuius duo latera tuberculis plerisque horrent in ambitu, anteriora quæ os spectant cirrhus multos tenuissimos alunt; posteriora aculei, retrorsum spectantibus minacia sunt. *Rostrum* habet resinum, quatuor apiculis munitum, quorum duo anteriores instar Lunæ cornutæ vel semicirculise rotundant, reliqui post hos suis aculeis retro conversis conspicui sunt. *Os* in supina parte semicirculare habet, parvum, ad incisuram eius utrinque binis, sub mento pluribus tenuibus cirrhis barbatum.

Truncus proxime caput depressior, octagonus est, prope caudam sexagonus, prona parte fuscus, nigris lituris intersparsis, circa ventrem plenum, in cuiusque medio *podex* est, albicat. Totus *squamis* ossis contextus est, in quarum medio

tumore





Eperlanus.

Schmelt. Rolelein.









Galeus Rhodius.

Tab. XXIII.

ein art der Sör.




Lampret.
kein aug



Huso


Hausen.



2


Huso seu.

Antacæus stellaris.



3


Alius Huso. Hausen. ander art.



Antacæus Rond.

Ein ander art Hausen. Rond.


4



Orbis


Scutatus Rondel.
Schnottolff.

5




Ostracion prior Aldrou.
Schalfisch.

6



Schnottolff.




Ostracion alter Aldr.

7

Ostracion


Americæ

9



Holostein Bell. Ostracion Nilj.

8



tumor durus, reduncus, erigitur, qui in omnibus continuatus corpus angulatum efficit, quod versus caudam valde gracilefcit. *Pinnas* circa branchias habet latiusculas duas, sub ventre totidem, sed longe minores, binis fibris constantes. In *dorsò* inter squamarum extantias concavo, duas, contiguas, parvas, omnes nigris lituris pictas. *Cauda* in pinnam subnigram exiguam & rotundam definit.

Dentes nullos habet, sed horum locolabia aspera, & in faucibus officula aliorum in morem hirta. Frequenter circa Nortslandiam insulam Oceani Slesvicensi Ducatui subiectam frequenter & per totum annum, in ostio Albis & Ederæ sæpe capitur. Incolæ Steinbicker, Muller, & Bursbul vocant.

Vicinat squillis & aliis pisciculis. Habetur ob carnis dulcedinem in deliciis.



TITULUS II.

De *Lævibus*.

CAPUT I.

De *Hufone*.

ACTENUS de πόδαμοδα-
λασσίους piscibus squam-
mosis egimus, sequuntur
non squamati seu *Læves*
Huso nempe, *Eperlanus*, *Lampetra*, *Anguilla*, *Orbis* & *Holosteus* Bellonii, *Hufonem*, quem à domo quasi Hauso, Germanis dici Bellonius opinatur. Plinius fortè *Marionem*, quem Danubio Porculo marino similem extrahi dicit, vocat; quidam *Efocem*, appellarunt. *Æliano* ni fallor est Antaceus, Germanicus. Magnitudinis est viginti quatuor pedum, & tantæ, ut vix biga à tribus vel quatuor equis trahi possit. *Vadianus* magnitudinis pondo quadrin-

gentorum minimos quinquaginta, frequenter centum, ducenta, trecenta, vidit.

Dorsum habet asperum. Nullum os in capite, si Alberto fides, si aliis multa, in corpore parva & pauca, cartilaginea potius, quam solida. *Loco spina dorsì* cartilago est, quæ foramen habet magnum & vacuum, à capite ad caudam tanquam terebello perforatum. Adipem pinguedini immixtum sicut porcus. Similia de suo Antacæo *Ælianus*. Cum ætate processerunt, ad maximi Thunni magnitudinem, in Istro accedere scribit, & tam pingui abdomine esse, ut eorum ventrem lactentis suos fœtus scrophæ ubera dicas, sicque aspero corio tegi, ut eo perpoliantur hastæ. Addit item capitis medio à medulla ad caudam mollem & strictam membranam pertinere, ex qua ad assum solem exficcata, flagella ad concitanda iumenta efficere possis. E Ponto Danubium subit, & per centum quinquaginta millaria Germanica, aduersus suavibusque undis progreditur.

De eius captura, ita quidam ad *Gefnerum* mercator. Mitto tibi, inquit, *Hufonis* piscis effigiem vivam. Is in Danubio, nec ubique nec tempore quovis capitur, sed quando migrat. Terra argillosa & pingui gaudet. *Capitur* fere ab autumno usque ad Ianuarium, spacium decem milliarium inter Viennam & Posonium, Presburgum vulgo vocant: ubi ad insulam Schutam nomine, cum arce minutissima, ultimus huius piscis capturæ locus est.

Viennæ die Veneris plerumque quinquaginta vel septuaginta, & aliquando centum *Hufones*, veniunt, qui integri fere distrahuntur. Copiosissima eorum captura fit in Vualachia iuxta Chiliam non procul ab ostiis Danubij, quibus in mare Ponticum se exonerat. Inde salsi exportantur in remotas regiones.

Vadianus mensibus Octobri &
P 2 Decem-

Decembri captos Viennæ invehit scribit. Timidius est, & à minimo etiam piscicula in fugam vertitur. Sturio se ei perlusum affricare solet, in latebras profugum eijcit, & ventrem lancinat, dumque unus fugit, alter persequitur, aquarum agitatione se produnt, & capiuntur. Caprus lacte vel vino potatur, nō ut diutius vivat, nec citius inebriatur, quā sextarios quatuor ebiberit.

Gregatim natant, & tubarum cantum sequuntur, ad eum postquam accessere, irretiuntur. In aqua tanto robore pollent, ut piscatorem cauda ictum ē navi deliciant, elato ex aqua capite, mortuis similem apparent. De Antacæorum captura, vide Ælium.

Quantum ad *usum in cibis*, vitulinæ in dorso, porcinae in ventre saporem habet, magna pars falsamentis cedit, lactibus nihil dicunt delicatius, sed & ova in cibum expetuntur.

CAPUT II.

De Eperlano.

TAB.
XXIV. 3.
Aldrov. de
Piscib. l. 4.
c. 12.

IN fluviorum in Oceanum, (verba sunt Aldrovandi) in fluentium ostiis, ut Rhotomagi & Antwerpia frequens est piscis, teste Rondeletio qui *Eperlan* (quam vocem vulgarem secutus Eperlanum ceu latinum nomen fecit) dicitur, à nitido & splendido (inquit) colore, quo unionem (perlam) refert.

Cæterum si à perla ipsi nomen est, verendum est appellari een, peerl; nam Eperlan Belgi, cum vocabulum non est: & Bellonius Eperlanum nuncupat. Ait tamen etiam, Atherinæ modo transperere. Hic Anglis *Schmelt* vocari scribit ab odore (violam enim gratissime redollet, quamobrem quidam *violam* vocari posse censent, argumento quod Ælianus ab odore thymi Thymallum piscem nominavit,) vel à pinguedine. Gelnerus priorem etymo-

logiam probat, quoniam Smelle Anglis sit odorari.

Smel tamen apud Belgas est liquescit, & proprie de pinguedine dicitur, à quibus Angli fortè nomen mutuaverint. Uterque *duo eius genera* esse scribit, *marinum* unum, *fluviale* alterum. Sed Rondeletius marinum litorale esse, Bellonius saxatile dicit.

Rursus Rondeletius Eperlanum in marinum & fluviale distinguens, figura corporis nihil vel parū differre innuit, ideoque unicam iconem exhibuit: Bellonius contra duas, admodum diversas; quare suspicari licet fluviale Rondeletii à marino non differre. Bellonius marinum item, partim marina, partim fluvialia aqua gaudere tradit, & Rondeletius quoque ex mari ad fluvios ascendere insinuat, dum in Sequanæ ostiis optimum esse scribit, & in Angliæ fluviis.

Apud Neustricos Caudebecanos Angliæ populos uberrimus est, maior tamen proventus circa yndemias, quo tempore est delicatissimus. Tereti ac tenui est corporis compage, nonnunquam dimidium pedem æquante. Rondeletius ad pedis magnitudinem aliquando accedere innuit.

Asinos parvos refert, unde ex eorum genere esse iudicarunt, quos refellit Bellonius, propterea quod glabro sit corpore. *Oris* hiatus satis magnus est.

Dentes habet in maxillis, & in lingua. Truttam præter cætera dentibus refert. *Lingua*, ut ait Bellonius quasi gemina, hoc est, (inquit) in cuius radice posterior quædam appareat, in qua multo plures dentes sunt, quam in anteriore. *Pinnas* habet easdem quas Salmonum genus, maxime posteriorem illam dorsipinnam subrorundam & pinguem. Prior totum piscem in æquales fere partes dividit. *Cauda* bifurca est. *Branchie* sunt utrimque quaternæ, decolores, & *violam olentes*.

Transparenti est corpore, depra lineam ni-

neanigra quæ spinæ internæ parti in-
hæret. *Calculos* habet in capite rotun-
dos, albos, quosque facili forinsecus
propter piscis transparentiam per
cranium videri posse Bellonius tra-
dit (qui diligentissime de internis E-
perlani partibus egit) sub posteriori
cerebri partesitos, ubi medulla in
cerebro definit. *Cor* branchiis se-
micircularibus & fimbriatis est ad-
modum vicinum ac scutiforme: de-
finit quoque in angulos, rubrumque
est, cui molles ac sanguineæ sunt car-
nunculae, quæ huic tanquam aures
in terrestribus famulantur. Illæ e-
nim moventur cum corde, quod
septo ab hepate dirimitur: unius
tantum lobi, in longum demissi ad
secundum latus. *Stomachum* desinen-
tem in mucronem habet in V. lite-
ram efformatum: *Lienem* admodum
rubrum, seminis *Attriplicis* in modum
laticum.

Cumque stomachi dextrum la-
tus sursum usque ad hepar reflectit,
illic geniculo intercipitur: ubi *apo-
physes* duas latas emittit, quæ veluti
secundum ventrem constituuntur.
Aliud post hunc subsequitur, quod
nec pylorum nec jejunum, neque
ileon commode nominare possis; si
quidem sine anfractibus recta ad a-
num procedit. Sed rectum geni-
culo intercipitur, estque ruberrim-
um. *Mesenterio* nullam admixtam
pinguedinem habet; quo stomach-
us & intestina obsidentur, ut ni-
hil aliud in ventre, quam adipem esse
dixeris.

Caridibus, culicibus, Aphyis, æ-
stro, lendibus, mille pedibus, pedicu-
lis & eiusmodi deiectionis *vesti-
tur*. Carne est molli & friabili. *Æ-
statis* sine vel autumnii initio ca-
pitur.

CAPUT. III.

De Lampetra.

TAB. XXIV. **L**ampetra, non tam à lambendis
petris, quam ab *Alabeta* Plinii.
5. 6.

Nilidis lacus piscis, qui *ἀλαεῖς*, quod *Aldrov. de
Piscib. c. 13
Plin. H. N.
l. 9. c. 17.* manu propter lubricitatem capi non
possit, dicitur, vocatur. Doctiores
Plinii & Ausonii Mustelam esse opi-
nantur, nec tamen vel ex *marinis
Æliani* quas jecorino simillimas
esse pupillis oculorum ad cyaneum
colorem accedentibus, mento quam
jecorini maiori, quam Chremetis
minore, algas depascere, saxatiles
esse, & omnium cadaverum in quæ
incurrit oculos conficere, idem au-
thor scribit; vex *Mustelis*, qui Ari-
stoteli cæterisque *ῥαλεῖς*, qui flumina
nunquam subeunt, & vivipari sunt,
esse iudico. Sed nec ex *Muranarum*
genere esse credo, quamvis Dorioni
apud Athenæum Muræna fluviali-
shaud ineptè dicatur, quod illæ
Branchiis integris careant, quas
Lampetræ velut cartilaginem obti-
nent.

Lumbricum marinum Plinii non ef-
se, exinde quod pinnis omnino ca-
reant, colliges. At ex *Vermibus aqua-
ticis* eiusdem esse, quos in Gange
Indiæ Statius Sebosus, haud immo-
dico miraculo attulit, branchiis bi-
nis, sexaginta cubitorum, cæruleos,
qui nomen à facie traxerunt, eis-
que tantas vires, ut elephantos ad
potum venientes, mordicus com-
prehensa manu eorum distrahant,
Rondeletius credidit.

Idem ex *βελιδιάς* seu Hirudinibus
Strabonis, quas in quodam Lybiæ *Strabo
Geogr. l. 17* fluvio septenum cubitorum perfo-
ratis branchiis, ita ut respirare pos-
sent nasci scribit, quod sanguifuga-
rum instar saxi & navium clavis
hæreant, opinatur. *Tineas fontanas*,
de quibus apud Plinium, quod Her-
molao placet, non esse, certum,
quia illæ ex insectis. *Flutam seu Plo-
tam* quod quoque Rondeletio vi-
sum, dici posse, quod nisi in sum-
ma aqua natet, ut aerem attrahat,
facile suffocetur, concedimus. An
Anguilla copæa sit, cuius Archestra-
tus apud Athenæum meminit, du-
bito. *Athen. Di-
pnos. l. 7.*

Quamvis enim sit ex ossis seu
ἀνίγνυς, quod Anguilla vulgari non
competit: in eo tamen, quod An-
guillas

guillas Copaidas Agatharchides prodigiosæ magnitudinis esse scribit, diversa à Lampetra esse videtur. Echeneida Oppiani esse, Rondeletius censuit, nec abhorret ab ea Echeneidis descriptio, quam apud Oppianum vide. Bellonius quoque nautis præcipuè infestam esse ait, temonibus triduum fere inhærendo, caudamque in contrarium vertendo, recensque picatæ navis lateribus picem lambendo sic infigi, ut nautas ab itinere remoretur.

De *Generibus* ut dicam, non unum Lampetræ genus est. Sunt quæ è mari flumina subeunt, sunt quæ à falsis aquis omninò abstinent.

Marinarum triplex genus est, maius, medium Germanis & Belgis Prick dictum, & minus à Salviano depictum, qui, licet ætatis ratione tantum differre quispiam suspicari possit, quoniam colore tantum & magnitudine à maiori differt, differre tamen, & specie ostendit, cum maiores semper & maculosæ & bicubitales; minores contra sine maculis & pedales tantum repariantur: Prick vero cubitalem magnitudinem haud superet, transversalibusque & nigricantibus lineis solum insigniatur.

Rursus ipsi maiores haud ubique æquè magni. Testatur enim Iovius in Arno & Tyberi ad generosum habitum adolescere: in omnibus autem Galliæ Cisalpinæ rivulis, ipsisque præteritum Ticini atque Adudæ emissariis multas reperiri pretiosas admodum, quanquam minimi digiti crassitudinem minimè superent.

Et Platina in Cisalpina (Gallia) parvas, in Hetruria mediocres, Romæ ex Tyberi permagnas capit: nisi dicamus, haud rectè ab his scriptoribus isthæc observata esse. Omnibus sive marinæ sint sive fluviatiles, commune est, Ceteorum more *fistulam in cervice habere*, per quam cum navibus aut saxis hærent, aquam ad branchias attrahunt. *Spina* item omnibus cartilaginea à capite ad caudam usque de-

ducta, chordam Galli vocant, quæ vere tenerior, ætate durior est, & insuavior.

Branchiarum numero, figura & ordine conveniunt, ore item & *pinnis* & totius corporis figura. Murænis valde similes sunt, si caput excipias. Os enim neque in longum neque in latum scissum est, sed excavatum velut in hirudinibus quas sanguisugas vocant. Gesnerus ab eo loculorum instar, qui ad servandos nummos loro contracti clauduntur, contracto lignum aut lapidem ita apprehendere ait, ut sugere videatur, idque tanta vi, ut ægrè avellatur, cucurbitularum medicinalium similitudine. Marginem item oris rotundum fibris quibusdam laciniosum esse, quæ nimirum ut firmius hæreat, fugatque efficiunt. In cavo illo sparsi sunt *dentes*, plurimi flavi, acuti, hamati, quorum interiores maiores esse idem Gesnerus observavit, eosque circiter viginti ordinibus distinguere; & tanquam à centro ad circumferentiam digeri, ordinibusque singulis quaternos, quinos, senosve inesse. Esse & in ipso oris recessu duplicem *dentium* minorum ordinem, quorum maior, inquit, omnino feram denticulis utrimque denis refert, eos denticulos continuos esse, cæteros cutim habere interiectam. In eiusdem cavi imo teste Rondeletio particula est contraria occursum foramen interius occludens. *Cor* habent sub branchiis & foraminibus reconditum, cartilaginea membrana, spongiosa ac prætumida inclusum, subrotundum, cicetis crassitie: *hepar* oblongum, cæruleum, unius tantum lobi. *Felle* carent. *Intestinum* omnibus unicum, rectum, minimè complicatum; reliquum corporis in scæminis matrix ovis referta occupat. Pinnis lateribus carent; nullasque ad natandum habent, sed flexuoso corporis impulsu aguntur, & *pinnulis* membranaceis iter dirigunt, quarum una ferè supra caudæ extremum erigitur, altera paulo superior est. Lævi cutē reguntur, quæ in maiori nigricat prone, supine candicat, ad la-

ad latera, & in dorso subluteis ac nigricantibus maculis conspergitur, quibus minor caret. Gesnerus maiori maculam ait esse albicantem in vertice, in medio oculorum interstitio; & contiguum ei anterius foramen parvum membrana parum prominente circumdatum. *Prickæ* cum maiori colore convenit, sed pro maculis quales diximus, transversales habet lineas. Omnes utroque gutturis latere *septem foramina* habent, quibus aquam acceptam reddunt. *Platina linguam* Lampetris tribuit, *Rondeletius* habere negat. *Salvianus* & *Bellonius* non meminerunt. *Oculos* rotundos & profundos habent. In maiori cæruleam pupillam aureus circumambit circulus.

De *Lampetrarum migratione* & hoc habe, Veris initio migrare, & circa *Donati* diem, qui est decimus septimus Februarii, nullas amplius apparere, sed aut recedere, aut corpore reliquo tabescente, licet capitis moles relinquatur, interire.

Initio Maii optimas, ab eo tempore irrequieto motu emaciari, & plerasque ante partum mori, parientium sobolem evanescere, nec unquam circa *Argentinam* apparere, adultas, quæ non pereunt, cum fluvio aqua secunda, Maio mense auferri, *Argentinensium piscatorum* relatio est. In mari & fluminibus parvas parere, eoque tempore quo in fluminibus capiuntur, in mari etiam capi, reliquisque anni temporibus vel in abditis locis latere, vel à littoribus in altum pelagus longè secedere; maiores in fluminibus rariores esse, *Salvianus* author est. *Vesuntur* aqua & musco. Quidam esca quadam composita in fontibus & aquis dulcibus eas nutriunt, & servant. Spumarum indiciis comperiri solent: captæque perpetuò in aqua immergi, cum qua ex longinquis partibus in urbes deferuntur.

Vsum in Cibis quod spectat, *Albertus* dulcem & insalubrem vinoque condiendum, *Alexan. Be-*

nedictus optimi succi, facit. *Salernitani* crassum & viscosum, minus tamen *Anguilla*, & quia veneni aliquid habent, in vino submergendas donec moriantur, posuere. *Romæ* olim proximam à *Scaris* quibus principatus debebatur habuere mensam. *Scribit Platina Romæ aule fastis offensus*, bene à natura factum esse, quod *Romæ* ex *Tyberi* permagnæ capiantur, & delicatissimæ, quoniam vallatæ ibi gulæ inter se auctis pretiis certant. *Emi* (inquit) frequenter *Lampetras* quinque sex, septem aureis, & olim à laticlavio viginti, cum alter secum auctionaretur, emptam scimus: nec passa est ingenua gula tantam audaciam gratuitam esse. Dispensato enim, quod sui ipsius arrogantiam & fastum (nolo dicere stultitiam) imitatus esset, centum aureos dono dedit, ne secundo ad certamen singulare provocatus, timidus ac infractus animo succumberet.

Cæterum non quovis anni tempore, nec quovis loco tanti fiunt. *Scribit enim Iovius Romanis*, id est, *Tyberinis præcipuam nobilitatem à magnitudine & sapore esse adeò ut denis sæpè aureis veniant*, ipso præsertim vere: & recte quidem, quoniam incipiente æstate, spinalis medulla iis nervi instar durior efficitur; & marinæ, hoc est, quæ in mari capiuntur, aridæ semper ac velut agrestes judicantur. *Iovius* delicatiore condimento, multo maiorem quam ab ipsis pulpis nobilitatem accipere scribit. *Necari* enim solere in vino *Cretico*, eiq; *myristica* nuce os claudi, & foramina illa (branchiarum utrimq; septem) totidem *caryophyllis* adimpleri in reganoq; convoluta in spiras, additis *avellanistris*, medulla panis, oleo, vino *Cretico*, aromatibusq; ad temperatiores prunas certis momentis sedulo excoqui, quo condimento, inquit *Leo x.* in minori fortuna, joci causa, ut convivium exhilararet, *Marianum cucullatum*, salsum, & ridiculum hominem decepit.

Namque

Namque funem instar Lampetræ incoctum, multoque illo jurulento immersum, grandi in patina appositum, ut notam omnibus eius edacitatem, gulamque eluderet: qui jam magna pultarii parte absumpta pseudo-lam petram aggressus, diu multumque cum ea maxillis ac dentibus inhærente colluctatus, cachinnum cunctis tollentibus, facetissime respondit: utinam sic mihi sæpius illudatis. Nam in hoc condimento non modo funes, sed & ipsas catenas (quibus insani vobis similes vinciuntur) & cum voluptate quidem absumerem.

CAPUT IV.

De Anguilla.

TAB.
XXIV.
7.8.
Aldrovand.
de Piscibus
l.4. c.14.

QVem piscem Latini Anguillam ab anguis similitudine dicunt, illa Græcis veteribus ἰχθύς, ὅτι τῆς ἰσχύος, quod commoto cœno felicius capiatur, modernis ἀχέλυς, vocatur. Lacedæmoniis ἀγκυλάτις dictas, apud Hesychium legimus. Est ex piscibus κατὰ δέξιμους, qui in aquis dulcibus geniti, ad mare descendunt.

Duo ipsarum sunt genera, Maius & Minus. Illi caput brevius, crassius & latius, color fuscus: in profundo degit, & aqua deficiente sæpe in limo, ut inde effodiatur, occultat. Ad mare nunquam descendere, sed semper in vallibus degere, quidam affirmant. Mares Rondeletius vocat. Huic, quod Anguilla simpliciter dicitur, caput longius & acutius, & in mare descendit. Læves sunt in universum & lubricæ, ut manu teneri non possint, si inclusæ tenentur, quacunque caudam exerere possunt. eadem totæ evadunt. Aristoteles eis quaternas utrinque branchias, sed simplices tribuit.

Alias quoque branchias pauciores minusque continentes habere scripsit. Athenæus verò ex Theophrasto exiguas. Cuticulæ quahæ

teguntur, Parvula inest rima, quæ causa est, quod in turbidis aquis facile strangulentur, & in aere diutius vivant. Teste eodem Aristotele gulam quæ paucis piscibus contigit, habent, licet exiguam, ventreque sunt exiguo. Feljecori hæret. Hoc magnum est, illud aqueum. Pingue inest paucis, plurimæ eo carent. Hippocrates tamen pinguedinem habere scribit, eandemque naturæ hominis inimicam: cæterum hæc pinguedo à carne separata non est: quare alias dicebat Philosophus: seorsum enim à carne non pinguescunt: unde parvum eis in omento sebum esse solet. Tergus earum quam Murænis crassius teste Plinio: cuius locum de pinnis huius piscis, ubi lumbricis pro lubricis legebatur, restitui in Lampetra ex Aristotele, qui longorum vel lævium alios ut Anguillam & Congrum binas pinnas, alios ut Murænam nullas habere scribit. Has juxta branchias hære idem asserit, supinisque pinnis carere. A medio dorso & ab excrementi meatu veluti limbus cutis potius, quam pinnarum substantia superiores corporis partes ambit.

Ventriculus & intestina in longum protenduntur. Color omnibus haud idem. Variat enim aquarum in quibus degunt, ratione. Quæ puram & defluentem incolunt, ventre (inquit Salvianus) sunt candido, dorsoque cinereo sive subcæruleo: quæ vero in impura & stagnante commorantur, ventre sub albo, dorso vero subviridi vel subnigro apparent: Os habent satis apertum, dentibus, parvis, acutis minutim, multiplici ordine. Magnitudo quoque non ubique eadem. Plinio atque Solino testibus in Gange ad tricenos pedes l.9. c.3. augmentur: & Athenæi Pausaniæque testimonio Copaidæ, item Strymoniae eximie magnitudinis esse dicuntur. Archestratus Copaidas apyrenos quasi spinas & ossibus carentes vocat: Gesnerus & Dalechampius Lampetras intelligi volunt: quoniam hæc pro spinis cartilagineam

Aristot. H.
A. l.1. c.5.

Plin. H.N.
l.9. c.3.
Athen. Di-
pnos. l.7.

ginem habent. *Magnas* vel ad brachii crassitudinem capi audio in aqua mortua (ut appellant) Galliae Narbonensis. In Italia ad viginti libras aliquando accrescunt; sed quæ superant, nunquam inventæ sunt.

Locum, si spectes Marinarum quoque Diphilus & Epicharmus apud Athenæum meminere, non quod ibi nascantur, cum pauca & nondum adultæ nunquam, magnæ & adultæ raro ibi reperiantur; sed quod, ut Plinius, Aristoteles & Oppianus firman, maria ex fluminibus subeant. In nullo amni qui Danubium influunt, reperiri in omnibus, qui Rhenum, licet ex uno aliquando cum illis fontescantur, Naclerus & Albertus prodidere. Frigiditas Danubii fortè in causa, cuius aquæ ante fauces Alpium ab Occidente in Orientem fluunt; maior pars ex Alpibus descendit, & à parte Aquilonari, ante Alpes delabitur. Copaidum, quæ ἀπὸ πύθωνος, σπινθίδας, Polux & Aristophanes commendant. Prodigiōsa eadem interdum magnitudinis à Bæotiis hostiarum more coronabantur, aspersaque mola, cum precibus Diis immorabantur. Regiæ, quas Lethus circa Berenicem fluvijs sibi vendicat, sesquialteræ ad illas, quæ ex Macedonia & Copaide lacu habentur. Suus iis & qui in freto Rhegi, & in Mæandro fluvijs capiuntur honos. Strymonis quoque, Elori amnis, & qui ad Euclea fluvijs, in precio fuere. Pars Britanniae Anguillarum terra à copia, quamvis ibi non degant, dicitur. Ad Aquas mortuas brachii crassitudinem æquant. In stagno Monspelienfi Latera dicto, trium vel quatuor cubitorum sunt longitudine. Ex Tarni fluvijs, quoniam non solum auget, sed efficit Garumnas, quæ parte in eum erumpit, tanta copia deferitur, ut una die xvi m. in nassis inventa sint. In Mintio amne quandoque mille glomeratæ capiuntur,

ut apud Cardanum extat. Malè ergo ἐν ταῖς Ἀγγεμέναις λίμναις, in sta-

gnis promanantibus, ut Scaliger vertit, reperiri negat Aristoteles.

De ortu dissentiunt Authores. Plinius, Anguillas atterere se scopulis, ea strigmenta viviscere, nec aliam earum esse procreationem scribit. Secundum Aristotelem, in

diffectis neutrum sexum, nec vel ova vel semen deprehendas; in temporibus siccis, sed post imbres, idque exiis, quæ vocantur γῆς ἐντέρες *terra intestina*: quæ fiunt in cœno & putredine; maritimis quidem locis, quæ algam producant; in stagnis verò & fluvijs propè ripas, quia tepor sive calor istic putredinem gignit. Plinio Athenæus & Oppianus ex veteribus, ex recentioribus Rondeletius adstipulantur. Illi complexas coire, & strigmentitium, quid emittere, ex quo cum in limo fuerit, ἐν τῷ βορβορῶ καὶ τῇ ἵλῳ γενομένης σήψεως, animal generetur, prodiderunt. Hic inferiore ventris parte vulvam in fœminis, semen in maribus esse, multa pinguedine perfusas non apparere, corporum complexu coeuntes à se visas scribit. Utroque id fieri posse modo credo. Nam & Berniciæ in Scotico Oceano ex vermenascuntur, post ova excludunt. Eadem & Rondeletii sententia. Addit enim, cum equus mortuus in stagnum Megalonis injectus fuisset, innumerabiles paulò post ibidem visas Anguillas. *Nutrimētum*

ipsarum sunt, radices herbæ & cuncta quæ in limo offendunt, visæ, ranis, vermibus & piscium partibus vesci. Paxamus hirudines, Homerus cadavera, quidam se ipsas invicem, Plinius edulia si quæ apponuntur, devorare, testantur. Purissimam tamen aquam impensius amant, ideò in quadam Britanniae parte, ut Albertus ex Beda refert, in ortu Cosmico Plejadum hoc est xvii. Calend. Junii, quod tunc propter ventos, qui initio veris è terra erumpant oppositos aqua nunquam luto turbetur, ingens ipsorum copia; & à turbida abhorrent adeò, ut Athenæo teste, cum

Q veri-

Plin. H. N. l. 9. c. 61. Aristot. H. A. l. 6. c. 15. edit. Scalig.

Athen. Dipnos. l. 7. Oppian. Halieut. l. 1. v. 156.

Aristot. H. A. l. 8. c. 2.

Athen. Dipnos. l. 7. Aristot. H. A. l. 6. c. 14. Aldrov. de pisc. l. 4. c. 14.

Athen. Dipnos. l. 7.

Scalig. ad Arist. H. A. l. 6. c. 15.

Aristot.
H.A.I. 8.
c. 2.
Plin. H.N. nius.
l. 9. c. 21.

ventris turbatur suffocari, & quidem propter exiguas branchias, soleant. In exiguis aquis mori dixit Aristoteles, hyemem malè ferre, Plin.

De reliqua ipsarum natura hæc habe. Noctupasci, interdum limo quiescere, ideo separatim ab aliis degere piscibus; exanimis piscium more non superfuitare, ut apud Plinium legimus, quod ventre sint exiguo, pingue paucis insit, plurimæ eo careant, ut Aristoteles tradidit, aqua tranquilla efflare, id bullarum indicio colligi eodem genere motus, quo serpentes in terra, id est celerimè, moveri, ita ut dum Phalacrocorax integras devoravit, mox per intestina delabantur, idque vel novies aliquando fiat, in sinu dentas, hominem aliquando ita circumplecti, ut nonnunquam suffocent. Annis septem vel octo, quod

Athen.
Dipnos.
l. 7.

Aristot.
H.N. l. 8.
c. 2.
Plin. H.N.
l. 9. c. 21.

branchias pauciores minusque continentes habeant, & paucum humorem admittant, vivere; extra aquam ad quintum, sextumve diem siloco umbroso, & frigido; (si à sole tangantur in terra brevi moriuntur) reponantur, à motu non impediuntur, & ventus septentrionalis aspiret; excoriatas & in partes sectas sat diu. Tonitrua denique adeò timere, ut defundo ad superficiem enatent, frigoris adeò impatientes esse, ut cum Anno M C X V. omnia gelu & glacie rigerent, in terram proreperent, & intra sceni cumulos se abderent.

Plin. H.N.
l. 32. c. 2.

Disciplina non omninò expertes esse videntur. In Jovis Lebradii namque fonte Anguillas è manu vesci & in aures additas, à veteribus proditum Plinius refert; & in Arethusa Chalcidenfi, Anguillæ & Mugiles mansueri in auribus tum argenteis ornati accipiunt à largientibus cibos, à sacerdotibus viscera & caseos, ut Athenæus scribit, & Ælianus, item Plutarchus, qui sacras hæc Anguillas vocari ait. Nymphodorus denique in Elore amne tradit Lupos esse, & Anguil-

Ælian.
H.A. l. 14.
c. 8.

las magnas adeò mansuetas, ut è manibus etiam porrigentium panem capiant: quod & Appollodorus scribit in Chronicis. *Hostiliter* eas tractant, Ardea, Corvus aquaticus Phalacrocorax ex avibus; ex quadrupedibus Lutra, quæ tamen amputato plerumque capite discedit, ut piscatores prodidere.

Quantum ad usum in cibis, delicatissimas olim fuisse certum est. Mænander inter paucas sumptuosissimi convivii, quæ talento fere constarent cupedias enumerat. Phitetarus miseros divites, qui parce viverent, & Anguillas non ederent, dicebat. Alii cœnarum Helenam, voluptatis reginam, præ

Athen.
Dipnos.
l. 12.

Diis honorandam, &c. dicebant. Sybaritæ, iis, quæ eas piscarentur aut venderent, immunitatem, teste Athenæo, decreverant. Hicæsius denique succi bonitate cæteris præcellere, stomachoque gratas esse reliquit. At medicis quamvis carnem mollem habeant, succo tamen lento & pituitoso abundant;

inflammationem pulmonis, quod Hippocratis l. 2. de

Diata. Galen. de Ali-
men. l. 3.

pinguedine hominis naturæ maxime insensa oblinantur, inferunt; superflua humiditate, quam partibus alluunt, turbidam & sonoram vocem reddunt; & secundum quosdam, nescio quid, quod nisi eximatur in periculum vitæ conjiciat, habent, ideo fortè caput, cauda, & à quibusdam oblonga, quæ nigricans per dorsum fertur vena, abscinduntur. Platina ubi præparationem Anguillarum eximiam dedit, subjungit acutissimè, sic paratas hostibus apponendas, quod nihil boni in se habeant.

His noxis infringendis, veteres betæ involutam, ut vitiositate suæ humidum detergeret, comedebant. Salernitani vinum fortè hoc est generosum & crassum, quale est rubeum præscribunt, nam si tenuis biberetur, Chylus in venas antè perfectam coctionem abiret & in corpus raptus Cachexiam excitaret;

idem

idem accidit ; nisi pedetentim , & parum velut pitissando hauseris.

De Vsu in Medicina tantum observavi apud Authores ; *Pinguedinem* in elixatione supernatantem unguentum ad plagas ingredi, de tosta destillatam, aurium & nervorum doloribus mederi ; glabro capiti illitam capillos restituere ; cum pinguedine anseris, succo rutæ, absynthii, hederæ terrestris , & Cynoglossi subactam, ad vulnera præstantissimam esse : Fumum ex salitarum cūte exceptum ; tormina ventris ex dysenteria sopire ; in vino putrefactam vini tædium parere. Evisceratam, tusam, & in olla vitrea coctam, cum pinguedine ac liquore, qui in fundo vasis remanet, hæmorrhoidum cruciatus egregiè lenire. Cingari Anguillas Equis per anum inferunt, ut obesiores, & agiliores videantur, Hippia tri quidam equo asthmatico Anguillam vivam ori inferunt, ut per intestina elaboratur. Alii & parvam imponi jubent purgationis causa. Nec propterea mortis periculum esse aiunt : quin Gesnerus asserit nautam sibi notissimum vivam integram deglutiisse, integram per alvum, vivam reddidisse. Idem author est, aliquos aureum & cholobaphicum colorem ex felle Anguillarum, aliorumve piscium vel boum parare : miscere autem aceti modicum & cum creta subigere in massam. Prætextatos earundem tergore verberari solitos Verrius teste Plinio tradit, & ob id multam his negat institutam. Prætextatos appellans impubes, eos nempe qui frugem aratro quæsitam nocte furtim secuisissent, aut depopulati essent.

CAPUT V.

De Orbe.

TAB. XXIV. Hujus piscis solus meminit Plinius. Durissimum esse piscem, inquit,

constat, qui Orbis vocetur: rotundus ^{Plin. H. N. l. 32. c. 11.} est, & sine squamis, totusque capite constat. Gesnerus Apuleii, *Cranium* esse opinatur, quod ad cranii formam ^{Aldrov. de Piscib. l. 4. c. 15.} magnitudine, rotunditate, & dentibus humanorum similibus accedat.

Tria ipsius genera descripsit Rondeletius, *quartum* addit Aldrovandus. *Primus* qui Orbis simpliciter figura, si caudam demas, sphericus est. Squamis prorsus caret, cuteque tegitur admodum dura; quam asperam efficiunt aculei duri, quibus tota cōspersa est. *Rostro* caret: *Capitisque* nullum apparet vestigium, quin (ut Plinius ait) totus capite (malim ventre) cōstare apparet. *Os* habet parvum, dentes vero magnos & latos, utrinque binos. Supra os duo exigua sunt foramina, olfactus, auditusque instrumenta: *Oculi* mediocres. Circa corpus medium unica est & semicircularis utrinque *branchiarum* scissura; prope quam etiam utrinque unam haud magnam, sed rotundam pinnam habere Salvianus ait, & in iconè exprimit. Rondeletius unicam esse ait, ut in Caprisco. Hic & in summo dorso pinnulam pingit qua Bellonii icon & Salviani quoque caret, & ipse in descriptione non meminit. Eam tamen etiam videre est in iconè ad skeleton efficta à Gesnero, quæ hic exhibetur. Posterior corporis pars in *caudam* brevem & rotundam, inque latam & fere lunatam pinnam desinentem degenerat; in cuius parte media atque superiore, pinna una erigitur, altera quoque inferiori parti hæret. Color ei cineraceus, lineis quibusdam latis & obscurioribus ex pisce medio exortis posteriorem eius partem ad caudam usque pingentibus. Est maris Ægyptii accola, ex quo Nilum quoque subit, & in eius ostio, quod Saiticum vocatur, capitur. Ob insolentem corporis detractum corium tomento impletur, & in domibus ornatus causa suspenditur; suspensus, rostro cæti partem à qua fiat ventus indicat. *Alter Scutatus seu Scutifer* ^{Aldrov. de Piscib. l. 4. c. 16.} dicitur, & in Septentrionali Oceano capitur.

Q 2 Est

Est corpore terete, mucoso, capite magis exerto quam superior: oris scissurâ majore, dentes in eo sunt plures & minores; oculi parvi, & exquifite rotundi. Branchiarum rimam multo majorem habet: intra has pinnae duas. Subest prosterne os illud, quod scuti specie esse diximus. Neque prona neque supina parte pinnae habet, cauda in unam latam definit. A capite ad caudam usque ossa ovi figura disposita sunt inter quorum intervalla aculei interjacent. Piscis est rarus & non edulis. *Tertius* est *Echinatus* seu *Muricatus*. Aculeis totus hic Orbis riget, ut manu tollere non possis, nisi cauda extrema apprehensa. Capite est multo minus exerto quam proximè descriptus, corpore magis rotundato & majore, in quo nullae sunt pinnae præterquam in cauda, quæ in unam definit. Sunt qui Hystricem ab aculeis, non inepte appellant. Possit etiam nonnullis videri *Æliani Sagittarius*, quem rubrimaris piscem esse scribit. Sagittarius in eo mari procreatur, & quoniam erinacei speciem & similitudinem habet; firmis & bene longis armatur aculeis. Sed de hac re judicentij, qui maris rubri pisces viderunt. Nihil temere de rebus parum compertis affirmare volo. *Quartus*, quem Aldrovandus dedit, quod ad oris figuram potissimum cum Scutato convenit, *Stellatus* sive *Asterias* cognominatur, quod totus conspersus sit stellis seu asteriscis: differtque à cæteris, quod neque ad branchias, neque in caudæ exortu pinnae habeat, sed ultra tergoris medium, nisi pictoris id incuria factum sit. Pinnae etiam caudæ in extremo viridi sint colore.

CAPUT VI.

De duobus piscibus Orbibus annumerandis.

TAB.
XXIV.
13. 14.

○ Blongi quidem hi Pisces sunt, Orbibus tamen, annumerari

posse censet Gesnerus, tū quod mucrones ut illi in corpore eminentes habent, tum quod à mucro, quem similiter ore emittunt, vulgo *Snottolf* quasi *Myxini* aut *Mucrones* appellantur: In prioris effigie color erat circa dorsum, qualis in terrestribus ranis videtur: circa latera & inferius ex subcæruleo & viridi permixtus. Antverpiæ cinereo colore capi audio. Sic ille. *Alterū* & hic quoque depictum, *Snottolfs* nomine missum, ex icone, sive ea, inquit, naturalis, sive aliqd etiam in ea artificiosum est, sic delineavit. Longa est dodrantem & palmos duos, lata palmum unum, circa medium præcipue ad caput attenuatur, sed magis ad caudam: *dorsum* medium fastigiatur, punctis notatur variis, subrotundis, & eminentijs exasperatur triangulis, per tres aut quatuor ordines digestis per intervalla. Oris hiatus, figuram fere ovalem refert. Pinnae ad branchias binæ, una in fine dorsum, altera in fine ventris, inter quas corporis pars extrema veluti discreta, & articulo distincta videtur. *Cauda* tripartita, sive natura, sive potius arte. Mucosus admodum est, inquit ille qui misit; non ossium, non carniū quicquam habet: mucoso tantum lentore expletur. Captu difficilissimus. Nam ubi hamum vel retia senserit, suum illum mucum evomendo, lubrica reddit omnia, contractoque orbem exuvio profilit. Mollem quidem & mucosam carnem, & eminentias trigonas, cum aliis *Snottolfs* communes habere videtur.

CAPUT VII.

De *Holosteio Bellonij* seu *Ostracione Gesneri*, & *Catan*.

DE hoc Pisce sic ex *Gesnero* & *Bellonio Aldrovandus*. Hunc quoque *XXV.* è mari Nilum subire, etsi ignoremus, 7. 8. 9. marinum tamen esse ex eorū duricie cōjicimus, quæ testā fere ostreaceorum imitatur, unde cum ob hoc, tum quod *isognion* à *Strabone* inter Nilooos pisces

pisces numeratur (in vulgaribus Strabonis codicibus impressis legitur *σεγενίων*, sed interpres Latinus *ὀσεγενίων* legisse videtur, vertit enim ex testaceis, imperite: & in epitome scribitur *ὀσεγενίων*.) Gesnerus *Ostracionem* hunc piscem nominandum conjicit. Bellonius vero non aspernando nomine *Holotheon* appellavit, quasi totum osseum. Forma (inquit hic) ad pentagonum accederet, pedalis interdum longitudinis. Incolæ ab interaneis protinus emundari curant, deinde vero testam eam duram (testaceorum) quæ contegitur, multos annos incorruptam servant, ut inde lucrum consequantur, quod à negotiatoribus externis novitatis gratia huiusmodi piscis emi sit solitus.

Cæterum dum vivus est penicillum in cauda habet, & pinnas supra & infra caudam: ac rursus pinnam aliam utrinque; oculos albos, os parvum. Color eius lactescit, & velut in pallidum languens. Is quem ego in museo jam multos annos inter rariora refero, & hic depictum ostendo, ab eo quæ supra rostrum conspicitur tuberculo (nasum appellare liceat, piscem ipsum ab eo *Nasum Niloticum*) ad extremam usque caudam vix implet duos do-drantes. Torus est *pentagonus*, totusque item ex articulis ferme pentagonis (ut icon ostendit) constat, qui coctione, imo per se temporis diurnitate dissolvuntur. Branchiarum scissura semicircularis: juxta quas utrinque pinna est, parva quidem si corporis magnitudini compareretur, sed perquam robusta: post podicem alia similis planè sed brevior. Uropygium totum cutaceo corio tegitur, ut quod mireris, in ostreaceum totius corporis tegumentum ita inseritur, ut à lateribus ei annekti non videatur; quin haud aliter corpori affixum est, quam navi clavus; oportuitque cutaceum esse, ut mortui promptus, idoneusque foret. *Oris* rictus p corporis portione exiguus; in quo dentes utrimque fere octo, non absumiles dentibus murium. Utraque maxilla cutaceo etiâ, non ostreaceo corio quod ad modum ineptum fuisset, constat,

Habes hic huius generis piscem alium, æque duro tegumento præditum, sed qui dimidio minor est, non pentagono corpore, sed ventro triplo quam tergo, latiore, lateribus quodammodo concavis: cuius item articuli non pentagoni, sed ferè rotundi, & orbiculati, & in singulis asteriscus venustissime spectabilis. Eminentia quæ in medio dorso est, non pinna, sed plane ossa substantia gibbi speciei. Pinna vero in eius conspicitur extremo. Cætera superiora similia habet, præterquam quod naso (ut vocabam) caret, & oculi sub majoribus tuberculis latent.



HISTORIÆ

PISCIVM

LIBER III.

De Piscibus fluviatilibus.

TITULUS I.

De Piscibus fluviatilibus

Squamosis.

CAPUT I.

De Trutta fluviatili.



Antum de Piscibus ἀνὰ TAB.

δὲ ποταμῶν & κατὰ δὲ ποταμῶν. Fluvia- XXVI.
tiles sequuntur, & hi vel

ἢ ἄλλοι τῶν τοιούτων, ἢ ἄλλοι τῶν τοιούτων, ἢ ἄλλοι τῶν τοιούτων.

Inter *Fluviatiles* eosque *Squamosos* 12.

primus est *Trutta*, Ambrosio *Trocta*, à trudendo *Platinæ*, quoniam semper in adversum & impetuosum flumen nitatur, adversas undas superare. Itali *Torrentinam*, quod in torrentibus & rivis montanis abundet vocare. An veteribus fuerit cognitus incertum. *Theodonem* Aufonij Figulus putatis; *Rondeletius*, *Gillius*, & *Bellonius Salarem* eiusdem. *Jovius Lupum varium* *Columellæ*, Gesnerus *Athenæi pyruniæ*. Figulo obest, quod *Theodonem*, *Salarem*, & *Fationem* unum piscem faciat. *Salarem* parvum esse *Salmonem* superius dictum, & Poëta

clarissimè indicat. Nec *Trutta Lacustris* seu *Salmonata* erit, cum hæc in lacubus nascatur. Lupos inter duos pontes in Tyberi capi diximus: *Truttas* suburbanas amnes ex Reatinis Sublaqueanisque quotidie suggerunt. Illi frigus vehementer pertimescunt, frigidiorib⁹ duntaxat locis gaudent.

Ælian. H. A. l. 15. c. 1. Quod verò *Ælianus* in *Astræo Macedonia* fluvio pisces τὴν χροάν κατὰ

σῆμα gigni, & peculiare quasdam muscas circa summam aquam volitantes appetere; piscatores, pro his muscis purpurascens lanâ hamum vestire, & gallinaceas pennas duas cerei coloris addere, ut pisces decipiant, prodidit; egregiè *Truttis* conveniret, si nomen additum fuisset.

De *Pyrantibus* credit *Gesnerus* *Mnesitheum* apud *Athenæum* loqui, cum ait. Ex fluviatilibus optimi sunt, qui in rapidissimis fluviis versantur, οἱ τε πυραντές. Hi enim non gignuntur nisi in rapidis & gelidis fluviis & facilius quàm cæteri fluviatiles concoquuntur. Convenirentque ista *Truttæ* nisi *Causabonus* pro οἱ τε πυραντές scribendum esse οἱ τε πύραντες ita, ut sensus *Athenæi* sit, optimos ex piscibus fluviatilibus illos esse, qui in fluminum locis, quæ maximè æquarum impetus vergit, quæque rapidissima sunt, quod plus exercitii habeant, vivunt, putaret. *De ipsarum Forma sic scribit Aldrovandus.*

Sunt *Truttæ* & *Salmoni* multa cōmunia; formæ nēpe tota, & corporis partes externæ & internæ: caro rubicūda, squamæ exiles, maculæ seu pūcta, magnitudo, formæ mutatio, circa rostrum præsertim, ac simul nominis: (in *Truttis Salmonatis* peculiariter) ascensus ad summas aquas saltuum vis & agilitas, suavitas in cibo: quæ obrem non est mirum si ex *Truttis* illis, quas Germani *Lachsforen* appellant, aliqui ætatis progressu *Salmones* fieri putaverunt: *Pinnæ* etiam quatuor natant, quemadmodū *Salmo*. *Cauda* vero maximè invicem distinguuntur. In *Salmonibus* enim ea gracilescit, in *Truttis* semper lata est: in illis pinna caudæ longa & bifida, ut in *Alofis*; in *Truttis* brevis &

non divisa. Hic accedit rostrum acutius in *Salmonibus*, quàm in *Truttis*. Rursus partibus internis à *Salmone* & *Umbra* fluviatili non differunt, nisi quod ventriculi appendices plures & evidentiores habent. *Cardanus* formam *Truttis* omnibus communè esse tradit, quod quidem de fluviatilibus verum fuerit: nam quæ *Salmonata* cognominatur, non parum ab iis differt, ut cuilibet icones conferenti notum esse potest. Quæ flavescunt item & nigricant, ab *albis* differre *Rondeletius* testatur, quoniam illis rostrum sit acutius, & veluti in fronte macula nigra. Præterea *albas* minores esse & carne minus flavescente.

Fluviatilis, corporis forma *Lupo* (inquit *Salvianus*) persimilis est, rostro tamen minus extento, magis retuso & paululum recurvo. Ore etiam paulo minore. *Alba* restante *Rondeletio* capite *Mugilem* quodammodo referunt: brevi nimirum, subrotundo, carnoso, vel potius pingui, coloris lactei. Maxillæ & lingua acutissimis dentibus armantur. *Sylvius* sex eorū ordines esse scribit, primum labris connatum, alios quinque à labro in pharyngem abscedentes; in quo tamen dentes sint in contrarium hamati, & qui cibum ex ventriculo regredi prohibeant. Idem ait, branchias utrimque quatuor dentibus humatis & asperis & duris contumaces habere: quæ verba non satis percipio. *Cardanus* & *Bellonius* sex inquirunt in lingua dentes habere: addit *Cardanus* & certo ordine dispositos: scilicet duos ante, totidem in medio, ad latera positos reliquos juxta radicem. Qui vero in oris ictu sunt, eorum *Bellonius*, quinque ordines in superiori parte palati facilè posse scribit denuerari. *Pinnas* duas sub ventre superiori tergoris oppositas, & duas ad radices branchiarū habet, unā rursus versū caudā, proxime ad anū, quidē regione est superioris indorso, quæ longo minor est & cutacea. Oculos habet rubētes. Corpus squamis parvis tegitur, & cute quæ facile rugatur, & carne divellitur, absceditq.

Dorsum,

Dorsum; imo totus fere piscis ex albo flavescit guttis, quales diximus. *Cauda* in brevem & latam pinnam degenerat. *Pinna* tergoris, iisdem quibus corpus maculis conspersa est. Cubitalem magnitudinem non excedit.

Differentias à coloribus duntaxat sortiuntur. Bellonius ex Rila Neustriæ flumine variis notis pictas videri, aliis atque aliis multum diversas, tamen in eodem tractu cæperis, scribit. In Santonum & Boiorum fluviis, reperiuntur, ut Rondeletius prodidit. Captam allicubi flavi coloris & admirationi fuisse, apud Gesnerum legimus. Subnigræ, maculis rubentibus notatæ; quem colorem ex senio contractum, quod ex maximæ sint, Rondeletius putat, in Misnia sunt vulgares. Sunt ibidem *Lachsforen* dictæ; nomine ex Salmohe & Trutta composito, quæ aureis maculis pinguntur. Subnigras rivi ad Crottendorfum, & fluvius quem Nigram aquam vocant; Suarceburgum oppidum alluens, alit. Multis in locis optimæ reperiuntur; & quamvis in maioribus fluviis reperiantur, in minoribus tamen frigidioribus, saxosis & inter montes delabentibus potius quam contra se habentibus, nasci & degere constat. In altis item montium rivis, etiam tenuibus & exiguis aquis, Trutta satis magnæ & pulcherrimæ habentur. Ascendunt enim altissimæ, cum & contra aquam luctari magnâ vi; & saltu se promovere, ad tres vel quatuor ferè cubitos interdum, in ascensu queât. Ex quibus efficitur, ut haud falsa esse credamus; quæ de iisdem Paulus Jovius scribit; eas adversos amnes vel è præruptissimis etiâ cautibus decedentes, incredibili impetu subire. Ab Nare enim fluvio in Velinum lacum, qui hodie Pedelucus est, stupendâ velocitate volucrum modo ascendere credi; qui lacus ab altissimo montis vertice certis primo coarctatus angustis, & mox tota aquarum mole præcipitatus, nec subiectis quidem cautibus madefactis, veluti è cælo in ipsum profluentem Na-

rem effunditur. Idem in Gardonis fluviis fieri experientia docuit.

Vescuntur aquarum dejectamentis, phryganiis vermibus, locustis aquaticis, & piscibus. Percarum sobolem, Fundulos, & Phoxinos læves, tantâ sæpè aviditate appetunt, ut supra aquam elatæ in scaphas aliquando incidant. *Auro vesci* vulgus credit. *Parvum* mense Octobri, in modicis quas excavavere scrobibus. Laudantur vehementer in *Cibis*, maximè si in frigidioribus & purioribus amnibus procreatæ sunt.

Quæ adverso eorundem impetu fatigantur, atque occurrentibus in æqualium vadum petris illiduntur castigatiora sumina, & aridiusculas carnes ostendunt, sed recenter captæ comedi debent: mortuæ enim paucissimis horis, quia ob pinguem tenebritudinem ocysimè putrescunt, saloris gratiam amittunt. In Malacca regione Indiæ, salitæ ad commeatus servantur; Cajuba vocant.

CAPUT II.

De Trutta fluviatili al-

tera. Hobberg f. 518.

HVCH apud Bavaros (inquit Gesnerus) nūcupatur piscis boni saporis, Truttis non nihil cognatus, cū^{2.} alias ut pictura ostendit, quam ad vivum expressam Achilles Pyrminius Cassarus, præstantissimus Augustæ Vindelicorum medicus ad me misit; tum quod pinnulam illam adiposam similiter in fine dorsi habet, & punctis variatur: sicut & icon nostra, & quæ in libro Bavaricarum constitutionum publicato habetur, præ se ferunt: in quo etiam mensura huius piscis proponitur; duodecim aut tredecim digiti, quibus brevior vendi non debeat. Augustæ, ut audio hic piscis vocatur, *ein Rot/Rottle* à colore rubicundo, quæ nomina nostri Vmbilis (ut Sabaudi nominant) lacustribus tribuunt. Voracem esse aiunt, in cibo Truttis inferiorem.

In

TAB.
XXVI.
*Aldrov.
de Piscibus
l. 5.
c. 13.*

In Carinthia Huchæ rubræ (Rot Huechen) quædam cognominantur in fluviis, eas Salmoni comparant: carne etiam rubrâ & boni saporis esse aiunt, & saliri ut inveterentur, solere: quod quomodo fiat Balthasar Stendelius ad finem lib. 4. Opfopæjæ suæ Germanicæ docet. Colores huius piscis in pictura nostra huiusmodi ferè apparent. Aureolus color passim aspersus est, copiosius tamen circa branchias & oculos. *Pinna* circabranchias rubicundæ sunt: cæteræ omnes, sicut & *cauda*, fuscæ & maculosæ punctis partim nigricatibus, partim aureis. *Dorsum* fuscum est, utrimque ad Indicum vel cæruleum colorem vergens, ubi & punctis nigris creberrimis distinguitur. *Linea* nigra & recta fere à branchiis ad caudam fertur. Latera media maculis quibusdam subcæruleis per intervalla distinguuntur. *Venter* candicat. Circa *rostrum* & branchiarum opercula roseus fere color, &c. in capite etiam viridis aliqua ex parte. Huchas istas quidam iconem nostram inspecta in quibusdam Germaniæ locis ali, in piscinis nobis referebant: & in Traga flumine Carinthiæ reperiri, ætatis progressu in Salmones converti (specie rostri nimirum) sicut & lacustres Truttæ, quanquam & aliæ Truttæ Salmonum speciem præseferunt.

CAPUT III.

De Thymallo.

TAB.
XXVI.
3. 4.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 14.
Ælian.
H. A. l. 14.
c. 22.

Thymalli solus Ælianus inter Græcos, Ambrosius inter Latinos mentionem faciunt. A Thymo quem olet ita dici, Salvianus contendit. Bellonius Thymum vocavit. Itali Temarum, quasi temerarium, quod stolidus piscis, dicunt. Truttarum generis esse, cum pinnarum situs, tum totius corporis figura indicant. Eratque Ælianus Truttis, si eas notas sibi habuisset, potius quam vel Lupis vel Cephalis, quorum communem & mediam speciem similitudi-

nemque gerere scribit, assimilaturus: quanquam & his non absimilis multum: similior interim Mugili, quam Lupo. Caput pro corporis ratione parvum, in acutum tendit. *Os* aperitur nō longo, sed quadrato ferè hiatu. *Ventre* est prominentiore. Rondeletius latiore, magisq; ventrosus pinxit, quam par est. *Pinnas* duas habet ad branchias, duas alias in ventre inferiore, à podice unam. In dorso prior magna est, maculis multis pulchrè variis: infra partim nigris, partim subrubentibus, supra rubicundis tantum. *Cauda* in duas latas pinnas definit. Rondelet. corpore ait esse cæruleo: Bellonius verò tergus ex livido in opacum tendere, & Gesn. fuscum id, vel subcinereum facit: Atqui hic exprimitur, Rondeletius scribit: fierique potest, quod vel loci, vel ætatis ratione evanet. Lineas per latera rectas habet, quarum quæ ea dividit à superiori branchiæ angulo spineo oritur, & recta ad caudam defertur: sunt & aliæ per totum corpus non paucæ, singulæque per singulos squamarum versus, non rectæ, sed innumeris veluti arcubus, minimis triangulis undatæ: quod veluti operosum pictores nostri, inquit Gesnerus, non indicarunt. Obscurè sanè & in meo pisce quem ad vivum depictum in musæo reservo, pictoreas expressit. Latera præterea modo pluribus modò paucis punctis & lituris nigris temerè asperguntur.

Vidisse se idem Gesnerus in fine Decembris aliquando singulis tantum utrimque ad branchias *lituris* insignem scribit; aliumque initio Junii, uno altero puncto vix apparente. *Squame* ex eiusdem observatione, singulæ fere *ρῶμβοειδεις* sunt, hoc est, rhombi figuram imitantur. Latera enim, inquit, earumque utrimque circuli segmentum referunt, supra vero infraque in cunei acumen tendunt; quod tamen in iconibus suis expressum negat. *Branchias* habet utrimque quaternas, & ut Bellonius addit, Harangi & Sardinæ modo, solidioribus horrent, uncinatisque ossiculis constant. Idē Bellonius *linguam* ostendere albam

albam scribit, dentibus carere, immo ne ullis quidē rudimentis eorū prāditum esse: ē contrariō Gesnerus pro dentibus, inferius superiusq; labrum exasperari, limæ instar, introrsum pfitetur: & Bellonium haud bene istāc exanimasse apparet: nam alias *Lavaretum* Gallice dictū piscem, ossicula ad fauces atq; Oesophagi ingressum utrimq; habere senis hinc inde denticulis ait, ut in Themolo cōminuta; cū alioqui in Thymallis, & in Lavaretis suis nihil quicquā tale reperiās. *Ventriculum* habet mediocrem, intestina crassiuscula, pinguedine multa obvoluta; & ut Bellonius ait, apophyses plures ex pyloro dependent, à quo statim sequitur intestinū unū gracile, rotundum, q; ad rectū tendit, in quo excrementa recipiuntur, & ad anum deferuntur. Idē Bellonius, *cor* tā exigū habere scribit, ut ne inesse, q; dem ei credatur. *Splenē* Salvia⁹ subrubrū facit, Gesnerus in suo quē manibus tractavit, ferē nigricare asserit. Bellonio teste hic tā magnus est fere in hoc pisce, q; hepar, quod in nullo alio pisce (inquit) unquā vidērā, oblongus rubra pinguedine mixtus. Unicus hepatis lobus est, ut idē Bellonius observavit, statim ubi gula finit, stomachū amplectens. Salvia⁹ felle carere putat: Bellonius vero tam exiguum id esse tradit, ut vix rudimentū aliquod eius appareat: & Gesnerus quoq; suū Thymallum felle caruisse negat, sed flavi vel subaurei coloris id habuisse. Bellonius folliculū piscium natationi accommodatū plenum semper vidit, ac per spinā delatū. Cum maxime augetur, ad cubitalem *magnitudinem*, teste Eliano, excrescit: etsi qui crebrius capiuntur, minores sint, & ut Salvia⁹ ait, libram non excedunt. Longitudo ad latitudinem ferē quintupla est, cauda etiam computata, ut Gesnerus advertit in eo quē manibus tractans descripsit, latus enim erat digitos tres, longus quatuordecim. *Gaudent* puris frigidis & saxosis aquis, in quibus circa saxa reperiuntur: nec ulli magis in mōtanis & præcipitibus fluviis, Truttas si excipias, capiuntur.

Gignunt eas in Germania Rhenus,

Limagus apud Helvetios, & Floha apud Misenos; in Italia Ticinus, Abdua & Ambra, in Pado rarius capiuntur. *Vicitant* insectis aquaticis, dejectamentis mille pedibus, pediculis, caridibus, pulicibus aquaticis ac terrestribus. Elianus alia quā culice escā capi posse negat. Volaterranus Thymallo vesci, & solus quidē inter scriptores, voluit. *χρυσόφάγος*, id est aurivori dicuntur, seu q; minutula auri fragmenta ppter splendore appetāt; seu quod cū majori pretio variant, obsoptagorū aurum absumant, & loculos exhauriant. *De odore eius ita Elianus*. Eius capti odor non indignam admirationē habet: non n. ut ceteri pisces pisculentum quendā mittit odorem: imo verō existimes te ejus gentilem herbam, recentem ex terrā lectā manibus tenere. Tanta sanē odoris suavitate fragrat, ut qui eum ipsū non videt, gratissimā apibus herbam, unde nomē duxit, in manu latere putet. Ambrosius de eo, qui gratā redolet suavitatem, dici facile scribit. Aut piscem olet aut florem: Omnibus sui partibus cōmendatur in *Cibis*: quibusdam tamen interiore tunicā maxime blandiuntur. Circa Albim præferuntur Truttis, In Arthesi & Addua captos tenerrimos Salvia⁹ fecit. *Majo* mense maxime appetuntur, & loco marinorum saxatiliū præscribuntur à Medicis.

In Medicina, Adeps hujus piscis laudatur, tum contra auditum gravem, si mense Majo in vasculū coniectus soli exponatur, & quod distillat, auri immittatur; tum contra oculorum prurigia, ungues, ruborem, fervorē, &c. si quotidie binæ guttæ cum pinna instillantur. Vidisse se puellā chemosia affectā Gesnerus inquit, quod malū aliquādo exanthemata puerorum sequitur, hoc remedio per septuaginta ferē dies continuato, (ut quotidie gutta instillaretur) curatam, rubore mox primis diebus sublato. Addit insuper, habere & pharmacopolas apud suos hunc adipem; & ab illis maxime ad oculorum remedia, ut maculæ in eis deleantur, peti solere, deinde etiam ad curandas igne vel aqua adustas partes.

Elianus. II.
A. l. c.

Ambros.
Hexam.
l. 5. c. 11.

CAPUT IV.

De Umbra fluviatili.

TAB.
XXVI.5.
Aldrov. de
Piscib. l. 5.
c. 15.

Umbra fluviatilis Aufonius ex veteribus in Mosella sua meminit, Gesnerus pro eadem cum Trutta fluviatili, quod ista in Mosella imprimis ubi se in Rhenum exonerat abundet, accepit. *Rondeletius ita descripsit.* Piscis est non solum nomine, sed & colore marinis (Umbris) similis, à quo utrique nomen. Corpus enim est opaci loci modo subfuscum & subobscurum, cubitalem magnitudinem non excedens. Galli Narbonensis, demptis Monspelienſibus, Umbram vocant. Piscis est ex Truttarum genere, Carpioni Italico corporis aspectu affinis. Pinnis & earum situ à Trutta non differt. Duas itaque ad branchias habet, duas in ventre, ab ano unicam, in medio dorso priorem majorem, posteriorem minorem, subrotundam, & pinguem, squamas parvas, & maculosas similiter habet. Carnis substantiam, partesque internas omnes easdem. *Capite verò à Truttis differt*, quo Carpioni (Italico, Gesnerus) similis est: capite enim longiore est, quam Trutta, ore minore nec tam hiante, rostro non acuto, sed obtuso, maxime in maxilla inferiore, sine dentibus, & sine magna maxillarum asperitate. *Oculis* est patulis, cornea tunica aurea, pupillâ nigrâ. Corpus à medio sensim gracilescit, in caudam latiusculam, & pinnam bifidam, latissimam deficit. A branchiis ad caudam linea recta (hanc in pictura non expressit) per medium corpus producta est. *Branchiæ* intus sunt quaternæ; *Ventriculus* longus & spissus pinguitudine quæ lacte candidior est, obductus, à quo multæ apophyses pendent. *Hepar* rubet, cui alligata est fellis vesica, *fel* nigerimum est, *splen* longus & niger. *Intestina* sine gyris ullis ad anũ demissa sunt. *Vescitur* terrâ, aquâ limo, unaque, cum his, & cum arena auri laminulas haurit: ob id vulgus auro nutriri Umbrâ credit: & revera in ventriculo & intestinis aurum reperiri certissimum

est. Carne est sicca & alba, qualis est Truttarum parvarum caro. Hyeme latet: æstate cum Truttis capitur: cui cum insucco & substantia, permultisque aliis similis est, Truttarum generi & tractationi subjecimus. Pura aqua maxime delectatur. *Hac Rondeletius*, nulla coloris facta mentione, quem Bellonius non tacuit: totum hunc piscem sub ventre argenteum, esse scribens: dorsum verò terfissimum habere ex livido opacum.

CAPUT V.

De Barbo.

Barbi quoque solus inter veteres **TAB.** Aufonius meminit. Nomen ei Cu. XXVI. racei illi Cirri quæ barbæ quodammodo similitudine ex utroque huius piscis labro dependent, fecere. *Bel-* *Aldrov. de* *Piscib. l. 5.* *lonius* haud incongruo vocabulo *c. 16.* *Mystum* vocat, & Græcorum vulgo *Myssacatum* vocari scribit. Sunt qui cum Mullis marinis piscibus, qui & ipsi barbati, confundunt. Corporis figurâ Mugiles fere refert, aut Squalos, nam si latitudinem spectemus, oblongiusculus est rotundus, in laterâ modice compressus. *Differt à Mugilibus*, quod pinna quæ in medio dorsi, firmiori aculeo innixa est: pinne ventris magis sunt flavæ; caudæ pinna rubescit: Rostro item est longiore & acutiore, cartilagineo & pingui. *A Squalo* etiam perspicuis quibusdã notis differt. Nam cum in extremo rostro Squalo sit os, infra rostrum in inferiore parte illud Barbus habet; unde & superior eius maxilla paululum prominet: Labra item longe crassiora sunt quam Squalo, caputque compressius. Postremò è superioris rostri extremo duæ appendices, ex lateribus duæ aliæ propendent: quibus & Squalus & Mugiles carent. Est autem appendiculum earum substantia cutacea quidem, sed mollis, lubrica, teres, subrubra. *Venter* est colore lacteo, latera argenteo. *Dorsum* ex albo flavescit, nigrisque quibusdam ac parvis maculis conspergitur. *Branchias* habet quaternas: quarum rima admo-



Trutta. Fario

Fordle Fore.

Trutta

Tab. XXVI

Pot. Foral.





Arsche.

Umbra.

Aesch.

Thymallus.





Barba.

Barb.

Thymallus.

Aesch.





Capite.

Alat.

Capito fluviatilis. rapax.

Ionling. Paubaiat.





Oryz. Rutilus. S. Rubellus.

Urff.

Lacuseus.

Rotauglen.





Louiscus. Condel.

Potauglin.
lunn Schwaal

Louiscus.

Blicke. laugeler





Oxyrinchus. Sphyrana

Hautin. Spithnag.

Ceruus Niloticus

14





Gobio fluviatilis.

Kresling. Bachkreß

Natus.

Nase.




Gobio.

Krazen.

Asper

Pficulus.

Ruchling.




Cobiter. Grundel

Stan bißfer

Cobiter Barbat.

Bartgrundel.


Asper Danubianus. Zindel.



Cobiter aculeatis.

Schmerlan.

dorngrundel.



admodum parva est: quamobrem extra aquam satis diu vivit. Ab iisdem linea ad caudam porrecta, minus evidens est, quam in aliis. *Dentibus* caret. *Oculi* parvi sunt, pupilla nigra, quam ambit aureus circulus. *Fel* adhæret jecori. *Intestina* in spiras contorta, plurima pinguedine oblita. *Vterus* oblongus est & bifidus, ovis innumeris refertissimus, cum prægnans est piscis. Pondere plerunque libræ unius, quandoque duarum, raro trium. *Salvianus* ad octo libras excrevisse observavit. *Belonius* frequenter in Nilo capi testatur, sed quo modo *Lucius Italicus*, inquit, à Gallico differt, sic *Nili Mystus* à nostro dissidet. *Noster* enim *Mystus* oblongus est, & quasi teres: *Niloticus* vero crasso & recurvo est corpore: *Eiusdem* tamen coloris sunt: & eodem modo barbis quatuor, seu mystacibus exornantur. *Niloticus* nostrum *Cyprinum* ipsâ formâ ferè æmulator: ventrem enim habet expansum. Tantâ crassitudine in Nilo proficit, ut eum *Memphis* libras viginti dependentem viderim; quo in loco *Mythus* vel *Mystus* dicitur.

De Loco eius & Natura hæc *Aldrovandus* habet. In lacubus quidem nascitur; sed cū multo frequentius nascatur in fluviis, fluviatilis potius, quā lacustris erit dicendus. Scribit *Salvianus* paucos esse lacus, qui *Barbis* abundant: plurimos vero esse qui eis carent: contrā in omnibus fluviis gigni atque ali: ideoque iure inter suos *Mosellæ* pisces *Barbum* recenseri ab *Ausonio*. *Albertus* author est, à piscatoribus sibi relatum, ova ab eo custodiri, ne ab aliis devorentur: additque se observasse in cavernis domus suæ ad *Danubium* sitæ, quotannis post æquinoctium autumnale congregari hosce pisces, tantaque copia convenire ut manibus etiam capiantur, ita ut meo tempore, inquit, incolæ loci aliquando decem plaustra fere manibus eiecerint. Nam hoc genus piscis frigus non sustinet: quare semper languidus hyeme invenitur; æstate verò mundus & sanus est. Hæc ille. *Vescitur* algis, coch-

leis & piscibus, & ne suo quidem generi parcere dicitur, *Albertus* cadaveribus capi quoque scripsit. *Degunt* gregatim, parvum ineunte æstate propellitor. *Gesnerus* ex piscatorum observatione sub collibus & ripis prominentibus libenter versari asserit, & porcorum instar fodere, ita ut aliquando in cavernis inhæreant, & pereant: pinnaeque eorum ab hircinibus nonnunquam infestari, quas saxis affricantes in fundo aque depellant, aut rapidiora fluminis loca petant, ut aquæ impetu elidantur. Apparet verò cum *Squalis* quandā occultam exercere amicitiam. Nam quemadmodum in quovis lacuum, fluminumque *Barbus*, ibidem fere semper, & *Squalus* reperitur; ita è contrario ubi *Squalus*, ibi semper etiam *Barbus*, ut *Salvianus* refert. *Claustra* fert, & in piscinis æque & *Squalus* parit & pinguescit.

Quoad usum in cibo *Cardanus* eum omnino reiicit. Aliis, si in saxosis & puris fluminibus capitur benè sapit, concoctus est facilis, laudati succi, carnis candidæ & mollis, sed plurimis spinis firmatæ. *Majo* circa *Rhenum* ad *Iulium* laudari, *Augusto* in *Helvetia*, *Gesnerus* prodidit. *Salvianus* in ineunte vere sapidiore dicit. *Ausonius* grandiores natu, majore in pretio. Nonnulli propter mollem carnem vino prius imponunt. *Ovavenenata*, *Majo* in primis mense *Platina* author est. *Gazius* scribit, cum experiundi gratiâ duos duntaxat de ovis hisce bolos comedisset, nihil inde aliquot horis postea noxæ percepisse: demum sub horam cœnæ, plurimam in ore ventriculi sensisse inflationem, quam ut dissolvere, inquit, anisum sumpsi, sed frustra. Post horam faciem apparuisse tanquam in syncope, ita ut astantes & admirari, & de mea salute timere inciperent. Se interim magnam non solum in stomacho & ventre, sed omnibus membris externis alterationem, & inæqualem quandam intemperiem in una quaque carnis parte sensisse. Tum supervenisse passionem cholericam, donec infra supraque simul pluries ova purgarentur,

rentur, magna cum anxietate & virium prostratione, & maximo vitæ periculo. Idem apud Gesnerum invenies. Sunt qui credant tum esse malefica, cum salicum, quæ fluviorum ripas obfident, floribus in aquam decidentibus vescuntur; sed quia nec salicibus nec aliis Barbi partibus ista vis, præstat culpam in idiosyncrasiam conjicere.

CAPUT VI.

De Capitone.

ARTICVLVS I.

De Capitone Aufonii, seu Squalo veterum.

TAB. XXVI. *Aldrov. de Piscib. l. 5. c. 17.* PISCIS quem hic descripturi sumus, à magnitudine capitis, *Capito* Latinis dicitur. Apud alias nationes varia invenit nomina, quæ apud Aldrovandum, Gesnerum & Bellonium vide.

Quis sit apud veteres, difficile est dictu, Bellonius *Thedonem* Aufonii, quem nullo spinæ nociturum acumine dicit, Rondeletius Capitonem ejusdem, Salvianus Alburnum Aufonii, & Galeni Lencefium, Aldrovandus Squalum ut Romæ vocatur, esse putat.

Marino Capitoni Mugilibusque aliis corporis figurâ similis est: dorso tamen minus lato & corpore compressiore. In dorso item unicam duntaxat *pinnam* habet, Mugilum verò genus duas, unam videlicet in eius medio, alteram inferius caudam. Mugiles denique lineas quasdam habent subobscuras à branchiis ad caudam productas, quibus carere omnino Squalum Salvianus scribit: unam tamen ei lineam esse Gesnerus proficitur, sed quæ leviter appareat. Idem Salvianus ait habere parvum, Rondeletius contra crassum & magnum: id quod pleræque etiam vulgares nomenclaturæ

indicant. Rursus uterque dentes habere negat. Rondeletius os tantum asperum esse ait: Gesnerus verò dentes eius latere in faucibus asserit, maxilla ferè semicirculari, superne leviter ad uncus, ordine duplici, exterius quinos, interius binos. Dentes enim ei tribuit Albertus his verbis: Piscium omnium dentes valde acuti sunt, exceptis per paucis, qui in lateribus gutturis, mandibulas habent, ut pisces fluviatiles magnis vestiti squamis, Barbellus (athuic squamæ sunt exiguæ) Monachus, & alii quidam. Hi enim habent dentes latos aliquantulum, magis ad conterendum cibum, quam ad dividendum idoneos: quamobrem etiam omnes æquales sunt: & ideo naturâ abscondit eos in gutture, ut clauso ore aqua non suffocet mandentes hos pisces. Tales autem dentes maximè habet Carpo (ut Cyprianus) piscis, *Labra* sunt satis crassa. *Oculi* nigri, in circuitu aureoli; tempora subflava, *Os* rubicundum, *branchiæ* utrimque quaternæ, geminæ colore totus est argenteo: dorsum tamen minus quam venter & latera pollucunt. *Squamæ* splendidæ sunt, albicantes, angulosæ, latæ, cute ultra medium obductæ, minimis variante punctis. *Aristis* in carne multis abundat, quarum etiam in Capitone meminit Aufonius, qui item à squamarum magnitudine squameum cognominavit, dum canit:

Squamens herbosas Capito interlucet arenas,

Viscere pratenero fartim congestus aristis.

Gesnerus cum circa Octobris calendas unum ovis gravidum magnum item & præpinguem inspiceret, nullas in eo apparuisse aristas testatur. Quare vel non omni tempore, vel non omni ætate in iis reperiri credendum est. *Ventriculum* parvum habet, intestina parva, *hepar* ex albo rubescens, fel in medio viride, *vesicam* geminam aëre plenam, *peritonæum* nigricans. Circiter libram plerumque implet, aliquando tres & quatuor, aliquando sed rarissimè, octo

Bellon. de
Aquarilib.
l. 1.

Varro R.R.
l. 3. c.

octo aut novem. Non tantum in fluminibus sed & in lacubus, sed & iis paucis *degit*. In Lario invenitur, in Constantiensi non item. Ab Aufonio inter Mosellæ, à Bellonio inter Strymonis pisces refertur; sed nec claustra refugit. Dulci piscina inclusus, crescit, pinguescit, & prolem propagat. Expressè Varro. In tertia parte quis habebat piscinam nisi dulcem? & in ea duntaxat Squalos & Mugiles pisces? Servari diu & in aqua pura potest, si eandem sæpius mutaveris, vas ad summum repleveris, nec quicquam aliud inieceris, aliàs suffocantur. *Vescitur* cœno & sordibus, ideo un Vilain in quibusdam Galliæ locis dicitur: scarabæis & animalculis, qui in aquæ superficie nant; gryllis quoque campestribus, & uvæ acinis, & muscæ genere, quod propterea Aletmuggen Helvetii dicunt; cerebro denique bubulo, ideò à piscatoribus hamo subtiliter alligatur. In locis littoribus proximis, in fine veris & sub æstatis initium parit. Mense Majo parere ab uno latere, ab altero Cerasa quæ Helvetii Amarella vocant, matura sunt postea, aliqui Gesnero teste prodidere. Inter gregales esse censentur. *Vsum in Cibis* si spectes, inter viles censetur. Carne quidem est candida, sed insipida ac molli, & quæ mox extra aquam flaccescit, plurimis abundans aristis; utrumque tetigit Aufonius dum canit:

Viscera prætenere fartim congestus aristis,

Nec duraturus post bina trihoria mensis.

Improbantur præ cæteris, qui in lacubus, & in magnis cœnosisque fluminibus capiuntur; quamobrem Romæ, quod vel ex proximis lacubus, velex Tyberi afferatur, parvi fit, cum aliqui Tyberinus in ligneis vastis diu vivus conservetur. Contra, in limpidis, parvisque ac saxosis fluviis torrentibusque captus, haud omnino aspernari debet, maxime ubi adolevit.

Major enim factus, minus mollis

est, ut hic etiam, sicut de Barbo diximus ex Aufonio in senecta præferendus videatur. Commendantur apud nos verno potissimum tempore, cum prægnantes sunt: Alii tradunt per totam hyemem admittimentis posse, & vere etiam usque ad initium Maij: ætate non probari.

Gesnerus apud suos commendat, scribit mense Decembri, placeatque circa Calendas Octobris, quo tempore unum ovis gravidum, inquit, reperi: magnus is & præpinquus erat: ova quoque sapiebant palato: nec ullæ apparebant spina. Idem caput in eo præferri asserit.

ARTICULUS II.

*De Capitone fluviatili seu
Squalo minore.*

FRæuens in fluviis est, inquit Gesnerus, vulgo nominatus *ein Haszle* TAB. XX VI. in lacu juxta Tugium *Ganghaszle* 7. vel communiori nomine *Weißfisch* Aldrov. de Piscib. l. 5. *Mayfisch* à Mense Majo, quo præc. 18. feruntur, quod nomen Alausis, quoque attribui putat. Italicum huius piscis nomen nisi *Stretta* sit, (à corpore longiusculo forte, & stricto, id est, minime lato) in Lario lacu, & in Verbano *Gravetta*, aliud se nescire profitetur. Hæc verò cum scripseret, piscator Lucarnensis in Verbano vocari ei asseruit, *Letta* vel *Aletta*.

Conjicitq; eundem fortè esse qui Papiæ *Cabacello* dicitur. Germanicum *Haszle* videtur lepusculum significare, fortè quod agilitate ac celeritate natandi lepores repræsentent. Ipse Cephalos aut Mugiles fluviatiles minores vocat, quod fluviatilem Cephalum sive Squalum magis quam Leuciscos referat, adeo ut icone opus esse neget. Pisciculi, inquit, sunt molles, duos aut tres palmos longi, albicantes, per dorsum in viridi nigricantes, caudæ & pinna dorsi glaucis; cæteris rubicundis minimè lati.

R 3 Squa-

Squamulis tenuibus , argenteis, branchiis ternis. Caro eorum aristis referta est, ut & Mugilum fluviatiliū maiorum. Ex his qui in fluvio apud nos capiuntur , oculis rubere audio, qui in lacu non item. Observavi postea lacustres superna oculorum parte flavere.

Dentes in faucibus utrinque conditos habet , ut Capito fluviatilis, in mandibula curva, exteriori ordine quinque majusculos, interius binos minores, omnes fere in summo leviter aduncos. *Parere* incipiunt medio Aprili, vel paulo ante. Suo tempore (Majo & Aprili præcipuè, deinde Junio & Julio : à Majo quidem mense etiam *Meyfisch* alicubi nominantur) satis grati in cibo, & salubres habentur. Aliquando verò vermes eis innascuntur, (*Ligulas* nostri vocant, & *Nestel*) & omninò insalubres sunt. Hyeme macri sunt ac minime placent. Fluviatiles etiam lacustribus præferuntur. Elixari debent in vino fervido. Circa initium Novembris ova in hoc pisce reperi, quæ magis quam piscis placebant. Idem *Capitonem fluviatilem* CÆRULEUM cognominant differentia causa, quem Germani , Saxones potissimum, *Iesen* appellant. Quidam *Alaufam* interpretantur , sed male, quoniam è mari fluvios non ascendit: Capitur in Albi , & in Danubio quoque, ubi *Ientling* vocatur. Cum Capitone fluviatili similitudinem habet, sed colore est in dorso & in aliquibus capitis partibus cæruleo. Præfertur assus. Germani ad Viadrum *Jesitz* appellant , Marchici ad Viadrum *Jese* scribunt : alicubi *Bradfish* dicunt , hoc est piscem assari solitum , per excellentiam. Poloni *Jaszcz* , Hungari *Zompo*. Non est in magno pretio; neutiquam salubris, quod pinguiusculus sit , & non, saxatillum modo friabilis: suavis tamen satis , quantum ad gustum. Estur frigidus, assus potissimum, quamvis & elixus, & aliis modis. Longitudo eius cubitum non excedit, nec latitudo tres aut qua-

tuor digitos. Post Pascha potissimum capitur.

ARTICVLVS III.

De Capitone fluviatili rapace Gesneri.

HOc genus Capitonis , Miseni ^{TAB. XXVI.} Rappe vocant , id est corvum, ut Kentmannus Gesnero communitata icone significavit , quòd is volucris instar vorax & rapax sit, ^{Aldrov. de Piscib. 5. c. 20.} quam obrem Gesnerus rapacem cognominavit.

Piscis (inquit Kentmannus) est candidus, argentei splendoris , dorso tamen fusco, & subcæruleo, *Squamis* tegitur latiusculis, tenuibus & perspicuis, quibus pellicula tenuis argentei nitoris subternitur , quæ per squamas translucens, piscem velut argenteo illitum ostendit, quales etiam cæteri pisces, quos communi nomine albos cognominamus (*Weißfish*) apparent. Piscis est longus, crassus, & carnosus : caro *aristis* plena. *Longitudo* ad latitudinem quintupla. *Dentes* ei non in ore, sed in faucibus sunt (ut aliis quoque huius generis) longiusculi, utrinque septeni, è mandibulis prognati. *Ventriculus* & *intestina* simul, piscis longitudinem non æquant. Revolutio eorum triplex est, ita ut in summo ventriculus sit, inde tenuius intestinum incipiens revolvi, duas sub eo helicas efficiat.

Tegit hæc dextro latere *jecur* (in quo vesica fellis longa conspicitur) altero *lien*. Vesica in eo aëre plena, oblonga est, ut in Lucio, Cypri- no, &c. Maximi qui apud Misenos capiuntur, ad sex aut septem libras, (xvi. unciarum) accedunt.

Addit Gesnerus sese audivisse *branchias* molles esse , ut in Salmone : *pinna*s coloris è fusco puniceæ. Nomen à rapacitate tulit.

Est

Est enim velut prædo vehemens in aquis: nec minus ferè quam Silurus (Glanis) & Lucius, aut etiam amplius, damnosus est vorandis piscibus: quos dum persequitur, in ripam aliquando expellit, & simul etiam ipse interdum impetu in siccum delatus, relinquitur. Hic piscis in Albi nascitur, non aliunde subit, & toto fere anno (sed rarius & per intervalla quædam) capitur. A partu valde augetur, & pinguescit. Parit autem circa annuntiationem Divæ virginis: quo tempore à stationibus suis catervatim procedunt, magni & parvi: duobus aut tribus diebus ante aut post illum diem: idque ita fore certum est. Quod si nihil impediat, sexaginta, plus, minus, uno retis tractu, interdum capiuntur. Piscis est *callidus* & extra hoc tempus, quo propter partum gregatim natat, difficilis capto: nisi vel nimii ventorum flatus, quo minus piscatores & retia trahenda audiat, efficiat: vel aqua perturbata, visum eius impediat: aliàs enim inter scamna, quæ arenâ accumulant, manet, nec facile retibus includitur. Cæterum extra pariendi tempus hamo ferè *capitur*, hoc modo. Quoniam vorax est piscis, Phoxinus aliusve pisciculus hamo infligitur, & sic linea per aquam, ultro citroque agitur, eo in loco, ubi huius generis pisces degere conjectura est: Hic cum pisciculo pariter hamum devorant, & capiuntur. Piscis est admodum laudatus & boni saporis, tum assus, tum elixus. A plerisque tamen parvi æstimatur, quod idoneum coquendi modum nesciant: nam nisi ritè coquatur, sive asses sive elixes, in partes aliquot dilabitur: quod si integrum servare velis, non in fervidam, ut alios plerosque pisces solemus aquam, sed ab initio statim in frigidam præparatam immittes, ut pariter cum aqua concal fiat: tum condies, saliesque, & ad juris ferè consumptionem coques. Assandum verò, desquamabis, exenterabisque similiter: deinde sale diligenter consperges & perfricabis, & per duas

horas in sale relictum, tandem assabis: ita bonus & grati saporis piscis erit.

Sunt qui pisces assari solitos, simpliciter assent, ovis (aut lactibus) solum non exemptis & salviâ infarctâ. Alii ova seu lactes, cum hepate & liene exempta, minutatim concidunt; adduntque multum piperis ac caryphyllorum, salem, uvas passas minores, vitellum ovi, hanc impensam in piscem infarciunt; & assant, putantque ita salubriores fieri.

ARTICULUS IV.

*De Orfo Germanorum seu
Capitone subrubro Gesneri.*

ORfum Germani vulgo *ein Orff* TAB. ^{Aldrov. de}
genus hoc Capitonis vocant, XXVI. ^{piscib. l. 3.}
(inquit idem Gesnerus) quod mihi 9. ^{c. 12. 23}
videre nondum contigit, præter- TAB. II.
quam Augustæ Vindelicorum o. 7.
lim in piscina quadam, ubi mihi in-
tuenti Cyprini colorem præ se fer-
re videbatur, aqua forte visum meum
mutante. Ibidem depictam iconem clarissimus medicus Achilles Pyraminus Gassarus mihi communicavit.

Dorso est rubicundo, ventre albicante, *squamis* (ut apparet) magnis & latis. Assi laudantur, præcipue Aprilis, & Maji mensibus. Linea à branchiis ad caudam, an probè adeo recta (præter plerorumque piscium morem) expressa sit inquirendum. Germanicus liber qui Bavaricas Constitutiones continet, eadem forma piscem hunc delineatum proponit, digitos 12. vel 13. longum, quâ longitudine inferiorem capi non liceat: cum vulgarem Ausonii Capitonem, vel novem digitos longum capere concessum sit: unde hunc (Orfum dico, qui tamen ab Orpho marino pisce toto genere differt) ad molem multò majorem ex-
crescere conjecerim.

In diversis Germaniæ partibus aliter atque aliter (proximis tamen se vocabulis) nominatur, *Driff/ Erfle/ Norfling/ Wurffling*: alicubi etiam *Elfr*, idem ni fallor. (Apud Hollandos *Elfr* est *Alofa*:) Intempestive captum, spinulis seu aristis redundare ajunt. Duorum generum hunc piscem esse audio: assatos alios carne alba esse, qui Augustæ vulgo *Weissfisch* appellantur: alios rubicundâ vel flavescente, Truttæ Salmonatæ instar. Piscem Norinbergæ quoque in Begniza fluvio frequentem esse aiunt; præferri genus illud, cuius caro rubeat: in superficie discrimen nō apparere: *squamas* paulo latiores esse, quam in Thymallo: carnem siccam, & friabilem, salubrem, ut vel purpureis concedatur, minus suavem quam Truttarum. Bellonius quoque visa apud me huius piscis effigie, forma ad Squalum (id est Capitonem fluviatilem) eum accedere ferebatur. Piscem audio lautum, & in pretio esse: muscis vesci. Cyprino minus lautum esse, sed crassiorē: non in aquis fluentibus, nec in lacubus, sed in piscinis fermè reperiri, apud Vindelicos, Norimbergæ, & alibi. Sunt qui *Pigo Picone* pisci Larii & Verbanī lacus eum comparent: & similiter certo anni tempore è squamis ceu clavos quosdam emittere mihi retulerint. Ad Cyprinos neigitur magis an Capitones pertinet, iudicandum illis relinquo, quibus in promptu hi pisces sunt.

CAPUT VII.

De Leucisco.

TAB. XXVI. **L**euiscisci nomine omne Mugilum genus Hicessio apud Athenæum. 10. 11. 12. venire superius, ni fallor, diximus. Aldrov. de Piscib. l. 5. Galenus suæ speciei piscem *fluviatilem* & *lacustrem* facit. Salvi- 5. 22. nus Squalum esse, idē quod cum Galen. de Galenus τὴν γαῖαν ὀξύτερον habere scri-

bat (sed erperam, Legendum enim *Alim. fa-* est, καὶ φάλην ἔχον μικρότερον καὶ ὀξύτερον) *cult. l. 3.* credit; Modernis Græcis *Leucorinus* dicitur. Bellonius, *Albicellam* Bellon. de commodè vocari posse scribit, apud *Aquatil.* alias nationes, Germanos inprimis, l. 2. varia sortitur nomina. In Germania, circa Argentinam *ein Lauck/ Helvetiis* diminutiva voce *Laugele*, quo nomine Gelenus dici conjiciebat (inquit Gesnerus) quasi *λυκιδον*, id est Albiculam, tanquam olim sic appellassent Græci, & ab iis mutuati essent Germani. In quibusdam Helvetiorum lacubus, ut juxta Tugium & Bielam *Vvinger* vocitatur, ut à Sabaudis circa Neocomum *Vengeron*.

Diversus tamen ab his piscis est Vangeron in Lemano dictus, cui Helvetii à rubore pinnarum nomen posuerunt. Brelenpes etiam *Onhoft*, id est, acephalos nominant hos pisces: amputatis enim capitibus, siccatos, alio venales mittunt: cum minimi densis agminibus narant. Helvetiis *Seelen* id est animæ dicuntur.

Acronii lacus accolæ nomini- bus variant; *Grasig* Lindaniæ vocant: Vberlingæ *Laugele*; Constantiæ dum parvi sunt, *Ziensfische* vel *Grasig*: adultiores, *Agonen*, *Agunen*, *Lagenen*. Aiunt enim piciculos esse vix longiores palmo, *squamosos*, quibus multi abstineant, quod circa latrinas pascantur: suo tempore tamen commendari.

Æstate, inquiunt, innascuntur eis vermes, quos vulgus, *Nestel*, nominant, quo tempore insalubres habentur.

Ova gerunt usque ad Junium, deinde pariunt. Non solum autem inter se, sed cum illis etiam piscibus latis lacustribus, quos Helvetii *Rotten* vocant, & cum Scardulis five Cyprinis latis coeunt, unde piscis genus enascitur, inter utrumque parentem medium, *ein Drissfisch*.

Sed

Sed alius est Agonus in lacubus Italix, & Germanicum nomen Graſing cavendum, ne quis cum diverſo fluviatili piſciculo confundat, quem Greſzling, vel Krefzling nominant. In Dunenſi Bernenſium Helvetiorum lacu, *Blauwinling*, id eſt, cæruleus, hoc genus Leuciſci dicitur: noſtri longè aliud lacuſtre tantum genus ſic vocant. *Glyſſen* à ſplendore factum, commune eſt piſcibus illis qui vulgo dicuntur Laugelen aut Suualen.

Squamis mediis tegitur, quæ lineolis diſtinctæ ſunt. Nonnulli cum priore Rondeletii Leuciſco confundunt, ſed corporis, inquit hic, latitudine differt, roſtroque eſt acutior, alioqui pinnis, earum numero, & ſitu ſimilis eſt, Romani piſcatores à Squalo, teſte Bellonio, non diſtinguunt: neque enim adeò exactè piſces fluviatiles, ut Galli, internoſcunt. Etenim Leuciſcus aſpectu multo hilarior, quam Squalus, minoribusque ſquamis contegitur. Albo colore nitet, & veluti inter ſquamas ſtriis rectis interſtingitur. Caudam bifurcam & pinnas albas proferret, neque ita latas, ut Squalus. Hic præterea Leuciſco maior evadit. Alburnus eidem ſimilis eſt Leuciſco; tamen eſt paulo latiore corpore, & ſquamis elatioribus, ac labro inferiore melius inſarſto. Eſt etiam nonnihil diſcriminis in lineâ, quæ utrinque corpus interſecat: ſi quidem Leuciſco non tam arcuata eſt, quam Alburno, & Alburnus rotundiori corporis compage conſtat, ad Cephalum magis accedente. Bellonius nulla ait habere *dentium* rudimenta, verum fortaiſſis haud diligenter inſpexit, Geſnerus namque in faucibus utrinque mandibulam curvam quinis armatam denticulis repperit, ut in Bellerio. Albertus utrinque mobilem in faucibus mandibulam habere ait. In Pado (ut Geſnerus obſervavit) dodrantem nunquam excedit; craſſitie fere æquali per totum corpus, à capite ad uſque caudam. Os aperitur in oblongum, nec prominet mandibula ſuperior. Addit

item Geſnerus apud ſuos paulo maiores capi in fluvio quam in lacu; longiuſculos eſſe, non latos, Haſelis non diſſimiles ſpecie, paulò breviores, ſi bene meminit: Dorſi colore eſſe fuſco, flavo, & viridi ferè permixtum eſſe. *Pinnas* albicare, vel nimium ruſſi admixtum habere, lineam qua terminatur laterum color, inſtar iridis reſplendere ex flavo & viridi calore. Rondeletius quoque ex fuſco partim viridem eſſe, partim flavum dicit, *ventriculumq;* habere parvum, hepar magnum, & in hoc fellis veſicam: denique multum *pingueſcere*. Quo loco in cibis haberi debeat, apud Galenum legimus, qui conditam ſeipſo meliorem effici, quod quicquid in ſapore eſt mucoſi abjiciatur; meliorem recentem, diutius in muria ſervato, ſcribit. Teſtatur Bellonius, *Bellon. de Aquatil. l. 2.* nondum proveſti magnum numerum veris initio capi, modicoque ſale conſperſum atque exiccatum, Byzantium deferri, vendique Maio, Junio & Julio menſibus. Eo um capturam maiorem fieri ex Epiri lacubus, Venetosque his maxime uti, ad ſequenavibus adferri curare, & eodem vocabulo cum Epirotica lingua, quæ Scouranicos dicit, Scourancas nominare: quæ cum Leucorinis, inquit, maiores ſunt: ambo tamen piſces ſale conſperſi & fumo infecti atque exiccati, ad externos mitti, ut noſtri Harengi foreti, conſueverunt. Sic Bellonius. Geſnerus commendari ſcribit Aprili & Maio menſibus, Februarioque non inſuaves inveniriſſe, quo tempore lactes in mare pleni erant, eodemque menſe à ſuis laudari. In Italia quidem, hyeme in primis capi. Veru toſtos, ſale, aceto, olivo, pipere, & cinnamomo conditos Grapaldus laudat: & Rondeletius denique molli ſuavique carne eſſe tradit, & pinguedinem eius aurium doloribus ſuccurrere, & cum felle eiſdem permixtam oculorum caliginem abſtergere.

CAPVT VIII.

De Leucisco primo Rondeletii.

TAB. XXVI. **H**Æc Leucisci species, in Italia *Lascha*, in Gallia *Hardon*, quod facile per longum tempus in vasculis aquatilibus seruari possit, alibi apud Italos *Dorada*, quod in eo tractu caput eius aureo colore fulgeat, Helvetiis *Roterigle*, quasi *trytrophthalmos* dicitur. Bellonius *Sargum Sargonemve*, qui inter marinos Mugiles fluuios subeuntes, ab Aristotele recensetur, perperam voce cavit. Capitoni seu Cephalo fluuiatili corporis aspectu, pinnarum numero, situ, figura, squamis similis: sed capite est minore, corpore latiore. Dorso cæruleo cervice viréscente, ventre candido, oculis flavescentibus. *Dentibus* caret. Imò palato ossa habet. Bellonius ad Cyprini magnitudinem unquam accedere negat: atque corpore quam *Squalus*, compressiore esse, pinnaeque habere subrubras, paruos item Gardonos pinnam caudæ longiorem exerere quam *Leuciscum*: (sic vocat piscem proximè præcedentem) & antequam in extremum pinnæ, quæ bifurcata est, desinat, rotundari: Latiusculis *squamis* contegi, ipsoque capite magis ad *Leuciscum* quam ad *Squalum* accedere. Oblongius & paulò crassius habere corpus, quam *Abramis*, ac denique tergore esse magis quam *Squali* nigricante, & auri colorem referente. In Ambra Melegnarum alluente numerosè capitur. Sed & Peni sinus lacus delicatissimos profert. Alacres sunt & videnti omnes ova habere, & foeminae esse creduntur. Solidiuscula illa & ruffa. Partus Aprili inchoatur, & ad Maii pergit medium. Laudantur antequam pariunt, Ianuario, Februuario, Martio & tota hyeme mediocriter: sunt qui Aprili, & Maio commendant. In vinum fervidum

immissi elixantur. Rondeletius carne esse fluxili & parum nutriente dixit.

CAPVT IX.

De Oxyrincho Rondeletii, Corvo Nilotico & Naso Alberti Magni.

OXYRINCHI nomen inter poly-TAB. fema censetur. Diphylo apud A-XXVI. thenæum Mugil est, fluuiatilis; idem, 13. ut Rondeletius insinuare videtur, Aldrov. de cum superiori Gallorum Gardono: Piscib. l. 4. Straboni, Æliano, aliisque inter Nili 6.24. pisces recensetur: eidemque Æliano rubri maris quoque piscis est, ac denique maris Caspii, ut in Sturione dictum est. A quibus omnibus differt, (ni fallor) *Oxyrinchus* iste Rondeletii, Antverpiensibus *Hautin* vocatus, rostro longo, tenui & maximè acuto, unde *Oxyrinchium* rectè à se appellatum fuisse putat, nisi mavis, inquit, *Sphyrænæ* fluuiatilem vocare, quia marina *Sphyrænæ* rostrum simile habet, molle & nigrum. *Squamis* melioribus tegitur. *Pinnas* in dorso tres habet, in æquali spatio à sese distantes: totidem in ventre habet, quot *Barbus*. Quærendum nunquid idem sit, qui Frisii *Snepel* appellatur, à *Scolopace* ave, puto, quam *Sneppam* dicunt; Galli verò à rostri proceritate *beccassam*. Gesnerus in Albi fluuiio quendam quoque piscem *Sneppelsingen* vocari tradit, sed à superiori diversum, paruum nempe, & candidum, Capitoni fluuiatili similem.

CORVUS Niloticus, corpo-TAB. ris figura Mugilibus similis est, sed XXII. caput pro corporis portione (longum enim dodrantes duos) paruum Aldrov. de Maxilla inferior superiore brevior. Piscib. l. 5. Pinnæ ad branchias, utrimque una 6.25. & 26. breues: in tergore ultra medium alia oblonga: in supina parte à podice alia:

alias in ventre una, de pisce hoc, quod præterea dicam, non habeo.

TAB.
XXVI.
15.

N A S V S ab oris figura seu naso valdè crasso, nomen sortitus est. Nasum vel Nasutum benè dixeris: & quia labrum seu rostrum superius crassum, simum obtusumque habet, non malè Græce Pachyrinchus & σιμὸν, Latine Simus vocabitur. Genere Squalo ac Leuciscis fluviatilibus adscribendum esse, & corporis totius figura indicat, & Albertus quoque attestatur Monacho, hoc est, Capitoni fluviatili similem esse inquam, sed tenuiorem, naso valde crasso. Et Gesnerus esse tradit, qui fluviatilibus Barbis hunc piscem comparant, quod ad corporis speciem: aliquos piscibus Erflen vulgo dictis apud Germanos. Ipsi vero specie, squamis & colore Capitonem fluviatilem referre videtur: sed ad eam magnitudinem, inquit, non perveniunt. Lonicerus duorum triumve palmorum magnitudine esse ait, & oris formam peculiarem habere. Venter eorum intrinsecus nigerrima membrana ambitur: unde joculari nomine Germani hunc piscem, scribam cognominant. Os modice deorsum vergit. Lapidem habet in capite, teste Alberto. Capiuntur in fluviis & rivis. Libenter enim in rivos ascendant, inquit idem Gesnerus, in lacum non veniunt, nisi ad initium eius tantum, præsertim vere. Albertus Danubii piscem esse ait, & aquarum in Danubium influentium. Cæno & spurcitiis vescitur. Caro alba & laxa est, spinulis referta, ut & Capitonis & aliorum multorum fluviatilium, præsertim circa caudam. Verno tempore præferuntur & pinguescunt. Apud Helvetios tamen Novëbri mense laudantur: si modo unquam laudandi sunt. Nam caro eorum semper laxa & insipida est: quam obrem aliare eos potius quàm elixare coqui solent. In Rheno præstantiores habentur. In libello quodam Germanicè vulgato de piscibus, Febuario & Martio & cum salices stillant, eos præferri legimus. Hæc ferè Gesnerus.

CAPVT X.

De Gobio fluviatili.

ARTICVLVS I.

De Gobio non capitato.

G Obio fluviatilis est duplex. U-^{TAB.}
nus non capitatus; alter capita-^{XXVI.}
tus. NON CAPITATI Dorion a-^{16.}
pud Athenæum inter fluviatiles me-^{Aldrovand.}
minit, fortassis & Aristoteles, dum^{de Piscibus}
eos in fluviis pinguescere scribit. Me-^{l. 5. c. 27.}
diolanensibus Varira, fortè quasi va-
rius. Ubique enim rotundis nigris
maculis distinguitur, vocatur Ger-
manis *Kresling*, aliis Leuteffer, quod
cadaveribus submersis vescatur. A
Gesnero ita describitur. Gobio no-
ster, ein *Gresling* / quem nuper ca-
ptum in lacu, inspexi, mense Ianua-
rio ovis gravidus erat: barbatulus,
cirris singulis in angulis labiorum
per brevibus. Pupilla oculorum ni-
gra, ambitu candicante. Macula à
capite caudam versus per media u-
trinque latera nigricantes, rotun-
dæ, magnæ proportionem, circiter de-
cem, singulæ deinceps digeruntur:
& similiter per medium dorsum.
Cauda etiam maculosa est, & dorsi
pinna. Vesica bifida, magna pro-
portione. Longus est plerumque
quinque aut sex digitos. Fel habet
subviride, caudam bifurcam. Os
cum aperitur rotundum & veluti è
præputio se exerens, deorsum nu-
tat. Lapilli in cerebro perexigui sunt.
Hæc ille.

Squamis tegitur parvis. Quam-
vis ab Aufonio, qui eum *Barbi jubas*
æmulari cecinit, fluviatilibus ac-
censeatur, in lacubus tamen quo-
que capitur. Degit in fundo &
cæno, unde Fundulos quibusdam
vocari etiam diximus. Vescitur
musco vel alga, item arenulis, & hi-
rudinibus minimis lacuum. Cre-
ditur cadavera hominum submer-
sa depasci, unde nonnulli anthro-

pophagum dicunt : quæ res aliis fortassis anſam præbuit , ut ex cerebro equorum procreari dixerint , quod quidem in aquas abiectis veſci , à ratione non eſt alienum , nam & Bello-nius teſtatur calvariis bubulis in aqua proiectis oblectari , eiusque gnaros Ligeris accolæ , calvarias eas ſtudioſè adſervare iis denique in Ligerim immerſis , Gobios allicere , ut facilius eos poſtea capiant . Idem teſtatur Rondeletius . *Capiuntur* autem facile & magna in copia , inquit Geſnerus , circa ripas lacus noſtri retis genere , quod Stoßbaren appellant .

Aliquando bis aut ter anno *pariunt* . Æſtate vermiculis quibuſdam in ventre vitiari dicuntur , teſte Alberto . Rondeletius *carne* ait eſſe molli inſipida , virus nonnunquam reſipiente : fallique medicos , qui Gobiones fluviatiles ægris apponi volunt , his eam in eſſe ſucci bonitatem exiſtimantes quàm Galenus in marinis commendat , ab hiſce enim illos hac dote multum ſuperari . Cœnum aliquando reſipiunt . Author denatura rerum , ſalubriores eſſe ait , ubi aquas arenofas in nutrimentum habent . Et Geſnerus elixum ſatis ſolidum eſſe teſtatur , nec contemnendum in cibo .

N. Ad Gobiones referimus piſcem Rheac Mæni alumnum rariorem quem Obriſſ / ſeu Obreſſ / q. Obreſſ / Piſcatores vocant. Ambire enim videtur inter Gobionem & Percam. Huius iconem, exhibet Tab. 31. ea ſigura ac magnitudine, qua cum duobus ſociis caprus eſt non procul Francofurto, 16. April. 1649.

ARTICVLVS II.

De Gobio capitato.

TAB.
XXIV.
9.
Aldrov. de
Piſcib. l. 5.
s. 28.

Gobio Capitatus nomen iſtud à Capite pro corporis ratione maximo accepit . Non tantum apud Italos , ſed & inter Germanos varias ſortitus eſt appellationes . *Gropp* dicitur inter Helvetios , *Cop* vel *Kop* in Ca-

rintia , *Kaolrappia* Franconia : alicubi *Mul* , circa Tridentum (qua parte Germanice loquuntur) *Tholiman* . Saxones & Miſeni à capite , quod ferè globi inſtar rotundum habet , ſed compreſſum , varia ei nomina fecerunt : *Keuling* , *Kulingk* , *Kulheit* , *Kaulheupt* . Anglice à *Bulhed* , à capite taurino , quaſi Bucephalum dicas , nempe ob magnitudinem , non ſimilitudinem formæ . Rondeletius & Bellonius *Βότρυς* vel potius *Βότρυς* aut *Βότρυς* . *Aristoteles* eſſe volunt ; ſed cum is duntaxat in fluviis ſub ſaxis ſtabulari , quod & aliis competit ſcribat , nihil definiri poſteſt . Cremonenſibus *Bot* vel inde vocatur , quod Buſonem , qui Botto vulgo , deformi oris riſtu referat . Piſculus eſt ranæ piſcatrici ſimilis , ſi parva magnis (inquit Rondeletius) conferre licet , corporis figura & colore . Capite enim magno eſt , lato & depreſſo . *Oris* magno hiatu , ſine dentibus : ſed pro iis labra inſtar limæ aſpera habet ; *pinnas* binas ad branchias , rotundas , & ambitu pulchrè criſtatas : duas alias inferius parvas , longiuſculas , albicantes in medio ſummi ventris : aliam ab ano ad caudam : in dorſo quoque geminas , non ſingularem , ut Rondeletius ſcribit , qui aliam fortè ſpeciem , inquit Geſnerus , nobis ignotam vidit : nam & cauda quam ſuo attribuit Cotto , proportionem multo longior eſt , quam in noſtro . Ex his dorſi pinnis brevior , quæ capiti propior , altera longior caudam verſus , quam tamen non attingit : idque in fluviatili & lacuſtri genere ſimiliter . *Oculi* ſurſum ſpectant . Branchias quaternas habet , *hepar* magnum ſine felle . Si corpusculum ſpectes , ventriculum magnum . *Fœmina oris* immodicè turget , quæ in pectore in globos collecta , geminas veluti mamillas præ ſe ferunt , & membrana veſtiuntur nigricante . *Lapillos* in capite habet . Qui in *lacubus* degunt , (ut Tigurini lacus exemplo oſtendit Geſnerus) non ſolum magnitudine inferiores ſunt *fluviatilibus* : raro enim ultra digiti medii longitudinem excreſcunt ; ſed ſpecie etiam differunt .

Bellon. de
Aquatil. l. 2.

etſi

et si vulgus forte non discernat. Nepe, colore magis albicant, cum illi nigriores sint. (Corpus varium est, partimque albicantibus partim fuscis punctis, & maculis etiam nigricantibus transversis distinguitur) *Spinulis* circa branchias pluribus & acutioribus, brevissimis tamen illis, & visum pene latentibus horrent; quibus digiti etiam, si retro ducas, configuntur. *Pupilla* oculorum aliqua ex parte pulchre virescit, & gemæ instar resplendet, præsertim ad solem. Elacu in fluvium non migrat: neque fluviatiles in lacum Gustus etiam suavitatem fluviatilibus longe sunt deteriores. Icon quam dedit Aldrovandus Gesneri est, diversa nonnihil ab ea quam Rondeletius exhibuit, pinna dorsi singulari, & cauda penicilli instar, longiuscula: unde suspicari licet, aliud genus Corti circa Monspelium haberi. *Degunt* in rivis frigidis ac montanis, & fluviis præcipitibus, sub lapidibus & inter Saxa. *Carnivori* creduntur, & à se mutuo devorari certum est. Mense Martio circa festum Paschatos *pariunt*. In aqua fundo non tam natant, quam subito impeditu teli instar se vibrant, & quo volunt traiciunt. Gesnerus testatur, legibus piscatoriis licere, eos capi in flumine à Calendis Novembris usque ad Pascha: extra verò illud tempus, nec retibus, nec fuscina, neque alio modo licere: hamo autem nunquam. Nassis uti permissum esse, à die D. Marci usque ad exitum Maij, non æctius tamen contextis, quam ut Gobij capitati evadere queant. Cocta esse suavissimos & origratissimos cum ovis, quæ pingua, copiosa, & delicatissima, Matthiolus prodidit. Carne molli, Rondeletius, dura Albertus fecit. Apud Helvetios fluviatiles dūtaxat, & quidem circa brumam & Ianuario mense in deliciis sunt, quidam à Calendis Decembris ad Calendas Aprilis commendant; omnes, capita, quod spinis tantum cureq; constant, reiiciunt. Placent & frixi.

CAPUT XI.

De Aspero Pisciculo.

Huius Rondeletius meminit, eodemque à maxillarum asperitate cognominatum inditum, aitque Lugdunensibus *Apron* appellari propter squamarum asperitatem, Rhodanoque peculiarem, cæterum non quovis eius loco, verum in ea ferre parte reperiri, quæ inter Viennam & Lugdunum interiecta est. Pisciculus, inquit, est *capite* latiore, quàm Gobio, in acutum desinente: ore medio, *dentibus* caret: sed maxillas asperas habet, foramina ante oculos. Colore est rufus, maculis nigris latis, à dorso ad ventrem oblique descendentibus varia: Pinnas ad branchias, & in ventre similes cum Cottis habet, sed in dorso dissimiles: duæ enim sunt à se se iunctæ. Vulgus ait pisciculum hunc auro *vesci*, quia arenam cum qua nonnunquam auri laminæ sunt, haurit. *Carne* est ficiore quam Gobio.

Ad hunc referri potest, & is *piscis* Danubianus, quem Iulius Alexandrinus ad Gesnerum dedit. De eo ita Gesnerus, Forma quidam tota, & singulæ ferme corporis partes, inquit, in utriusque pictura cōvenire videntur, nisi quod pinna ab ano in nostra icone nulla est, pictoris forte incuria. Nulli enim piscium, opinor, hæc pinna deest. Rondeletius *Lacertum* peregrinum suum sine ea pinxit, quam Salvianus eidem addidit. Bellonius in sola Tænia hanc pinnam se non reperisse mihi retulit. Piscis quem exhibemus, Germanicum nomen est *Zindel*: velut alij scribunt, *Zinde*, *Zindel*, *Zinne*, *Zingel*. Ungari *Kolcz* appellant. Icon ad me missa, digitos XII. longa est; quam longitudinem in hoc pisce mediocrem esse audio. Colore est, partim è fusco rufescente partim nigris *maculis* satis magnis per intervalla distinctus: quarum aliquæ à dorso ad ventrem, qui cinereus est, oblique tendunt. *Oculis* color Indicus: & ali-

quid sub eis rubri. Audio eum ad libræ pondus, id est, unciarum XVI. accedere: (alii etiam trilibrem fieri retulerunt) *caudam* adeo duram habere, ut vix amputari possit: pinnas in dorso aculeatas in capite Percæ instar, (icon nostra pinnas molles, non aculeatas, præ se ferre videtur) nostrum acuminatum; carnem candidissimam. Sunt qui forma & colore Cani marino comparent: alii Lucio, præcipue quidem capite: absq; *squamis* esse aiunt, instar Anguillæ. (Rondeletius Asperum suum à squamarum asperitate vulgo Gallice Apron dictum ait) Lautissimum esse addunt simul & *saluberrimum*, omnium Danubii piscium, ita ut vel puerperis apponatur, & divitum duntaxat mentis oneret: quod equidem miror, si squamas non habet: fere enim omnes qui *squamis* carent, minus salubres existimantur. *Ferunt* eum Danubius & Tibiscus, In Danubio prope Bosoniâ magna eius copia capitur. Viennæ etiam non deest; & in Bavariæ fluviis, ut Isara & Leisaca: hic quidem è latu Ammelse fluire in Rachelsee lacum, & inderursus in Iseram fluviû. In piscinis servari non potest. Eiusdem piscis effigiem illi quam dedimus, similem, coloribus tantum diversam (ventre & pinnis albicantibus) Raphaël Seilerus Iurisconsultus doctissimus, comes Palatinus, clarissimi Augustanæ reip. archiatri Geryoni filius, ad me misit: in qua similiter nulla abano pinna, nullæ squamæ apparent.

CAPUT II.

De Cobitide fluviatili.

ARTICVLVS I.

De Cobitide Rondeletij.

TAB.
XXVI. 20.
Aldrov. l. 5.
de Piscib.
c. 9.

TRiplex invenitur *Cobites*, fluviatilis Rondeletij nempe, *Aculeata*, & *Barbatula*. De illa ita ex Gesnero, & Rondeletio Aldrovandus. Idem Rondeletius fluviatilem hunc pisciculum antiquis, qui de fluviatilibus

parum fuere solliciti, in dictum, *Cobiten*, *Cobitidem*, fluviatilem nuncupavit, quod marinæ, inquit, persimilis sit: cum alioqui neque situ neque numero pinnarum cum marina conveniat; quare similitudo isthæc ad *Cobitidem* barbatulam potius pertinet: ad hæc *Cobitis* marina lævis est, uti & *Barbatula*; contra squamosus, quo de loquimur, pisciculus est, nisi figura exhibita nos fallat, quod quidem suspicari licet. Ipse enim Gallis *Loche franche* vocari asserit, vel quod totus lævis sit, & aculeis careat; vel quod mollior sit, & salubrior: quãobrem *Cobiten* forte hunc pisciculû, inquit Gesnerus vocat, quod ad *Gobionem* fluviatilê Aufonij accedat, non ad marinam *Cobitin*. *Degit* in rivulorum & fluviolorum ripis, digitali magnitudine, rostro satis prominente. Corpus flavescit, & maculis nigricantibus notatur, subrotundum est & carnosum. *Pinnae* duæ sunt ad branchias, duæ in ventre, unica ab excrementi meatu, unica in dorso. Gesnerus cum hoc piscitio idem putat, vel saltem simillimum, suis *Ryserle* nuncupatum; *Digiti*, inquit, longitudinem parvum excedit, colore per dorsum è cæruleo virescente, per latera & ventrem candido. In Silo torrente capitur ad Tigurum circa lapides: & ex eo Limagum amnem ingreditur, inter lautos pisciculos habitus Rondeletio suis *Cobites* carne est humida, & viscida: si in aqua sordida & cœnosa nutriantur, pinguescit, sed multo insalubrior redditur. Pro *Cobite* Rondeletij nos aliam iconem dedimus, eiusdem ni fallor, piscis

ARTICVLVS II.

De Cobitide aculeata.

C*obites aculeata*, quæ *Mustela* parva imberbis dici posset, Gallis est *Perce*, quod *Petras* quasi videantur perforare (duos habent in branchiis aculeos, utrinque unum, ad caudam spectantes, dentium cœrastris longitudine, quibus sese impellunt, ut minima

TAB.
XXVI. 21.
Aldrov. l. 5.
de Piscib.
c. 30.

nima inter lapides foraminula subeant) Germanis Steinbeis, seu Dacobythus, Oxyrinchus non incommodè, aliis. Pisciculus est inquit Albertus, eodem colore quo Fundula. Non est autè rotundus, sed quasi columnalis compressus, & habet spinā acutam iuxta os, qua cum recurvato capite vulnerat manum se tangentis. Bellonius quoque & Rondeletius aculeum in operculis branchiarum utrinque unū habere tradunt. Albertus branchiis ipsum carere omninò ait; cuius errorem detegit nuper Georgius Fabricius, qui parva foramina circa oculos eis, sicut in Lampredis inesse observavit, teste Gesnero, qui pisciculum esse ait exilem seu tenuē, & oblongum, Fundulo, de quo mox, similem, paulo longiorem: nam quatuor aut quinque digitos æquare solere: maculosum, capite acuto & dorsum vergente. Rondeletius spinā internam duram quam in præcedente rigidiorem esse monet, ideoq; inter edendum molestiorem esse: sapius vero etiam ichtyopolas parū cautis imponere, & pro levibus vendere, cæterum imposturam inter edendū facile deprehendi. *Degit* in aquis fontanis & rivis præcipuè. Ex his vero migrans cum alios fluvios, tū Albim maxime subit, ut Gesnerus refert, qui & apud suos nullum aut certe rarissimum esse scribit, circa Argentinam vero frequentiore, & ex Georgij Fabricij testimonio in Misena optimos capi in Mulda prope Doblā opipidum: in herbis, algis & cæno *degere*, atque inde *victitare*. Majo mense cū Fundulis parere, aliquando vel bis vel ter. Rostro lapidibus mordicus se affigere, & aliquando vasis etiam, licet æneis, quibus in foro piscatorio à mulieribus, inquit, iniiciuntur, ita ut fugere videantur. Esse quando cōplures gregatim hærentes inveniuntur. Rebus angustis, id est, quorū perangustæ sunt maculæ, capi, cum aliis pisciculis circa ripas fluminum. Bellonius pisciculum esse scribit admodum *vivacem*. Eidem delicatissimus est: contra insinuare nobis videtur Rondeletius in cautis pro lævi Cori-

tide obrudi iniquens, fraudemq; edendo detegit: & Gesnerus vilissimos vocat, carne tenaci, Fundulis multo ignobiliores. Aprili mense & Majominus improbari; præferri gravidos: frigi debere butyro: Misenos circa bacchianalia, & Martio mense eos commendare, antequam migrent, quod tum ovis gravidi sunt: præstantiores apud eosdem non in Albi, sed in Mulda capi.

ARTICULUS III.

De Cobitide Barbatula.

Cobitis ista *Barbatula* nomen à Cir-^{TAB.}
ris tenuibus è rostro barbæ mo-^{XXVI.}
do dependentibus obtinuit. Alber-^{22.23.}
tus M. Fondelam, Germani Grinde-^{Aldrov. l. 6.}
la vocant. Gesnerus Mustelam flu-^{31.}
viatilem dici posse putat. Indicis digiti crassitudine est, inquit Bellonius, quinque digitos longa (pinguis Lochia) tota puncturis seu punctis distincta: notæque in tergore & lateribus habet, nunc grandes, nunc parvas ac nigricantes, quibus ipsa etiam quoddammodo pulla apparet; sed ventre est candido. Pinnam utrimq; unam in lateribus gerit: item in ventre duas, in tergore vero summō unā admodum parvam: item sub cauda ad anum alteram. Pinna caudæ rotunda est: reliquæ omnes, obtusæ & latæ. Cirris quaternis, utrinque, duobus (Barbi modo) tanquam mystacibus insignis est. Os habet parvum sub longo *naso*: ejusque *intestinum* statim à stomacho (quem hepar fovet) reſta per ventrem ad anum ducitur. *Fel* dextro hepatis labo adfuturum: *Lienem* insignem, & rubrum habet. *Cor* sub branchiis, suo pericardio obvolūtū, *ova* singulari vesicula, ut aliis piscibus bicorni folliculo conclusa. Hæc ille. Duo *genera* esse huius pisciculi Georgius Fabricius Gesnerum in epistola monuit. *Vnum* commune, quod in deliciis habetur, & insigni magnitudine apud suos (Misenos) capitur in Flohi amne: alterū & tenuitate corporis, & colore & sapore diversum, quod à Saxis nomē est consecutum, Stein-

Steinsmirlin. Limpidis & saxatilibus locis gaudent, quamvis & circa ripas & in cœno, unde Mosgrundel dicitur, reperiantur. Plurimi in rivis quibus maiora flumina ingrediuntur, capiuntur, idque præcipue Februario, Martio & Aprili. Gesnerus medio mensis Maij *capios*, ovis gravidos vidit; aitque post Pascha parere incipere: quamvis non desint, qui vel singulis mensibus eos parere asserant. De *visciporum* in cibis ita Aldrovandus. Tam delicatus pisciculus est, ut Lonicerus inter omnes ferè primatam tenere scripserit. Teneros tamen præsertim & nuper natos in deliciis haberi, Gesnerus ait, eosque cum iure coctos ex eodem, quod mireris, cū pane cochlearibus edi: quas delicias, inquit, aliquando circa summum Acronium lacum gustavi. Salubres vulgo existimantur, ita ut medici etiā ægrotis alicubi eos permittant. Esse sanctolidiuscula carne, & odore non piscoso, ut alij pleriq; sed magis grato, idem Gesnerus asserit, & cum exigui sint, nec pingues, non multum replere: præferri à Misenis maiores, & qui à saxis denominantur: colore saporeque differre, corpore tenuiore, carne duriore, & quæ in elixis tenacius spinis hæreat: Commendari maxime à natali Domini usque ad Pascha, quoniã tum parere incipiãt: alios Februario, Martio, Aprili mensibus eos præferre, usque ad initium Maij. Teneros verò nunquam non laudari, maxime si cum apio, petroselino, edantur. Vino calido iniecto elixari debere, idque brevi tempore & sub finem modico aceto affuso, ad eius fere consumptionem coquendos, quomodo Gobij capitati etiam parantur.

CAPUT XIII.

De Phoxino squamoso.

TAB.
XXVII.
§.6.

QUID de Phoxino Aristotelis statuendum sit, ex ipsius verbis colligere difficile est. Statim enim ac natus est ova habere, & semel in an-

no in stagnis fluviorum & arundinetis lacuum, quæ *πολιμνάδες* vocant, ova ponere dixit. Rondelerius eo nomine *duos* squamosos *pisces* describit. *Vnus*, quem in Picardia sub nomine Rosiere vidit, dimidiati pedis longitudinem nunquam superat. Corpore est lato & compresso, oculis magnis, colore luteo, bramis minimis, corporis specie simillimus. Semper utrum *ovis* refertum habet, ideo cum illis nasci piscatores tradunt. *Alter* vocatur à rubore caudæ, Rose. Reliquo inquit corpore cæruleo est, paulo maior, minus læso corpore, *ovis* semper plenus, etiam maximus. Cū priore eundem esse coniicit, qui apud Helvetios Bambela vocatur. Gesnerus. Pisciculus, inquit, est tres aut quatuor digitos longus: sex quidem digitis longiorem non vidi. Caput ei crassiusculum pro sua magnitudine, nigricans, iris oculorum crocea: qui color etiam ad pinnarum initia omnia spectatur, in pinnæ dorfi quoque initio, in maioribus & adultis. *Pinnarum* ad branchias articulus veluti carunculam quandam habet, in aliis parum, in aliis valde croceam (in aliis si bene memini, rubentem) pro ætatis nimirum & sexus differentia, fortassis & aquarum & regionum, in quibus degunt. *Squamos* habet albicanres. Linea fusca obliquè à capite ad caudam fertur. Pinna in dorso medio unica est, binæ ad branchias, totidem in medio ventre, alia post anum. In principio caudæ macula atra notatur, & aliis minoribus, singulis, ad initia pinnarum utrinque. Dorsum & latera nonnihil flavescunt. Sapor in cibo subamarus: Reperiuntur influentibus solum aquis, ut audio: non etiam in lacubus & cœno, ut læves, quos è rivis, lacus & flumina maiora ingredi diximus: unde eos, læves, nostri à rivis Bachbâmele nominant. Idem in Glatto flumine apud Helvetios, parvo ac cœnoso, ab iis qui caneros captant, subinde inveniuntur, & abiiciuntur. A bacchanalium vel quadragesimæ initio usque ad Calendas Maij nallas non angustius contextas, quam ut Gobij capitati

A. l. 6. c.
13. 14.

Gesner. in
Phoxin.

bbberg f. 509.

tati & Bambelæ ex ijs evadere possint, in flumen immittere piscatoribus nostris licet. Bambelam nostram Itali quidam, ut audio, eodem quo Gobium fluviatilem nomine appellant, Varon. Verbani vero accolæ circa Lucarnum Stornazzo, vel stericulo.

CAPUT XIV.

De Bubulca Bellonij, & Rutilo fluviatili Gesneri.

PHoxino *Bubulcam* Bellonij subijcimus, quia eum priori illi, quem Rosiere Piccardi vocat cognatâ Gesnerus facit. Ita verò de eo Bellonius. Sordidus admodum & vilis pisciculus Gallico vulgo è re ipsa Bouvierâ nuncupatur: aliis Peteuse, etymologia à bombis obscœnis tracta. Piscis est Sequanæ alumnus, non tamen usquequaque frequens, ut qui nō semper appareat. Nam quomodo Verones pisculi nusquam Augusto, Sept. & Octobri tibi, aut saltem raro apparebunt: sic Bubulca sero in conspectum venit. Plurima vere capitur. Brēmam aut Castagnolam mariānam toto habitu æmularetur, nisi corpore esset minimo. Planus enim & latus est: sed & argenteo nitore refulget, atque orbicularem magis habet formam; quam in longitudinem protensam. Trium digitorum longitudinē excedit, neque sesqui digitalem latitudinem. Soli obiecta, nigri nihil habere comperitur, quam in linea, quæ spinam comitatur ad caudam. Parvam in tergore gerit pinnulam; oculorum pupillam, omniā nigredinē superantē. Squamis regitur magnis, & latis. Carneum quiddam, ut Cyprinus (quatenus parvum magnolicer conferre) in fornice palati ostendit, *branchias* utrimq; quaternas simplices, ac sub ventre totidem, caudā bifurcam. *Ore* est parvo, dentibus vacuo. Pisciculos istos respui credo propter fellis magnitudinem, quod vix possint exenterari, quia eorum

fellis vesica distrumpatur: quo pertotum corpus diffusio, plurimum amari invescendo sentiuntur: id autem sub hepatis lobo dextro coloris Smaragdini, magnitudine pisi continetur. *Folliculum* vento plenum in *utero* gestat geniculo interceptū: *lienem* stomacho inhærentem, rubrum atque orbicularem. Huius etiam intestina multis in gyrum revolutionibus & infractibus circumvoluta sunt. Hactenus Bellonius.

RUTILO *fluviatili* à rubro pinna-
rum colore nomen Gesnerus, ad dif-
ferentiam Erythrini veterum imposuit. Circa Comum in Lario lacu, inquit, Piota, ut circa Verbanum quoque dicitur: à Germanis Oceani accolis Roddovu vel Roddau: Sabaudis circa lacum ad Bielam & Neocomum, Vingeron, vel Vengeron, unde Germanorū Vvingeron, vel contra, (quo tamen nomine Lucernæ accolæ Leucisci speciem intelligunt eam quam Vendosiam & Dardum Gallis dici in dicavimus) Anglis, Roche, Polonis, Pstrega. Piscis è foro ad Gesnerum delatus, latus erat ad digitos quatuor, longus duodecim. Pupilla nigerrima, iride aurea labiis subrubris: colore in cauda, pinnisque in ventre & ab ano sitis, cinnabarino: nam cæteræ minus rubri habent. Linea à summis branchijs caudam versus obliqua, cauda bifurca: Supercilia & circa branchias locus, aureo colore nitent. Squamæ latæ, striatæ, validæ. Dorsum fuscum, venter pallidus: pinna quaternæ: *fel* viride, *vesica* gemina: *caro* aristis plena. In faucibus maxillas utrimque habet, recurvas dentibus minutas quinis, qui ab anteriore parte singuli ferrē instar asperantur: quod in aliorum piscium dentibus nondum memini animadvertisse. Piscis hic apud nos Helvetios, *lacustris* tantum est, satis *vivax*. In nostro & Acronio lacubus, abunde capitur. Piscatores Constantiæ, & circa Acronum aiunt cum aliquando cum Cyprino lato *coire*: inde Hybridam, (*ein Halbfisch*) gigni, qui inter utrumque ambigat, Rutilo maior aliquando, minor autem Cyprino

TAB. II.

7.

TAB.

XXVI. 9.

T

lato.

lato. *Parit* Iunio mense. Muscarum fluviatilium (sive lacustrium) genus est quoddam magnum, oblongo, tere, varioque corporis alveo, has insigunt hamis ad inescandos Rutilos. Februario Martioque mensibus apud alios Germanos, Novembria apud nostros *in cibo* præfertur. Majo rursus deterior fieri, & imminui incipit. Parari iubent peritiores instar Cyprini; & vino frigido immissum elixari. Hactenus ex Gesnero. Putatur cum Vangerone Rondeletii esse idem. Hic autem corpore Ballero, (de quo suo loco) rostro Mugilibus simile esse ait, rostro tñ esse longiore. Dentib. carere: piñas ad brāchias duas habere subaureas, in medio ventre duas alias croceas; ab excrementi meatu unicam, in dorso aliam. Caudam in duas desinere hæque à squamis initio integri, etiamsi non adhæreant. Cyprino & corporis specie & carnis substantia succoque affinem esse, & vilem haberi.



TITULUS II.

De Piscibus fluviatilibus lævibus.

CAPUT I.

De Attilo Padi.

TAB.
XXVIII.

2.

*Aldrovand.
de Piscib.
l. 5. c. 1.*

*Plin. H. N.
l. 9. c. 15.*



Antum de Piscibus fluviatilibus squamosis, sequuntur Læves, inter quos præcedat *Attilus*, in Pado inertia pinguescens, ad mille aliquando libras catenato captus hamo, nec nisi boum iugis extractus, ut Plinii verbis utar. Piscis est Cartilagineus, Sturioni magna ex parte respondens. Huius enim more *ossa* gerit clypeata, sed ea tempore dicitur abicere, idque in causa esse cur alii sine ossibus, alii cum ossibus depingant: post quæ, *pinna* dorsi est unica, cui parte supina subiacent duæ, quales omnino sunt Sturioni. Cauda et-


iam in duas deficit. *Os* clausum ad obliquam lineam incisum est, sed apertum & hians rotundum. Ante illud pendente rostro *appendices* carnosæ & molles. Brāchias operas habet, ad quas pinnæ fixæ sunt. Quomodo vero à Sturione, quem Franc. Philelphus Attilum esse credebat, differat. Cælius Calcagninus perquam eruditè docet his fere verbis. Quod à me percontaris, an Attilus, quem Ladanum vulgaris nomenclatura solet appellare, is sit quem Italia Moronem, Usonem Pannonia vocat: pau- *Ælian. H. N. l. 14. c. 26.* cis respondebo, me eundem non existimare, vel ex Plinii testimonio, qui eum Pado vult peculiarem esse; quo loco de propriis quorundam amniū piscibus ait. Sed ego, et tecum agam liberalius, non modo te ad Plinii, sed ad oculorum etiam tuorum testimonium provoco. Totamque itaq; Attili effigiem ac membraturam quantā potui brevitate perstrinxi. Et quia non satis perspicue id fieri posset, nisi notā alicuius piscis exemplo uteremur. Hyccam sive Sturionem, qui nullo ferme loco non nascitur, mihi proposuisti. Qui licet in mari natales habeat, solet tamen adversus amnes mira subire voluptate, donec iam præpinguis redeat. Moronis sive Usonis exemplo nondum dixi, quod neque ii pisces non cognoscantur, neque mihi eorum imago satis memoriæ inhæreat. Sic ergo accipe: Attilus hoc differt ab Hicca sive Sturione, quod Sturio pelagius est: Attilus amnicus est, & Pado peculiaris. Sturio non temere visus æquare quatuor talenta Attica, id est, trecentas libras: Plinius scribit Attilum ad mille libras, id est, supra XIII. talenta excrevisse. Quæ magnitudo sane insignis & raro perspicua. Attilus cum ad certam magnitudinem excrevit, *squamas* hispidas abijcit, quas per quinque versus dispositas gerit, in summa scilicet dorsi spina ex utroque latere geminatas, & sibi quasi parallelas, extremus versus pinnas attingit. His abiectis tactu lævis evadit, nec habet quod unguem offendit. Contra Sturio semper hispidas squa-

mas

Lucius.

Hecht.

Tab. XXIX



Carpio.


Spiegel Karpf.

2

Cyprinus.

Karpf.


3



Cyprinus. 2.

4

Karpf.





Cyprinus. latus.

5

Cyprinus. 3

Karpf.




Lota. Gallorum.

10

Tinca.

Schleie.

7




Cottus ggn.

Gebie Capitat.

Grobbe.

ad tab. 22.

11



Fundulus.



Grundel.

12

Perca.

Bersich.

8





Alburnus.

Blicke.

13

Perca. alia

Bersich. ander art.




Einart. Hausen.

14


Salar. Salmo parvulus.

Salmling.

15



16 Exosfinc. Icthiocolle.



Phoxinus.


Wäjslem Bambois.

Phoxinus.

Ehriz.



Phoxing. Linné.

Mjöling Erling.



Altilus. Padi.


Ein cut Storr.




Trijsche.

Anlacus Stellatus.

Geflünter Storr oder hauser.



Mustela fluviatilis. flus. Trijsche.



Mustela fossilis.

8

Mustela. alia.

Trijsche.




Mustela Barbata.

7

Lambreta.

10

Noinaug.




Lambrete.

Lambri.


Prick.

11




Salmerinus.

Sainlung.




Perca.

Persch.




Perca.

Persch. maior clata.




Schwallus.

Schrollen.



Epilanus.

Pottlein.




Stichling.

Pungtius.

Stichling.



Pecten.





Alosa.

Cypr.



Araneus minor.

Peterman.



Alosa seu Clupea.


Phoxinus Squamosus Maior.



Phoxinus Squam minor.



Blicca Ballerus.

Blicke.




Glanis. ein art Welsen.

Barbus. Ein ander art Trüsch.




Cyprinus monstrosus.



Cyprinus Albus. ein and art karpf.

Cyprinus. karpf.



mas suas tota æstate retinet : Caro Sturioniscallum habet , & mirifice palatum oblectat. Attili contra, fluxa est, & mollis, & palato parum iucunda. Existimant piscatores *προτομὴν*, id est, partem priorem Attili, ad posteriorem vix eam habere proportionē, quam quatuor ad unum. Tota n. vis huius piscis sita est in *capite*, & parte capiti attigua. Quæ observatio etsi ad Sturionē etiam, aliosq; pisces pertineat, auctore Aristotele & Plinio: cuius verba sunt, videlicet capita piscibus portione corporum maximā, fortassis ut mergantur, tamen in Attilo nescio quomodo præter cæteros luculenta est atq; admirabilis. Parvi sunt *oculi* Attilo, in tāta mole capitis. Sturio & Attilus habent os in parte prona, (supina dicere voluit) eo prope in loco, cui in cæteris perfectioribus animantibus, respondent, omoplata. Os utrique sine dentibus, sed Sturioni ferme orbiculatum. Attilo multo maius, & ad lineam obliquam incisum, quo aperto, vasto illo hiatus pisces devorat, quos respirando *κατὰ διασολὴν* (ita piscatores putant) contrahit. *Loca* pisculentā maximē frequentat, hyberno præcipue tempore vorticolas voragines, ad quas pisces frigoris impatientes, temporis gratia se recipiunt. Rostrum Sturioni resimū ac latiusculum, ad imaginē fere Delphini & Oxyrinchi; Attili planum, & paulominus quam in mucronem desinens, Attilo tergicolor albicans & lanosus. Sturioni vergit in glaucum. Hæc itaq; Cælius. De eius cum clupea inimicitia ita Plinius. Minimus hunc piscis, appellatus Clupea, venam quandam eius in faucibus mira cupidine appetens, morsu exanimat.

CAPUT II.

De Antacæo Borysthenis Rondeletij, & Stellari.

ANtacæi pisces dicuntur prægrædes, inquit Rondeletius, & vastæ magnitudinis in Mæotide & Borysthenē; quos aliquando in ostiis in glacie concretos effodi auctor est

Strabo. (Nec alios, ut conicio. Solinus intelligit, inquit: Apud Nuros nascitur Borysthenes flumen, in quo pisces egregij saporis, & quibus ossa nulla sunt, nec aliud quam Cartilaginis tenerrimæ. Nec dubito, quin Plinius de his loquatur his verbis: Et in Danubio Mario extrahitur porculo marino similis. Et in Borysthenē memoratur præcipua magnitudo nullis ossibus spinisque interstitis.) Ex his fassamenta fiebant, præsertim ex maxillis & ijs quæ circa palatum sunt partibus, quod eę partes aliis suavitatem præstarent. Ex his igitur unus est, quem hic proponimus rostro oblongo, acuto, *oris* vasto & rotundo hiatus in supina parte Bellonius similem figuram exhibet Attili nomine, nisi quod unicam ei tantum in dorso pinnam appinxerit. Ingentis, (inquit) est magnitudinis: Cætera Sturionem tā internis quā externis partibus refert, hoc dempto, quod pro eminentioribus ac callosis illis elatis tuberculis, quibus Sturio quinque carinis præditus est; hic stigmatis tantum lividis sessilibusq; maculis in cute minus aspera, ad latera sit distinctus: Præterea unicam tantum *pinnam* ab ano ad caudā gerit. Sturio autem duas habet. Cæterum *Os* Attilo prominet oblongū, fistulosum, sublongo etiam naso. Hætenus Bellonius, qui deinceps non nulla de hoc pisce scribit, quæ vero Attilo conveniunt.

ANTACÆUS STELLARIS in Danubio prope Straubingam captus, & depictus, ad Gesnerū missus est. Colorem ubique ferē cæruleum ostendebat, venter erat candidior ad roseum inclinans. Spinæ in dorso & stellæ pallidi coloris puncta etiam passim expallido albicantia, vel fusci Indici coloris. Cognatus huic est, qui Sick vel Tick vocatur, & in Danubio circa Pestam vel Budam capitur, mole corporis quæ ad XXV. libras accedat, cute varia undique, que stellata, sed rostro longiore & graciliore quam vel in Hufone, anserino fere simili.

CAPUT III.

De Ichtyocolle.

TAB.
XXIX. 16.
Plin. H. N.
l. 32. 6. 7.

Diosc. M.
M. l. 3. 6.
102.

Bellon. de
Piscib. l. 2.

Ichtyocollæ meminit Plinius ex veteribus dum inquit. Ichtyocollæ appellatur piscis, cui glutinosum est corium, idemq; nomen glutini eius. Quidam piscem Iudaicum vocari feribunt, quod nomē Zygænæ apud Parisienses competit, alij Antacæum ab Herodoto, à Pomponio Magnum vocari dicunt, nonnulli Plinij Mariorem appellant. Bellonius Tanais ac colis *Barbotam* dici, quod quaternis veluti barbis ad labia sit cōmunitus, prodidit. Nec alium Dioscorides intellexit, cum gluten ventrem esse piscis cetacei, laudariq; candicans, ratione Ponticum scripsit. Tale enim & hodie ex ei⁹ intestino ex Pōto mittitur. Est autem Piscis cetaceus figura oblonga ac prope tereti. Ossibus ac spinis caret, capite est crasso & lato, ore magno & in promptu posito: è superiore maxilla quatuor apophyses carnosæ, velut barbæ dependent, unde Barbotta dicitur. Oculos parvos habet pro corporis magnitudine. Bellonius ait hoc à Sturione atq; Attilo præcipuè differre, quod rostro careat, magnum oris rictum præ se ferat, sitque sublutea, dura, lævi ac glabra cute convestita carne. Bina ante oculorum canthum, parva atq; aperta foramina habet: pinnas in tergo duas (quas aliter Rondeletius, aliter Bellonius pingit) ad caudam erectas. Branchiæ veluti spineo regmine communiuntur. Sturionis modo: Cauda quā huic magis bifurca; præcipua à cæteris piscibus nota discernitur, quod paulo supra spineum operimentum branchiarum, quodam ad eius latera impresso foramine pervius sit. *Folliculus*, sive vesica, ex qua glutinum fit à capite ad caudam, per spinæ longitudinem extenditur. *Carne* est secundum Rondeletium prædulci, & glutinosa admodum, ob id salutaræ idonea, qua melior redditur & rubescens Salmonis modo, atque etiam durior, quam ob causam aliquādiu maceranda, priusquam coquatur. Eam Tanais & Ponti accolæ Romæ & Venetias transmittunt, illicque in

foro piscatorio venditur. Ichtyocollæ auctore Plinio epinyctides tollit, Erugat cutem, extrahitq; in aqua decocta horis quatuor, denuo contusa, colluta & subacta ad liquorem usque mollis. Ita præparata in vase novo coeditur, & in usu quatuor drachmis eius, binæ sulphuris, & anchusæ totidē, octo spumæ argentæ adduntur, aspersaq; aqua teruntur una. Sic illita facies, post quatuor horas abluuntur. Idem alibi. Lethargicos (inquit) coagulum vituli adiuvat in vino polum oboli pondere: idē Ichtyocollæ. Valet ad conglutinandas omnis generis chartas, atq; instrumenta musica, reliquaque lignaria incrustamēta, quæ tessellato, imbricato, & vermiculato opere fiunt.

CAPUT IV.

De Glanide.

Piscis, qui Aristoteli & Pausaniæ TAB. XXVII. 8.
Glanis, Plinio sæpe Silurus aliquādo Glanis, Glanus, & Glanius vocatur. Ab Æliano Siluro explicatur. Veteres sequuntur recentium plurimi, interq; hoc Gesnerus & Schonfeldius, nos quid sentirem⁹, superius diximus. Nomen à Glanide Italiæ & Cuniæ fluvio accepit, si Stephanum sequimur, eiusdemq; vestigia apud Byzantinorum vulgus, qui hodieque Glangnū teste Manardo, vocāt, quasi Glanum, retinet. Descriptionem quod attinet, sunt ipsi spinæ pro ossibus non Cartilagine. *Corpus* fuscum, nigris maculis plenum, squamæ nullæ, corium satis crassum, & lubricum. Caput grande, depressum. *O*s obrutum. Oculi parvi. Rictus amplus & ad capitis latitudinē patulus. Labia superiora gemino, inferiora unico ordine denticulorum confusaneorū, introrsum reclinatorū aspera, quibus prædā retinet. *Fauces* binis utrinq; ossiculis, limæ instar asperæ sunt. A labro inferiore dependent barbulae quatuor, tenues, oblongæ, pallidæ, à superiore duæ, eiusdē coloris, duræ, longissimæ, prætenturarum instar, quas ante se modo exerit, modo cōponit. *Pinna* illi in dorso post cervicē unica est, parva, quatuor aut quinque fibris

Schonfeld.
Ichtyol.
p. 69.

fibris elata, post branchias duæ: quatum prima, faucesque proximè spectans, aculeo constat osseo, duro, quo infestos sibi pisces arcet, &c.

Venter magnus est, deformis, & subalbidus, obscurè fuscis lituris cōspersus. *Cor* inter branchias utrinque quaternas situm est, à reliquo diaphragmate separatum, quod gula ampla perforat, à qua ventriculus dependet, & intestina, quæ unica revolutione in anum desinunt. *Ventriculo* incumbit *Epar*, ex rubro pallens, duobus lobis distinctum, cui vesicula fellis diluti aquei, adhæret. *Dorso* adjacet vesica simplex, peritonæum candidum est.

Ad multam magnitudinem excrescit: non solum enim ducentarum librarum, sed maior etiam capi solet. Gesnerus testimonio eruditi cuiusdam Ungari in Tibisco, qui Dacix fluvius Danubio miscetur, aliquando captum fuisse scribit septem vel octo cubitorum, plaustrum occupantem: cum in fluvio annis sedecim sub culina Viri cuiusdam nobilis latuisse: hamo tandem inescatum esse, dum fæturam suam custodiret: ubi se captum sensit exsiluisse; secutos impetum eius piscatores ad milliaria duo, denique defatigatum cœpisse: barbas eum supra infraque os habere, rictum latum, caudam versus attenuari. *Dentes* habere instar pectinis illius quo lancæ vestis depectuntur, à carduis denominati vulgo: squamis carere: in aquis cœnosis *versari*. Ipse vero Gesnerus dentes habere negat, sed labia limæ instar exasperari, atque ita prædam faciliè retinere: retentam mandere & comminuere: ei opus non esse, sed faucibus & gula maximè patentibus integram vorare. Idem & in Viadro apud Silesios tantum esse scribit, ut captus, impositus curru, plerumque ultra currum emineat. Variat ab isto ille cuius Gesnerus Iconem sub Siluri tertii nomine ponit. Piscis, inquit, Similitudinem aliquam cum Mustelis fluviorum & lacuum habet. Oculi sunt parvi: barbulae fusca, non longæ, & crassiusculis paulatim attenuantur;

binæ superiore labro, ternæ inferiore. Pinnæ ad branchias binæ, in dorso nullam ostendit pictura, sed tantum carunculam quandam mucronatā eminentem, qualis & in Mustela palustri maiore, eodem fere loco visitur. In ventre vero una & continua longissima pinna ad caudam usque albicat, maculis distincta fuscis. Corpus à capite retrorsum subinde attenuatur, finis latiusculus & obliquus est, & quid mireris nullam caudæ pinnam habent. Os magnum & latum. Capitis colore caruleo subviridis; reliquum corpus viridi & flavo colore mixto pingitur, sed maculas etiam diversi coloris habet. Huius generis duos in suo stagno civis quidam aluit, qui cum ante annos triginta sex, (verba sunt Stuibii ad Gesnerum) ad Hundselden in Rheno cum aliis piscibus illis quos Argentinae vocant Rufelken, simul nassa capti essent, vix digiti longitudine, & Argentinā in forum advecti, à cive quodā raritatis gratia empti, in piscinam coniecti sunt, in qua alter ab eo tempore usque adeo excrevit, ut jam sex cum dimidio pedes meos (hominis mediocris proceritatem aut amplius) longitudine contineat. Caput qua crassissimum est, filo complexus, duorum pedum & dimidii fere circumferentiam deprehendi. Alter huic per omnia similis, sed longitudine longe est inferior. Maior ille piscibus quibusvis, excepto carpione sive vivis sive mortuis, *vescitur*. Hyeme nihil quicquam gustare unquam visus est. *Cornua* quæ supra & infra os habet, quotannis decidunt, & rursus nova succrescunt, sicuti cervis.

Reperiebatur in pluribus fluminibus tempore Æliani; temporibus *Æliani*. *H.* Plinii præcipuè in Mœno, nisi Rhe- *A. l. 12. c. 29* num velis legere. In Aeno grassatum quem quidam Mœno & Rheno substituant prope Visbium, quod ad eius amnis ostia conditum Aventinus prodit, tanquam loco magis cœnoso, verisimile est. In Cydno Ciciæ fluvio procreatos sed minutos, quod eius confluens nitidus & frigidus a-

pud Ælium habetur. Pyramus, Saurus, Orontes plurimos producant, quia limosi; nec pauciores in Ptolomæorum fluvio, Apamiensi stagno. In Bubasto Ægyptia cicures aluntur plurimi. Strabo, & Athenæus, dū Siluros in Nilo esse scribunt, Glanides intelligunt, nō Sturiones. Nam qui è mari fluvios subeunt, præter Delphinum Mugilē & Alofam, nullus alius Nilum intrat propter Crocodilos. Plinius dū maris peculiarem facit Gladinē, fallitur. Expressè Schonfeldius, Fluvatile hoc animal est, nec unquā aquam falsam ingreditur: ubi circa Håburgū capitur, itatim Albis ex aquis pluviis aut nivalibus exæstuantis metus est, quas ut passim ex locis montosis, stagnis seu lacubus collectas, fugiens, Silurus cedit, & partes Albis spaciosiores sequitur. Reperitur & in Istro, Tibisco, Vistula. In Helveti. stagnis paucissime capiuntur in Bernensibus Neocomensi & Moretano aliquando. *Vescitur* carnibus; nec minoribus duntaxat pisciculis ventrē implet, sed & in maiores, imo homines & equos grassatur. Captū in Pannonia fama receptū, in cuius visceribus humana manus ornata annulis reperta sit. Puerum in Danubio ad Posoniam natantē ab hoc pisce devoratum, & in capti visceribus fragmenta eiusdē reperta, à fide dignis Pannonibus proditū est. In eius, quem sub culina viri cuiusdā Nobilis latuisse supra diximus ventre, caput humanum cum dextera manu & tribus annulis aureis inventum est. Aristoteles dentibus dūtaxat valere, & ἀγνιστοφάγον esse scriptum. Cauda cōcussa, pisces præsertim minores ori admoveat. Caniculæ exortu sideratur, & alias fulgure sopitur. De *Coitu* & partu apud Aristotelē legimus. Cohærentes fœtus edere, sicut & ranas. Maiores profundis aquis parere, quippe nonnullos etiam ubi senum pedum altitudo sit: minores, locis brevioribus ferè ad radices falicis, aut alterius arboris cuiuspiā, juxtaq; arundines, atq; etiam muscū. Tardissimum eis ex ovis incrementū: atque idcirco affidet mas, quadragenos, quinquagenosq; dies, ne devo-

retur fœtus ab occurrentibus piscibus. Eodem quoq; die, aut etiā post, capiunt ova incrementum, quæ contigerit semen. Glanii ad erui magnitudinem. Quantum ad *Vsum* in cibis, Salvianus durā carnem habere scribit. In Germania & Polonia pinguis est, & boni saporis: laudaturq; in cibum recens, tum sale conditus. Circa festum Iohannis optimus est, trium librarū inprimis. Obsonatores venā candidam, quam per spinam dorsi tenuissimo rectam involucro, transire, Benedictus Martinus scribit, tanquam venenatam eximunt.

CAPVT V.

De Barbotæ Gallorum.

A Glani, licet maximo pisce, non malè de hoc parvo dicetur, ob corporis barbæq; similitudinē. Galli vulgo Barbotam vocant, non à barbis (inquit Bellonius) aut arunco, sed ex hoc, q̃ Galli barborare, cœnum & lutum rostro, anserum modo commovere dicunt. Ipse Clariam fluviatilem vocat, sed cum Lora Lugdunensiu quo suo loco; implicat. Anguillæ, aut Congri modo glabram *cutem* habet, atq; idem caput. Cirro recto breviq; & simplici in maxilla inferiori barbatur. Continuā in tergo pinnam gerit mollem, ad caudam (quæ illi rotunda est) desinentē. In nonnullis duas pinnas, ut in Icone quam à Bellonio missam ex Rondeletio exhibemus; in tergo videas: quarum exigua est, quæ capiti magis est vicina, sed & inter anum & caudam rursus aliam pinnam gerit: unam præterea utrimque in lateribus circa Branchias, quas utrimq; quaternas habet: duas verò sub vêtre capiti multum propinquas. Ceterum duos in inferiori maxilla habet denticulorum ordines admodū parvos: atq; in superiori maxilla totidem, ut nihil quam asperitas in eis sentiat: nam alios etiam in fornice palati gerit. Tergus & latera fulvum vel sublividum colorem habet: *venter* autem albicat. Semipedalem non excedit longitudinem. *Hepar* lobum oblongū ad sinistrum latus demittit, sub quo

TAB. XXVII.
Bellon. de Aquatil. l. c.

Plin. H.N.
l. 32. c. 11.

Arist. H. A.
l. 9. c. 37.
Aristot. H.
A. l. 8. c. 20.
Aristot. H.
A. l. 6. c. 14.

est *Stomachus*. In pyloro apophyses, seu cœcos viginti quinque connumerare potes: *lienem* quoq; videas, neq; dextro neq; sinistro, sed in medio spina stomacho inhaerentem. *Anus* eius propinquior est capiti, quam cauda. *Intestina* pluribus quam tribus inflexionibus non circumducuntur. *Ova* in bicorni vulva fert utrinq; permulta. Huc ferè Bellonius. Vita & moribus cum *Lota* Lugdunensium convenit. *Hepar* magnum habet ac delicatum; Carnem quam *Lota* glutinosiorem: mucore & cœno vescitur, in eoque delitescit.

CAPUT VI.

De *Mustella fluviatili* & *lacustri*.

QUam nos *Mustellam* vocamus, illā Iovius inter Larii pisces *Trisium* Latine dixit. *Mediolanenses* *Botam* vocāt, seu quod utri similis sit, ut *Cardanus* scribit; seu quod capite ranas referat. In subr. alii *Boterissias* dixere. Specie fluviatiles è *Lacustribus* apud suos differre *Gesnerus* asserit; Esse enim minores, colore nigricare, carne albiore, solidioreq; in cibo lautiores; duabus per dorsum piñis, quā obrem separatim etiam describit. Cæterum corpus ait esse utrisque lubricum sine squamis (licet quibusdā, inquit, squamulæ minimæ radendo appareant) flexuosum, quod caudam versus attenuatur veluti in tæniam. Coloris varietas maculosa, pinna ab ano ad caudam ferè, oblonga. Binæ omnibus ad branchias, & binæ aliæ eodem circulo inter caput & ventrē: pupilla *oculorum* alba, pars ambiens nigra. Branchiæ quaternæ simplices. Caput magnum, latum, & veluti compressum. In cerebro lapilli. Os granderescissum. Barbulæ circa os infra supraque; numero & magnitudine differentes in diversis generibus. *Dentes* nulli, sed veluti in lima exasperatū os. Voracitas, piscium quos devorare possunt, *Caro* mollis & dulcis. *Iecur* magnum. In deliciis *Vesica* (aut folliculus) nulla, *intestinum* parum anfractuosum, fere simplex. *Stomachus*:

ab eo ventriculus, & in circuitu multæ appendices. Iā vero *Botarissiam fluviatilem* *fæminam* (eam intelligit quā nigricantem modo dixi.) Ianuario mensē diligenter contemplatus his verbis (ex quibus tamen etiā nonnulla aliis huius generis speciebus conveniūt,) descripsit. Piscis est forma & flexibus serpentē ferme referens. Capite lato, caudam valde versus attenuatur. *Brachia* ei quaternæ, *Pinna* ad latera brachiarum utrimque una nigricat: & aliæ duæ paulo inferius in pectore parvæ albicāt à podice exorta una oblonga, paulo citra caudam definit; itē in dorso oblongior alia, ultra mediū dorsum continua tradit: & alia ante ea minor caput versus, quā pictor in cone per in curiā nō expressit. *Pinnae* omnes molles sunt & sine spinis. Carūcula sub mento pili instar prominet. *Cauda* non bifurca, sed circularis, nusquam omnino divisa, sed ubiq; sibi instar membranæ cōtinua: Colore vario, è fusco & nigro dorsum tenerum albicat: latera juxta dorsum minimis punctis nigris in colore subalbido distincta sunt. Os aperitur hiatus rotundo, totus piscis sine squamis & viscosus est. *Maxillæ* minimis *denticulis* serratæ. Color subalbidus (linea subalba nimirum) à capite incipiens obliq; per latera caudā versus procedit. Nam cauda in colore nigricante variat. Membranea vero caudæ extremitas partim nigricat partim subflava est. *Lapillos* duos in capite gerit, albißimos & bene duos, figura & magnitudine granorum oryzae. *Lacustris* modò in *Trissia* in *Griffio* lacu capta ab eodē considerata huiusmodi erat. Longa dodrantes, duos cum palmo: filum ambiens Ventrem triū palmarum. *Denticuli* minimi, frequentes, ut serpentū. Superior pars oris duos ordines dentium habet, unum scil. interius in medio, cui nullus responderet infra. Sunt & in intimo oris recessu, duo denticulorū ordines seu in maculis duabus. *Brachię* quaternę. *Squamula*, rotundæ minimæ, quæ dū pellis cultro raditur, apparent, in parvis generibus v. tum fluviatili, tum *Lacustri* luteo minore nullo prorsus, per *cutim* passim

TAB.
XXVIII.
6.7.8.9.
Aldrov.de
Piscib.l.5.
6.7.
Cardan.
Variet.Rev
l.17.37.

passim ceu foramina, ceu puncta cava rotunda, conspiciuntur; quæ si quis caput versus validè radat, albissima videntur: sin iterū caudam versus, rursus obscurètur. In *ventre* meatos duos; unus excrementi, alter genituræ: qui compressus lacteo succo manabat. Et rursus alias *alia ex lacu* huiusmodi: subflava, punctis nigris, barbula à mento demissa, albicans. Ante initium pinnarum in *dorso* carnosam particulam, mollis, teres, intusque cava, prominet. Inde mox sequitur pinna brevis, longitudine pollicis: deinde una continua, octo vel novem digitos longa, ab ea nudum pinnis dorsum est, per tres fere digitos: cum sequuntur aliæ duæ parvæ, triangulares fere, inter quas digiti propemodum spatium intercedit: ex quibus infima & ultima, minor & caudæ coniuncta est. *Fel* subviride: vesicula eius tum jecori tum intestinis affixa. In ventriculo pisces duo integrierant, uterque digitos septem longus, tres latus: nec aliud quicquam. Pondus totius, unciaë quinquaginta. Coctæ pellis subviridi & deformi colore erat, caro albissima, bona, satis solida. *Iecur* album, non ut in minoribus subruffum, grande, suavissimum. In *alia Trissia parva, fluviali*, forte digitos decem longa, pinnae dorfi inquit, sic sunt. Primum, caruncula illi brevis non est, sed pinnula digito brevior: & minimo spacio intercedente, alia duos digitos longa: deinde post spatium duorum digitorum, alia paulo brevior, media, & mox cauda. Rursus ab hac differt alia, paulò longior, (ut semel animadverti: non enim simpliciter hæc accipi debent, quod ad magnitudines & colores) cui minus erat flavi in corpore, plus nigri, & eius splendidiore. Primum enim pinna illi brevis est, deinde una longa continua usque ad initium caudæ: Ergo magna Trissia lacustris; præter carunculam illam, pinnas in dorso quaternas habet, ex minoribus, nigricans binas; luteola verò maior ternas, minor binas: si modo species duæ sint luteolæ: quod accuratius considerandum est:

Minoribus lacuum Trissis pinnae in dorso binæ, adeo propinquæ invicem sunt, ut unica putentur: Colore fusco, non pulchro. Differentia à pinnis certior: nam colores multas ob causas variare possunt. In Rheno supra Acronium lacum aliquando ad tres libras sedecim unciarum accedunt. Constantiæ tanta capta, ut drachmis duabus cum dimidia venderetur. Capta & Pragæ aliquando, pulcherrimæ, coloribus distinctæ, flavo, croceo, candido, roseo, atro, oculorum pupilla nigra, parte ambiente cærulea. Nigriores circa ripas fieri, magis in profundo flavas, quibusdam placuit. *Carnivore* sunt, nec ullus piscis pro sua magnitudine maiores pisces devorat. Profunda petunt, adeo, ut Albertus scribat, in lacu circa Constantiam ad trecentos passus sub aqua hamis extrahi: sæpe cum ranis extrahuntur; quæ quia illis ore adherent, tanquam exfugendi cibi gratia, ideo ore cum ranis aquaticis coire, quidam prodiderunt. *Parere* incipiunt Decembri, alicubi & Ianuario. Solæ piscium senectute *obscantur*. Maxime commendantur *in cibis*, illæ in primis, quæ in puris rapidisq; fluviiis degunt, quod candidiorem ac solidiorē carnem habeant. In jecinoribus tanta saporis gratia est, ut apud Thuringos olim comitis cuiusdam Bichlingorum matrona, omnes, dicant, principatus sui reditus in eorum delicias consumpsisse. Laudatur hæc præcipue ante Natalem Dominicū: circa partum improbantur, quod hoc tempore nonnullis in aquis grandinosa fiāt. *Ova* aiunt semper valde noxia esse, quibusdam in locis, ut circa Neocomensem lacum Sabaudia. Caupones aliqui excisis jecinoribus, pisces vivos aquæ reddunt, consuto prius vulnere. *Ventriculū* huius piscis cum suis appendicibus miras habere vires tradit Encelius. In veteratum enim, ut fit (inquit) in Saxonia à matronis, trahere mirifice secundas hærentes aut relictas in partu, in potu datum: & magni momenti esse ad omnia vitia matricis. In Suevia passim in Cauponis & diversoriis parietibus hærentes hi ventriculi

tricoli circa Zetorum fornaces visuntur, ab edentibus illuc reiecti, ut exsiccati servantur, & cum potione aliqua hausti à colios cruciatibus liberent. Colligi aiunt & oleum ex hepate ad solem vel ad fornacis calorem suspensio, intra vas vitreum: clarum id & flavum esse, adversus oculorum suffusiones utile, item nubeculas & maculas, quæ ab angulis oculorum nasci incipiunt.

N. *Musfela marina* iconem vide Tab. 46.

CAPUT VII.

De Piscibus Fossilibus.

TAB.
XXVIII.
8.
Aldrov. de
Piscib. l. 5.
c. 9.

Piscium Fossilium & Veteres & moderni meminere. Ex illis ita de eorum natura & ortu Theophrastus. Pisces alicubi fossiles sunt, ut circa Heracleam & alibi in Ponto. Nascuntur autem circa fluvios, & aquosalia loca, quæ cum siccantur (certis temporibus) paulatim, pisces subinde humorem sectando terram subeunt: quæ demum siccata, remanent in ea, veluti vivi sepulti, vel ut animantia quædam in suis latibulis hyeme condita durant, sine sensu ferè & motu torpida. Quod si loca illa priusquam denuò aqua accedat, fodiantur, pisces illi moventur. Sic & in Ponto contingit pisces glacie & gelu occupari, neque sentire, aut moveri prius, quàm in ollas coquendi injiciantur. Præcæteris autem Gobio hoc accidere videtur. Ferè autem fossiles pisces fiunt, eo quod ab inundatione fluviorum, in locis quæ resiccantur, vel ova, vel alia principia gignendis idonea piscibus relinquuntur. Nonnulla enim non ex ovis oriuntur, ut Anguilla & Centriscus. Et hoc in Heraclea, circa Lycum fluvium contingit. Principia autem hæc in terra relicta, perficiuntur, durantque. Neque absurdum est hos pisces durare.

Multa enim huiusmodi animalium exiguo egent nutrimento, sicuti serpentes quoque & quæ latibu-

lis se abdunt. Primum scilicet ipsa ova humore è terra manante, deinde eodem nati ex ovis pisces nutriuntur. Ad magnitudinem tamen aliquam eos excrefcere neque verisimile est, neque fertur, cum & loci angustia & alimenti penuria impediant. Cæterum durare in aere hi pisces non æquè valent, ac illi qui ab aquis ad pastum egrediuntur; qui scilicet exigua refrigeratione, & quæ ab aëre eis præstari possit, indigent; nam vel ipsa branchiarum angustia indicat, non multa refrigeratione eis opus esse; quamobrem & Anguilla tum in aere multum temporis vivit, tum in aquis turbidis illico suffocatur. Et similiter fossiles pisces à tetra eos ambiente, quantum satis est, refrigerantur. Sed quod circa fossiles in Paphlagonia pisces contingit, peculiarem & additam rationem habet. Illic enim profunde admodum multos & bonos pisces effodi aiunt: cum neque inundare aquam animum iis in locis neque aliter colligi animadvertatur, unde semina & principia generationis relinquere dicimus. Reliquum est ut sua sponte nascantur, idque continuo. Neque enim coire inter se possunt. Aut igitur hoc fieri existimandum est ratione loci, qui humidus sit, & omnino ferax huiusmodi piscium propter certam humidi calidique commoderationem. Oriuntur autem & alii quandoque quidam pisces spontè; aut humores quosdam alicunde manare cogitandum est, qui generationis principia secum adferant: quæ mox locus idoneus & recipiat & alat. Præterea hoc inquirendum de utrisque, tum illis qui in aere vivunt, tum fossilibus, utrum in aquam immissi vivere valeant, aut in proprio duntaxat loco, qui eis naturalis sit, sicuti sua & marinis & fluviatilibus aqua. Nam ex his quoque non nisi pauci mutationem sustinent. Nam qui in aquis resiccant terram subeunt, & qui glacie gelati detinentur, iis familiarem esse humorem magis quam aliis (è fossilium genere) constat. Ergo piscium

alii simplicis naturæ videre debent, alii amphibii secundum Democritum, ut & aliæ quædam animantes. Vtuntur enim aere quædam (ex aquaticis) ut prædictum est. Theophrastus sequitur Plinius, dum inquit: Circa Heracleam & Cromnam (aliàs additur, & Lycum amnem: probè nimirum, mox enim sequitur) eodemque Lyco amne, & multifariam in Ponto unum genus esse Theophrastus prodit, quod extremas fluminum aquas sectetur, cavernasque faciat sibi in terra, atque in his vivat, etiàm reciprocis amnibus ficcato littore, effodi ergo: motu demum corporum vivere eos approbant. Circa Heracleam eandem eodemque Lyco amne decedente, ovis relictis in limo, generari pisces, qui ad pabula petenda palpitent, exiguis branchiis, quod fieri non indigo humoris, propter quod & Anguillas diutius vivere exemptas aquis. Ova autem in sicco maturari, ut testudinum. Eadem in Ponti regione apprehendi glacie piscium maximi Gobiones, non nisi patinarum calore vitalem motum facientes. In his quidem, tametsi mirabilis, est tamen aliqua ratio. Idem tradit in Paphlagonia effodi pisces gratissimos cibis terrenos, altis scrobibus, in his locis, ubi nullæ restagnant aquæ, miraturque & ipse gigni sine coitu. Humoris quidem vim aliquam inesse, quam (qualem &) puteis arbitratur, cum in nonnullis reperiantur pisces. Quicquid est, hoc certe minus admirabile talparum facit vita subterranei animalis, nisi fortè vermium terrenorum & piscibus natura est. *Neotericis* est piscis fossilis ille, quem Germani *Beisher*, alii *Peisher*, quidam *Meerputten* vocant. *Duorum* sunt *Agricolæ generum*. *Maiores* nempe, & *minores*. Sonum omnes edunt acutum. E fluminibus, quæ currunt in locis paludosis egressi, per riparum venas longius, & interdum in proximi oppidi cellas, neque subterraneas penetrant. Quidam Eruditi *Mustellam fossilem* vocant, eamque ita describit Fabricius. Longitudine est

palmi crassitudine digiti, quanquam multò maiores etiam reperiuntur. (Agricola palmos quatuor longos maioris esse scripsit.) Dorsum coloris cinerei: cum punctis multis, maculisque transversis, partim nigris, partim cæruleis. In lateribus linea utrinque nigra & alba. Venter flavus cum maculis albis, & punctis rubris ac nigris, ita parvis ac si acuta factæ essent. Ab ore carneæ particulae eminent, quos nando extendunt, extra aquam contrahunt. In Misena trans Albim duobus locis, quod scio fodiuntur. Ad Polnitium amnem; prope Orlantem: & ad Dobram rivum prope Hanam oppidum. Item in pratis ad Rederam fluvium copiosè effodiuntur, si flumen inundet. Ex terræ cavernis etiam ingrediuntur lacus & paludes: Cum aquæ extra ripas excrescunt, è terra prodeunt: aquis autem residentibus, in pratis campis relinquuntur, & ubi greges sunt, relictivorantur à suis. Sordes amant, & in cloacas, quæ alia purgari ratione nequeunt, injecti, omnia consumunt. Cum in rivis paludibusque capiuntur recentes, solent à tenuioribus etiam mensis adhiberi. Serviunt imprimis fraudi agyrtarum, qui eos alunt, & vitris inclusos multitudini ostentant pro serpentibus, quia forma à parvo serpente non multum figura differunt. Sunt qui eos spirare putent. Ubi enim plures huius generis pisces simul sunt, spuma supra eos effertur. Vitro inclusi ore angusto, *crescunt*, & suo quodam succo vivunt usque ad semestre.

CAPVT VIII.

*De Lampetra Fluviatili, &
Vario, seu Phoxino
leui.*

QVam nos *Lāpetram fluviatilem* dicimus, in Tholosanis Chatillou, à titillatione, quod cum manu tene-

TAB.
XXVIII.
10. II.
Aldrov. de
Piscib. l. 5.
cu f. 69.

tur, quasi titillationis sensu variis fluxibus videatur contorquere se & elabi; Germanis Neunaug seu *εννεοφθαλμ* dicitur. Marinis, inquit Rondeletius partibus internis & externis & colore similes, sola magnitudine differunt: quædam enim magnitudine: aliæ vermibus terrestribus crassioribus assimilantur. Caro est tenax, *spina* nulla; pro spina dorſi, unus continuus nervus cavus, quo humor albus continetur, simplex, absq; ullis nervorum costarumve ramulis. Intestina tenuissima. *Ventriculus* vix apparet: nec mirum cum solo ſuctu vivat. Foramen in capite ſupra, ſicut *Lamperæ* maiores, habet. In fluviis & rivulis in quibus capiuntur, naſci vel indeliquet, quod nullis marinis *Lamperis* ibi aditus patere poſſit, cum neque illi in mare confluant, neque mare cum iis ulla parte ſit coniunctū. Capiuntur ſæpius reti cum Variis ſive *Phoxinis* piſciculis. Veſcuntur luto & aqua, iisdem Locis degunt quibus vermes: Autumno in brunam uſque in Albi capiuntur, torrentur recentes in craticula, acceto condiuntur, & vaſis ligneis exceptæ, in varia loca diſtrahuntur. Vernis quadrageſimo jeuniis gratum delicatulis obſonium. Salitæ item leviter, fumo indurantur. Carne ſunt ſatis molli & glutinoſa, quod quantulumcumque eſt vitii, conditum & coctum facile beneficio corrigitur, niſi aquæ in qua vixerunt vitio, plus ſolito viroſæ fuerint.

TAB. XXVIII. I. *Aldrov. de Piſcib. l. 5. v. 10.* VARIUM ſeu PHOXINUM lævem, Romani *Morellam* quod nigris punctis & tenuiſſimis lituris fugilletur, Inſubres Sanguinerol à rubore, dicunt: Rondeletius à Græcis quibuſdā *ἰγυδρόφθαλμον* vocari ſcribit. Germ. *Elriß*. Diverſis toto corpore coloribus depingi hunc piſciculum ex diverſis in primis nomenclaturis oſtendi poteſt. Dorſum (inquit Rondeletius) aurei ſplendoris eſt, venter argentei, latera purpuraſcunt, Cauda in pinnam auream & latiuſculam deſicit. *Cutælævi* integitur, punctis notata, nigris nempe. Pinne laterum multum ad ventrem tradunt: quarum ra-

dices, quæ corpus pertingunt, rubro ſunt colore perſuſæ, inde ſanguinaria dictus. Nigricat quoq; in tergoribus per intervalla. Linea quæ latera utrimque ſecat arcuata eſt. Digiti longitudinem ſeu palmum, nunquā excedunt. Circa lacuum & fluviiorum oras aquis ſtagnantibus capiuntur reticulis. *Bellonius* *ovis* ſemper prægnantes eſſe aſſerit, ideoque *Ariſtoteles* *Phoxinum* eſſe autumat. *Gefnerus* vero ſexu diſtingui dum ait, coire invicem etiam inſinuat; quin, quod ſi (inquit) *Phoxini*, minimi iſti piſciculi ſint; nil mirum ſi propter parvitatem mediocres etiam ex eis nuper nati videantur. Verum nec ipſe *Ariſtoteles* ſimpliciter nuper natos, ſed verbis *ὥς ἐπ' αὐτῶν*, id eſt, prope dixerim, additis, gravidos capi tradit. Veriſimile eſt autem tantillos piſciculos, ſicut & mures inter quadrupedes, brevitem-pore perfici & generare poſſe. Carne eſt molli & ſatis ſuavi: ſed non niſi eviſceratus coquendus eſt.

CAPVT IX.

De Salmerone, ſeu Salmerino.

TRidentini, piſcem ſibi peculiarẽ, TAB. XXVIII. *Salmerinum* vel nomine ab *Aldrov. de Piſcib. l. 5. c. 11.* *Salmerone* deſorto, quo cum carnis rubedine convenit, vel quaſi *Salmonem* lacuſtrem, nuncupant. *Aldrovandus* à *Cardinale Madrucio* acceptum ita deſcripſit. Corporis forma pinnarum, numero ac ſitu cum *Truttis* ac *Salmonibus* fere convenit: Cæterum ſquamis caret; etſi ſquamoſum eſſe profiteatur *Salvianus*: Capite eſt rotundiuſculo, reſuſo roſtro. *Oculorum* pupillam nigram aureus, qui in mortuo poſtea fuit ruberrimus, circulus ambit: acquam maxime ſplendens. Antequos foramina duo, auditus vel olfactus inſtrumenta, rotunda, manifeſta. Oris maxilla inferior nonnihil recurva, Unco ſurſum vergente: eſtque tota ea mandibula alba. Lingua eiſdem coloris, item palatum.

Totum os insigniter dentatum. Pisces ipse rotundus potius, quam latus est. Pinnæ sunt numero septem, omnes sine aculeis: quinque supino binæ prono corpore, juxta branchias duæ, totidem in medio ventre, quinta à postrema à Podice, longæ omnes ac latæ. Quæ ad branchias sunt, triplici colore præditæ. Ubi enim longiores sunt, hoc est, in ipso exortu, albicant, mox totæ rubent, exceptis nervis, qui nigricant, reliquæ tres sicuti in exortu magis quam illæ alben, ita quoque rubedo in his intensior est, nigredine vero plane carent. Priores quatuordecim nervis constant, subsequentes novem, novissimæ decem: quæ vero in medio fere dorso cōspicitur, duodecim nervos habet, altera non longe à cauda, iis caret, mollis & cutacea, ut in Truttaceo genere: malèque ceu nervosa à Salviano expressa est: utraque dorso concolor, id est, nigricans. *Cauda* Lunata est, eiusdem coloris, non rubra, ut ille ait. Podex in imo ventre juxta exortum posteriorispinnæ. A branchiis ad caudam linea exilis, recta ad caudam usque fertur asperiuscula. Latera non nihil albicant, & nunc rotundis, nunc oblongis, iisdemque nunc maiusculis, nunc exiguis maculis subfulvi coloris consperguntur. Totus venter coloris fermè crocei, aut vulgaris minii. *Vterum* habet admodum procerum atque latissimum, utpote qui totam corporis capacitatem occupat, ovis refertus eiusdem fere magnitudinis, fulvis auroque resplendentibus, margaritas aureas dices. Intestina alba, pluribus circumvolutionibus intorta. *Iecur* breve, latum, unico duntaxat lobo constans, flavescens. Vesicam fellis invenire non licuit. *Lien* maiusculus ex atro rubens. *Vertriculus* longus & carnosus. Caro, ut in Salmone, rubra. Longitudo totius piscis à capitis initio ad caudæ extremū, Spithamas binas explet. *Locum* si attendas, in lacubus Tridentinorum montium capi innuit. Salvianus in frigidissimis & saxosis fluminibus nasci prodidit. *Vescitur* pisciculis, & in horum defætu, recrementis. Quin singuli ca-

piuntur, ideo solitarios esse concludimus. *Cōit* in fine Novembris & Decembris. Piscis est, si quis alius delicatissimus. Caro ei tenera quidem, & quæ brevi tempore putrescit, sed minimè viscida, satisque friabilis.



TITVLVS III.

De Piscibus, qui præter fluvios alias quoque dulces aquas incolunt.

CAPVT I.

De Perca Maiore.



Antum de Piscib. Fluviali. TAB. XXIII. libus, tam squamosis quam levibus sufficiat, sequuntur 13. 14. Illi qui præter fluvios alias quoque aquas dulces incolunt: *Perca* XXIV. nempe *Maior*, *Perca fluvialis minor*, 9. *Scrollus*, *Pungitius Alberti*, *Alburnus Ansonii*, *Epelanus fluvialis*. *Lucius*, *Cyprius latus*, *Ballerus*, *Tinca*, & *Lota Gallorum*.

PERCA MAIORI, quæ Germanis Baers & Bersich, corporis figura lata & compressa est: *rostrum* prominenti non aliter quam marina, verum non adeo acuto: Ore etiam ut illa mediocri, imò pro corporis ratione parvo. Dentibus caret, sed labia habet denticulis horridula, ut Bello-nius testatur. Squamis tegitur parvis ac aridis, quæ difficillime à corpore avelluntur, maximèque ancillis fastidio esse solent. Color ei varius, vèternempe; Corpus reliquū fere cineraceum; nigricantibus quibusdā ac latis maculis à dorso descendentibus (non aliter ac in marina) latera depingentibus. Pinnæ ac cauda rubescunt. In *femina* v. nihil, vel parum saltē. *Pinna* in tergo duæ, quarū quæ capiti proxima, maior est & aculeata, posterior minor sine aculeis: totidē ad Brachias quæ Rondeletius altiores esse putat, quam

quam in reliquis fluviatilibus: totidē item in ventre: quæ vero ab excrementorum est officio, aculeo crenato vallatur. Brachia habet utrimque quaternas easque duplices, id quod Aristoteles quoque vidit. *Cauda* bifurcatim dividitur. Ad maiorem *magnitudinem* excrescit, quam marina: nam & trilibris aliquando capi solet inquit Salvianus: in Lario lacu ad pedalem etiam teste Iovio magnitudinem. In Suerinensi vero lacu ulnam id est cubitum æquare Gesnerus intellexit. Venter habet mediocrem; intestina pauca & tenuia, *hepar* subpallidum: à cuius maiori lobo vesica pēdet, in qua fel est tenue & aqueum: *Lien* subrubet. *Lapillos* habet in cerebro. Plinius eam mari & fluviis communem facit, sed perperam. In dulci enim aqua vivere & usu, & Aristotelis Aufoniique testimonio, qui eum cum Cyprino, Glanide & aliis nominat, constat. *Ælianus* in Danubio capi scribit. *Rhenus* eo caret, forte quod altiores aquas amet. Præcipua in Verbano lacu & Pado flumine producitur, prodente Platina. Fama est Larij lacus Percas fuisse advectitios & inquilinas, tralatis scilicet è lacu Eupyli, qui Lambrū emittit amnem, feminibus. In omnibus *secur* grandine affectum est, nec quoquam alio vitio laborant. *Devorant* alios pisces tum proprij generis sobolem. *Pariunt* circa littora & frutices ut Aristoteles prodidit, in Helvetiis lacubus verno tempore in profundo, Aprilis & Maio mensibus, ut Gesnerus. Partus tempore facile capiuntur in Sleia, & frequenter, hinc à littoribus ad pastum excurrunt, vaganturque locis spaciosioribus. Circa Iohannis festum rursus capitur, dum littora ex profundo repetit. Lucio læso opitulari, fabulosum puto; nec ille huic parceret, nisi propter pinnas cogeretur. Gesnerus narrat, piscatores in Lemanno lacu observasse, Percas hyeme emittere per os *Vesiculam* quandam rubram ex ore pendentē, quæ vel invitas, inquit, supernatare cogit: coniectant autem id ab eis fieri præ iracundia, quod in retia incide-

rint: hoc enim tum maxime pati, cū retia trahunt piscatores: sed mirum esse quod hyeme tantum id ipsis accidat. De ipsarum *Salubritate* diversæ sunt Authorum opiniones. Rondeletius dotibus illis quibus marina instructa est carere, scribit. Gesnerus Rhenanas, & quæ in fluviis & lacubus maioribus purioribus versantur probat: quæ in minoribus minusque puris aquis degunt, non item. In Gallia summam alendis febricitantibus dignitatem obtinent, si Iovio credimus; In Italia quæ in Lario lacu laudatissimi, eadem ad pedalem magnitudinē crescunt, & maturescentibus præsertim uvis, ab ipso pingui & præteneris interaneis cōmendantur. In Germania quovis anni tēpore, April. & Mart. mensem si excipias, laudantur. Aufonius in pretio habitam fuisse testatur alibi inertis gustu prodidit. Minimam quas *Hornas* cognomināt, coqui peritiores vino calido immerfas elixant. Maiusculæ propter spinas & aculeos pinnarum dorfi, vescentibus molestæ sunt: in minimis propter teneritudinem nō curantur. Parvulæ etiā, butyro frigi solent, frequentius quā ulli alij pisces. Circa Verbanum lacum Percas modice apertas, verubus ligneis transversas inserunt & assant: semissas butyro illinūt. Ibidem omne genus pisciculorum ad solem inveterant, maxime vero Perculas. Vulnus aculeis pinnarum dorfi inflitum, non facile sanatur.

CAPUT II.

De Perca Fluviatili minore.

Perca fluviatilis minor, quibusdam ^{TAB. XXIV. 8.} *Cernua*, & *Acerina* medici Plinij, Straboni *Porcus Niloticus*, quia porcū continente spinarum serie admodū setarum mentitur, Trago *Aurata fluviatilis*, quod extra aquameducta ac suo humore deterfa, aureo fulgore in Cæruleum abeunte insignis sit; Caio Anglo *Aspredo*; Pictorio *Aspretilis* dicitur. Piscis est toto corpore asper, pinnis spinosus.

Percæ forma & magnitudine, colore per summa fuscus, per ima cum pallore flavus; duplici per maxillas

Bellon. A-
quat. l. I.

femi circulatorum ordine notatus: oculo ex dimidio superiori fuscus, ex inferiori subaureus, pupilla niger. Linea per dorsi longitudinem porrecta, & veluti filo transverso corpora affixa singularis: notis per caudam atque pinnas nigris maculosus: quæ, pinna cum ira subest, inhortescunt: cum animo conquiescunt, resident. Bellonius scribit nullum alium *Channam* exanimem melius exprimere: mortuum n. hiare & oris rictum apertum tenere. Idem ait, recens *captum* hilari quadam ac subvirenti opacitate ceu pavonis torqueus, resurgere: imo vero extra aquam eductum, ac suo humore detersum, aureo fulgore in cæruleum abeunte insignem esset. Perca plurimum æmulari, nisi transversis lineamentis (quæ Perca insunt) careret: oreque magis esset recurto. Hoc potissimum signo dignosci, qui spineum branchiarum tegumentum, crenatum ut in Lupo & sua rima luxatum habet. Ubi autem linea quæ piscium latera secatur, ad branchias incipit, ibi aculeum caudam spectantem ut in Dracone marino videri. Sed & hoc à Perca dissidere, quod perca duas in tergore pinnas habeat. Cernua (sic vocat) unicam tantum, nullisque dentibus, sed neque lingua manifesta præditam esse; *squamæ* habere quadrangulas, robustas, crenulatis tenuibus in gyrum incis, quæ piscem Scabrum admodum efficiant. Radiis denique solaribus obiectam, *maculis nigris* per dorsum distinguere percipi: at totam sub ventre candidare. Cæterum non advertit Bellonius extremis branchiis, id est, branchiarum margini alterum paulo inferius aculeum adiunctum esse, quod observavit Gesnerus, qui tamen neutrum in duabus quas dedit, iconibus expressit. Sunt n. inquit, perexiles: ut in mediis etiam branchiis denticulatae aliquot spinulae crenatim (ut ita dicam) apparentes, si de proximo intuearis: superius minores & frequentiores: inferius maiores, paucæ & maioribus intervallis. Sunt autem illæ, inquit, digestæ in margine portionis cuiusdam branchiarum, quæ à parte

subiecta deduci & elevari potest. Est & supra branchias spinea pars obliqua, utrinque versus occipitium se colligens tantillis serrata denticulis, ut tactui magis quam visui pateant. Item alia pars supina triangularis superinnata, à branchiarum scissura, statim supra pinnas ibidem, retrorsum spectat, & in brevissimum sed acutum spiculum definit. Idem Gesnerus squamas rotundas esse negat, sed rotundas esse fere ut in aliis piscibus ait. Pinnam etiam dorsi unam esse oblongam & continuam, ut Bellon. dixit, & Cajus in communicata icona probe representavit: differre tamen partibus: nam anteriorem aculeis constare quatuordecim, quorum primi duo breviores propius iuncti sint, medij longiores, longitudine paulatim ad ultimum usque decrescente: partem posteriorem, molliorem esse, fibris non aculeis distinctam, brevior, & ab anteriore intervallo quodam inchoato discerni. Jam v. tres esse pinnas in supina parte, unam post anam, & binas summo ventre quæ nigris lituris, ut cæteræ omnes non distinguuntur. Ferunt amare *torrentia*. In Hollandia copiose in stagnantibus aquis capiuntur. Rarus est in Tamesi, plurimum in Ranello, quod Oxonium præterfluit. Cum *nata* Gobij & Bottæ more universas pinnas movet, si Cardano credendum, In vivaria coniectus, pisces alios exurere, quod ipsis aculeis molestus sit dicitur. Hyeme latet, in quadragesima commendatur. *Lapilli* quos in cerebro gerit, adversus renum lapillos & pleuritici commendantur.

CAPUT III.

De Scrollo, & Pungitio Alberti.

SCROLLUS Danubianus piscis est. **TAB. XXVIII.**
Color in Icone, quam Raphaeli Seilero acceptam Gesnerus refert, dorso fuscus est, lateribus subviridis, plurimis punctis fuscis intervenientibus: **15. 16. Aldrov. l. 5. c. 35. & 36.**

bus: quales etiam in pinna dorſi (cuius aculei albicant) conſpiciuntur: venter candidus eſt. Initium pinnae ad Branchias rubet, &c. Raro longior ſit, quam figura oſtendit. Quoquomodo paratus, in cibo optimus eſt.

PUNGITIUM Alberti, Rôdeletius *aculeatum* vocat. Author de rerum natura *Spinochiam*. Piſciculus eſt, inquit Albertus, minimus, qui lanceolas (aculeos) binas habet in radicibus pinnarum ventris. *Mas* ſub gutture rubet, *femina* rubore caret. *Squamas* non habent. Piſcatores hoc genus piſcium ſponte *generari* ajunt, & ex iſtis alios omnes, hac obſervatione inducti, quod in lacunis novis primo ſtatim anno inveniantur, & poſtea ſequentibus annis piſces alij diverſi, quanquam nulli fuerint immiſſi.

CAPUT IV.

De Alburno Auſonij & Epelano fluviatili.

TAB. XXIX. 13.
Bellon. Aq. l. l.
Aldrov. l. 5. c. 37. & 38.
ALBURNI meminit in ſua Moſella privatim Auſonius. Bellonius circa Vercellas in amne Lagogna Ticinum influenti, *Scavardinum* à piſcatoribus appellari ſcribit, Germani *Weißfiſchlin / & Roſtaugen* / id eſt, ἐρυθρόφθαλμον dicunt. Piſcis eſt & fluviatilis & lacuſtris, Alphyis albis ſimilis, oculis magnis, ruſceſcentibus, dorſo viſcente, ventre candido. Bellon. lineam utrinq; eſſe ait arcuatâ, quæ eius latera dividat. Sed Rondel. duabus diſtingui proſitetur, altera à brachiis ad caudam ducta, medium corpus dirimi: alteram minus evidentē à radice pinnae branchiarum orta deſicere, priuſquam ad caudam perducta ſit. *Nare* eſt parum reſina. Pinnas eaſdem habet quas Gobio. Capite eſt parvo: corpore latiſculo, ſed depreſſo, vixque ad duorum digitorum latitudinem extenditur. *Felle* caret. Argenteis tegitur *ſquamis* ac tenuibus. Carne eſt molli & parum pingui. *Poſtax* eſt piſcis, quam ob cauſam facile

homo capitur; unde Auſonius prædâ puerilibus hamis, recte dixit. Obſervavi Alburni duas alias ſpecies, quarum prior tergoſe fere ad caſtaneæ colorem vergit: altera ad cœruleum. Vtriuſq; pinnae & cauda etiam ad caſtaneum vergunt. Cætera argenteo colore reſplendent:

EPELANUM fluviatilem Bellonius **TAB. XXVIII. 17.** Sequanicum cognominat, à Gallia fluvio, ubi abundat, additq; ſic vocari quaſi excellanum à præſtantia, quæ cæteros ſui generis piſciculos excedit. Ferrarienſes *Borbolum* vocant, Alburno ſimillimum atq; hoc tantum ab eo diſſidentem, quod ruſſas radices pinnarum Gardonis & Veronis modo habet, ac lineam quæ latera ejus ſecat, verſus caudam admodum inflexam & velut arcuatam. Quinq; digitorum longitudinem, pollicis latitudinem interdum exuperat. Piſciculus eſt *odoratus*, de bonitate & principatu cum aliis omnibus contendens. Rothomagenſes *Ovellameo* argumēto nominant, quod ſemper ovis prægnans ſit. Epelanum ſi ſuas *Squamas* habentem conſpicias, præ nimia albedinis terſitudine tibi refulgere videbitur. Squamis autem exutus *tergoſe* oſtendit variis coloribus emicans, in iridis aut arcus cœleſtis morem. Marino craſſior eſt & brevior.

CAPUT V.

De Lucio.

LVCIVS vel *ῥόζος* à lupo, vel à **TAB. XXIX. 1.** *Aldrov. l. 5. de Piſcib. c. 39.* *Lucendo* dictus eſt. Nulla ejus apud veteres Græcos mentio, & oſtendit egregie contra Philelphum Salviſianus Oxyrinchus Niloticus quod Bellonius vult dici poſſet, niſi Plutarchus eundem marinum, tanquam è mari Nilum intraret faceret. Eſocem Plinii, quem in Rheno magnitudine excellere putat, haud difficulter cōcedi poteſt, & videtur abinde Belgicum Snock originem ſuam traxiſſe. Apud Anglos & Gallos diverſa, pro diverſitate ætatum ſortitur nomina. Corporis figurâ oblonga eſt, eademque ideo oblōgior videtur, quoniam piſcis latera modice dilatantur.

Dorſ-

Dorsum latum est, & fere quadratum, perpetuoque æquale, donec ad postremas pinnas ventum sit: & cum reliquis fere *Squamosis* piscibus dorsum ipsum magis aut saltem æque atque venter extuberare solent: huic uni venter, quam dorsum magis extuberat, potissimum ubi pinguior sit factus, quod tamen aliquando ichthyopolarum impostura etiam fieri Romæ observavit Rödeletius, piscium quorundam ventres infarcire tradens vilius herbis, atque ita ceu pinguiores carius vendere. Caput habet macrum, osseumque ac quadratum. Ossium seu *spinarum* in capite formas diversas repetiri ajunt: unam vulgo cruci comparant, aliam lanceæ, tres alias clavis seu paxilis, passionis Dominicæ instrumentis. Author obscurus de natura rerum scribit Lucium in cerebro lapidem crystallo simile gerere, sed hunc cum ævum in longum duxerit. Gesnerus vero testatur sese in capite Lucij etiam parvi, lapillos geminos candidos reperisse. Rostrum habet longum & rectum maximum, Anserino rostro comparat Rondeletius. *Maxilla* inferior superiore longior est, & cochlearis modo excavata. *Dentes* in eo plurimi, haudque uno modo dispositi, ut & Albertus ait, diversarum acierum; nam in maxillæ inferioris anteriore parte dentes parvi sunt, in os recurvi: in superiore maxilla nulli sunt, qui cum ea latior sit, dentes extra os prominentes & inferioribus non occurrentes inutiles forent. Horum igitur loco natura (inquit Rondeletius) duos dentium ordines palato infixit. *Oculi* coloris auri sunt æmuli, ante quos duo foramina in unicam cavitatem coeuntia: *Corpus* squamis regitur parvis tenuibus: ve adeo, ut ijs carere videatur, & cum ijs coquatur, & inter edendum, si parvus sit piscis, negligantur: sin major, duriores & evidentiores abiiciantur. Venter albicat, dorsum vero ex subflavo nigrescit, à quo lineæ plurimæ latæ, non recte, sed multipliciter inflexæ, obliquæ potius quam transversæ, in aliquibus magis, in aliquibus v. minus & flavæ & conspicuæ dedu-

cuntur, totumque piscem pulcherrime pingunt. Pinnis natat quatuor, duo sunt ad branchiarum ima: qui pinnarum situs est fluviatilib. piscibus communis, ut facilius in aqua suspendantur & efferantur: contra altius sitæ sunt eadem pinnæ in marinis, quia dulcis aqua tenuior est, & liquidior, marina crassior & spissior: ob id hæc potius magis sustinet, illa minus. Inferiore venteris loco duæ aliæ sunt magnæ & validæ. In dorso nulla est, sed non procul à cauda duæ sunt, una superior est nigris maculis notata. Cauda brevis, in duas pinnas definit similiter pictas. *Linea* medium corpus dirimens vix cernitur, quia ex minutis punctis constat. *Ventriculum* ita gutturi continuatum habere Albertus scribit, ut aliquando eum rejiciat aviditate glutendi piscem. Rondeletius permultas eius ait esse appendices, in quibus chylus cōfectus fervetur, ne ob gulæ laxitatem facile rejiciatur: Vidi ego magnitudine insigni Lucium, qui alium, & ipsum insigniter grandem ventrem contineret, & hic rursus murem aquaticum, ut latissimum habere ventrem necesse sit hoc genus piscium. *Intestina* tribus longis convolutionibus cōstant. *Hepar* ventriculum cōplectitur, in quo vesica est felle viridi distenta. Nullæ pulpæ earum *spinulæ* intercurrent, ut aliis fluviatilib. plerisque. In lacubus & stagnis ubique ferè reperitur, obscuras verò ulvæ cænoque lacunas obsidet. In mari nunquam visitur, in ostiis Rhodani & stagnis marinis aliquando, sed tabidos capi Rondeletius auctor est, sed & in fluminibus nonnullis haberi Aufonius in Mosella sua prodidit, in Tiberi vix quotannis denos, Salvianus. Nec difficulter dignoscuntur. Arctiori enim sunt corpore, toti argentei, flavisq; illis lineis carent. Tam est vorax, ut non tantum in pisciculos alios, & ranas. Sed & in animalia quædā grassetur. Narrauit mihi, inquit Rondeletius, quidam vir fide dignissimus, vidisse semulæ, quam iter faciens in Rhodanum potatum duxerat, labrum inferius, à Lucio dentibus apprehensum, cujus

eius de morfu cruciatam & territā inde fugisse, & crebra capitis quassatione Lucium in terram deiecis-
se, quem ille palpitantem & in aquam redire conantem cepit, domumque tulit. Anseris pullos duos in eiusdem repertos ventre se vidisse, quidā Polonus testatur, idem & fulicam invē-
tam, & pedem ancillæ in piscina ab eodem ad morsum prodit. Tā avide pisces persequitur, ut præ nimio celeritatis impetu, supra aquas elatus, in scaphas incidat quod me vidisse, cū Anno M.DC.XXXI. in meo ex Angliareditu, Landsberga noctuscapha veherer memini, A porculo seu minore perca abstinere quidam credūt, alij apprehenso capite devorare, ne si cauda arriperet, à squamis & spinis læderetur, opinantur. Albertus cap-
tum dentibus conterere, mortuum in ventrem propellere, vivum non devorari, prodidit. Summam ranæ cum Lucio antipathiam, eleganti Hi-
storia expressit Dubravius, quam vide. *Vitam* ei longissimam ex Lucio Friderici II. Imperatoris cognosci potest, quem in stagno quodā vixisse CCLXVII. annis ex annulæ rei, quem cum stagno eum Imperator inderet, in branchiis sub cute abdiderat, inscriptione Græca colligitur, quæ talis est. *Εγώ ἐκείνῳ ἰχθύος ταύτης λίμνῃ παντοῦρωτοῦ ἐπιτεθείς διὰ τῆ κοσμητῆς φιδερύς β. τὰς χεῖρας ἐν τῆς ἡμέρας τῆ ὀκτωβρίου*, id est, *Ego sum ille piscis huic stagno omnium primus impositus per mundi re-
ctoris Friderici II. manus, die quinto Octob.* Fuit enim inventus iste annulus in capto eo Lucio anno salutis M. CCCC. XCVII. ut testatur Conradus Celtis referente Gesnero in sua Epistola nuncupatoria. De eiusdem vivacitate ita Cardanus. Mirum est illud, quod à tot audiivi viris, ut impudentius fuerit tot testibus mendaciū non credere, quam veritatem adversus eorū auctoritatem tueri: Lucium scisso vētre ostēdēdi lactis causa; inde confuto atque inter Tincas in vi-
variis reposito, sanare humore earū, dū se illis Lucius vētre affricat. Martio Aprilique mensibus orvis turgent & pariunt, perguntque ad Iunium usque. Alij è Tincarum semine genera-

ri credunt. Quidam & sponte & ex alieno semine provenire, quod neque soli neque sati procreantur in eis, opinantur. Ex ovo editos, à quibuldā piscibus intra Branchias foveri, Encelii nugæ sunt. Quantum ad *Vsum in cibis* loviū inter obsonia plebeja recenset. Poggius etiam ex Cymino lacu, & quidem præpingui, nullam unquam inesse gratiam scripsit, nisi cum solus in maxima convivarum inedia prandiis apponitur. Thrasymenus lacus laudatiorēs profert. Braccianus, qui olim Sabatin⁹, inferiores. In Gallia tamen, Germania & alibi tanta putatur salubritatis, ut Adamus Lonicerus ēt puerperis concedat. Pinguiorēs tamē sunt Iulio mente & Octobri laudatiorēs, quibus Cyprini soboles: in piscinis esse deteriores cū semina spargunt. Ab Arnolde inter duræ carnis pisces recensetur, sunt qui caudam & partem posteriorem præferunt. Mediæ ætatis meo iudicio optimi sunt. Ova piscatoros circa Argentinam tanquam medicata abiciunt. Gesnero sunt æquæ ut Barbinoxia. Apud nos absque periculo in usu. *Vsum in Medicina* quod spectat, Mandibula in pulverem redacta in Calculo, urinæ difficultate, & pleuritide usurpatur. Saliti ossa pulverizata spodij vicem præstant, & ulcera exsiccant.

CAPUT VI.

De Cyprino.

CYprinus Oppiano *κυπρινός* dicitur. Nomen forte à Cypride, ut Gesnero placet, quod sæcūdiffimus sit, sortitus est, ut *λεπιδώτης* apud Athenæum, vel à squamis seu latissimis & maximis, ut Rondeletio visum, seu ita firmiter vallatis, ut lapidis ictus facile repellatur ut Bellonius credit. *Carpam* Cassiodorus vocat, Brasavolus ob magnitudinem *Reginam*, *Carpionem* alij. Crassior est magis quā longior, nec ulli piscium magis quam Tincæ similis. Superius enim *labrum* rotundum est ac croceum, ex quo utrimque (Tincæ instar) gemina barba

TAB.
XXVII.
II. 12.
TAB.
XXIX. 2.
3. 4. 6.
Aldrov. l. 5.
c. 40.
Cassio. l. 12.
Epist. 4.

Aristot. H.
A. l. 4. c. 8.

Bellon. A-
quil. l. x.

barba pendet, lōgior una, mollis flavescens, in acutum deficiens; *Músanas* (inquit Rondeletius) possis appellare: brevior altera, & ideo minus evidens, nigricans. Capite est brevi pro corporis ratione, Tincis hac etiam parte similis. Ore medio, labris adiposis, carnosisque; *lingua* caret: sed eius loco palatum carnosum dedit natura saporum percipiendorum causa: quod evulsum, linguæ formā adeo referte Salvianus & Rondeletius aiunt, ut non solum vulgus, sed etiam viri docti (Albertus linguam sapidissimam esu dixit, improprie itaque) linguam vocent, & linguam veram esse perfectè defendant. Imperfectam tamen piscibus esse linguam, & carnosum Cyprianop. palatum, non modo vetustati & Arist. visum, sed & experientia, quæ substantiam illam palato affixam inferiori parti nullo modo hærentem, nec ullo pacto solutam aut liberam testatur. Gesnerus tamen testatur sese linguam (ut vocant) separatam à palato, in parva etiam Carpa duos digitos latam vidisse, linguæ in quadrupedibus proprie dictæ figura: substantia quoque & gustu saporeve simili. Usus quoque eius & facultatem gustandi, similem esse, inquit, dixerim. Quare linguam appellare, nihil prohibere putat, quoniam ut lingua sit, vel dicatur, neque locus aut situs facit, cū aliæ etiam partes situ diverso nomen idem retineant. *Dentibus* carere hoc genus piscis Rondeletius asserit, horumque vice os palati medio infixū planum habere, læve, triangulare: ex adverso, in parte inferiore ossa duo incisa, in gulam recurva. Bellonius vero Cyprinum dentes quidem in ore non habere ait, sed tantum in ingressu faucium: & Gesnerus intra fauces eius dentes latere asserit, sed neque vel oculis diducto ore, neque tactui immisso digito apparere. Esse autem in maxillæ recurvæ medio dentes qui nos fere accumulatos, chæradum instar, situ & magnitudine inæquales tres maiusculos, duos exiguos præduros, cavos, superficie summa lata sive plena, obrusa, sed li-

neis quibusdam exasperata, unum tantum & candidiorem cæteris & superficie lævi in mucronem brevissimum fastigiata. Idem Gesnerus lapillum in capite habere tradit iuxta linguam, candidum, durum, ad minimi numismatis magnitudinem, interdum paulo maiorem. Habere & in medio capitis substantiam quandam maiusculam, crassum, cordis fere figura, duram sed tenacem & flexilem, dum recens est, sub dentibus mordentis, tanquam in acetabulo quodam repositam, similiter ut Leuciscus fluviatilis, quem Gardonum vocant Galli. De hac forte sensit, (inquit) Encelius, & improprie lapidis nomine appellavit, his verbis: In Carpæ faucibus reperitur gemma seu *lapis*, forma triangulari, magnitudine proportionem piscis, coloris candidi extra, intus flavi, *Oculis* est mediis, ante quos sunt foramina. *Pinnis* natat latis. Duæ sitæ sunt ad branchias magnæ, in medio Ventre duæ: inter quas & caudam alia est unica: quæ ferrato aculeo & valido innititur: inter hanc & præcedentes est excrementi meatus. Ex medio dorso unica erigitur, ad caudam ferè continua, robusto etiam incisoque aculeo fulta. Cauda lata est ex nigro rubelescens, ut & postrema pinna. Ipse vero colore est flavescente, maxime cum senuit. Iunior enim colore magis est ad fuscem inclinante. *Branchiæ* utrinque quaternas, duplici ordine, novissima excepta habere Cyprinum testatur Aristoteles: Gesnerus vero quaternas in ea se reperisse tradit, sed omnes duplices. *Squamis* magnis, validisque regi, ideoque Lepidorum Dorioni vocari. Eas et si *ἀργυρεῖς*, id est, argenteas vocaverit Orpheus, docti haud necesse propterea esse putant, alias esse statuendum, cum de coloribus Poetæ sæpe loquatur improprie, & epithetis aliquando abutantur; creditque Gesnerus commune hoc squamarum epitheton esse, quod ut facile credo, ita hic *ἀργυρεῖς* si quis splendentes vertat, eū peccaturum non puto. Ipsæ autem ad aureum inclinant, Sunt qui hunc piscem

piscem pro sua magnitudine, plus sanguinis habere dicunt, quam ceteri pisces, ideoque minus frigidi temperamentum esse probabile videri. *Vetriculum* mediocrem habet; *Hepar* subrubrum, cui sub nigra *fellis vesica* hæret, & *intestina* admodum pingua, *splenem* magnum. Crebro quinque & sex librarum pondere reperitur, aliquando etiam viginti: Iovio vero teste in Lario lacu ducentarum quoque; Maximum enim aiunt, qui in eo nascuntur piscium. De loco non convenit inter auctores. Plinius marinum facit, Oppianus littoralem. Aristoteles inter fluviatiles reposuit, *Ælian.* in Danubio quoque capiscripsit. Dorian inter fluviatiles & Lacustres collocat. In Lario lacu admirandæ magnitudinis capi, Iovius auctor est. Larius, inquit, lacus, ob longitudinem à Virgilio maximus nuncupatus, pisces longe omnium maximos gignit. Troctas (Trutas) centum aliquando librarum pondere, & Bulbaros ducetarum; Sed Bulbari illi ingentes videri potius liquidis ac perspicuis in undis quam capi retibus possunt, cum ea impotenti impetu plerumque dilacerent. Subeunt solstitij diebus umbrosos specus in rupibus Licinianis, quæ sunt in adversa Larij ripa contra Insulam, Euripumque; illum gemmeum à Cæcilio Plinio celebratum. Eos industrius quidam sacerdos sagittis arcubalista emissis, cum in profundo quiescentes fuscinis atque tridentibus attingi non possent, vulnerare conabatur, neque tamen sagittæ longo alligato funiculo, nisi aversi officiebant, cum illa squamarum serie thoracati earum ictus facile repelleret. In lacubus Allobrogum maximi quoque proveniunt. Alicubi in piscinis & variis includuntur, alicubi in paludes & stagna coniiciuntur, in quibus plurimum proficiunt. Ut vero scribit Albertus: Hic piscis in aliquibus aquis generat, & in aliquibus grassatur & crescit, sed optime valet in fundo argilloso, tritico primo seminato, & postea argilla desuper spersa, & postea aqua superfusa. De partu & quæ circa ipsum eveniunt, isthæc fere Aristoteles prodidit. Cyprini &c. vide

Scaliger. Sponte etiam nasci & Rondeletius & experientia comprobant. Vidi inquit ille, in aquis, in cava loca & montibus septa receptis, & collectis sponte generatos Cyprinos, in quæ loca nec rivus, nec stagnum, nec palus, nec lacus, nec fluvius ullus, nulla denique aqua præter cœlestem influisset. Fœminam lac ore suscipere, inde futura ova concipere falsum est. Herbis, luto, muro, & aliis vescitur. Athenæus carnivorum dixit. Astu plurimum valere, & ut reti capiendus evadat, varia machinari Albertus atque autor de natura rerum tradunt: primum n. circumeuntem, foramen quærere: hoc non reperto transilire conati, vibrato in aerem corpore: aliquando sub reti, suffodiendo sc. in fundo, effugium quærere: alias herbam aliquam ore tenere, atque ita retinere sese, ne trahatur à reti: alias caput fundo ingerere, haud ignarum, rete, dum nisi caudam tangit, elidi. Refert Gesnerus se cognovisse ex homine fide digno, in Palatini regione Germaniæ, in loco cui nomen à Michaeli & campo vel agro, in fossa circa arcem Carpam esse, quæ centesimum vitæ annum attigerit, unde longævum piscem esse conicere possumus. *Carme* sunt in universum molliore, nec tamen ita insalubres, quod humiditas non sit viscosa, præsertim eorum, quæ in rapidis & puris aquis nascuntur. Martio in primis commendantur. Maio & Junio, quod genitura vel emittat vel recens emiserit, non item. Mas fœminæ præstat, maiusculus minori. Caput à ganeonibus expetitur, propter linguam forte, quæ si assetur, prædulcis est, & bene cum succo citri apparatus. Ex ovibus Caviarium rubrum apparatus, quod Iudæis dicatum est. *Medicinam* si spectes, lingua vim augendæ Veneris habet. Lapillus de capite, crudo pisce extractus, febricitantium æstum sedat, & sanguinis è naribus fluxum cohibet.

CAPUT VII.

De Cyprinis Monstrosis.

Miram hanc piscis speciem Lugduni in foro piscatorio vivam aliquando venditam, nullus fuit inquit

TAB.
XXVII. 10
Aldrov. de
Piscib. l. 5.
c. 41.

quit Rondeletius) qui non demptis capite & Roſtro Cyprinum eſſe iudicavit. Nam ſquamarum figura & Colore, pinnis earundem ſitu, cauda idē plane eſt cum Cyprino. Pinna dorſi initio aculeum incifum habet, ut in Cyprino. Eundem aculeum habet alia pinna quæ excrementorum meatum ſequitur, quæ rubefcit, item caudæ pars ei reſpondens. Tota cauda lata eſt, ut in Cyprino. Duas alias pinnas habet ad branchias, ſimiliter duas in ventre. Caput habet non protenſum ut Cyprinus, ſed Delphini capiti ſimile, roſtrum ſatis longum, ſed obtuſum, quale revera pictura repræſentat. Ex ſuperiore roſtri parte iuxta oris ſciſſuram appendix carnoſa utrimq; una dependet, ut in Cyprino, hac ſuperior eſt alia brevis & vix apparēs, niſi propius inſpicias utrimque ēt unica. Hæc Rondelet. *Similem huic monſtroſo Cyprino*, ſed barbulis inſignem, quas in ſuo Rondeletius non expreſſit, Gilbertum Cognatum Nozerenē ad ſe miſiſſe teſtatur Geſnerus, in Nozerethano ſtagno repertū, anno ſalutis 1554. In Cognati vivario novem tātum diebus vixiſſe. Verum longe pulcherrimum fuiſſe nec ſpecie colorib. ratum & admirandum Cyprinum illum, qui anno Domini 1546. Omburgi in Ditione Comitatus Palatini, Marchionis Ioachimi Brandeburgenſis captus & Auguſtā miſſus eſt ad Carolum V. Cæſarem in comitiis illic agentem, qui eum Sorori Mariæ donavit, coctum etiam colores retinuiſſe. Picturā eius ſibi cōmunicāſſe Io. Thannmyllerum iuniorem chirurgum Auguſtanum peritiſſimum, in qua longitudo, inquit, apparet trium dodrantum : latitudo digitorum novem, quæ eſt in medio dorſo ad ventrem medium. Pinnæ dorſi initiū partim aureo, partim rubro colore eſt, deinceps v. pulcherrimè cærulea: reliquis pinnis omnibus color aureolus, ut capiti ēt magna ex parte ac ventri, ſed paſſim etiam rubedo intervenit, quæ barbulaſ quoq; quarernas tingit. Dorſum ex viridi cæruleum, latera ſuperius viridia, inferius aurea, &c. In ſumma ſuaviſſimis floridiſſimiſque coloribus vnde-

qua; adeo eleganter pictus atq; diſtinans eſt, ut vel cum rubri maris elegantiffimis quibuſdam, maximiq; variis piſcibus certare poſſet. Narrat item captum eſſe aliquando apud ſuos Cyprinum hermaphroditum, in quo utriuſque ſexus notæ (hoc eſt & genituræ & ovorum vaſa) comparuerunt. In piſcinis vero contrarium quandoq; reperiri, nempe neutrius ſexus Cyprinos, nec mares nec fœminas, & hos forte eſſe, quos ſponte naſci Rondeletius author eſt. Idem Geſnerus hac quoq; forma Cyprinū alium captum eſſe teſtatur in Acronio ſive Conſtantienſe lacu, prope Retz, duos fere dodrantes longum in præſentia illuſtris & Generoſi viri Comitatus Wolff de Schamburg. anno ſalutis 1545. idibus Novemb. Picturā ad ſe miſiſſe Archillem Pyrminium Gaſſarum medicum eo tēpore præſtantiffimum. Pronam partem nigro colore pictam fuiſſe, latera fuſco, ſupinam luteo. Spectabilem in eo præcipue faciem, æmulam humanæ latitudine ſua, nec non oculis, ore, naſo buccis ac mento. Hæc ſcripſerat, cū eundem piſcem Raphael Seilerus juvenis Auguſtanus clariffimi medici Geryonis filius, cum omnimoda eruditione, tum iuris ſcientia & comitis Palatini dignitate nobilis, pictum ad eum dedit, cum deſcriptione huiusmodi. Piſcem hunc omnino qualē depictum mitto, fuiſſe captum in flumine Auſtriæ (quod vocant die Eris) in ditione comitis Iulij de Hardegg prope urbem Retz anno 1545. menſe Octobri, viri quidam eruditi & graves, mihi veluti teſtes oculati confirmaverunt. Faciem non averſam, pro ut reliqui, vel obtuſam ſed repreſſam, ob aliquo in planum aſpectu tendente, cum temporibus utrimque latis, oculis binis, naribus, ore, mandibula, omnia effigie humana habuit. Pinnis, ſquamis, cauda, totoque corpore poſteriore, ipſaq; adeo magnitudine atque colore Carpam præ ſe tulit. Rete captus eſt ſolus, & obrarieratem ac maxime quod ſenſibus etiam ignotus eſſet, diu conſervatus, & veluti miraculum quoddam paſſim aſportatus.

CAPUT VIII.

De Cyprino Lato Ronde-
letii.TAB.
XXIX.5.
Aldrov.de
Piscib.l.5.
642.

CYprinus latus Germanis *Bresem*, Italis *Scarda* seu *Scardula* dicitur. Bellonius *Abramidem* veterum nullo fundamento adiecto arbitratus est. Cyprino adiungitur, quia est squamis, corporis specie & vita similis. Piscis est maximus & latissimus, capite parvo, p corporis magnitudine, dorso repando & cultellato, corpore compresso, squamis magnis tecto. Linea à branchiis ad caudā ducta curva est. Ad branchias pinnæ duæ sunt, in medio ventre duæ aliae, ab excrementi meatu alia ad caudam continua. Huiusmodi pisces in lacubus maximis nascuntur. Vidit Rôdeletius in Arvernæ lacu quodā istiusmodi pisces, qui binum cubitorum, pedum totidē latitudinem æquarent. Nostro in foro copiosissimè prostant: minores *Scardas*, maiores propter dorsum insigniter repandū *Gobbos* quasi gibbosos nuncupant, suntq; pedales plerumq; bipedales rarissimi. Scribit Gesnerus *vadum* amare argillosum, vel albicāti argillæ simile: ideoq; in lacu Tigurino nō passim, sed superiore eius parte capi. Stagnantibus a. aquis præcipuè delectantur, illic quemuco, luto, herbisq; vescuntur. Quare in iis tantū capiuntur fluviis, qui tardius fluūt, turbidaq; sunt, & crassiore aqua, qualis est Araris: multi itē in Gallia Belgica: nec in his ad eandem unquā magnitudinem accrescunt, ad quā in lacubus & stagnis. Mirum q; narrat idem Gesnerus, nimirum quēdā in Polonia permultos horum piscium coniecisse in piscinam quæ mox superveniente hyeme tota congelata esset: & cum parendi convivii causa, remoto gelu pisces capere vellet, ne unum quidē invenire potuisset: sequēti a. vere rursus omnes apparuisse. Ad hosce latos Cyprinos referri debet piscis huiusmodi è Polonia missus, ubi *Klofzcz* dicitur, totus ex subcæruleo ad violaceum vergens, exceptis pinnis &

cauda quæ albicant. Pinna quæ ab ano est longiorem & in exortu latiorē quam pars est, à pictore puto, expressa est. Habentur à quibusdam in pretio in Arvernia imprimis, ubi in lacu quodam magni & pingues capiuntur. Nonnulli partem in eis mediam expetunt; alii plus molestiæ ob minutissimas spinas inter edendum quam voluptatis asferre arbitrantur.

CAPUT IX.

De Cyprino lato alio, &
Ballero.

TAB.

XXIX.

Gesnerus ex relatione Kentmani, *tria* huiusmodi piscis genera in Albi reperiri tradit. *Primigenis* pisces esse parvos, tenues, latos, colore sub aureo, cui circa dorsum fuscus admiscetur. Dupla eis ad latitudinem longitudo, caput parvum. Pinna dorfi & cauda fusci coloris sunt: reliquæ verò quinque pinne, è fusco puniceæ. Squamæ ut in Cyprino. Genus hoc Miseni parvum cognominant, *kleinkarass*, vel à colore *Giblichen*. Vivaces sunt admodum. E piscinis & stagnantibus aquis in Albim veniunt. Raro octo digitos longitudine excedunt. Vescuntur gramine & argilla, ut & reliqui huius generis pisces: quamobrem magis amant piscinas, quàm fluentes & lapidosas aquas, propter vadum herbosum & argillosum. Itaque rarius in Albim reperiuntur. In piscinis quidem multiplicari eos non patiuntur domini, impediunt enim incrementa & saginationes Cyprinorum, quos à pabulo depellunt. *Alterius* verò generis *karas*, aliquanto crassiores & longiores sunt, *Squamæ* similiter ut prædicti vel ut Cyprini, è gilvo seu flavo nigricantes habent: vocantur autē *Halbkarass*, id est dimidii *Carasi*, quoniā è *Caraso* & *carpa* veluti compositi videtur. Hi quoq; ut primigenis *Carasi*, & piscinis aut stagnantibus aquis Albim ingressi, pariunt in eo & cresunt. Vtrisque caro est subflava, & in cibo viscosa, quomodo cunq; parata.

X 3.

Quo

Quo diutius verò in Albi immorantur, eo sapidioris solidiorisque carnis evadunt. *Tertii demum generis* Carasii tenuiores & latiores sunt, quã dimidii nunc dicti, similes primis sed maiores & pulchri, cãdoris argentei, habentq; pinnas parte supina rubentes, superior vero pinna cũ cauda obscurius è fusco punicea est. Hi pisces in Albi nascuntur, non aliunde (ut prædicti) ingrediuntur. *Pariunt* primũ lunio mense, secundò Ianuario, sicut & superiores, quibus temporibus etiam præcipuè capiuntur. Mediocriter augentur, ut sesquibilibus aliquando aut bilibilibus capiantur. Aflari solent & in pretio habentur. Fœminę ovis gravidæ, elixæ etiam in aqua ad juris ferè consumptionem, vel copioso butyro ad jus sub finem adiecto, non displicuerint. Est in Frisia orientali piscis, quem *karutz* appellant, Carpa multis partibus minor, tergo magis arcuato & gibbofo. Sexies in anno parere unanimiter affirmant, qui ipsum in variis servant.

TAB. XXVII. DE BALLERO ita Aldrovandus. Aristoteles Ballerum inter fluviatiles & lacustres bis meminit. Ballerus, inquit, & Cyprinus & cæteri fere omnes, cum parturiunt, undis se intrudunt. Et alibi: Ballero & Tilloni lumbricus canis ex ortu innascitur, qui debilitat, cogitque ad summa stagni efferri, qua æstu intereunt. Hunc Rondeletius eum esse conjicit, qui à Lugdunensibus, & lacuum qui in Allobrogibus sunt, accolis Bordeliere nominatur, quod littora semper fectetur & quærat. *Bordenim* littus significat. Cæterum cur Ballerum faciat, nullum adducit argumentum, nisi quod vita & moribus à Cyprino, quo cum nominatur ab Aristotele, non differat. Vilis est piscis. Strymonis amnis accolæ vulgo *Plestyam* teste Bellonio vocant, in Macedonia ad Pischiacum lacum, ubi plurimus est, modo *Platanus*, modo *Plestyam*, modo *Platogniam*. Hollandi, apud quos cum ob copiam, tum quod per se insipidus sit, vilissimus habetur, *een Bleye*. Bramæ, inquit Rondeletius, tam similis est, ut parum cautis pro Bramis sæpè

vendatur, sed ab iis magnitudine corporis & squamarum differt & pinnarum & caudæ colore. Est igitur Ballerus capite brevi, ore parvo, sine *dentibus*, sed horum loco ossa habet aspera: sine lingua, sed *palato* carnofo: Pinnae duas habet ad Branchias, duas alias in medio ventre, ab excrementi meatu unicam ad caudam usque in dorso aliam. Posteriores pinnae cum cauda rubro colore perfusæ sunt, ut in Percis fluviatilibus videre est; quæ in dorso est, nigricat. Linea à branchiis ad caudam curva producta est. Branchias quaternas habet, os in medio palato, ex adverso sita sunt ossa duo loco inferiore, altera parte serrata, quibus contrario occurfu cum palati osse herbæ atteruntur. Venterculum parvum habet, intestina pinguedine oblita, hepar ex albo rubescens, in quo fel viride splenem rubrum. Multis spinis abundat, frequentes *squamas* habet, rotundas & tenues. Tergus eius nigricat, venter candidat. Oculorum pupillam Bellon. non ut in aliis nigram, sed veluti crystal-
linam esse asserit, iridem vero albissimam, ac tredecim squamarum ordines utrinque in lateribus habere.

CAPUT X.

De Tinca.

Tincam vulgatissimum ubiq; terrarum piscē, à solo inter veteres Ausonio memoratum, ab aliis quod nullo in pretio fuerit, neglectum, Iovius existimat. Bellonius Aristotelis *ψύλλα*, quæ Gaza *Fullonem* vocat Dorianis apud Athenæum *γυαφεα*, id est Fullonem dici, credit: metuo ne perperā. Non tantum n. Tincæ decocto, sed & aliorum glutinosorum pisciũ, Ichthyocollæ, Anguillæ, &c. maculæ eluuntur. Fullo quoq; Aristoteli marinus piscis est, Tincā inter fluviatiles & Lacustres reponimus. *Manā* non esse, q̃ Platinæ placet, vel ob ultimā hanc rationem, quia marinus est, certũ est. Quid si verò, inquit Aldrovandus, Romanam vocem esse dicamus, à qua

Bell. de Aqu.

l. 2.

TAB. XXIX.

Aldrov. de Piscib. l. 5.

c. 45.

à qua sententia idem Iovius non videtur declinasse. Celebratur enim apud Ciceronē, quidam facetus orator Placentinus cognomine Tinca, fortassis, inquit, ab hoc pisce cognominatus, quemadmodum Florentiæ Laurentius Medices senior, uti erat perurbanus, cuidam celebri familiæ civi, se domi Tincā ingentem exquisita arte coctam falso iactanti, Tincæ cognomen, quod illi postea fuit æternum, indidit. Quemadmodum Merula ob similitudinē cum Tinca, item Callarias noster, Tinca marina vocari meruerunt, quid vetabit, si Tincam etiam Merulam palustrem dixerimus? Hoc sanē nomine usus est doctissimus Scaliger his verbis: Ausonius sui temporis secutus plebem, usitatis nominibus, pulcherrimū poemā non est veritus inficere potius, quam aut ipse in ambiguo versari, aut iactare Authorem in obscuro: sic Alosam pro Clupea sive Thrissa, Tincam pro Merula fluviatili posuit. Habet quibus cum Cyprino similis est, habet item quibus cum plurimum ab eo discrepat. Corporis enim specie, pinnis earumque situ, & palato carnoso cum eo convenit: squamis verò nō item. Hæ Cyprino maiusculæ, Tincæ vero perquam exiguæ tenuesque & muco semper obductæ: adhæc Tinca iuxta oculos circum habet rubrum qui in Cyprino flavescit. Color omnibus haud idem, aliquæ enim subalbidæ sunt; plurimæ ex albo flavescentes, nonnullæ virides, quæ verò in maris degunt paludibus, ut in multis Hollandiæ locis, subnigræ sunt. Ausonius viridem dixit, cū plerumque flavescat potius. *Rostrum* habet breve acretusum: os fere rotundum, ad venterem inclinans, planè edentulum, at pro dentibus serrata ossa. Ex utroque oris latere, ubi inferius labrum superiori committitur, appendix pendet, ut in Cyprino, cutacea, rotunda, brevis, mollis, ac lubrica adeò, ut nunquam explicetur, conspicuave fiat, in digitis comprehensa extendatur. *Oculi* sunt magni & aurei. *Pinnæ* binæ sunt ad Branchias, totidem aliæ in ventre, à podice una, in dorso alia

brevis sine aculeo. Cauda in latam pinnam definit. Branchias habet quaternas duplices, lapillos in capite Auratæ & reliquorum marinorum more, binos exiguos. Stagnantes potius quam currentes aquas amat, ideoque in stagnis, lacubus ac paludibus quàm in fluminibus frequentior, & inter arundines ulvasque plerumque victitat, omnique anni tempore hisce in locis capitur. E rivis a. flumina maiora quandoque intrat, sed degunt maxime, ubi vadosa sunt, vadūque ipsum limosum. Gregalis est, putrescentis limi sordibus vescitur, carne nequaquam. De *amicitia* eius cum Lucio supra dictū est, quibus si lubet, adde, q. cum Lucius in ceteros tyrannidem exerceat, à Tinca quasi beneficii memor, prorsus abstinet. Cū occiditur, diu supervivere fertur. *Vsum* in cibis quod spectat, intiuavē habent carnem, quia impurum & damnatum alimentum: ideo commune est apud Italos mulierculas diverbium. *Nessuno mangia Tenca, che febre non sente*, & Ausonius vulgi solatia dixit. Diebus tamen canicularibus in primis noxiæ putantur, quanquam Mariscana è Tucino lacu, qui nunc Celanus, quæ labio inferiore trito, quod saxoso eius loco volutentur, à vulgaribus distinguuntur, laudantur: nec non illæ, quas parvus lacus quarto decimo ab urbe lapide, apud Bacanam sylvam, profert. Hac teste Iovio, nobilis quidam propinalis lautitiæ studiosissimus, autumno captas, allio laridoque contritis, additisque odoratis oleribus & multo aromate, in teganis ad vaporem tepidioris furni felicissime percoxit. Laudatur denique Thrasymena Tinca, de qua idem Iovius: Cum in cœna Leonis X. Pontif. discumbentes, pelagios pisces vario iudicio certatim atq; impensius laudarent, nobilis quidā Florentinus Tincis fortasse solum affectus, extollatis, inquit, convivæ, ut lubet marinos pisces: ego certè Trasymenam Tincam conditam leucophago, his vestris Triglis, Spigolis & Rhombis prætulerō: quo suo insulso dicto lachrymas omnibus præ risu excussit.

Veteres medici (inquit Medicus quidam apud Gesnerum) ad sopiendos capitis & artuum dolores, torpedines admovebant, quarum loco à mediterraneis Tinca forsan usurpari potuerunt. Sunt qui non febrientium modo æstus Tincis pedibus subditis, seu alligatis vivis temperari, sed idē remedium adversus arquatū etiam morbum proficere putent. Iovius quoque scissas per dorsi longitudinē, pedum & manuum plantis applicatas, ardentis febris ardoribus plurimum adversari, quosdam tradit putare ex secta Iudæorum, qui quam sordidæ admodum, inquit, & ridentibus aliis talia experirentur, aliquando tamen ipsis æstuantibus exoptata blandimenta feliciter attulisse comperti sunt. Monet vero Rondeletius, ut id opportunè fiat, quod alioqui non modo nihil profuerit, sed contra maximè obfuerit. Frigiditate siquidem intro repellente ac magis constringente augeri incendium. Alii ictericorum jecori aut umbilico vivam imponunt. Icterici aliqui Tinca viventem alligant umbilico, donec immoriatur, postridie rursus aliā alligant, idque etiam certo die repetunt. Tinca immortua intus ac foris veluti croco tincta redditur, & plerique hoc remedio restituuntur. De felle hoc ex libro Germanico manuscripto habet Gesnerus: Fel de Anguilla, Thymallo, Tinca & porcellolactante, misce ad aurium remedia. Hoc enim infuso, pelliculas rumpes, fluxiones curabis, vermes aurium occides.

CAPVT XI.

De Lota Gallorum.

TAB. XXIX. **L**ugdunenses, inquit Rondeletius piscem qui in Arari invenitur, Lotam vocant, qui à Gebennensibus Mustella quasi Mustella nominatur. Si quis Mustellam lacustrem vel fluviatilem appellaverit, non ineptè meam quidem sententia fecerit, modo non eam accipiat, quæ ex mari fluvios petit, qualis est Mustella Aufonii, qui

Mustellæ nomine Lampretam nostram describere videtur. Lota Piscis est fluviatilis & lacustris. Mustellæ marinæ vulgari, de qua alibi diximus, similis admodum, nisi esset corpore rotundiore & spissiore. Ex maxillæ inferioris extremo pilus unicus veluti ex mento barba propender, nullus in superiore eminet, ut in martina. (Gesnerus tamen in suis putat etiam supra duos pilos esse, sed in mortuis ferè latere, ut in maxima observavit.) Pinnis quatuor natat, duæ sunt ad Branchias sitæ, duæ in ventre, ab ano unicam continuam habet ad caudam, huic æqualem & similem in dorso, quam præcedit alia pinnula. Cauda mucroni gladii figura similis est. Parvulis squamis corpus tegitur, quod è ruffo fuscum est, & maculis nigris undulatis dispositis conspersum. Dentes parvulos & tenues habet. Muco oblita & lubrica Lota est, ut Anguilla. Ventriculum parvum habet cum multis appendicibus, intestina convoluta; hepar albicans, in quo fellis vesica, quæ ex viridi flavescit, splenem rubrum, vesicam oblongam aere plenam, branchias quaternas & duplices. Nascitur in lacubus & fluviis leniter fluentibus, ut in Arari. Hepar pro corporis ratione magnum est, & delicatum habetur. Ova noxia, quemadmodum ova Barbi, quæ ventriculum lædunt & alvum turbant. Caro tota à Lugdunensibus habetur in pretio.



TITULUS IV.

De Piscibus lacustribus.

CAPVT I.

De Umbla vulgari, & Rondeletii.

Inter Lacustres pisces censentur, Umbla, Trutta, Lacustris, Carpio, Lavarelus Allobrogum, Bezola, Albulæ, Albus Salviani, Farra, Pigus, Sarachus,

TAB. XXX. 1.2.

rachus, & Schilus. Umbla, quasi umbra, quod haud exiguum cum umbra fluuiatili similitudinem habeat, dicitur. Rondeletius *Salmonem lacus Lemani*, quod corporis specie, pinnarum numero, situque & partibus internis. Salmonem referat, vocat. Helvetii à Colore circa ventrem rubicundo, *Rotele* nomen indidere. Duo eius esse genera magnitudine maxime differentia in Lucernensi lacu Gesnerus tradit. Maiorem circa Bielam Rott, alicubi Roote appellari: à Sabaudis *Route*; circa Lemanium vero Umble minorem diminutivo nomine *Rotele* privatim dici. (Est & alius in Suevia & circa Augustam *Rotele* dictus, sed fluuiatilis, non lacustris piscis, Truttis quoque affinis, Germanis cæteris ferè Huch nuncupatus, quo de suo loco diximus) Sabaudia circa Bielam *Ronson* vel *Bondelle*, illo nomine colorem indicari, hoc forte bonitatem. Denique piscem qui in lacu Bavarie Ammersee vocatur, Germanice *ein Pissling*, non aliud quàm Umblam minorem videri: confert enim Salmoni parvo; & à dorso usque ad mediâ latera coloris lutei esse dici, adeoque tenerum, ut statim *extra aquam* exspiret, nec in alio ullo eius regionis lacu inveniri. *Umblama* ior corporis forma partibusque omnibus Salmonibus & Truttis similis est. Os habet magnum, *dentes* vero non solum in maxillis, sed etiâ sex magnos in lingua. Caput livescit, branchiarum opercula argentei sunt coloris in extremo aurei. Magis albicat quàm minor. Nullis suggillatur lituris, unicâ esse parvam tergoris pinnâ Bellon. scribit: Rôdel. tamen non longe à caudæ exortu aliâ sed admodum exiguâ depingere videtur, & ipse Bellon. eandem in icone exprimit, & mox puto apophysim carnosam vocat. Idem Bellonius juxta ventrem, pinnâ (in impressis codicibus branchia legitur sine sensu) utrinque unâ esse ait, sed quâ nec ipse, nec Rôdeletius quoque pingit: duas sub ventre huic oppositas, omnes sine aculeis: postremas piscem in duas æquales partes interfecare, sed partem quæ ad caput est, paulo longiorē esse. *Cutim* adeo glabrâ esse, ut squamis carere videatur. Tergus præ multo livore opacum

apparere: ventrem præ albedine uti argentum micare: apophysim carnosam habere supra *caudâ*. Umbræ, Truttarum, &c. more. Quaternis præditâ esse *dentium* ordinibus in palato serpentium more, *linguâ* ostendere aduncis in gyrum dentibus, crenatis, exertis & hamatis senis, vel eo pluribus cōmunicâ, præter hoc maxillâ etiâ inferiorem parvulis aliis exertis & parum falcatis in ambitum vallari, brachias habere utrimque quatuor: latera eius virgula recta secari utrimque per medium corpus, parum repandum versus ventrem. Tres aut quatuor dodrantes plerumque longa est. In Lucernensi lacu brachii fere longitudine excrescere Gesnerus testatur, & Rôdeletius duos aliquando cubitos longas à Lemano lacu Lugdunum advehi. *Minor Umbla* (ut idem Gesnerus refert) dodrantalis plerumque; aut brevior, pedem raro excedit, aut si amplius, increfcit. Vidi n. inquit, aliquando palmos quinque longâ. Octobrimense in Lacu nostro captâ corpore latiusculo, nunquam tamen Umblæ majoris magnitudinem attingit. *Ventre* turgidulo aliquando spectatur, propter *vesicâ* nimium inflatâ. Est a. velica ei oblonga, ut Albulis, non distincta per medium. *Dorsum* totum cum dimidia laterum parte subroscum: Inferiora latera albicat. *Venter* albissimus est: caudæ color idem, quod dorsum pinnulam mollē & parvam, ut Truttæ, dorso extremo gerit. *Maxillis* est dentatis. Spinas etiâ ceu dentes in *lingua* habet. Pinnæ omnes partim subalbæ, partim crocei coloris sunt. Branchiæ quaternæ. *Lappillos* in cerebro habet. *Mares* ventre, pinnis & caudâ magis rubet, feminae candicant: eadem capite superius & dorso magis virent. Non tantum in Lemani lacu, sed & in aliis capitur. *Vescitur* pisciculis, quisquiliis & aliis. Si vel parum *sancietur*, velut moribunda supernatat. Capta quâ primum aquas reliquerit, exspirare traditur. *Carne* est suavi, sicca, & cum senuerit dura, & quæ multorum iudicio Asellis, imo saxatilibus succedere queat. Pinguis potissimum apud Allobroges capitur tantique fit, (inquit Bellonius,) quantidiorum bursa æstimare potest. Commendatur ab Helvetiis Novembri

menſe, & aliàs circa initium Decēbris: quo tēpore Geſnerus *ova* habere ait bona & ſolida, tardius vero caro eius inſulſa, pinguiſcula & flaccida apparet, & ova dilutiora ſunt. Tēpore partus menſis inepta eſt. Cū elixatur, vinoprius fervido injicitur, ne nimis mollis reddatur. Apud Allobroges paſtitius includi Bellonius refert.

Facit Rondeletius alterius mentionē, quā Lemani lacus accolæ *Umblechevaliere* forte ob magnitudinem, præſtantiā & robur nominant. Neq; verò à ſuperiore ſolū differt, vel ſexu, vel ætate, ut ex ſequenti deſcriptione perſpicuum fiet. Eſt igitur hic piſcis Salmonibus & Truttis, q̄ vulgò Salmonatē dicuntur, ſimilis, *roſtro* recurvo, quò à ſuperiore differt, id n. longius habet & acutius. Maxillæ inferioris extremum incurvum in maxillā ſuperiorē, eius rei gratia excavatum recipitur ut in Salmonibus videre eſt. Maxillæ lineis multis diſtinctæ ſunt. *Dorsū* ex cæruleo nigricat. *Venter* aureo colore eſt. *Hepar* flavescit, in eo *ſplen* nigricat. *Ventriculus* gulæ ſubjectus eſt, longus, ſpiſſus, cuius innumera- biles ſunt appendices, quemadmodum in ſuperiore. In inſignē magnitudinē excreſcit. Carne eſt ſicca & dura: in aſſulas dividitur, q̄ Caryophyllis confixæ in craticula aſſantur, & oleo ſive butyro irrigantur Paratur etiam hic piſcis Truttæ modo. Caput maxime commendatur, ut Salmonis.

CAPUT. II.

De Trutta Lacuſtri.

TAB.
XXX.
3.
Aldrov. de
Piſcib. l. 5.
c. 59

Quam nos Truttā Lacuſtrem vocamus, eā Galli *Truttā Salmonatā*, Rondeletius *Salmonē lacuſtrem* vocat, cumq; Truttis vulgarib. grandior ſit, Salmonem minor, *Sarionem* ab Auſonio dici Bellonius & Rondeletius opinantur. An ſit *Anchorago* Caſſiodori, quod Geſnerus opinari videtur, ſuperius diximus. Ex Truttarum genere eſſe. Salmoniq; ſimilē cū ex corporis forma, partiumq; externarum & internarum ſimilitudine, tum ex nomenclatura Gallica notū eſt. *Differt à Salmonem* magnitudine & maculis. Minor n. & maculas in lateribus purpureas,

multo quā Salmon copioſiores habet Trutte, itē q̄ in fluviis rapidis & limpidis inveniuntur, nō ſunt adeo maculoſæ, magnitudineaq; ſucco, carnis colore & ſubſtantia multo inferiores. Umbra vero nullis ut dictū eſt litturis ſuggillatur. *Geſnerus hunc piſcē diligenter intuitus, his verbis deſcribebat: Squamulis* tegitur minimis, bene dentatus eſt, & *lingua* ē utrimq; dentibus munitur. Caput colore nigro, cæruleoq; mixto, dorſum partim glauco, partim ſubnigro, partim cæruleo, partim ſubviridi. In lateribus puncta nigra. Pinnæ in medio dorſo multis nigris maculis variatur, reliquæ alben. Habet & ultimā illā dorſi mollē *pinnulam*, ut reliquæ Truttæ: Brachias quaternas. *Appendices* nō toto circuitu inteſtini, ſed ab una tantū parte magnas, oblongas, bipartitas, utrimq; circiter 18. habet, & alias ſex ſeparatim ex oppoſito, ventriculū ſeu majus inteſtinum verſus. Hæc ille. Ad duum triumve cubitorum *magnitudinē* accreſcit, in Lario lacu ad 50. quinimo, Jovio authore, ad 100. etiam libras. Initio æſtatis *caro* eius rubere incipit, duratq; is color uſq; ad Auguſtum, vel ſaltem ad Divi Jacobi diē, quo tēpore partu jam abſoluto, colore rubicundum amittit. Geſnerus loco diſferre invicē iſtiusmodi lacuſtres teſtatur, alias n. in vado ipſius aquæ degere, præſertim argilloſo, hæſq; magis pingueſcere, & palato ſapidiores eſſe, alias circa ſummas aquas, ubi muſcas appetunt, minus pingues & vilioris pretii: illas apud ſuos *Grundforinē* has *Schwabforinē* appellari. Duo itē genera capi in montanis lacubus quos Atheſis facit, quorum unum ab aureo colore *Goldforinē* alterum à nigredine *Schwabforinē* appelletur.

De loco & natura huius piſcis ita Aldrovandus. Lacuſtris piſcis eſt, ſed qui ex lacubus fluviis quandoq; ſubit certo tēpore, inſtante nempe partu. E Lemano in Rhodanum *aſcendere* ajunt vere, inquit Geſnerus, ut & circa Sedunum capi: at in Tigurino & Acronio lacubus neq; eodem tēpore migrare putat. Acronii lacus incolæ *paritura* ad Rheni influentis oſtiū aſcendit, ubi cum pepererit, rursus deſcendit.

dit. Conferri ajunt hunc piscem junipero, nam sicut hæc tertio demum anno fructum perficit, ita etiam eius foetus ad tertium usq; annum crescens, perficitur: *parere* plerumq; Julio & Augusto, alias citius tardiusve, prout cœlum magis minusve calidum fuerit. Jam vero magno licet sit corpore, suâ tamen naturâ agilis quoque est; aliarum Truttarum more. Tradit Jovius sese audivisse majores istas Truttas lacus ripis lascivo excursu extremos arenæ margines aliquâdo justi passus longitudinē p̄fulcasse. Laudantur vehementer *in cibis*, *Carnē* habet solidâ, rubicundam, & saporis optimi: aliquando tamen præ nimia pinguedine nausæa movent, & mortuæ paucissimis horis, q̄ pinguis illa teneritudo quam sæpissimè cōputrescant, gratiâ saporis amittunt. Lariarum multo succo corpora replent, & genitalē humorē copiosè suggerunt. Præferuntur, si Jovio credimus, Soranæ aliis, in Acronii lacus parte inferiorē captæ, illis quæ in superiore parte capiuntur: item quæ circa fundum pascantur, iis quæ circa summam aquam. Ab Helvetiis Februario commendantur, ab aliis simpliciter æstate, dum pulpæ earum rubent. Spinæ dorfi & Caudæ assæ, vel principum mensis inferuntur.

CAPUT III.

De Carpione.

TAB. XXIX. **Q**ui sit apud Veteres Carpio, ignoratur, Moderni quidam in solo Benacolo lacu reperiri, & à carpando auro dici ajunt. Alij ablatâ priori syllabâ, *Pione* vocatum fuisse, ac tandem *Carpione* q̄ cum quidam piscem edisset, careq; supputanti solvisset, carē se *Pione* edissere diceret, perhibent Fracastorius à carpo nauta, à Saturo Benacum trajecturo, q̄ aurum ipsi extorqui vellet, in carpionem mutato derivat. Lacustri potissimum Truttæ cōgener statui potest. Nam & corporis figurâ, partium numero & carnis substantiâ ei similis est: punctis que similiter nigris notatur, ac denique pinnulam dorfi posteriorem mollem, ut illa habet. Evidentibus tamē ab eâ

interstinguitur notis. Prominentiori enim rostro, majoribus oculis, candidiore & turgidiorē ventre, ac nigricantiore dorso est: *magnitudo* Truttæ lacustri duorum triumve plerumque cubitorum, cum Carpio pedem excedere nunquam visus sit. *Dentes* habet non in maxillis solum, sed etiam in palato & lingua, *squamis* tegitur tenuibus. Ventrem habet candidum atq; argenteum, dorsum subnigrum. Qui ab Aldrovando exprimitur, lateribus est ferè rubicundis, intensius verò rubet lineâ corpus dividens. Ventre pinnisque candicat, *Tergus* ad cæruleum inclinat. Solius Benati lacus alumnus esse omnes ajunt: negatque Petrus Bembus alibi capi, huncque piscem capere atque cognoscere Friderico Imperatori voluptati fuisse. Atqui Salvianus revera reperiri nascique asserit in parvo & limpidolo lacu, haud procul ab Alvito Campaniæ oppido ex-oriente, (vulgo illago della posta appellato) ex quo Fibrenus fluvius exoritur: esse tamen Benacinis minores, & vix libram unam implere. Profundiora aquæ loca amat. Pisciculis *vescitur* & quibusdam lacus recrementis. Bellonius Phrygani edacem esse tradit. Auro *vesci* paulo ante negavimus. Carne est duriuscula, siccaq; minime glutinosa, rubescente, Truttis & Salmonibus simili. Plus æquo servatos contabescunt & deteriores fieri ajunt, id q̄ & multis aliis piscibus accidit, maxime iis qui delicatiorē & friabili sunt carne: quamobrem Benaci accolæ, in sartagine frixum, foliis involutum, acetō in quo aromata pri⁹ ebullierint, irrigatum, per p̄ximas urbes circumferre, quem condiendi modum vulgus ab hoc pisce acarpionare, alii amarinare nuncupant. Platina spinam in capite gerere scribit perniciosam, eamq; inter edendum cavendâ: cuius tamē apud alios nulla mentio est.

CAPUT IV.

De Lavareto Allobrogum,

& Beſſola.

LAvaretus à munditiæ & candore, quod nunquam sordidus sit, no-

men fortitus est. Bellonius ex Truttarum genere esse ait, at Rondeletius, Salmonum, Truttarumque generi adjungendum suaderet, inquit, pinnula illa dorsi posterior adiposa Salmonum & Truttarum generi propria nisi multa alia reclamarent, ut oris constitutio Thrissis quam Salmonibus similior. Os sine dentibus, caput compressum, corpus *maculis* carens, caro mollis & cādida. Quamobrem Lavaretum inter Salmones (Truttasque) & Alofas, ambigere iudicat. Bellonius exactissimè delineavit his verbis: Piscis Lugduni satis cognitus, Umbrę similim⁹, nisi *simus* esset, *dentibusque* omnino careret: *Bisulam* (Bezolam) tamen vulgarem magis refert: sed Lavaretus nunquam pedem excedit, neque crassior est eo quod pollex & index capere possunt. Capite est oblongo, *squamis* tenuibus, albis, atque ut in Trutta parvis exiguum in tergore gerit pinnam, duas ad ventris latera utrimq; circa branchias, ac totidē sub vētre ei oppositas, quę tergoris fastigium occupat: aliā quoq; parvam in eo interstitio, quod est inter caudam & anum, quę omnes nigricantes apparent. *Linea* à supercilio subrubra per latera ad caudam protensa insignis est: *cauda* bifurca, pinnisq; ad extrema nigris, fimbriatis ac laciniatis. Ventre laxo & prægrandi, ut in Trutta. Hoc item à Cæteris piscibus differt, quod *nare* est recurta, atque (ut in Harengiis ac Logiis) officulis quibusdam prominentibus insigni, labiis nullum *dentium* rudimentum ostendentibus, appendice glabra ac carnosa *cauda* infidenti, in Umbrę modum. Neq; tamē *dentibus* caret: officula n. ad eius fauces atque œsophagi ingressum utrimque conspiciuntur, senis hinc inde denticulis, ut in Themolo, cōminuta. *Branchiæ* illi sunt utrinque quaternæ ac simplicissimæ, quarum extrema, quę capiti inhæret, reliquis sane minor est, nullis lateribus maculis est insignitus, totumq; huius piscis corpus, dempto tergore argentum est. Verū tamen si ad eius internas partes advertas, *costas* quinque & triginta u-

trinque connumerabis, cernesque cor illi esse pallidum ac trigonum, pericardio inclusum: *hepar* album, unius tantum lobi, ut in Exocæto & Delphino, in cuius latere dextro fellis vëscicula adfuta est. *Lien* à sinistris apophysis & stomacho incumbit. *Intestina* nullas habent revolutiones. Nā gula usque ad ventriculi fundum deducitur, qui per piscis longitudinem delatus, ac sursum quidem reflexus, duodenum parit à dentibus suffultū, in cuius gibbo innumeræ apophyses spectantur: ex quibus vena oritur, per quam sanguis defertur ad hepar. Apyloro sequitur aliud intestinum, quod nullis anfractibus circumductum, rectā ad anum tendit. *Vulvam* utrimque bicornem habet, tenuibus *ovis* conspicuam. Cætera in congenere piscibus describentur. Lacum Allobrogum, ut Burgetii & Equibetii proprium Rondeleti⁹ facit. Bellonius ex Lemano quoq; adferri scribit. Caro ei candida, mollis, suavis, minimè glutinosa, boni succi, mediocriter nutriens. Bellonius in tantis in Gallia delitiis haberi scribit, ut regionum œconomorum chartæ frequenter inscriptum habent.


BEZOLÆ nomen huic pisci lacus Lemani accolæ dedere, Bisulam Bellonius dixit. Latine *Cephalum* vel *Mugilem Lacustrem*, vel potius *Leuciscum* *Albulamve* lacustrem appellare licebit. Bellonius semel tantum huius piscis meminit, Lavaretum Bisulam magis quam Umbram referre inquit. Sed Rondeletius exactius, ut Lavaretum, inquit, Lacus Burgetius, & Equibetius ferunt, ita Lemanus Bezolam vulgo dictam, non admodum dissimilem, nisi quod colore minus est candido ad cæruleum inclinante: rostro acutiore, capite minore, ventre latiore & prominentiore. Nullum piscem reperias, cum quo melius comparari possit, q̃ cum Harengo, quam in marinis depinximus. Carne est molliore quam Lavaretus, & ab eo saporis suavitate & succi bonitate multum separatur, nec in pretio habetur. Proprius est Lemani lacus.

TAB.
XXV.

5.
Aldrov. de
Piscib. l. 3.
c. 52.

1 Umbla maior.


Große Röteln.



Trutta Lacustris, Trutta Salmonata.


2 Umbla min.

Röteln pizlung.




Grund föhrin See föhrin.

3




6 Albula Lacustris.

Gang fisch.



Lauarectus Albula

Adel. fisch.



4


Alb. minima.

hegling.



Albula Lacustris


Lacustris Betula. Blauwling. Brätfisch.



5

Albula Parua.


Albelen wäsgangfisch.



8

Carpio Benaci.

See föhrin.




13

Schillus


Schill. Nagmul.

15



Alburnus Albus Salicari


Weis. fisch.



9

Squalus.


Ein Art hering.



10

Clavatus cyprinus.


Piga. Demdräufsmen.



14

Farra albula lacustris specios.


Farra. Alius. generis.



12

Agonus.

Wälsche Agonus.



Chalcis altera Rondeletij.

Ein Heringart. in Süßem Meer.



15

17

CAPUT V.

De Albulâ parua, & minima Gesneri.

TAB.
XXX.
7.8.
Aldrov.
de Piscib.
l.5.c.53.

Albulam parvam non sui generis piscem esse, sed Albulam sive Bezolam cæruleam secundo tertiove suæ ætatis anno ita vocari, quidam opinantur, quibus piscatores nostri, inquit Gesnerus, contradicunt quod cæruleos observarint secundo etiam ac tertio anno forma coloreque à genere Albularum (de quibus hic loquimur) differre. Cognatus est hic piscis cæteris lacustribus albis. Nam & species & sapor fere omnium non dissimilis est. Albulam magis quam Bezola albicat: cauda tamen & reliquæ pinnæ, præter eas quæ juxta branchias sunt, nigricant in extremitatibus. *Dorso* color glaucus: alicubi tamen purpurei quiddam & cærulei mixtum videtur. Caput ex glauco cæruleum. Inter caput & dorsum color viridis, ceu gemma relucet. Branchiæ ei quaternæ. Hyemè aliquando memini me videre hunc piscem *squamis* per latera exasperatum, eminentibus per singulas squamas veluti tuberculis. Aiebant hoc indicium esse recentium & vivarum. *Capiuntur* Albulæ in summa parte Tigurini lacus, juxta locum quem *Buchberg* vocant, diebus ferè quatuordecim post diem divi Martini, & ad oppidum Rapperswillam circa ipsum divi Martini diem. A *partu* in lacum nostrum descendunt (sed non tam procul ut cæteræ Albulæ) usque ad Ver: deinde rursus ascendunt tota æstate, usque ad divi Martini diem. Capiuntur etiam in Gryphio agri Tigurini, multo majores quàm in nostro, & in Hallvillensi Bernensis agri. Augusti & Septembri mensibus præcipue laudantur, quod suaviores eo tempore solidioresque sint. Postea enim pariunt, & mollior earum caro fit, & succus in foeturam consumitur.

De ALBULA MINIMA sic Gesnerus: Albulam minimam hunc piscem ^{Aldrov. de Piscib. l.5. c.54.} voco, inquit idè Gesnerus, què nostri Hagele vel Haling, quasi Halæculam appellant. Friburgi Helvetiorum (ut audio) *Wfarren*/ Lucrenæ *Nachtisch*/ quod noctu fere irretiatur ut quidam putant. Sed mihi piscator Lucernensis affirmavit, *Nachtisch* vocari Albulam cæruleam anno primo, cum circa diem divi Johannis æstate jam ad digitum longitudinem excrevit. Tota specie accedit ad illam quam proxime albulam parvam nominavi, sed plerumque minor est, & in capite minus viridis. Si piscem erectum inspicias per dorsum aliquid coloris purpurei in lateribus apparebit. Branchiæ ei quaternæ sunt, pinnulæ albe. Ore aperto superioris mandibulæ extremitas deorsum tendit. Os habet longiusculum, *dentes* nullos. *Julio coeunt*. Nocturnum capiuntur retibus ad passus quadraginta aut quinquaginta demissis. Cum cælum serenum est, altius descendunt cum nubilum, ascendunt. Densissimis gregibus præ cæteris Albulis capiuntur, non passim in lacu nostro, sed maxime à pago Vædesuilla, usque ad Insulam & versus alteram ripam à loco Surenbach usque ad arborem longam. Diebus quatuordecim fere à natali Domini capi incipiunt & immixtæ eis Albulæ cæruleæ aliquot, & mox expirant. Cum captæ mox expirent, ut recentes habeantur matutino tempore potius ad prandium coeuntur, & assi in craticula quam calidissimi à gulonibus devorantur, quicam ob causam non universos, sed paulatim alios assari jubent, ut statim assumtis prioribus, fervidi posteriores mensis afferantur. Embamma additur ex aceto, sapa, pipere, sale & potri aut cepæ foliis concisis. Placet item recens in jure albo frigido, apio copiose insperso, maxime per mensem Decembrem. Sale idem conditus infumatus, que comedatur.

CAPUT VI.

De Albo Salviani &
Farra.

TAB.
XXX.
9. 10.
Aldrov.
de Piscib.
l. 5. c. 55.

Albus Salviani, *Capto lacustris* Gessneri est. Quamvis Squalo Alburno nove appellato pisci persimilis sit, ab eo tamen evidentibus quibusdam notis facile internosci potest. Primum enim etsi uterque latitudinis ratione oblongus appareat, eadem nihilominus utriusque existente latitudie, Albus paulo longior Alburno conspicitur. Deinde rostro acutius, oculis majoribus ac dorso magis repando Albus est. Nam cum Alburnus sensim atque modice, Albi repente ac plurimum à capite extuberat *dorsum*. Pinnarum autem tum in lateribus, tum in dorso ac in imo ventre existentium, situ ac numero eicum Alburno conveniente, earundem colore ab invicem discrepant: subnigras enim Albus: subrufas vero Alburnus eas habet. Postremo amplioribus *squamis* albus tegitur. Ventreque atque lateribus, æquè atque Alburnus candidus atque argenteus est: capite vero ac dorso magis quam ille subviridis. Magnitudine non differunt. Uti enim Alburnus, sic & Albus pedalis, frequens: bipedalis vero aliquando tantum reperitur. Lacustris piscis est, non tamen in lacubus omnibus aut eorū quam plurimis, ut Tinca, Lucius, Squalus ac Barbus, sed eorum nonnullis solum reperitur. In Trasymeno enim lacu, ubi etiam Albo vulgo vocato, frequens satis in fine veris *capitur*. In fluminibus eum reperiri huc usque non observavimus: estque advertendum, ne quispiam eum in fluminibus etiam reperiri contendens, Squalum pro Albo nobis ostendat, in mari nec nascitur, neque ex lacubus fluminibusve ad id descendit. Duram *carnem* habet Albus, & propterea ægre coquitur. Inspidus adeo est, ut piscium omnium jure vilissimus censeatur.

Nec enim ulla condiendi ratione sapidus effici potest. Torrefactus tamen paulò minus ingratus est palato, solumque in aliorum piscium penuria eo vesci solemus.

FARRA, Fora & Pala quoque dicitur. Lavaretos vel Thrissas refert, ut scribit Rondeletius, magnitudine cubitali, ore parvo, sine dentibus ut in Thrissis, colore cinereo, corpore depresso & lato, *squamis*, pinnarum situ & numero Lavaretis similis, linea à branchiis ad caudam recta & candida ducta est. Pinnulam dorsi mollem pinguemque habet, caudam latissimam. *Carnes* est candida & suavi, quæ Lavaretorum Truttarumque carni non cedit.

Æstate & autumno *capitur*; hyeme in altis gurgitibus latet. Sale conditur & servatur in hyemem. Sic ille. Cæterum monendus est Lector in Rondeletii codicibus diversum piscem, quem in Lemano Vangeronem vocant, huic capti haud recte per librarium incuriam præfigi.

CAPUT VII.

De Pigo, & Schilo.

Pisci, quem descripturi sumus, Verbanus Larique lacus accolæ *Pici*, *Pigi* & *Picui*, quod clavis suis seu aculeis pungat, nomen imposuere. Rondeletius *Cyprianum clavatum*, Albertus *Vergiliadem*, quod Vergiliarum ortu apparent, dixit. Cypriano, describente Rondeletio ita est, similis, ut demptis aculeis Cyprianum esse affirmes. Est enim eodem corporis habitu, pinnae totidem eodem in loco sitas, os, oculos, eodem modo carnosum, interna omnia similia habet. Vita item, moribus, sapore, succo Cypriano similis, nisi quod paulo melior est. *Salvianus diligenter sic descripsit*. Pigus piscis est capite rotundo: rostro obtuso, nec admodum extento, ore mediocri & edentulo.

Bran-

Branchias habet utrinque; quaternas, & juxta eas, pinnas binas, utrinque; vnâ: aliasque in imo ventre, caudæ magis quàm capiti vicinas. In dorso ferè medio una haud magna, nullis aculeis armata reperitur. Imo vètri ppè caudâ alia una etiâ minor hæret. *Cauda* ipsa in falcatam pinnâ definit. Totius *figura* ni paulo lógior efflet, ovata censcri posset. *Squamis* magnis regitur, ex quarum medio albi & pyramidati *aculei*, in fine veris & ineunte ætate, enascuntur. Quibus cum primis 40. æstivis diebus horreat, ætate procedente imminuuntur primû, demûq; prorsus delitefcunt. Quapropter primis illis æstivis diebus demptis; reliquo anni tempore prædictis pyramidatis aculeis omninò caret: unde cû Plinius scribat: Duo lacus Italię in radicibus Alpium Larius & Verbanus appellâtur, in quibus pisces omnibus annis vergiliarum ortu existunt squamis conspicui crebris atq; præacutis clavorum caligarium effigie, nec amplius quàm circa eum mensem visuntur. Dubio pcul Pigum piscem, etsi innotinatum eum relinquat, describit, cû is (ut infra monstrabimus) Larii & Verbani lacus alumnus sit, & (uti diximus) in prima ætate (quo quidem tempore vergiliæ exoriuntur) eius squamæ parte media, clavorum caligariû instar, præacutæ fiant. Habent enim caligares clavi, qui à caligis militaribus, quibus suffigebantur, dicti sunt, pyramidata capita. Eiusmodi aculeos, sicuti Majo & Junio tantum mensibus, in dorsoq; solum & lateribus; & nò in vètre, Pigo enasci asseverant omnes, sic nò fœminas, sed mares tantum in horrescere, testantur nonnulli: Venter ex albo languide rubet: tergus ex cæruleo, nil habet præ cæteris piscibus peculiare atq; animadversione digum. Cum maximè excreverit, quinas aut senas libras nò excedit. Solius Larii atq; Verbani lacus accola est. Nemo enim in alio lacu fluminive eum reperiri hucusq; (qd sciam) animadvertit. Et licet frequentiores in prima ætate, cum clavis illis caligaribus insigniti appa-

rent, in iis lacubus capi soleant, reliquis etiam omnibus ferè anni temporibus, in eisdem; etsi non æque crebro, capiuntur. Majo Mense circa lacus littora *parit*. Sapòre & succo Cypriano est similis, paulo tamen melior. Salvianus ei carnem tribuit teneram atque sapidissimam, ideoque cum optimis quibuscunque dulcisaquæ piscibus conferri posse & maxime in æstatis principio captum: hoc enim tempore nulli piscium esse secundum, & quovis denique modo conditum, probe semper sapere.

SCHILUM, qui & *Nagemulus*, ita describit Gasserus. *Nagmaul* piscis est in Ambronis lacu Bavarix; qui raro capitur, quoniam raro altius natando evahitur. Longissimus ulnam æquat. Formâ non dissimilis est Lucio, nisi quod in aqua subviridis, extra aquam verò diluvior apparet: oculis albicantibus, ore retro juxta maxillas minus lato. Squamarum magnitudine, ordine & asperitate Percam refert. Pinnæ dorsi erectæ, *aculeis* tres fere digitis rigent. Præter dorsi spinam paucas alias & parvas habet. Parit Martio. In cibo quidem optimus est Majo & Junio. Elixatus, assatus & frustratim concisus etiam frigi solet. Pinguis est admodum, & carnem etiam coctus albitissimam servat.

Aldrov. l. c. cap. 59.

CAPUT VIII.


De Saracho.

Piscem quem Albanenses *Sarachû*, TAB. Ichthyopolæ *Sarachinû* vocant. Bel-XXX. lonius *Agonum*, Jovius & Salvianus *Aldrov. de Aconem*, Fracastorius & Jovius *Aquo-Piscib. l. 5. nem* vocant, ab officulis sine dubio il- c. 58. lis acutis, quæ asperam spinosamque in eius ventre lineam constituunt, & veluti acus quidâ sunt. Rondeletius *Chalcidem*, quem Gaza *Aericam* vocat, dici opinatur, alicubi fortè *Sardannella* dicitur. De ipsorum Generibus ita Bellonius. Tres sunt apud Insu-^{Bellon. de} bres *Aquatilib. l. 2.* lacus in quibus piscem vulgari Mediolanensium idiomate, *Agonum* nominatum capiunt, varium quidem eum.


Larius

Larius enim lacus, qui hodie Comensis cognominatur, Agonos educat exiguos ac magis populares, Sardis similes, dempto quod ventre sunt latiore: neque alio quam Mediolanum transferuntur, aut saltem raro Mantuam prætergrediuntur. Eos dolii muriâ conditos adservant, quam etiam mediocriter sicci sine muriâ coperiantur. Verbanus lacus, quæ lacum majorē cognominant, multo majores Agonos quā Larius educat. Indigenæ urbiū, quæ ad eius litus sitæ sunt, Aronan, Palencza, Cornobio, Locaria & Eugudræ vocatos pisciculos magno proventu capiunt, mediâ magnitudine inter Larios & eos ex lacu Lugaræ, quos Indigenæ urbium nominant *Campignon* & *Buiffon*. Benacus autē Lacus magnitudine insignes Agonos profert. Sed nec Urbani aut Benaci Agoni muriâ condiri solent, ut minores. Hæcille; & mox rursus de Saracho. Duo, inquit, tresve lacus sunt in Epiro, in quib. Sarachi capiuntur, quos ubi sale condierint, exicaverint, & fumo infecerint, Venetias, Anconā & aliò navigiis transvehunt. Quorum eos maximè in pretio habere solent, quos de la Boiane huius nominis flumine ac lacu cognominant. Horum verò duo comperiuntur *genera*, alterum minus, alterum autē Clupeæ ferè magnitudinis. Minores Sarachi quadrante longiores non sunt, maiores pedalem implent longitudinem. Ambo eadem linea sub ventre præditi sunt, quā Clupea insignita est. Cæterum Agoni omnes (inquit idē Bellonius) *squamas* habent levi contactu decedentes, tenues, latas & transparentes: corpora argenteo coloro nitentia, sed parum nigricant in tergo. *Desquamati* super argentum terfissimum refulgent. Oris rictum habent grandiusculū sine *dentibus*: pinna in tergo simplicem, parvam, duas in lateribus sub branchiis, quarum omnium exterius tegumentum spinneum in medio crenatum est. Oculos valde grandes proferunt, caudam in penicilli modum discissam. Utrique nonnunquam lituris duabus, rotundis, ac nigris, interdum pluribus sigillatur in tergo. *Lineam* sub ventre


habent ferratam, ad anū desinentē, quam si digito in adversum cōfrices, cultri modo acutam percipias. *Branchias* habent utrinque quatuor, internâ parte veluti fimbriatas, quod etiam Harengis, Celerinis & id genus piscibus accidit. *Cor* ut semen Cicerculæ trigonum inter anteriores pinnas sub branchiis occultatum. *Hepar* subbrum sinistro stomachi lateri & œsophago incubans, ipsumque pylorum amplectens, *Stomachi* figura in conum turbinatur, à cuius superiore parte pylorus exit, multis apophysis cæcis ac circumdatur. *Lien* dextræ Stomachi parti, inhæret ruber, à pyloro intestinū non reflectitur, sed recta ad anum tendit. Triginta sub ventre *ossicula* acuta, asperâ in hoc pisce lineam constituentia, connumerare potes. Hæc omnia itaque Bellonius, quibus addi potest, Holce pisces ita pinguescere referente Rondeletio, ut cum incratricula affantur, pinguitudo veluti oleū distillet, adeo ut ab hac pinguedine, sint qui *Liparim* appellent. *Carnivori* sunt, & pulices aquaticos venantur. De *generatione* prodit Salvianus, Acones fœminas ovis gravidas, maribus femine refertis consequentibus, ad saxosa litora Majo mense adnatare, ibique illas parere sua ova, hos suo femine fœcundare, moxque pusillos inde pcreari pisciculos, qui intra paucos dies ad digiti augeantur magitudinē, tuncque vulgo *Antesitos* vocari. Aqua exempti mox *emoriuntur*. Gregatim *vivunt*, & temerè in retia incidunt. Adeo sunt *timidi*, ut vel à tremula umbra terreantur. A Luciis, Cyprinis & Truttis adeo sibi metuunt, ut aliquot aliquando millia, insequentem inimicum longo per lacū tractu pavidi fugiant, jucundo intuentibus spectaculo. Alosis sapore perfimiles, vere graciles, autumnō optimos Jovifacit. Salviano Julio, Augusto, Septembri & Octobri mensibus probantur. Crassiusculū tamē succū gignunt, difficulter concoquuntur, & mediocriter nutriunt. Cum saliendi causa enterantur, *oleum* ex interaneis ad lucernarum usum colligitur.




Gobius Bottatrica Salu.




Alburnus Salu.




Meforo uel Blennus Salu.




Thijmus Salu.




Cyprinus Salu.




Salar et Varius.




Obris.




Rubellus Salu.



Barbus Salu.



Salmo Salu.





HISTORIÆ NATVRALIS

De Piscibus

LIBER IV.

De Piscibus Exoticis.

TITULUS I

De Piscibus squamosis.

CAPUT I.

De Tajasica, Paru, Pira-Acangata, & Acarauna.



Oterant quidem & isti, quos hoc libro trademus pisces, ad sua genera in præteritis referri: verum cum tardè nimis ipsorum descriptiones & icones in manus nostras pervenerint, coacti sumus eos peculiari libello includere.

TAB. *Tajasica* itaque prout Brasiliensis
XXXII. bus vocatur: piscis est octo aut novem
I. 2. digitos longus, corpore obterere &
Marigrav. pyramidalis, extenuatur enim versus
Hist. Brasil. caudam. *Caput* est illi grossiusculum
lib. 4. c. 2. & compressum: *Oculi* eminentes & nigri, circello aureo: os edentulum. Sex habent pinna; nimirum sub qualibet branchia unam oblongam, sub his in medio inferiori unam breviorē: unam in medio dorso, aliam longiorem versus postremam dorsi partē, & è regione huius unam in infimo corpore: septima est cauda, oblonga & in exitu rotundata. Tegitur squamulis parvis, coloris hyalini pallidi, maculis variis fuscis vermiculatis variegatus per totum, exceptis pinnis postbranchialibus & infimo ventre, quæ ex pallido subflavescent.

Cauda est undata fusco. Latet in arena absconditus; ideoque capitur pedibus, eos ponendo super arenam ubi latet.

Coctus atque assatus bene sapit & convenit cum Hollandorum *Post* est enim carne albissima & friabili.

PARU, Piscis est latus & subrotundus, verum haud crassus, novem aut decem digitos longus ab ore ad pinnam caudæ quæ duos & semis digitos longa & totidem lata: latitudo piscis septem digitorum. *Pinnas* obtinet sex: duas magnas ac latas duos circiter digitos; unam in dorso, alteram in ventre, quæ utrobique ad caudam extenduntur; habetque quævis pinna in fine prominentiam instar funiculi, ea videlicet, quæ in dorso quinque digitos, quæ in ventre tres digitos longam. Post branchias in quolibet latere etiam pinna est duos digitos longa, unum lata; & duas in inferiori ventre sub his, duos digitos longas, angustissimas. *Capite* est parvo, ore elato, angusto, minutissimis dentibus albi coloris; oculis conspicuis, flavo circello circumdati. Totum corpus vestitur squamis mediocribus, quarum dimidius numerus niger est, dimidius autem flavescit, ita ut lunulas flavas in nigricante corpore gestare videtur. Circa branchias flavedo est, & in initio pinnarum, post aures macula flava in qualibet.

Piscis est edulis.

PIRA ACANGATA, id est, piscis duro capite: *Percæ* mediæ magnitudine, septem aut octo pedes longus, ore haud amplo, oculis nigris, circello nigricante aureo & ruffo colore mixto. *Pinnas* habet sex & septimam pro cauda: duas postbranchiales, duas in infimo ventre junctas, unam versus posteriora in ventre, & unam per totius dorsi longitudinem usque ad caudam extensam & erectam, firmis spinis suffultam quam in vaginam recondere potest. Pinna caudæ furcata. Tegitur squamulis argenteis, aureo & igneo colore transplendente, præsertim in dorso: in ventre in argenteo thalassinus color translucet.

Z

Pinna

Pinna dorsi argentea transplendens & maculis fuscis insignita. Pinnae laterales albæ, quæ in ventre cærulefcentes. Caudæ quoque pinna in extremitate cærulefcit. Est edulis.

ACARAVNA, Piscis magnitudine exæquat Paru, sed non est ita latus, & squamulas habet nigricantis coloris. Cauda est bifida, pinna tres digitos longa, duos lata. Pene utramq; branchiam etiam pinnam habet, inferius in antica parte duas angustas. Per totum dorsum & per ventrem etiam pennam utrobique extensam, acutam, continuam, in postica parte corporis circiter unum digitum latam. Os parvum, angustum, denticulis minutissimis. Oculi haud magni. In utroque latere prope caudam acutissimum habet aculeum; quos in latera potest recondere & evaginare & alios pisces lædere: quilibet aculeus ferè digitum longus osse piscino confans.

Piscis est edulis.

CAPUT II.

De Guaperua, Piranema, & Acarapucu.

TAB.
XXXII.

3.

Marcgrav.
Hist. Brasl.
lib. 4. c. 2.

GVAPERVA Brasiliensibus. Piscis est corpore lato & compresso, quatuor digitos longo, tres lato, ubi latissimus. Ore parvulo, denticulis minimis. Pinnae habet sex: post quamlibet branchiam unam, parallelogrammi figura: in infimo ventre duas oblongas: in dorso & inferiore ventre extremo longam ac latam, quæ in acumen desinunt, subulæ figura. Cauda quadrata seu potius parallelogramma, unum digitum longa, duas tertias digiti lata. Tegitur squamulis coloris nigri, splendentis instar bombycini, quarum oræ (non omnium sed quarundam) fimbrias flavas habent instar femilunularum. Pinnae sunt nigræ, Circa os linea crassa purpurei est coloris, & illi perpendiculariter altera

supposita Corpus tres lineæ latæ ambiunt, quarum duæ per latus & posticas pinnas extenduntur. Caudam etiam talis secat linea & ejusdè coloris; una pro fimbria ipsi est oculorum pupillâ nigra, circulo aureo.

PRANEMA, Piscis mediocris Capionis seu Percæ magnitudine; novem, decem aut undecim digitos longus; latus, ubi maxime, tres digitos aut paulo amplius, Os habet amplum, subrotundum, edentulum quidem, sed acutissimis prominentiis asperum: oculos magnos instar solidi Hollandici, pupilla crystallina, circulo aureo splendente, qui superius ad dimidiam partem coloris est miniati. Branchias habet admodum amplas. Pone has in quolibet latere pinnae digitum quidem longæ sed haud latæ, & subter has in ventre duæ sibi propinquæ duos digitos longæ & sesquidigitum latæ, triangulares, spinis suffultæ. A ventris medietate ad caudæ exortum usque pinna protenditur tres & semis digitum longa, unum lata, itidem spinis intertexta, quam abscondere fere potest in rima ad hoc comparata: per universum dorsum ab occipitis fine ad exortum caudæ pinna extenditur quinque digitos longa, paulum plus digitum lata, tenui membrana constans, duabus & viginti spinis intertexta, quam erigere atque deprimere & fere abscondere potest in rima. Cauda quæ à corpore protenditur sesquidigitum est longa, unum lata, pinnam habet tres & semis digitos latam, & plusquā sesquidigitum longā. Calor totius piscis est argenteus laccatus laccæ florentina. Squamulas habet minutulas quasi triangulares: in ventre plus albicat, seu argenteo minus laccæ intermixtum cernitur.

Capitur in mari & boni est saporis, edulis.




ACARAPUCU, fluviatilis piscis, in sesquipedalem longitudinem excrefcit, ubi latissimus quatuor aut quinque digitorum, Os acuminatum circiter

Taiasica.

1

Paru.

2




Pudiano Vermelho.

4


Cenaperua.

3




Pudiano Verde.

5




Iaguaraca.

7



Carauna.

8




Guaticupa tuba.

9




Tamoata.

10




Pirapiscarga.

12



Acara Pinima.

11



citer duos digitos longum, haud amplum, labia abscondere & contrahere potest ut solum hiatus appareat, nullos habet dentes. *Oculi* magni, pupilla nigra splendente, circulo ex albo & fusco mixto. *Pinnas* habet septem: unam per dorſi longitudinem ad caudam fere extensam, non latam, quam erigere & spinis sustentare, atque recondere potest: postbranchiales duas, totidem in infimo ventre, unam post anum: Septimam pro cauda, furcatam quatuor aut quinque digitos longam. Totus splendet squamis argenteis minoribus: in dorſo tamen aliquid aurei admixtum: & in quolibet latere sex oblongæ maculæ cæruleæ rufescentes, non ita conspicuæ. Pinna dorſi & cauda dilute cinerei sunt coloris, ut & laterales: duæ in infimo ventre flavescunt paulû, ut & ea quæ prope anum. Edulis est.

CAPUT III.

De Pudio Vermelho, Pudio verde, & Iurucapêba.

TAB. XXXII. **P**UDIO Vermelho vulgo, sed rectius *Bodiano*: Brasiliensibus *Aipimixira*, & *Tetimixira*, Piscis mediocris Perce magnitudine. Latitudo corporis, ubi maxima, duorum digitorum prope caudam unius aut paulo plus. Corporis fere æqualis latitudo est. *Caput* parvum, *os* acutum, superius in anteriori parte tres denticuli acuti, minimi, inferius item, & versus interiora in utraque mandibula alii minimi denticuli. *Oculos* habet paululum eminentes, pupilla nigra, exteriori albo, hinc flavo circulo. *Pinnas* habet septem: nimirum duas plus digito longas, haud latas, post branchias in utroque latere unam: sub his duas junctas in ventre: aliam in ventre versus caudam duos digitos longam, secundum longitudinem adnatam: unam item talem in dorſo, tres

& semis digitos longam: & septimam pro cauda, quæ est quadrata, digitum longa & lata. Tegitur piscis squamis subtilibus, ita arctè cõplicitis, ut ad tactum glaber esse videatur. *Color* totius corporis flavus cum aureo mixtus. Summitas autem capitis & totum dorsum ad media utrimque latera, & fere usque ad finem dorſalis pinnæ purpurei est coloris egregii cum lacca mixti: extrema ora pinnæ majoris in ventre versus caudam etiam purpurascit ut & pinnæ illi junctæ totaliter: reliquæ pinnæ flavæ cum aureo colore mixtæ, ut & totum reliquum corpus. Pars ultima pinnæ majoris in dorſo etiam flavæ ut & cauda. Piscis est edulis.

Pudio Verde Lusitanis. Piscis oblongus, nimirum decem digitos ab oris extremo ad caudæ initium; corpus tres digitos latum, circa caudam autem sesqui. *Os* acuminatum, haud amplum, antè in superiori mandibula habens duos dentes acutos, longos; & seriem denticulorum minorum: inferius in anteriore parte quatuor, longos, acutos, & seriem minorum candidorum. *Oculos* habet parvos, pupilla nigricante, circulo primum aureo, dein exterius albescente. *Pinnas* obtinet septem, nimirum unam per dorſi longitudinem extensam, sex & semis digitos longam, dimidium latam, quam spinis erigere & sustinere potest: post utramque branchiarum unam, duos digitos longam, paulo plus uno latam: sub ventre duas parvas junctas: à medio autem ventre inferiori una tendit pene ad caudæ exortum, quatuor digitos longa, unum fere lata: Septima pinna est cauda, quæ est quadrata aut parallelogrammi figura, sesquidigitum longa, duos lata,

Totus piscis vestitur squamis latis quæ ita compositæ sunt, ut meri cubi sibi appositi videantur; lutei seu aurei coloris ac per totum ambitum linea seu fimbria elegantissima azuri seu cærulei coloris. *Caput* superius aureum est cum magna macula coloris ex viridi thalassini, circumdata azureo & azureis flavis subviridibus & albican-

tibus striis variegatum. *Pinna* duæ laterales seu postbranchiales & duæ in ventre albicant, in laterali ambitu cærulea lineola præditæ. *Pinna* dorsalis aurei est coloris & striis undulatis cæruleis secundum longitudinē notata, quæ in ventre major ex ruffo ad brunum vergit colorem, striis itidem cæruleis secundum longitudinem. *Cauda* rufescit striata thalassino ac cæruleo secundum longitudinem, in extremitate autem paululum virefcit.

Piscis insignis coloris & edulis. Capitur in mari.

Iuruucupeba, aut etiā *Itaiara*. Piscis longus septem aut octo digitos, duos aut tres latus, ubi latissimus: ore satis patulo, & ex triangulāri rotundo lingua angusta, brevi, denticulis minutissimis: oculis rotundis, pupilla crystallina & circulo rubro. Post branchias in utroque latere habet pinnam fessquidigitum longam, quadratam & exterius circinatam: subter has, duas in inferiori vente junctas; paulo post occipitium incipit pinna anteriori medietate spinis suffulta, posteriori mollis, quæ tendit secundum longitudinem dorsi ad caudam usque, & semper fit latior, prope caudam digitum lata. In inferiore corpore versus caudam etiā pinnam habet haud amplam. *Cauda* constat pinna fessquidigitum longa, plus uno lata & quadrata.

Squamatus piscis, sed squamis ita complicatis ut lævis esse videatur. Piscis universi color egregiè ruber, in ventre autem ex rubro & albo maculatus; in lateribus autem constanter maculas habet puniceas, nigras, varias, majores & minores. *Pinnae* omnes sunt rubræ & nigro maculatæ.

Pinguis est piscis & boni saporis, optimus tamen assatus. Capitur in mari inter scopulos. Parieti recens appensus noctu toto corpore clare lu-
cet.

CAPUT IV.

De Iaguaraca, Caranna, Cururuca, & Guatucupa Iuba.

IAGVARACA. Piscis est mediocris TAB: XXXII.
Percæ magnitudine, ore acuto, edentulus. Oculos habet magnos, pupilla crystallina nigra, magna & ampla, circulo coloris argentei, & superius maculam sanguineam habente. 7.8.9. Marcgrav. Hist. Brasil. lib. 4. c. 35.

Pinnae habet in lateribus & infimo ventre similes præcedenti pisci: per dorsum verò secundum longitudinem extenditur pinna digitum lata, usque ad unum digitum ab initio caudæ, constans tenui membranula undecim spinis acutissimis suffulta, quam potest elevare & substernere pro libitu: atque non solum componere, sed & abscondere in rima cui pinna insidet.

Hanc sequitur alia contigua unum digitum lata, pertingens ad caudæ exortum, duos digitos longa, triangularis & superius desinens in acumen. *Cauda* autē pars reliquo corpori subtenfa rotunda est, fessquidigitum longa, continens pinnam furcatam, cuius pars inferior duos digitos longa, superior paulo longior. Ad branchias in utroque latere, in quolibet duos habet aculeos, in quorum medio alii sunt minimi: his branchiis & aculeis ferit & vulnerat: ferit etiā cum spina dorsali & cum iis quæ sunt in infimo ventre, ad quarum singularum latus aculeus est satis longus, & quidem in pinna prope caudam in infimo ventre spina est unū digitū longa.

Totus piscis tectus est squamulis eleganter dispositis; & quælibet squamula in ambitu minutissime est serrata. Color totius corporis est ar-
enteus, in ventre plane albicat. *Caput* superius incarnati est coloris, & hispida testa munitum. *Pinnae* omnes coloris sunt dilute incarnati: ea autem quæ in dorso spinis suffulta, prope spinas auro est umbrata.

Caro pinguis & boni saporis; præsertim si piscis affertur. Capitur in mari inter scopulos.

Caranxa. Magnitudinem & figuram habet ut *Iurrucapeba*, differt tamen capite & colore corporis. *Pinnas* quoque eodem modo positas habet ut ille. *Os* autem obtinet lunatum; dentesque habet acutissimos, sed minutos: *Branchias* amplas, quæ aculeis in postica parte sunt munitæ. *Oculi* versus summitatem capitis in lateribus positi non longe ab invicem haud magni, pupilla ovali nigra, quam ambit circulus ruber. Squamulis in vniuersum vestitur lunatis, coloris miniatiper totum, & ubique punctulâ nigra, magnitudine seminis papaveris insparſa, habet, præterquam in ventre.

Capitur in mari inter scopulos: estque edulis, molli admodum carne atque boni saporis.

Curruca, species *Corvina*; Piscis fluviatilis, sesquipedem longus, corpore oblongo; ore satis amplo, oculis mediocribus, nigris. *Pinnas* habet septem: unam per dorsum longitudinem ad caudam ferè protensam, quæ divisa est & prior pars latior, tres digitos ferme; & totidè longa, triangularis, spinis suffulta, posterior longior, sed exilior. Cauda fere quadrata. Squamas habet mediocris magnitudinis argenteas cum auro & subfusco paucis mixtas, præsertim in dorso & lateribus. *Pinnæ* in dorso & lateribus ac cauda, cineræ; in medio ventre flavescunt, & fuscescunt. Edulis est.

Guatacuba Tuba, in duorum pedum longitudinem excrescit, dorso paulû incurvato. *Os* habet triangulare, acuminatum, dentes parvos acutissimos. *Oculos* magnitudine stufferi Hollandici, pupilla magnâ, nigra, splendente circulo rubro. *Pinnas* habet molles sine spinis in lateribus; nimirum unam in quolibet latere, post branchias, angustam, duos & semis digitos longam: duas tales junctas & ventre subter illas unica spina munitas: & unam prope anum digitum longam ac latam, unica quoque spina armatam. Ante medium dorsum versus occiput, inci-

pit pinna desinens ad caudæ initium; quinque digitos longa, unum fere lata, quæ duabus & viginti spinis erigitur: cauda duos penedigitos longa, unû lata, pinnâ habet plus uno digito longâ & quatuor latam paululumque exterius versus interiora arcuatam. Vestitur squamis paulo maioribus, coloris argentei & striis flavis & ex argenteo rufescentibus secundum longitudinem extensis à capite ad caudam usque. In utroque latere etiam à capite ad caudam eminens lineâ tendit. *Caput* ex argenteo, rufo, flavo mixtû. *Pinnæ* albæ sive argenteæ; caudæ pinna ruffa: venter albus.

Capitur in mari inter scopulos. Boni est saporis, & lingua & caro circa mandibulas longè optimi ut in *Carpione*.

CAPUT. V.

De Pira Iurumenbeca, Ta-
moata, Acara, & Pira
Pixanga.

PIRA JURUMENBECA vulgo Boca-^{TAB.}
molle, quia molli ore & aquis ex-^{XXXII.}
tractis statim moritur: vivit in mari ^{II. 12.}
in cœno: oblongus piscis haud latus: ^{Idem lib. 4.}
novem aut decem interdum pedes ^{c. 4.}
longus, duos & semis latus, ubi latissimus. *Os* habet elevatum; quod ampliare & rotundare potest: oculos magnos, pupilla crystallina, circulo ex argenteo & brunno mixto. *Septem* habet pinnas, duas angustas postbranchiales, duos digitos longas: duas in infimo ventre junctas, duos fere digitos longas, unum latas: unam post anum firmâ spinâ suffultam: sextam per dorsum extensam & bifectam; anterior eius pars sesquidigito longa, unum lata, triangularis, quam erigere & in rimam recondere potest, mollis & translucens; altera pars usque ad caudam ferè porrecta, tres digitos longa, semidigito lata, itidem mollis. Septima est cauda, duos fere digitos longa, sesquidigito lata, figura pentagoni cuius basis inserta in corpus.

Squamas habet toto corpore argenteas, splendentes, mediocris magnitudinis : in dorso viridis & aureus color transplendet. *Pinne* argenteæ & in medietate exteriori aureæ. In quolibet latere tinea tendit paulum elata, etiam argentei coloris ut reliquum corpus.

Edulis est & boni saporis.

Idem lib. 4. c. 5. **TAMOATA**, Lusitanis soldido (quia armatus) piscis fluviatilis seu aquæ dulcis, edulis. Longitudo corporis ab occipitio ad initium caudæ trium & semis digitorum; longitudo capitis unius digiti; latitudo paulo major. Crassities corporis; ubi maxima, nimirum post occipitiū, trium, circa caudam duorum. *Caput* latum ranæ ferme modo; os haud amplum; ad cuius quodlibet latus filum habet unū digitum longum instar barbæ, os edentulū. *Oculi* minimi crystallini, magnitudine seminis papaveris, circello aurato cincti. *Pinnas* obtinet octo; ad quamlibet branchiam unā, digitum longam, firmam instar cornu in uno latere, directe à latere protensam: duas in infimo ventre, non ita firmas at eiusdem magnitudinis: unā in medio dorso, alteram in eodem dorso prope caudam, minimā: unā parvam in infimo ventre prope caudam & octavam pro cauda, digitum longam & latam. Totum caput superius tegitur testa dura instar clypei: & universum corpus vestitum est lorica ex oblongis squamosis corporibus composita: suntque hæc corpora per ambitum minutissime serrata & quadruplici ordine tota lorica disposita: id est, cocunt partes seu squamæ loricæ in utriusque lateris medio, in dorso & in infimo ventre. Color totius piscis obscure ferreus, præsertim in capite. Carne bona est.

Piscis hic aqua carens influvio ubi est, tempore sicco, per terram abiret aquam quærat.

Idem lib. 4. c. 6. **Acara Pinima**. Piscis est latus, dorso incurvato, sex aut septē digitos longus, quatuor latus, ubi latissimus, parvi Carpionis figura aut verius Percæ misnica. Os habet haud amplum, denticulos minutissimos; oculos satis ma-

gnos pupilla nigricante transplendente, circulo rubro, fusco & albo: *Pinnas* septem; unam per totum dorsum extensam & continuam versus anteriora minus uno digito latam, versus posteriora latiore: huius pinne medietas anterior spinis suffulta est & illam in rimam potest recondere: post branchias in utroque latere unā duos digitos longam, haud latam, in medio ventre duas junctas semidigitū ferme longas firma spina sustentatas: inter anum & caudā inferius itidem unam firma spina munitam: Septima pro cauda est furcata, plusquā sesquidigitum longa, totidem lata.

Totus vestitur squamulis argenteis ex auro splendentibus: in quolibet latere septē magnas habet strias secundum longitudinem ad caudam usque extensas, coloris fusci splendentis (in quibusdam aurei seu lutei) à summo item capite per utrumque oculum ad extremitates oris, in quolibet latere capitis lata stria nigra descendit, ad cuius orā aliquid cerulei admixtum est. Ultra harum striarum exortum in dorso, nimirum ubi pinna dorsi initium sumit, itidem per quodlibet latus descendit nigra stria usque ad exortum pinne lateris seu oram branchiarum. Omnes pinne & caudā coloris sunt lutei seu aurei splendentis. Capititur in mari inter scopulos: & est edulis atque boni saporis.

Pira Pixanga, Belgis *Gatvisch*/ quia in initio antri inter scopulos degit in mari. Longus est novem digitos, ab initio oris ad exortum caudæ. *Cauda* duos digitos longa. Os sesquidigitum amplū, minutis sed acutissimis denticulis præditum. *Caput* haud magnum: oculi magni, prominentes, pupilla coloris instar Turcoïdis optimi, circulo nigro, cū aureo & sanguineo mixto. Branchiæ in triangularem figuram desinunt, ampla & acuta spinula præditæ. *Pinnas* habet septem: unam per totius dorsi longitudinem extensam, unum ferme digitum latā, & in postica parte latiorē, cuius prior medietas undecim firmis spinis sustinetur, posterior est mollis.

Post

Post branchias in utroque latere unam, duos digitos longam & totidem latam, subrotundam & carnosam: duas junctas in medio pene infimo ventre, unica spina singulas firmatas: unam mediocrem post anum spina munitam. Septima est pro cauda, duos fere digitos longa & totidem lata, non secta sed extremo ambitu subrotunda. Tegitur squamulis parvulis per totum corpus, ad tactum glaber nisi à cauda versus caput digitis fricetur. Totum corpus, caput, pinnae, cauda ex albo flavescent: & per totum variegantur maculis sanguinei coloris diluti, rotundis, magnitudine seminis canabis: quaedam etiam in ventre majores. Pinnae eodem modo maculatae in ambitu suo obscurius rufescent. Figuram ferè Auratae habet. Edulis est ac boni saporis.

Captus per trihorium extra aquam potest vivere: bihorium postquam mortuus esset, aperiebam illum & cor adhuc movebatur exemptum: cor situm erat statim post fauces, & aspera arteria in id inferebatur, eratque digitum remotum à reliquis visceribus per mediastrinum; minimum utique & vix granum tritici æquans etiam quando spiritu inflatur.

CAPUT VI.

De Vubarana, Capevna, & Acarapitamba.

TAB. XXXIII.
r. 2. 3.
Idem H. B.
lib. 4. 6. 7.

VVBARANA. Piscis figura corporis Trutæ nostrati similis, ubique ferme æqualis crassitie, paulum tamen in dorso exaltatus, versus caudam autem angustior. Corpore oblongo, quadratè cylindraceo: pedalis longitudinis, semipedem crassus. Caput acuminatum seu coactum, haud magnum: oculi stufi magnitudine, pupilla nigra, circulo primum aureo, exterius argenteo: Os edentulum & lapis illi pro lingua. In medio dorso unam habet pinnam duos pene digi-

tos longam, unum antèius latam, trapezii figura, non tamen duris spinis firmatam. Post branchias in quolibet latere versus inferiora parvam pinnam oblongam & angustam obtinet & duas tales laterales ad infimum ventrem è regione dorsalis: prope anum unam parvam. Cauda constat pinna furcata instar harengi plus duobus digitis longa. Squamulas habet ordine linearis secundum longitudinem corporis positas, ita affabre ut ad tactum quaque versus glaber videatur. Superne si aspiciatur olivacei est coloris, atemius aut laterali ter si intuearis plane argenteus ac splendens videtur, & dorsum cærulescit ex argenteo: venter plane albus: branchiæ ita glabræ sunt ut laminæ argenteæ videantur.

Astutus boni est saporis, nec opus est desquamare: coctus non ita commodus ob multitudinem spinarum per carnem dispersarum.

CAPEVNA. Piscis corpore oblongo non lato qui in septem digitorum longitudinem excrescit. Os illi obtuse acuminatum; habetque in superiore atque inferiore mandibula unam seriem minimorum denticulorum: tota cavitas oris cum lingua sanguinei coloris insignis: Oculi illi parvi, stufi magnitudine, crystallini, circulo partim argenteo colore variegato. Pinnae obtinet septem; in quolibet latere post branchiam unam oblongam, tenuem quasi triangularem: duas triangulares in infimo ventre; unam post anum firma spina munitam: unam per dorfi longitudinem excurrentem, cuius anterior medietas spinis munita, quem recondere potest; posterior mollis & sine spinis: cauda bicornis, molli pinna, Tegitur squamulis parvis argenteis, in quibus aliquid aurei transplendet. In quolibet latere habet duas lineas crassas aurei coloris, unam à summitate oris per oculos & medium latus tendentem ad caudam, alteram magis superius per dorfi latum pergentem. In summitate capitis livescit. Pinnae omnes sunt cinereæ: Venter albus ut & eius pinnae.

Co-

Coctus boni est saporis. Capitur in mari inter scopulos.

Idem. Lib. 4. cap. 8. ACARA PITAMBA, Piscis oblongo corpore ut mullus seu barbus, in duorum pedum aut etiam maiorem longitudinem excrevit: Os habet minutum & dentes: Oculos amplos, pupilla crystallina, circulo miniato: Pinnae septem; unam à summitate dorsi tendentem ad exortum caudæ fere, spinis suffultam, digitum latam aut paulo amplius: post quamlibet branchias unam tenuem & longam; subtrus in ventre duas junctas, & prope anum unum: caudæ constat pinna quinque digitos longa, quæ in duo obliqua cornua desinit. Squamis totus vestitur modo Carpionis, eleganter ex purpureo cæruleis. In utroque latere in medio ab oculis ad caudam tendit linea sesquidigitum lata; aurei coloris, per totum autem dorsum & latera usque ad hanc lineam puncta aurea majuscula habet: sub linea in lateribus subtiles lineas aureas seu flavas, secundum longitudinem. Venter albicat. Pinnae laterales & ventris ex albo flavescent. Dorsalis pinna & tota cauda aurei sunt coloris.

Optimè sapit assatus, & melius quam coctus. Pinnae ejus lucent noctu. Capitur in mari.

Hic piscis à crustaceo quodam animalculo vexatur, sesquidigitum longo, digitum crasso, figuræ oblongæ, ut cauda Gammari & eodem modo formato & crustato: constat autem septem juncturis, & habet quatuordecim brevia crura, unguiculis acutis prædita, in quolibet latere septem: antè corpusculum paululum ampliatur. Corpus molle est sub crusta instar cochleæ lente cute obductum: nec oculi nec os apparent. Hoc animalculum ori piscis se ingerit & unguiculis suis arcte faucibus inhæret, nec unquâ piscis se ab illo liberare potest. Postero die adhuc vivebat capto pisce & pridie mortuo; in totum albi est coloris.



CAPUT. VIII.

De Iaguacaguare, Curimata, Tareira, d. Alto, & Tareira de Rio.

JAGUACAGVARE, Lusitanis *Iaque-Tab. XXXIII. 4.5.6.7. Idem lib. 4. c.8.* ita, id est, interula, à colore, quæ nigritæ ejusdem coloris amiciuntur. Piscis instar Percæ nostræ latus & obrotundus, ad summum octo digitos, quinque aut sex latus, Os habet parvum, cum minutulis dentibus ordine digestis: Oculos mediocres crystallinos, circulo fusco: Pinnae porro septem, unam à medio dorsi ad exortum caudæ protensam, spinis suffultam, anteriore quidem parte semidigitum latam, posteriori latiorè & trianguli figuram desinentem. Duas postbranchiales, duas in inferiori ventre; unam post anum latiusculam: caudam denique duos digitos longam, parallelogrammi figura, quæ in duo cornua desinit. Squamis vestitur, instar percæ, majusculis; quæ è cinereo cærulescent. A dorso autem per latera latæ lineæ descendunt ad ventrem nigrae, in quolibet latere quinque. Superius caput quoque nigrescit, venter verò albescit atque erubescit. Pinnae omnes è cinereo cærulescent & quodammodo nigricant versus extremitates. Tota denique cauda nigra est. Edulis est piscis.


Haud malè convenit cum Mormyro Gesneri, nisi quod Icon in eo differat, quod in Mormyro Gesneri plures lineæ nigrae vel pullæ à dorso ad ventrem per latera descendant.

CVRIMATA. Piscis Carpioni, figura, colore, carne valde similis: sesquipedem longus, quatuor & semis digitos latus: capite Carpionis, ore rotundo & edetulo: corpore oblongiori, & squamis majusculis. Pinnae habet septem præter caudam; nimirum duas postbranchiales, duas in medio ventre inferiori, unam post anum, & unam plane parvulam parallelogrammā huic oppositam in dorso; unam denique in medio dorso, magis longā quam latam. Totus piscis coloris est argentei ut Carpio, & ejusdem saporis. Non capitur nisi in dulcibus aquis.


Vubarana.





Capcuna



Acarapitamba.




Iaguacaguari.




5

Curimata.




Tarcira. de Rio

Seu fluvialitis.




Tarcira.

7




Guamaiaçu Guara

10




8

Piratiapia.



Ceixupira.

9





Guaracapema.

11

Mitupira & Pimbebe.

12



Idem H. B.
lib 4. c. 9.

TAREIRA d'ALTO, id est marinus, piscis tereti corpore, decem digitos longus (reperiuntur & maiores) quinque; crassus, ubi crassissimus, nam versus posteriora sensum minuitur. *Caput* habet colubrinum, supra oculos in duo tubera elatum: oculos pupilla nigra, circulo flavescente; os acuminatum satis amplum, interius flavum denticulis acutissimis munitum, quales & lingua habet. *Pinnas* obtinet octo, nimirum in quolibet latere post branchias unam, uno plus digito longam, trientem latam, directe à latere protensam: post has interstitio pene sesquidigiti in infimo ventre duas junctas figura trapezii, duos digitos longas & totidem fere latas in extremitate: versus caudam in infimo ventre unam duos digitos longam in corpore extensam, sed plane angustam, supra hanc in dorso parvula est instar cuspidis cullæ: in medio dorso una pene quadrata, duos digitos lata, plus uno longa: Octava est cauda vix sesquidigiti longa & furcata. *Pinne* a. instar foliorum papaveris sunt tenues, & molles. spinis sustentantur. *Squamulis* vestitur peltatis, ita affabre compositis ut ad tactum glaber videatur. Venter totus albicat: latera & dorsum secundum longitudinem lineas habent alternatim flavas & virides. *Ore* squamularum circumcirca brunneæ sunt, & videntur quasi rhombi ordine positi essent brunis lineis circumscripti, & ac si per unum ordinem tenderet linea, flava, per latera viridis. Pinna in dorso secundum longitudinem strias habet brunas reliquæ flavas. *Cauda* itidem striata brunno. Caput superius maximam partem brunnum. Piscis asandus, nam coctus non ita bonus est. Sapore autem multo antecellit Tareira do Rio, qui multas habet spinas.

TAREIRA do Rio, i.e. fluviatilis, oblongo corpore, dorso recto, ventre paululum protuberante: inferior illius mandibula longior superiori: dentes habet acutissimos & inter eos duos longiores in medio inferioris mandibulæ & quatuor tales in superiore: mordet vehementer: *Oculi* satis magni, prominuli, pulchri, pupilla atra,

cætera nigri. *Caput* Lucii capiti parum simile. Longus est piscis quindecim aut sedecim digitos. *Pinnas* habet sex: nimirum duas oblongas post quamlibet branchiam unam, duas junctas oblongas in infimo ventre, unam post anum parallelogrammi figura; unam in medio dorso magnam, rectam, parallelogrammam, plus tribus digitis longam, duobus latam. *Cauda* parallelogramma pinna constat, duos & semis digitis longa, sesquidigitum lata, in extremitate circinata. Totus tegitur squamis satis magnis, fuscis in dorso & lateribus; verum in lateribus fuscum argenteo est variegatum, ut ita per fuscum argenteum videatur. *Caput* tegitur dura testa fusca. Venter totus albicat. *Pinnæ* omnes fuscae, sed nigro undulatae transversum ut Nisi cauda: itidem & cauda. Capitur in fluviis. Edulis est, sed multas habet spinas.

CAPVT VIII.

De Piratiapia, Ceixupira, & Piquitinga.

PIRATIPIA piscis est oblongo corpore & satis crasso, interdum tantam magnitudinem acquirit ut quinquaginta libras æquet: *Oris* pars inferior longior superiori. *Denticulos* habet acutos, inordinate positos & tota oris cavitas cum lingua est rubra. *Oculi* prominentes, pupilla crystallina ovali & circulo rubro. Ante utrumque oculum habet foramen. *Branchia* desinunt in triangular. figuram, & sunt amplæ. A summitate dorso ad caudam usque extenditur pinna, quæ ad medietatem anteriorem spinis surrigitur, reliqua medietas est mollis. In inferiori corpore prope anum etiam pinnam mollem habet obrotundam: in quolibet latere post branchias unam, & duas in infimo ventre junctas, oblongas. *Cauda* fere quadrata est, at in extremitate paulo latior quam in exortu. *Squamis* vestitur parvis. *Dorsum* & infimus venter cinnabarii sunt coloris, latera ex gryseo fuscescunt.

In totum præterea est maculatus, & in dorso quidam maculas habet maiores

res nummo mifnico, ex gryfeo fufcas, in lateribus vero & infimo ventre minores eiuſdem coloris. *Pinna* omnes cinnabarii coloris, in extremis oris lineam albiffimam habentes, adque eam fimbriam latam nigerrimam. Poſtbranchiales *pinnæ* totaliter cinnabariæ ſunt ſine fimbria nigra aut alba. Dorsalis *pinnæ* medietas anterior tota rubra, reliqua fimbriata albo & nigro ut reliquæ. Optimi ſaporis carnem habet ſi coquatur.

CEIXVPIRA, acquirit interdum longitudinem novem ac decem pedum, atq; craſſitiem corporis humani corpore oblongo & capite atq; figura corporis Tuberoni haud abſimilis. Quem deſcribo tantū duos pedes erat longus cum ſemiſſe. Erat illi *caput* cōpreſſum & latum, ſeptē digitos longum & fere quinque latum: *Oſ* haud inamplum pro mole corporis, parabolica figuræ, edentulū, prominentiſ tamen acutiſſimis conſertim repletum: lingua lata: oculi albi haud magni, paulō maiores duplo ſtufero Hollandico, pupilla cryſtallina. *Brachias* habet ſatis amplas: *Pinnas* ſeptē, nimirum poſt quālibet branchiam unam, directē à latere protenſam triangularē, ſemipedē longam, duos & ſemis digitos latam, ubi latiffima. Interſtitio ferē ſex & ſemis digitorū ab occipitio in medio dorſo incipit pinna quatuordecim digitos longa, in initio triangularis, & quatuor digitos alta, hinc ſenſim minuitur & ad caudam ferme pertingit, ibiq; triangulo deſinit. Huic oppoſita eſt eiufdē figuræ una in infimo ventre, undecim digitos longa, deſinens cum ſuperiore, ſed non cum illa incipiens. Infra duas poſtbrachiales in infimo ventre duas habet junctas, quamlibet tres & ſemis digitos longā & ſeſquidigitū latam. Septima pinna eſt cauda, incipiens duorum digitorum interſtitio à fine dorsalis & ventris, bicornis, ſuperius cornu fere octo digitos longum, inferius paulō brevius, nimirū ſeptem digitorum. *Pinnæ* omnes anterieus ſpinas habent, ſed molles. In interſtitio inter occiput & dorſalem piñam, octo oſleos triangulares aculeos pro-

minentes obtinet, quos recondere in carne & erigere poteſt, ac pro armis uſurpare. Ante quemlibet oculū, in intervallo unius digiti foraminulū habet duplex. *Caput* oſſeum & glabrum. Totum corpus exiguis ſquamulis veſtitur, ita ut totus piſcis glaber videatur. Colore totus eſt niger, excepto tamen ventre, qui albiffimus inſtar cretæ; in lateribus (inter album & nigrum) paululū caneſcit nigredo, cætera, ut dictum, nigerrima. *Pinna* omnes nigræ, exceptis duobus infra poſt branchiales in infimo ventre quæ albæ ſunt, oris nigricantibus. In utroq; latere piſcis linea quædam profundior reliquis ſquamulis tēdit ad caudā uſq; eiufdem cum corpore coloris.

Piſcis gravis ac pinguis eſt, ac pro optimo habetur inter omnes in Braſilia, præſertim quādo adhuc medio; crifeſt magnitudinis. Caput. in Mari.

PIQVITINGA eſt duos, aut paulō Idem L. 4. c. 10. plus digitos lōgus, figuræ pene ut *Piarabucu* à quo non multum differt ut dicam. *Oſ* habet parvulum, ſed q̄ ample aperire & rotundare poteſt: *Oculos* ſatis magnos, nigros, circulo argenteo: branchias amplas: *pinnas* ſex & ſeptimam pro cauda: nimirum duas poſtbranchiales, triangulares, inferius poſitas: duas junctas in medio infimo ventre: unam triangularē in medio dorſo, unam poſt anum: cauda conſtat pinna furcata. Color capitis argenteus ſplendens ſuperius olivaceo imbutus. Tegitur ſquamulis albis, in dorſo tamen olivaceus color translucet. *Pinnæ* omnes albæ. Differt à *Piabucu*, quod ille paulō maior evadat, & linea illius lata non ſplendeat, cum reliquum corpus ſplendeat, quod in hoc contrario ſe habet. *Piabucu* etiam *pinnam* habet in dorſo prope caudam, qua hic caret. Cæterum caro ſimilis, edulis.

CAPVT IX.

De Camuri, Guaracapema & Miivipera.

CAMVRI Luſitanis *Robalo*, piſcis eſt **TAB.** duos pedes longus. Lupo noſtro **XXXIII** figura corporis ſimilis atq; etiam ore, Idem lib. 4. craf. c. 10. & 11.

crassus plus uno pede, ubi crassissimus: *caput* sesquipedem pene longum: *os* semilunare, in medio paulum acuminatum, sex digitos longum, sed quod magis dilatare atque rotundare potest, ita ut circumferentia eius fiat tredecim digitorum: *oculos* habet dupli stufieri magnitudine, pupilla crystallina, circulo aureo: *Pinnas* octo; nimirum duas in dorso, priorem tres digitos longam & paulo plus latam, firmis spinis sustentatam, quam in rimam recondere potest: alteram huic magnitudine parem, sed spinis destitutam, nec habentem quo condatur: duas postbranchiales, paulo plus tribus digitis longas, duas in infimo ventre quatuor digitos longas, duos & semis latas, unam talem post anum; octavā pro cauda, quæ est furcata, quinque digitos longa, sex lata. *Squamas* habet ut *Carpio*, coloris argentei, splendentes, in dorso autem & lateribus aureus admiscetur. Venter plane albicat: *Pinnæ* sunt aurei coloris, quibus aliquid fusci admixtum est, in quolibet latere superius à fine branchiarum usque ad medium exortus caudæ, ductam habet lineam crassam, nigram.

GVARACAPĒMA mas est *Doradæ*. Piscis compresso corpore & latus, licet non ita crassus. *Caput* desinit in figuram quadratam, estque in fronte ita in aciem eductum, ut facilius fluctus maris natando secare posset. In sex aut septem pedum longitudinem excrescit: latitudo sive altitudo, ubi maxima, nimirum versus anteriora & pone caput, sesquipedalis. *Os* habet haud ita amplum, pro magnitudine corporis, mandibulas compressissimas, denticulos acutos. Paulo supra os & quidē versus eius interiora oculi positi inferiori loco, ne nimirum in aquis imperiose ageret, qui alius linceus. *Oculi* autē sunt magni, rotundi, pupilla crystallina, ceterum argentei coloris. Branchias habet amplas: *Pinnas* septem, nimirum unam insignem à summitate capitis per totū dorsum extensam usque ad caudæ exortum, latam in medio septem aut octo digitos, quæ sensim minuitur, constans

membrana ad tactum coriacea, & spinis mollibus interius sustentata: hanc natās in æquore erectam tenet. A medietate infimi ventris ad caudæ initium itidem pinna producitur, sed vix unum digitum lata, in exitu triangulata: post utramque branchiam pinnam habet oblongā octo vel novem digitos: sub his in infimo ventre duas propinquas paulo longiores. *Cauda* circiter sesquipedem longa in duo cornua ampla distenditur. Squamulis minimis vestitur totus, quæque ad tactum vix sentiuntur; ita ut glaber videatur. Color in capite, dorso, lateribus ex viridi & argenteo mixtus, uti & in pinis, in ventre vero albicat. Per totum autem corpus (nimirum latera, dorsum, caput) maculis variegatus cæruleis, variæ magnitudinis, milii, grani hordeacei, erui. Carnem habet ficcā, boni saporis.

Velocitate natandi superat porcos marinos, & eodem modo saliendo progreditur. Vescitur pisce longo vulgo *Petumbo* appellato.

MIIVIPIRA & *PIRABEBE* Brasiliensibus, *Peixe volador* Lusitanis. Piscis est volans, vel hirundo piscis: variæ est magnitudinis: maior erat *Halece*, quem hic describo, & formæ rarioris. Figurā corporis habet (instar *Zadæ* Pomeranorum) teretem & posteriora versus acutiorem. Totius longitudo ab ore ad finē caudæ tredecim digitorum; crassities, ubi maxima, nimirum circa exortum alarum, septē fere digitorum, ad exortum a. caudæ duorum. *Caput* crassum habet, superius compressum & latum, nimirum superius fere duos digitos & quasi in tubera supra oculos elatum, os non ita magnum, edentulum, at ossa eius paulum ferrata instar limæ. *Oculi* magni, rotundi, stufieri Hollandico equales, pupilla nigra, circulo flavo, & exterius altero fusco. *Pinnas* habet sex cū cauda; duas in dorso, unam parvulā in medio, paulum tamen versus anteriora, alterā post hanc duos digitos longam, sesquidigitum latam, tenuē, at octo spinis sustulā; duas robustas in infimo ventre, subter illa, duos & semis digitos longas, firma spina cō-

stantes sed angustas, & unam parvam in inferiore corpore ex opposito maioris in dorso; septima est cauda, duos digitos longa, totidemq; lata & furcata. Præterea habet duas alas magnas, in quolibet latere unam, habentes exortum suum sesquidigitum fere post oculos, post branchias paulum; estq; alarum longitudo septem digitorum, latitudo in exortu plus uno, in extremitate sex digitorum: constant alæ tenui membrana instar chartæ puræ (*Postpapier*) ex albo seu cinereo subfusci coloris: habent a. aliquot plicas & sustentantur spinis tenuibus per longitudinem extensis. Ad utramq; alam in initio eiusdem parva quasi ala exit, duos & semis digitos longa, sed planè angusta & sua spina munita. Totum caput cum initio dorsi (ab ore nimirum ad quinque digitos numerando) vestitur testa ossea, dura, quæ versus suum finem dupliciter divisâ in duos aculeos definit quasi spinas. *Branchiæ* a. ad duos digitos extenduntur in aculeos usq; sub alis. Totum a. corpus vestitur squamulis elegantibus, ordine dispositis, quæ in ventre triangulares, in lateribus & dorso verius ellipticæ figuræ. In ventre a. ita dispositæ sunt ut piscis ad tactum glaber videatur: at in lateribus & dorso quælibet in sui medio habet tuberculum, ita ut ordine naturæ dispositæ in recta linea, repræsentent lineas rectas, elatas, tuberculatas. In toto ventre albicat, in lateribus & dorso subfuscus, & splendens ut *Harengus*. Spinæ quæ alas sustent, & per eas extenduntur etiam albicant. Alæ ipsæ ex cinereo fuscescentis sunt coloris, maculis, nigricantibus variegatæ. Volat hic piscis super aquas instar *Hirundinis* per spatium quantum sclopeto pertingi potest: nimirum usq; dum succescant alæ, tunc n. iterum aquæ se immittit alas humectâdigratia & denuo volat. Natura a. huic pisci alas dedit, ut se salvare posset, dum hostis eius *Doradæ* magna caterva ipsum persequitur. Sæpissime mille eorum simul volantes vidi in Oceano Tropicis interiecto: interdum etiam volando incidunt in naves, ut nobis etiâ factum memini. Caro boni est saporis cocta. Aetum &

de *Hirundinibus* superius, sed quia huius Icon ab illis diversa, addere & hanc placuit.

CAPVT X.

De *Guaibi Coara*, *Guaperua* & *Piraya*.

GV A I B I C O A R A *Brasilienfis*, TAB. *Buraco de Velha* *Lusitanis*; *Piscis* est XXXIV. corpore latiusculo; dorso elevato & à capite arcuato, duodecim aut quatuordecim digitos longus, quatuor latitudo, ubi latissimus. *Caput* & *os* acuminatum, satis amplum, habens in utraque maxilla seriem minimorum denticulorum, linguam conspicuam; quæ una cum cavitate inferiori oris, sanguinei est coloris: *Oculos* stuferti magnitudine crystallinos, circulo coloris ex aureo & fusco mixti. *Pinnas* obtinet septem, nimirum post brachia in quolibet latere unam, quasi triangularem, mollem: in infimo ventre duas junctas: unam post anum duplici spina munitam: per dorsum a. una extenditur, cuius medietatem anteriorem undecim spinæ erigunt, quam recondere potest in cute, posterior medietas mollis & sine spinis. *Cauda* constat pinna bicorni, & parallelogrammi figura à corpore extenditur. *Squamæ* habet mediocres, instar *Percæ*, argenteas, quæ per oras sunt melini coloris, & aspectu referunt meros cubos: in occipitio & dorso summo squamæ ex argenteo cærulescunt, & per oras itidè sunt melini coloris. Totum a. caput superius & ad latera est aurei coloris, striis cæruleis secundum longitudinem variegatum. *Pinnæ* omnes melini sunt coloris, exceptis duabus in infimo ventre, quæ magis albescunt: platus a. utrumq; versus dorsum secundum longitudinem tendit linea melini coloris ad caudam usq; *Piscis* boni saporis coctus: capit in mari inter scopulos.

GV A P E R V A *Brasilienfis*, *Peixe Porco* *Lusitanis*, *Græcis* *νάρκω*. Ab ore ad initium caudæ quindecim digitos longus, in medio ubi latissimus, octo latus: corpore paulum compresso a lato: dorso arcuato, ventre adhuc magis curvo: capite porcino: dentibus caninis, albis, longis; octo in

qua-

qualibet mandibula, duo medii tam inferius quam superius longiores sunt reliquis: dentes inferioris mandibulae aliis quasi brevioribus sustentantur. Os subrotundum, angustum: quatuor fere digitorum interstitio ab ore superius sunt oculi, sesquidigitum à se invicem distantes, maiores grosso misnico (& ante eos quasi vestigium foraminis) pupilla crystallina, circulo aureo maculato cæruleo. Branchiarum loco rimam habet duos digitos longam, plus uno latam. In dorso tres penè digitos post oculos, duo habet cornua, unum pennam olorinam crassum, tres digitos longum, quod versus posteriora paulum inclinatur, alterum parvum per membranam alteri adnexum, utrumque in rimam recondere potest demissum. Trium & semis digitorum intervallo post hæc pinna est, in initio fermè triangularis, hinc magis magisque angustatur ad caudam fere, quinque digitos longa, initio paulo plus duobus lata: & è regione in infimo ventre talem, initio duos & semis digitos latam, magis magisque arctatam versus caudam. Cauda quadrata figura à corpore extenditur, & pinnam habet quatuor digitos latam, duos longam, quæ in duo cornua dilatatur, ut totius longitudo sit quatuor digitorum. In medio inferioris corporis parvam habet pinnam & ante eam cornu sesquidigitum longum. Pinnae omnes sustentantur spinis & sunt cærulei coloris, venter albicat. Squamis vestitur elegantibus, in superficie sua punctulis thalassinis cum cæruleo indico umbratis, in dorso magis cæruleis. Ab oris summitate in utrumque latus ad pinnas postbranchiales, semilunari figura, duæ lineæ crassæ cæruleæ, unius digiti intervallo, ducuntur. Comeditur assatus, coctus non valet.

Dedimus huius & in superioribus descriptionem, sed quæ cum isto non convenit.

PIRAYA & PIRANHA Brasiliensibus: Piscis pedalis longitudinis, lato corpore circiter sex digitos,

ubilatissimus: dorso incurvato, capite obtuso ut Dorada. Oris hiatus parabolicus, quod exactè claudere potest, habet labia parva quibus dentes tegit, obtinet enim tam superius quam inferius ordinem dentium triangulorum, alborum, acutissimorum, quatuordecim in qualibet mandibula (minores habent duodecim) quibus uno morfu partem carnis ex quacunque parte hominis potest abripere quasi novacula esset abscissa: Si quis ingrediatur aquam vel saltem immittat pedem vel manum, statim ab illo lædi potest, ita sitiens est sanguinis & cupiens carnis humanæ, quare caute ab illo cavendum. Oculos habet rotundos, parvos, crystallinos pupilla nigra, & inter illos duo foraminula seu spiracula: branchias amplas, exterius duras & ossæas: sex pinnas & septimam pro cauda; duas nimirum postbranchiales paulum elatas à ventre infimo, duos digitos longas, unum latas: in medio infimo ventre duas junctas parvulas, vix unum digitum longas & angustas: è regione harum in medio dorso incipit pinna, & ad duorum & semis digitorum longitudinem extenditur versus posteriora, paulo plus uno digito lata: duorum autem digitorum interstitio à parvulis in infimo ventre incipit pinna firma spina antè munita, cætera mollis & maximam partem squamulis tecta & paulo plus duobus & semis digitis longa; extenditurque ad exortum caudæ, unum digitum lata: exortus caudæ sesquidigitum longus, ipsa bicornis, & quodlibet cornu in exitu arcuatur. Squamulis tegitur: tota summitas capitis dorsum & latera usque eo si linea ducatur à postbranchiali pinna ad medium pinnae squamosæ, coloris est cinerei diluti cum paucis cæruleo mixti, ac squamula quælibet fimbriam habet ignei & cærulei coloris transplendentis, reliquum laterum seu inferior pars & venter coloris sunt flavi obscuri, ut & capitis inferior pars, ac pinnae postbranchiales & omnes infimi ventris.

Pinna dorsalis & cauda coloris est è cinereo cærulescentis.

Edulis est, & carnem habet albis-
simam, paululum siccam & boni fa-
poris. Sæpissimè comedi. Hæc spe-
cies maximè gaudet cænoso fluvij
fundo.

Pyraye alia specus hic reperitur
magnitudine & figura plane similis
priori, excepto quod parvulam ad-
huc pinnam habeat squamatam in-
ter dorsalem & caudam, & quod co-
lore differat: nimirum summitas ca-
pitis, totum dorsum & laterum su-
perior pars eo usque si linea ducatur
à pinna postbranchiali ad medium
pinnæ squamosæ, coloris sunt aurei
cum cinereo mixti, & cæruleo tran-
splendente.

Capitis inferior pars, reliquum
laterum & infimus venter insigni co-
lore croceo fulgent, cui aureus per-
splendet. Eiusdem coloris croceo
aurei sunt pinnæ postbranchiales &
infimi ventris. Dorsales duæ & cau-
da cinerei diluti cum paucò cæruleo
mixti, ut & dorsum.

Hæc species magis gaudet areno-
so fluvij fundo. Edulis est ut prior.

Reperitur & alia *Pyraye* species al-
ba, figuræ ut antecedentes, solum
caput non ita obtusum, sed os pau-
lum prominet figura conica: color
ventris & laterum argenteus: dor-
sum & caput argentei coloris cum
paucò cæruleo transplendente: pin-
næ omnes argentei coloris cum gry-
seo mixti.

Dentes habet parvulos triangula-
res ordine dispositos, nec ita mor-
det ut cæteri. Paulò minor quoque
est reliquis speciebus, cæterum non
minus edulis, quam illæ.

CAPUT XI.

De Amore Guacu &

Guacari.

TAB.
XXXIV.
4. 5.
Idem l. 4.
c. 13.



AMORE GUACU Brasiliensibus;
in semipedis longitudinem ex-
crescit; corpore oblongo, capite
crassiusculo, branchiis amplis, mi-
nutissimis in ore denticulis: *Oculi* il-

li parvi nigri circello aureo. *Pinnas*
habet septem: nimirum duas post-
branchiales oblongas, quasi triangu-
laris; duas sub his junctas; duas in
dorso, anteriorem minorem poste-
riore; & è regione posterioris unam
in infimo ventre. *Cauda* oblongiuscu-
la, parallelogramma, in extrema-
te circinata. Tegitur squamis pro
sua magnitudine majusculis. Piscis
in totum ferrei coloris, in ventre ta-
men paululum è ferreo albicat. Est
edulis.



GUACARI, piscis subrotundo seu
pyramidalis corpore, pedalis vel pau-
lo majoris longitudinis; octo digito-
rum crassities, ubi maxima est. *Ca-
put* inferius planum, lateribus ellyp-
sin describit, superius subrotun-
dum.

Os parvum rotundum habet sub-
ter in plano capitis: loco dentium in
utroque latere processus habet qua-
si setis equinis factos: inferius labium
explicatum, lunatum, membrana
constans, quæ in lateribus oris in su-
is extremitatibus in cirrhum desinit,
triennem digiti longum, qui cirrhi
pro barba serviunt. *Oculi* parvi, ro-
tundi, nummi misnici magnitudine,
cinerei fusco maculati, superne posi-
ti & inter quemlibet foramen, di-
stans dimidium digitum ab oculo
versus interiora. *Branchiæ* angustæ
inferius versus & ante quamlibet
proxime corpusculum parallelogra-
mum, semi ferme digitum longum,
quod extendere & recondere potest,
ita ut reconditum vix videatur. Con-
tinet illud corpusculum in extremi-
tate denticulos acutos setaneos, qui-
bus alios pisces pungit. Et post bran-
chias in quolibet latere inferius ad
planum, triangularem quasi pin-
nam, quatuor digitos longam pene,
plus uno latam, oblongam, spina os-
sea in extremitate laterali sustentatâ
& aliis minoribus secundum longi-
tudinem discurrentibus: spatio au-
tem sesquidigiti versus posteriora di-
rectè post has iâ descriptas, iterum du-
as inferius pinnas habet quadratas,
in quolibet latere unam, duos & se-
mis digitos longas, duos latas, eodem
modo

Piraia et Piranha.




Amore Guacu




Guapcrua.

Guacari.




Piraambu.



Acaraia.

7




Gnariguari.




Acara.

8




Cugupu - Guacu.



10


Piaba.

13




Maturague.

11



Carapo.

12





modo spinis hispidis ossibus sustentatas. Post anum in infimo ventre angusta est pinna, parallelogramma, duos digitos longa. In medio dorso pinna est, quatuor digitos longa, duos longa, spinis hispidis ordine dispositis sustentata, ac antè spinam duram crassiore suffulta, post hanc prope ortum caudæ superius parva quædam est pinna, membranosa, quæ antè corniculatam spinam fulcitur. Cauda constat pinna tres digitos longa inferius, duos superius, bicornis, spinis firmis suffulta. Totum caput testatur vestitur dura ad tactum hispida: totum corpus squamis triangularibus, versus anteriora majoribus, ordine positum.

Sunt autem squamæ omnes ad tactum asperæ, quasi exculptæ, quælibet in sui medio extuberantiam habens: scilicet totum corpus lorica tum est, & quælibet pars lorice habet quatuor angulos, & in quolibet existit tuberculum, ita ut in quolibet latere sit quadruplex ordo tuberculorum. Color totius piscis croceus dilutus, in ventre saturior; ac per totum maculatur maculis rotundis, magnitudine seminis sinapi, fuscis. Maculæ hæc in lateribus & pinnis paulo sunt maiores, in capite minores, ac in summitate capitis maculæ ruunt quasi rivuli. Posterior medietas ventris nullas habet maculas. Pinnae omnes ut corpus coloratæ & maculatæ, excepta pinnula prope caudam, quæ constat membranula nigra, corniculata autem illius spina crocea est & maculata ut reliquæ.

Diu vivit extra aquam, ad quinque horas. Editur defracta lorica, sed paucam habet carnem: intestina longissima, æqualis omnia crassitie, instar crassioris fili quo vela consuunt. Habebat unus piscis quindecim digitos longus, intestina viginti octo pedes longa, quæ dimensus sum.

Reperitur & hic *Guacari*, magnitudine & figura plane similis priori, qui in flumine S. Francisci capitur solo colore differens & bonitate carnis: est enim totus umbræ coloris obscuri, & per totum maculis adspersus

obrotundis, nigris, seminis sinapi magnitudine. Caro huius boni est saporis.

CAPUT XII.

De Pirambu, Acaraja & Acara.

PIRAMBU Brasiliensibus; *Chay-Tab*
quarona Lusitan. Piscis Carpionis **XXXIV.**
magnitudine & figura, decem digi- 6. 7. 8.
tos longus ab ore ad initium caudæ, *Marcgrav.*
paulo plus quatuor digitos latus, ubi *H. Bras.*
latissimus: versus caudam angustior 4. 6. 14.
& æqualis latitudinis, duorum nimirum digitorum. Os habet instar Carpionis, oculos magnos prominentes, pupilla crystallina, circulo aureo cum albo mixto. Pinnas obtinet octo, nimirum unam in medio dorso, paulo plus tribus digitis longam & unam latam, quam in rimam recondere potest, & erectam novem firmis spinis sustentare: huic contigua est alia tres fere digitos longa, minus uno lata nullis innixa spinis: post utramque branchiam unam habet tres digitos longam, unam latam in exortu: in infimo ventre duas junctas, duos digitos longas, vix unum latas, firma spina munitas; post anum unam, digitum latam, dimidium longam, itidem firma spina sustentatam: octava est pro cauda, tres digitos longa, totidem lata & furcata. Squamas habet maiores, instar Carpionis, argentei splendentis coloris, paucillo aureo mixti: quælibet autem squama mediam partem usque ab insertionem suam coloris est *feuliemort*: sub capite & ventris priore parte magis argenteus est: Omne pinnæ dilute cinerei sunt coloris. In ore superius & inferius lapidem habet, denticulis minimis præditum, vix sensibilibus.

Edulis est ac boni saporis.

ACARAIA vulgo corrupte *Garranba*: Piscis qui trium pedum longitudo adipiscitur, figura Carpionis. *Dentes* in inferiori mandibula habet acutos, instar acicularum: in superiori duos longos paulo crassiores, quibus interjacent minutissimi vix sen-

vix sensibiles. *Oculi* ipsi magni sunt, pupilla crystallina, circulo sanguineo primum, hinc argenteo. *Pinnam* longam habet per dorsi longitudinē expansam, cuius mediam partem versus anteriora spinis furrigere, & in rimam recondere potest: reliquas quinque pinnas communes habet cum aliis piscibus: septimā pro cauda, quæ lata & penè bicornis est. *Squamis* vestitur argenteis, medio-cris magnitudinis, quæ sanguineo colore umbratæ sunt, ita ut maximā partem sanguineus videatur, argenteo colore transplendente; in ventre totus est albus, ut & sub faucibus. *Pinnæ* omnes sanguinei coloris, exceptis iis quæ sunt in infimo ventre, quæ albæ sunt, in extremitatibus tamen sanguineæ.

Edulis est piscis. Sale etiam conditur & servatur.

A C A R A piscis palmum longus, dorso curvo, & alto corpore ut *Perca*. *Os* habet angustum, & dentium loco limam. *Oculos* habet magnos, nigros, circulo aureo. *Pinnas* obtinet sex, nimirum sub qualibet *branchia* unam longam, triangulum acutum referentem: à summitate autem dorsi pinna extenditur, firmis spinis sustentata & in triangulum acutum prope caudæ exortum desinens. *Cauda* oblonga est, parallelogramma, in extremitate recta. Vestitur squamis satis magnis, argentei coloris, sed in capite, dorso, & lateribus ita umbra mixtis, ut fuscus videatur. Venter albicat. *Pinnæ* omnes & cauda fusci sunt coloris ex umbra. In medio quolibet latere magnam habet maculam nigram, ut & prope exortum caudæ.

Edulis est piscis, & capitur in dulcibus aquis.

CAPUT XIII.

De Guarū-Guarū, Cucupu-Guacu, & Maturaque.

TAB.
XXXIV.
9. 10. II.

G U A R U - G U A R U pisciculus est minutus, nunquam maior sesqui

digito, exili corpore, oblongo, instar minimi *Eldris*. Capitulum habet compressum: ocellos nigerrimos, circulo aureo: pinnulas quinque, nimirum duas postbranchiales, & duas subtus ferè in infimo ventre, & unam in posteriore medietate dorsi. *Cauda* constat pinna parallelogramma, in extremitate circinata. Vestitur squamulis, & totum caput superius, & dorsi anterior medietas sunt fusci coloris, posterior & latera aurei, squamulis umbratis umbra: caput inferius & venter albi splendentis ut mater perlarum, pinnulæ flavæ. Prope caudam utrimque maculam habet nigram.

Edulis est & capitur in lacubus & stagnis.

CUCUPU-GUACU Brasiliensibus, Lusitanis *Meros*, Belgis Iacob *Evera* gen: ingens fit piscis: habui, inquit Marcgravius, quorum corpus cum capite quinque pedes erat longum & cum cauda sex. Corporis ambitus quatuor pedum, octo digitorum, altitudo unius & semis. *Caput* & *Os* magnum habet, quod apertum in rotundum dilatat, edentulum: oculos mediocres, pupilla crystallina nigricante, circulo flavo: *Branchias* in ambitu rotundas, medio autem in triangulū desinentes: *Pinnas* quinque, nimirum unam à summitate dorsi incipientem & non ita longe à cauda desinentem, ad anteriorem partem seu medietatem plane angustam & acutis spinis munitam; posterior autem medietas lata est, & semilunata in ambitu, spinisque haud firmis erigitur: prope anum unam eiusdem figuræ, cum medietate posteriore dorsalis; sed dimidio minorem: Post *brāchias* prope infimum ventrem duas longas & latas, tenuioribus spinis intertextas. *Cauda* magnam pinnam habet quadratam, in extremitate latiorē, quam in exortu. *Squamis* habet parvas. Totum caput, dorsum a latera cinerei sunt coloris cum umbra mixti, & versus dorsum paulo saturatioris. Venter albicat. *Pinnæ* omnes cum cauda dilute brunneæ. Per totum caput, dorsum, latera & pinnas post-

postbranchiales maculæ parvæ nigrae, seu puncta frequentissima dispersa. Venter verò & reliquæ pinnæ cū cauda his punctis carent. Bonam habet carnem. Capitur in mari.

MATURAQUE piscis est corpore oblongo, & fermè parallelogrammo, figura scilicet *Tamoata*, Quinque aut sex digitos longus, sesquidigitum latus ubi latissimus. *Caput* habet latiusculum, dura testa tectum. Oris pars inferior paulò longior superiori: & in inferiori sex denticulos acutissimos habet, in superiori aliquot minimos: Branchias satis amplas: oculos rotundos, nigros, circello aureolo, exterius fusco: Pinnas sex, nimirum duas postbranchiales oblōgas, haud latas: duas tales in medio infimi ventris, & unam post anum trapezij figura, & similem in medio dorso. Cauda constat pinna quadrata, unum ferè digitum longa, in extremitate circinata. Tegitur magnis squamis ordine positis. Totum caput superius, dorsum & latera nigra sunt, venter ex albo obscurè canescit. Pinnæ omnes nigrae.

Capitur solum in lacubus & paludibus, non in fluviis. Boni saporis est.

CAPUT XIV.

De Carapo, Piaba, Piabucu, & Nhaquunda.

TAB. XXXIV. 12.13. Marcgrav. l.4.c.15. CARAPO prima species, corpore oblongo figura cultri, dorsum nimirum crassum & obtusum, venter acutus ut culter: posterius autem corpus definit in acumen: unum pedem circiter longus, duos digitos latus, ubi latissimus. *Caput* acuminatū, sed compressum, inferius labiū paulò longius superiori, os angustum, inferius ordinem denticulorum minutorum, superius nullos habet. *Oculi* minimi, nigri, vix grani papaveris magnitudine. Branchiæ angustæ, & post quamlibet parvula pinna oblonga. Unius ferè digiti intervallo à capite in infimo corpore incipit pinna te-

nuis, angusta, & pertotum ventrem æqualiter porrigitur ad finem corporis: nam caudam nullam habet, nec ullam aliam pinnam in toto corpore. Squamas habet mediocres. Totus piscis est coloris ex fusco, & paucorubro mixti, ac in dorso & capite magis nigrescit. A branchiis in quolibet latere linea tendit ad finem corporis usque, quasi cultri acie tracta, & sub hac linea maculæ nigrae per corpus dispersæ; seminis sinapi magnitudine.

Capitur in lacubus & est edulis.

In flumine S. Francisci capiuntur Carapo huic priori speciei similes, excepto quod longiores sint, & in extremitate acuminati instar subulæ, ad trium digitorum longitudinem squamulas parvas habent.

CARAPO secunda species, priori figura, colore & lineis lateralibus similis, excepto quod dimidiæ tantum sit latitudinis, nec ulla macula habeat. Capitur in lacubus. Caro spinosa, sed boni saporis.

PIABA magnitudine *Phoxini*, pisciculus duos aut tres digitos longus (interdum quatuor aut quinque; quando maximus) ocellos habet nigros, circello aureo. Squamulis vestitus. In medio dorso pinnula erecta triangularis: post quamlibet branchiam unam habet oblongam; duas in medio infimo ventre & post has unam, quæ ad caudæ exortum protenditur: cauda est furcata. *Caput* ad latera auro & argento splendet: totum dorsum argenteo viridi & multo Indico: medium laterum secundum longitudinem argenteo & Indico mixtū: *Venter* aureo & argenteo & paucorubro Indico. Post quamlibet branchiam maculam habet rotundam, satis magnam Indici coloris, & statim post hanc eiusdem coloris maculam lunæ corniculatæ figura, eiusdem coloris oblongam in quolibet latere ad caudæ exortum. *Pinnæ* omnes & cauda aurei coloris, quæ in infimo ventre rubra. Capitur in omnibus fluviis currentibus Brasiliæ, ac summa vi contra aquæ cursum nititur.

Brasiliiani involvunt foliis arborū,

Bb & ci-

& cineribus condunt, de super ignem imponentes; sic præparatos comedunt. Saporis sunt haud contemnendi.

PIABUCU pisciculus sex digitos longus, sesquidigitum latus, ubi latissimus, ventre paululum extuberante, oculis elegantibus, pupilla crystallina, circulo argenteo, cui superius parum rubri admixtum. *Septem* habet pinnas, octavam pro cauda furcatâ: nimirum postbranchiales duas in infimo ventre, unam in medio dorso, circa anum unam longam extensam versus caudam; & è regione huius in dorso parvulam. Tegitur squamulis argenteis splendentibus. Per mediû laterum secundum longitudinem tendit linea alba lata, nō splendens. Dorsum autem ad hanc lineam olivacei est coloris, cui viridis hyacinthinus persplendet. Pinnæ albæ.

Capiuntur facillimè aciculis, vel corbe, aut olla immissa in aquam, cui parum farinæ de mandioca, aut mica panis intrita. Cocti comeduntur & frixi. Si quis vel leviter vulnerato uno aut altero membro, vel ulcusculum tenens aquam ingrediat, statim hic piscis vulnus petit mordendo, ita sitiens est sanguinis humani.

NHAQUUNDA: Mas & fœmina reperitur. Mas corpore est oblongo, ferè ubique æquali, septem, octo, aut decem digitos longus, duos altus, ubi altissimus: *Caput* & os ferè *Lucij* habet, superius labium extendere, & oris biatum rotundare potest: Dentiû loco habet limas, linguam tenuem, branchias amplas, oculos conspicuos, pupilla nigra, circulo fusco: septē pinnas, post quamlibet branchiam unam, duos ferè digitos longam; sub his in infimo ventre duas junctas, & post anum unam penè quadratâ. Ab initio ferè dorsi una propenditur penè ad caudæ exortum, tres digitos longa, unū ferme lata, æqualis, mollibus spinis suffulta, quæ in fine paulo latior, & in triangulum desinit. *Cauda* resta dura tegitur nigra. Totum corpus squamis mediocris magnitudinis vestitur, ac totum dorsum & late-

ra obscuri grysei sunt coloris cum argenteo transplendente. Venter albus. In utroque latere unum ordinē habet macularum, rotundarum, nigrarū, pisci magnitudine, & inter has dispersa pūctula multa cærulea. Pinnæ omnes aureæ, ut & cauda: & pinna dorsi insuper variegatur per totū punctulis cæruleis. In utroque latere per ordinem macularum nigra tendit linea, incipiens à fine superiore branchiarum, & ad regionem finis pinnæ dorsalis desinens, & semidigiti ferè interstitio sub huius fine, alia linea incipit, ac in medio exortus caudæ desinit. Lineæ hæ elatæ sunt ac aureæ.

Capitur in fluviis, ac boni est saporis.

Fœmina mari per omnia similis, excepto quod punctulis cæruleis in lateribus & pinna dorsali destituitur, & quod venter circa anum rubescit. Comeditur ut mas.

CAPUT XV.


De Amore Pixuma, Amore Tinga, Guara Tereba, Piracoaba & Cocoroco.

AMORE PIXUMA Brasiliensibus, TAB. vulgo corrupte *Amorea* piscis XXXV. magnitudine *Tamoata*, capite lato, o-
3. 4. 5. 6. re amplo, & edentulo, corpore oblongo, ita ut fere *Tamoatam* referat. Coloris est obscure ferrei; in ventre, qui extuberat, albi. Tegitur cute molli: pinnas habet septem & octavam pro cauda in ambitu circinatam. Carne est sicca & bona, ut *Tamoata*.


AMORE TINGA Brasiliensibus, piscis est eiusdem plane figuræ cum *Amore Guacu*, sed tantum minor: habetque squamas in totum albicantis, seu pallidi coloris, & in totum maculatur maculis fuscis, ut *Tajassica*. Cauda tamen illius est fusco undata. Edulis est ut præcedentes.

Guara Tereba. Piscis magnitudine septem aut octo digitorum: capite obtuso, oculis crystallinis, circulo au-


Piabucu.




Nhaquunda.




Guara Teroba.




Amore pixuma.




Piracoaba.



Corocoro.




Guatucupa.




8

Vritaco.




Guarera.



10

Camaripuguacu.



reo: os denticulos habet minimos: Branchias amplas: dorsum incurvatum, unde & *Corcovado* minor potest appellari. *Pinnas* obtinet septē: post quamlibet branchiam, unam longā: sub his duas junctas in infimo ventre: in medio autem ventre duas spinulas acutas, quæ membranula coniunguntur; & post has triangularem, quæ deinceps angustata ad exortum caudæ extēditur: in summitate dorsi triangularem mediocrem, & post illam aliam similem majorem, quæ angustata ad exordium caudæ porrigitur. *Cauda* in duo cornua extenditur. A branchiis linea tendit ad medium piscis, quæ dein oblique deorsum vergit, & directe usque ad caudam porrigitur: hæc posterior lineæ medietas hamulis posterius versis armatur, & utroque latere triangularibus vestitur squamulis, quæ minimæ sunt, ut ad tactum glaber videatur. Coloris est in dorso & lateribus usque ad medietatem longitudinis ex hyalino cærulescentis: reliquum laterum & venter albicat, sed aureus color transplendet. *Pinnæ* venteris albæ; reliquæ cum cauda aurei sunt coloris.

Edulis est piscis.

Piracoaba piscis pedalem longitudinem adipiscitur, corpore oblongo, ut *Zandæ* Pomeranorum. Os habet acuminatum, amplum, edentulum; mandibulam superiorem longiorem inferiore, & superior pars oris prominet in rotundum conum è cartilagine constantem: *Oculi* illi satis amplii, pupilla crySTALLINA, circulo aureo. *Pinnas* habet octo: nimirum duas in dorso triangulares erectas, interstitio sesquidigiti: post quamlibet branchiam unam longam, angustam; duas his breviores in infimo ventre junctas, & prope anum unam triangulatam; octava est cauda furcata. Sub qualibet pinna postbranchiali barbâ habet sex pilis crassiusculis constantem, tres digitos ferè longis, estque eius exortus prope exortum pinnarum, vergens retrorsum. Totus vestitur squamis mediocris magnitudinis argentei coloris, & in dorso ac summi-

tate capitis paulum cānescit. *Pinnæ* quoque omnes cani, seu cinerei sunt coloris: postbranchiales tamen nigredine dilutæ sunt. Barba albâ. Capitur arenosis locis in mari. Boni est saporis.

COROCORO piscis dorso incurvato, capite & ore obtuso: pedalis longitudinis. Denticulos habet parvos, haud acutos: branchias satis amplas, quarum anterior pars in spinam definit acutâ: sex pinnas: nimirum in quolibet latere post branchias unâ tres digitos longam, subtus in infimo corpore duas triangulares fere, sed in extremitate circinatas & antè firmas & acuta spina suffultas, post anum una crassa, dura & acuta spina nixam, cui parvula spina antistat. A summitate dorsi pinna incipit, quæ arcuatim ad medium dorsum tendit, firmis ac acutis spinis sustentata, hinc definit & contigua illi est mollis, quæ & arcuata fere est, & pene ad exortum caudæ protenditur. *Cauda* duos digitos longa, quatuor lata. *Squamis* majusculis vestitur totus argentei coloris, sed in toto dorso, & eius summitate diluta umbra mixtis & per latera transversim (non tamen ad ventrem usque) in quolibet octo striæ, digitum latum crassæ, ex diluta umbra descendunt: venter totus albus, ut & illius pinnæ. Pinna dorsalis, postbranchiales & cauda ex argenteo & diluta umbra mixtæ. Pinnam autem anteriorem dorsalem in rimam potest recondere. Capitur in mari, & est edulis.

CAPUT XVI.

De *Guatucusa*, *Vribaco*

& *Guarerva*.

GUATUCUSA Brasiliensibus, *Ba-* TAB.
labolla Congensibus, *Corvina* Lu- XXXV.
sitans. Piscis corpore oblongo, dorso 7.8.9.
paulum, ventre minimum curvo: lō- *Idem ibid.*
gitudinem duorum pedum non raro
adipiscitur. Os habet acuminatū, cuius inferior pars paulo longior superiore, quodque ample potest diducere; *dentes* minimos, linguam conspicuam, branchias amplas; *oculos* stufieri magnitudine, pupilla nigra, circulo

Bb 2 argen-

argenteo. Pinnae obtinet septē; post quamlibet branchiam unam oblongam; duas sub his in infimo ventre paululum versus posticam partē, unam post anum triangularem, unam triangularem ac latam in summitate dorsi, duriusculis spinis suffultam, & huic fere contiguam alterā in posteriore parte dorsi oblongam, quæ æqualis fere latitudinis, atq; ad exortū penē caudæ protenditur. *Cauda* constat pinna fere quadrata & lata. Parvulis rotundis squamis totus vestitur, coloris per totum argentei splendētis, cui tamen in dorso aureus transplendet, & ad tactum videtur lævis. Pinnae & Cauda ut & venter albicāt. A summitate autem branchiarū per medium latus ad caudæ exortum tendit linea argentei coloris. Capitur in mari, ac optimi est saporis.

URIBACOPISCIS dorso incurvato, ventre protuberante, quindecim aut sedecim digitos longus, quinque, aut sex altus, ubi altissimus. *Caput* & *os* obtusum, conum referens triangularē: dētes parvuli, acuti, lingua lata: brachiae amplæ in triangulum definientes: Oculi dupli stuferi magnitudine: pupilla crySTALLINA, circulo argenteo, cui aliquid cinnabarii mixtum est. *Pinnae* habet sex, nimirum post quamlibet branchiā, unam longam triangulum acutum referentem, sed exterius paulum circinatam: sub his in infimo ventre duas triangulares, anterior firma spina munitas: post anum unam oblongam, in exteriori ambitu circinatam, molliusculis spinis per medium suffultam, anterior autē dura & acuta spina: à summitate autem dorsi ad exortum fere caudæ pinna latiuscula, latitudinis fere ubique æqualis, & acutis spinis suffertata. *Cauda* itidem lata in duo veluti cornua distenditur. *Vestitur* squamis magnis, in totum argentei coloris, sed cui parum cinnabarii translucet. Pinnae laterales, & infimi ventris albæ seu argenteæ, dorsalis & cauda plus cinnabarii, quā argentei habent. A summitate deniq; branchiarū ad caudā usq; (paulum arcuatim) tendit linea rubra, & supra eam in posteriore parte corporis, in utroq; latere, maculā ha-

bet nigram magnitudine grossi mīnici. Capitur in mari. Edulem habet carnem & bonam.

Guarervu, piscis corpore lato, compressoq; quatuor digitos longo, tres lato, ubi latissimus, ore patulo, denticulis minutis. *Pinnae* habet sex, nimirū postbranchiales duas, parallelogrami figura; duas oblongas & latas in superiori dorso, & infimo ventre posteriori, quæ in acumen desinūt, figura subulæ. *Cauda* quadrata, seu potius parallelograma, unum digitum longa, & duas tertias partes digiti lata. Squamulis tegitur nigri coloris splendentis instar bombycini, quarū oræ (quarundā tātum, non omnium) fimbrias habent flavas instar semilunularum. Pinnae omnes nigræ. Circa os linea crassa est ferrei coloris, & alia illi perpendiculariter superposita. Corpus tres lineæ latē ambiunt, quarum duæ per latas & posticas pinnae extenduntur; (caudam etiam talis linea secat, & eiusdem coloris) una pro fimbria ipsi est. Oculorum pupilla nigra, circulus aureus.

CAPUT XVII.

De *Camaripuguacu*, *Piratipua*, *Curema*, *Parati*, & *Aramaca*.

Camaripuguacu piscis dorso recto, TAB. XXXV. ventre paululum extuberante; IO. pinguis ad tactum & revera. *Caput* habet Marcgravi anterius acuminatum, *os* amplū, H. Brasili. edentulum, quod in rotundum deducere potest, nimirum superiore 4. c. 18. mandibula, inferiori immota permanente, ita ut duos pugnos humanos iuxta se, vel etiam humanum caput possit admittere. *Linguam* habet conicā, crassā, superior autem mandibula brevior est inferiori, ita ut clausum os superius habeat: *Oculos* latiores Imperiales, rotundos, crySTALLINOS, & argenteos, branchias amplissimas. Longitudinem adipiscitur undecim aut duodecim pedum, crassitiem viri. *Pinnae* obtinet septem; duas haud procul distitas à branchijs, in lateribus proximè ventrem anteriorem, longas, triangulares; cuilibet autem harum parvula subest, quæ tamen

natan-

natando vix videri potest : in medio inferiore ventre itidem duas coniunctas, triangulares, latiores prioribus, sed breviores : has versus posticā partem corporis inferioris sequitur alia solitaria pīna, triangularis, lata, squamata, quæ appendice continua, angusta, protenditur ad caudæ ferè exortum : in dorſi altera medietate versus posteriora, pinna est elata triangularis, lata, quæ appendicē habet versus posticam partem vergentem, elevatam, triplo longiorem, instar funis crassioris. Septima pinna est pro cauda, quæ secta est, & in amplam extenditur furcā. Squamis vestitur magnis, obrotundis seu peltatis, maioribus Imperiali, in dorſo tamen minoribus materia squamarum alba, pellucida instar matris perlarum ; sunt autem arctè sibi impositæ squame, ita ut quadruplices aut quintuplices jaceant, ac de qualibet ante aliam prominet pars figura lunæ bisectæ, quæ argenteo obducta est (revera repræsentat argētum) & rivulos hinc inde discurrentes monstrat argenteos in argenteo campisita totus piscis argēto obductus videtur, præterquam in dorſo, ubi cæruleus est, argēto tamen translucente. Pinnæ omnes argenteæ, præter dorſalem, quæ eundem colorem habet cum dorſo. Carnem habet lentam, quæ diu coqui debet, multæ in carne spinæ, sed satis crassæ, ut faciliè inter edēdum extrahi possint. Magis aspectu quam esu piscis delector.

Comedi sapius eius carnem, sed lenta est, & tantū famelico conveniens. Os superius ossa habet duritie æqualia ossibus alicuius animalis.

Piratia Pua ingentē adipiscitur magnitudinem, ut *Capuripima*. Inferior mandibula paulo longior superiori: dentes acuti in tota mandibula inferiori, in superiori solum in medio, qui longiores, quemadmodum & mediū in inferiori : Os ampliare amplissimè potest in rotundum foramen. Oculos obtinet non ita longos pro corporis mole, pupilla crystallina. Branchias amplas, duras seu armatas. Corpore a. est oblongo, dorſo paulū incurvato versus caput, & ventre mediocriter amplo. Pinnas habet septem: Vnam a

summitate dorſi (incipientem versus capitis ferè exortum) ad caudæ usq; initium protensam, quoad medietatem anteriorem spinis suffultā, quoad posteriorem mollem sine spinis, in medio a. sui angustiore, antè la-tiorem, postè adhuc magis latam & quasi circinatam in extremitate. In quolibet latere post branchias, unam latam, & in extremitate circinatam, cætera quasi quadratam : sub his in infimo ventre duæ propinquæ sunt oblōgæ, haud latæ, firmis spinis nixæ: prope anum unam habet satis amplā, itidem circinata fimbria postè, utri ea quæ in dorſo. Corpus postè quadratè extenditur, & continet septimam pinnā pro cauda, quæ ampla est, & figuræ penè quadratæ. Squamulis vestitur parvulis, ita ut ad tactum glaber videatur, etiā si antrosum mulceatur. Coloris est per totū corpus ex obscuro aureo epatici, qui tamen obscurior in dorſo & summo capite huic a. colori per totum retis in modum cinerei coloris liturę obtenduntur. Pinnæ omnes eiusdem cum corpore coloris, laterales a. præterea fimbrias habent aureas, reliquæ epaticas. Carne satis probata est, si junior sit, nimirū sex, septē aut octo pondo & assatus magis quam coctus, nam pinguis est : adultior verò ducentorū aut plurium pōdo carnem habet probaiulis; nec delicatiorē carne *Camarupim* assu, nimirum lentā, tenacem, ac difficilis coctionis. Capitur in mari.

Curema species *Tainha* grādis & crassa. Piscis marinus, in duorum pedum longitudinē excreſcens, corpore oblongo, ferè cylindræo, more *Trutæ* fluviatilis, crasso & præpingui. Caput in conum obtusum desinit, superius compressum & latum, durum, squamis duris rectum. Os pro mole corporis parvum, parabolicū, labio superiori conspicuo, mobili, inferius a. os triangulare, obtusum discubir, & paulo brevius est superiori, edentulū. Oculi magni, rotundi, antè positi, nigri, circulo argēteo. Duo narium foramina supra os. Branchiæ semilunares, haud amplæ. Pinnas habet septem (octavā p. cauda, quæ in duo cornua desinit) nimirū duas postbranchiales, triangu-

latas duas, magis versus posteriora in infimo ventre, junctas: in summo dorso parvam, tribus suffultam duriusculis spinis: post anum unam bicornem, & illi oppositum in dorso eiusdem ferè magnitudinis. Tegitur squamis magnis clypeatis, planis: color totius piscis in summitate capitis, dorso & medietate laterū obscurè cinereus, cui hyalius transplendet: reliquum laterum, venter & caput inferius argentei splendentis coloris, uti & pinna ventris, reliquæ pinnae cum cauda eiusdè cum dorso coloris. Præpinguis est & coctus vel affatus sine oleo vel butyro comedi potest. Salit⁹ & in sole siccatus asservatur magna copia. Salitus quoque & in muria servatur. Optima illius pars venter.

TAB.
XXXVI.
1.2.

Parati Lusitanis Tainha, piscis est in longitudinè pedis excrefcens, figura corporis ut *Curema*, cui per omnia similis est excepta magnitudine, & q̃ circulum aureū habeat circa oculos. Carne est sicciore, & quæ inter coquendum pinguedinem flavam de se fundit. Magna copia saliti in sole exsiccantur & recoduntur. Capiuntur retibus, ut & *Curema*, transfiliunt a retia eleganti spectaculo, quando illud trahitur: quando malacia est magno numero ex aquis exsiliunt.

Aramaca Lusitanis Lingoda & vulgo *Cubricuncha*, soleæ est species cōpresso corpore, & figurā habens soleæ q̃ Belgæ vocant *Tonge*. Os denticulis acutis p̃ditum: caret lingua: Oculos habet duos in uno latere (ubi lapidei est coloris) in altero nullum, pisi magnitudine, unum p̃pelatus posterius oris, alterum superius & magis versus posteriora vergentem, pupilla lunata, crystallina, hyalino colore transplendente. Branchiæ satis amplæ, in quolibet a latere post brāchias est pinna una, duos digitos lōga, angusta, superius in pilum tenuē desinens; ad brāchiarum finē in infimo corpore sunt duæ parvæ pinnae junctæ. Per totum a. corpus tam superius, q̃ inferius secundum longitudinem habet piñam usq; ad caudā extensam, tenuem, vix semidigitum latam; cauda ferè quadrata cōstat pinna tenui. Vestit^r squamulis parvulis, & in toto sinistro late-

re, ubi oculos habet, lapidei est coloris, in latere dextro albi, vivit in mari inter arenas. Edulis est & boni saporis.



TITVLVS II.

De Piscibus Exoticis Lævibus.

CAPVT I.

De Piscibus in totum lævibus.

ARTICVLVS I.

De Guamaia cu Ape & Petimbuaba.

Pisces Exotici læves sunt in TAB. XXXVI. duplici differentia: Vel e- XXXVI. nim sunt in totum læves, vel 3.4. Marcgr. H. Brafil. l. 4. c. 1. eum aliqua lævitate spinosi. Existis sunt quos hic describemus.

GVAMAIA CV APE Piscis triangularis; duplex est, unus cornutus, alter sine cornibus. Cornutus ab ore ad initium caudæ septem digitos est longus, (interdum & longior) à ventre ad dorsi summitatem tres digitos latus seu altus: venter vix duos digitos latitudine complet: cauda unum digitum lata, desinens in pinnam duos digitos longam & totidem latam. Os ipsi parvulum, & pisi tantum capax: habens in superiori mandibula duodecim denticulos angustos, acutos, in inferiori quinque. Caput ab ore ad cornua usque in gibbum assurgit, convexitate sesquidigiti; dorsum autem ad eundem modum in gibbum arcuatur: & unicam tantum habet pinnam in postica parte versus caudam, & quidem exilem. Oculos habet satis amplos, diametro trientis, superne in capite in fronte positos prope cornua, ab ore circiter sesquidigiti intervallo: & ante singulos oculos foraminulum unū. Pinnas in universum obtinet quinque: unā in extremo dorso, ut jam dixi, & in quolibet latere unā, lōgè infra oculos versus posticam corpore-

Corporis partem paulum vergentes; unum digitum longus: & prope utraq; rimā, unam plus semidigito longam, branchiarum loco: unā denique pinnā inferius in ventris extremitate, prope exortum caudæ, unum pene digitum longam, dimidium latā: quinta facit caudā. *Cornua* duo directē ante se protensa in fronte gerit prope oculos, magnitudine calcario galligallinacii, duo itidem æqualis magnitudinis in infimo vētre versus quartam pinnam. Caret squamis, sed tegitur densa cute, in ventre quidē alba, reliquo a. corpore fusca, atque in ventre & lateribus usq; ad altitudinem oculorum figuris trigonis, tetragonis, pētagonis, sexagonisque mirē distincta & notata. Vbiq; a. (excepto infimo ventre) eadem cutis variis maculis nigricantibus est insignita. De altera specie superius egimus.

idem H. B.
lib. 4. c. 4.

Petimbuba piscis tres aut quatuor pedes longus: corpore instar Anguillæ. Os edentulum acuminatum, superiori mandibula breviori quam sit inferior: estque lōgitudo oris sesquidigiti, amplitudo, ubi maxima, vix unius. *Caput* novem digitos longum est ab oculis ad oris extremum, crassities eius post oculos quinque digitorum, hinc paulatim minuitur, ita ut prope os sit trium tantū digitorum. In summa a. longitudo capitis à fine branchiarum ad oris extremum est unius pedis & unius digiti. *Oculos* habet satis magnos, magnitudine nucis avellanæ & pene figura, pupilla splendida cærulescente, quā tunica ambit argentea, in parte anteriori & posteriori macula miniata notata. Post branchias in utroque latere, pinna directē protenditur à latere sesquidigitum lata & longa rufescentis coloris: hinc sex & semis digitorum intervallo versus posticam corporis partem, duæ pinnæ parvæ rufescunt in quolibet latere una, sed magis versus ventrem.

Posthas pedis intervallo sequitur pinna rufescens duos digitos longa, sesquidigitum lata: sub hac autem eiusdem magnitudinis & coloris una in infimo ventre: demum à fine harū intervallo fere quinque digitorum,

sunt adhuc duæ pinnæ rufescentes paulo minores superioribus, una sursum, altera deorsum elata, & inter has ortum sumit cauda instar murenæ tenuis, teres, sex digitos longa. Corporis a. longitudo à fine branchiarum ad caudæ initium est duorum pedum & trium digitorū. Cute est instar Anguillæ glabra, coloris in toto corpore & lateribus ab ore ad caudam, hepatici, in dorso triplici, in lateribus unica serie macularum cærulearum magnitudinis nummi Misnici ferē: hæc maculæ à medio corporis in lateribus ad caudā usq; in lineas coeunt: inter omnes a. maculas cæruleas ordine intercedunt maculæ virescentes. In inferiori corpore tam sub capite quā ventre albescit, & videtur aliqua rubedo inaspera. Corpus a. universum non exactē teres est, sed compressum & latiusculū, ventris n. latitudo prope secundum par pinnarum, ubi latissimus, duorum digitorū, crassities ibidem totius corporis sex digitorum. Hinc paulatim attenuatur, donec prope exortum caudæ sit sesquidigitum paulo plus aut minus crassum. Edulis est piscis. Potest Acus piscis vocari. Iconum quas supra dedimus, nulla cum hac convenit, nisi fortē Acus minor Bellonii.

ARTICVLVS II.

*De Nhambdia & Guape-
rua.*

NHAMBEDIA Brasiliensibus, *Bagre* TAB. do Rio Lusitanis, piscis corpore XXXVI. oblongo, obeso, ventre molli, versus s. 6. posteriora angustiori. *Capite* compresso, & ore parabolice figuræ, & denticulis minimis prædito. Est autem corpus duodecim aut quatuordecim digitos longum, duos & semis altum, ubi altissimum. *Oculi* parvuli, paululum protuberantes, rotundi, pupilla nigra, circulo ex auro & umbra mixto. Branchiæ satis, amplæ, & barba sex filis constans, duobus supra & quatuor infra os: Eorum quæ supra os versus latus stant

Marcgrav.
lib. 4. c. 5.


stant quodlibet crassitiem habet fili, quo literæ obsignantur, quinque digitos longum, & post cuiusque exortum fovea est oblonga, in quâ barbæ initium incumbit, vertèdo illam postica parte, ut semper facit: quatuor inferiorum quodlibet exterius duos & semis digitos longum, interius semidigitum; suntq; inferiora fila barbæ non ita crassæ ut superiora. *Pinnas* habet septem, & octava est p cauda: nimirum post quamlibet branchiam unam oblongam, firmissima & acuta spina munitam (quemadmodû & in exortu ipsius post branchiam os durum est, triangulare) ad medietatem corporis ante anum duas junctas oblongas, in extremitate circinatas: versus caudam in inferiore ventre unam ferè quadratam & in extremitate circinatham: in summitate dorsi magnam quadratam multis spinis suffultam & post illam unam longam angustam, cute carnosâ constantem, qua & corpus est tectû. *Cauda* bisecta est, & quælibet pars in exitu circinata. *Cute* tegitur non squamis.

Caput dura testa tectum, osque superius totum umbræ coloris: dorsum & latera cinerei cum pauxillo caruleo mixti: Venter albus: pinna dorsalis prior prope exortum eiusdem coloris, cætera in totum nigri, spinis cinereis: posterior eiusdem coloris cum dorso & lateribus: pinnæ postbranchiales totæ nigre: barba nigra, uti & pinna ventris & cauda, licet in exortu paululum ruffæ. A summitate branchiarum per quodlibet latus tendit in medio linea rubra usque ad caudæ initiû. Capitur in fluviis, & est optimi saporis, vulgoque comeditur.


Guaperua piscis cuius longitudo ab initio oris ad exortum caudæ paulo plus duorum digitorum (reperiuntur tamen & duplo maiores) corporis medii crassities, ubi maxima, trium laterum quodlibet unum digitum altum. Caret omnino brachiis: os habet fatis amplum & elatum, proiectum instar canis, minutissimis denticulis; loco linguæ lapidè habet instar Carpionis: ocellos vix grani milii magnitudine, colore egregii turcoidis. Inter ocellos in medio superioris labii,

seu in fronte corniculû gerit sursum erectum, & paulû retrorsum versum, & ante illud corniculum etiam filum tenue, & dimidium fermè digitû longû versus anteriora directè, ppensum paululum tamen elevatû, cui appendiculum adhæret ut in Liliis: filiû hoc retrò recôdere potest: nam post corniculû fovea est in vertice, hinc parva eminentia & iterum vallis, tunc ad uni⁹ digiti longitudinè pinna in dorso porrigitur quadrantem lata. *Cauda* pinnulâ habet plus semidigitum longam: à cauda interstitio aliquo versus anteriora circa ani regionem iterum pinnula est semidigitum longa & duæ parvulæ in inferiori corpore sub pectore. In medio a. ferè corpore, magis tamen versus anteriora, in quolibet latere brachium obtinet, desinens in pinnâ duas trientes digiti longam, & penè ita latam, pinna a. brachiorum octo constat spinis, quæ per pinnæ longitudinem disparguntur, & antèius prominent instar octo unguiculorum acutorum. Brachiû quodlibet unica constat junctura ac versus anteriora deflectit, ut ita naturæ piscis comòdius serviat. Caret in totum squamis, sed tegitur cute in ventre molli, reliquo corpore ad tactum aspera & scabra, ut in Tiburonibus. *Color* cutis est obscurè rubricans, cui fuscus admixtus, & per totum corpus maculas habet nigras, figura undarum. Pinnæ & brachia etiâ eiusdem sunt coloris cû fusco mixti. Sed pinnâ in dorso in quolibet latere quatuor habet maculas nigras maiores: cauda verò & omnes pinnæ minores eleganter variegatæ sunt. Ventriculû habet duos digitos longum, cum orificio tres digitos longo, & duos circiter amplo, q in ipsas fauces inseritur: Vnde ventriculû inflare instar utriculi potest. Caro eius non comeditur. Ad orbium classem pertinet. Vescitur squillis: natans egregie explicat pinnas & inflat se, ut instar orbis, seu pilei appareat rotundus. Habui alium totum colore differentem, duos & semis digitos longum qui totus erat coracini coloris splendentis, & se inflabat. *Cutis* horum piscium faciliè detrahi potest, & romento impleta servari.


Piratia Pua.




Aranaca.




Guamaiaçu apr.




Petimbubaba.




Guaperua.




Nhamdia




Curuata Prima.



Pirague.



Piscis innominatus.



Har der.

ARTICVLVS. III.

De Curvata Pinima, Puraq³
& Pisce innominato.

TAB. XXXVI. 7.8.9. *Maregrav. Hist. Bras. lib. 4. c. 5. & 6.*

CVRVATA PINIMA, *Lusitanis Bointo*. Piscis est *Cordovadi* magnitudine, vel etiam maior, corpore oblongo, satis tamen lato & crasso, amplis branchiis, oculis grandibus argenteis. Caret *squamis*, & tegitur solummodo cute præterquam in medio laterum: nam cuiuslibet lateris mediū à branchiis usq; ad caudam permeat lata linea aurei coloris; hinc à branchiis incipiēs alia parallelus superius ducitur ad duas partes totius longitudinis; hinc hæc parallela secatur oblique auream, & pergit parallelus usq; ad caudam: linea hæc parallela aureæ antè, & usque dum auream secatur, duplici squamularum serie minimarum insignitur, & tota est glabra, postica parte, ubi secatur auream, & infra itidem duplici serie squamarum notata, sed maiorum, & linea ipsa non est glabra, ut antè, sed aculeata quasi denticulus piscium. Color piscis in dorso & lateribus subvirescens, in ventre albus & splendens. *Pinnas* habet septē, nimirum postquamlibet branchiam unam oblongam: duas sub his versus posteriora iunctas in infimo corpore: unā in medio ventre, & huic oppositam unam in summo dorso, & adhuc in dorso unā magis versus anteriora. Ab ultima dorsali & ventris pinna continuā, haud lata, acuta utrobique; ab ita exordium caudæ: quæ furcata est. Capitur frequentius in mari, & boni est saporis.

PURAQUE, *Lusitanis Piexe viola*, ob figuram quam cum Cithara communem habent qua ludunt Lusitani. Piscis est latus, non crassus, cartilagineus. Longitudo eius ab initio capitis ad finem caudæ unius pedis, & novem digitorum. Ab initio seu acumine capitis ad octo digitorum intervallum versus posteriora, cordis latitudinem habet, uti pingi solet; latitudo eius, ubi maxima septem digitorum, excurritque ibi in latere in pin-

nas instar Rajæ, estque penè transparentes cum luci obvertitur. Caret branchiis. *Caput* in coniformam definit. Ab acumine capitis tres digitos & semis retrò numerando, occurrunt oculi unum digitum ab invicem distantes, rotundi, prominētes, mediocris avellanæ magnitudine; pupilla nigra, circulo aureo. Ad utrumque oculum versus posteriora habet fistulam, minimi digiti apicem capientē, per quam aquā evomere potest. Sub oculis, in inferiori tamen corporis parte, os habet, distans tantum ab initio capitis quantum oculi, sesquidigitum amplum, edentulum, & duo spiracula sesquidigitum post os versus posteriora: In quolibet latere quinque incisuras habet, ut Rajæ & Tiburonēs.

Post anteriorem illam cordiformem corporis partem reliquū corpus teres, aliquantulum tamen compressum, & ibi latū tres digitos, & in quolibet latere habet pinnā mollem, tres digitos longam, & sesquidigitum latam: hinc angustius fit corpus usq; ad caudæ pinnam, ubi digitum est crassum. *Caudæ* pinna ferme duos digitos longa, paulo plus uno lata, superius longior, q̃ inferius, ut in Tiburonib⁹. Inter duas a. illas pinnas secutidas laterales versus caudam in dorso, distantia duorum digitorum ab invicem adhuc duas pinnas erectas habet, ad tactum instar membranæ crassioris, triangulares, duos digitos longas, sesquidigitum latas. Tegitur cute molli, nullis squamis, ac in toto inferiori corpore in medietate anteriori est albus, in posteriori incarnati coloris cum albo mixti. In dorso, aut superiori corpore glutinis est colore, fuscis maculis variegato, insperaque egregia varietate puncta ex albo cærulescentia. Pinnæ quoque glutinis habent colorem, ac in lateribus aliquid rufescentis mixtum. Acumen capitis cartilaginis colorem obtinet, quæ etiam constat. Per totius dorfi longitudinem ad tactum spina dorsalis, quasi tuberculis minimis eminet. *Caput* illius recens lucet noctu. Caro eius non comeditur. Sed si comeda-

tur, afferunt piscatores, per tres horas semifatuos reddi homines, dein sponte adfere redire. Vnius attactus, crepitum articulorum manus, & brachii causat, qui tamen statim definit: & si in medio tangatur, artuum tremorem efficit.

Capitur mensibus pluviosis, quando tempestuosum est in Bibribi fluvio, longè ex terra adveniens, cum Raijs & Pastinacis.

PISCIS INNOMINATUS in septē digitorum longitudinem excrefcit; figura similis illi, quem vulgo *Harder* appellamus; pinnis tamen aliter firmatis: duæ enim quæ in infimo ventre anteriore sub branchiis sunt, magnæ & latæ, duæ post branchias in lateribus parvæ, in dorso duæ mediocres, & in inferiori ventre posteriori parva. *Cauda* constat pinna furcata. *Os* parvum, oculi magni. *Cutem* habet glabram, sine squamis: in dorso nigricantem, ac in utroq; latere quatuor nigricantes maculæ magnæ à dorso protenduntur, in ambitu suo violacei coloris: Inter maculas autem versus dorsum prominet thalassinus color: reliquum corpus argenteum. *Pinna* nigricantes cum violaceo mixtæ, & duæ illæ magnæ sub ventre quinque argenteis maculis singulæ insignitæ. Insignis coloris piscis, quando natans videtur. Viçtitat venenis illis Besaenen.

ARTICVLVS IV.

De *Mucu*, *Abacatuaia*, & *Acaramucu*.

TAB. XXXVII. **M**Vc v Brasiliensibus, piscis tereti corpore, ut *Enneophthalmus*, vulgo *Lampreta*, Germanis *Neunauge* / nec crassiori: circiter duos pedes fit longus, magis aut minus: Capitulum habet acuminatum, conicum; ocellos parvos nigros: os item parvulum: guttur inflare aliquo modo potest. Careret pinnis: per latera lineas obliquas nigras habet, angulos obliquos per medium laterum invicem facientes.

Edulis est & capitur in lacubus &


paludibus. Iconem eius Nobilissimus de Laët in America descriptione, sub nomine *Vbirre* dedit verum descriptio *Mucu* cum iconone non satis convenit, ideo non est mirum, quod diversum à *Mucu* esse sentiat.

Abacatuaia, Lusitanis *Peixegallo*, *Faber* & *Gallus marinus*. *Palleris* magnitudinem habet, altus & latus instar illius, subrotundus, neq; illo crassior: *Os* illi est haud amplum, edentulum; *Oculi* nigri, circulo argenteo. *Pinnas* habet quinque, unā in dorso, unā in ventre, utramque descendentem, & continuam ad caudam usque: itidem post branchias utrimq; unam: *Cauda* constat pinna furcata. Præterea habet duo quasi fila in longum extensa ab inferiore corpore, & unicū tale in dorso ante pinnam dorsalem. Careret squamis, sed tegitur cute levissima, splendente, coloris argentei; totusq; est illius coloris, exceptis filis illis, quæ nigra sunt. Carnem habet boni saporis. In descriptione America sub nomine *Avvab kattoe*, sive *Iavvke* datur. Icon superius data, non in totum convenit, ideo repetimus.

Acaramucu Piscis corpore est cōpres- Idem Hist. fo, nec crasso, verum oblongo, decem l. 4. c. 12. enim digitos longus est, quatuor latus, ubi latissimus. *Os* illi parvulum, angustum, rotundum, apicem minimi digiti admittens, ut piscis triangularis. Superius & inferius in anteriori parte oris utrimq; dentes triangulati acuti. *Oculi* stufieri magnitudine, crystallini, pupilla nigra. Distāt oculi ab ore, duos digitos & semis, plane in alto positi, tres quartas partes digiti à dorso sub utroque oculo, in quolibet latere, branchiarum loco fissurā habet oblique factam, unum digitū longam, trapezii figura. In dorli summitate directè supra oculos, instar fili maioris, seu crassioris cordæ violæ, corniculum habet oblique erectum versus posteriora, quatuor digitos longū & teres. In postica corporis parte inferius & superius utrimq; pinnam habet tenuem, tres digitos & semis longam, tres quadrantes digiti latā, quæ desinunt circa caudam, quæ parallelogrammi figura exoritur à corpore, habet

TAB.
XXXVII.
1. 2. 3.
Marcgrav.
H. Bras. l. 4
c. 16


2 Abacatuia.



Mucu.




Acaramucu.




Pinaru.

4




Pinaru.

5




Timucu.

6




Guebucv.

7



Niquy. Pietermn.

8



habetque pinnā sesquidigitum longam, paulo plus duobus latam. Caret squamis, sed regitur cute glabra, parum tantum hispida, ut Xiphie, coloris albicantis, cui cryseus est admixtus, & in dorso paulum fuscus; pinnæ quoque grysei coloris. Non est edulis: in ventriculo algæ seu musci marini multum inveniebam. Parieti apensus noctu clarissimè lucebat in tenebris.

ARTICVLVS V.

De *Punaru*, *Timucu*, &
Guebucu.

TAB.
XXXVII.
4. f. & c.
Marogr. H.
Brasil. L. 4.
c. 13.

PVNARV pisciculus est quatuor digitos longus, corpore oblongo, capite crassiusculo, & antèius obtuso. Os habet parvum, in maxilla inferiore duos solummodo denticulos, longos, acutos instar acicularum: oculos superius & in fronte positos, pupilla nigra, circello aureo: & supra hos duo rubra fila brevia, prominula; branchias amplas: utpote quæ una ei est è duabus conflata. Pinnas postbranchiales duas oblongas, & sub his duas plane angustas. Paulo post occiput incipit pinna, quæ ad caudam usque producit, spinulis prominulis suffulta. In medio infimo ventre incipit similis, ferè ad caudam usque pertingens. Cauda longiuscula, & parallelogramma. Tegitur cute fusca, & pinnæ sunt eiusdem coloris.

Reperitur hic & alia PVNARV species, figura corporis prioris similis, sed mandibulas habens rostratas, quasi è minimis denticulis compositas. A summitate capitis pinna latiuscula extenditur usque ad exortum caudæ, quæ mollioribus textitur spinis non prominulis. Postbranchiales habet ferè ut prior, ut & in ventre & cauda. Color ut prioris, sed variegatus est in lateribus lineis curvis obscurè purpureis. Vtraque species inter scopulos vivit, & intrat etiam testaceorum domicilia.

Idem H. B.
lib. I. c. 14. TIMVCV Lusitanis *Peixe agulha*, Piscis duos est pedes longus, corpore tereti instar Anguillæ. Rostrum habet osseum, tres vel quatuor digitos lon-

gum, acuminatum, utrobique dentibus minimis refertum: inferior rostri pars paulò longior superiori, & id quod prominet molle, non osseum; caret lingua. Oculos habet rotundos, crystallinos, circulo argenteo: sex pinnas, nimirum duas oblongas postbranchiales, duas junctas in infimo ventre ante anum parvas, post anum unam, quæ ferè ad exortum caudæ porrigitur, & similem huic oppositam in dorso. Cauda pinna quasi bifida constat. Caret squamis, sed regitur cute. Summitas capitis & rostri ac dorfi cum medietate laterum olivacei est coloris: inferior medietas cum ventre argentei. Per utrumque autem latus secundum longitudinem linea tendit virefcens, distinguens olivaceum ab argenteo. Pinnarum color respondet parti cui appositæ sunt.

Edulis est. Capitur in mari, & fluviiis salis. Boni est saporis, præsertim frixus butyro: Caro eius non est spinosa.

GVEBVCV Lusitanis *Bicuda*, piscis *Idem lib. I.* rostratus; oblongo & ferè tereti est c. 15.

corpore, ut *Dorada*: capite porcino, rostrato, cauda in duo cornua diducta ut *Albacara*, rostrum acutum, osseum, durum: partis superioris longitudo sedecim digitorum, inferioris decem. Crassities totius prope insertionem septem digitorum: utramque autem rostri partem movere potest. Branchias habet amplas: Os interius orbicularis figuræ, in medio sui hyperbolico foramine; lingua oblonga, alba, dentibus omnino caret. Oculos habet solidi magnitudine, pupilla crystallina, circulo argenteo. A rostri insertionem caput in altum assurgit, ut in *Dorada* mare: Est autem caput ab oculis ad occiput longum septem digitos, novem altum. Corporis longitudo ab occiput ad caudæ exortum quatuor pedum, & altitudo lateris post occiput unius pedis; in medio autem corporis decem digitorum, & prope caudam duorum. Cauda in duo cornua exteditur & ampliatur, quodlibet octodecim digitos longum, ad cuius exortum in quolibet latere dug

auriculæ membranaceæ. *Pinnæ* habet sex: proxime post quâlibet branchiam unam, directè à latere protensam, dura membrana constantem ut in *Tiberone*, figura trianguli acuti, undecim digitos longam, & in exortu, ubi latissima, duos tantum latam: è regione harum in infimo ventre duo bacilliformia corpora juncta habet, ex osse nigro constantia, dura, plane ut os *Sepiæ*, quodlibet novendecim digitos longum, utrumque junctum, in rima longa, profunda recondere potest, quæ à natura secundum longitudinem ventris facta est ad caudam usque. Interstitio duorum pedum à fine huius fissuræ seu ano, in infimo corpore pinnam habet triangulatam sex digitos longam, latere anteriori firma spina munita; etiam hanc in rimam quandam recondere & rursus surrigere potest: Octo digitorum interstitio ab hac pinna, parvam habet versus caudam, in acutum triangulum versus posticam partem desinentem; & è regione huius similem & æqualem in superiore corpore, has duorum digitorum intervallo sequitur cauda, quam supra descripsi. Maxima a. omnium est pinna dorsalis, incipiens à summitate occipitis, quæ prætenditur per dorsum in trium pedum longitudinē, constans membrana pergamini æmula, costis intertexta, hanc quoque totā demittere potest ac in profunda rima cōdere: lata est sesquipedē, ubi latissima, & versus posteriora paulū angustatur. *Cutecras*sa, subaspera vestitur, tota subfusca: spinulis oblongis, trientē digitis longis, ut ita solida sit & aspera, cum squamis careat. Venter & caput inferius albicant, latera cinerei & argentei coloris: dorsum ex cinereo argenteo obscurē fuscū, ut & caput superius & rostrū; reliqua rostrū cinere scit flavo. *Pinna* omnes cū cauda ex cinereo argenteo fuscescunt, ut & dorsalis, quæ præterea maculis orbicularibus, nummi misnici magnitudine est variegata, illa post anum paulū undulata maculis fuscis: Carnem copiosam habet, non spinosam, pingue, non glutinosam, ideo ad comedendum aptiorem, quam caro Mariorum. In ventriculo interiore


multos integros pisces pedales inveniebat author.

ARTICVLVS VI.

De Bagre aliquot Speciebus.

BAGRE piscis sex ponit author Species. TAB. XXXVIII. I. 2. 3. 4. 5. Marcgrav. H. Bras. l. 4. c. 16. *Prima* est oblongo corpore, initio dorsi paulum elevato, capite acuminato seu conico, quod dura testis est tectum ad initiū elevationis dorsi, pedalis longitudinis: Barbā habet sex cirrhis constantem, quorum quatuor inferiores sesquidigitū longi, duo superiores longitudinem totius piscis æquant, *Pinnas* obtinet septem, octavā pro cauda: nimirum duas postbranchiales loco inferiori positas, & ante quamlibet fortem aculeum, dentatū osseum, unā in summitate dorsi elevatā, & ante illam item aculeum fortem, equalis cum pinna longitudinis: duas junctas in medio ferè infimi ventris, magis tamen versus posteriora, unam membranaceā sine spinis versus caudam, & huic oppositā mediocrem mollibus spinis suffultam. *Cauda* constat pinna furcata, caret squamis, sed tegitur cute per totum argentei coloris splendentis. *Pinnæ* omnes argentei sunt coloris, ut & barba & caput. Per medium utriusque lateris tendit linea argentea ad caudā usque, constituta ex 77. protuberantiis. *Oculi* nigri satis amplios parvulum, edentulum, labiis elevatis. Piscis est edulis, si quis ab eo læsus fuerit, difficulter sanatur, & magnos patitur dolores.

Secunda corpore oblongo, capite compresso & plano, ore inferius parabolice figure, obtuso, edentulo. *Caput* octo digitos longū, testa dura pūctulata tectum. *Oculi* parvi, rotundi, crystallini, quatuor ferè digitos ab invicem distantes. Barbam habet sex cirrhis constantem, quorum exteriores longiores, quatuor digitorum, reliqui breviores: septem illi pinnæ, octava pro cauda: una nimirum in summitate dorsi, firma spina anteri⁹ munita, erecta, tres digitos longa, totidē lata: duæ postbranchiales, itidem firma spina munitæ, quatuor digitos longæ, duos latæ, Interstitiis sex & femis digitorum post branchiales





chiales in infimo ventre (qui paulum extuberat) duæ junctæ, tres digitos longæ, duos latae, in ambitu circinatæ: septem digitorum intervallo à dorsali, alia in extremo dorso, carnosæ, sesquidigitum longæ, unum lata, in extremitate mollibus spinis munita, & sub hac in infimo ventre alia paulo major cauda sequitur trium digitorum intervallo, in duo cornua diducta, crassa seu molli membrana constans duos & semis digitos longa, in quolibet cornu duos lata. Totum caput superius, & ad latera, dorsum totum & latera ad protuberantiam ventris usque, candidi cum diluto flavo & aureo mixti est coloris, in testa capitis etiã aliquid viridis transplendet: *Pinna* omnes & cauda gryseæ sunt: Venter & laterum inferior pars & caput inferius (quod planum est) albi coloris. caret squamis, sed vestitur cute. Bona satis est carne, melior quam Camarupi, cuius magnitudinem ferè æquat.

Tertia figura & magnitudine ut præcedens, sed barbam habet quatuor tantum cirrhis constātem, duobus nimirum longis octo digitos, & latiusculis instar ligulæ, duobus brevibus: ad pinnam dorsalem similis ligula novem digitos longa, & postbranchiales pinnae eodem modo: cætera similis præcedenti.

Quarta Belgis vulgo *Clipbagre* decem digitorum longitudinem habet; corpore oblongo: Capite lato & cōpresso: ore parabolico, edētulo. Barba constat sex cirrhis, quorum quatuor inferiores unum digitum, superiores duos longi. Oculos habet parvulos, cæruleoscentes, quatuor digitorum interstitio ab ore in summitate dorsii regitur testa dura ossea, & postbranchias in quolibet latere pyramidalis testa angusta regit latera. Pinnas habet septem, & octavā pro cauda: nimirum unam in summitate dorsii, elevatam, mollem, sesquidigitum altam, plus uno latam, antè spinam osseam crassā dupliciter ferratā, duos & semis digitos lata sustentatā. In medio ventre infimo duas parvas: in fine penè dorsii, carnosam, parvu-

lam, angustam, & è regione huius inferius aliam parvulis spinis suffultam; cauda diffusa in duo cornua sesquidigitum longa. Tegitur cute: ac in capite, initio dorsii & lateribus, ubi testaceus est, umbræ est coloris, per reliquum totum dorsum & latera umbræ dilutionis, & fuscis maculis mediocris magnitudinis variegatur: in ventre albicat. A testæ latiore fine ad caudam usque in quolibet latere, per lineam testam tendit ordo denticulorum acutorum, posterius versus, qui clypeo duro ferrato in medio insunt, nam anguli obrusi figura positi sunt usque ad caudam hoc modo 7.

Eduilis est, sed pauca carne, quæ non magni fit.

Quinta præcedenti similis, & maculis nummi mifnici magnitudine variegatus: Verum caret denticulis illis in lateribus: lineam solummodo habet: & duos cirrhos, & sex longiores quam alter. Hæc species habet carnem bonam & pinguisimam.

Sexta magnitudine & figura similis illi, quem secundo loco descripsimus: sed barbam habet tantum quatuor cirrhis constātem, duobus nimirum longis octo digitos & latiusculis instar liule, duobus admodum brevibus. Ad pinnam dorsalem similis ligula est novem digitos longa, & ad postbranchiales eodem modo; cætera per omnia similis illi, quem diximus; nam & ventrem ita protuberantem habet.

ARTICVLVS VII.

De Ajereba, labebirete, Niqui, & Guatacupu.

AIEREBA Brasiliensibus *Rajæ* species, piscis planus, circinatus, unum pedem & novem digitos longus, & totidem latus (reperiuntur & duplo maiores.) Quatuor digitorum interstitio ab anteriori circumferentia in superiori superficie duo foramina habet satis ampla, tres digitos ab invicem distantia, prope cau-

TAB.

XXXIIX.

6. 7.

Marcgrav.

H. Brasl.

4. 16.

dæ exortum orbicularis incifura est in quolibet latere: *caudateres*, quatuor pedes longa, & circiter in medio sui, duas osseas spinas crassas retro dentatas habet, quibus pungit, quando ad spiracula apprehenditur, caudam incurvatam supra corpus levando. *Os* inferius habet, haud amplum, edentulem, incifuræ quasi parabolicæ. *Cute* tegitur in superiori corpore ferrei coloris, & in medio dorso insignitur tuberculis nigris, parvis: inferius corpus totum album. Caro nihili æstimatur in cibis.

Iabebirete Raja species, ejusdem magnitudinis cum *Ajereba*, figura autē obtusi vomeris ad latera extuberantis: sectiones prope caudam ut in illa, & præterea duo corpora cylindracea digiti crassitie protuberantia. Cauda longa. Color piscis superius è cinereo fuscus, inferius albus, carne probata est & bona.

Reperitur hic & alia *Raja* species præcedenti similis; excepto quod processibus illis cylindraceis prope caudam destituitur. Color totius corporis superius umbræ, punctulatus per totum maculis nigris, seminis finapi magnitudine: *Cauda* aculeis caret. Carnem habet bonam.

Reperiuntur hic & *Raja*, quarum caudæ tres & semis pedes longæ, crassæ in initio tres digitos, & in fine plane acuminatæ, plenæ tuberculis nigricantis in totum coloris, flexiles ut scutica.

TAB. XXXVII. 8.
L. I. C. 17.

NIRU Belgis Pieterman: Piscis est capite crasso, ore ranæ amplo, edentulo, crassâ lingua, inferiore mādibula paulo longiori quam superior. Anterior corporis medietas est paulo latior, posterior angusta & teres: estque ut plurimum sex aut septem digitos longus, latus antèrius quidem sesquidigitum aut paulo latior: Ocelli ipsi parvi quidem, sed exserti, cylindracei more cancrorum terrestrium, pupilla nigra, circulo è cinereo fusco. Branchias habet amplas, & post quamlibet pinnam unam, digitorum longam & latam, in ambitu circinatam: in ventre sub his paulo inferius duas junctas: à medio

dorso pinna ad caudam pene continuatur, semidigitum lata, at in fine paulo angustior, cui respondet similis in infimo ventre: *Cauda* plus digitorum longa, minus lata, parallelogrami figura, in extremitate circinata. Ante exortum pinnæ dorsalis duos habet aculeos fortes, & supra postbranchialem utramque unum acutum. Tegitur cute, cujus color ex nigro & umbra, gryseoque mixtus, nimirum in toto dorso, capite & lateribus, pinnisque omnibus; Venter albicat, & in lateribus etiam plus albi, quam nigri aut grysei est. Per totum dorsum, caput & latera, puncta nigra, magnitudine seminis papaveris, dispersa.


In arena absconditus jacet prope littus Maris, ac incedentes vulnerat.

Edulis est, si jecur & fel bene separetur, aliis lethalis.


Guarapucu Lusitanis *Cavala*, Belgis **Roningsfisch** est corpore oblongo, ferè æqualis ubique crassitie, excepto versus posteriora, ubi magis magisq; attenuatur. Ut plurimum in septem pedum longitudinem excrescit, & crassitiem corporis humani. *Caput & os* habet acuminatum, dētes acutos, rotundos, ordine positos, oculos magnos crySTALLINOS, circulo argenteo: *Pinnas* octo, videlicet post quamlibet branchiam unam triāgularem, directè à latere protensam: unam tenuē angustam ferè in initio dorsi, post hāc unam in eodem dorso triangularem erectam; sub hac in infimo ventre triangularem; duas mediocres triangulares in infimo vētre subter postbranchiales. *Cauda* constat magna pinna in duo cornua amplè extensa. A pinnis autem triāgularibus, tam in dorso, quam infimo ventre, parvulæ ordine pinnulæ oblongæ sunt dispositæ usq; ad caudam. Vestitur cute argentei coloris, cui in ventre paulum cærulei, in dorso multum miscetur, ut color resplendeat. In quolibet latere linea subtilissimis squamulis conforta describitur ad caudam usque. Boni est saporis. Est quidem *Scomber*, sed quia Icon quā supra dedimus, non cōvenit, ideo & hāc adjicere placuit.

CAP.


Guarapoty.




Guacucua.




Guamaiacu Atinga.




Piraaca.




Cucuri.




Narinari.



Tiburoni.



Iperuiba & Piraquiba.



CAPUT II.

*De Piscibus non omnino
levis.*

ARTICULUS UNICUS.

*De Guacucuja, Guamajacu
guara, & Guamajacu
Attinga.*

GUACUCUIA, *Monoceros* piscis: *Vespertilio* Aquaticus posset appellari. Corporis figura antè est instar vomeris: Corpus octo digitos longum, quinque latum in medio, ubi latissimum: medietas autem corporis posterior rotunda est, & versùs caudæ pinnam fastigiatur in conum: medietas autè anterior vomeris seu lati cordis figuram obtinet. Piscis autem non crassus, sed latus; caput vix prominet seorsim à corpore, estque illi inter oculos supra os cornu impositum, durum, duos pene digitos longum, conicum. Oculos habet nummi mifnici magnitudine, pupilla crystallina lenticulari, reliqua pars variegata maculis, & lineis flavis albisque. Oris hiatus castaneam potest capere, ipsum edentulum est. Supra os carnea prominentia est instar tonsillæ humanæ ferè. In utroque latere in medio piscis, brachium eminet, quatuor digitos longum, una junctura constans, inferior medietas brachij duos digitos longa est, unum lata in infimo ventre inter brachia duas habet pinnae sesquidigitum longas, quæ quasi pedes sunt. Cauda constat pinna duos digitos longa, sesquidigitum lata, ac fere quadrata. In inferiore corpore, sesquidigiti interstitio à cauda etiam pinnulam habet parvam, & talem etiam in dorso, trium digitorum intervallo à cauda. Cutem tegitur, non squamis, quæ superius fusca est, multis tuberculis duris, per dorsum insignita versùs anticam partem, & utrumque latus. In utroque autem latere undecim nigras habet maculas lentis magnitu-

dine & figura, binas ac binas juxta se positas. Prope insertionem utriusque brachij etiam multas ejusmodi maculas nigras habet, & ibidem in quolibet latere foramen parvum in corpus.

In summa, in lateribus, circa oculos, in extremis branchiis, mirè variegatur punctulis albis, nigris, lineisque itidem albis & nigris, ut vix exprimi possit à pictore. In toto autem inferiori corpore egregij miniati est coloris, atque ibi cutis æqualis, verum ad tactum paulum hispida.

Guamajacu Guara, Lusitanis *Peixe* TAB. XXXIII. *porco* & *Diabe*: Orbis est species. Longitudo ejus ab initio oris ad pinnæ exortum in cauda quatuordecim digitorum: pinnæ caudæ longitudo plus duorum digitorum: Rotundo est corpore, & crassities ejus duorum & viginti digitorum. Caret squamis, tegitur cute, per totum corpus ex fusco ochræ coloris pallidi, in ventre albi. Totum corpus aculeis munitum est, qui in lateribus longiores, in reliquis partibus breviores (longiores autem sunt duorum digitorum) teretes, in extremitate valde acuti, & singuli tribus insertionibus, quasi triquetris cuti infixi. Inter aculeos cutis ubique maculis nigris scater, excepto ventre. Oculos habet magnos eminentes: Os parvum obrotundum, edentulum: pinnae tantum quatuor, duas in lateribus duos & semis digitos longas: unam in dorso versùs caudam ejusdem magnitudinis, & minorem sub ano.

Potest orbis muricatus Gesneri dici.

Habui inquit author, alium minorem vivum Mense Febr. anni 1639. item alios duos mense Septembri vivos. Cutis eorum erat è fusco virens, in ventre nigricans: aculei ut prioris, & planè similis figura corporis: prope quamlibet pinnam, maculâ habebant nigram, ut & utrimque ad latera prope os. Pinnarum color erat flavus: oculorum pupilla nigricans, circulo luteo. Supra utrumque oculorum cornu exile, satis longum, molle, cutacea substantia constans, quod

quod præ se fert natans, quando autem extra aquam est, flavescit. Inflare se potest & iterum considere. Sonum edit *Blech/Blech*. Si velis ut se inflat, trahe pinnam quæ in dorso est.

Idem l. d.
c. 14.

Guamaia *Attinga* Brasiliensibus, Marcgravio *Orbis muricatus* Ranæ rictu, septem digitorum longitudinem habebat, & corpus oblongum: os Ranæ simile, & loco dentium tam superius, quam inferius; os durum; oculos magnos, rotundos, protuberantes, pupilla crystallina circulo flavo: Branchiarum loco foramen in utroque latere digitum admittens, & pone hoc pinnam trapezii figura, unum digitum longam, duos latam: In extremitate dorsi versus caudam etiâ pinnam oblongam, haud amplam, & e regione huius similem in infimi ventris extremitate. Cauda constat pinna sesquidigitum longa, unum lata. Totum corpus tegitur cute spinosa, quæ in capite in duram testam abit. Spinæ illæ constant duris ossibus & acutis: in infimo tamen ventre caret spinis, sed mollis est instar Ranæ. Totum corpus & caput superius ex gryseo & fusco est maculatum: magis tamen suffecit, inferius totum ex albo flavescit, ut & spinæ totius corporis. Pinnæ omnes flavescent. Post utrâque pinnam postbranchialem maculam habet nigerrimam stufæri magnitudine, & supra hanc utrobique, paulum tamen magis versus anteriora aliam minorem nigerrimam. Ad utrumque latus exortus pinnæ dorsalis etiam similem habet, parvulas item sub oculis & ore. Vtris modo se inflare potest. Edulis est, & capitur in fluviis dulcibus.

CAPUT III.

De Narinari, Tiburone, & Iperuquiba,

TAB.
XXXIX.


NARINARI. Sunt aliquot illius species, hæc quam hic describimus, appellatur *Narinari pinima*:

Lusitanis *Raja*, Belgis *Puistseert* vel *Deicle*. Pastinaca marina. Corpus habet magnum, latum, fermè triangulare: constans ad utraque latera latissima pinna triangulari, carnosâ: & prope caudam habet duas pinnas, palmi magnitudine, subrotundas æqualis longitudinis: caput magnitudinem habet mediocris porci, crassum, compressum, in medio quasi fossam habens. Os triangulo subrotundum, compressum paulò & in promuscidem desinens: nam oris hiatus quinque distat digitos ab extremitate promuscidis versus ventrem: amplitudo oris duorû & semis digitorû; edentulum, sed loco dentium os habet lingue figura inferius in ore, quatuor digitos longum, sesquidigitum latum, ad fauces usque pertingens, & simile os superius, transversum positum, duos digitos longum & totidè latum. Inferius os constat e septendecim ossibus, albis, duris literæ U figurâ habentibus, quæ arctè per membranas coniunguntur, hisce alia septendecim subiacent, singula singulis, spongiosa ad aspectum, nec ita dura, superius os constat quatuordecim ossibus literæ J figura, quæ eodem modo per membranas sibi invicem agglutinantur, iisque etiam alia quatuordecim ossa superiacent: duo autem illa ossa per membranas annectuntur aliis ossibus capitis. *Cranij* cavitas sex circiter digitos longa est, vix duos lata, in qua cerebrum latet. Promuscis tantum constat cartilagine. *Oculos* habet parvos, nummi mifnici magnitudine: post oculos in quo liber latere spiraculum amplum, pomi vulgaris capax; intra hæc branchiarum folia recondita jacet: ad latera inferius a fine capitis in quolibet quinque oblongas incissuras. *Color* totius superius ferreus, maculis albis per totum inspersis, magnitudine nummi mifnici, inferius totum album. *Cutis* tota glabra lævisque. *Corporis* longitudo ab occipite ad exortum caudæ sesquipedalis, latitudo inter extremitates pinnarum triangularium, trium pedum, & decem digitorum.

Pinna-

Anthropomorphos.

Tab. XI.





Pracamo Brasil.

Pirametara.

3

4




Petim Luaba.

Tabac pype.




Sallema seu Salema.

Camaripugiacu.




Leo marinus.

8



Frater


Hugo.



Galerita.


See monch.

10



Synagris.

11





Pinnarum prope caudam longitududo septem digitorū, latitudo quatuor. *Capitis* longitududo decem, latitudo septem digitorum, crassities sesquipedis. *Caudæ* longitududo quatuor pedum & trium digitorum: crassities sesquipedis. *Caudæ* longitududo quatuor pedum & trium digitorum: crassities in exortu quinq. digitorum, quæ sensim gracilescit. Paulo post exortum caudæ superius parvam pinnam curtam habet, paulo plus digito longā, & mox post eam duos hamulos sibi invicem super erectos, piscatoriis hamulis similes & incurvatos, longitudine trium digitorum. Caro boni est saporis, sufficiens quadraginta hominibus saturandis.

TAB.
XXXIX.

Tiburoni species minor, Belgis een Crupshape, à figura. Convenit eum majore, excepto capite, quod triangulare habet seu prout cor vulgopingitur. *Oculi* parvi ad latera ipsius capitis. *Os* parvum, triangulare longe infra positum, triplici ordine dentium minorum, unde ita nocere non potest, os quippe habens angustum. Caro melius sapit, quàm majoris.

TAB.
XXXIX.

Iperuquiba, & *Pirauquiba*. Lusitanis *Piexe pogador* & *Piexe piolho*, nostratibus *Dupger*, quia Tiburoni adhæret fugens. Octodecim digitos longus, ferè teres, quatuor digitos crassus, ubi crassissimus, in postica parte attenuatur. *Os* habet triangulare, cuius pars superior brevior inferiori, etiā linguam. *Caput* superius ad dorsum usq. duos digitos longū, circiter planum & figuratum, ut palatum alicuius piscis strijs transversis, hac parte Tiburoni firmiter adheret in ventre, & capto illo simul capitur. *Oculi* parvi, flavi, pupilla nigra, semicirculo flavo. *Dentes* nulli, sed eorum loco multæ minutissimæ prominentiæ. Post branchias utrobique pinnā obtinet triangulatam, duos & semis digitos longam, subter in ventre duas junctas: à medietate corporis tam superius, quam inferius, etiam pinna extenditur angusta usque ad caudā, quæ pinna constat sesquidigitum longa. *Cute* tegitur per totum corpus cinerei coloris.



TITULUS III.

De aliquot aliis, & inter hos monstrosis piscibus.

CAPUT I.

De pisce ἀνθρώπομορφῳ & Remoranti.



Piscem ἀνθρώπομορφον, ita describit Kircherus. Capitur certis anni temporibus in mari Orientali Indiæ ad insulas Vissajas, quas insulas Pictorum vocant, sub Hispanorum dominio, piscis quidā ἀνθρώπομορφος, id est, humana prorsus figura, quam ideò *Peche muger* vocant, ab indigenis *Duyon*. Caput habet rotundum, nulla colli intercapedine trunco cōpactum. *Extremæ aurium fibræ*, quæ & *auriculæ* nominantur, ex cartilaginea carne eleganter vestita, quarū interior pars amplissimis formata anfractibus, veram hominis refert aurem; *Oculos* suis ornatos palpebris, situque & colore non piscis sed hominis iudicares; *nasō* non nihil aberrat: malam inter utramque non usquequaque eminet, sed levi tramite bipartitur; sub eo verò labra magnitudine specieiue nostris simillima. *Dentium* non quales insunt piscium generi ferratiliū, sed plenorum & candidissimorum continua series. *Pectus* alba cute contectum, hinc atque hinc paulò latius quàm pro corpore in *mammās* extuberans; neque eas ut *fœminis* pendiculas, sed qualis virginibus globosas, plenas lactis candidissimi. *Brachia* non longa sed lata ad natandum apta, nullis tamen ipsa *Cubitis*, *ulnis*, *manibus*, articulisve distincta. In administris soboli propagandæ membris, in utroque sexu nulla ab humanis distinctio: posthæc in piscem cauda desinit. Hactenus ingeniosissimus Kircherus. *Ossa* huius piscis insignem vim sanguinem fi-

TAB.
XXXX, I.
Kircher.
Artis Mognet. l. 3.
par. l. 6.
p. 675.

D d stendi

Nieremb.
H.N.II.
c.4.

stendi & attrahendi habent: visa, ita sanguinem currētem stringere, quasi vena ligetur. Efficaciora tamen foeminarum, & ex his quæ maculis ad nigrorem accedentibus distinguuntur. Alius quidā dicit, carnem carni hominis applicatam, ita omnes spiritus ad se attrahere, ut hominem veluti stupidum reddat. De *Remoranti pisce* apud Hugonem Linschotanus habemus. Historia talis est. Navis quædam Lusitanica per Morambiquem in Indiam decurrebat. Vento hæc adeò secundo & optato utebatur, ut vela omnia plenissima navem proferre felicissimè viderentur. Diebus ergò quatuordecim integris cursum versus Lineam æquinoctialem nautæ tenentes, & quotidie altitudinem metientes, tandem observarunt, gradus ad metam propositam, non minui aut pauciores fieri, verum quotidie multiplicari, seque ab æquinoctiali Linea quam longissime dispelli & arceri. Quæ res non saltē præter omnes naturæ causas esse videbatur, ad admirationem univerforum, verum etiam qui in navibus erant, certis se præstigiis & incantamentis agitari, liquidissimè rebantur, cum scirent, illius loci mare huius appulsus neutiquam causam esse, & vela secundis ventis interim nihilominus ex voto turgida procedere. Sese ergò anxie invicem contuentes, partem terrore, partim anxii vi & admiratione diu exercebatur; dum tandem, nescio quo casu, nautarum quidam, attentis & sollicitis in undam oculis despectans, latam & ingentem quandam caudam proræ intortam innexamque contuitus est, qua piscis quidam navem firmiter prehenderat, reliquumque corpus per navis longitudinem exporrexerat, adeò ut caput ipsius post puppim prominere. Hoc ille situ navis omnem molem ita violenter torquebat, ut illam contra violentissimum quoque resantis venti impetū vi & robore suo immenso retroageret, secumque tot diebus rapide proferret. Iam itaq; hoc pacto causa repulsus præcognita, ad actis sudibus

furcisque & organis, conferentibus cæteris, ad arcendum eum tamdiu studiosissimè laboratum est, donec tandem, cauda plicatili avulsa, navem ille destitueret, cum iam diebus quatuordecim integris illi agglutinatus adhæsisset, & violento renisu eandem, omni impetu ventoq; contrariis preto, natando secum abrupisset. In æternum itaque memoriæ signum historiam hanc Pro Rex in atrio suo depingi accuravit: quæ effigiem his meis oculis persæpe egomet cum magna admiratione usurpavi, & circumstantiis supradictis subnotatis diligentissime perlegi.

CAPUT II.

De pisce Goensi.

IDē Hugo narrat, ex flumine quodam Goæ, cujus ostium hyberno tempore pro loci more obstructum erat, piscatores quosdam monstruosū piscem extraxisse, cuius similem nec in India nec in aliis locis uspiā videre contingit: qui ob novitatem Archiepiscopo, ejus jussu à pictore ad vivum exprimebatur cujus Icon seu effigies Regi Hispaniarum postmodū transmissa est. Animal illud medio-cris magnitudinis erat, canem domesticum vulgarem altitudine haud excedens, cujus rostrum porcino simile protuberabat. Oculi ei parvi erant; nullæ aures, quarum loco duo saltem foramina habant. Pedes elephantinis (respectivè tamen) per omnia similes erāt. Cauda ad dorsum fines lata, sensim in acumē desinebat. Per atrij pavementum cursitans, suū porcorumve grunniebat ritu. A capite ad caudam universum corpus squamis, pollicis articulum prioris equantibus, constitutum erat tam solidis ac firmis, ut nec ferrum, nec æs plus resisterent. Grandibus & frequentibus, non secus ac incus quædam, à nobis plagis confusus, nihil aliud quam convolvebatur, & echini more caput caudamq; intro condebatur, ut globi exquisitam rotunditatē præ-

Nieremb.
H.N.II.
c.5.

præstaret: nemine interim junctura-
rum proportionem satis observante.
Conglobatus, nulla, vel vi, vel ma-
china divelli aut expediri poterat;
relictus tamen, sponte se iterum pan-
debat aut explicabat, & qua via pa-
tebat errabat.

CAPUT III.

*De pisce ludicro, Pusta, &
Michipillin.*

Nieremb.
H.N.l.ii.
c.13.

Illuvies menstrua, & ludicrus ge-
stus, unde nomen meruit, commē-
dant *Axotol*, h. est, lulum aquarum.
Genus quoddam est piscium lacu-
strium molli cute interctum, ac lacer-
tarum more quadrupes, dodrantis
longitudine pollicemq; crassum, etsi
interdum cubitum excedat. Vulvam
habet muliebri simillimam, ac venter
eius maculis fuscis distinguitur, cor-
pore medio ad caudam usque, nem-
pe prolixam & quæ juxta finem te-
nuissima sit, paulatim ac sensim graci-
lescit. Pro lingua est cartilago brevis
ac lata. Quaternis natat pedibus, in
totidem digitos, persimiles ranarum,
fissis. Caput depressum est, & reliqui
corporis proportionem magnum. His-
cens rictus, aterque color. Huic me-
strua singulis quibusque mensibus
fluere observatum sæpe sæpius est,
haud aliter ac mulieribus; tum vene-
rem abunde excitare, haud secus ac
scinci facere solent, quos terrestres
crocodilos quidam vocant, ad quorū
genus fortasse pertinet. Salubre ac
gratum præbent alimentum, nec dif-
simile anguillarum carni. Multis mo-
dis parari solent, frixi nempe, assi, eli-
xique. Verum ab Hispanis magna ex
parte ex aceto mulso, addito pipere,
caryophyllis, atque siliquaastro Indi-
co: à Mexicanis vero siliquestro solo,
seu intacto, seu integro, familiarissi-
mo illis ac prægrato condimento.
Pusta capiuntur in fluminibus Panu-
cinorum, minimi digiti vix æquan-
tes longitudinem atque crassitudi-
nem, sed ventre ranuncolorum in-

Nieremb.
H.N.l.ii.
c.14.

star paulo protuberantiore, quibus
simul eum miltomame permixtis &
admotis, subvenitur passis erisypela-
ta, brevitate & facilitate mirabili.
Michipillin seu ova piscium, dicitur
genus quoddam lacustre, album,
quod ex omni piscium in lacu degē-
tium Mexicano conflatur multitu-
dine, unde factum est illi nomen.
Statis anni temporibus eadem capi-
tur palude, haud aliter quam thyn-
ni, trichiæ, scombri, similesque pi-
sces, alij gregatim vagantes in Ocea-
no. Agmen pisciculorum esse credi-
tur, haud lendibus majorum. Me-
dio id procedit alveo, in neutrum lit-
tus inclinans, tã numerosū à multi-
tudine, ut quinque cubitorum inter-
vallum aut amplius occupet. Non
prætermittunt occasionem piscato-
res, sed diligenti observatione & cu-
ra vagantes pisciculos captant exci-
piuntve retibus, atque ita non me-
diocris solet sæpenumero fieri captu-
ra. Coquuntur iidem alienis fictili-
busve vasis, ferculisque ubi opus est,
adiiciunt, addito siliquaastro chillive:
quo apparatu neque modico neque
ingrato cibo constant, sed quo non
modo Indi, verum advenæ quoque
Hispani sæpenumero vesci gau-
deant.

Nieremb.
H.N.l.ii.
c.41.

CAPUT IV.

*De Ambiza & pisce
mulari,*

ADnectam quod Philippus Piga-
feta scribit de quodā pisce Zairi, *Nieremb.*
qui membra duo habet manus hu- *H.N.l.ii.*
manas referentia, & caudam clypei *c.55.*
& forma & magnitudine. Vocatur
hic ab incolis *Ambize angulo*, id est,
porcus aquatilis, propter pinguedinem
qua porcum refert. Caro, quæ ab in-
colis fumo induratur, & ad lautitias
reservatur, & gustu & odore est gra-
to. Aquam dulcem non relinquit.
Pabulum ejus est gramen, & omnis
generis herbæ in littore enatæ. Ore
bovem refert. Tantæ interdum &
Dd 2 magni-

magnitudinis, ut quingentas libras pondere elever. Capitur à piscatoribus non ut pisces, sed fere ut bos. Observato enim loco diligenter, ubi pasci solet, scaphis suis expectant, & advenientem contis aut remis occidunt: occisum ad aulam regiam deferunt; aliter enim capitali proposita pœna (ut & alios pisces, qui hinc Regij dicuntur, nempe trutas, & cacongo piscem singularem, salmonem figura referentem, sed colore diversum, caro enim ea est alba; & tam pinguem, ut prunis superimpositus eas extinguat) vendi non potest. Unde diligenter ne impunitas audaciores reddat, observantur piscatores ab Aulicis, & deprehensi absque ulla remissione plectuntur. De *pisce mulari* sic scribit Nierembergius.

Nieremb.
H.N.l.II.
c.62.

Sub Philippo II. visa in Oceano bellua duabus velificans alis, navis specie. Fregit unam bombardæictus. Irrupit per fretum Herculeum bellua furens, & horribilibus frendens mugitibus atq; illapsa per mediterraneas Hispaniæ oras, Valentiam appulit, ubi demum exanimata, centum & quinquaginta dodrantes prolixa, molis circuitus centum, vacuitas cerebri septem homines capiebat.

Eques in os consistere posset. Maxillæ servantur in Escuriali usque ad decem & septem pedes porrectæ, viginti armatæ dentibus duorum dodrantum, minimi unius. Genitalia immodica. Appellatum idcirco monstrum piscis mularis. Aliqui eruditi lamiam fuisse putarunt ob fauces & ingluviem. Duo cadavera in stomacho reperta. Creditum quoque aliquibus huius generis belluam devorasse Ionam Prophetam. Quis certo sciet?

CAPUT V.

De *Pisce tauriformi* & *Amilotl.*

Piscis tauriformis est Francisco Her-
mando pisculus vix duos palmos longus, sed pinna munitus caudæ instar, sed pæne prolixa digitos: corio intectus duro, fusco, sed circa ventrem candenti, & ubique pentagonis sex angulisve distinctos figuris. Os est minimum, sed longiusculis munitum dentibus: Oculi magni, pinnae circa aures binæ satis parvæ, quemadmodum & aliæ duæ, quarum altera circa extrema ventris est, altera verò juxta postremum dorsum; mirum est, in hoc pisciculo duas prominere juxta frontem spinas acuminatas, infractæ duritiei, instar corniculorum, ac totidem alias eadem magnitudine & forma circa ventris postrema. Vide an ad Boopa vel Acanthiam referri possit. *Amilotl.*
vero est piscis teres, lacustris, squamosus, candescens, maculis aspersus pullis, sesquidodrantem longitudine, & pollicem crassitudine excedit. Binas pinnas habet in dorso, totidem in ventre, utrimque unam, ac infra ventrem alteram. Caput est oblongum, rostrum acuminatum: sed inferna maxilla prominentior. Oculi sunt nigri, iris aurea. Aureum caput, venter luteus, adeoque reliquum pænè corpus. Victum eius sic commendat Franciscus Hermadus. Optimum & concoctum facile præbet alimentum; nam & ovis capitur magna ex parte onustus, adeoque gratum, ut cum gravem quamdam evasissimæ ægritudinem, mihi que nutrimenta omnia, à sanis hominibus & sagacioris palati vehementer expetita, sorderent displicerentque vehementius, hoc uno cibi genere suavissime usus sum, & ad vires instaurandas non mediocriter adjutus. Sed magnitudo ipsa adeo gratiam commendat, ut quo in majorem amplitudinē adoleverit, eo majori habeatur in precio, expetatur avidius, rarius inveniatur venalis, inventusque ematur carius.

Nieremb.

H.N.l.II.

c.24.

Nieremb.

H.N.l.II.

c.26.



HISTORIÆ NATVRALIS

De Piscibus,

LIBER V.

DE CETIS.

CAPUT I.

De Cetis in genere.



Eorum nomine sæpè tam apud Græcos † quàm Latinos ingentis molis pisces intelliguntur; hic pro illis duntaxat sumimus, qui pulmones, arteriam, collum & alia membra cum terrenis quadrupedibus communia habent, quibus omne propriè dictorum piscium genus destituitur. Specialius aliquando, seu pro Piñrice, seu pro Balæna sumi, apud Ciceronis Aratum, & Oppianum videbis. Integuntur corio, qui Macedonibus, dum è Mesambria Tocam navigarent, visus, corio squamoso, tam crasso ut cubitum æquaret, ostreisque patellis, & algis oppletus, pro monstroso habendus est. Lora ex eo fiunt, quibus maxima pondera per cochleas sublevantur, simili duritie & nervos esse, & chordas exiis ad bellica instrumenta confici, prodidit Ælianus. Pulmones habent, quod plus caloris, quia ingentis molis animalia, ut possint moveri, requirunt. Branchiis † ideò carent, sed fistulas (ora vocat Plinius, nares Ovidius, Cardanus oscula) accepere. Ductus hæc ab ima palati ad extimam parte duplex, septo distinctus, & nostrarum narium foraminibus ad palatum deductis, proportionem quodammodo respondens. Vnicum in extima parte lateræ C. figura foramen apparet, quod

carne pingui, tanquam operculo, tegitur. Respirationis gratia datas, vel exinde colligas, quod obturatis, citius moriantur, quod in Delphino Rondeletius observavit. Osippos subter habere, Aristoteles & Plinius reliquere, ut dum resupinantur, pisces quos captant, evadendi tempus habeant, in promptu habere, observavit Rondeletius. Resupinatos tamen cibum capere, tum ob dictam causam, tum propter longam & multum infra descendentem oris scissuram. Carent quidam *Dentibus* instructi quidam, serratis, planis, exerris, aliquando hominis similibus. Eboris instar candidos, ad opera firmos, anteriores latos, ne hæreret cibus, posteriores acutos, ut promptius divideretur, apud Cardanum legimus. *Mammæ* feminae habent; detractos aliquando ex una in Aquitanico litore duo lactis cados, Rondeletius prodidit. Audire certum, & nulla manifesti instrumenti vestigia, ut putat Aristoteles, Rondeletius tamen in Delphini cranio, meatum qui ad cerebrum usque excurrit invenit. Vehementer *pinguescunt*, quod piscium carne alantur, & moveantur tardissimè, quod tardo motu digerere posset, densitate corii præpeditur. *Internas partes* verbis Rondeletii describam. Sub peritoneo, inquit, partes quæ ad nutritionem & generationem conformatae sunt, ad quadrupedum terrestrium magis quam ad piscium partes accedunt. Nam *Epiploon* habent, sed minus pingue, quo ventriculus & intestina incallescunt, & foveantur. *Ventriculum*, magnum, cum ad justam magnitudinem accreverint: recens natis exiguus est, & geminus videtur. Eius fundo *pancreas* hæret, definit in *intestina*, quæ in multos gyros convolvuntur, eadem ferè ubiq; crassitudine, præterquam in extremis, quæ mediis paulo sunt latiora. *Mesenterium*, vertebrae annexum, glandulas nigras, venas, arteriasque intertextas habens. *Renes* venæ magnæ trunco, arteriæque magnæ per emulgentes annexuntur, sunt inter epas & testes sitæ. *Urina* per

Aristot. H. A. l. 9. c. 2.
& 4. de partib. c. 13

Cardan. variet. c. 37

Arist. H. A. l. 4. c. 8.

† Galen. 3. de Alim. facult. c. 21. & 37.

Ælian. H. A. l. 17. c. 6.

† Plin. H. N. l. 9. c. 7.

ureter in vesicam percolatur : quæ terrestrium animalium vesicis similis, sita est inferiore ventris parte. In iis qui utero adhuc gestantur, in urachum definit, per quem urinam deponit in allantoidem tunicam ad diem usque partus. Editi in lucem, per pudendum urinam veluti terrestria emittunt, & per musculum sphincterem retinent. *Vracho* arteriæ umbilicales adhærent, arteriæ magnæ inferioribus ramis insertæ. Utrinque sunt *testes* oblongi, quibus præparantia vasa præposita sunt, infiniti scilicet venarum arteriarumq; è magna vena ortarum ramuli, qui post varios & multiplices anfractus, in epidymia inferuntur. Cum enim magna sanguinis copia, multo semini generando necessaria sit, quæ longo vasorum ductu, ob spatii brevitatem transmutari & elaborari non potest, solerter admodum natura gyros illos vasorum constituit, ut illis, id quod longitudini deest, pensaretur, & quibus singuli meatus capreoli intorti dependent, & glandulosa corpora radici pudendi adnata desinunt; ex quibus meatu urinario, nervo cavo *genitale* constat humano simile, cuius extremum foris propendet, in glandem tenuem linguis avium similem desinens, quæ præputio non omnino integitur: intus replicatum latet, ad veneris usum exoritur. Venas suas, nervos, arterias, idem pudendum habet. Ossi innititur, quod ossi pubis proportionem respondet. *Thorax* costis veris ac mendosis, sternum, vertebra, musculus constat: cuius capacitatem *pulmones* magni complent, densiore substantia quam in terrestribus: crassitudine & colore hepar quadrupedum referunt, tum, ne aqua in rariorem substantiam penetrans, ejici non posset; tum ne in magnis expirationibus, quibus in aquis ferè semper coguntur, tenuior substantia ferè disrumperetur. Hi in duas partes divulsi sunt, parte inferiore adeo gracilescunt, ut membranam esse affirmes. Undique *Cor* complectuntur pericardio conclusum, in medio thora-

ce locatum, nulla in re porcorum cordi ab simile: duos sinus, totidem auriculas, denique omnia similia habet. Ad hæc, asperam arteriam, Oesophagum, musculos & quæcunque in terrestribus corporibus sunt, clavicula exempta, reperire est. *Caput*, cum vertebra articulat. *Cerebri* dispositio diversa. Nam in anterius & posterius divisum est, non in dextrum & sinistrum, ut in homine. *Nervorum* coniugationes ex eo nascuntur, plexus *χρσοειδής*, in eo rete mirabile, meninges duæ pro integumento. *Vulva* in feminis cervicem palmum unum longam habet: ea deinde in ramos duos distribuitur, veluti in quadrupedibus terrenis videre est, testes ad uteri cornua positi, pudendum inter umbilicum & podicem. De *Magnitudine* in singulis speciebus dicitur. *Locum* si spectes, in solo nec tamen omni mari (Pontus Euxinus nullos habet) reperiuntur. Semperque ferè in alto versantur. Circa solstitia maximè visuntur, quod tunc illic ruant turbines, tunc imbres, tunc delectæ montium jugis procellæ ab imo vertant maria, pulsataque ex profundo, belluas cum fluctibus volvant. Aliàs in fundo maris ferè degunt, molis suæ pondere. *Cibus* ipsis pisces, harengi in primis, quos quandoque tam avidè persequuntur, ut in littora vadosa impingant. *Generant* intra se, & catulos enituntur. Hi teneri sequuntur matrem, quod à nautis visum. *Motu*, ob corporis molem, & ventris ingluviem tardo feruntur. *Visus & auditus* ipsis hebetior. Hinc curiosæ omnium naturæ beneficio, pisciculis, si credere fas est, tanquam duce utuntur. Odore picis adeo delectantur, ut sese navi affricent. Strepitu terreri Arrianus in rebus Alexandri M. prodidit. *Vsum* in cibus, apud Ichthyophagos, prodente antiquitate invenere.

Præparationem vide apud
Aldrovandum.

CAPVT II.

De Cetis in specie.

ARTICVLVS I.

De Balena.

ET hæc de Cetis in genere sufficiant, in specie jam de iisdem agentur. Numerantur autem inter eos, *Balena*, *Balena vulgi*, *Physeter*, *Pristis*, *Orca*, *Delphinus*, *Phocæna*, *Scolopendra*, *vitulus marinus*, & *Manati Indorum*.

BALÆNA, Græcis *φαλæνα*, vel *αλæνα*, id est emittere, quod maris aquas per fistulas emittat, vel à *φαλος* quo vocabulo Græci meatum in galeis militaribus, cui plumas inferebant, indignant, vel à Chaldæo *בלע*, quod & devorare dicitur. Ingentis est magnitudo. Visa in Indico mari, quaternum iugerum, seu nongentorum sexaginta pedum longitudine. Centum & quinquaginta cubitos obtinebat, quem Nearchus eiectionem vidit. Describitur à Bellonio, Rondeletio, & Aldrovando. De suo scribit Bellonius, adipem eius velut oleum non concrefcere: pinnas habere utrinque unam & tertiam in dorso, qua totum corpus dirigit. Caudam lunatam, Corium nigrum, cui pinguedo pedis altitudine subit, laridum quadragesimale appellant. Lingua eidem aliquot librar. pondo. Ante oculos prætenturæ, seu tenues quædam asfulæ, quatuor ulnas longæ, ac sesquipedem latæ, longissimis villis præditæ, quibus iter prætentat. Ossa tam magna, ut postes ex iis fieri soleant. *Rondeletius* suæ parvam linguam, & quæ quatuor duntaxat vel quinque vasa fassamentaria adscribit. Alibi, penem se unius vidisse, qui à procero homine humeris deportatus terram contingeret, scribit. In eius quam *Gesnerus* describit ventriculo tria dolia crudo-

rum pisciculorum, inter quos salmo unius ulnæ longitudine, inventa sunt. Pelle nigro undique tegebatur, nisi quod maculæ duæ candidæ, utrinque supra medium oculi inciperent, & retro tenderent. Tota maxilla inferior erat candida, & pars quædam sub ventre. Plura apud *Gesnerum* vide. *Aldrovandus* prior colore erat subcæruleo, tota maculis nigricantibus conspersa, ventre candido. Altera, quam *Bufalinam* vocat tota nigricabat. Capta erat An. M. D. LXXVII. in Scaldi decem ab Antverpia miliaribus monstruosa, quam *Pareus* descripsit. Longitudo eius erat pedum octo & quinquaginta, altitudo sexdecim. Cauda quatuordecim pedes lata, ab oculo ad extremum rostrum intervallum sexdecim pedum, Maxilla inferior senum in singulis lateribus pedum erat, viginti quinque dentibus armata, qui totidem foraminibus in superiore dentibus omnino carente excavatis, recondi poterant. Tot dentium longissimus sex pollices non excedebat. *Locus* ipse procul à terra ubicunque degit. Plurimas *Schonfeld.* autem circa Islandiam, Gronlandiæ, in *Ichtyol.* & vicina Septentrioni loca, à *Biscainis*, *Anglis* *Hollandis*, circa æstivum in primis solstitium, quo tempore sinus recessusque maris pacatiores quærunt, capiuntur. In *Ta-probanæ* mari *Thunnis* insidiari, apud *Ælianum* legimus: in *Gaditano* Oceano non ante brumam conspici: statim temporibus in quodam sinu placido & capaci, mirè gaudentes sibi parere, condi, *Plinius* prodidit. *Victus* ipsis pisces, visus qui *Ælian. H. A. l. 16. c. 18.* quadraginta asellos devoraverat, eosque adhuc recentes, quos oculatus testis dissectos & sale conditos ad solem siccavit. Sunt qui comedere masticando negent: pisces deglutire integros, eosque minutos, quod interna gutturis membrana nil magnū ingredi sinat, dicunt. Quidam carne vesci negant, quod in capte visceribus præter mucum & spumam nihil reperiatur. Pisciculum *Lodel* venatoribus dictum, si copiosè voravit inobviatur quasi, & in furorem

TAB.
XLI.
TAB.
XLII.

Vossius de
Idol. l. 4.
c. 32.
Plin. H. N.
l. 9. c. 3.

Ælian. H.
A. l. 16. c. 18.

Plin. H. N.
l. 9. c. 6.
Schonfeld.
in Ichtyol.

rem acta, nec hominibus nec æqualibus suis parcat. De *Coitu partuque* (verba sunt Schonfeldii) venatores referunt, Balænas contracta societate & consuetudine in amorem mutuum, quem coniunctione, saltatione, aliisque affectuum coniugalium significationibus inter se testantur coire; hinc unà natæ semper, amicitiamque cæptam conservare, donec accensa ad libidinem femina, erecto ad perpendicularum & in caudam corpore, marem eodem positu obviam, pinnis suis, tanquam brachiis duobus amplectatur, mutuq; complexu per horæ dimidiam, vel integram utræque hæreant: Inde coniugium & conversationem ad mortem usque colere. Fæmellæ fœtum autumnō inter Octobrem & Ianuarium pariunt, unicum, tauro non minorem, imò maiorem pro matris quantitate, qui sub maternarum pinnarum præfidiis & tutela tutas, non

Philos-
tratus.
l. 2. de vita
Apollonii.

deferit parentes, nisi ablactatus. Philos-
tratus faucibus ab eis filios abscō-
di, si quando maiorem belluam fuge-
re contigerit, prodidit, quod & apud
obscurum de natura rerum autho-
rem invenies. Terræ defectu aquæ
affinis, aquâ ore recepta & ejaculata
fuccurrere, fide eiusdem dicitur.

Aristot. H.
A. l. 4. c. 10.
Oppian.
Halieut. l.
I. v. 404.
Ælian. H.
A. l. 9. c. 50.

Dormire edita per summa, fistula A-
ristoteles author est: stertentes audi-
ri, Plinius: in sicco exire ut à Solis
radiis calefant, Oppianus & Ælia-
nus. *Inimicitiam*, cum Delphino,
Thunnis & Orca gerit. A gladio
piscæ ut septem diximus vehemen-
ter timetur. Ziglerus castoreo aqua
diluto & in mare effuso adeo terre-
ri, ut totus grex dissipetur prodit.
De venatione & captura vide Schon-
feldium. *Vsus* adipis, in lucernis,
ad inungenda coria, currum rotas,
& alia. Cardanus viscera quia pin-
guia, & sapore & violæ quasi odo-
re commendari scribit. Galenus
eis mucosum saporem tribuit. Vi-
ginti balænarum genera apud Har-
tenium inveniuntur, ex quibus *Primum*
quot Ninting vocatur hominem fu-
git, & comestibile est. *Decimum*, quod
Fiscraake, haleces versus terram fu-

gat. *Vndecimum*, quod triginta ulna-
rum, ultra septuaginta dentes habet,
& eos tam magnos, ut inde tabulæ
ac manubria cultellorum fiant. *Duo-
decimum*, non habet pinnas in dor-
so. *Decimum quintum*, quod Rod-
kemling vocatur, subvertit naves,
& XL. est ulnarum. *Decimum sex-
tum*, quod Nahwal, antierius in su-
periore mandibula, dentem lon-
gitudinis septem ulnarum, adeo
exactè tortum in circuitu, ut huma-
no ingenio melius fieri non posset,
habet. *Decimum septimum*, quod Ske-
ling, octuaginta ulnarum, diversos
superciliorum supra oculos habet
ordines. *Decimum octavum*, quod
Nordhwal, nonaginta ulnarum, non
vivit nisi de pluvia & rore cœlesti,
quod fabulosum credo. *Vicesimum*,
quod Haffnegriffæ, magis insula ef-
se videtur quàm piscis. Fides sit pe-
nes authorem.

ARTICVLVS II.

De Balena vulgi, & Phy- setere.

Bellua hæc ut plurimum triginta
sex cubitos longa est, octo alta, ut
Rondeletius describit. *Oris* scissu-
ra ad duodeviginti pedes porrigi-
tur. *Dentes* in eo nulli, sed horum
loco in utraque maxilla, corneæ
sunt laminæ nigræ, sensim in pilos
suillis similes desinentes, quæ in an-
teriore & posteriore sive interiore
oris parte breviores sunt, in media
longiores. Ab interioribus *Lingua*
intus continetur & coercetur: in-
de abducta vel abscissa ita diffun-
ditur, ut in eundem locum iterum
recipi non possit. *Oculi*, quatuor ul-
narum spacio à se distant, foris parvi
apparent, intus capitis humani ma-
gnitudinem superat. *Pinnas* duas
maximas in lateribus habet, qui-
bus natat, & catulos in metu occul-
tat, in dorso nullam habet. *Cau-
da*, situ caudis Delphinarum similis
est, figura non multum ab similibus,
quam cum movet, ita mare agitat,
ut naviculas submergat. *Rostro*
est


Aldrov. de
Cetis c. 7.

Galen. l. 3.
Alim.
Schonfeld.
in Ichtyol.

Balæna .


Walfisch

Tab. XLI.




Balæna .

Walfisch .




Balæna .

Monstrosa .




Balæna


Ein ander art Walfisch .



Phocæna

Meer Schwein . Braunfisch .





ARTICULUS III.

De Puste & Orca.

est breui. *Fistula* caret. *Corio*, duro, nigro, integitur, sine pilis, cui lepades, & ostrea hærentia aliquando repertiuntur. *Interna partes*, veluti in Delphino. In ventriculo mucus, spuma, aqua, alga foetida, ambra inveniuntur, ut exinde Carnivorâ nō esse colligas. Vitulos vivos parit. Carnis nullus *in Cibus* vsus, sola lingua commendatur, sale condita. Viginti tria sæpe vasa eâ implentur. *Mosixmiv* Aristotelis esse, vel exinde colligitur, quod pro dentibus fetas, quibus intus os hirsutum est, habeat. Plinius musculum manuum benè dixit, sed pro duâ Balænâ malè posuit.

PHYSETER, qui & Physalus, *ῥυς* id est à flando dicitur, quod copiosiore aquarum eluviam præ cæteris efflare scribatur. Gesnerus eadem vel saltem affinem cum Pusti, qui *πυς*, *ῥυς*, & *πυς* dicitur, facit, quem vide. Diverſum esse à Physalo maris rubri, ex descriptione videre est. Magnitudine hic adulti Gobionis, sine ore, cum branchias tamen habeat, perniciem ei qui gustaverit creat. Intumescit enim, tandemque ventris profluvio vita finitur. De *Descriptione* inter authores non convenit. Plinius ingentisq; columnæ modo se attollere scribit. Solinus super antennas navium velis quondam diluvium eructare addit, quod Strabo commune cetis in mari extero circa Turdetaniam facit. Turnerus portentosa magnitudinis cetum facit, & singulos se eorum tantum aquæ è fistulis, quas in capitibus habent ejaculantes vidisse, ut singulis singulas naves aquarū copiâ in profundum submergerent, adjicit. Bellonius hoc solo à Balænis differre, quod nullas prætenturas habeat, neque tam vastâ corporis mole, figuraque sit magis tereti. Rondeletio est ore maximo, dentibus acutis, ferratis, linguâ carnosa & magnâ, fistula longè quam reliquis crassiore, pinguedine multa.



PUSTES à secādo, quod perniciosissimè TAB. natet, dictus est. Perperâ à Bello XLIII. nio capite vasto, rotundo, & cacabi Aldrov. de figuram exprimente describitur, quo Cetis c. 5. modo namque aquam velociter secaret? Rondeletio est rostro, valdè Bellon. de longo, osseo, utrinq; aculeato. Aculei Aquatilib. validi sunt, & Delphinorum dentibus l. 1. similes. Aloysius Cadamustus ferram aquaticam vocat, eaque in assamenta Aloysius secari ligna scribit. Clusius ipſius for- l. 6. Namæ ratione inter Galeos seu caniculas reponi debere affirmat: eumque Clusius ita ex pictura describit. Erat hic piscis, Exot. l. 6. inquit, corporis formâ & colore Galeorum generibus, aut Caniculæ Aristotelis valdè similis: nullis tamen maculis ut illa, conspersam cutim habens, perinde tamen rudem, & instar Zyganæ cutis asperam, fusci in dorso coloris, in ventre candicantis, & sex pinnas habet; in lateribus, medio videlicet panè corpore binas, &c. Caput in longum & angustum, planum & firmum rostrum porrigebatur, utrinque cum iis dentibus, sive offeis firmisque & rectis spinis, ex adverso sitis ferræ instar munitum, viginti vel etiam pluribus, &c. Binos oculos in prona capitis parte habebat, binas nares in supina, & infra illa oris scissurâ, ut Zyganæ ferè transversam. Reperitur plerumq; in Oceano occiduo.

ORCA Latinis à vasis olearii aut vinnarii similitudine dicitur. Quodnam Aldrov. c. 6. apud Græcos habeat nomen, vix cōpertum, nisi vocabulo Orygis apud Strabonem, què in mari extero circa Turdetaniam ponit, veniat. Bellonius ocrynū Oppiani esse credit, sed perperam. Thunni enim hic genus maximum. Delphino est corpore toto vigesies crassior, potissimum circa ventrem: Toto tergore atra, ventre ex albo roseo, ad latera ferè cærulea. Rostrum habet simum, surſus reparandum; cuius labri inferioris tanta est crassitudo, ut à superiore, se jungatur

Ee dum

dum piscis pronus est, quadraginta triculenti in eo dentes, quorum anteriores obtusi & graciles, posteriores acuti & crassi sunt. *Oculi* eidem sunt parvi, *pinnæ* pro corporis magnitudine pusillæ. *Cutis* glabra & politissima. *Cauda* lunata, & ulnam distenta excedens. *Pudendum* mari in medio ventre abstrusum, duor. pedū longitudinem excedens; in fœmina ano vicinum est, ad quod utrinque duorum digitorum intervallo, quædam foramina visuntur, in quibus mammarū papillæ delitescunt. Sæpe octingentas, aliquando & mille libras excedunt. *Lienem* unico orbiculari globo in placentæ formam effectum habet. Plurimum aquæ per fistulas ejaculari, Plinius auctor est. *Orca*, inquit, in portu Ostiensi visa est oppugnata à Claudio Principe. Venerat tunc exadificante eo portum, invitata naufragiis tergorum è Gallia advektorum, satiansque se per complures dies, alveum in vado sulcaverat, accumulata fluctibus in tantum, ut circumagi nullo modo posset, & dum saginam persequitur, in litus fluctibus propulsa, eminente dorso, multum super aquas, carinæ vice inversæ. Prætendi jussit Caesar plagas multiplices inter ora portus, profectusque ipse cum prætorianis cohortibus, populo Romano spectaculum præbuit, lanceas congerente milite, è navigiis assultantib. quorum unum mergi vidimus reflatu belluæ oppositum unda. De earum & Balæna pugna ita quoque Plinius. Balæna & in nostra maria penetrant. In Gaditano Oceano non ante brumam eas conspici tradunt. Condi autem ætatis temporibus in quodam sinu placido & capaci mirè gaudentes ibi parere. Hoc scire orcas, infestam his belluam, & cujus imago nulla repræsentatione exprimi possit alia, quam carnis immensæ dentibus truculentæ. Irrumpunt er. ò in secreta, & vitulos earum & fœtas vel etiamnum gravidas lancinant morfu, incussæque ceu Liburnicarum rostris fodiunt. Illæ ad flexum immobiles, ad repugnandum inertes, & pondere suo oneratæ, tunc quidem & utero graves, pariendive pænis inva-

lidæ, solum auxilium novere in altum profugere, seseque opponere, & cautium angustiiis trucidare, in vada urgere, saxis allidere. Spectantur illa prælia ceu mari ipso sibi irato, nullis in sinu ventis, fluctibus verò ad anhelitus ictusque, quantos nulli turbines volunt.

Hucusque Plinius.

ARTICVLVS IV.

De Delphino.

Piscis quem Latini Delphinum vocant, is Græcis *δελφίς* & *δελφιν* & si XLIV. minutus *δελφινισκός*, plerisque Euro- Aldrov. de pæ nationibus, Porcus marinus dicitur. Ex Cetis esse, quod branchiis careat, pulmonemque & arteriam habeat, Aristoteles reliquit. Repando dorso incurvum esse plerisque proditum, unde incurvè cervicum pecus Pacuvius vocavit, seu quod talis oculis nostris, dum abundis exiliens in mare præceps fertur, propter celeritatem motus appareat; seu quod, quia branchiis destituitur, revera corpus, cum se vibrat, incurvet, ut promptior in gurgitem pronus feratur.


Rostrum ei est simum, unde Simo- Plin. H. N. nis nomine gaudere Plinius scribit. *Linguam* mobilem, brevem, latam, carnosam, exertam in ambitu ferratam, suillæ non absimilem. *Dentes* parvos, acutos, pectinatim coeuntes. *Oculos* magnos, sed cute adeo reectos, ut pupilla solum appareat, non longe ab oris scissura, quin in eadem prope modum linea sitos. De *Fistula* situ non convenit inter auctores. In dorso esse scribunt Aristoteles & Plinius, ante cerebrum Rondeletius, cuius verior sententia, inter oculos Bello-nius. In dorso esse creditum veteribus, quod magis ad posteriorem partem quam in balæna spectet. *Pinnæ* duabus validis natat, quæ veluti hominis brachia cum omoplatis articulis junguntur. Earū muscoli quatuor robusti dorfi pectoriq; annectuntur. Hæ in v ètre sunt, ita sitæ, ut nō solum nata-

Vtilis Piscis formam ad instar Piscis habens.




Delphinus prior.

Delphin



Delphinus alter.


Delphin.



Antiq.
Metal.



Antiq

Nat.




Delphinus
Delphin

famina
Wäblein.



Delphinus alius.

Ein ander art Delphin.



natatum, sed & motum, quo sursum se effert respirandi causa, adinvenit. In dorso quæ est, aculeatam Plinius, & Pausanias faciunt, propter duritiam sine dubio. Nam rigidam satis esse Rondeletius testatur, quæ quæ in cauda, ex ejusdem lateribus, altera dextram, altera sinistram partem versus, ita ut cauda, quæ lunata, aquam latitudine sua verberet. *Sextum* si attendas, pudendi in *femina* orificiû, ano vicinum est ad terrestria animalia accedens, binas eadem, si Plinium sequimur in ima alvò papillas tantum gerunt, nec evidentes, & paulò in obliquum porrectas. Aristoteles mammas propè genitale continere ait, papillas quadrupedum more conspicuas habere negat, sed velut alveolos quosdam humoris duos esse scribit, utroque de latere singularem, è quibus lac fluit, quod ore catulorum parentem sectantium excipitur. *Vulva* cervicem palmum unum longam habet, quæ deinde in ramos duos veluti in quadrupedibus terrenis videre est, distribuitur. Testes ad uteri cornua, pudendum inter umbilicum & podicem gerit. *Mari* foramen quoddam in medio ventre apparet, è quo pudendû quadrupedibus simile exit, quod in congressu erigitur, & extra eminens profertur. Ideò fortè Aristoteles genitale foris esse dixit, testes intus, qui secundum Plinium prolongi, ad alvum necti. *Felle* omninò caret. *Locum* si spectes, nullum ferè sine Delphinis mare; adeò ut & in Ponto, quem nulla piscibus inimica belluâ ingreditur, reperiantur, & in Adriatico quamvis raro capiantur, sed & aquas dulces subit, & Nilum ipsum, ibique piscibus aliquandiu pascitur. Illos tamén non esse, quos Solinus serratas cristas habere. Crocodicolos studii ad natandum elicere, demersosque astu fraudulento tenera ventrium subternantes secare & interimere, scribit, facile mihi persuaderi pator, quod Marcellinus non Delphinos, sed Delphinis similes vocat. Accipit à Græcis qui circa Propontidem salitant Bellonius, eosdem instar alio-

rum piscium migrare, è mari mediterraneo videlicet Septentrionem versus, Hellespontum & Propontidem emetiri, Euxinum ingressos certo tempore immorari, tum denuò loca prius relicta repetere. *Cibus* Delphino pisces, in quos crudeliter grafatur, habetque Cæpphos aves comites, quæ ab eo occisorum sanguine pascuntur, ut Oppianus scribit. *Vita* satis lōga, ad tricenos sæpe annos producit, fortè quod felle careat. *Cotus* humano similis, illeque paulò quam piscium qui attritu ventrium coeunt, diuturnior. Aristoteles tamen ceteror. more congregi scribit. Gestat utero * decem mensibus, & singulos uno partu, interdum & binos edit. Parere ætate, nec ullo alio in vulgatis Plinii codicibus legimus.

Rondeletius foetum verè aliquando extraxit, alterâ foeminâ Octobri dissectuit, inque eius utero tum demum formari cceptû foetum invenit. Chorion amnio & allantoido tunicis, is in utero involvitur, sanguine per venas umbilicales nutritur, & spiritum per easdem arterias recipit. Proles celeriter adest, quippe quæ annis decem ad summam magnitudinē perveniat, ut tradit Aristoteles. Pro voce ipsis gemitus est humano similis, ut Plinius prodidit. Rondeletius stridorem edere scripsit, vocisque non nihil. *Visum* habent acutissimum, ita ut piscem etiam sub lapide vel in caver-

Aristot.
H.A. l. 5.

c. 5.

* *Aristot.*
H.A. l. 6.

c. 13.

Aristot.
H.A. l. 9.

c. 48.

Plin. H. N. l.

Ælian. H. A. l. 12. c. 12.

Plin. H. N. l. 9. c. 8.

Aristoteles extra aquam mutientem & anhelantem cæteror. spirantium morere reliquit, & Gesnerus Arimini captum tres dies in terra vixisse scripsit, & Rondeletius vivos à Monspelienlib. Lugdunum usque deportari affirmat. Gregatim ex ætatum ratione dispositi natant. Parvuli præcedunt, adultiores sequuntur. Hoc singulari in prolem amore fit, quo etiam motus tenellos in fauces recipere, ut Solinus dicit, vel saltem eos in faucibus aliquando gestare, quod Oppiano & Gesnero visum, solet. De ipso-

Plutarch. l. utra animalia. rum somno ita Plutarchus. *Delphinus dormiens de summo per altum demittitur, tantisper dum in vadum impingat, solumque sentiat: Hic excusso somno ronchoque edito ad summum rursus meat, rursusque demittitur, ac pronus fertur, imo quodam mirabiliter composito quietem captans. Ingenium singulare respicit, quod parentes senio confectos alant, sui que corporis nisu natatum eorumdè promoveant, totam nationem tanto amore prosequantur, ut sæpe aliquem * ex se captum ad portum usque comitentur, mortuum verò quasi ad sepeliendum efferant; quod Hesiodi à latronibus interfecti in mare projectum cadaver, * ad Rhium & Molycriam deportasse legantur, quod navib. in qua aliquis ex delphinidibus, coorta tempestate, quasi in ultionem perniciem struant, quod à Græcis, Italibus, Veneris in primis nautis creditur; quod Serapidem & Dyonisium, iussu Pro-*

** Aristot. H. A. l. 9. c. 47.*

** Plutarch. in Sympos.*

Plutarch. l. utra animalia.

** Plin. H. N. l. 8. c. 35.*

mæi Soteris revehentibus, & supra Maleam abreptis, ducem se ad stationem præbuerint; quod Simonis nomine miro modo gaudeat, ut post Plinius, Gillius cū ad Antipolin provinciae Narbonensis urbem navigaret expertus scribit; quod captus miserationem gemitu moveat, ut auritus testis Gillius prodidit, quod denique cantu & Musicâ, unde illa de Arione in mare injecto & à Delphino liberato, seu fabula, seu Historia, oblectetur. Tempestates lasciviendo præfagire * nautæ, Bellonio refragante affirmant, & à nobis cū ex Anglia Scotiam aliquando peteremus observatum est; seu quod aëris mutationibus

non aliter ac ægri afficiantur; seu quod procellâ exsurgente, confurgentes ab imo maris exhalationes, calorem in Delphinis excitent, quem ut temporent, crebrius erumpunt. Piscatoribus Euboicis in piscatione subsidio esse, authoribus proditum est: Verum rectissime Bellonius, non suo pte ingenio sed fortitudo id facere, observavit. Si enim in Celerinorum aut Sardiniarum greges inciderint, capitibus absumptis, truncos capientibus relinquunt. Pisces verò irruentis Delphini impetu consternati, postquam in aërem exiliissent, tam denso interdum in mare agmine relabuntur, ut pluviam repræsentent. Quæ de Delphinorum in pueros amoribus dicuntur, apud Gellium & Ælium invenies. *Inimicitias cum Balæna, ut apud Philen legimus, Pompilo, & Amis gerit. Expliculis, Pediculum parasitum habet, de quo ita Aristoteles. Maris quod à Cyrena in Ægyptum panditur, piscis Pediculus nomine circa Delphinum est, qui omnium pinguis- simus sit pabuli copiâ, quæ Delphini operâ suppeditatur. Usus ejus quibusdam gentibus in Cibis, & quidē tantus, ut in mensas Principum veniat. Maximè tamen hepar & lingua commendantur. Illud tenerum, sed mali succi. Hæc, tenerior pinguior & hepatici præferenda. Cardanus viscera non solum sapore sed & odore quasi violæ commendari scribit. De Usu in Medicina pauca occurrunt. Kiranides ventrem siccū & tritū spleneticis prodesse, jecur assium & in cibo sumptum, tertianam & quartanam integre sanare scribit. Plinius febrium circuitus tolli ait, si ante accessiones degustatum fuerit. Dentium cum melle Cinis infantium gingivis dentitionibusque confert. Alligatus, pavores repentinos tollit.*

ARTICULUS V.

De Phocæna & Scolopendra Cetacea.

PHOCÆNA Delphini species est. Rondel. deletius quidē diversum à Turfione facit; sed Gaza, motus sine dubio


Gell. Noct. Atticar. l. 7. c. 8. Ælian. H. A. l. 6. c. 15. l. 8. c. 13. & l. 2. c. 6. Aristot. H. A. l. 5. c. 31.

Plin. H. N. l. 32. c. 10.

TAB. XLI.


Caput Delphini.

Delphinus Kopf.



Gadus pycis Serice

Der Kopf des Schwerfisch



Scolopendra cetacea.





Phoca sine

Vitulus marinus.

Vitulus

Seehundt.



Seehund.

Rosmarus.


Wallrofs.



Rosmarus.

Vetus.

Ein Alt Meer Ros.



Rosmarus luscus.

Ein Jung Meer Ros.

Plin. H. N. l. 9. c. 9. bio Plinii verbis, qui Turfiones Delphinorum similitudinem habere scripsit, Phocænā Turfionē vertit, & pro iisdem, Scaliger, Bellonius, Gesnerus, Jovius & alii agnoscunt. Differt tamen & ab eo qui Athenæo *Θυρσόδον* dicitur, & à *Platanista*, quem Plinius in Gange Indiæ rostro & cauda Delphini, magnitudine verò quinque cubitorum, facit. *Descriptionem* si attendas, ita de iis Plinius. *Delphinorum similitudinem habent, qui vocantur Turfiones. Distant & tristitiā quidem aspectus: abest enim illa lascivia: maxime tamen rostris. Canicularum maleficientia assimilati.*

Cardan. in variis. Nobis ex Bellonio & Cardano, ista placet. Phocæna Delphini est magnitudine, brevior tamen crassioreque corpore. Captus aliquando in Neustria, qui mille libras pendebat, adeò pinguis ut teres videretur. Caput habet obtusum, *Rostrum* tam finum ut cum capite ferè rotundetur; *Meatus auditorios* admodum obscuros si reperire volueris, ab oculi majore cantho, sex digitor. intervallo caudam versus accuratè disquirere, illucque grandem culmum inferere oportebit. *Pinna* eidem solidæ ac nigræ. Tergoris color ex cæruleo in obcurum livens, *Cauda* lunata. Cardanus eum qui Diepæ in Neustria captus erat, *fistulam* in medio per quam aquam effunderet, digiti magnitudine habuisse scribit: *dentes* quoq; obtusos, & hominis molarib. similes. Minxisse, ore aperto respirasse & suspirasse; *Lachrymatu* fuisse, p. fluentib. ex oculis guttulis; diuque supervixisse, quamvis sanguis è vulnere, nō secus ac vinum è siphunculo flueret, addit. Nullius non maris est incola. Bellonius sæpius in Oceano Gallico quam Delphinos capi scribit. Rondeletius etiam in Ponto

Arist. H. A. l. 8. c. 13. vivere, & in loco illò, Aristotelis, *ἔξω γὰρ φαλκίνας καὶ δελφῖνος ἔδεν ἐστὶν ἐν τῷ Πόντῳ;* & c. *Φαλκίνης* pro *φαλκίνης* ex eodem Aristotele, qui antea Phocænā in Ponto nasci scripserat, legendum esse putat. Hoc alii de vitulis marinis accipiunt. Parit magna ex parte binos vel singulos ut Aristoteles prodidit. Bellonius in for. Parisiis, diebus Veneris inprimis adferri reliq. Del-

phino tamen est deterior, quia pinguior.

SCOLOPENDRÆ CETACEÆ, *Ælian H. A. l. 13. c. 13.* Ælianus solus meminit. Exerunt aliquando totum è mari caput, Narium pilos magna excelitate apparere, caudam perinde atque locustę latam conspici, reliquum corpus aliquando in superficie æquoris spectari, & cum triremi justę magnitudinis conferri posse: Per multis pedibus, utrinque ordine sitis, tanquam ex scalmis apensis natare. Addunt inquit harum rerum periti ac fide digni, ipsos etiam fluctus ea natante leviter subsonare. Pro hac Cetacea Scolopendra, hanc quam exprimi curavimus Aldrovandus exhibet. Tota ad colorem cæruleum vergebat; ad latera tamen & in ventre non nihil rufescebat.

ARTICVLVS VI.

De Phoca, seu Vitulo marino.

ET si Phoca animal sit amphibium, quia tamen humore potissimum victitat, nec diu extra aquas vivere potest, inter aquatilia referre placuit. Græci *Φόκην* dicunt, seu ex *βωκῆ* beatu quem edit, unde Servius apud Virgilium, *Phocas*, *marinos boves* interpretatus est, seu aliunde ducto vocabulo. Plinius & Gaza vitulos marinos; ille, quandoque Vitulos simpliciter dixit. Festo *Bocas*, ut Gesnerus cōiicit, vocatur. Varinus *ἐν ἄλιον κήπος*, Oppianus *θηρὲς ἐν ἄλιον* dixit. Differt *Corporis figura* ab omnibus tum piscibus, tum Cetis, adeò ut quadrupedem vocaverit Aristotel. Habet quippe, ut oculus testis Rondel. scribit, veluti *brachia* sine cubito, sine ulna, brevissima: Quod sequitur, Carpo nostro respondens, ex multis ossibus constat: Metacarpium verò, ex quinque ossibus quæ pelle tantum teguntur: inde tanquam manus indivisa, præterquā in extremo, in quo quatuor linearum distinctiones, tantum spectantur; ungues autem quinque distincti. Quia pinnarum vicem agunt, ideò Homerus *φόκας νέποδες* cognominavit. *Corio* tegitur duro, solido, pilis nigricanti-

TAB. XLI.

bus & cinereis, quædam maculas parvas albicantes in ventre habent. Plinius *Cartilagine*s non ossa habere scribit, sed Aristoteles carne abundare mollemque esse, & cartilaginibus ossibus constare, author est. *Caput* est breve, & pro corporis magnitudine parvum. *Collum* longius, quod pro arbitrio extendit & contrahit. Inferior *maxilla* Lupinæ similis est, superior quæ in lupo latior, hacque & naribus vitulis terrestribus affinis est. Oris scissura mediocris. *Superciliorum* locum & superius labrum pili duri aliàs nigri, aliàs albi tegunt. *Dentes* sunt ferati & lupinorum similes. *Oculi* splendent & subinde in mille colores ut hyænæ transeunt. *Lingua* est scissa, id est bifurca. Plinius duplicem facit, Rondeletius latam esse addit. *Auribus* caret, quod vitam in humore traducat, partes verò aurium meatibus additæ, ut motus aeris à longè delatus servaretur: sed loco eorum meatus angustissimos & exiguos habet, qui in viventibus sunt evidentes, in mortuis difficillimè inveniuntur. Lato est *pectore*. Omoplatas enim habet quaternis musculis conexas, superiore vel posteriore in parte quam canes terrestriaque alia animalia, quæ in lateribus eas habent. *Felis* in hepate habere negat Aristoteles, omnino habere, Bellonius. Plinius tribuit, sed partem non exprimit. *Renes* ei sunt firmissimi & solidissimi, cum reliquorum omnium magis minusve cavi. *Genitale*, maribus oblongum, foeminis ad terrestria accedens. Aristoteles simile Rajæ esse ait. *Locus* Phocæ aqua & terra. Nec penitus illa carere potest, nec in ipsa agere secus, nisi per intervalla quædam respiret.

Vescuntur piscium carnibus, & in vivaria immisæ, furibundi in eos sæviunt; apud Troglodytas extra finem Arabicum piscium capturæ non minus ac homines intenti. In retia delapsi, dilacerant eadem, & piscibus una capitis effugiendi ansam præbent. Leporum & aliorum retro mingentium ritu *mingunt & coeunt*, nempe aversi, inque medio coitu cohærent. *Pariunt* in terra pecudum more, nun-

quam geminis plures, ut scribit Plinius. Secundinas emittere scripsit Aristoteles. Prolem circa duodecimum à partu diem in mare deducunt, quod Calpurnius inter impossibilia recensuit. Maxima ex parte per littora vagantur, & vicinos agros, vineta & pomaria deperdunt. Si quando colliculum ascenderint, indeque secedere coguntur, pedibus accipite in ventrem contractis, ac toto corpore in globum constricto, maximo impetu in mare devolvuntur. Non procul tamen à littore recedunt, quod ipsis difficilis pedum in terra usus sit. Difficiliter *interficiuntur*, nisi capite eliso, quod corpus totum carnosum sit. Extra aquam ad solem in arena littoris vel super saxa *dormiunt*, ut liberius respirent. Nullum animal graviora somno premi author est Plinius. Nos aliquoties, Plin. cum Andreapoli in Scotia studio Juvenal. peram daremus, tam prope ad stertentes accessimus, ut lapidibus infestari potuerint. Postquam se in aquas coniecissent, elato ex undis capite nos intuebantur. Inter dormiendum tam altè stertunt, ut mugitum edere videantur, quod Aristoteles quoque & Plinius meminere. In causa pituitosus humor, qui in aspera arteria, inspirando & expirando agitatur. Sed & in aquis fortè dormiunt. Nam & ranæ, quarum more sub aquis diu urinantur, longissimo anni tempore, sub aqua latere possunt, ne quicquam de *pulmone* dicam, qui exiguus, spumofus, nec sanguineus *Ingenium* si spectes. Sæpissimè mitescit, & naturam ferinam deponit, & quod mireris, accipit disciplinam, voceque pariter & visu populum in spectaculis exhibitus salutat, & incondito fremitu, nomine vocata, respondet; sed & in hominem amore fertur, hac in parte nihil à Delphini natura abhorrens. Visus aliquando vitulus marinus, qui ad principis Christiani nomen gaudio perfundi videbatur, obmutescere ad Turcæ. Is etiam cuius Rondeletius iconem dedit, in Lerini insulæ Cœnobio, nullo metu cum hominibus

per

Aristot.

Plin.

ARTICVLVS VII.

De Manati Indorum.

per multos dies versabatur, adeò ut & gradus ascenderet. Damnis apud Philostratum, Phocam à piscatoribus captum, filium quem in cavea pepererat, ita deplorare mortuum vidit, ut per triduum à cibis abstinuerit. Tzetzes verò testatur, cum suis catulis mori, istos cum suis matribus, parentesque senio confectos, in natando iuvare. Summa ipsis cum mari *Sympathia*. Pili enim excoriati si mare turbatum in fluctus surrexit, similiter eriguntur; si defecit, in planum sternuntur. Quod cum non crederetur, factò in Indico mari circa Hispaniolam insulam periculo, non amplius fabulosum haberi Cardanus asserit. Plinius sensum æquorum retinere, semperque æstu maris recedente inhorrescere scripsit: Rondeletius verò mutationes aëris significare, austrinis ventis surrigi, borealibus ita desiderare, ut nullos planè affirmes, sæpius observavit. Fulmina & grandines corium prohibere Plutarcho & Palladio proditum. Ideò, & summas velorum partes eo obtegi, & Augustum Cæsarem pellem vituli marini perpetuo circumferre cõsuevisse, & Severū Imperatorē eadē rectū voluisse legitur. Grandini verò obviare Palladius credit, si per possessionis terminos circumferatur, & in villæ aut cortis ingressu suspendatur, cum malum videris imminere. Urso metueri Oppiano debemus, congressos aliquando cum iisdem in spectaculis, Lycostæ rustico apud Calphurnium fugere & arietes marinos, & forti anhelitu è cavernis extrahi, Æliano. Negligitur etiam ab infima plebe in *Cibis*. Caro enim ipsius, mollis est, spangiola, & pinguis, adeò ut liqueatur si diutius manibus contrectetur. In *Medicina*, dextra pinnia capiti subdita somnum adfert, quòd nullum animal graviore somno prematur. *Pellis* à podagra præservat, si ex ea calceos gestaveris. Adeps in muliebribus morbis vehementer ab Hippocrate laudatur. *Coagulum* quod evolmere dicunt, ne in hominum manus incidat, cum panace, vel succo punicis, Comitiales morbos sanat. Cælius Aurelianus tamen id reprehendit.

HUJUS piscis nemo veterum meminuit, nisi fortè Bos sit Aristotelis, quem in Historiis inter Cetacea reponit. Belgæ vaccam marinam vocant. Nec in congruè iste diceretur, cū quòd capite terrestrem bovem referat; tum quòd ejusdem more herbis in terra pascatur. Utri est similis, ideò fœdissimus aspectu. *Caput* habet bovis instar, *Oculos* exiguos, *Pedes* circa caput binos, crassos tanquam alas brachiorum loco, quibus natat. *Aurium* loco duo foramina exigua quibus audit, *Lapides* seu ossa in cerebro bina parvæ pilæ palmariæ magnitudine, orbicularia. Circa *caudam* strictior est & quasi præcinctus, quæ etiam ab inde ad extremum tota conspicitur nervosa. Fœminæ duo sunt ubera in pectore, quibus catulos lactat. *Corium*, quo integitur est simile ustulati porci corio, digitum densum, cineraceo colore, rarisque pilis præditum. Adeò magnus est, ut iugo boum opus sit ad unum vehendum. Nonnunquam quatuordecim aut quindecim pedum longitudinem superat, octo verò palmarum crassitudinem. Circa insulam Hispaniolam in mari capitur. Subitamen & flumina, & secundum ripas eorum herbas depascitur. *Manus* fœcit aliquando. Aluit quendam per vigintisex annos in lacu Gvaynabo Caramatexi Regulus, tam mansuetum, licet jam grandem, ut nomine Matonis inclamatus, è lacu egrederetur, & ad ædes cibi sumendi gratia perreptaret, iterumque in lacum remearet, pueris atque viris, quorum cantu delectari videbatur comitantibus. Idem denos simul pueros tergo exceptos ex una lacus parte nonpositam transvehebat. Cum quidam ex Hispanis hastam in eum vibrasset, etsi non læsus, nunquam tamen postèr. emergere voluit, si viros vaste indutos, & barbatos conspexisset. Intumescente fluvio Hayboaico, & in lacum illum se effundente, in mare

Philostr.
l. 2. de vita
Apollonii.

Plutarch.

Sueton. in
Augusto.

Pallad.
R. R.

Ælian.

Plin.

Plin.
Theoph. H.
l. 9. c. 12.

TAB.

XLIII.

Arist. H. A.

l. 6. c. 11.

Lopez

Hist. Ge-

ner. c. 13.

Clus.

Exot. l. 6.

c. 19.

regressus est. *Vsum* & in *Cibis* & in *Medicina* præstat. Caro enim ejus resiccata, Anglicæ bubulæ similis est, & diutissimè incorrupta manet; cocta Thynni carne est præstantior. Cauda in partes concisa, & soli per quinque dies exposita, tandem in patella cocta, multa pinguedo elicitur, quæ, quia rancorem non contrahit, ad ova in sartagine frigendo

adhibetur. *Ossa* in capite colicæ passioni & doloribus nephriticis valdè aduersantur, si primò adusta, contrita & per cribrum transmissa, in vino drachmæ unius vel alterius pondere, assumpta fuerint. Ex Corio cingula etiam & calceorum soles fiunt.



ADDITA-



ADDITAMENTUM

De

CANE ARISTOTELIS.

Nieremb.
H.N.l. II.
c. 20.



PISCIS qui hodie Tubero dicitur, Canis Carcharias esse vulgò creditur. At quia ille quem Franciscus Hernandus describit, exactè descriptioni, quam attulimus; non respondet: ideo placet & hanc apponere. Cetaceus inquit piscis est, ex genere oblongorum, Oceani incolæ, quindecim interdum dodrantes longus, voracissimus, cursu velox, nec omninò stupidus, & bina humana corpora sæpenuerò crassus; ore quòd rostro unciarum decem intervallo subjacet, lunato, vallatoque supernè trino dentium præacutorum, ac sèsemviro serræ modò subintrantum, ac quaternò infernè binum dodrantum rictu, & brachiis utrimque quinis: rostro ranæ obrotundo, pinnis singulis utrimque juxta branchias, totidem juxta pudenda, juxta caudam unicâ alterâ omnium maxima imminente dorso statim à branchiis, alteraque juxta caudam modicâ, à contrariò alterius parvæ, sed in oppositam partem vergente caudâ magnâ, crassâ, falcataque, & superna parte triplo aut quadruplo longiorè atque latiore, & juxta exortum quibusdam parvis cavitatibus insigni: oculis modicis longo inter sese distantibus intervallo: pupillâ magnâ, & sub lutea iride, corio verò ceterorum cartilagineorum, cum sese tendit, nullis ictibus penetrabili: dorso ac lateribus cæruleis exsaturatis, ac ventre candenti. Mirum est, bina pendere mari, offesa pudenda, cava, alba, dodrantem longa, & ternis singula, glandis loco,

longiusculis noxia acuminibus, quibus novacula modo facilè quidvis obvium abscondit. Maleficum animal est, atrox, ac hominum devorator: adeò vivax, ut in perquam tenuès etiã divisum apalectos, affixumque veru, ac vitam adhuc videatur mordicus retinere. Mediocre præstat, & quale alii congeneres pisces, dum parvum est alimentum; sed provectius, durum, ingratum, insalubre, & fluxum alui ciens. Vnicum est illi intestinum, satis amplum; unde tam improba contigit voracitas. Cor parvum subalbidum, laxum, & usque adeò vivax, ut eductum, & in varias partes sectum, diutius conspiciatur moveri, ventriculisq; distinctu. Stomachus vastus est, hepar candens, in duas partium tænas, quatuor dodrantes longas, ac decè uncias latas. Splen vero jocinoris longitudine, sed duas tantum uncias longus.

Cæterum solent circa tuberones *Nieremb.* pisciculi quidam natâre *Romeri* dicti, *H.N. l. II.* de quibus ira Hernandus. Piscis est ^{c. 19.} spinosus, Oceani Septentrionalis alumnus, dodrantem plus minus longus, tres uncias crassus, corio tectus molli & pænè teres. Lunatâ constat caudâ, & rostro resimo atque compresso, oculis magnis, si magnitudini corporis comparentur, pupillâ nigrâ ac luteâ iride. Senis natat pinnis, quarum altera medio pænè dorso in caudam usque procedit, sensim sese attenuans, & à quibusdam præacutis spinulis sumens exordium: altera à pudendo pænè ipso in caudam ferè descendit, utrimque à brachiis singulæ, binæque paulo ante initium ventris.

Color

Color universi ex albo in cæruleum tendit, quamquam dorsum caputque cyaneo exsaturato videantur nitere, universumque corpus senis pavonini coloris transversim in discurrentibus orbibus ambiatur. Extrema corporis caudam contingentis quadrata sunt, & quaternis veluti dorsis distincta quarum bina quæ in latera excurrunt, desinunt in acumen. Caudæ initium pavonino exsaturato splendore. Micant mediæ utrimque partes, dilutiores sunt sequentes exsaturatæ, ac demum postremæ candentes.

DE GLAUCO ÆLIANI.

Nieremb.
H.N. l. II.
c. 21.

AD Glaucum Æliani videtur referri debere, & hic quem Clusius exenteratum & resiccatum ita describit. Erat, inquit, corpore longo, trium ferè pedum longitudinem explente coloris (resiccatum enim & exenteratum dumtaxat conspiciebam) ex cineraceo fusci, in quo tamen quidam candor, præsertim in tergo, adhuc elucebat: vivum enim & recenter captum argentei panis coloris fuisse intellegebam. Medii corporis ambitus pedis, hoc est, duodecim unciarum longitudinem æquabat.

Cartilagineus verò erat, & lævitate prædicatus; rostro lato, sed in obtusum deinde acumen desinente. Oculi magni erant, è quorum infima parte enata erat membrana, quæ sursum sese attollens, velut nubes caliginem illis offunderet.

Oris rictus non valde latus, in supina capitis parte maxillas in obtusum angulum delinquentes habebat, ferè ut simiæ: quaternis autem dentibus os præditum erat, binis in superiore maxilla, totidem in inferiore: hisque firmis, quorum singuli quibusdam sulcis erant distincti, ut pluribus dentibus armatum os esse videretur. Corpus à cervice sensim gracilescerebat: spina sive a-

culeo in eâ parte, quâ dorsum cervici connectebatur, sito, eoque sex uncias longo, infimâ parte lato & cavo supernâ autem valdè acuto. Pinna surrecta innitebatur quatuor panis uncias longa. Binas dumtaxat in lateribus branchias valdè apertas observabam, utrimque videlicet unam, cum aliorum galeorum genera denas habeant, in singulis lateribus quinas.

Has sequebantur duæ pinnae ad natandum idoneæ, longiores quam in illo galeorum genere conspexerim, novem videlicet unciarum longitudinem æquantem. Binas alas habebat ex utraque podicis parte, quatuor uncias longas, illasque bifidas, hominumne industria sic fissas, an à natura nihil pronunciare possum.

Alia deinde pinna in dorso paulò infra eam, quæ ad aculeum erat, exoriebatur, ad extremam ferè caudam usque inæqualiter porrecta, hoc est, ad eam usque caudæ partem, quæ tenuissima, & septem uncias longa, muris caudam quodammodò æmulabatur. Podici, qui in supina parte, ut in reliquis piscibus, situs, vicina apparebant bina foramina, in quem usum, ignoro.

Capitis porro cutis siccitate adeò erat contracta, ut nulla circa oculos, nulla ante eos, foramina observare potuerim.

De Pisce Gibbo.


HUic similis est *Acacana*, qui est ^{Nieremb.} ^{H.N. l. II.} ^{c. 25.} *hodrantalis* piscis, insignis prolixitate inferioris labri, & eminentiâ gibbâ, quæ à capitis exordio usque ad os, quod per exiguum est, arcuato descendit flexu.

Dorsum lateraque cyanea sunt, venter ac laterum pars alba, ac præter duas pinnas quæ circa branchias sunt utrimque, unicam angustam & longam, & aliam parvam, duæ aliæ visuntur breves, altera à medio ventre, altera vero à dorso in caudam usque procedens.


Squa-

Cete admirabilis forme.


Tab. XLV.




Orbis spinosa.




Histris piscis.




Orbis Rana rictu.




Pisces triangularis.




Searus Cretens.









Orbis oblongus testudinis Capite.



Sargus Aldrou.




Albula nobilis.




Aculeatus marinus Maior.

Tab. XLVII




Lupus


marinus Schönfeldij




Lycostomus Balticus.




Scorpis marinus alter.



Idem Sippinus



Spirinchus.



Siluri vera effigies.





Squamofus non est, & tamen bono constat alimento. Mare illum ad me misit Australe; etsi quidam referant, in Septentrionali quoque reperiri.

De Ostracione Gefneri.

Ostracioni affinis est *Catan* qui piscis est quindecim pedes, cum in perfectam magnitudinem adolevit longus, cortice rectus durissimo, laminis rhomboidis figuræ, paucisque contexto, testaceæ panē duritiei, nitidis, ac circa ilia elatis, qui vicem lorice præstare posset. Rostrum est prælongum & acutum, serrati dentes, & quaternio ordine dispositi, ac pinnae crassissimæ binæ juxta branchias, ac juxta caudam unica. Vivit in lacubus aut magnis fluminibus provinciæ Panucensis. Salubri constat nutrimento: sed cum parandus est, hic piscis, spoliatur corio. Vivit ex aliorum piscium canumve raptu, homines quoque interdum aggreditur.

Editur vero aslus, non coctus aut elixus.

AD LIBRUM V.

De Phoca.

Phocarum generis est Wallrus seu Mors, animal amphibium, quod Vorstius apud Delaetium ita describit. Belluam hanc marinam vidi, magnitudine vituli, aut canis Britannici majoris. Phocæ non dissimilem: capite rotundo, oculis bovillis, naribus depressis ac patulis; quos modo contrahebat, modo diducebat, aurium loco utrimque foramina; rictu oris rotundo necitavasto, superiore parte aut labro mystaca gestabat feris cartilagineis, crassis ac rigidis constantem. Inferior maxilla trigona erat, lingua crassa brevisque, atque os interius dentibus planis utrimque munitum, pedibus anterioribus

posterioribusque latis, atque extrema corporis parte Phocam nostram planè referebat.

Pedes anteriores antrorsum, posteriores retrorsum spectabant cum ingrederetur.

Digiti quinque membrana intersepiente distincti, eaque crassa. Posterioribus Digitis ungues impositi, non prioribus caudâ planè carebat. Postica parte repebat magis quam incedebat.

Cute crassa, coreacea, pilisque brevibus ac tenuibus obsita vestiebatur, colore cinereo. Grunnitum apri instar edebat, seu crocitatat voce gravi & valida. Repebat per aream extra aquam, quotidie per semihoram aut amplius dolio aqua pleno immittebant, ut se ibi oblectaret. Catuluserat, ut ferebant qui attulerant ex nova Zembla, decem hebdomadarum, dentes seu cornua exerta, ut adultiores, nondum habens, tubercula tamen in superiori labro præcipiebantur, unde brevi proditura facile apparebat. Ferrum & validum animal calebat ad tactum, valideque per nares spirabat.

Pulmentarium ex avena, miliove comedebat lentè & suctu magis quam deglutiendo, herumque gestantem cibum ac offerentem magno nisu ac grunntu accedebat, sequebaturque, nidore eius allectus. Lardum eius gustantibus haud insuave visum est.

Conspiciebantur ibidem duo majorum capita, dentibus duobus exertis Elephantorum instar, longis ac crassis & albicantibus munita, quideorsum versus pectus spectabant. Eorum coria cccc. aut Io. pondo pendisse ferebant Angli qui attulerant.

Hisce dentibus rupes ascendere, seque sustinere ajebant. Et prodeunt in continentem seu terram ut somnum ibi capiant gregatim.

Pabu-

Pabulum aiebant illis esse folia oblonga ac magna, herbæ cuiusdam è fundo maris nascentis. Nec piscibus vivere, aut carnivorum esse. Vidi ibidem penem ejusdem animalis osseum, rotundum, cubitum & amplius longum, crassum

ponderosum ac solidum, in fine prope glandem longe crassiorum ac rotundiorum. Hujus pulvere ad calculum pellendum Mascovitzæ utuntur



Finis Historiæ de Piscibus.



HISTORIÆ NATURALIS
De
EXANGVIBUS
AQVATICIS

LIBRI IV.

Cum figuris aeneis.

JOANNES JONSTONUS
Med. D. concinnavit.



FRANCOFVRTI

ad

M O E N V M,


Impendio

MATTHÆI MERIANI.

M DC L.

... ..
... ..

... ..




... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



HISTORIÆ NATURALIS

De

EXANGVIBUS

AQVATICIS

LIBER I.

De Mollibus, seu Molluscis.

TITVLVS I.

De Molluscis in genere.

Aristot. H. A. l. 1. c. 4. & 8, l. 4. c. 1.



QUATUOR Exanguium genera Aristoteles constituit, *Mollia*, nempe seu *Mollusca*, quæ carne molli foris obducta, solidum interiorius modo sanguinei generis continent. *Crustata*, quæ crustis collis te-
guntur. *Testacea*, quæ testis duris fragilibus muniuntur, & *Insecta*, quæ Græci *ἐντομα* dixere, *Zoophyta*, hisce adnumerari meliori jure possunt, quàm ut inter plantas, numerentur.

Arist. H. A. l. 4. c. 1.

Nomen.

Mollusca præmittimus, cum quod nobiliora sint, & partium numero ac robore longè præcellant; tum quod idem Aristoteles & Plinius fecerint. Nec malè Aquatica Piscibus subiungentur, cum & Plinio, ea, pisces nuncupare placuerit. *Mollusca* seu *μαλάκια* dicuntur, quod neque asperam, neque testaceam cutem, neque squammam habeant, Athenæus *πυδάδι*, seu *Loligini* similia dixit. Dicitur & *μαλακόδεσμα* *Gaza* & *Rondeletio* visum: deceptos, &

Plin. H. N. l. 9. c. 28. Galen. de Alim. facult. l. 3.

Cartilaginea Aristoteli talia dici *Salvianus* ostendit.

Aristot. de Gener. l. 1.

Naturam inter carnem & nervum mediam obtinent: fissilis hæc, in anfractum, ut ad vires commodior esse possit: loco ossium, quod piscium spinis proportionetur omnia, Polypum si excipias. *Exteriores partes* tres præcipue habet *Caput*, *pedes* si-
ve *brachia*, quos Aristoteles quan-
doque *πλεκτάνας*, *Gaza* crura, bar-
bas, cirros vocat, & *τὸ κύττω ἀδίορτον*, id est, *alveum indiscretum*. *Caput* omnibus *Plin. H. N. l. 9. c. 28.*

inter pedes & ventrem, seu ut *Aristoteles*, *ἐν μέσῳ τῶν πόδων τῶν καλῶν πλεκτανῶν*. In capite *Os* est & *bini dentes*, qui potius, cum immobiles sint, neque ad retinendam prædam firmè innitantur, *ὀύγγα* seu *rostrum* dicendi sunt. Est enim hæc pars, (os & dentes) ad unco carnivorarum rostro per quam similis, ex duabus partibus composita, superiore & inferiore commissura pyxidata, ut loquitur *Rondeletius*, ita ut inferior superiori inferatur. Loco *linguæ* *Aristot. de carnosum* quiddam in ore gerunt, *part. l. 4. c. 5.* quo esculentorum voluptatem discernunt. In capite *oculos* binos grandiusculos, quibus exigua quædam *cartilago*, *discrimen* cere-
brum

brum parvulum continens, præstat. *Pedes* habent parti priori, circum caput, infra oculos circa os & dentes vinctos, quod pars eius posterior ad priorem adducta sit, extremaque coeant ac confundantur, hinc fit ut excrementa meatu ori vicino infra emittant. Otoni hic sed singulis eorum generibus diversi. *Acetabula* sunt quibusdam, circumstantaque, implicamentis illis quibus digitos antiqui medici indere solebant, similia fibris implexa, quibus carunculas cæteraque cedentia trahunt. Aliis breves & inutiles, binæque promuscides prælongæ, quibus veluti anchoris innituntur, seque contra ætus marinos navigii modo stabiliunt. *Fistulam*, supra caput, & brachia ante alveum, gerunt, cavam, quam modò in dextram modò in sinistram partem transferunt, & hac, mare transmittunt. Aristotele hæc modo, αὐλὸς modò μυκήτης. Gesnerus φυσήτης legi, Gaza & Plinius narem transtulere. *Pinnulam* quoque habent circumdantem alveum, ut natare, & se in natando dirigere possent.

Alveus à capite amplioris capacitatis propendet, cuius caro non in directum, sed in orbem fissilis & cute integitur. Cutem tamen Salvianus denegat, & Plinius, nulla, Polypos vestiri scribit. *Capillamenta* in toto eorum latere conspiciuntur, quorum is, qui branchiarum in aliis piscibus, usus. Scholiastes Nicandri ὀσλίγγας, Aristoteles περιχώδη vocat. Interiora si spectes. *Osgula* excepit angusta, quam sequitur ingluvies, περιόβος, ampliuscula, neque avibus ab similibus, cui jungitur *venter*, tanquam ἡνυστρον facie buccinorum claviculæ.

Intestinum ab eo tenue, partem versus repens superiorum ad os fertur, quod laxius est quam gula. De Cerebro, vel quod ipsi proportionem responderet, superius diximus, vesica carent.

Mutis adhuc superest, quam Aristoteles, principatum sentienti obtinere dicit, ac si hæc cordi esset ἀνάλογον. Humida ea & corporu-

lenta pars per quam gula in ventrem pertendit, adnata magis tergo. *Ater humor*, quem quidam πῶν θάλον, alii ut Athenæus & Dioscorides πῶ μέλαν vocant, pro sanguine ipsis inest, si Plinio credimus: pro bile, ut Rondeletio placuit. Non solet, scilicet, natura, id quod pro sanguine fervat, in quolibet metu effundere: nec ullus meatus venæ proportionem responderet, quo alendi corporis causa in universum corpus distribuatur. Secretus is ab alimento in vesica, seu tunica membranæ; Aristoteles μεήκων, Gaza Papaver appellavit: exitum finemque habente, qua alvi excrementa emittunt, parte quæ fistula vocatur, quæ in supinis posita est.

In falsis aquis degunt: sed in potu lentioribus non inveniuntur, idcirco frustra in Ponto quæras.

Vescuntur carnibus. Nec sexus ipsis denegatus. Aristoteles enim vulvas bifidas, ac testes geminos juxta genitale in omnibus reperiri ait.

Differunt fœminæ à maribus, quod mas prona sui corporis nigriora supinis, partesque omnes asperiores habeat quam fœmina, & lineis intervenientibus varias, caudamque acutior. In mare quoque meatus quidam subditus gulæ, à Cerebro in ima alvei pertendit, idque ipsum ad quod fertur, speciem mammæ imitatur: in fœmina duplex illud idem, supraque positum habetur.

Generationem quod spectat, Ter. Generis copulari, & diu in venere, quia frigida, morari, compertum. Ore coire, & renixu atque complexu mutuo brachiorum jungi, prodidit alibi Aristoteles.

Semen per meatum emittunt, idque parte corporis supinâ, quam putamen distat, & mare illabitur, faciunt. Continent fœminæ primò ova indiscreta, mox discreta in plura: sed quia imperfecta excluduntur, auferuntur more vermium, postquam vim vitalem ab asperso maris semine acceperunt. Sic glutino uvarum instar cohererent, & quam primum

Plin. H. N. l. 9. c. 29.

Locus. Arist. H. A. l. 9. c. 28.

Cibus. Arist. H. A. l. 4. c. 1. de Gener. l. 1. c. 1. & 3. Sexus.

Arist. de Gener. l. 1. c. 15 & l. 3. c. 2.

Arist. H. A. l. 4. c. 1. l. 8. c. 2. Plin. H. N. l. 9. c. 12.

Aristot. de part. Anim. l. 4. c. 10.

Plin. H. N. l. 9. c. 12.

Aristot. de part. l. 4. c. 5.



Polypus.

Polkuttel.

Tab. I.

Sepia.

Black fish. black kuttel.





Loligo

*maior. großer
schmäler
blackfisch.*

Sepia supina.


Meerspin.



Loligo minor.


Lopus

marinus. Seehar.



Sepiola.

Kuttelfisch Klein blackfisch.



DE EXANGV. AQVAT

primum vitale virus attingere, animal-
cula ex ijs nascuntur.

De sensibus nullum est dubiū. Dor-
mire & somniare apud Aristotelem
habemus.

vsus. Apponebantur olim mensis ; &
Arist. H. A. probabantur maxime gravida. Nec
l. 4. c. 14. nunc à culina exulant, quædam Po-
Arist. de lyporum genera si excipias. Succum
Gen. l. i. c. falsum exiguum crudum copiosum
19. habere scripsit Galenus. Flatus pare-
Galen. l. de re, elixataque probiora effici, quod
boni & humor noxius eluatur, Diphilus. O-
mali succi va an aliquando in cibo fuerint, du-
cibus. bium.

TITULUS II.

De Mollibus in specie.

CAPUT I.

De Polypo.

TAB.
I. i.
Aldrov.
Exangv.
l. i. c. 2.



ANTUM de Molluscis in
genere sufficiat, iam in
specie de iis agemus. Nu-
merantur autem inter ea,
Polypus, Sepia, Loligo, quibus *Leporem*
marinum adijcimus.

Nomen.

Polypus, qui pro ratione Dialecto-
rum, πολύπους, πάλυπες, πάλυπες, πάλυπες,
& πάλυπες vocatur, à multitudine pedū,
nomen sortitus est. Antiphyllus By-
zantius in quodam Epigrammate
πελυπόδην dixit. Lacones ἀνόςρεον, alij ὄνον,
seu asinum marinum, infimæ ætatis
Græci Octapodia, seu Octapodos
vocavere.

Descriptio.

Descriptionem quod attinet, *Ven-*
trem tum figura tum tactu, cū Sepiis
similem habere, stomachum nimirū
sive gulam ab ore prælongam, quam
ingluvies excipit; tum ventrem con-
iungi, ac intestinum simplex ventri
annecti, & usque ad exitum tendere,
Aristoteles prodidit. *Cerebrum* in dif-
fecto duplex conspici, citat ex Ari-
stotele Athenæus, qui & *atramentum*
eius subruffum esse, & in vesica, quā
μήκωνα vocant, quoque supra ventrē,
auctoribus *Æliano* & Scholiaste in
Aristophanū, sita est, contigere, scri-

Aristot. de
part. l. 2.
c. 8.
Athen.
Dipnosoph.
l. 7.
Aristode
part. l. 4.
c. 5.

bit, minusque huius quàm Sepiam, &
quidē ad mutum habere, quod bra-
chia habeat coloremque mutet, ubi
amissum est, accrescere, & nunquā
eius copia desit, Aristoteles addidit.
Aristot. H.
Caput ei prædurum quam diu vivit, &
A. l. 9. c. 37. quasi inflatum est. Alveus id in cæte-
ris mollibus dicitur, quod brevior &
rotundior conspiciatur. *Oculi,* supra
duos pedes: *Os* & dentes in pedum
Athen.
Dipn. l. 7. medio. *Pedes* habet ut reliqua octo-
nos membrana interiecta magnos,
Aristot. H.
A. l. 4. c. 1. non solum ad natandum, sed & ad
ambulandum utiles, quorum medii
quatuor habentur maximi, ut bina
sæpe cubita superent, cum acetabu-
Arist. de
part. l. 4. lorum ordine duplici, quibus ori ci-
c. 9. bum admovet; reliqui quatuor, duo
superne, totidem inferne, memini.
A quibusdam brachia, ab aliis, Cru-
ra, Cirri, à Plinio barbæ, vocantur. A-
cetabula Aristoteles *πλεκτάνας*, alij *κο-*
τυληδόνες, Antiphilus Bizantius *ἐλιπας*,
Antipater Thetталus *πλοχμῆς*, Ovidi-
us flagella, dixere, *περίθμα* à Hesychio
& Varino dici, nonnulli credidere,
alii id capiti tribuunt. *Dorsum,* Plini-
us partem lævem appellat, à qua ace-
tabulorum ordo inchoatur. *Cervicē*,
habet imbecillam, cum premitur.
Pinnulam ipsi angustam, de medio or-
tam, quod parvum habeat alveum,
quem pedibus suis dirigere possit, A-
ristoteles tribuit. Plinius ob eandem
Arist. H. A.
l. 4. c. 9. causam, habere negat. Tam esse ex-
iguam; ut minimè aut vix conspici
possit, experientia didicimus. *Fistula* *Plin. H. N.*
l. 9. c. 29. ipsi in dorso, cava, qua mare trans-
mittit: eamque modo in dextram
partem, modò in sinistram transfert.
Rostrum Plittaci, si Scaligero & Bel-
Scalig. Em.
lonio, fides. *Cutis* nulla, quamvis Bel-
erc. 218. lonius pedes cute contegi reliquerit.
Caro alba, cavernosa, meatuumque
Bellon. Ob-
serv. l. 1. c. plena, quod apud Galenum & Plu-
14.
Galen. de
sympr. caus. tarchum legimus.

In mari Adriatico sunt frequentissi-
mi. Thasus & Caria optimos, Cor-
cyra magnos alit. In exterioribus
Cartejæ locis ad talenti pondus ac-
cedere, Strabo scribit. In Ponto Eu-
xino non reperiuntur magni, si Op-
pianum sequimur: circa Hellespon-
tum nulli, quod hoc mare ad Boreā
Oppian.

spectans imbris ferè sit obnoxii.
Arist. H. A. l. 8. c. 2. *Victus.* *Ælian. H. A. l. 6. c. 32.* *Victus* ipsis carnes cõchularum, quas
 complexu crinium frangunt: itaque
 præjacentibus testis cubilia eorum
 prehenduntur, Carabi, Cancri,
 Paguri, Locustæ, quarum carnes
 quandoque exsugunt, & succum ex-
 hauriunt; salsamenta, & pisces. Hæc
 omnia tanta aviditate devorant, ut
 ne à proprio quidem genere abstine-
 ant, & si *Æliano* fides est, qui mino-
 res retibus inclusi capiuntur, mayo-
 rum esca fiunt. Humanas verò car-
 nes in primis appetit. Et refert Tre-
 biius Niger apud Plinium, ad confi-
 ciendum hominem, in aqua, nullum
 hoc atrocius esse animal, luctari cõ-
 plexu atque forbère, & numerofo
 suctu detrahère, ac in naufragos uri-
 nantes imperum facere. Depasci &
 arborum fructus, in sicco æstivo
 tempore egressos, certum. Explan-
 tis autem olea maximè delectari e-
 iusque truncum flagellis sæpissimè
 amplecti, præter Athenæum, Op-
 pianus prodidit. Ficis ad mare natis
 affigi, & fructum mādere, ex Clear-
 cho habemus. An brachia sua tem-
 pore penuriæ, sub brumam come-
 dant, quæ rursus renascantur, du-
 bium quidem est, à maximis tamen
 authoribus, Alcæo, Diphilo, Hesio-
 do, Oppiano, & *Æliano*, affirmatur,
 hinc *κοινοποδίας* dici Iohanni Gram-
 matico ajunt. At Aristoteles, Plu-
 tarchus id falsum censent, & ille, ali-
 quos sua brachia à congris habere,
 addit. Distingui *Sexu*, nullum du-
 bium, & Marem à fœmina differre,
 quod ille capite esse productiore, &
 brachio suo gerit, quod genitalis spe-
 ciem referat, in quo duo amplissima
 acetabula habentur. Nervo id quasi
 constare, porrectum ad medium us-
 que brachium confirmant, torumq;
 nari fœminæ annecti. Athenæus, a-
 cutius & solum albicans esse, parte
 sui extrema bifurcatum, dorsoque
 annexum tradit. Plinius forte *caudam*
 vocat.

De *Coitu* ipsorum hoc scimus, cum
Arist. H. A. l. 5. c. 12. latent, (conduntur autem binis mē-
 sibus) idque hyeme coire, & ova pa-
 rere. Os ori, acetabula acetabulis

componunt. Cum eo, quod vocant
 caput, in terram reclinato, unus in-
 vitetur, brachiaque pandat, alter,
 passis item flagellis, adaptat sese ita;
 ut acetabula continentur. Edunt
 ova & quidem verno tempore, fistu-
 la. De Ovis ita Aristoteles. Deponūt
 aut in cavernis aut in testis, aliove
 cavo loco simile quiddam labruscæ
 cirrulis, & candidæ populi fructui. E-
 dita ova dependent ab ambientibus
 specuum parietibus, tanta copia, ut
 exemta, vas implerint longè maius,
 quam caput ipsius, in quo ipsa conti-
 nebantur. His quinquagesimo de-
 mum die disruptis, pusilli polypi ge-
 nerantur: & magno agmine serpunt,
 phalangior. more. Ac quanquam nō
 omnibus membrorum singulorum
 natura conspicua est: tota tamen ap-
 pareret forma. Multi autem propterea
 quod invalidi sint, pereunt. Ad eò
 verò aliquando exigui reperti sunt,
 ut nihil haberent discretum; cætera
 discreti moverentur. Quod ita bre-
 vissimè Plinius. *Polypi vere pariunt ova*
tortili simulata pampino, tanta sæcun-
ditate, ut multitudinem ovorum cuncti
recipiant cavo capitis, quo prægnantes tu-
lere. Excludunt quinquagesimo die, è qui-
bis multa propter numerum intercidunt.
 Polypus fœmina modò incubat ovis,
 modò cavernam cæcellato brachio-
 rum implexu claudit. Artificiosè hæc
 extracta, & circumjecta concharum
 tenuiorum, & scabrarum congeries
 velut lorica dura erigitur. De *Ætate*
 hæc apud Aristotelem legimus. *Pam-*
cissima genera Polyporum biennium vi-
vunt. Natura enim facile coriabescit. Ar-
gumento est. Pressus enim, aliquid semper
emittit, ac tandem evanescit. Patiuntur
hoc fœmina, post partum magis, ac stupida
sunt, neque fluctibus agitata sentiunt. Fa-
cile quoque ab urinantibus manu capiun-
tur. Mucosa quoque evadunt, neque ad
venandum consistere queunt, quod autem
bimatum non expleant, inde capiunt ar-
gumentum. Nam postquam polypuli orti
sunt, tum in æstate, tum sub Autumno,
haud facile invenias polypum grandem.
At ante id tempus maximi sunt. Vbi igitur
ova ediderint, sic consensescere atque
debilitari utrumque affirmant, ut etiam à
pisce-

pisciculis exedantur, per facile quoque abstrahi à cubilibus. Ante id tempus, nihil

Ælian. H. tale. Ælianus hoc Veneri adscribit, A. l. 9. c. 30. cui & Oppianus assentitur. Vivit tam-

Motus.

men etiam in centum dissectus partes. Natant & pinnis & pedibus, & quidem obliqui. Pedes in eam porrigunt partem, quæ capitis nomine appellata est, ita, ut cum natant, in adversum prospiciant, & caput ex adverso habeant. Sub aquis, ita in solido ingrediuntur, ut humoris beneficio suspensi fluctuent. In sicco (in sicco exeunt asperum, lævitatem odere) cum ambulatio cum pulsu & tractu fiat, alterum solum est in Polypi motu. Acetabulis enim iactis procul, ut, cuique applicuere id apprehensum tenent: tum brachiorum contractione corpus admovet, ita subvehunt sese in eam partem cui adhæserunt.

Scalig. Exerc. 218.

Ingenium.

Ingenium & sagacitatem si spectes, ἀνόντων quidem Athenæus, brutum Plinius vocat, quod ad homines adnatet, nec persequentem fugiat: est nihilominus callidus & solers. Nam primò, omnia in domum comportat, dein putamina erosa carne egerit, ad natantesq; ad ea pisciculos venatur. Idem Conchas artificiosè discuneat, & earundem carnibus vescitur. Non

Arist. H. A. l. 9. c. 37.

Plin. H. N. l. 9. c. 30.

sunt, inquit Plinius, prætereunda & L. Lucullo Procons. Betica comperta de Polypis, quæ Trebius Niger è Comitibus eius prodidit, avidissimos esse Concharum; illas ad tactum comprimi, præcidentes brachia eorum, ultroque escam ex prædante capere. Carent Conchæ visu, omnique sensu alio, quam cibi & periculi. Insidiantur ergo Polypi apertis, impositoque lapillo extra Corpus, ne palpitatu ejiciatur, ita securi grassantur, extrahuntque carnes: ille se contrahunt sed frustra, discuneat. Tanta solertia, animalium hebetissimis quoque est. Colorem eum mutare, sic pisciculis imponere, vulgare; in eo non convenit, quod Theognis, Phocylides, Ion, petrar. duntaxat mentiri colorem scribunt. Plinius verò & Antigonus ad similitudinem, ille loci, hic rerum, quibus appropinquat, quod & de arena Scaliger innuisse videtur, eandem suscipere, prodant.

Athen. Dipnos. l. 2. Plin. H. N. l. 9. c. 37.

Causas huius rei diversi diversas assignant. Plutarchus id astu facere & quod corpus porosum & transparens habeat, ait. Alij, ut Theophrastus scribit, metui id assignant, ut cū hominis genæ, pro varia cordis concitatione, hoc vel illo colore tinguntur. Bellonius, ob mollem pellem, quæ facile deglubipoteest, id fieri credit. Cuius colorem, nunc album (hunc assumere non posse, apud quosdam invenies) mox rufum, postea lividū, mox variis coloribus distinctum videas. Huc pertinet & illud quod apud Plinium extat. Polypum hamos appetere, brachiisque complecti, nō morfu, nec prius dimittere, quam escam circumferat, aut harundine levatum extra aquam: Monstro verò propiora sunt, quæ Trebius Niger, apud eundē prodidit. Carteja, inquit, in Cetariis prodire assuetus, exire in lacus eorum è mari apertos, atque ibi salsamenta populari, convertit in se custodum, indignationem, assiduitate furti immodici. Sepes errant obiecta, sed has transcendebat per arborem, nec deprehendi potuit, nisi canum sagacitate: Hi redeuntem circumvasere noctu: Concitiq; custodes expavere novitatem. Primum omnium magnitudo inaudita erat, deinde color muria obliti, odore divi. Quis ibi Polypum expectasset, aut ita cognosceret? cum monstro dimicare sibi videbantur. Namque & afflatu terribili canes agebat, nūc extremis crinibus flagellatos, nunc robustioribus brachiis clavarum modò incuscos, ægreque multistridentibus confici potuit. Ostendere Lucullo caput eius dolij magnitudine, amphorarum quindecim capax, atque (utipis Trebij verbis utar) barbas, quas vix utroq; brachio amplecti esset, clavarū modo torosas, longas pedū XXX. acetabulis sive caliculis urnalibus, pelvium modo: dentes magnitudini respondententes. Reliquiæ asservatæ, miraculo pepédere pondo DCC. Quæ de alio, mercatorū res salsamenta; Puteolis depopulante, dicuntur, apud Ælianium vide.

Plin. H. N. l. c.

Plin. H. N. l. 9. c. 30.

Ælian. H. A. l. 13. c. 8. Athen.

Dipnos. l. 4. Vfus.

Quantum ad usum appositos olim mensis, nullum dubium. In convivio nu-

vio nuptiali Sphicratis, qui Cotys Regis Thracum filiam ducebat, erant centum. Mnesimachus in Hip-
 potropho apud Athenæum, eosdem apparat. Apud Græcos, quoque cum

Athen.
 Dipnosyl. 9

Ἀμφιδέσµια celebrarentur, ab amicis mittebantur. Duræ tamen sunt carnis, & ad concoquendum difficilis. Ideo ligno contunduntur, vel ad lapidem atteruntur, ut fibrosæ carnis durities frangatur. Caput suavissimi saporis esse perhibetur. Caro, si concoquatur, copiosum alimentum, sed

Plin. H. N. 1. 32. c. 10. succo crudo scatens, suggerit. Plinius muriam ex sese emittere, scribit, & ideo non debere in coquendo addi, & arundine secari: ferro enim infici,

vitiumque trahere, natura definente. Elixi magis probantur quam affi. Philoxenus Dythiramborum Poeta, quod totum excepto capite devorasset, in egritudinem incidit, & mortuus est. Idem Diogeni Cynico acci-

Plutar. 1. 1. dit, quod crudum † deglutivisset. In An aqua i- venere & in Medicina locum. Polypo- gne melior. tufo & apposito listi sanguinem, scripsit Plinius. Myrepus in clibano cū

lignis oleæ eundem urit, donec in cinerem vertit, pulveris unciam, cum dimidia Chalcanti miscet, & naribus ad tollendum Polypum insufflat. Se-

Hippocr. 1. 1. de inter. affect. de Natura muliebri &c. cundum Hippocratem, tosti puerperi purgamenta purgant, bene ad concipiendum dantur, menses in vino albo suffocati, movent. Uteros molliunt, & in dislocatione eorundem bene præscribuntur. Ad Venerem stimulare, præter Diphilum, Æginetam, Dioclem, Alexis & Xenarchus apud Athenæum testantur. Iovius verò, sale inveteratos Venetias ex Dalmatia & Illyrico deportari, & à senibus acetabula & extremitates cirrorum, ad sobolem procreandam expeti, scribit. Causam Mnesitheus in flatuositatem, Iovius in falsedinem Aldrovandus, in feminis copiam, quam suppeditant, coniiciunt.

Antipathia.

† Plin. H. N. 1. 9. c. 62.

Ælian. H. A. 1. 10. c. 38.

† Plin. 1. 6. gris † laceratur. Muræna eidem den-

tium firmitate brachia † abscindit. † Ælian. H. A. 1. 1. c. 32. Cum apud Epidaurum easdem secaret Bellonius, ventriculos cirris Polyporum repletos comperit. Immobiles manere si quis rutam coniiciat, Ælianus author est.

Quantum ad Differentias & Genera, variant circa ea authores. Apud Athenæum ex Aristotele & Speusippo, Heledonem, Polypodinem, Bolbotynen, & Osmylem, species Polyporum invenies. Apud eundem Nautili & Treplichrotis fit mentio. Arist. H. A. 1. 4. c. 2. stotelis hæc sunt verba, ex Scaligeri interpretatione, Polyporum multa sunt genera. Vnum genus est frequentissime dit.

summa aqua natans, quod & maximum est. Horum littoris accola longe sunt maiores quam qui in alto degunt. Aliud genus parvorum, ij vario sunt calore, neque existantur. Item alia duo. Nam Eledona tum peculiari crurum longitudine: tum, quia molluscorum sola singularibus tantum acetabulis prædita est. Cum bina alij habeant. Et quam alij vocant Bolitanam, alij Olentiam. Postremo alij duo in conchis. Vnus, à quibusdā & Nautilus & Nauticus, appellatur, ab alijs autem ovum Polypi. Ejus testa pectunculo similis est, cava: neque ei connexa natura. Is prope terram pascitur sæpe numero: quare à fluctibus eijcitur in aridam, ubi elapsus de Concha, aut capitur, aut in humo perit. Hoc genus & pusillum est, & simile Bolitanis. Alter in testa tanquam limax, is ex ea nunquam exit: sed interdum brachia exerit. Tantum Aristoteles: Quinque itaque Polyporum genera sunt, quorum duo in conchis hærent, tria, sine conchis conspiciuntur, inter quæ levem & exiguam moderni differentiam esse putant. Eledonē τὸ τῆς ἐλείν, quod comprehendat, vel τὸ τῆς ἐαυτῷ ἔδειν, quod se seipsam rodat, dicitur, ὁ ζῷος, ὁ ζῷος, à gravi capitis odore nomen habet: Osmylus adeo bene olet, ut Gyllius, nihil moscosius se sensisse, etiam tum cum mortuus esset, scribat. Pollux tamen inter cirros & caput fistulam gerere, è qua retum emittat odorem, prodidit.

Bolitanæ, quo & Βολιτίνη, Scaligeri olentia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & πολυπόδινον, nomine ab Of-

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

dit.

Plin. H. N.
l. 9. c. 30.

Arist. de
sens. & sens.
sat.

De Sepia.

TAB. I.
 2.3.7.8.
 Nomen.

Descrip-
tio.

Arist. de
Part.
Animal. l.
4.c.8.

† Arist. H.
A. l. 4. c. I.

Locus
Aldrov. l. IX
C. 4.

c.5.
Victus.
Arist.H. A.
l.9.c.37.&
l.8.c.2.

Genera-
tio.
Plin. H. N.
l. 9. c. 31.
Arist. H. A.
l. 15. c. 17.
Scal. edit.

effundit, qua illa & nigriora & duriora fiunt, atque augescunt uvæ ad acini magnitudinem: Ex candida fit Sepiola, exitque die quinto decimo cute obrupta, exitque in caput & ventre annexo, ut aves. Quamquam nexus ille umbilici nondum satis constat. Crescente itaque Sepia, decrescit albumen, ut in avium ovis vitellus, ac tandem deficit: Oculi Sepiolarum ut in cæteris quoque animalibus grandissimi. Perfecta iam Sepia cum est egressura, se membrana secare occipit, Sepiola perterrita & stercus edit, & rubescit. Parit verò juxta terram inter arundines & sicubi enata alga, aut aliud quidpiam è mari ejectum, ut materia samentorum aut lapides. Bimatum non complere Aristoteles prodit.

Arist. l. c.
Plin. H. N.
l. 9. c. 51.
Arist. l. c.

Sexus. Sexus dignoscuntur faciliè. Mares prona sui parte nigriores sunt, partes omnes asperiores habent, & lineis intervenientibus varias, caudâ etiam acutior. Fœmina intestina continet duo veluti mammas, quæ alvo dissecta facillime conspiciuntur.

Ingeniû. Ad Ingenium pertinet, quod percussæ tridente fœminæ auxiliatur mas: at fœmina icto mare fugit: quod soli suo utitur atramento, non solum cum metuit, sed & abscondendi causa: quod ambo ubi sensere se apprehendi, effuso eodem, quod pro sanguine his est, infusata aqua abscondantur: quod à collo acetabulum instar funiculi, quo hamus dependet, dimittit, & pisciculis mordendum exhibet, eodemque retracto prædâ ad se adducit: quod denique tempestate urgente, propriis scopulis devincta flagellis hæret, & nativos dura connectit caute rudentes.

Plin. l. c.

Ælian. H.
A. l. l. c. 34.
Philes in
Iambis.

Oppian.
Halieut.
l. 2.

Vfus.

Habent ut olim ita & nunc in Cibus locum. Nam & cum Amphidromia celebrabantur, mœnas cum Sepiis mollire, & plurimos cirros diligenter stringere solebant, & in Ipsicratis nuptiis, assarum fit mentio. Optima putantur gravidæ, mensibus in primis Ianuario, Februario, & Martio. Elixantur magna ex parte, assil-

que præferuntur. Majores sale conservantur in Illyride, indeque Venetias deferuntur, ut & Genua Mediolanum. Ad Venerè ciendam quidâ cum nucibus adhibent. Ova in siccû ejecta, nonnulli in sartagine coquunt. Serthi difficulter concoqui, parumque in se continere succi, scripsit. Est & in Medicina earum Vfus. Ad dentium dolorem, cum ovorum putaminibus & oleo miscet Galenus. Hippocrates in morbis mulierum sæpissimè præscribit. Celsus & Dioscorides atramentum alvum emollire prodit. Ova urinâ movent teste Plinio. Marcellus ad tincturas & maculas corporis abolendas ex iisdem remediû facit. Dentifriciis aptissimum est os Sepiæ; quod & thoracis vitiis cum aqua potum prodesse Gesnerus scribit.

De Differentiis nihil occurrit. Rô- Differentius deletius pisciculum hunc, quem ita tiaz. descripsit, Sepiolam vocavit. Sepiæ, inquit, nascenti similis est, pollicis crassi magnitudinem non superat: octo pediculis constat: duas proboscides habet, nec sepium in dorso, nec gladiolum habet: utrique lateri pinna, veluti ala parva affixa est, rotunda, nec figura, nec situ pinnis Sepiarû & Loliginum similis, &c. Colore est vario, parvulus enim punctis in dorso notatur. Ore, oculis, fistula, partibus internis à Sepia non differt. Carne est molliore.

CAPUT III.

De Loligine majore & minore.

Loligo major τεύδις Græcis, Gazæ Tab. I. Lolium, Gallis Calamar, à thecâ 45. scriptoriæ similitudine, sive quod in ea reperiuntur, quæ ad scribendum necessaria sunt, dicitur. Minorem τεύδιδα vocavere. Quænam cum Polypo & Sepia communia habeant, capite de Sepia explicatum est: hoc solum addimus, Loliginum promuscides, Ligulas vocari Apulejo; id vero quod durum ac solidum intus per i. corpus

Nomen.

Apul. Apol.

Corporis prona continetur, $\xi\iota\phi\theta$, seu gladiolum dici. Differunt à Sepia, quod alveum, quem Aristoteles $\kappa\omicron\iota\sigma\iota\delta\iota\varsigma$, Athenæus $\zeta\omega\mu\alpha\tau\iota\omicron\nu$ vocat, longiorem habeat: & bina quidem conceptacula gerat, quæ ventris ferunt speciem, sed alterum minus ingluviæ imitetur & tactu discrepet, quoniam & Corpus totum carne molliore constat. Quin & præter atramentum, quod prope mutim habet, gerit & succum purpurascensem, $\omega\chi\rho\delta\omicron\nu$ Athenæus vocat, Oppianus $\delta\pi\epsilon\rho\upsilon\theta\rho\nu$, Gladiolus autem, quem Athenæus $\delta\varsigma\epsilon\gamma\kappa\omicron\nu$ dixit, cartilagineus est, pellucidus, & ab uno parte cultrum, ab altera calamus referens.

Oppian.
Hal. l. 3.

Aldrov. de
Mol. lib. 1.
c. 6.
Descrip-
tio.
Bellon. de
Piscib. l. 2.

Aldrovandus crystalli instar splēdidum depinxit. Peculiarum descriptionem si attendas, Teuthos, describente Bellonio ipsa quidem Loligine major est, ut cubitorum interdum quinque esse, inquit Aristoteles. Extérieure quoque corporis nota aliquantulum à Loligine discernitur. Parse nim Lolii, quæ exit in acutum, in Loligine latior est. Quin etiam pinnulæ totum Lolium ambiunt, junctæ perpetuæque, quæ alioquin in Loligine partem aliquam relinquunt. Minus autem accedit ac Polypū quàm Sepia. Nam corpus ei oblongū est, cartilagineū, duabus pellibus obductū: gladium arctiorē & magis cartilagineolum in tergo continens, translucidum vitri modo, tenui theca inclusum: rostrum aquilinum, psittaci figura. Sed eodem modo atramentum quod Sepia emittit, & cirros octonos habet, breves tamen: in quibus tot acetabula conspicias quot in Sepiis. Ac præter illos octonos duo quoque longa flagella, seu promuscides, multis in extremo acetabulis circumfessa videbis. Hæc acetabula præter Sepiarum & Polyporum morem, tribus introrsum ossibus aculeis robustis, in gyrum munita sunt. Latas in gyrum diffundit pinna: à cuius ore corneo gula prætenditur angusta, & usque ad stomachum longa, quem habet amplissimum, atque aded ingluviem, quæ hunc præcedit. Loliginis minoris descriptionem, quæ ferè

nihil ab ista differt, vide apud eundem.

Reperiuntur in profundo † mari, etiam propè † Eubœam, quin & in Ponto, in quo nulla Sepia. In nostro mari, inquit Plinius, quinquē † cubitorum capiuntur. *Videtur* piscibus: nec à Cancris Paguris & Astacis abstinent; diligenterque, quicquid in stomachum dimiserint, rostro, quod robustissimum habent atterunt.

De *Coitui* idem in Loliginibus occurrat, quod in Sepiis diximus. Pariunt in alto, & conferta ova edunt. Apparēt hæc gemina, quod vulva earum ita articulata sit, ut bifida cernatur. Neque his bimatu † longior vita. Mas à fœmina differt, quod intus meatus duos habeat, quibus mas caret, sicuti in Sepiis e emittit. Non tantum suis pinaculis natant, † sed etiam iisdem extra aquam se efficientes volitant: & sæpè tanta multitudine, ut, quod ex Trebio Nigro Plinius prodidit, navigia quoque demergant. Dum volitant tempestatem prænuntiant, quod caro ipsarum nuda & glabra, frigoris quoque sit impatiens, ut Plutarchus prodidit.

Vfus Loliginum ut olim in Cibis Vfus fuit, sic nunc est. In cœna lauta appositos Pherecrates apud Athenæum testatur: Scholiastes Aristophanis, & Suidas inter viles reponunt. Præferuntur gravidæ, & quas Ambracia dedit, Romæ mensibus frigidis laudantur. Et assarum, & in sartagine coctarum, Athenæus meminit. Antiphanes sacra delectatur. Deterius jus sine atramento confici opinantur. Quomodo sapidiores reddantur, vide Aldrovandum. In *Medicina*, stomachicis convenire in cibo apud Galenum legimus. Tormentosis assaras prodesse Marcellus Empiricus prodidit.

Locus.
† Arist. de
part. l. 4.
c. 4.
† Athen. l.
7. Dipn.
† Plin. H.
N. l. 9. c. 15.
Idem l. 9. c.
30.
Vitus.
Generatio.
Plin. l. 9. c.
5.
Arist. de ge-
ner l. 3. c. 8.
† Plin. H.
N. l. 9. c. 3.
† Plin. H.
N. l. 9. c. 29.
Plut. quæ
natur. 18.

* *

CAPUT IV.

De Lepore marino.

TA. I. 6.
Nomen.

Lepus marinus, Græcis λαγώς & λαγώ, θαλάσσιος, à colore leporis terrestris, quem ἐμπέριον vocant, nomen fortituse est. Monspelienses ebrium vocant, quod vivus colore ex rubro nigricante sit, quali plerūque ebrii conspiciuntur. Mortuus ex fusco albicat.

Descrip-
tio.Ælian. H.
A. l. 2. c. 45
Apulej. in
Apologet.

Variè à veteribus describitur, qui eum modò offæ informi, ut Plinius, modò cochleæ testa exemptæ ut Ælianus; modò Lolligini parvè, carneam si respicias, ut Dioscorides: as-
similarunt. Apulejus cætera ex ossem, duodecim tamen numero ossa ad similitudinem talorum suillorū connexa & catenata gerere, reliquit.

Differen-
tia.

Rondeletius tria genera descripsit. *Primum genus* maximè lethale est, cochleæ nudæ admodū simile, maxime posteriore corporis parte. Os habet in dorso veluti Sepia, volutæ instar contortum, qua parte caudam spectat; in lateribus Sepiarum modò pinnas habet alveum ambientes replicatas: mox cornicula duo carnosæ, qualia sunt in cochleis, altera tantum capitis parte Zygenæ caput imitatur: altera parte foramen est, per quod carnosam quandam substantiam exerit, quam etiam pro arbitrio retrahit. In harum duarū partium mediocrima est pro ore, *atramentum* & reliquis partibus internis lolliginem refert. Idque in hoc genere est mirabile, quod cum in omnibus animalibus partes sinistræ dextris similes sint, in hoc sint valdè dissimiles, ideo offa informis meritò dicitur. Odore est Pisculento retroque. *Alterum genus* superiore est maius, partibusque & aliis superiori simile, sed parte priore duas latas appendices carnosas habet, in quarum medio rima est. Paulò infra cornicula duo, qualia in superiore descripta sunt, nisi quod acutiora & breviora sint. In dorso os nullum, neque posterior pars, cochleæ exenteratæ similis est. Huius posterioris partis utroque la-

tere, veluti in Sepia pinnæ sunt magis replicatæ & expansæ. *Tertii generis* prona & supina pars exhibetur. Quod in partis supinæ medio conspicitur, est os: Supraposita ori pars alveus, qualis in Sepiis, ovi figura, sed in ambitu crenatus. Ori subiecta pars membrana est tenuis, carnosæ, magis expansa in rotundum, cuius ora fimbriata est, fimbriæ nigrescunt. Intus cerebri nigri parum est, gulam excipit ventriculus, ex quo oritur intestinum instar capreolorum vitis convolutum. In medio substantia quædam est fungosa, succum fuscum continens, fortassis *μήκων* cum atramento suo. Toto corpore est splendido: CrySTALLUM vel puitam concretam conelatatque dixeris. Odore est ingrato & pisculento nauseumque movet. Hoc genus Bellonius pro communi lepore descripsisse videtur. Fulvum inquit leporis terrestris colorem imitatur. Pulmonis marini more per mare divagatur, tametsi pinnis careat. Pellucidū habet corp⁹ ovi anserini magnitudinē non excedēs, q̃ pro lubricitate hūc & illuc trās fert. Septē habet appendices innumeris promuscidibus stipatas ex Indico in cyaneum vergentes, quibus sugendo corpori alimentum suggerit: appendicum autem substantia fungosa est. Ex aqua emergens naturam suam emittit, & in seipsum concidit. Linguam demorsus vellicat ut aridam, paulò tamen remissius, &c.

Addit Ælianus & *Indicum*, quod Ælian. H. ex omni parte ad terreni leporis similitudinem accedit, præter pilos, qui spinosi & erecti. Tercium illud genus in alto mari degit, ideoque rarissimè capitur. Primum in stagnis marinis lutulentis, & alga limoque vescitur. Frequentes inter cycladas insulas occurrere Bellonius prodidit. Dari in hoc genere marem & sceminam apud Plinium habemus. Cum ad Rondeletium delatus esset qui lingula carnosæ careret & ore in dorso, marem esse iudicavit, primo loco descriptam sceminam, quod in ea Polyporū ovis simile quid reperiretur.

Adhi-

Plin. H. N.
l. 2. c. 1.

Ufus. *Adhibitus est in Medicina olim. Ga-*
Galen. l. ii. lenus & Plinius inter Psilothra refe-
de sympt. runt. Archigenes ad ægylopas la-
 næ tomentum sanguine leporis
 marini tinctum indit. Iubent quidam
 & lepore marino recenti podagram
 fricari, prodente Plinio. *Venenatum*
 esse certissimum est, eum inprimis
 qui in Indico mari. Eo Titus à fratre
 Domitiano sublatus est, & Plinius
 ait. Non sunt minus mira quæ de le-
 pore marino traduntur. Venenum
 est aliis in potu aut cibo datus, aliis
 etiam visu. Hi quidem gravidæ si a-
 spexerint forminam duntaxat ex eo
 genere, statim nausea & redundatio-
 ne vitium fatentur, ac deinde abor-
 tum faciunt. Remedio est mas indu-
 ratus sale, ut in brachialibus habe-
 ant: eadem res in mari & tactu qui-
 dem nocet. Alibi tamen, mortem
 sæpè inferre, & si nihil aliud ventrem
 doloribus acerbissimis torquere scri-
 bit: quod & Ælianus prodidit. Quæ
 de mulieribus dicta sunt, à Rondele-
 tio experto confirmantur, sed reme-
 dii non meminit. Symptomata quæ
 insequi solent, egregie vetustissimus
 Poëta descripsit

Post bibitum hoc virus viridis sta-
gnantia fellis

Excrementa manent, tenebroso lu-
mina visu,

Caligant, liquida abeunt in corpore
carnes:

Nausea adest, tumet alta cutis, talig-
calescunt:

Subque cavis oculis roseo fucata ru-
bore

Apparet facies, sistensque urina mo-
ratur,

Quæ nunc purpureo, nunc sanguineo
esse colore

Cernitur, & quemcumq; videt con-
temnere piscem

Affolet a versans, ut qualibet aquo-
ris eger.

Hinc patet vix pulmoni propriè
 infestum, cum tot affectus sumpto eo
 oboriantur. Fatendum tamen ple-
 rumque tabem invadere. Alexiphar-
 macorum quæ contra adhibentur
 haud paucus est numerus. Exhibetur
 primò helleborus niger, hinc lac asi-

ninum inprimis: nec non decoctum
 malvæ, & alia de quibus Aldrovan-
 dum vide. Rondeletius mulieri quæ
 nauseam ex odore conceperat, can-
 crorum usum præscripsit.

Aldrov. de
Moll. c. ult.



HISTORIÆ NATVRALIS

De Exanguibus Aqueis.

LIBER II.

De Crustatis.

TITVLVS I.

De Crustatis in genere.



QUÆ Crustata Plinio, illa *Plin. H. N.*
 Latinis aliis Crustacea, *l. ii. c. 31.*
 quod molli crusta operata *Nomen.*
 sint, Græcis *μαλακίστρα*,
 eandem ob causam dicuntur. Me-
 dium inter Testacea & Mollusca for-
 titi locum videntur. Nam quatenus
 foris crusta, etsi fragili & tenui obte-
 guntur, cum testaceis conveniunt:
 quatenus molle carnosumque intus
 continent, Mollibus comparantur.

Osibus carent, quod ossa juncturis Descri-
 indigerent, ut Cardanus scribit, nec *ptio.*
 sub crusta extendi possent. Commu-
 nes ipsis cum cæteris exanguibus
 partes, Caput, Alveus, Gula, venter,
 & intestinum. *Alveus* totius corporis *Aristot. H.*
 indiscretus est: nec *caput* distinctum, *l. i. 4. c. 3.*
 nec aliud quicquam. Idè ea Gale-
 nus capite trūncare voluit: quod ca-
 ve de Caudatis accipias. *καείδες* ista
 dicuntur, non tam quod magnum
 caput habeant; exiguum enim hoc:
 quàm quod maximum inter cætera
 crustata. Et videtur Athenæus apud *Athen. Di-*
 quem ista leguntur *καφαλή* catachre- *pnos. l. 3.*
 sticè pro thorace & capite sumere.
 In Capite *os* est quod protinus ven- *Arist. H. A.*
 trem in omnibus, præterquam in Lo- *l. 4. c. 5.*
 custis excipit, mox à ventre intesti-
 num. Exiguus is, si proportionis in

corporum magnitudine ratio habetur: hoc, simplex usque ad exitum excrementi deijcitur. *Dentes* in ore habent duos priores, & quia hi ad exactam ciborum contritionem non satis, quoad intima corporis penetrare queant, tres in ventriculo, alii in fecus singulos, inferius tertium. Longi qui in ore & tegmine duplici operti, inter quæ talia quædam interiacent qualia locustarum dentibus annecti suo loco dicemus. Intra hos binos dentes carnosum est illud, quod linguæ proportionem eiusque effigiem gerit. Supra os *Oculi* siti sunt, iique duri omnibus, apti intrò, foras, & in obliquum & quidem celeriter moveri, idèò palpebris carent: Cardanus in latus moveri ait nostri comparatione, directè autem oculorum suorum. Melius enim esse ut altero utrinque prospiciant etsi diversis oculis, quàm utroque simul nec ante nec post. Prominere autem quia à late ibus: quia aliter antè penitus prospicerent: à lateribus autem collocari, quia si supra caput non viderent, ante verò non poterant, quia os infra reponere necessarium fuisset, quia caput habent immobile: neque ante simul os & oculos esse, quoniam oportuisset esse latam faciem, unde in motu etiam tardiores evasisent. *Caput* etsi exiguum, appendicibus tamen & cornibus munitur, quæ & ad pugnandum & ad prætendandum inter data sunt. *Pedes* omnibus octoni, omnes in obliquum flexi. *Brachia* forcipibus denticulata sunt bina, quæ Græci *χίλας*, Apuleius furcas, alii nomine Græco servato Chelas nominant. Horum pars superior in primoribus his, ut loquitur Plinius, movetur superiore immobili; hisque pro manibus utuntur, & contra quam pedes flectant. Omnibus magna ex parte grandior & validior dexter quàm lævus *forceps* est. *Caro* colore sanguinis rubra & tactu lento. In alveo humor est pallidus, & minuta quædam oblonga & albida, ruffa etiam alia maculis dispersis. *Papaver* eis parcius. brachior. annexus communis. *Tabellas* quidam Latini vo-

cant quas *πάνας* Aristoteles, quibus cor crustæ coagmentantur. *Lapides* sub crusta genitos refert Cardanus, de quibus in Cancris agemus.

In stagnis potius marinis & juxta amnium ostia, saxorum foraminibus & limosis locis morari ex Aristotele & Athenæo habemus. Lapillis, alga, limo & stercore victitant: nec à carnibus abhorrent. *Coeunt* more eorum quæ in aversum mingunt, ineunte vere, & cum ficus maturescunt, propè terram, & quidè quòd exanguia sunt & naturæ frigida, diutissimè. Fœmina ovum rubidum, membrana prætenui obvolutum, ventri, lateri, & utrique intestino annexum, & ad carnem usque adhærens parit. Imperfectum illud, quod foris editum, incrementum capiat. Diversitas *Sexuum* ex nonnullis cognoscitur. Maior & crassior mas, tenues genitales meatus habet, & primum pedem simplicem. Nec non duabus particulis candidis, quas in carne pectoris habet, sed à fœmina discretas tum colore tum concretionem similes Sepiarum promiscidi. *Vorticosa* hæ sunt, quemadmodum buccini anfractus, quem Græci *μύκωνα*, id est, papaver vocant. Oriuntur ex ab acetabulis, quæ sub extremis sunt pedibus. Fœminæ operculum distantius, hirsutius, & opacius: vulvæ membranæ ad intestinum hinc atque inde fissæ, in quibus ovum gignitur; primus pes duplex, & cauda latior.

Longæ vitæ esse scripsit Plinius, Nulla *respirant*, sed aquam per fistulam egerendo refrigerantur. Humorem ore accipiunt, & meatu oris superiore emittunt. Hebes omnibus *visus*, tum quòd oculos habeant duriores & promittentes, tum quod à latere positos. Valent *gustui* & *odorati*, & ad morem aquatiliū *dormiunt*. Nullum sonum vel vocem emittunt, & obliquo motu incedunt, caudaque tantum natant.

Ad *Naturam* & *Mores* pertinet, Mores: quòd hyberno solum tempore conduntur, vere & autumnō pinguescunt, quod autem potius & cornibus quàm chelis quibus tamen magis valent

Locus.

Aristot. de Gener. l. 3. c. 11. & Athen. Dipnosoph. l. 3.

Generatio. Arist. de Generatione. l. 1. c. 11 & 14.

Arist. H. A. l. 4. c. 2.


Arist. H. A. l. 4. c. ult.

Plin. H. N. l. 9. c. 31. Sexus.


Plin. H. N. l. c. Vita.

Arist. H. A. l. 4. c. 10.

Plin. H. N. l. 8. c. 1.




Locusta marina.




Astacus marinus com.

See Krebs.




Astacus seu cammarus.

See Krebs.




Astacus cammarus.




Leo seu


Elephantus.



Astacus parvus marinus.



Astacus similis pediculus marinus.



Arist. H.A. l.5. c.17. l.8. c.17. lent inter se depugnant, istis cum aliis, quod denique vere & autumnopost partum operculum exuant.

Vfus. Plin. H.N. l.9. c.37. Athen. Diapnos. l.3. Lem.deOcult. Natur. l.3. In Cibo laudantur plenilunio, quia sydus tepido fulgore mitificat tempore verno & autumnali, & cum uterum gerunt. Grati sunt saporis, sed duræ carnis, ideò coctionis arduæ. In Medicina, ad canis rabidi morsum, tabem, & fervidorum humorum destructionem conferre, Lemnius tradidit.

TITULUS II.

De Crustatis in specie.

CAPVT I.

De Crustatis caudatis.

ARTICVLVS I.

De Locusta.

TAB. II. I. **C**RUSTATA in Caudata & Rotunda optimè dividemus. Illa sunt, Locusta, Astacus & Squilla. Locustam Ildorus, à pedum longitudine dici putat. Græcis est καρχήδων, ὡς τὸ τῇ καρχαβαίνειν, quòd capite incedat, vel eo sit multum prominente, καρχήδων apud Trallianum, Hesychio & Varino Ἀιγλήδων, à caudæ motu, καρχήδων & κηροφίς. Ab aliquibus γερραφίαι, ab aculeis, ὡς τὸ γερραφέν καὶ καρχήδων, id est, ad scribendum & sculpendum idoneis. Aristophanis scholiastes παγέρες τὰς περὶ ἡμῶν καρχήδων exponit. Hirtò asperoque sunt corpore.

Descriptio. Duo eis ante oculos cornua magna, initio aspera & aculeata, deinde rotunditate præpilata, (κέντερον Oppianus & Ælianus, Aristoteles κέντερον, nos antennas vocamus) in exortu crassissima, quæ paulatim magis ac magis ita gracilesunt, ut tandem in tenuissimum cirrum desinant, in omnemque partem pili instar flecti possint. Oculi corneis semper prominentes, & exerti, in obliquum mobiles, aculeis acutissimis firmissimisque utrinque tanquam propugnaculis

muniuntur. Oris lateribus additæ appendiculæ tanquam parvi pedes ad tutelam. Dorsum asperrimum est & aculeatum, velut è fronte aculeus magnus eminet. In lateribus brachias habet veluti è pilis coagmentatas, pedes utrinque quinos annumeratis extremis chelis, quas Gaza modò forcipes denticulatos, modo brachia forcipata interpretatus est: flectunt eos in obliquum, ut chelas introrsum. Cauda lævis & sine aculeis ex quinque tabellis contexta, in pinnas quinque desinens, natandi causa, ei tanquam remoinnuitur, & in ea totius corporis robur situm est, quod experieris si ea parte Locustam apprehendas. Dentes habent primores binos maiusculos & gulam ante ventrem exiguum, in quononnulli dentes, & similis muti humor. Cor ex nigro rufescere observavit Bellonius. Mare cum excipiunt ore, transmittunt id ad suas branchias, quarum plures quàm alià crusta intercepta obtinent. Præterea meatus pectoris dependet usque ad exitum excrementi: is pro vulva fœminis est: genitalis verò semen continet in manibus. Iacet autem in concavo carnis, ita ut interiaceat caro. Nam intestinum ad partem curvam situm est, meatus ille ad cavam; non alio modo quam in quadrupedibus continetur. Neque verò id alià specie est in masculo & fœmella, sed utrisque & tennes & candidi, ac pallidum continent humorem. Et utrisque eadem origo à pectore. Quem Aldrovandus appinxit dorsum habebat inter atrum & cæruleum medium, dentem superiorem triplo maiorem inferiore. Vterque intus tuberculis caret, & utrinque est acutus.

Reperiuntur in mari, circa Sigæon **Locus.** in primis Athon & Ligustico. In Indico quatuor sunt cubitorum. Hyeme *Plin. H.N. l.9. c.3.* verò aprica littora sectantur, æstate in opaca gurgitum recedunt, petrosisque locis vivunt. In Ligustico nigricantes Pierius Valerianus conspexit.

Victus ipsis pisciculi, quos circa cubilia capiunt, & captos ori forcipe suo admovent. Murænas & congnos maiores devorare, & cibos ore terere, quod

Bellon. A-
quatil. l. 2.
c. 3.
Genera-
tio.

Arist. H. A.
l. 5. c. 17.

re, quod oris constitutio & gulæ angustia ostendit, observavit Bellonius. Vita omnib. diuturnior. De Generatione ita Aristoteles. In genere crustatorum locusta post coitum impletur, & continet ova circiter menses tres, Maio, Iunio Quintili. Deinde edit ea sub ventread plicaturas: ubi crescunt, quomodo solent vermiculi. Id quod commune est & molluscis & piscibus oviparis, ut omnium ova crescant. Locustarum igitur ovum est solutile in arenâ modum, octo in classes partitum: pro numero scilicet cooperulorum, quæ lateri adhærent. Quorum singulis cartilagineum quiddam adsitum est: circum quod hærent cumulata specie ramis: unumquodque enim horum cartilagineorum in plura scinditur. Quodprehendas, si diducas: sin aliter intueare, unum corpus concretum putes. Grandissimum quodque non est ad foramen, sed ad medium: postrema autem minima. Minimis magnitudo quanta fici granulo. Neque continuo ipsi meatui hærent, sed medio. A cauda namque ad pectus, duo, singula utrinque sunt potissimum intervalla. Sic enim etiam cooperula ipsa disposita sunt, ut à latere tegere non possint. Quare extremitatibus suis imposita cooperuli modo contegunt omnia. Videtur autem parturiens producere ova ipsa ad illa cartilaginea caudæ applicatu. Comprimens enim sese atque statim curvans parit. Cartilaginea hoc tempore augescunt ita, ut ovorum ipsorum capacia esse possint. Nam ad cartilaginea pariunt sicut Sepiæ ad malleolos, aut alia quæ fluitant. Is est pariendi modus. Concoquit autem ibidem potissimum vicenis diebus. Tum abjicit cuncta simul consistentia sicut cum eiecit, videntur: inde ex his locustæ oriuntur die ferè quinto decimo: capiunturque sæpè numero minores digito. Ante

Aristot. H.
A. l. 4. c. 2.
Sexus.

Sexus differentia in eo consistit, quod fœminæ primus pes bipartitus sit, mari continuatus uno ungue.

Fœmina quoque pinnulas quæ subtus sunt magnas habet, sed collum versus decrescetes. Mas omnes æque minores. Maris etiam pedibus postremis quasi calcaria quædam sunt: eaque tum magna, tum acuta, fœminæ eiusmodi pars parva & inoffensa. Rondeletius addit in caudæ supina parte fœminam habere appendices duplicis pinnis similes, ad contegenda & conservanda ova: mari simplices & parvas. Vulvam bifurcatam habere, Aristoteles testis est.

Aristot. de
Gener. l. 3.
c. 8.

De Natatu, pedes anteriores, in eo qui maiores sunt moveri Bellonius negat, sed pinnulis quas partim sub cauda gerit, partim in extremo eiusdem, tum quaternis reliquis pedibus natate asserit. Cum nullius rei metu afficitur anteversum progreditur non prætensis sed obliquatis ad latera cornibus, ne aqua contra natantem ruens reprimat cornua, & ulterius progredi prohibeat. Retrocedens in metu, demittit & laxat eadem, & tanquam remis altius demissis Scapham propellens, multum itineris conficit. Latent mensibus quinque, & more arietum cornibus dimicant. Lædi non posse nisi sub cauda tradit Rondeletius. Antiparhiæ si attendas, tantum Polypum pavet, ut si juxta viderit omnino moriatur. Murænam eadem aggreditur, & ex victa prandium instituit.

Motus.
Bellon. A-
quatil. l. 2.

Ælian. H.
A. l. 9. c. 25.

Plin. H. N.
l. 9. c. 30.

Antiparhiæ.
Plin. H. N.
l. 9. c. 30.

Ufus.

Vsum in Cibus si spectes, Collimendon idè Carabi accepit nomen & hoc cibi genere impensè delectaretur. Eliguntur gravidæ & tempore plenilunii. Præferuntur in Italia ab Octobri usque ad Aprilem: præferuntur & maximæ, quales capiuntur in mari Indico, & circa Africæ quoddam littus loco petroso, ut scribit Synesius. Plus carnis habent quàm Cancris, ut Diphilo Siphinio apud Athenæum visum, difficulter concoquuntur, sed admodum nutriunt falsi humoris sicciq; participes, & si aqua dulci sæpius coquantur, ventrem cohibent. Condituras vide apud Aldrovandum. Vsum in Medicina q; spectat, Hippocrates puerperæ ut melius

Hippoc. l.
de morb.
mulier.

melius purgetur præscribit. Simeon Sethi testas combustas ac cum mero vino potas renes calculosos expurgare scribit.

ARTICVLVS II.

De Astaco.

PUNCTUM I.

De Astaco marino commun.

T A B. II.
2.
Nomen. Astacus ex sententia Rondeletii, quasi *ἀστᾶς*, id est, non destilans sed abundè fluens dicitur, quòd tubercula plurima, tum alba tum purpura guttarum, sive lachrymarum specie forcipibus inspersa habeant.

Descriptio. Est vel Marinus vel Fluviatilis. Ad eum Leo seu Elephantus Plinii, & istæ quem hic descripturi sumus pertinet. Est autem Astacus colore toto nitido, sed nigritia insperso. Pedes inferiores grandes, ad octo usque habet: ab his grandes sp̄s duos multò majores & mucrone latiore, quàm locusta, sed specie diversâ. Dextri namque summum latum oblongum tenue est: sinistri crassum & teres: utriusq; verò bipartitum ac quasi mandibula cum dentibus infra supraque. Quanquam dextro dentes ferrati sunt omnes, alterius primores ferrati: at interiores tanquam molares. Inferiorum ordo quaternis æqualibus, superiorum ternis inæqualibus expletur. Movent partem superiorem utrique, & ad inferiorem premunt: ac valgi quidem sunt situ inferiore, tanquam à natura destinati ad protendendū & premendū. Supra hosce duo alii hispidi paulò infra os. Mox haud longè infra, branchiæ circum os multæ & hispidæ, quas assiduè motat. Hi pedes qui oris præstò sunt, extantibus quibusdam tenuibus barbulis asperantur. *Dentes* duos habet ut locusta: supra hosce cornicula breviora ac tenuiora quam locusta. Tum alia quatuor eadem

specie, sed breviora & tenuiora, super his oculos pusillos breves. Prominet pars cui subsunt oculi, acuta & aspera quali frons, major quàm locustis. Omnino facies acutior, pectus autem latius: totumque corpus carnosius ac mollius quàm locustæ. Octo pedum quatuor bifidi, quatuor nò: quod collum appellatur, quinquè in partes divisum est extrinsecus. Tum est sexta pars lata quinquè producta plagulis. Hactenus Aristoteles. Gesnerus Chelam faciè hominis ridiculâ representantem exhibet. Nam Chelæ pars minor maximum & aquilinum nasum refert: & quæ in utriusque partis confinio apparent verrucæ, oculos, si supercilia addantur. Superiorem partē quatenus seu cornicula quatuor supra nasum & frontē eminent, cæruleo aliove colore si pictor inducat, ad representationē pilei auriti & ad latera descendētis, ita tamen ut aures lateant: retrò & circa tempora pili prominent nigri. Facies partim albo inducatur pigmento, partim roseo fuce niteat. Lingua instar partis chelæ majoris tubero rubicundo colore insigniantur. Quòd si cristam quoq; è pennis præfertim gallinacei, capi aut pavonis nutantē, foramini summo indideris, planè Gorgoneam & terribilem habebis faciē.

Nunquam nò in Oceano frequenter: in Euxinio tamen nulli. In saxis habitare Oppianus prodidit: Aristoteles in terrenis. Circa Thasum & Hellepontum nascuntur. *Coerunt eodem modo quæ cætera crustata.* Mas fœminaque nulla nota insigni inter se differunt. Nam utriusvis uterque libet forcipem majorem deprehendes; quanquam utramque æqualem unquam neutri. Ore mare excipit, cum locustæ ad branchias transmittant. Sine humore longius à mari deferri nequit: & tam est loci patrii amantissimus, ut non longè deportatus, eodem adrepāt. Polypum extimescit.

Quantum ad *Usū in Cibis*, optimi *Ufus* in illi apud veteres qui in Methymna *Cibis*, capie-

Oppian.

Halieut.

l. 1.

Arist. H. A.

l. 5. c. 17.

Gene-
ratio.

Ælian. H.

A. l. 8.

c. 22.

Ælian. H.

A. l. 6.

c. 22.

capiebantur. Omnes difficulter coquantur, & tardè descendunt: ritè confecti & præparati non imbecilliter alunt. Mnesitheus assos elixis prætulit.

PUNCTUM II.

*De Leone seu Elephanto &
Aftaco parvo Rondeletij.*

TAB. II.
5.
Nomen.
Bellon. de
Aquatilib.
l. 2. c. 3.

Ælian. H.
A. l. 14.
c. 9.
Descriptio.

CRustatum quòd hic descripturi sumus, nomē Leonis vel à magnitudine, ut Aldrovando videtur, vel à colore flavo, quo vivus conspicitur, ut Rondeletio placet, sortitum est: Bellonius cum Elephanto Plinii idem facit, quòd eadem sit Leonis apud Ælianum & Elephantum apud Plinium descriptio.

Corporis specie Aftaco affinis est, sed brachia longiora habet, forcipes tenues & latiusculos, quorum scissura major, quàm in ullo alio Crustatorum genere. *Pedes* tres qui proximè brachia sequuntur, longiores sunt, aculeati, in calcaria terminati: ultimus exiguus brevis & tenuis, neque aculeis, neque pilis munitus. Præterea ab Aftaco dorso aculeis differt, quibus cum locusta convenit. Utrunque *cornua* duo longissima tenuissimaque habet, item alia in fronte breviora, inter quæ unum in fronte eminēt acutum, neutrà parte ferratum: hæc sunt oculorum propugnacula, qui cornei sunt & prominent. *Corpus* totum undulatum est, instar panni ex hircorum camelorumque pilis contexti. *Cauda* perinde ac in Aftacis in pinnas quinque definit, sed lineis magis distincta. Scaliger unum vidit, cujus brachium puerilis brachii magnitudinem æquabat, quantum & ille quem Aldrovandus Brundisio sibi missum describit, habebat.

Plin. H. N.
l. 32. c. 11.

Plinius Elephantum suum nigrum esse vult, id est, violacei exsaturati coloris. Nam *κυανός* Græcè de nigro, ut de Æthiope, & cæruleo, ut de mari dicitur. *Forcipibus* adeò valent, ut ob-

servatum sit, Massiliæ vulpem per totam noctem, ab uno detendam fuisse.

Apponuntur lautis in Italia con-
viviis, Ælianus, adipem squalidæ & infuscatæ faciei nitorem afferre, reliquit.

ASTACVS parvus marinus Rondeletij semper est parvus. *Corpus* ei vivo rubescit, alioqui lineis cæruleis transversis variatum. *Capite* & thorace est rotundiore quàm fluviatilis, in lateribus inciso. E capite eminet *Cornu* latiusculum, magnum si totum corpus spectes, utrinque ferratum, inter oculos situm, quas recondit & exerit. Cornua quatuor oculis præfixa sunt, dum & breviora cornu ferrato viciniora, alia duo multò longiora, flexibilia, articulata. Chelam utrinque unicam habet denticulatā, quaternis articulis connexam. Utrunque pedes sine forcibus. *Collum* tabellis constat, & in pinnulas definit. Sub cauda appendices sunt ovis reponendis destinatæ.

PUNCTUM III.


De Cammaro seu Aftaco fluviatili & aliis.

Astaci fluviatiles Galeno *καμμαρί* *Tab. II.*
dis, Athenæo *καμμαρί*, modernis *Tab.*
Græcis Caranides & Caranidia dicuntur. *Tab. III.*


Circa eor. *Descriptionem* non est quòd multum laboremus, hoc tamen poni potest. Ventriculū mutim undique ambire, quā quidam stercus esse credunt, Bellonius hepar, sed falsò, quòd hoc solis sanguineis datum sit: Eundem tam miro artificio fabrefactum, ut etiam in ejus fundo alterum os comperias suis maxillis & dentibus refertum. Utrunque etiam spiraculum seu foramen sub cortice ad latera oris videas, per quod aquam ore acceptam referunt. Branchias habere ex Aristotele Gaza & Rondeletius prodidere: Philosophus enim *βραγχίαι*, hoc est, partis branchiis similes dixit.

Gesne-


Cancerus. *See Krebs.*




Astacus Minor. *Kleiner Krebs.*



Astacus Maior. *großer Krebs.*



Astacus Japygius.





Gefnerus cirros potius esse iudicat, ad motum progressionis natationisque à natura datam, vel ne aqua *Helmont.* inrorsum penetret. De *Lithiis* memorabilia prodidit Helmontus, quæ sequuntur. Per plurimas inquit atque uniformes cancrorum discretionis ista comperi. Inprimis stomachum cancri esse in capite propè verticem. Mares enim quotannis ægrore incipiunt, à mensis Junii medio: tæmellæ dein in Julio ante testarum exuvium. Sunt enim per dies novem & amplius velut semiexanimes ac immoti. Quæ tempestate stomacho illorum exterius obducitur membrana nova, inter quam & stomachum veterem, est liquor quidam lacteus, qui sensim exterius in globum stomachi convexum, quâ parte attingit, obduciturque stomachum veterem, contrahitur utroq; latere in concavum, statimq; lapidescit. Interim nec tunc nec multò post cancer esitat quicquam. Ideoque (penè incredibile) vetus sive interior stomachus, sensim in mucilaginem alimentariam absumitur; exteriorque ac novus alter stomachus, in vicem absumpti, succedit. Siquidem isti lacti, ad stomachi veteris convexum subnato, obtenditur statim pellicula, per modum lacti tepenti solitum: crescitque lac istud, inter utramque præfatam membranam, utriusque scilicet stomachi. Quæ cuncta ducentis fortè cancris dissectis, dietim observavi, jucunda admiratione. Tandem residua pars lactis, cancro cedit in alimentum. Nichil autem cancer edit, aut in eius stomacho reperitur, quantisper isti lapides sunt in stomacho eius, vivitque circiter XXVII. dies tam ex veteri suo stomacho, sensim absumto, quam ex usu resolutorum postea lapidum. Hucusque Helmont. Albertus plenilunio crescere putat.

Locus. Reperiuntur passim in fluminibus, lacubus, & rivis. In Pannonia tam frequentes ut Julius Alexandrinus sæpe supra triginta currus Astacis onustos, in foro Gammario Viennæ numeravit. In Hispania non haberi affirmant quidam.

Victitant cadaveribus, & carnibus, *Victus.* & quidem his adeò delectantur, ut in Danubio de navibus suspensis, magna multitudo adhæreat. Ranas quoque appetere, Albertus testatur, & nos experientiâ comprobatum habemus. Per tredecim dies vivum absque cibo conservavit Gefnerus *Sexus* notis distinguuntur. Mares in ea parte quâ corpus ad caudam continuatur subtus, quatuor longas prominentes virgulas habent, quibus fœminæ destituuntur. Cauda etiâ illius, rotundio, planior & spissior; tenuis, vacua, & lata huius, majorq; tabellarum in eadem distantia.

De *Generatione* hoc sciendum, *Genera-* rem in coitu primò supra dorsum fœminæ ascendere, mox se istam supinâ vertere: per solam meatuū applicationē coire: membro n. q. alterius corpus ingreditur destituuntur: Ova per anum, per quem & excrementa reddunt, parere: & sæpe minimos Astacos caudæ matris adhuc adhærentes conspici. Albertus ova fœminæ primò in corpore valdè compressa esse, dein paulatim exire & virgulis curtis sub cauda dones complectantur adhærescere, scripsit. Hyeme mensibus quinque *latent*, si cōmunem opinionē sequaris. Aliqui enim tū etiam apparere ac ad litora prodire; æstare ad optatas aquas gregatim concedere dicunt. Novilunio emaciantur, plenilunio pinguescunt.

De mirâ quædam inter Cancros *Antipathia.* & parvos *antipathia*, sic Helmontus. In Marchia Brandeburgica locupletissima est cancrorum piscatio. Vectores autem coguntur noctu excubias agere, ne fertè porcus aliquis vel leviter subter currum transcurrat. Nam id si contigerit, manè quorquot cancri, in curru fuerint inveniuntur mortui. Tam exitialis est porcus cancro.

Dividuntur in *Minores* & *Majores*. Illi, *Differen-* quòd sub saxis degant, saxatiles *tia.* dicuntur, parte supinâ albicant, proni nigricant, elixi non undiquaque rubescunt. *Majores*, rotundiori sunt magisque crenato in Pado cor-

Astacus flu

1

Edel Krebs

Tab. III.

Astacus fluviatilis

2

Squilla lata

3

Squilla lata Rondel.

4

Carangon seu *Carangon* Rondel.

6

Squilla gibba Garner.

5

8

Squilla *Vrfa* minor.

Squilla parva

7

Squilla *mantis*.

9

hoger Krebs.

Squilla.

10

Leo Rondel.

11

Leu.


Squilla lata Bären Krebs

12

Squilla gibba.

alia.

13



Arist. H. A.
l. 4. c. 2.
Sexus.

De *Sexu* ita Aristoteles. Distinguitur à fœmina mas duabus particulis candidis, quas ipse peculiare habet in carne pectoris, sed ab ipsa discretas tum color, tum concretionem, similes sepiarum promuscidi. Vorticofæ hæ sunt, quemadmodum buccini anfractus, quem Græci *μύκωνα*, id est, papaver vocant: Oriuntur ex abacetalibus, quæ sub extremis sunt pedibus. Est etiam in pectore caro rubra, sanguinis colore, quæ tamen atrectata dilabatur, neque similis carni sit. Ab ea meatu qui in pectore buccini refert speciem, alia est sinuatio funiculi crassitudine, sub qua duo, quædam sunt appensa intestino arenacea genitali femini destinata. Atque hæc mas habet. At fœmina ova ibi, colore rubra, quæ annexa ventri, atque utrinque latus intestini, ad carnosas usque partes, membranâ tenui continentur.

Generatio.

Coëunt more quadrupedum retro mingentium, scilicet, ut fœmina caudam supinam exponat, mas suas superimponat & applicet; & coëunt in eunte vere juxta terram, & cum ficus maturefcunt.

Antipathia.

Inimicitias cum Laborace exercent, & à Phycide ac Lupo comeduntur. Quo semodo ulciscantur, apud Ælianum habemus. Cum se, inquit, interceptas sentiunt, fastigium quod eminet à capite, quodque simile est acutissimo triremis rostro, atque in summa parte secturas habet, modo ferrulæ uncinatæ, hoc, inquam, animosæ illæ bestiæ cum incurvarint, summa lævitate saliant, & tanquam saltatorium versant orbem. Lupus ore hiantes squillam lassam comprehendit, hæc in gutturis laxitate saltat, ut gula intumescat.

Vfus.

Vfus earum & in *Cibis* est & in *Medicina*. In *Cibis* preciosum piscem Juvenalis nominat. Apicius tanti grandiusculas faciebat, ut earum gratia in Africam navigaret, cumque priusquam navi exiliret Minturaensibus minores animadvertet, gubernatorem, nulla excensione factâ, eadem via Italiam repetere juberet. Hodie elixantur & cum aceto comeduntur:

friguntur etiam in Cartagine cum oleo farinâ adpersâ. Olim ficus foliis affatæ involvebantur. Difficulter concoquantur, stomacho nocent, & Veneris desiderium excitant. Hoc & sibi contigisse Cardanus testatur. Hectici eximie prodesse nullum dubium. Ajunt tritas & particulæ impositas, cuspidem vel sagittam, si quæ infixæ, singulari atrahendi vi educere. Quidam escæ ad mugiles capiendos admiscunt. Iisdem & lupo piscis inescatur.

ARTICULUS IV.

De Squilla in specie.

PUNCTUM I.

De Squilla lata sive Urfa.

Quam Squillam latam Rondeletius vocavit, hanc nos *Urfam* & *IV*. quidè Aristotelis cū Bellonio & Scalligero dicimus. Ubi enim porrecta jacet, urfi corium extensum repræsentat. A Squillis eam separavit Aristoteles, quod sub Squillarum nomine non notet. Neapolitani Messanenses in Sicilia Messacaram, quasi sit *ἡ μέγιστος καρχήδων*, vocant.

Rondeletius eam ita descripsit. Locustarum est magnitudine, sed latior, multo & magis depresso corpore & hirto, in fronte ossa duo, utrinque unicum, in ambitu ferratum, in quibusdam acutius, in aliis latius. Hippinæ duæ alligantur. Inter hæc duo enascuntur cornua, initio articulata, circa media bifida, ut ex duabus quatuor fiant, non valde longa. Brachia duo habet cum aculeis, veluti clavis eminentibus, pedibus majora, non bifida, quæ in os flectuntur, quibus ori cibum tanquam pedibus admovent. Pedes utrinque quaterni sunt. Oculi parū prominent. Frons quadrata, & latior quàm in ullo Crustatorum genere. Tumores multi per dorsum sparsi sunt, ex quibus extant tubercula, quorum summa pars adeo rubet, ut carbunculus in annulorum pala inclusas dicas.

TAB.
IV.

3. 4. 8. 12.
Nomen.

Scalig.
Ex. 245.

Descriptio.

Scalig. Ex.
245.

In Coenosis vivere argumento est, quòd luto obfita è mari extrahatur. Rarò in Gallia capitur; Romæ & Neapoli frequenter; in Africa frequentissimè. Circa Minturnas Campaniæ oppidum majores sunt Smyrnæis. Idem eis pariendi tempus natura statuit q̃ Locustis. Per hyemem & vere prius q̃ ova excludunt laudantur, Et hæc de Vrfa, quæ Major dicitur, accipienda sunt. Est alia quam Minorem & Calatam vocant. Scaliger Cangren Aristotelis credit, Rondeletius Cicadam marinam, quòd cum Cicadis terrestribus magnam similitudinem habeat. Quinque tabellis constat, & dorso egregio naturæ artificio variè cælatis & sculptis. Torarubet. Dodrantalem magnitudinem vix superat.

PUNCTUM II.

De Carangone & Squilla gibba.

TAB.
IV. 6.

Descriptio

QUAS Aristoteles καργώνας aut καργγας, Hesychius καργώνας vocat, eæ Gazæ sunt Crangines.

Est verò hæc Squilla, si Descriptionem attendas, palmi majoris longitudine. Contegitur crusta tenui, lævi, candida, nonnunquam ex albo parum rubescente, quæ cocta, tota rubescit, cornu instar pellucida. E dorso enascitur cornu in fronte ferratum, fursum recurvum, cuius denticulata asperitates in superiore & inferiore sunt parte non in lateribus. Oculi sunt cornei, in quibus subjecta pars cava cochlearis modo. Cornua sunt quatuor, ex quibus duo benè longa, tenuia & flexibilia. Pedes habet quinos; qui in calcar terminantur terni sunt.

Posterior pars pro reliqui corporis crassitie & magnitudine longa, septem tabellis constans, in quatuor pinnas desinit: è quarum medio extat aculeus latior quàm in Squilla gibba. Quam Gesnerus vidit, partim rubebat, partim dilucius

albicabat, ad latera flavescebat.

Sunt omnium crustatorum sapidissimi. Carne tenera dulci, bonique & multalimenti constant. Caudæ in primis crusta spoliata, cum pipere, sale & aceto, mensibus Februario, Martio, Aprili, Majo, laudantur.

SVILLA GIBBA κυφίς, propter gibbum quem habere videtur dum se curvat dicitur. Alii καμπύλας & κυρτάς vocant. Græci moderni Caridas & Caranidia nuncupat. Crangonibus sunt tenuiores maximè in cauda extrema. Senos ante frontem gerunt valdè tenues cirros. Caudam contractam, in cuius extremo pinnae sunt quinæ: quarum quæ medio loco posita est, ferratam duram, atque in acutum fastigiatam formam habet. In Santonum littora maxima earum copia. Ova pariunt & generant Locustarum more. Ceterum menses circiter quatuor gerunt. Cornu frontis elatum in palatum Lupi piscis infigunt, eumque interimunt. Ubi tanguntur saltant, actangentem sæpè expavescunt, corpusque in aqua gibbosum arcuato motu promovent erucarum modo. Vendebantur olim in sportulis ex junci rimine contextis, friguntur cum oleo in sarta, ine: aut elixantur in aqua & comeduntur cum aceto.

PUNCTUM III.

De Squilla parva, & Squilla Manti Rondeletij.

SQUILLA parva nomine proprio caret. Squilla Aristotelis, non est, ut perperam Gaza convertit. Chelas enim hoc, Astaci modo habet. Quidam ex γλάγος à colore fortasse, quem vivis Rondeletius obscurum tribuit, dici volunt. Alii μελιναιδίας apud Athenarum propter suavitatem in cibo. Duplex istarum est genus. Unum Majus, durior crusta quàm Squilla gibba, q̃ vivū in aëre saltat, & noctu ut candela lucet, Cambaretto Romanis.

Alterum Minimum, ut tam exiguum,

Vfus.

TAB.

IV. 5. 13.

Descriptio.

Aristot. H.

A. l. 5. c. 17.

Anexandr.

in Pindarr.

TAB.

IV. 7.

Arist. H. A.

l. 5. c. 15.

Differen-

tia & de-

scriptio.

guum, ut mille vix libram æquent pondere, Venetiis frequens. Cocis quibusdam Brava, Vasconibus, Civade, id est, avena, pugillatim enim devoratur. *Caput* habet pro Corpusculi magnitudine crassum & latum, sine cornu. *Caudam* tenuem, gibbum parvum. *Oris* appendicibus & aliis Gibbæ similes, punctis aliquot variatur. Bellonius vias subfulvaspectari ait, coctas rufescere.

Locus.

Et in mari, & in fluviis nascuntur: etsi Bellonius longè à mari provenire dicat. De Garumna canistris excipi, Scaliger testis est. Tarentinus fluviatiles nominat.

Vfus.

Carne sunt adeò dulci, ut fastidium pariant. Vix ullum aliud Cibi genus, teste Rondeletio, dulcius degustaveris. In aqua hordei lotæ, & in carnis jure coctæ, hæcticis maximè conveniunt. Cum crustis adjecto pipere elixæ, venerem stimulant. Icon quam hic damus, Gesneri squillam parvam exprimit.

TAB.
IV. 9.
Aldrov.
l. 2. c. 16.

SQUILLA MANTIS, nomen à bestiola quadam ex Locustarum genere accepit, nec antiquis est dicta. Occitani eam Preguedicus, id est, precantem Deum appellant, quod semper manus junctas teneat, & corpore sit, jejunantium instat, gracili & macilento. Divinare eandem vulgus credit, & de itinere quæsitam alterum brachium extendere.

Mathiolus *Hippocampum* appellat, Bellonius *Cicadam marinam*, quam *Speusippe Nymphæ* esse suspicatur, eandem ita descripsit.

Descriptio.

Tenuis est, inquit, huius crusta, cruda ita albicat, ut ferè transpareat. Una cum pisciculis marinis sæpe suo cortice contexta extrahitur, & simul cum carpionatis, bocis, mænis, & trachuris canistris inseritur. Natura incredibili ferè artificio. Cicadæ oblongum corpus decem *tabellis*, affabrè articulatis loricavit: quarum prima, quæ caudam extremam conficit, caudam in lateribus expandit. Cauda porro duabus maculis

phœniceis subrubris insignita est, quæ duorum oculorum speciem præ se ferunt, estque aculeata & crenata. Prima tabella à cauda incipiens, versus secundam, tertiam, quartam, quintam, & sextam, pinnulis fimbriatim multiplicibus subrus munita est quibus, dum in mari natat, aquam percutit, & corpus incitat.

Tres *tallellæ*, quæ sex prædictas subsequuntur, ternis utrinque pedibus communitæ sunt: ad cervicis autem initium, duo brachia majora oriuntur, quibus cibum apprehensum ori suggerit: sed ea cancris, alter quam locustis forcipantur. Sunt enim in longum exporrectæ, atque in extremo grandioribus crenis suffulta, quibus cum cibum corripit, ex uno brachio, ad aliam brachii articulationem transfert.

Horum autem extrema velut in duritiem osseam abeunt denticulati scalpiis conficiendis ob id expetita. Pars quæ capiti contigua est, in exile quiddam terminatur, & contra quam cauda se in latum diffundit. Extra aquam prorsus immobilis & imbecillis est.

Aculeum unum habet utrinque ori præfixum, ut Phalangium & Scolopendra, quo mordicus cibum à pedibus suggestum continet quem postea dentibus conficiat, & in stomachum detritat.

Dentes illi natura in oris lateribus protulit, unico utrinque ossi crenato, V. litteræ formam referente infixos. Cujus anterioris partis officium est, ea incidere quæ manditi posterioris verò quæ crenas habet, conterere. Nam idem os, duos habet dentium ordines.

Prætenturæ duas in fronte breves, urfinis similes, ostendit, trifariam in extremo diffusas: ac rursus duas alias in lateribus prædictis breviores. *Oculos* habet virides, exertos, quos non alveo ut Cancrarium & Locustarium genus condit: sed ante hos pinnulas exporrigit eis similes quas in cauda gerit: ex quo multi decepti caudam *caput* esse crediderant. Strias rectas intergore, atque in capitis tabella ductas

ductas profert. Pisce dissecto, *dentes*, fortib. musculis movere conspiciuntur. *Cerebrumque* adeo esse exiguum, ut vix hordei grani magnitudinem æquet: Optici tamen ad oculos perducii apparent. Rondeletius toto corpore pellucido esse addit. Eodem modo parit & coit, quo alia squilla.

Vfus.

TAB.
LI.

Marcgrav.
Hist. Brasil.
l. 4. c. 20.

Carne est molli, dulci, delicata. Huic affinis est *Tamarugvacii* Brasiliensium, *Camaron de Salgado* Lusitanis dicta. Caput habet triangulare. Barbam cancerinam octuplam. Et in eo tantum à Manti differt, quod in anteriori parte corporis pedes non habeat, nec brachia interius ferrata.

CAPUT II.

De Crustatis rotundis.

ARTICULUS I.

De Cancris in genere.

CRUSTATA quæ Latini Cancros vocant, Græcis *καρκίνοι*, quasi *κορυμβοί*, quod *κόρυς*, id est, pupillas, & oculos mobiles habeant, dicuntur. Siculi *καρχαί* vocant, Hefychius *καίριος*. Apud Varinum *πύλαρις* vel *πύλαρις* Cancer dicitur, quod ostrea lapillo inter testes seu valvas (*πύλας ἢ πύλας*) injecto, venetur. *Caudam* habent revolutam, sine *ἐπικάλυμα πύλας* Aristoteles vocat, quæ extabellis constat, & corpus posteriore parte integrit: *Caput* indiscretum. *Cerebro* carent, etsi partem quæ cerebri fungitur munere habeant. In obliquum aspiciunt inclusis crustæ fragili oculis. Pedes qui in obliquum feruntur eis deni cum forcipibus, quorum dexter in omnibus major, & in primoribus superior pars movetur inferiore immobili.

Descriptio.

Arist. H. A.
l. 4. c. 10.
c. 3.

Plin. H. N.
l. 9. c. 13. c.
l. 11. c. 48.

Arist. de part. 4. c. 8. *Dentes* interius bini primores, & inter eos caruncula linguæ effigie. *Stomachus* ori continuo junctus exiguus.

Plin. H. N.
l. 9. c. 31. *Mollibus & petrosi locis* gaudent: quin & sub terra inveniuntur. Hye-

me aperica littora sectantur æstate in opaca gurgitum recedunt.

Vesuntur conchiliis. Polypum ob nimiam Venerem imbecillum devorant, nec à suo genere abstinere. A-
quam quam ore excipiunt, parte oris exigua emittunt, hinc apparet circa spuma, quod aqua & aër, quicum ea hauritur, per attractum & rejectum agitentur.

Galenus dulci & falsâ aquâ vivere scribit. Lacte potatos sine aqua diutissimè, author de natura rerum.

Generationem si spectes, Cancr prior copulantur, sua opercula, loculosa illa rugosaque, mutuâ confertione cõponentes. Primum Cancr minor ab averso supervenire solet, tum major, ubi ille supervenerit. *Ova* edunt in operculo, hinc istud tæminis latius, & hirsutius; ita à maribus discernuntur.

Addit tamen Plinius, fœminæ primum pedem duplicem, mari simplicem, eundem duas inter ventrem & caudam spinas habere, quibus illa caret.

Soli è crustatorum genere non nant, sed incedunt, & quidem transverso latere quod simis & uris, propter posteriorum pedum latitudinem competit. Cum enim motus tractatione & pulsione fiat, & sic secundum artuum flexiones, quæ Cancris introrsum ad pectus sunt; ideo quasi cum triremes circumaguntur, lateris unius remiges impellunt, altrinsecus inhihent, aut retrò trahunt, ita quam in partem processurus est cancer eius lateris utitur cruribus ad carpendum solū, alterius lateris ad aspellendum.

Insidias incredibili sagacitate subodorantur, & confestim se vel luto obruunt, vel inter saxa subducunt. Universi ubi aliquando congregantur, os Ponte evincere non valent: quamobrem regressi circumeunt, apparetque tritum iter. Concurrent inter se ut Arietes adversis cornibus. In capiendis ostreis & conchis, summa calliditate utuntur. Calculos enim & lapillos, patulæ hiantique eorum testæ ingerunt, ita ut occludi nequeat, mox dentato forcipe pisculentâ carnem abra-

Locus.

Vitus.

Arist. H. A.

l. 4. c. 2.

c. l. de Re-

spirat.

Galen. de

cib. bon. &

mali suc-

ci.

Genera-

tio.

Arist. H. A.

l. 5. c. 7.

Plin. H. N.

l. 9. c. 31.

Motus.


Natura, &

Ingeniū.


Plin. H. N.

l. 9. c. 38.


Tamaru Guacu.




Cancer marinus. Krab. Tab. V.




Cancer Anonimus Randal.




Cancer Heracleoticus Rond.



Cancer maier. meer spin.



Hypocarcinus.




Cancer Heracleoticus alter.




Cancer


Crabbr.




Cancer Randal.



Cancer Krabbe.




Cancer Heracleoticus. 3.




13

Pagurus farn.



12

Pagurus maier. meer spin.



abradentes devorant. Sole signum Cancri transeunt, Cancrorum cum exanimati sunt corpora in sicco transfigurari in Scorpiones Plinius author est. Ovidius, brachiis orbos, scorpis, si sub terra occultetur producere, p. didit. Latent mensib. quinis, & veris principio senectutem anguium more exiunt renovatione tergorū, & tum mollis ad modum crusta subnascitur, & vix præ teneritate ambulare possunt.

Duræ sunt carnis, ideò difficiles, concocti, sed firmi alimenti. Id apud Galenum, Athenæum, & aliis invenies. Nec in Medicina spernuntur. Plinius Sole cancri signum transeunte contra serpentum ictus mederi tradit. Sues percussas hoc pabulo sibi mederi Thrasyllus author est. Apri hyosciami devorato Cancros pro remedio quærunt. Cervi à phalangio vel quovis alio admorsu iisdem sibi medentur. Carbunculos & carcinoma in mulierum parte, præsentissimo remedio sanari, tradunt, Cancro fœmina cum flore salis confuso, post plenam lunam, & aquâ illitâ, ut apud Plinium legimus. Ad stranguriam, tres, in aceti cyatho cocti, in mortario confusi & expressi propinantur. Succus cum aqua florum Cyani destillata expressus, gingivis puerorum in dentitione salubriter illinitur. Pulverem Ranzovii ad dissectionem nervi apud Aldrovandum vide. Lapis in capite repertus, & aceto acerrimo immixtus, motum manifestum habere deprehenditur.

ARTICVLVS II.

De Cancris in specie, & quidem de Cancris extra conchas in salsis aquis degentibus.

PUNCTUM I.

De Cancro marino.

CAncri degunt extra conchas, vel in istis. Illi vel sunt in aquis salis, vel in dulcibus. Inter illos qui in aquis salis sunt. *Cancer marinus, Cancer Maja dictus, Pagurus, Cancer eques, Cancer fla-*

vus, undulatus Rondeletii, Cancer varius, Aldrov. de Cancer cordis figura & alii Chelarū lōgitudine differētes. Cancro marino generis nomen inditum est, nec in eius descriptione Rondeletius, Bellonius, & Gesnerus conveniunt.

Rondeletii acuminatus magis est parte anteriore prope oculos, & duo habet cornicula, quibus horū caret. Rotundo est ac circumato corpore Bellonii, anteriore, parte crenis diviso, crustaceo tegmine cōvestito. Majores trium aut quatuor digitorū latitudinem non excedunt. *Hepar* habent rubrum, quod Aristoteles multum neminare videtur. Intestina multiplicibus cirris obfessa, moventurque horum partes solidiores albis musculis agentibus. Aldrovandus aliam observavit speciem, cujus pes ultimus qui ab utraque parte est, brevioribus & crassioribus constat internodiis, & aliis pedibus est curtiore, in fine duabus, aliis articulationibus latior. Plurimi prope insulam Canibalorum, quæ hodie Domeneca dicitur, reperiuntur, & quia in saxis habitant, πετράλις Oppian. dixit. Et *mares & fœminæ*. Illis color rubentior, his ex livido in cyaneum tendit. Mares fœminas opprimere videntur antequam incant. Crura in ventrem inflectunt dum incedunt. Rondeletius fœminæ partem inesse quandam croceam scribit quâ mares carent. Ovorum putat esse materiam. In Bosphoro Thracio, vento violento ingruente, contra fluctus nituntur: Circa promontoria, ubi major vis venti, singuli in sinuoso loco se tenent.

Maximè, in *Cibis*, fœminæ cum ovis turgent laudantur, ideò majus earundem Bononiæ pretium. In India succo dulci cū luna parturit turgere; plenam eodem destitui, à quibusdam proditum. In *Medicina*, phthisicis carnem prodesse Rondeletius experientia docuit, quod & apud Marcellum invenies. Stranguriam sanant si duarum drachmarum pondere ex lacte materno vel nutricis infantibus porrigantur. Ad quartanam, scabiem, & oculorū lachrymas ab Avicenna; ad Carcinomata à Plinio laudantur. Iisdem pilosæ mamma tollunt.

d

PUN-

Aldrov. de Crust. l. 2. c. 17.

TAB.

IV. 1.

TAB. V.

Descriptio.

Ælian. H.

A. l. 7.

c. 24.

Vfus.

Ovid. Metam. l. 15.

Plin. H. N. l. 9. c. 30.

Ufus.

Plin. H. N. l. 9. c. 32.

TAB.

IV.

TAB. V.

PUNCTUM II.

De Cancro Maja dicto.

TAB. V. **C**ancer Majas dictus, nomen à
5 magnitudine sumfit. Nam *μαία*
TAB. quæ amitam & nutricem significat,
VI. 2. aliquando etiam pro grandiore natu
Nomen. funebatur.

Descri-
ptio.

Eo à Paguro differt, quòd hic parte anteriore latus sit, Maja se posteriore in latitudinem diffundat, anteriore coarctetur, & magis orbiculata sit.

Corpus illi tam grave, ut ad incesum sit ineptissima, idque vivæ livet, aut virescit, aut rubore phæniceo aspersum est; quam si supinam contempleris, tria parte anteriore brevissima specula ab ipsius crustæ tegmine continuata cernes, inter quæ prætenturæ duæ delitescunt. *Crua* quaternis articulis intercepta sunt, alta & exilia. *Pedes* utroque latere quaterni, quinque articulis intercepti, unguibus benè muniuntur. *Tibia* multa scabritie exasperantur. *Famina* operculum latiusculum habet, sub quo duo foramina membrana occlusa, in ipsis posteriorum tibiæ radicibus collocata apparent. Quatuor præterea semicirculis utitur in natando, à quorū radicibus octoni pdeunt pinnati ramuli, quibus hærent ova in foetis. *Interanea* si spectes, in capite atque adeò ore ipso duos ossæos dentes gerit: in palato, carunculam quæ linguæ vice fungitur: ante dentes bina denticulata officula, atq; in ejus ore cavitatem statim ante gulā, in qua quæ rubrum continetur, habet multiplices flexus. Vulvam esse Bellonius putat, Ex hac enim ova prodire comperitum est. Subsequitur cavitas satis capax, vacua quidem ea, dum jejunos est piscis, ut vel os alterum, vel ventriculus ejus esse dicas: cui etiam dentes adfunt numero quaterni, incisorii, & unus molaris, à quibus gula incipit, in cujus summo epiglottidem manifestè videas: ea autem ad apophyses meatibus cõmittitur adeò exilibus, ut vix appareant: & quemadmodū vulva adimplebat majorem

partem recessuū, sic apophyses ubiq; per cavitates immittuntur, tenuibus tamen ligamentis adstrictæ, & maxime musculis. Nec est aliud intestinum manifestum, quam illud in quo desinunt apophyses, excrementi scilicet receptaculum. Est autem id teres, cæteris partibus incumbens, ad caudam usque protensum. Sed & vesicam utrinque unam in ipsa alvo, robustam, magnam & membranofam cernas, cuius exitus est per ea duo foramina, quæ sub operimento latent. *Branchias* habet utrinque sub testa in lateribus numero senas: quæ certâ membranâ ab ipso tegumento distinguuntur. Aquam enim in ore acceptam per meatus qui ad radices crurum sunt egerit. Hæc omnia ferè Paguro suo Rondeletius adscripsit, quæ vide. Ad Mæam pertinent & aliquot sequentes.

Primus Hippocarcinus à magnitudine, cum addito *hispidus*, quod universum tergus aculeis spinosisque quibusdam operculis obsitum sit, quæ ad latera majora videntur, dicitur. Supra oculos emissitios è tabulis quibusdam ad latera protensos fronte media, duo velut cornicula acuta exeunt. Os infimo loco situm, duo veluti brachiola intus tota villosa muniunt. Quinque ab utroque latere pedes, si brachia annumeras, in totidem articulos distincti. Chelæ anteriori parte, brachiū puerile æquant, forcipibus fuscis coloris, è quibus villosa quædam prominentia stamina instar penicilli.


Alter est parte supina Hippocarcino non dissimilis. *Cauda* est ovalis ferè figuræ, & extremo in angustam, appendicem scutiformem quinque angulorum seu pentagonam definit. Insignis in eadem scutellata cavitas apparet. Os multis veluti brachiolis villosis, supernè & infernè circumsepitur. In ventre plana cavitas, ovis retinendis aptissima.

In *Tertio* senæ spinæ majusculæ latera utrinque ambiunt: & binæ maximæ frontē muniunt. Duos palmos est longus, chelis, brachiis, & supina corporis parte tuberosus, & hispidus.

Quartus


TAB. IV. 6

Pagurus foemina.




Cancer mixtus.

Tab. VI.




Pagurus prone.




Pagurus

Supine.




Cancer Varius

siue mar. varius.




Aranej

marini Species prone.




Cancer flavus

siue Undulatus




Aranej m. Spec.

Supine.




Araneus crustae.

prone.




Araneus supina.




Araneus alius.




Cancer brachyochelos. Rondel.




Cancer minutior.



Cancer minut.



Cancer brachyochelos.



Congener.



Quartus eiusdem est figuræ, sed pluribus spinis ab utroque latere & in dorso horret, pedibus & brachiis hirsutus, & supina parte, variis coloribus sed præsertim rubro maculatus.

TAB. IV. 4.5.6. *Quintus* quem Heracleoticum Rondelietius vocat, aculeos in fronte habet & in lateribus. Pars testæ prona aculeis aspera est, & hirta, coloreque fusco.

Sextus asperitatem in testa tomentosam habet, coloreque est cinereo & fusco.

Locus. Reperiunt in Egæo, Jonio & Adriatico mari.

Vfus. Mares eliguntur autumnus, hyeme & Aprili mense ad Cibum, in plenilunio: fœmina vero reliquo anni tempore usque ad Septembrem. Assantur etiam in furno ano & ore clausis, ne quod intus est liquidum effluat.

PUNCTUM III.

Dr Paguro.

TAB. V. 13.14. TAB. VI. 1.3.4. Nomen. Descrip-
tio. **P**Aguro, καὶ τὸ εἶναι καὶ φουλάττωσαι ἐν πύργοις, id est, κρεμνώδεσι πύργοις, quod in locis præruptis versetur, nomen inditum est. Simeon Sethi eum Carcini appellatione dignatur. A Palladio Cancer marinus dicitur. Scholiastes Aristophanis Caraburi exponit. Moderni Græci Paguri nomen adhuc retinent, idemque in Dalmatia, teste Massario retinetur. Latior est quam longior, & ex Oceano in pedalem longitudinem abit. Vifus in Anglia decem libras pendere. Valida crusta integitur & in lævi, eaque novem in gyrum crenis imbricis modò incisa est. Color vivorum viridiorum præ nimia rosei exhalatione veluti subnigra tergora apparent. *Crura* utrinque blæsa quatuor habent, villis hirta, ternis articulationibus geniculata, in quibus ungues acuti oblongiq; sunt, minimè bifidi. *Brachia* bisulca parte anteriore binis articulis intercepta forcipibus crenatis munita, in extremo nigra: quibus quæ constringunt ut edant, etiam dura confringere possunt. *Branchias* utrinque in latere o-

stendunt dispositas, ut reliquum genus Locustarum, sub tergoris crusta senis ordinibus ad tibiæ radices insertas. In ore tot comperies naturæ secreta, tot adstantes appendices, torpelliculas, ut coactus incredibile artificium necesse est fatearis. *Mutim*, TAB. V. 3.10. quæ hepar est, habet dulcissimam, maximè ex parte subrubram, cum infinitis propè apophysis flavis grandi stomacho adjacentibus. Reliquæ partes internæ musculis albis constant, quibus externæ moventur. Rondelietius sub nomine Cancris Majæ descripti. *Differentias* si spectes, alius est Mas, alius Fœmina. Scaliger alium orbiculatiorem, fusciolem, & majorem facit, alium quadratiorem & minorem, colore dilutiore, & penè pallida viriditate. Poreffos vocant Veneti.

Huc pertinet *Cancer Heracleoticus* Bellonii ab urbibus Heracleis, quarum una Ponto, altera Propontidi adjacet, dictus. *Crusta* firmiore munitur ut Maja, *Tibias* utrinque quaternas habet, *brachia* duo admodum firma, binis articulis geniculata, forcipibus robustis bisulca, hispida, & benè armata, quorum pars superior elatis crenis vallata est. Nonnulli *Gallum marinum* vocant, quòd brachia eius in crista galli modum tornata videantur. *Dorsum* tuberculis exasperatur & coloris est miniacei.

Huic similis est *alter* pilorum densitate Urli corium referens. Differt à priorè primò chelis, quæ longiores sunt, & in extremo pars utroque, quæ forcipem facit, & instar dentium sibi invicem dum clauduntur contingunt, colore miniaceo: præterea pedibus brevibus, quorum duo posteriores utrinque brevissimi, antennis & oculis magis à se invicem distantibus. *Invenitur* in mari Tyrreno & Adriatico: sed in Oceano maximus. Vidit Rondelietius unum, cuius latitudo palmum majorem superabat, longitudo ad semicubitum accedebat. Alexander apud *Ælianum* genus *Ælian.H. A.I.17.6.1.* quoddam Cancrorum cōmemorat, quorum testa circumferentia undique pedis mensuram impleveret. Miras eo-

rum magnitudines in sinu quoq; Perfico Strabo refert. Suetum ipsis in tegumento se exuere. Hoc cū luxari & a corpore abscedere sentiūt, furis quasi agitati huc & illuc ferūt, & pleniorē victū quærunt, ut tumore inflatis facilius crusta rumpatur. Elapsi similes mortuis in sabulo jacent, sibi restituti sabulum gustant, & postquam se abdidere, nō citius ex latebris, egrediuntur, quā pristina armatura instructi. Musicæ sunt adeo amantes, ut eadē capiuntur. Captos aliquando foramina subire, & mortuos in Scorpiones mutari Nicander prodidit.

Ælian. H.
A. l. 9.
c. 45.

Nicand. in
Therica.
Vlus.

Inter lautissimos numerantur cibus, sed difficillimè digeruntur. Cum coquantur parum rufescunt & parum nigrescunt.

PUNCTUM IV.

De Cancro Equite.

Nomen.
Aristot.
H. A. l. 4.
c. 2.
Plin. H. N.
l. 6. c. 3.
Aldrov. l. 2.
c. 20.
Descriptio.

Cancer Eques à velocitate cursus nomē accepit. Hefychio est δρεμων, Æliano δρεμια Cursor, aliis Græcis ἵππους Eques. Major est Castaneâ parvâ, colore subalbido, pūctis subrubris consperso, & ut Pagurus, tornato. Soli objectus totus pellucidus est, præterquam in ea corporis parte, quæ interanea continet. Oculos grano phaseolinō habet maiores, quibus acutissimè cernit. Tibiæ sunt villis levibus obsessæ, utrinq; quinæ: quarū duæ anteriores brachia sunt forcipata, quib⁹ cuncta cōplectitur: reliquæ graciles vnguibus rectis & obliquis variatæ. Huius generis fortè erit, qui Rondeletio *Cancer latipes* dicitur, nucis juglandis magnitudine aliquādo paulò maiore. Chelas habet denticulatas & articulatas, pedes utrinq; quatuor. Postremus & minimus, q̄ in osseam latitudinem desinat, nomen Cancro imposuit. Testa est lævi, parte superiore albescente, quodammodo nigricante. Cum maris purgamētis in litus eiicitur. Huic similis est quem Bellonius Græcis μικρὸν καρκίνον, Romæ Grancettum vocari scribit. Punctis frequentibus cādidis in tergo variatur Ophitæ modo. Singulares digiti quaternis constant articulationib⁹. Amphibii sunt, & in maximis ardoribus meridiano

tempore è mari egrediuntur, diemq; sub sole, trāsigunt, circa vespērā mare repetunt. Tanta velocitate ferri vidit Bellonius, ut ne unum quidē unquam cursu consequi potuerit: quin nec laertam ex ambrosia sub qua delitescbat exilientem, assequi eundē potuisse. Volare potius quàm currere videbatur.

Dromonem Hefychii quidam in Locis maris æstuariis capi scribunt, sagittæque modo per aquas summum decurrere. Facit Ælianus quorundā mentionē, quos πετηλίας à volando (Gillius legit πελλίας) vocat, quod per parvis alis volatum exerceant, quibus currentes non utuntur. Potest ipsis ποδανέμων titulus, qui ex Cratete Comico ab Athenæo datur, tribui. Negliguntur in cibis propter exilitatem.

Ælian. H.
A. l. 7.
c. 30.

PUNCTUM V.

De Cancro flavo undulato Rondeletii, Marmorato, Cordis figurâ, & aliis Chelarum longitudine differentibus.

Cancer flavus undulatus, à colore & T. A. B. VI. 6. lineis, quæ in prona parte sunt sinuosæ undarum modo, non aliter quàm Cameloto vulgò nuncupato, nomen sortitus est. Pedes quaternos habet longos & hirsutos: Chelas duas magnas, etiam hirtas: Cornua duo satis longa: in fronte appendices duas, in lateribus alias. Capitur circa Antipolium & Lerinum insulam.

Cancer Marmoratus sive varius, quod T. A. B. VI. 5. testa sit lævi, ac perpolita, & maculis viridibus cæruleis, albis, nigris, cinereis, Jaspidis instar & marmoris perspersus sit. Si mortuus in sole exsicce- Aldrov. l. 2. c. 22. tur, totus fit flavus, maculæ verò in mortuo statim evanescunt. Forfices habet aliis breviores & crassiores. Tubercula veluti gemmæ in eis eminent, ut in Astaco. Corniculæ duo è frōte extant. Post oculos, qui satis à se distant, testa est ferrata. In saxorū cavernulis degunt, & ita pedibus hærent, ut vix avelli possint. Crusta sunt cæteris

cæteris duriore. In faxis Agathensis littoris degunt.

TAB. VII. 4. *Cancer cordis figurâ*; Cornua duo è fronte prominentia habet; brachia quoque duo brevi forfice, & quaternos pedes. Pelagius est, & panagro ex alto mari cum piscibus in littus pertrahitur. In maiorum Afellorû ventriculis sæpissimè reperitur.

Aldrov. l. 2. c. 23. *Canceri chelarum longitudine differentes*, vel sunt Μακρόχηλοι, vel Βραχύχηλοι. Chelis vel tenuibus, vel crassis. Μακρόχηλοι chelis tenuibus, sub Araneorum marinarum nomine apud Aldrovandum veniunt, & sub tribus generibus exhibentur.

TAB. VI. 7. 8. 9. 10. 11. *Primum* est fusco & cinereo colore, parte priore quàm caput est, acutum, oculis parum à se invicè distantibus, cornibus duobus acutis.

Alterum corpore est rotundiore, quod sub Aranei crustacei nomine venit.

Tertium magis rotundius, colore cinereo & fusco, chelis quàm priores crassioribus, cui Aranei marini crustacei alterius in Tabula nomen inditum.

Differt ab his *Aranea marina*, cuius Aristoteles in Cancelli descriptione meminit. Formâ enim similis araneis est, nisi quòd partem capiti & pectori subjectum aranco maiorem habeat. Brachia forcipata habere pro corporis exilitate longissima Rondeletius addit. Μακρόχηλοι crassis brachiis, sunt hirsuti & asperi, ut aculeati videantur. *Unus* est prona parte corpore & pedibus albus, unde albicantis nomen. Chelis cæruleis, supina verò ruber. *Alter* priore minor colore nigricante, unde nigricantis appellatio.

TAB. VI. 12. 13. 14. 15. Βραχύχηλων aliquot sunt species. Ex quibus Rondeletii ex rubro nigricat, Chelis valdè brevibus ac tenuibus, pedib⁹ proximis longissimis pro corporis ratione, crassis, acutissimis, lanugine quâdam obducta. Frequens est in Lorino insula.

Reliqui sunt tenues & læves, supina pars aculeos habet. Ex his unus ore est acuto admodum, & oculis à latere utrinque prominentibus, corpore undiq; aspero. *Minutior* dicitur.

Congener brachichelo Aldrovandilagenam crasso ventre refert, caudam si demas. Capite est valdè acuto, corpus parte supinâ aculeis horret, coloreque est cæruleo, pronè albicat, forcipes Chelarum rubent.

ARTICVLVS III.

De Canceris fluviatilibus.

CANCER fluviatilis seu fluvialis, TAB. III. καρκίνος ποταμίος Græcis dicitur. Simeon Sethus & Galenus, Pagurum fluviatilem vocavere. Eo à marino differt, quod sit testâ durior & crassior; tibiis asperioribus, brachiis rugosioribus, & cum marinus lividum loti corticis colorem referat, fluviatilis ex rufso nigrescit. Marino, præterea, ungues extremam tibiarum articulationē faciunt: fluviatiles multas crenas in gyrum circa ungues habent.

Frustra eos in Gallia, & Germania Loc. quæras. In Græcia, Creta, Sicilia, & Etruria inveniuntur. Bellonius in Atho Macedonia monte vidit, & in Ciliciæ rivulis, qui non longè ab Issò defluunt. Tanta aliquando eorû ibi copia, ut temporis momento mille capi possint. In Nilo habitare apud Ælian. H. N. l. 5. c. 52. num habemus.

Sunt Sarcophagi, & cum invicem Victus. tågunt, pedes sibi arrodunt & vorant. Rondeletius cū ducentos Romæ emisset, denique in aquam ut sese reficerent coniecisset, ita inter sese confictati sunt, ut plures quinquaginta mutilatos reperiret. Eo tandè eventum est, ut omnibus necatis, unus tantum superstes fuerit. Ibidè ligonibus effossa scrobe vel paropside capiuntur. Juxta Ephesiam metropolim serpentes, qui ex caverna quodâ egressi A. l. 16. paludè tranare conantur, forcipibus 38. arreptos interficiunt. Romæ in foro piscario, filo appensi ac trajecti, prostant.

Eduntur omni tempore, sed æstate Vis. te sunt meliores, & posteaquam durū corticem exuerunt, magnatum mensis apponuntur. Lacte à quibusdam suffocantur. Avicenna in hecticis febribus cū aqua hordei valde probat.

In *Medicina* easdē ferē habent vires quas & alii. Tritos potosque ex aqua recentes seu cinere asservato, contra omnia venena prodesse, privatim cōtra Scorpionū ictus, cum lacte asinino, vel si non sit, caprino, vel quocunque, Plinius author est; quod & apud

Plin. H. N.
l. 32. c. 5.

Dioscoridnm invenies. Ad viperæ morsum bibuntur ē vino per se, vel cum staphide agria, sale & polio, ut restatur Ægineta. Cinis ustorū prodest pavore potus periclitantibus ex canis rabiosi moribus Æschrion empiricus vivos in patella æris rubritam diu urebat, donec facilē in lævorem redigi possent, lunā decimā octavā, post canis syderis exortum, cum sol leonem ingressus esset. Huius pulverem tenuissimum cochlearii unius mensurā ex aquę cyatho propinabat, cum recentior esset morsus; augebatur quantitas, si inveteraverat. Huic remedio tantam vim inesse scribit Galenus, ut dicat nullos periisse, qui bushoc in tempore datum esset. Id ex proprietate substantiæ fieri idem credidit. Triti in oleo & aqua peruncti, ante accessiones in febribus pro-

Plin. H. N.
l. 32. c. 10.

sunt, teste Plinio. Archigenes apud Galenum ex cancris siccis tritis, pedib⁹ & eminentiis amputatis, drachma unā, & asari drachmā alterā, cum aqua ex eodem flumine ex quo cancri sumtā, medicamentum aquas educens componit. Hippocrates in vino suffocatos in flexu uteri propinavit.

Hippocr. de
morb. mulier. l. 1.

ARTICULUS IV.

De Cancris in conchis degentibus.

PUNCTUM I.

De Cancris parvis.

TAB.
VII.
35.

PRÆter ea quæ hætenus retulimus crustata, sunt & alia, quæ in alienis conchis, ut Mitulis, pinnis, pectinibus, ostreis, ac varii generis turbinatis degunt, ut Cancelli, Cancris parvi, Squili, & Scylari, figurā non usque adeo à prædictis diversā.

Cancer parvus, qui pinnis innascitur Descri-

pinno φύλαξ, quasi ὁ τῆς πίννης φύλαξ, ut Suidas, Hefychius, & Varinus tradunt, πιννοτήρης Chrysippo, ut Athenæus citat, & τὸ τῆς τηρεῖν ἢ φυλάσσειν τὴν πίννην, dicitur. Sunt autem qui in ostreis reperiuntur, parvæ fabæ magnitudine, toto corpore candidi, præterquam, quod pronæ crustæ medium rubeat. In pinnis qui degunt, majores sunt & magis rubri, alioqui chelis, pedibus, toto denique corpore aliis similes. A Cancellis eo differunt, quod parvi cancri viventium pinna- rum & ostreorum hospites sint: Cancelli inanes duntaxat testas & turbinatas subeant, sintque longo corpore Locustis non Cancris simili.

De *Generatione* non conveniunt Generatio.

authores. Piscatores cum illis quorum testis inhabitant, quasi ex eodem semine nasci tradunt, teste Aristotele. Apud eundem ista invenies verba. Arist. H. A. l. 5. c. 15.


Pinnæ quæ petris aut saxorum cavernis adhæserint, radices agunt, illic Margaritam generant. Vivunt autem & nutriuntur per partem carnī hærentem. Huius autem conchæ ori adnascitur animalculum chelas habens, & cibum assumens, quod cancro parvo simile est, & vocatur Pinnophylax. Rondeletius cum sæpissimè Cancros parvos in Conchis & Ostreis ovis turgentes viderit, ex Coitu maris & sceminæ & ovis provenire affirmare audet. Ut ut sit, nō possunt isti in aliis procreari, ut nec vel viscū vel polypodium, nisi super aliis arboribus crescere.

Quæ de eorū prudentia apud Plutarchum, Oppianum, & alios invenies, quod nempe pinnā regat, & de appropinquante præda admoneat, fabulosa sunt. Decem Pinnas aperies antequam unum pinnophylacem invenias. Plutarch. de solertia animal. Oppian. l. 2. Halicut.


Aqua tantum & luto eadem paviscuntur, ut Mytuli. Latere in eis crede ut vitam servant vitam, Molliore testa præditi, injuriis magis sunt obnoxii. Ideo & spongiarum cavernulis saxorum rimis, & in externis testarum quibus Ostrea testā sunt cavis, sæpissimè Cancros parvos se reperisse, Rondeletius affirmat.

PUN-


Cancer Molluccensis proutus.




Cordis figura Cancer.



Cancer parvus alius.



Cancer parvus.




Cancellus


rudus.

Cancellus


in testis.




Cancellus ruber.




Cancellus alarou.




Cancellus in Buccino.




Scyllarus sine canall: in Noritz condia.



Cancellus oblongus.






Canceri Hirsuti Rondel species.




Cancellus

avena.



Amphibæna marina.




Tab. VIII.


Cancer Heracleotus hirsutus pronic.




Cancer pronic.




Cancer Heracleotus hirsutus jupine.




Cancer Supine.




Crabem.



Testudo marina.




Testudo marina.




Stella


marina maior.



Stella marina tredecim radis.



Stella marina minor.



De Cancellis.

APPEND.



APPENDIX.

*De quibusdam Crustaceis
Brasilienfibus Cancris
inprimis.*

CAPUT I.

*De Guaja Apara, cancro
maximo.*

TAB.
IX.



VAIA APARA, cancer maximus elegantissime variegatus. *Corporis* figura est Lunæ bissectæ similis, in latitudine habens tres digitos, in longitudine duos & semis (quanquam & majores reperiantur) *Testa*, ut dixi, lunata est, in utroque latere posterius exsecta, & in acumina desinens. Anterior pars testæ ultra medietatem coloris est obscure brunni, & variegata maculis ex albo flavescentibus: posterior pars ex albo flavescit, striis brunnis secundū longitudinem ornata.











Pedes habet octo; singulos quatuor internodiis constantes, subrotundos, ex albo flavescentes: brachia duo, quodlibet duos & semis digitos longum, & sesquidigitum latum, quodlibet parva forcipe præditum, quibus non ita arctè comprehendere potest, ut alii cancri. Est autem quodlibet brachium superius armatum & dentatum instar cristæ galli, ita ut quando vivus brachia corpori applicatis ea componit, uti aptissimè potest, cristas duas galli sibi invicem appositas esse appareat. Tenacula præsentat rostrum galli, brachium itaque totum rostrum galli cum sua crista. Brachia autem etiam ex albo flavescent, & maculis brunnis sunt variegata. In aquis natans per os

aquam exsufflat, quasi ex fonte exsiliret.

GVATA alia species. *Corpus* rotundum, paulo oblongum, juglandem cum suo viridi cortice æquat, octo habet *pedes* cancrinos: duo *brachia*, quodlibet ferè duos & semis digitos longum, at exilia; in parte extrema corporis tres habet aculeos obtusos, & oculos planè exiles. *Color* totius corporis, brachiorum & pedum est albus; ac tota testa dorso egregiis maculis brunnis ordinatim distincta, in summitate majoribus, at in lateribus, minoribus: *Brachia* parvulis maculis ex ruffo purpureis sunt variegata: pedes albicant in totum, ut & venter.

GVATA alia species quæ rarius capitur. *Corpus* ellypticæ figuræ, latum, tres digitos & totidem longum, aut paulo minus; testa tecta est ellyptica, in ambitu multis corniculis prædita, superius autem convallibus: *ocelli*, arvuli, ut aliis, in quodlibet latere pedes quatuor cum quatuor juncturis, *Crunra* subhirsuta, & in extremitate unguem nigrum corniculi figura habentia. Anterius autem crus tres digitos longum, reliqua semper breviora unum altero. Brachiorum cum forcipibus, cujuslibet longitudo trium digitorum, crassities humani digiti, forcipes sesquidigitum longa & satis crassa. Ipsæ extremitates forcipis paulo plus sesquidigitum longæ, rostratæ & exterius versus dentatæ, quasi denticulis humanis, & ita aptè sibi invicem quadrantes complicatæ, quasi quis rostrum dentatum clauderet, in una tenacula forcipis, quæ movetur seorsim, in medio etiam est dens albicans. *Color* totius cancri vivi saturate rubens, ut pruna nostratia majora esse solent, in medio corpore saturatior, reliquis partibus dilutior: extremitas tunicularum ruffa cum brunno mixti, ut cerasa nigra tingere solent. Coctus retinet colorem.





Guaia

alia.

Guaia Miri.

Cicie Panema.

Vca Vna.

Ciri

Apoa.

Guanhumi.

Aratu et Aratu pinima.

Maracoani.

Potiquiuxce.

Potiquiya.

Guaricuru.

Paranacare.

CAPVT II.

De Guaia Miri, Carara Vna, Cunuru, & Ciecie Ete.

GUAIA MIRI, cancerculus in falsis fluviis degens, nunquam excedit pruni magnitudinem; *testa* est ellyptica, anteriore parte in multos angulos desinente: *Ocelli* parvi, breves: *brachia* duo, dextrum paulo minus sinistro: *crura* octo, quatuor internodiis constantia, & brevibus pilis hirta: color *testæ* ferrugineus: brachiorum & crurum obscurè violaceo-purpureus. Pili crurum pallidi, inferius forcipum latus albicat.

CARARA VNA Cancer parvus, cuius corpus quadratum refert, cuius singuli anguli transversim abscissi, cæterum compressum, magnitudine semi digiti. *Oculi* prominuli, haud longi, nigri, in angulis abscissis consistentes. *Brachia* brevia, forcipibus obrotundis crassiusculis: *crura* octo haud crassa, sed compressa. *Testa* cum cruribus epatici coloris, seu instar hepatis tosti: *brachia* itidem: forcipes brunni coloris, qualis succus ceraforum nigrorum: *Crura* minutulis pilis hic inde vestita, eiusdem cum cruribus coloris.

CUNURU, foemella est *Vca una*, figura & colore conveniens, solum magnitudine corporis & brachiorum differt, minor enim est, quam mas, & brachia habet parva, brachio maris sinistro vix æqualia, sinistrumque paulo grandius dextro; raros quoque habet pilos, cum *Vca una* tota sit hirsuta.

CIECIE ETE Brasilienſibus: *Crangversinho des Manges* Lusitanis: *corpus* ad quadratam figuram accedit, & totum vix superat maioris avellanæ magnitudinem: *Oculi* prominentes longiusculi quos recon-

dere potest. *Crura* octo: brachium sinistrum ipsi maximum, non tamen crassum, forcipis tenacula tenuia & longa, æqualia, sine dentibus: dextrum brachium tenuissimum. *Testa* coloris hepatici: reliquum totum corpus cum cruribus obscurè flavum expallido.

Edulis est; & Brasiliiani illo curant morbum, quem vocant *Mia*.

CAPVT III.

De Ciri Apoa, Vca Una, Guanhum, & Aratu Pinima.

CIRI APOA Brasilienſibus. Cancer marinus, *testa* quasi ellyptica testus, quæ in medietatis anterioris ora dentata, & in quolibet latere in acutum desinit angulum, mediocris magnitudinis. *Brachia* habet duo mediocria, itidem dentata: *sex crura* & septimi & octavi loco posterioris duos remiges planos, quatuor internodiis, circum circa pilosos, quibus utitur natans. *Oculi* longè à se invicem distantes, parvuli, cylindracei, crassiusculi, non tamen longi & ad quemlibet cirrhulus eminet instar pili. Totius *testæ* color fuscus, seu nigricans, in qua diverso fusco cordis figura, aliæque depictæ. *Brachia* fusca, forcipes ex cæruleſcente albescent. *Crura* ad medietatem internam viridi & albo mixta: medietates exteriores cæruleæ: remigum extrema pars, quæ lata est, cærulea, reliqua viridis & albo mixta. *Corpus* interius etiam cæruleſcit. Boni sunt saporis. *Ciri* ordinariè in fundo aquæ salis ambulant, interdum tamen ad littora prodeunt cum decremento maris, sed rarius. Capiuntur maris refluxu.

VCA VNA Cancer in palustribus degens, *corpus* eius ellypticum, superius convexum, juglandis cum suo cortice magnitudinem æquans

vel etiam superans. *Crura* habet octo, quatuor juncturis: anteriora lon-iora, posteriora breviora: *Oculos* haud longè distantes, cylindraceos, haud longos, quos erigit & recondit, coloris pallidè flavescentis, pupilla hyalina. *Brachium* dextrum ipsi maximum, interius multis tuberculis acuminatis præditum, ut & forceps: sinistrum parvum. Color *testæ* superius olivaceus, flavo in extremitate intermixto. *Corpus* interius pallidè flavescit. Omnia crura & brachia castanei sunt coloris, forcipes etiam superius, cætera pallidè flavescentia una cum tenaculis. Crura omnia inferius vestita sunt copiosis pilis longiusculis obscurè castanei coloris. Carne sunt bona.

GVANHUMI, Cancer terrestris: corpus illi rotundum, sed paulum compressum, magnitudine *Auriaci mali*.

Pedes habet octo, quinque digitos longos, quatuor internodiis: *crura* longis pilis vestita: os magnum & ad latera oris utrimque latitudine unius digiti hirsutum, ut & corpus: *Brachia* duo, dextrum magnum, sinistrum parvum, magnum longum octo digitos, latum plus duobus; parvum vix quartam partem illius æquat.

Oculi bini, quos instar parvæ pilæ erigit, & iterum in longa cavitate abscondit: circa os quasi duo brachiola quæ recondere potest, & iterum depromere, & usque ad oculos deducere.

Celerrimè currit, & quidem transversim, ita ut oculos ad latus convertat & brachium maius elevatum gestet. Maximo numero in silvis paludosis oberrant. Carnem habet bonam.

ARATV & ARATV PINIMA. Cancer terrestris, quadratæ figuræ, corpore haud magno, *testa* multiplici colore picta, brunno, cæruleo, albo, rubro punctatim variè intermixtis.

Oculi prominentes longè distantes, nigri, in angulis rostri positi.

Crura octo, quatuor internodiis, compressa, ruffa, ac per totum maculis purpureis, nigris ac albis distincta. *Chela* duæ non ita magnæ, æquales, ruffæ, in extremitate ex albo flavescentes. In ventre etiam flavescit. Crura raris pilis nigris vestiuntur.

CAPUT IV.

De *Maracoani*, *Potiqui-
quiya*, & *Tamaru
Guacu*.

MARACOANI, cancer parvus, in locis ambulans, quæ refluxu maris sicca evadunt, alio enim tempore è latibulo suo non prodit: corpore est ferè quadrato, digitum longo & lato, antè tamen paulò latiori: *Oculi* prope sibi invicem appositi, longi plus semidigito, tennes instar aciculæ crassioris, quos erigere & aptè in rima recondere potest.

Os habet amplum & maius quam cæteri cancri: *crura* octo, quatuor internodiis. *Brachium* dextrum illi maximum, tres digitos longitudine superans, satis crassum, & se totum post illud potest abscondere: forceps autem brachii latior, haud crassus, referens forcipem sartorum, extuberantiis haud acutis loco dentium præditus; superficies brachii etiam parva tubercula habet: *brachium* sinistrum minimum, minus uno è pedibus, forcipula minima instar scorpionis.

Crura raros habent pilos fuscos. Coloris est in testa fulvi, ut & in pedibus & minore forcipe, atque in inferiori corpore: extremitate pedum magis rufescunt. *Brachium* dextrum è fulvo obscurè rufescit. Est edulis.

POTIQUIQUIYA Brasiliensibus. Locusta marina, Belgis *Zeevrees*. Longitudo corporis à fronte ad exte-

ortum

ortum caudæ septem digitorum, caudæ sex: latitudo testa dorſi ſeptem, ventris duorum & ſemis: totius corporis ambitus novem digitorum & ſemis; caudæ ambitus quinque, quæ conſtat ſex tabellis, ſeptem juncturis ſibi invicem appoſitis: & habet cauda ad quodlibet latuſ inferius quatuor pinnaſ, ſeſquidigitum longas, unam latas: extremitates laterales cuiusque tabellæ deſinunt in cornu acutum: in quolibet latere quinque habet crura, quinque internodiis diſtantia; primum par crurum ſex digitos longum, alterum novem, tertium pedem, quartum ſeptem digitos, quintum quinque: Quodlibet autem unguem habet incurvum, acutum, pilis multis flavſcentibus hirtum, inſtar penicilli pictorum: crus anterius craſſitie digitum æquat, reliqua graciliora.

Teſta corporis variè tuberculata, frequentibus eminentiis inſtar corniculorum rectorum, acutorum, anteriuſcatet.

Oculi prominentes cylindracei, & poſt eos duo cornua ſurrecta antroſum inclinata, digitum longa; ante oculos ſupra os quatuor cirrhi exortum ſumunt, primo duo magni pollicis humani craſſitie in exortu, ubi quatuor internodiis conſtat, longi ſeſquipedem & undique ſpinoſi, inter hoſ duo minores, quatuor internodiis, teretes ſine ſpinis, ac ultra medietatem biſecti, decem in totum digitos ſinguli longi.

TAMARU GVACV, Braſilienſibuſ: Camaron de Salgado Luſitanis. Locuſtæ marinæ ſpecies, novem digitos longa, vel paulo pluſ. Capitiſ longitudo duorum digitorum; verſuſ caput magis magisque anguſtatür.

Corpuſ autem habet undecim quaſi juncturas, quemadmodum cauda in Gamariſ: in poſtica parte corporis ad quodlibet latuſ duos habet proceſſuſ ſubhirmiſuſ.

Totum corpuſ tectum eſt cruſta cancrina, albicante, ſplendente in-

ſtar cornu politi, ad juncturas autem ſubnigricat aut purpuraſcit; pedes in quolibet latere treſ, nimirum ad tertiam, quartam & quintam juncturam à collo numerando; exilia, duos circiter digitos longa.

Caput triangulare, olivæ magnitudine ſub teſta albicante ſplendida later, duos digitos longa. Pone caput ad quodlibet latuſ habet brachium unum, ſeptem digitos longum, quatuor juncturis conſtant, eſtque extrema pars brachii ab ultima junctura incurvata inſtar falciſ maioris, & novem dentibuſ acutiſſimiſ prædita: hiſ brachiis ferit, & qui vulnerati ſunt, ægrè ſanantur.

Oculos habet prominentes, oblongos: barbam cancerinam octuplam: prope oculos duas prominentiaſ retroſum verſaſ, digitum longas, læves, at in extremitatibuſ hirmiſuſ: infra caput adhuc octo prominentiaſ, duos digitos longas, quæ in extremo tubercula gerunt. Verſuſ poſticam corporis partem inferiuſ multas latas quaſi pinnaſ habet, quæ natationi haud dubio ſerviunt, & quaſi folia complicata ventri inferiuſ adjacent. Non comeditur.

CAPUT V.

De Paranacare & Guari
curu.

PARANACARE: Gammaruſ in concha degens, haud eduliſ, treſ digitos longuſ: brachia habet duocum forcipibuſ, crura quatuor longiſſima, nimirum treſ digitos longa, & poſthec quatuor planè brevia; caudam ſeſquidigitum longam inſtar aliorum Gammarorum; oculos longos & prominuloſ: duocum cirrhoſ pro barba.

Corpuſ regitur teſta obſcurè caſtanei coloris; eiuſdem coloris eſt

& cauda, nigris striis secundum longitudinem variegata, corpus inferius & exortus crurum & brachiorum interius cærulescunt, uti & oculi & barba; per totum corpus habet pilos ochræ coloris.

Concha quam inhabitat fermè quatuor digitos longa, turbinata coloris pallide subflavescentis.

Variæ autem magnitudinis reperiuntur, planè parvulæ, magnitudine minoris pruni, turbinatæ & variis tuberculis acuminatis præditæ, pallidæ, rufescentes, nigrae, ad littus prope fluvium Paraiba.

GVARICVRV Brasiliensibus, *Gammarus* vulgo *Camaraon*; quatuor digitos longus: crura habet sex, tribus internodiis constantia, cum unguiculo in extremitate: antè par crurum quasi furas habet, crassius reliquis & vicem brachiorum fungens; paulo plus duobus digitis longum, ultimum paulo plus uno, omnia aculeata seu spinosa.

Cirrhos prope os prodeuntes habet sex; duos longissimos, nimirum tres digitos singulos, versus posteriora reflexos; duos unum digitum, & duos semidigitum: sub ore parva tenacula quatuor crassiuscula, & quatuor tenuiora, quibus cibum tenet. Oculi similes reliquis. Color totius fusus. Cocti eduntur.



HISTORIÆ NATURALIS

De Exanguibus Aquaticis.

LIBER III.

De Testaceis.

TITVLVS I.

De Testaceis in genere.



Estacea quæ vulgò dicuntur, ea alii Testata, Horat. l. 2. saty. Nomen. tius testas, Cicero, belluas nativis testis adhærentes, Palladius clausa maris animalia, Albertus testudines, plurimi Conchas, & Conchilia dixerunt. Græci δὲ τεστὰς Arist. H. A. l. 1. c. 6. δερμα, ac si dicas testaceæ cutis animalia, δὲ τεστὰς, quod apud Philosophum invenies, δὲ τεστὰς, ut Athenæus testatur, δὲ τεστὰς ἐστὶν δὲ τεστὰς ὅτι καὶ καὶ καὶ καὶ καὶ Strabo scribit, σκληρὸν δὲ δερμα, λιγύρην, quod Empedocli tribuitur, δὲ τεστὰς ἐστὶν, δὲ τεστὰς, δὲ τεστὰς ἐστὶν ἰχθύας, seu testaceos pisces, quod apud Suidam, ut illud apud Oppianum legimus, λιγύρας Hesychius & Varinus, κυματοφρογίδας idem, appellavere.

Partes corporis si spectemus, Omnibus testa intus lævis aequalisque habetur, Caro item quam Græcè spondylum, latinè callū dici Hermolaus author est, quam Lunæ incremento augeri prodidere quidam. Terrenū illud quod continet & conservet foris est, hoc calorem leviculum, quia sanguine carent, tanquam furnulus fovet & conservat, & testa dicitur. Non mutant eam, tum quòd nō moveātur, tum quòd non siccentur. Oculos habere negat Aristoteles, Plinius Arist. H. A. l. 1. c. 9. Plin. Epist. 136. movere etiam, scribit. Dentes ipsis priores, & carnosum illud quod proportionatur ad sentiendū cibum caput omnib. infra, plantar. modo. Stomachus orī cōtinuò jungitur, isq; pportione magni.

magnitudinis exiguus. Hunc excipit *venter*, in quo q̄ *papaver* dicimus, (μάρων) situm. Mox intestinum continuum tendit simplex, originem à papavere illo ducens. Excrementū illud quod papaver dicimus, continent turbinata omnia sua clavicula, univalvia fundo, bivalvia qua nodo ligantur. Laborant omnia per frigus, & æstum atque exuperantiam temporis patinequeunt. *Nutrientur* more plantarum per poros, & quidē humore dulci, si Aristoteli credimus. Idē eis anni pluvij profunt, Purpuras si excipias. Moventur omnia parte dextra, non ad vertiginem sive claviculam, sed in aduersum.

Victus.
Arist. H. A.
l. 8. c. 2.
Arist. H. A.
l. 8. c. 20.

Differentia.

Plin. H.
N. l. 9. c. 33.

Differentias quod spectat, mira in ipsis naturæ ludentis varietas. Tot color. differentia, tot figura, planis & concavis, longis, lunatis, in orbem circumactis, dimidio orbe cæsis, in dorsum elatis, lævibus, rugatis, denticulatis, striatis, vertice muricatis intorto, margine in mucronem emissis, foris effuso, intus replicato, jam distinctione virgulata, crinita, crispata, cuniculatis, pectinatim, imbricatis, undata, cancellatis, reticulatis, in obliquum, in rectum expansa, prædensata, porrecta, sinuata, brevi modo ligatis, toto latere connexis, ad plausum apertis, ad buccinum incurvis. Rondéletus eas brevissimè complexus est. Alia ab aliis testæ duritia superatur, ut pulmones, Holothuria, Echini, longè minus dura testa conteguntur, quàm Purpuræ & Buccina. Alii undique circumtegentur, ut nihil interioris corporis regi possit, ut Ostrea, Tölline, Pectines. Alia altera tantum parte testam habent, alteri parti testæ loco est scopuli pars cui hæret. Chamæ & Dactyli sive Solenes utrisq; extremis non integuntur, per quæ caput & posteriorem partem exerunt. Eorum quæ undique integuntur: alia turbinata sunt, ut Purpura, Buccinum, alia turbinata non sunt, ut conchæ, quæ à Gallis Porcellinos vocantur. Alia unica cōcha cōstāt, ut Lepades. Alia duabus, & Mytuli. Testar. alia læves, ut Unguiū, Mytulorū. Aliæ asperæ, ut

Purpurarum, Buccinorum, Ostrearum, quarum rursus testarum, per magna est in asperitate varietas, quæ in singulis declarabitur, &c. Nos ea brevissimè in Turbinata, Turbines, Bivalvia & Univalvia distinguimus. *Locus* ipsis mare, quod ita amant, ut apud Ægyptios maris symbola conchylia haberentur. In mari rubro mira quadam magnitudine augentur. Bibacta iisdem referta est, ut & maris Ægei & Laconici littora. In montibus & remotis procul à mari locis reperiri, nullum dubium. Causas alibi inquiremus. Ad *Temperiem* spectat, quod plurima eorum algore & estu lateant. Limaces hyeme, Purpuræ & Buccinæ canis exortu tricenos circiter dies conduntur. Æstate tamen potius plures vigent, Piræsem Euripum si exceperis, in quo non minus hyeme probantur, quod tum, piscibus alio migrantibus pabulentur uberius.

De ipsorum *Generatione* accuratissimè Aristoteles in libris generationum egit, eoq; res redit, ut omne genus testatum spontè oriri pronunciet. Apertum, inquit, id hinc est, quod navigiis putrescentibus, fæce spumosa adnascuntur, & locis multis ubi nihil tale aderat ante, post per inopiam humoris facto cœno, Ostrea prodiere; ut apud Rhodum insulam, cū classis applicuisset, & sicilia proiecta essent, in mare, tēpore post cœno obducto testis. Ostrea in eis reperiebantur. Nihil autem partis genitalis emitti ab iis, argumentum est, quod cum Chii quidem ex Pyrrha Lesbi insulæ Ostreas vivas portassent, & in loca quædam maris reciproci æstus, & luto similia dimississent, plures nihilo fuere temporis spacio, quāquam incremento corporis plurimum profecerunt. Quæ autem ova vocantur, nihil ad generationem conferunt, sed indicium sunt nutritionis melioris, quale in sanguineis pingue est: quāobrem sapore per id tempus præstant, ciboque laudantur. Quæ de Conchis Ælianus scribit, in speciali historia adferemus.

Generatio.
Arist. Gen.
A. l. 3. c. 11.
Arist. H. A.
l. 5. c. 14.
Scalig.

Sensus.

Sensus eis Plinius adimit, tribuit Aristoteles. Purpuris escas putidas Purpurarii emoli. acceduntq; odore sine dubio illectæ ad ipsas. Ungues ad strepitum se subtrahunt, inferiusque subsidere cernuntur, quoties ferramentum sentiunt admove-ri. Exiguo namque extant, reliquo autem toto corpore perinde ac in cubili occiduntur. Natices qui capiunt non adverso, sed secundo flato adeunt, quoties escam persequuntur, nec voce ulla sed silentio agunt.

Antipathia.

Antipathiam cum tonitru habere creduntur, & adhærescentis tempestatis signa sunt.

Vnus.

Adeò olim in *Cibis* adhibebantur, ut inde conformatum sit adagium, conchyliia viduarum cupedias, & Plinius, luxuriæ matrem Conchyliorum, præcia margaritis propemodum æquasse, quæritur. Commune omnibus falsum quendam in sua carne succum habere, quo alvum ciere nata sunt: quòd si probè assentur, maximè tum falsa evadunt, ut quæ succum jam habeant ab igne veluti succensum, & propè dixerim, absumptum. Mollitie tamen & duritie operationis variatur eventus. Venerem invitare certum, unde eam Concha Cyprum vectam quidam, alii è concha natam voluerunt. In *Medicina* quoque locum invenisse in specialibus dicemus.



TITULUS II.

De Testaceis in specie, & primò de Turbinatis in genere.




UPERIORE titulo Testaceorum omne genus, in Turbinata, Turbines, conchyliia bivalvia seu διζυγα, & μονιζυγα seu univalvia distinximus: Turbinata vel in genere, vel in specie considerantur. In genere dicta Turbinata sunt illa, quæcumque in volutas

& anfractus seu spiras, quales in prælis & torcularibus visuntur, Testas suas quoquo modo reflectunt. Græci στρομβώδη vocant, Gesnerus ελικοειδῆ quoque dici posse putat, quòd ελικας vocent, quas diximus, volutas. At Rō- deletio στρομβῶ in genere pro omnibus Turbinatis sumitur, Turbo autem est id quod ex amplo & lato paulatim in mucronem definit, cuius figuræ est & Turbo luforius. Proprium illis est testam habere continuam totam & unicam. Si externa spectemus, si interna considerentur, Aristot. H. A. l. 4. c. 4. quodammodo similem naturam nata sunt omnia, magnitudine autem distant & aliis affectibus qui excessu comparantur. Quædam enim quæ maiora sunt suas quoque partes conspectiores habent: minora autem minus: sic etiam duriora & molliora, & ejusmodi alia alii. Nam quæ caro summa à testæ ostro exorta est, eam quædam firmiorem quædam solutiorem habent. Ex eius medio caput est & cornicula bina; in majoribus proceriora, in minoribus minima. Eximendi capitis eadem omnium ratio, & per terrefactis contrahendi. Habent quædam os & dentes, minutas, tequies. Quædam etiam muscarum more habent proboscidem linguæ speciei. Hæc dura est buccinis & purpuris. Nam quemadmodum Tabani & asilus tergora quadrupedum pertundunt: ita his tanta est duritia, ut escarum testas perforant. Subest oristatim venter similis avium ingluviei, qualis est etiam umbilicis. Infra duo candida quædam, firma, speciei mammillari, qualia in sepiis inveniuntur: sed hæc solidiora. A ventre gula duplex longa ac papaver usq; quod in fundo est. Quæ omnia perspicere possunt, in sinu vorticeso testarum. Quod gulæ jungitur intestinum est, à qua, continuo tractu fertur totum simplex usq; ad exitum, incipi eas à vorticeso sinu quo papaver continetur, atque inde laxiorum. Est autem papaveris magna pars quasi excrementum in omnibus ostraceis. Inde intestinum reciprocans rursus ascendit ad carnosas partes, atq; circiter caput

Palypus.



Tab. X.

Nautilus.



Testa Nautili.

Nautili Structura.




Purpura.




Purpura


alia.




Testa Nautili.




Buccina.



Cochlea rugosa.



Murex aculeatus.



Strombus magnus.



Caput terminatur, qua emittitur excrementum omnibus turbinatis tam terrenis quam marinis. Hucusq; Aristoteles. *Crescere* ut vermes, scilicet anfractibus, qui subinde accrescentes plures efficiuntur in partem priorem, quod caput vocatur, experientia docuit. *Serpunt* parte dextra non ad claviculas, sed in adversum. De *Congressu* in speciebus dicitur.



TITVLVS III.

De Turbinatis in specie.

CAPUT I.

De Turbinatis in anfractum tortis.

ARTICVLVS I.

De Nautilo.

TAB. X.
Aldrov. l.
3. c. 3.

Arist. H. A.
l. 4. c. 1.

Differen-
tiæ.

Arist. H. A.
l. 4. c. 2.



UUM sunt Turbinata apud Aristotelem generum, velenim *ελικω* habent, vel sunt *σφαίροειδῃ* seu in globum circumacta. Ex illis sunt *Nautilus*, *Purpura*, *Buccinum*, & *Conchylium*.

Nautilus, quem Suidas *ναυτλω*, alii *ναυπηον* & *ων πολυπόδιον* vocant, vulgo *ναύπιλος* dicitur, & cum *Nauplio Athenæi* idem esse videtur. A modernis Græcis *γαλάμω τεκταπόδις* vocari Robertus Constantinus author est.

Duo ipsius apud Aristotelem habemus genera. Vnum est, cuius testa pectunculo similis est, cava, neque ei connexa natura. Is prope terram pascitur sæpe numero: quare a fluctibus eiicitur in aridam, ubi delapsus de concha, aut capitur aut in humo perit. Hoc genus pusillum est & simile bolitanis: quæ Polypi spe-

cies est. *Alterum* in testa tanquam limax est. Is ex ea nunquam exit: sed interdum brachia exerit. Illud respicit Plinius cum dicit. Inter præcipua miracula qui vocatur *Nautilus*, ab aliis, *Pompilos* (potius *polypodis ovum*) *Scipinus* (verius *pronus*) in summa æquorum, pervenit, ita se paulatim subrigens, ut emissâ omni per fistulâ aqua, velut exoneratus sentina, facile naviget. Postea prima duo brachia retorquens (potius attollens ex *Athenæo*) membranâ inter illa miræ tenuitatis extendit.

Qua velificante in aura cæteris subremigans brachiis, media cauda, ut gubernaculo se regit. Ita vadit alto, *Liburnicar. ludens* imagine, & si quid pavoris interveniat, hausta se emer, eus aqua. Eundem exactissimè *Bellonius descripsit*. Concha, inquit, tribus fragmentis constare videtur (carina scilicet & lateribus, cum tamen una & simplex sit) quarum latera utrinque ceu carinæ iunctæ apparent, ea ut plurimum magnitudine, quam ambæ manus amplecti possent: latitudine autè quantum pollex cum indice comprehendat. Omnes autem non excedunt crassitudinem membranæ pergamenæ, striisq; in oblongum ductis, ad oras crenis laciniatæ sunt, in formam rotundam abeuntes: foramam autem per quod *Nautilus* alitur atque exit de *Concha*, magnum est. Fragilis hæc lactei coloris, lucida, admodum polita, omnino navis rotundæ effigiem referens. Navigat enim per maris summa, elatus de imo gurgite offertque se testa inversa, ut facilius ascendere posset, & inani scapha enaviget, atque ubi inde emerferit, tum concham invertit. Cæterum *Nautili* brachiis interjacet membranula, qualis est inter palmipedum digitos, sed hæc magis est tenuis, in telæ aranæ modum, robusta tamen, qua etiam aura inspirante velificat. *Cirris* quos utrinque multos habet, pro gubernaculis utitur, atque ubi metuit, cum concham protinus marino humore oppletam demergit.

Alterum

Plin. H. N.
l. 9. c. 29.

Alterum Nautilum, Cochleam margaritifera Bellonius vocat, & videtur eam Fauconerius describere, cum in Epistola ad Gesnerum ait, suum Nautilum, testā habere interna parte ita nitentem, ut cum unionibus preciosissimis de coloris amœnitate certare posset, Bellonius enim suæ illius cochleæ concham, in magno apud artifices Gallos, ad vasa diutioribus abacis accommodata conficienda, precio esse, & *Porcellanam* ob id vocari scribit. Fauconerius multa in sui Nautili testæ carina tabulata, eodem amœno colore nitentia, fuisse prodit. Hinc faciliè colligas eundem cum eo esse, quem à Græcis *πυλῶν τρυγανδῆς*, id est, polythalamū dici scripsimus. Plin. cū de Nautilo paulò ante dixisset, mox tanquā de altera eius specie. Navigeram similitudinem, inquit, & aliam in Proponitide visum sibi prodidit Mutianus. Concham esse acatii modo carinatam, inflexa puppe, prora rostrata: in hanc condi Nauplium animal Sepiæ simile, ludendi societate sola: duobus hoc fieri generibus. Tranquillo enim, vectorem demissis palmulis ferire ut remis; si verò flatus invitent, eosdem in usu gubernaculi, pandique concharum sinus aures. Huius voluptatem esse, ut ferat, illius, ut regat: simulque eam descendere in duo sensu carentia: nisi fortè tristi (id enim constat) omine navigantium humana calamitas in causa est. Cardanus quoque cuiusdam cochleæ meminit, quam India mittit. Est, inquit, forma triremis cum alta puppi, in qua vasculum aliud, diceret poculum à natura excogitatum. Nam & magnitudo tanta eius quam vidi, ut cotylam capiat.

Res profectò usus elegantissimi & pulcherrimæ formæ.



ARTICVLVS II.

De Purpura.

Purpura Græcis *πορφύρα*, Plinio aliquando Pelagium, Politiano cōcha Herculea, quòd tincturæ Hercules author credatur; Serapioni Pulpia, Brasavolo Antale dicitur. Qui cum Conchylio confundunt, à Plin. H. N. Plinio refutantur. Distinguit enim l. 9. c. 35. iste, & expresse apud eum legimus. Conchyliæ & purpuras omnis ora atterit, quibus eadem mater luxuria paria penè etiam margaritis fecit. Nec minus illi, qui Conchylium idè cum Buccino ponunt, quòd Plinius cum duo tantū genera Turbinator. continentium florem illum tingendis vestibus adeò expetitur poluerit, alterum Purpuram, alterū Buccinum esse, necesse videatur. Eodem enim libro hæc verba extant. In Conchyliata veste cætera sine Buccino, præterque iustæ temperaturæ aqua pro in viso potus humani excremento. Concham ex Turbinatorum genere esse Aristoteles prodidit, & aliquot ipsarum genera agnovit, ut circa finem dicemus.

Descriptionem si spectes, sæpe ovi est magnitudine, aliquando maior, nisi elevata & aculeis munita esset, & carnalè ad latus qua linguam exeret haberet. Rugata eadem, aspera, cinerea, aliquando flavescent, aliquando ex viridi cinerea, intus luteo colore. Rostro est longo tubuli modo excavato: Cornua Limacum more attolit, atque eodem modo serpit, iisdem cornibus iter sibi præterendit. Linguam ex tubulo illo canaliculato in latere procurrentem habet, quæ callosæ huic parti adhærescit, cui caro ipsi testæ adjungitur. Est autem ea *aro*, musculus quidem fortis ac candidus, mediæ testæ alligatus, quo Purpura tanquam congenito quodā operculo, carni parulæ opposito, diutissimè extra aquam vivit. Marinam enim aquam haustam asservat, qua pluribus diebus refovetur ac sustentatur. *Caput* illi cartilagineum ac durum.

Plin. H. N.
l. 9. c. 30.

TAB. X.
5. 6. & c.
Nomen.

Plin. H. N.
l. 9. c. 35.

Plin. H. N.
l. 9. c. 36.
& 39.

Plin. H. N.
l. 9. c. 36.
Descriptio.

durum. Os in ea parte qua scopulis hæret, rotundo foramine pervium, quo lapides arrodit, & in stomachum exugens demittit. *Hepar* quoq; habet viscidum, tenaci quodam lentore præditum, ut penè viscum esse appareat. Sed hoc quod de hepate, brachiis, & corde, Bellonius scripsit, pro fabulosis censet Rondeletius.

Et hæc quidem recentior. Descriptio est. Ut vero & veteres videamus, Clavatam Plinius facit Purpuram ad Turbinem usque, aculeis in orbem septenis ferè, qui non sunt buccino. Testam intortam curriculatim in crepidinem desinere, apud Aristotelem extat. *Partes* illæ quæ Dioscoridi secundum Hermolaum *κίονια*, aliis *ίόνια*, quod violam significat, partes sunt interni Purpure corporis mediæ, fibratæ, torosæ, & firmæ, circa quas testæ volumina capreolorum ritu circumvolvi incipiunt secundum Dioscoridē: vel quibus hæret vena illa vel membrana illā florea Purpurar. continens, inter *papaver* nempe quod turbinata omnia sua clavicula continent, quod est inferiore loco, & cerviculam seu collum superiore loco.

De eo flore seu succo ita breviter Aristoteles. Inter *papaver* & collum florem continent, textura densa, colore candidæ membranæ, qua ablata & compressa manus flore tingitur. Hoc ipse flos videtur esse: reliqua concretio, quasi alumini. Id Plinius florem in mediis faucibus habere dixit, liquoris eum esse minimi in candida vena, unde pretiosus ille bibitur, nigrantis rosæ colore subluces, reliquū corpus sterile. Rondel. partem succum continentem, cordi proportionem respondere existimat, florem, sanguinis loco esse. *Caro* earū penitus includitur, nec ulla ex parte, excepto capite conspicitur, ut apud Aristotelem habemus: Testa sua adhæret. *Linguam* duram habere eaque testas e scarum perforare, non tantum ab Aristotele, sed & Plinio, qui longitudine digitali facit, & Æliano proditur: Rondeletius promiscidibus muscarum quæ inter cornua

comparat, & firmam, torosam, quæq; exeri possit, concedit: sed tam durā esse ut testas perforaret negat, rostro id fieri verisimilius addens. Qui *κροκίδα*, seu *κροκίδα τῆς πορφύρας* apud Galen. l. 3. lenum, pro tomento purpurarum, de Medic. pro depexo & contuso in medicamē. secund. loc. tis veteres uterentur, sumunt, vehementer falluntur. Lanæ n. purpura tincta crassior & minus curata pars est, cuius & Dioscorides meminit. *Operculum* varia apud authores sortitū est nomina. Plinius purpurarum cavum dixit, Aristoteles *καλυμμα*, *ἑπικαλυμμα*, Galenus *πώμα* vocavit. Alii *βλάττον βυζάνιον*, vel *βύζαντον*, à Byzanto vel Byzantio Africæ nominant, & longè verius quàm illi, qui id nomen ori narium purpure adscribunt, quas non habet, vel qui blattas Byzantias buccinorum & Conchyliorum permixta opercula appellant. Galenus Indici conchilii testam inter ostraca & testas purpurarum & muricum generatim comprehendit. Nec negandum fortè est, Conchylii, buccinæ & purpure opercula, nec substantia, nec viribus differe, nisi fortè unguis odoratus differētiam supponat. Nam blatta Byzantia dū uritur ingrati est odoris, & castoreum redolet: unguis vero, suavē odorem spirat. Potest tamē & id quod *ἰωδες* Græcis dicitur, gravis apud Latinos odoris esse, & in quibusdā locis unguis odoratos, fetidos in aliis reperiri. Ut ut sit, Carni hæret operculum purpurarum ut unguis noster. Ex filis seu fibris coagmentatur, & quia pinguedinis aliquid in se habet, fumum cornu modo accensum emittit. Et hæc quidem de partibus sufficiant.

Flori, qui & succus Plinio, *τὸ αὐτὸς τῶν* Flos Purpure. *πορφύρας* Græcis, varia indita sunt nomina. Vitruvius ostrum dixit *ὀστρὸν* Vitru. l. 7. *sepius*, cui Virgilius Sarrani epithetō, à Sarurbe Phœnicicæ, quæ postea Tyrus, unde purpureus color & Sarranus & Tyrius, secundum Massariū addidit. Nec tamen omnis Purpura ostrum, ut tradit Gellius, quamvis omne ostrum purpura sit, quod exuberantiam splendoremq; ruboris habet, hoc est, illustratur splendore, quod alia

Arist. H. A. l. 5. c. 15.

Arist. H. A. l. 5. c. 15.

Plin. H. N. l. 9. c. 36. Ælian. H. A. l. 7. c. 34.

alia purpura caret, *Saniem* etiam præter Plinium idem Vitruvius vocavit, Pollux *λαθρον*, Fucus, pelagium, venenum Tyrium, purpuriflum, *καλχα* eiusdem sunt apud alios nomina. *Tria* verò huius floris, à varietate coloris sumpta, posuere *genera*, *πορφύρεα*, coloris violacei, saturati, & subnigricantis, quo colore *πορφύρεον κύμα* Homerus dixit: qualis erat amethystina & quæ è Pelagiis purpuris & buccinis fieri solebat. *Φινικίδα* punicatorum rubentem colore cocci, qualis fuit Tyria vel Tarentina. *Αλεργίδα* deniq; colore glauco, irato mari simili, austero, diluto, qualis fuit conchyliata, Tyria omnium celeberrima, quæ & ostrum dicebatur quo obscurior & nigricantior eo carior. Sed & à loco aliqua est differentia. Testatur enim Vitruvius, ostrum quod legitur in Ponto & Gallia, quòd hæ regiones sint proximæ ad septentrionem, esse atrum. Progredientibus inter septentrionem & occidentem, lividum, quod legitur ad æquinoctialem, orientem, & occidentem, violaceo colore inveniri: quod verò meridiana regionibus excipitur, rubrum esse. Inventum fuisse à Phœnice regnante à Tyrio Philosopho Hercule produnt. Cum enim in eam, referente Cedreno, Tyri partem adscendisset quæ ad mare pertinet, pastoris canem concham vorantem, & pastorem lana sanguinem prout ille putabat à sanguinis ore abstergentem vidit. Tinctura delectatus, lanam istam ad Regem detulit, qui lanam ita tingi, & sibi vestem parari curavit.

Locus.

Quantum ad Purpurarum locum in pelago & litoribus. ut in Differentiis dicemus degunt, nec ulla magis idonea ipsis regio quam limosa. Si amnis in mare effluentis aquam degustarint, eodem die moriuntur. Dies tamen circiter quinquaginta extra aquas captæ vivunt, sæpe in arena latent, & canis exortu circiter tricenos dies conduunt. Sunt tamen peculiariora loca, quæ à Purpuris celebrantur. Virgilius & Petronius Assyriæ meminere, Plinius Meningis Africæ insulæ, non longè à Syrtibus sitæ, quæ

Lotaphagorum terram putant, & Getulici litoris: Laconica Pausaniæ, Horatio & Valerio Flacco celebris est. Unde huic fucus Tenarius; Arriano, Muxa emporium ad mare rubrum. Tenientem purpuram apud Plinium lego, fortè quod in tæniis seu cautibus in mari candidatibus, & fasciæ instar pratensis, degit. Dialutensem seu fortè Dialutensem alibi, quasi *δία* & *άλυτον*, quod per salum æquor rapit: Porphyrysa Aristoteli à frequentia Purpurarum dicta est. Fit & Melibææ apud Festum mentio. Celeberrima deniq; omnium est Tyria, ut Plinius de suo tempore scripserit: Tyri nobilitas nunc omnis Conchylio atque Purpura.

Vicitant pisciculis teste Aristotele: sed nec algæ nec muscum rejiciunt. Ita ista in suas testas recipiunt, ut iis in orbem exertis, quasi circulari convivationem præbeant, una alterius alimentum depascente. Plinius pabulo & solo purpurarum genera discernit, ut sit lutense, quod putrilimo; algense, quod alga; dialutense quod vario soli genere, pascitur. Istud esse vilissimum.

Ortum apud Aristotelem invenio duplicem. Velenim ex limo existunt vel ex salivario lentore, ut Plinius prodidit, quem emittunt, de quo ita Aristoteles. Purpuræ verno tempore eundem in locum congregatæ faciunt id quod vocant favaginem. Est enim favi specie, sed minus expolita. Quemadmodum si è folliculis alborum cicerum multis quiddam cõpactis. Nullus his patet aditus, neq; inde fiunt purpuræ, sed tum illæ tum testacea alia ex putredine atq; limo proveniunt. Sed id est quasi purgamentum & ipsis & buccinis. Etenim hæ quoq; favificant. Generantur verò hæc quoq; favificantia, quemadmodum cætera testacea. Cæterum etiam facilius, si qua subsint principia referentia genus suum. Cum n. incipiunt favificare, emittunt lentorem quandam mucosum, ex quo folliculi concreescunt illi. His igitur omnibus solutis, effluit in terram id quod continebant. Atq; eo in loco purpurillæ minutæ

Victus.
Arist. H. A.
l. 8. c. 2.

Generatio.

Arist. H. A.
l. 5. c. 14.
edit. Scal.

minutæ oriuntur atq; concreſcunt, quæ herentes purpuris capiuntur, aliquot etiam inchoatæ tantû. Quod ſi ante partus tempus capiantur, in iſtis ſtoreis non tenerè pariunt, ſed in eundem locum conventu factò quæ admodum etiam in mari: Unde per cratium anguſtias quaſi racemi prodeant. Celerrime inter teſtacea creſcunt. Sex annos vivunt, & ſingulis annis incrementum earum per orbem patet, quibus totidem quot annos habent, teſta claviculatim intorta in crepidinem deſinit. Parum progrediuntur, & ad eſcas à longo accedunt, quòd odoratu valeant. *Tinctura* ratio alio ſpectat. *Uſum in Cibis* præſtant, & hoc cum oſtracodermis communes habent, quæ ſaltum ſuccum continant, eodemq; alvum ſubducant, carne autem ſint dura. Athenæus ex Hiceſio papaver copioſius alere ſcripſit, magis tamen Scillam ſapere. Colla ægrè confici & difficulter ſecedere excrementum facile, partes extremas aptiſſimas eſſe, & ſeu elixas ſeu aſſas humori ori gratum & ſtomacho acòmodû emittere, Xenocrates prodidit. Peculiare eſt eis quòd coctæ iuſculis ſpiſſent. Nec à *Medicina* excluduntur. Contra venena prodeſſe, docuit Plinius, contra Dorycnion Nicander. Saliva recentia vulnera agglutinâtur. Callus pro ſe operiuntur tuſos glutinat nervos præciſos, Teſtæ cinis puſtulas verendorum è melle diſcutit, ad dentiſſicia cum roſis & caryophyllis uſurpatur. Cû pulvere glycyrrhizæ, papaveriſq; ſemine, cremore hordei pauco vino albo pulmonib. auxilantur, & fluxiones ſiſtet. In pollinè redacta ulcerib. malignis còpetit. Cum melle illita, pilos attenuat. Filum è purpura quo viperæ cervici circûpoſita ſuffocata fuit, collo circûdatum tonſillar. affectus tollit. Aëtius verò purpuram hircinio felle madefactam & mulieri umbilico diebus ſeptem impoſitam conceptum juvare tradit, ſi deinde creſcente luna cum viro congrediatur.

Differentia ſeu genera, ſi quæras, ſunt *Magnæ*, quæ ad Sigæum & Loctû Idæ promontoria gignuntur, *Parvæ*, quas

Euripus fert & Caria. *Pelagiæ* quæ magnæ & ſcabræ, quarumq; ſlos magna ex parte niger, ſed nonnullis puſillum rubidus. Nonnullæ ad pretiû minæ evaſiſſe, prodidit Ariſtotel. *Littorales* quæ parvæ, & flore ſunt rubro. *Echinatæ*, quæ vel pluribus ſpinis maximè in poſtica parte horrent: vel rarioribus, minoribus, & brevioribus. Illæ extra modò flaveſcunt, modò cãdicant: intus, modò violaceiſcunt coloris modò rubicundi. Iſtorum tota turbinata pars rubicundo colore conſpicitur, dorſum verò partim rubet, partim viſcit. Anterior muçto acutus non eſt, ſed notabili latitudine ſpectabilis. Intus colore ferrugineo, flaveſcente ac eleganti cæruleo variant. Sunt & *Rubræ*, ut in Auſtrinis partibus *Nigræ*, in Aquiloniis; *Lividæ*, in Occidentalibus & Orientalibus. Marmoreæ qualis eſt illa longis undiq; tuberibus, ubiq; ferme duplicibus at minimè acutis ſed obtuſis plena, labro laſiſſimo, quaſi canaliculato, binæ enim id foveæ percurrunt, tota ferè marmoreæ duritiei, undiq; candida, præterquam in extremis foraminis oris, quæ purpuraſcunt. Ad hanc pertinet tota ex cinerem candida, minor quàm priores omnes labro ſubtus ſpinoſa, cum aliò qui nullè in toto corpore ſpinæ dentur. Vêtre eſt plene ſeſſili, ſeu non turbinato. *Pentadactyli* deniq; qualis eſt illa quâ ſuperius deſcripſimus. Geſneri quâ ex Adriatico mari accepit.

ARTICVLVS III.

De Buccino.

Buccinum à ſimilitudine potius ^{TAB. X.} ^{8.} buccini quo ſonus editur, rotunditate oris in margine incifa, ut Plin. viſum dicitur, quàm quod vel buccis admodum ſonos muſicos edat, vel buccas inflare tubicines rogat, ut Bellonius voluit, Gillius maſculino genere extulit, quidam etiam dentale buccinû interpretantur. Græcis hodiernnis *φύκιον* dici Geſn. autor eſt: nonnullis *εργόμενος* & *εργεῖται* idè ſignificant. Còmuniter *κήρυξ*, fortè à cera, quam mucò ſimilem mutuo attritu ſalivant, & Græcis eſt *κινεῖται* vocatur: quod

plin. H. N. quod vocabulum ex antiquis Græ-
l. 9. c. 36. cis nonnulli pro purpura sumpserunt:
Plinius nonnunquam muricem trās-
tulit Athenæus purpuræ filium no-
minat.

Descri-
ptio.

† Arist. H.
A. l. 4. c. 4.

Testa tegitur scabra, eaque con-
genita promuscidibus, ut musca in-
struitur, quod membrum linguæ ef-
figiem præ se fert. Venter os protinus
excipit, similis in umbilicis iagluviei
avium. Infra duo candida quædam
firma speciem annulari, qualia in
sepiis inveniuntur: sed hæc solidio-
ra. A ventre gula duplex longa ad
papaver usque, quod papaver in fun-
do est: quæ omnia perspicere possunt in
sinu verticoso testarum. Quod gula
jungitur intestinum est, à qua conti-
nuo tractu fertur totum simplex us-
que ad exitum, incipiens à verticoso
sinu quo papaver continetur, atque
indelaxior. Papaver verò pars eius
ima esculentaq; est. Inter hoc & cer-
vicem flos est, sed, ut Plinius dicit,
dilutior & minus floridus. Et hæc de
Buccino veteres. Bellonius Buccini
concham ut plurimum minimi o-
vi magnitudinem non excedere,
strias in tergore quinas habere, ut
nerita, plerisque in gyrum tubercu-
lis obtusis, brevibusque obseptas,
multo quam in purpura frequentio-
ribus, sed ubi in claviculum desinūt,
unicum tantum eam comitari testa-
tur. Interna parte incisam oris ma-
gnitudinem habet turbinum modo,
& canalem ad latus, per quem lin-
guam exierit, purpurarum modo: eo-
demq; operculo contegitur, qua et-
iam turbinata omnia, ne in testas cō-
tracta ab externis offendantur. Co-
lor testæ intus lacteus foris fulvus,
tantaque magnitudine aliquando
crescit, ut ad Cartejam purpuræ &
buccinæ deca cotyli, id est, decem
cotylorum capaces reperiantur.

Locus. Locum si spectes, petris adhærent,
Arist. H. A. circaque scopulos leguntur. Canis
l. 8. c. 13. exortu circiter tricenot dies latere
Arist. H. A. scripsit Aristoteles, quod Plinius de
l. 5. c. 15. muricibus accepit. Annos circiter
sex vivere, idem tradidit.

Genera-
tio.

Idem ipsis *Gignendi* modus qui
purpuris. Semen ad generationem

nullum habent. Favificare in mo-
re eis positum, Ova sub lapide pronæ
parte oblonga albaque, deinceps
pendentia disponunt, quæ ita dispo-
sita favi nomen habeat ab apum si-
militudine. Supini autem sub la-
pide stabulantur, cum favificant:
quo verò tempore favos exstruunt,
si incoquantur & abscindantur, ova
intra continere comperientur: quæ
saliverio lentore lapidibus & cauti-
bus ferruminant, ut inde decidere
non possint: quod tam magno artifi-
cio constituunt, ut nihil coacervatum
esse videatur.

De earum in *Cibus* usu, hæc scri-
psit Xenocrates. Buccinæ sunt du-
riores purpura; & magnitudine ad
loco differunt, triplicesque vires ha-
bent, testæ, colli, & excrementi in
testa contenti. Nam scabra sub-
stantia piscis alvum sistit, ac præ-
cipue si assetur: contra magis facit
elixa.

Collum earum alvum sistit,
difficulterque concoquitur: idcirco
ex sinapi vel aceto, aut liquore, aut
pipere corrigere ipsum debeat, qui
eodem vescuntur. Aqua denique
quæ ex eis manat, calefacta, ventrem
subducit: Cum eo verò excremento
quod testa continetur, cocta, magis
gilva fit, & piscis qualitatem præ-
fert. Si verò totæ decoquantur,
maiores sistendi vim habebunt, &
sitim offerent. Quidam verò eas
elixas lævigant, & æquæ ac urticas
condiunt, huntque origratæ. Luna
exoriente plenæ, & æstate gra-
ciles. Eadem apud Dioscoridem,
Galenum & Diphilum invenire li-
cet.

Habent & in *Medicina* usum. Car-
dialgia laborantibus in cibis præscri-
bit Trallianus, purulentis etiam, si
salsus humor est. Ad alopeciam,
usta, trita, & in oleo veteri subacta, &
ad glutinis crassitudinem redacta à
Myrepsō vehementer commendan-
tur.

Galenus ad ophelidas & lenticu-
las, in furno assæ & ex melle trita
commendat. Andernacus ex succo
limonum detrita ad genus mulierū
decal-

Ufus in
Cibis.

Ufus in
Medicina.

dealbandas deprædicat, præsertim si
aliquid argenti vivi sublimati, iisdem
inieceris. In Belgio contra tussim ina-
nem inprimis & puerorum, potus ex
buccino propinatus.

Differen- tia,

Differētiās quod spectat, Rondeletius duo reperiri scribit, parvum, nempe, lineis frequentibus asperiusculum, & alterum ei simile, nisi quod lineas prominētiore habeat, & transversas, ut striatum meritò dici possit. Est & testa spissiore durioreque, nec non genus magnum coloris violacei, sed cuius orbes flavescent, & in ore candicant. Gesnerus se & aliud vidisse scribit, purpuræ similis, figura & magnitudine propius, tuberculis undiquaque dispositis, deinceps rotundis scitè omninò eleganterque *στῆθος* elevatum; nec in mucronem adeò exporrectum, sed capite obtusiore brevius. Missa & Aldrovando peregrina, colore & duritie marmoris, circulis rosas æmulantibus.

ARTICVLVS IV.

De Murice.

TAB.
X. & XI. **M**urex modò Buccinum , modò
Nomen. Purpuram significat , taceo co-
lorem purpureum , cui Muricis no-
men imponitur. Hic pro testaceo su-
mitur , quod & turbinatum & lon-
gos firmosq; aculeos habet , nomen-
que ab asperitate muror. sortitum
Descri-
ptio. est. Perottus inter ostrea enumerat,
propter scabritiem corticis. Sed alia
in Ostreis asperitas , alia in Murici-
bus. Illa per totam superficiem sese
reperdit : hæc, aculeis quibusdam
per intervalla eminentibus constat,
iisque longis & firmis, quod Plinius
quoque firmare videtur dum ait. Fir-
mioris jam testæ murices & Con-
char. genera. Valerius Flaccus dum
intortum vocat, de buccino sumen-
dus est.

Descri-
ptio.

Vsum in Cibus quoque habent, sed illaudatis. Xenocrates enim falsos virofos esse, & ventrem turbare, urinam ciere, ori ingratos, concoctu difficiles, puitam gignere, &c. scribit. Scribonius Largus tamen & Cel-

fus inter Cibos stomacho gratos re- *Largus*
 censent. Apud Macrobiū etiam *Compe*
 cum aliis conchis in epulo apponun- *104.*
 tur, quo die Lentulus flamen inaugu-
 ratus est.

Vsum in Medicina si attendimus, *Vfus in*
Carnes appositæ pilos in mammis *Medicina*
tollunt : Testar. cinis cum oleo tu-
mores aufert; panis resistit; Capitis
ulceribus cum melle illinitur; macu-
las in facie mulierum purgat, & pa-
rotides tollit. Habetur & pro denti-
fricio. Carbunculos de veretris ex-
terminare, Marcellus Empiricus pro-
didit.

Quantum ad *Differentias* & Ge- Differen-
nera, est *Murex Marmoreus*, *Triangu- tia.*
laris, *Lacteus*, *Purpureus Orthocentros*,
Coracoides, & *Aporrhais*. *Marmoreus* à
candore & duritia nomen sumit.
Rondeletii parte interna ex albo
purpurascit. Testa gravis est, densa,
solida, aculeis multis horrens, figura
interbuccinum & conchylium me-
dia, ampla, ut meritò δεκαγ'τυλ & dici
possit. Vritur facilè, & in cinerem a-
bit, acrimoniaque ob empyremum
acquirat, Ambustis medetur, cicatri-
cemque pulchram inducit, postquā
abluta, & cum oleo rosato in un-
guentum redacta fuerit. *Gefneriani*
marmorei muris color forinsecus
palescit, intrinsecus cum pulcher-
rimo splendore ex albo roseus est.
Labrum exterius protendit se & di-
latat in marginem : mucrones infra
caput seu conum testæ duo magni,
sed obtusi prominent. In ipso cono
parvi admodum & subrotundi, per
spiras deinceps non aculei sed tumo-
res visuntur. Huic accedit *Aldrovand-*
i, turbine acutissimo atque longo &
exili, undique strictus aut potius un-
datus.

Triangularis, altera parte est planus, altera ferè rotundus, sed ita, ut utrinque sint duo latera, tertium, plane pars afficiat, à qua figura, quæ huic propria est, nomen sumsit. Aculeos habet breves & firmos, vario est colore, foramen duplex habet rugosum, quo ob testæ amplitudinem & brevitatem sonus editur gravis & tristis. Operculum cum uritur fumum

f 3

emittit.

emittit. Pinguedinis aliquid habere, rectè inde colligas. Quare in oleo amygdalino decoctum in aurium doloribus utiliter usurpatur. *Lacteo* color nomen imposuit. Obtusior est turbine aliquando quam cæteri, aliquando Exochas potius & tubercula habet quam clavos. Triplicis effigies invenies apud Aldrovandum. *Purpureos Orthocentros* totus forinsecus & intrinsecus rubet, turbine candicat. Mucrones habet duodecim rectos & robustos, sex constat volutis quæ exiguis & obtusis tuberculis resperguntur. *Coracoides* Rondeletio ab infirmis & rostris corvorum similibus aculeis dicitur.

Aporrhaides quidam inter Lepades, quod ut istæ faxis adhæreant, ponunt, sed malè. Faciunt enim & Neritæ idem, quæ tamen toto genere ab iisdem differunt. Adde lepades parte altera detecta & carnem ostentante affixas; Aporrhaides verò acclinato tegmine, quod iis operculum est, ad saxa agglutinantur. Quid si illius Muricum generis sint, quæ Græci Plinio prodenre Colycia, & Corythia vocant, turbinate æquè sed minora multo, efficaciora etiam, & oris halitum custodientia. Ut ut sit, quem Aldrovandus expressit, marmorea est duritia, intus & extra candicans, septem aculeis, ab uno tantum latere, iisque canaliculatis instructus.

Plin. H. N.
l. 32.

ARTICVLVS VI.

De Conchylio.

Aldrov. l. 3.
6. 15.

CONCHYLII nomen ut ut uniuerso testaceorum generi imponatur, privatim tamen pro unica specie accipitur. Sic apud Plinium invenimus, cum in Ponto conchyliæ non esse cum ostrea abundant, scribit: sic apud Philostratum in vita Apollonii, cum, in Biblo maxima conchyliæ & murices eximie magnitudinis nasci, dicit. Sumi & pro colore, apud Plinium in primis, tam certum est, ut demonstratione non indigeat.

Qui pro Ostracio fumunt, nomen partis toti accommodant. Est autem ea parte latius qua in turbinem deficit, sine aculeis tuberculisve ullis. Foramen quo caro interior ostenditur, non rotundum, ut in purpura & buccino, sed longum. Operculum blattam Byzantiam Serapionis esse, quæ eadem, quod avium unguem æmuletur, cum ungue Dioscoridis, opinatur Rondeletius. Nec *ivādes* vocabulum obeft. Nec enim hoc semper gratus innuitur odor; sæpe etiam gravis. Ideo expressè Dioscorides, ἀμφοτέρω δὲ ἰβάδεις, θυμιάματα, καὶ τοὶ ὅλῳι ποσιὼς τῇ ὁσμῇ. At castoreum fœtet, & utrumque, tam operculum, quam hæc blatta Byzantia ad suffocationes uterinas adhibetur. Quod autem, in Indiæ nardiferis lacubus unguis inveniri, & nardi pabulo vesci dicitur, cum conchylium marinum sit, id ex aliorum potius quam sua sententia à Dioscoride scriptum opinatur Rondeletius. Similis purpuræ tegumento dicitur, non figura, sed usu potius & substantia.

Laudatissimus est qui à mari rubro Vfus, adfertur, candicans, pinguis. Baby. *Plin. H. N. l. 21. c. 8.* lonicus nigrescit atque minor conspicitur, succum ipsis & quidem purpureum inesse testatur Plinius. Partes eius omnes in medicamentis usurpantur. Crematum idem efficit quod purpura & buccinum. Caro interna medicamentis aurium dolores sedentibus à Galeno admiscetur. *Galen. l. 3. de Med. f. l.*

CAPVT II.

De Turbinatis in orbem circumactis.


ARTICVLVS I.

De Turbinibus.


Tantum de *τροχίαιδες* seu Turbinatis, & in anfractum tortis, sequuntur Turbinata, quæ in orbem circumaguntur, *Turbines* nempe, *Trochi*, *Neritæ*, *Cochleæ*, *Echyni*, & *Cochylia*. *Turbinū* haud spernenda sunt genera. *Tab. II.*

EQ


Murex marmoreus Rondel.




Murex Orientalis.




Aporrhais. Tab. XI.




Concha Longa Rondel.



Murex Coracioides.





Concha altera.




Turbines.

Concha Indica polita. *Concha echinata cruda.*




Trochus magnus.

Trochus Pyramidalis.




Trochi.

Trochi.




Turbo magnus.



Nerita Rond.








Turbo Longus.



Nerites.

Nerites.

Nerites.



Descri-
ptio.

Est turben magnus, auritus, tuberosus, angulosus, muricatus, pentedactylus: sunt & turbines in spongiis nascentes. Magnus multis voluminibus constat, margine spisso & aspero, testa alba, lineis tuberculisque multis scabra & aspera. Foramen habet rotundum, & rimam qua excrementa excernuntur. Saxis hæret turbine sursum verso. Auriti, tres icones habemus, quorum primus perelegantem & in mari Gallico rarum exhibet, alter, intus & in tergore ferrugineum cætera croceum, concha tuberosa, pronè & supinè pictum; tertius, tuberculosum, testa superius leucophæa, infernè crocea. Tuberoso tubercula nomen indidere. Varii est generis, longus, tenuis, acutior, lævis, albus, niger, varius. Aldrovandus quatuordecim Icones exhibet, ex quibus secundus, est striatus, è monte erutus. Angulosus exinde nomen sortitus est, quod testæ volumina ita à se discreta sint, ut in medio angulos efficiant. Ustus dentificiis conficiendis utilissimus est. Muricato, tubercula brevia & obtusa nomen imposuere, testa est intus purpurea, foris alba, & quasi calce illita. Pentedactylos dicitur, quod quinque appendices longas & acutas, si extremum turbinis annumeres habeat. Spongiis quæ delectantur, multorum sunt generum, quæ omnia apud Aldrovandum videri possunt.

Conchula, quæ lactea vocatur, in succo pomi Citrii, cum aqua vitæ dissoluta, mulieres ad faciem fucandam utuntur.

ARTICVLVS II.

De Trochis & Nerite.

TAB. X. **T**Roche à similitudine instrumenti, quo pueri lusiunt, appellantur. Omnes sunt levès & varii. Testa veluti crustis duabus constare videtur; externa minus nitet: quæ subjacet unionum est splendore. Alii sunt parvi, alii oblongi. Icones exhibent Magnos, Pyramidales, Nitoticos albos & maculosos, Nerita seu ut Scaliger legit Narita, Græcis

νεῖτος ἀνελτός & ἀνάγντος apud Athenæum, Hefychio νεῖται, dicitur. Nomen à Nereo Deo marino fortisros videtur, quod is fortè tali concha tanquam elegantiorè buccinæ loco, usus esse fingatur: sicut & Triton, quem visum auditumque in quodam specu Olyssiponenfis oræ concha canentem Plinius refert. Ab illis qui Adriaticum sinum accolunt etiam nunc veteri nomine appellatur. Testa est levi, si Aristotelis descriptionem sequimur, ampla & rotunda, forma buccinis proxima, papaver tamen non nigrum ut buccina, sed rubrum habet. Corpus medium testæ firmiter annectitur. Tranquillis diebus soluti pascuntur: coortis ventis recipiunt se ad saxa cancelli, atque ibi quietem agitant. Neritæ autem adhærent more patellarum, & earum quas Σομφαίδες Græci vocant, & cætera horum genera omnia. Hærent enim saxis reclinato tegumento, quod quasi tegumentum esse videantur. Quem enim usum ambæ valvæ biforibus, hunc præstat altera tandem pars turbinatis. Intus pulpa carnea, inque ea os. In rimis cavernisq; saxorum generantur, celerique incremento augescunt. Et olfaciunt, & audiunt. Ideo silentium servent necesse est, qui eos capiunt.

De Natatione eorum ita Plinius. Navigant ex his Neritæ, præbentesque concavam sui partem, & alteram auræ oppositas, per summa æquorum velificant. Ælianus & Bellonius diversos ab Aristotelis Nerite proponunt. Illius est magnitudine exigua, pulchritudine eximia, & in mari ubi sordium nihil, & tranquillitas viget inque saxis ad imam maris sedem adhærescentibus nascitur. Huius, testam in anfractum intortam habet, qua penitus inclusam, nulla ex parte præterquam capite conspicua est. Apud Aremoricos tanta huius testacei frequentia, ut abscedente æstu, magnos acervos è saxis colligant, & coquant. Quia papaver rubrum habet, pulmentum ex eo confecta, ac si minio tincta essent, conspiciuntur.

Arist. H. A.
L. 4. C. 4.Motus.
Plin. H. N.
L. 9. C. 33.

Græci

Græci crudas eius carnes edunt, quod appetentiam excitare, inprimis cum capis comestæ, credantur. Icones plurimas apud Aldrovandum vide. Nobis aliquot duntaxat exhibere visum.

ARTICULVS III.

De Cochleis.

Nomen.
Aldrov. l. 3.
c. 29.

COchleæ, Aristotele *κοχλίας* & *κόχλοι*, quod *τὰ ὄσθια κοχλοῖς μὴ* habeant, Spartanis *σέμελοι* & *σέηλοι*, Hefychio & Varino *σελάται*, aliis *πωματίαι* ab operculo, *φερέσκει* & *φερεκίοι*, seu domiportæ, *χαμαιδύτοι*, *χεαμαδελίαι*, *ἀχραδαμύλοι*, &c. dicuntur; quorum tamen nominum quædam terrestribus potius convenire videntur.

Descriptio.

Descriptionem si attendas, Teucer animal esse sine pedibus, sine spinis, sine ossibus, testaceum, oculos nunc exerens, nunc retrahens, ad exemplum quæstionis ludicræ scribit. Siliceo, claviculatim intorto *tegmine* clauditur, quod vulgus testam, & volutam, Cochlearem testam Budæus, Cochleam synecdochicè Celsus, domum Sammonicus & Statius, calicem Plinius, *κέλυφος* Dioscorides, *ὄσθιον* Galenus vocant. Si eam detraxeris hebetescere atque exspirare quidam aiunt, negant illi, qui circa initium Augusti exire, & novis super induci prodidere. *Capitis* figura carere, apud Albertum M. legimus. At Plinius equorum capitibus assimilavit, Massarius bovini præ se ferre figuram scripsit. *Cornua* quidam bina attribueret, ut Plinius; quatuor nos, id est, magna duo quæ posteriora sunt, & minora totidem ferè in fronte, habere videmus. An *Oculi* dati sint disquiritur. Pro visu tentamenta proportionem puncti attritoris in summo corniculorum accepisse, tradit Scaliger. Carere iis, & corniculis in quibus arenacea durities, prætentare iter, Plinius. Habere in summitate cornuum, & cum appropinquant, oculos in cornua retrahere, cornua in caput, & caput in corpus, Albertus. *Os* eis inest. *Dentes*, acuti, tenues præ-

Scalig. in
Arist. l. 1. de
plant.
Plin. H. N.
l. 11. c. 37.

duri, eiusque indicium, derosam à Plin. H. N. minimis earum vitem, dentibus car- l. 11. c. 37. nosum quid interiacet. *Promuscidem* etiam inter aculeum & linguam habent, & ori jungitur quasi ingluvies avium; à qua stomachus est, quem excipit venter, in quo situm est, quod papaver vocatur, mox intestinum continuum tendit simplex, originem à papavere illo ducens. *Saliva* quæ punctis acu vel stylo carnibus manat, myxa Græcis dicitur.

Quantum ad *Locum*, reperiuntur *Locus.* in mari, fluviis, & terra, quarum istæ *Arist. H. A.* sylvas & confita arboribus loca potissimum amant. Hyeme propter frigus nimium, æstate quod fervidum tempus reformident, in occulto delitescunt, suoque succo vivunt, nisi quid rosis de cælo deciderit. Ideo Varro. *Locusis* (pro cochleis) me- *Varro R. R.* lior, quem & non concoquit sol, & tangit ros. Locum mutare Ælianus prodidit, ad Propontidem calidam hyemare, ad Ægialum æstatem insumere scribens. *Ælian. H. A. l. 10. c. 6.*


Rore *vicitare* dixi, sed non solo. *Victus.* Sub noctem sæpissimè ad pastum exeunt, & tum post pluvias æstivas & autumnales accenso lumine à rusticis capiuntur. Plinius mirè caulem *Plin. H. N.* asphodeli in Campania prosequi & *l. 22. c. 22.* sugendo arefacere scribit. Theophrastus easdem inter ficorum genera recenset. Saginabantur apud veteres in vivariis. Instituit ea Fulvius Hirpinus in Tarquinensi paulò ante civile bellum, quod cum Pompeio M. gestum est, distinctis quidem generibus earum: quia & saginam commentus est, sapa & farre aliisque generibus, ut cochleæ quoque altiles ganeam implerent: cuius artis gloria in eam magnitudinè perductæ sunt, ut octoginta quadrantes caperent singularum calices. Macrobi *Macrobi. Saturn.* hæc saginandi ratio ignorabatur. *l. 3. c. 13.*

Inimicitias cum lacertis gerere apud Plinium legimus, cum laris avib. *Plin. H. N.* apud Ælium. Massarius ubi limax *l. 8. c. 39.* fit, neque suam esse, neque perdicem *Antipat.* ait. Sale super limacem *piecto*, totū ferè liquefcere, & in aquā viscosam converti, Albertus M. prodidit.

De

Cochlea cælata.


Cochlea rugosa et umbilicata.



Cochlea Sarmotica.





Cochlea cælata cum suo operculo.





Cochlea cylindroides alter.

Cochlea olearia.



Cochlea echinophora Rond.

Cochlea cylindroides prior.





Limax marinus.

Cochlea depressa.

Cochleæ operculum.

Cochleæ operculum.




Echinus spoliatus a suis spinis.

Echinus Spatagus, et Brissus.




Echinus idem in duas

partes

dissectus.



integer



Genera-
tio. De *Ortuno* non convenit inter autho-
Aristot. l. 3. res. Solas ex omnibus testaceis in coi-
de Gener. tu cohærentes videri, & vere ac autu-
l. 11. mmo prægnantes apparere, ex Aristotele habemus. Gelfnerus quoque Limaces coire, & ova parere candida, magnitudine oculorum lucii piscis, iisque incubantes mense Maio aliquando inveniri, audivisse se scribit. Albertus, & Porta ex limo, & putrescentibus aquis vel rore oriri, & ideo brevior vita frui, Hyeme tantum oriri, quod Plinio placuit, vix verisimile, cum easdem lactucis innasci testetur, nos vicinæ sciamus. Testa detracta hebetescere, & processu temporis in aureliam transire, ut eruca, atque immobilem vivere, sed quidnam ex eo animalis pennati oriatur, compertum nondum esse. Massarii fide addimus. Terrestres contractione & concussione corporis moventur.

Vfus. De *Vsu* earum in Cibis apud Romanos constat, ex superioribus. An verò boni vel mali sint succi, inter scriptores non convenit. Celsus boni succi esse prodit, nec intus vitari; Galenus, etsi Græcis in mensa frequentes, sed concoqui pertinales, crassioris succi, & quæ ventriculo diutissime immorentur, solidius alimentum præstare, sed tardius & paulatim concoqui. Archigenes inter ἀσθμας nutritia, & syncopis exhibenda reponit: sed mendum, cum Mercuriali suspicor, quod Aetius, quid verbum transtulit cochleas omiserit.

Galen. l. 3. Plinius nec veteres, nec recentes
de Alim. ori gratas esse reliquit. Fluviales
facult. c. 2. & albas virus habere, ut & sylvestres. Alexandrinis idè frequentiore elephantiafin, quod crebro falsamenta, limaces, quidam & asininas carnes comedunt, si Caelio Rhodigino, & Galeno credimus. Mathiolo quæ in apricis degunt locis, & odoratis visitant herbis, iis quæ in opacis & palustribus degunt, præstant. Dioscorides terrestres stomacho utiles esse, nec facile corrumpi scribit. Optimas Sardonicas, Africanas, Astypaleicas, & quæque in Sicilia ac Chio gignuntur, quæque in

Liguria Alpibus, pomatiæ, cognominantur. Marinas facile excerni: fluviales virus olere; quæ vepribus frutetisque glutinatæ cohærent, quas sefilos vocant, ventrem & stomachum turbare, addit.

Marcellus earum usum penitus improbat. Apud Apilium lacte & pulve pastas invenies. *In Medicina* frequens earum usus. In capitis dolore, caput præcisum de collo suspenditur. Earundem pinguedine capilli multiplicantur. Integræ pro febris amuleto, de collo suspensæ commendantur. Oculis caligantibus Africanas combustas & tritas. Marcellus Empiricus commendat; auribus dolentibus, cum oleo nardino aut rosaceo fervefactas Asclepiades; cum hordeo decoctas Villanovanus. Cartilagine, carnem earum, glutinare, Hollerius prodidit; nervos Dioscorides. Tagautius emplastro ad maturanda œdemata adhibet. Sanguinis è naribus fluxum concisæ ex aceto sistunt. Cum melle & felle bovis mistæ, anthraces maturant & rumpunt. Tritæ cum suis volutis hydropicorum aquas exsugunt.

Aqua ex Cochleis destillata, hecticam febrem ad uncias sex sumpta tollit; maculas oculorum, cum fimo lacerti, corallio rubeo, & saccharo destillata, abolet: clavos & verrucas, resectas, mense Maio vel Octobri detracta & insillata sanat. Pollen de testis limacum inanibus contritis fissuras manuum pedumque inspersus tollit, &c. Plura vide in Aldrovando.

Iam de *Differentiis* dicendum Differentia est. Multiplex autem ipsarum est varietas, magnitudinem, figuram, colorem, regionem, victum, vitam, & alia, si spectemus, sunt nigræ, albæ, ruffæ, varinæ, nudæ, testæ. Adhærent fico, lauro, asphodelo, carduis, aut foliis gregatim.

In mari rubro, maximam, testa purpurea, cum spira in medio, mira colorum varietate, inveniri, scribit Ælianus. Sertum, inquit, dicens, *Ælian. H. summo artificio & ornatu contex-* A. l. 11. c. 21.

tum, è floribus multiugis, viridibus, aureis, rubicundis, per æqua intervalla digestis. Gyllius tantæ se unam magnitudinis vidisse asserit, ut tantum vini caperet, quantum piscator exficcare uno prandio posset. In Ægypti Nilo grandissimæ feruntur, vocales, ululantium expressa similitudine.

In agro Romano sunt quædam lupinis paulò maiores, quæ autumnò quorundam carduorum caulibus accervatim adhærescunt, si Mathiolo credimus. Minutæ fortè Plinio. Sunt & *Echinophora* oblongæ, quibus tubæ loco utuntur tubicines; *Pomatia*, quæ cancellum qui testas ingreditur, raditur, radò excedunt, & in Tridentinis montibus, è Terra, hyeme, & frutetis, uncis quibusdam ferreis, propè fruticum radices, terra circumfossa, eruuntur, præstantissimæque censentur.

Seseli, quæ sylvestribus frutetis & sentibus adhærent: & ex quibus quædam opere vermiculato à natura elaboratæ conspiciuntur: *Cavatica* in Balæaribus insulis quæ non prorepunt è terræ cavernis, neque herba vivunt, sed uvæ modo inter se cohærent. Minus denique *vulgares*, quæ adhærente operculo eiusdem testæ sese operiunt, & semper terra obruuntur. Circa maritimas Alpes quondam effodiebantur, fortè & hodiè. *A regionibus* sunt *Illyrica*, quibus magnitudo præcipua; *Africana* quibus fecunditas; *Solitana*, quibus nobilitas; *Sicula*, quæ modicæ, quoniam magnitudo duras, facit, & sine succo, *Astypalaica*, quæ laudatissimæ; *Linusia*, ab agro cui nomen lina est, ita dictæ, juxta Pytiuntem, medio inter Parianam coloniam & Priapum spacio; *Germana*, quas Vegetius in portione equi prophylactica, admiscet. *Acerata*, quæ latæ & multifariam nascuntur. Et hæ quidem Terrestres sunt. Marinis accensentur, *Sarmatica*, *Calata*, *Olearia*, *Depressa*, *Rugosa*, *umbilicata*, *Echinophora*, *Cylindroides*, & *levi turbine obverso*, addi his *umbilici* possunt.

Sarmatica, in mari Sarmatico in-

venitur. Dolium corporis mole æquat, cornibus arboreis cervum. Extrema cornua in orbiculos rotundantur, unionum instar splendentes. Cervice est crassa; oculis accensæ candelæ modo micantibus; naso obrotundo, & pilis felium ad instar obvestito; rictu oris magno, sub quo pendet promineteque carnea moles, aspectu subhorrida. Quatuor nititur cruribus totidem latis & aduncis palmis.

In Dania se vidisse, fortè mentitur Thevetus. *Calata*, Caragolo de Aldrov. l. 3. mat, seu Scaragolo Hispanis, testa c. 31. est turbinata & satis longa, cælaturis inæqualis & scabra, intus lævi. Operculo superiore parte est non aspero, intus tuberoso, inæquali, & rubri coloris. Succum falsum gignit, & venerem stimulat. Testa in aceto macerata, superiore veluti cute vel crusta spoliatur, redditurque cochleæ margaritifæræ modo splens, nitida & unionis modo colorata. Huic similis est Cochlea maculis viridibus Aldrovandi, nec non ea, quæ inter Turbinem & cochleam cælata mediam naturam habere videtur. Quæ hic exprimitur, operculo est miniaceo, miniaceis tuberculis, turbine violaceo infra, supernè ferrugineo. Cavitas inter turbines, viridi est colore.

Olearia nomen à Plinio inditum, quod ea oleum decapularent, vel in usus quotidianos haurirent. Rotunda est, intorta, & adeò magna ut aquæ quatuor libras capiat. Huiusmodi aurifices, additis ansæ & basi in urceos efformant. Aldrov. l. 3. c. 32.

Depressa, est altera parte plana, altera excavata in voluminibus, quæ initio parva paulatim crescunt ad foramen usque. *Rugosa*, rugas per transversum ductas, ita elatas habet, ut & striata dici possit. Colore est intus albo foris flavescēte, valdè fragili. *Umbilicata*, & quidem in medio, in satis insignem magnitudinem excrescūt. Aliæ nigricant, aliæ corneo sunt colore, aliæ maculosæ. Ad cochlearum terrestrium quæ conglomeratæ fecerunt, crassioribus caulibus adhæ-

Plin. H. N. l. 9. c. 56.

Aldrov. l. 3. c. 32.

Aldrov. l. 3. c. 34-35. 37-38.

Echini quantum gaus
Rond.

Echinus marinus ferrugineus.

Echinometra amethystini
coloris.

Tab. XIII.

Echini species oblonga aperta.

Echinometra Aldrou.

Concha *Margaritifera.*

Concha imbricata Rond.

Concha Echinata.

Pina magna

Concha tridactyla.

Concha squamosa.

Concha Pictorum.

Concha corallina.

Concha rugata.

Concha fasciata.

Concha Longa.

Concha vera cum animali.

Concha tenuis: testa.

rent, formam quam proximè accedunt. *Echinophora* aculei quibus tota conspersa est, nomen indidere. Operculo, succo, substantia, à parvo buccino non differt. *Cylindroides* pyramidem refert, pyri modo turbinata, magnitudine pugni, & punctis variis subcastaneis notatur. *Levem turbine obtuso*, politam admodum Rondeletius facit. Testa est crassiore, carne minus dura. Frequentissimè circa Levinum insulam capitur. Hisce adde *Limacis marini* insolentem speciem, nec non Cochleam marinam aliam tuberosam, quorum Icones damus. *Umbilicum marinum* Bellonius lapidi rubro persimili tegumento rugoso & scabro occludi scribit, quodque solum inter Gallici Oceani turbinata politiem admittat. Rotundiori hiat ore, edulisque est. Clavicula earum herbarum more, quæ sese arboribus alligant à dextra ad sinistram invertitur. Papaver in clavicula testæ continetur. Rondeletio *Umbilici* vocantur, quod præter foramen illud quo cochleæ faxis inhærent, quoque exerunt, alterum habeant umbilico admodum simile, quod profundum convolutionum veluti centrum est, vel circa quod anfractus Cochleæ convolvuntur, veluti circa *καυκλίου*.

Duos inprimis apud Rondeletium habemus, quorum prior, superiore parte latior, mox in turbinem definens, nigris, rubris, & albis tuberculis, corallorum omnium colorem & naturam referentibus, distinguitur: alter ciceris magnitudine, qui in spogiis reperitur, veluti granulis rubri coralli æmulis conspersus est. Inter umbilicum & foramen quo corpus exerit, testam incisam habet, incisuræ operculi vice sunt.

ARTICVLVS IV.

De Echinis.

TAB.
XIII.
Aldrov. l. 3.
p. 40.

ECHINUS, quem quidam cum Echeneide pisce perperam confundunt, Græcis *ἐχινός*, vel *δοτό* & *ἐχεν* *ἐκ τῶν σαρκῶν ἀφαιρῶν ἐσθλόν*, vel *δοτό* *μὴ*

δυνάμει *ἐχέει* *ἄλγος* *τὰς ἀνθρώπους* *ὃ ἐστὶν ὁ ἀνέστη*, quod teneri ob aculeos non possit, dicitur. Quidam Cardium marinum, nec non Erina-
ceum vocant. Spinofus ergo est piscis. Mirum est quod de his Aristoteles reliquit. Eorum scilicet corporis partes dissectas coire rursus & redintegrari. Idem apud Ælianum & Philen invenies. Spinæ ipsis pro pedibus sunt: his ingrediuntur & volvuntur in orbem. Hinc eos sæpè detritis aculeis invenias, quod Aristoteles & Plinius prodidit. Agilius & celerius moveri qui sunt cibo idonei, vel exinde colligas, quod semper aliquid algæ suis implexum spinis gerant. Imminente tempestate sese affigere aut harena saburrare, ne à fluctibus excuterentur, inde procellarum nautis præfagia, ab Oppiano, Plutarcho & Plinio creditum: at Bellonius frustra hoc credi prodidit, quod multis promuscidibus instructi, à fluctibus volutari non possint.

Sunt ex illis quidam *αἰετώτοι*, seu Vfus cibo inepti; sunt tamen quorum & in *Eduliis usus est*. Nullo enim tempore ovis carent, ut Aristoteles prodidit: maximè tamen pleniluniis diebusque tepidis pleniores redduntur, eos si excipias, quos Pyrrhæus fert Euripus, qui hybernis mensibus meliores censentur. Exiguum illudque humidum nutrimentum præbent, Mnesitheo autem
Galen. l. de attenuante victu. thore, sed quod Galenus stomacho commodum esse existimat. Ventrem deicere, omnes ferè scriptores annotarunt; magis eos qui circa Cephaleniam, Icariam, & Hadriam nascuntur, quia amarescunt, minus, rubicundos, melinos, crassiores, & qui cum raduntur, lacteum quiddam emittunt. Plinius secundus jus eorum multis verbis commendat, quo vocabulo aquam internam esse intelligendam, Gesnerus putat. Laco apud Athenæum unum in os immisum una cum testa dentibus comminuit: nostri, inquit. Dalechampius lapide, testam frangunt, & flavam

five croceam partem, id est, ova, edunt, de quibus ita Perottus. Scinditur Echinus levi percussu, hirta testudo in duas partes dividitur: abjicitur altera, altera verò leviter aqua abluitur. Decidunt sordes, quæ in iis pro visceribus sunt: remanent quinque partita ova, subruffa, ad stellæ imaginem formata. Hæc cruda sumuntur, sapore non iniucundo, quamvis nescio quid amaritudinis habeant. Cōditos mense Decembri olim, Palladius author est.

Quantum ad *usum Medicum*, *venenatos* quidam prodidere, Arcesilaumque Batti Eudemonis F. cum in lethalem morbum incidisset, marino Echino in potionem à Learcho sumpto, mortem obiisse, apud Plutarchum legimus: quod tamen apud nullum alium invenies. Testæ crematæ cinis, Dioscoride teste, *sordida ulcera* expurgat. Eadem contusæ & ex aqua illitæ *luxuriantem carnem* comprimunt, & incipientibus *panis* resistunt. Ad *capitis manantia ulcera* valere, Rondeletius author est. Ad *abortum* eundem prodesse Aëtius prodidit.

Contra *urinae stillicidium* valere Paulus Iovius reliquit. Quippe, inquit, qui frigidityte maris præalti, in quo degunt, (sexaginta enim aut etiam amplius passuum gurgite oriuntur) ipsi quidem exigui sint, sed aculeos grandes duosque gerunt. Causa magnitudinis est, quod incrementum corporis in ipsos convertitur. Cum enim parum caloris obtineant, neque concoquere possint, multum ob eam rem habent excrementi: aculei autem & pili, & reliqua generis eiusdem excremento nascuntur. Duri verò & rigidi penè lapidis constant propter frigus. Ad *secundas expellendas*, Hippocrates tres tenuiter tritos in vino odorato propinat. *Alopeciam*, cinis cum adipe porcino vel urfino sanat, &c.

Hippocr. l. i.
de morb.
mulier.

Differen-
tia.

Differentia Echinorum sunt variae. Sunt *Toronenses*, qui circa Toronem nascuntur. Candidi sunt, & spinis & testa, & ore, augenturque forma productiore quàm cæteri, est-

que iis spina parva, nec rigida, sed mollior. *Euphratenses*, quos Eratosthenes, ut est apud Strabonem, *Strabo Geogr. l. i. c.* in insulis apud Euphratem, miræ magnitudinis esse prodit, alios pileis maiores, alios *δυσπύλινς*. In mari Indico facile congiunt capiant, si Æliano adhibenda fides. *Balthici*, qui instar magni mali sunt, & in mari Balthico inveniuntur. Duros esse, puniceis ferè coloris, & spiculis ademptis maculosos, Gesnerus prodidit. Circa Daniam quoque & Norvegiam habentur. *Fluviatiles*, ut Hermolaus & Massarius ex Paulo Ægineta prodidere. *Purpurei* mixto virore, quales in scopulis quibusdam maris mediterranei aqua contactis, apud Antii reliquias, & juxta Baias, reperiri scribit Perottus, tam grata oculis varietate, ut, si colores durent, nulla esset cum gemmis comparatio, sed mortuo pisce colores tabescunt. *Agiles*, qui velocius moventur, nec sunt edules. *Ἀἰρωπι* inde dicuntur. Calidiores quidem sunt, sed quia voraces iidem, & præ copia ingestorum cruditatem colligunt, idè in cibos non veniunt. Bellonio si credimus, maiores aculeos habent, sed crassitie minores sunt, vixque grandis gallinæ ovum magnitudine excedunt. Diversa in eis colorum varietas. Sunt omninò nigri, albi, vitrei, ruffi, flavi, cyanei. Quidam purpura splendent, subinde circumagentibus se igniculis, micantibus ad aculeos scintillæ modo. *Ovarius*, ut Hermolaus vocat, quem Rondeletius ita descripsit. Forma eius in rotunditatem conglobata est, dempta una parte parum compressa, in qua *os* est rotundum, quinque *dentibus* incurvis, intus cavis, & in idem punctum coeuntibus munitum: ii quinque maxillis internis connexi sunt, quæ ab ore intus erectæ, ex acuto in latum tendentes, & ambienti calyci non continuæ. Inter dentes interna *caruncula* quædam est, quæ linguæ vice est; mox iungitur *gula*, quæ in *intestinum* desinit longum, per testam stellatim dispositam, eius tenuibus fibris

bris suspensum, tandem in parvum foramen terminatur. Hoc foramen ad egerenda intestina destinatum est, ex adverso oris situm, ita ut os in terram versum sit, excrementi foramen supra habeatur, Partus enim ex imo petitur, unde fit ut os ad partum sit versum, excrementum vero superius parte prona testæ contineatur. *Excrementa* rotunda sunt exiguarum pillularum instar. Qualis intestinorum talis ovorum ordo est. Nam inter nigrum id quod carnis vice est, & intestinum ova flava cernuntur quæ sola eduntur cruda.

Testa tota intrinsecus foraminibus parvis plena est, per quæ movendi facultatem *nervi* aculeis suppeditant: Extrinsicus in exigua tubercula eriguntur aculeorum cotylem excipientia, vinculo, membrana, scilicet, obligata, ut in orbem moveri possint, Talis radii cum brachio articulatio. Aculeorum igitur caput cavum est, & in aculeum illi desinunt. His in gyrum moveatur.

Spatagus & Brissus prout à Rondeletio describitur, vix à cordis figura recedit, aculeis parvis & raris septus. Os dentibus caret, verum maxilla inferior superiore prominentior est, ad hauriendum aquam arenamq; accomodata. His enim & luto vescitur. In interiore testa intestinum est convolutum, aqua & arena plenum, neque ova, neque nigrum illud continet, quod carnis loco est. Rari sunt.

Echinometra, quam cum Plinio, spinas longissimas calycem minimum habere Gillius putavit, cum Aristotele Rondeletius & Bellon. calycis potius magnitudine alios superare, crediderunt. Ille eius magnitudinis exhibet, ut ambabus manibus quaqua versum extensis vix capipotuerit. Hic in Insulis mari Ægæi ita profecisse vidit, ut ad duorum pugnorum crassitudinem extuberarent. De cætero, pelagiæ sunt, minimis aculeis præditæ, brevibus & obtrusis interceptæ spiculis, colore ad extrema albicantibus, ad radices

liventibus, & ex purpurea nitentibus. Parte prona planæ, supina rotundæ visuntur.

Aldrovandus quatuor exhibet, *Prima* est aculeis non admodum longis, coloris tota ferruginei. *Alteræ* spinis denudata, extrinsecus scabrosa, coloris eiusdem. *Tertia*, magnis longisque aculeis insignita, coloris tota amethystini. *Quarta*, omnium maxima, quæ in Thyrræno & Adriaco marina nascitur, tantæ capacitatis, ut quinque aquæ libras capiat, in superiore parte gibba & rotunda, inferiore plana. Circumferentia erat duorum dodrantum & palmi. Calyx evidenter in parte anteriore apparebat albus, in quinque ceu ventres, ut in Melopeponibus divisus, quorum singuli tres habebant tæniæ, quarum media erat tanquam futura, quæ partes separat, & facillimè aperitur, aperta figuram serræ refert. Binæ illæ aliæ tæniæ sunt colore quasi castaneo, crebris foraminibus pertusæ, quæ tamen nisi expositæ aëri, non apparent, quintuplo majores ea futura. Dentes habebat qui nos, concavos, figura triangulari, &c.

Est tandem *Echinus minimus* pelagijs, spinis grandibus, longis, & præduris, modo penè lapidis. Plurimumq; un Iudeo Italus vocatur, quod perpetuò nigrescat & sordescat. Testam juglande majorem non promit, estque reliquis omnibus vividior. Nā si supinum ponas, mox suas spinas deprimit, & se in pronam partem convertit. Gignitur in alto gurgite. Bellonius ita hoc genus descripsit. Plures habet quàm alii proboscides: idcirco citius repit, firmiusque hæret. Ova non fert, sed sanguineum quiddam nigrum saniei simile, quo manus cruentat. Dentes verticillimodo habet quinos, circulari ordine dispositos, quibus algas, saxa, & conchyliorum testas arrodit. In interna eius parte multos nervos annexos cernas: ex quo indigenæ coacervatam dentium congeriem, ita cum nervis exsiccati sinunt, ut annuli vice ad signandum panem utantur. Refert enim quinquefolium, vel

quippiam simile affabrè delineatum. Ventrem in quinque partes distinctum habent, quæ ab oris verticillo testæ appensæ, ad foramen excrementi coeunt, sed disunctæ sunt, & quasi interventu liminū discriminantur. Totidē promuscides habēt Echini, quod in testis foraminulis pertusis apparent. Sunt enim ultra sex milia in quolibet.

Ad hunc referri potest, ille qui in *rubri maris* littore semipedem latus, prona parte planis, superiore gilbus, paucioribus ac minus frequentibus spiculis præditus à Bellonio visus est; nec non ille maris rubri aculeis longissimis ferrugineis, ad rubrum vergentibus, cuius pictura Castelleto Genuensi debetur.

Quem in quinto genere *Rondeletius* reposuit, saxo inhaerentem, calyce quoque est parvo, spinis pro corporis ratione longis & duris, quo ad urinę destillationes felicissimè idem usus est. Idem est cum Echino Aristotelis, quem in *Historia Animalium* describit.

Arist. H. A.
l. 4. c. 5.

ARTICVLVS V.

De Conchyliis, & quidem Bivalvibus.

PUNCTUM I.

De Conchis.

TAB.
XIII.

HActenus de Echinis, sequuntur Conchylia, quæ vel sunt *Bivalvia* seu *disjugæ*, vel *Univalvia*. Ad illa pertinent, *Concha*, *Chama*, *Ostrea*, *Pectines*, *Musculi*, *Mytuli*, *Tellina*, *Balani*, *Pholades*, *Solenes*, *Pinna*: & *Concha animalifera*. *Concharum* plura sunt genera, quæ ad *Asperas* seu striatas rugosasque & *Læves* redigi possunt.

Ex *Asperis* est 1. *Margaritifera* quæ & Indica quod apud Indos; apud quos *βέρε*, dicitur, plurima nascatur, & Mater perlarum dicitur. Androsthene apud Athenæum in Indię uavigatione ita describit. Ostreum aspectu pectini simile, concha non striata sed plana, spissu, (hirsutam Echinatorum modò malè Plinius red-

didit) non utrinque aurita, pectinis modo, sed una tantum parte. In eius carne gemina concrevit, ut in suilla grando: modò colore adeò similis auro, ut cum eo collata non facillè internoscatur, modò argentei coloris, modò omninò alba, & piscium oculis similis.

Multa earum genera Plinius recenset, cuiusmodi sunt, *Pentadactylia*, *melicembates*, *echinophoræ*, &c. Interdum tam grandes in India reperiuntur, ut referant inventam in mari insulæ Borneo, cuius caro pondus septem & quadraginta librarum pendebat. Sunt quædam totæ argenteæ: quædam colore rubicundo flammeo micant.

Carnes ab Indis quandoque crudæ, quandoque assæ comeduntur. Ex testis varia, ut cistæ, pocula, cochlearia, scipiones mulierum, & rabulæ lusoriæ formantur. Inde mulieres armillas & monilia ex illis gestant.

De *Margaritis* in *Historia Naturali fossilium* agemus.

2. *Imbricata*, seu imbricatim undata, sic dicta, quod testa ad undarum sese attollentium similitudinem distincta est. Græcorum vulgus *Aganon*, Calojeri Arabiæ *Tridacnem* vocant.

Est dura, carne concoctu difficili. Quæ *Tridacna* Plinio dicitur, est pedalis longitudinis. Utraque testa libras medicas quindecim pendebat. Eo loco quo sibi invicem cōnectebantur, singulæ duos digitos per transversum crassæ erant. Allata erat Aldrovando ex rubro mari. *Tridacna* dicitur, quod nonnisi tribus vicibus deglutiri possit.

3. *Striata* cui striæ percurrentes nomen dedere. Varia harū sunt genera. Albæ sunt, nigricant, flavescunt, per ginglymum colligantur. Est quædam *longa*, ovi figura, testis multum cavis, canaliculis parum profundis. Est & *pectiniformis* tota ex cinereo lutescens, fasciis tribus ochreis ornata. Est & extra ferruginea, intus albo, & purpureo violaceo varia, in qua animans luteo, cæruleo, & rubro varium.

Vfus.

Descriptio.

Est &

Aldr. l. 3. c.
41.

Athen. l. 3.

Est & *Candida* ac admodum lucida: fasciam in medio habens latam castanei coloris, cujus medium percurrit linea castanei coloris valde faturati.

Aldrov. l. 3.
t. 45.

4. *Echinata*, quæ pectini similis est, testis admodum concavis, striatis, in ambitu incis. In striis sive exochis eminent aculei frequentes, incurvi, certis intervallis à se diffiti. Uniones in ea reperiri testatur Plinius. Plin. H. N. 19. c. 35. Nam & Iuba tradit, Arabicis esse cocham similem pectini insecto, hirsutam Echinorum modo, ipsam unionem in carne ipsa esse grandini similem.

5. *Squammosa*, quæ striis seu lineis semicircularibus, squamarum in modum est exornata.

Aldrov. l. 3.
t. 47.

6. *Longa*, cuius duas species Rondeletius ponit. Unam colore vario, in medio albescente, intus cum lævitate cādido: Alteram, testa alba, aspera, lineis multis distincta, quam Plinii longam esse putat. At Aldrovandus veram Plinii longam se exhibere credit, colore extra albo fuscoque variam, intus vero roseam, animante suo prægnantem. Idem aliam exhibet, parte quæ replicatur, foramina multa, ordine disposita habentem, quæ à natura fortè, ut aer ingrediatur facta sunt.

Aldrov. l. 3.
t. 48.

7. *Pictorum*, quæ idè ita vocabitur, quod testæ eius pro conficiendis coloribus raderentur. Crassitudine plurimum excedit, & florem foris habet. Reperitur maximè circa Carriam. Aldrovandus unam exhibet ex Rondeletio colore Cinnabaris, aut Sandarachæ, figura Spondylorum aut minorum Ostreorum.

Aldr. l. c. c.
49.

8. *Corallina*, quæ quod Corallum colore imitetur ita dicitur. Externa testarum parte pectinem refert: sed lineis est aspera, tuberculis rubris inæqualis, intus lævissima, candidi marmoris colore. Carnem habet duram, odore viroso, sapore salso. Post diutinos Austri flatus, & caniculæ exortum in litus ejicitur.

Aldr. l. 3. c.
50. & 51.

9. *Rugata*, quæ lineis multis & c. latis, per transversum ductis rugata est: testis valde spissis, coloris intus

argentei, quæ per ginglymum atticulantur. Ex iis Spherulæ præcum & dentiscalpia conficiuntur.

Ad hanc pertinet *Conchula rugata Rondeletii*, quæ à latere ad latus multas veluti rugas sparsim & sine ordine habet, Testæ sunt depressæ, colore vario. Labra testarum crassa & tam arctè cōnexa, ut sine vi non aperiuntur. Diphilus carnem copiosum bonumq; succum gignere tradit.

10. *Rhomboides*, quæ veteribus ignota videtur, quod testa sit musculorū marinorum testæ simili, *musculū striatum*, Rondeletius vocavit. Tota concha nigricat. Rara est, quia in alto mari degit, duramq; carnem habet. Bellonius Balanum Græcis dici putat, sed falsò ut apud Rondeletium videre est.

Ex *Lævibus* est *Concha Galades, Nigra*, Aldr. l. 3. c. 53. 54. 55. 56. & 57. *Fasciata*, *Crassæ testæ*, & *Tenuis testæ*. *Galades* sunt maximæ & lævissimæ, intus verò candidissimæ, non admodum concavæ, caro ipsis alba, dura, concoctu difficilis, succum crassum gignens. Satis rarò capiuntur. *Nigra*, hiæce est similis, nisi quod intus & foris nigricat. *Fasciata*, testa est admodum lævi, dura, & marmorea. Nomē hoc obtinuit, quod quinq; veluti fascias latas à latere ad latus ductas habeat. Harum plures Aldrovandus exhibet. *Crassæ testæ*, à galadibus & Chamis asperis, non tantum testarum crassitudine, sed fasciarum ratione, quæ in illis rariores & latiores sunt, & in his plures & unica tantum linea constātes. Aldrovandus aliquot earum icones exhibet, interque has clathratam maiorem & minorem. Ex ustis & in cinerem redactis præstantissimum antispodium fieri scribit Rondeletius. *Tenuis testæ*, conchæ, extra sunt colore sædo, lutulento cinereo, intus argenti modo resplendent.



PUNCTUM II.

De Chamis.

TAB.
XIV.Aldrov. l. 3.
c. 58.

Nomen.

Chamarum nomen à verbo χαῶ, ut Gesnero placet, derivatur, inditumque huic concharum generi, seu quod hient, seu à capacitate. χαῖμῃ Varino est χαῖμα, id est, oscitatio, unde Plinius, Conchas Margaritarum pandere se dixit quadam oscitatione. Galli flammæ & flammatas vocant, Itali Peverazas, non tã quod sapore sint piper redolente, quam quòd pipere condiantur. Spartianus Ostreas & Lithostreas cum dixit in Heliogabalo Chamas tracheas & Chamas leas intellexisse Hermolao creditur. Quidam Hiatus dixerunt, Galenus verò Concham pro Chama usurpavit. In genere eas suspēctes, vix in tanta varietate constat, quomodo à conchis & quibus notis differant, hoc unico excepto quod Chamæ id peculiare habent, quod plerumque in littore hiantes inveniuntur. unde earum nomen Ion Chius Ἰων τῇ κεχυνέναι derivat. De cætero ita Ælianus de iis. Chamæ marinæ & variæ & multiplices sunt: aliæ asperæ, aliæ leves: quædam digitorum compressu confringuntur, aliæ vel saxo ægræ conteruntur. Quædam ipsarum nigerrimæ sunt, uonnullæ argentei coloris similitudinem gerere videntur, aliæ utroque colore mixto insignes. Ac quemadmodum earum est varium & multiplex genus, sic multas & diversas sedes habent. Quædam enim in littoribus dispersæ jacent in arena, vel in limo quiescunt: nonnullæ sub algam subjiciuntur; aliæ saxi mordicus adherent.

Locus.


Æstivo tempore cum incipit messis, in Istrico mari gregatim natant, & leviter feruntur, cum ante id tempus sua sibi mole graves efferri non possint. Contra, ex tranquillo mari mirifica voluptate afficiuntur, & Favonii mollibus auris afflari gaudent: eamque ob rem in latebras abditæ,

Ingeniū.


& in suis conniventes testis, cum à tempestatibus mare conquiescere sentiunt, & Favonium flare, tum relictis sedibus, ad summum maris nant, & apertis testis eminent, & quiescentes ventum expectant placidū ac secundū: qui si contigerit, alteram concham subternentes, alteram erigentes, hac pro velo, illa pro navi ad navigandum utuntur, ut si eas procul videas, sic per tranquillum mare natantes, classem navium existimes. Quod si navem ad se accedere sentiunt, aut bellæ impetu, aut valentioris piscis metu percussæ, contractis uno impetu testis, subito delabuntur, Carnem album & urinam ciere Athenæus scribit: at Dioscorides urinæ non meminit. *Dispersuntur in Læves, & Asperas*, Aldrov. l. 3. c. 65. *Aspera* χαῖμαί τε ἀσπεῖαι Græcis nomen à testarum externa parte, qualineas multas obliquas & cavas, ideoque musco oppleras habent traxere. Belonius valvas tornatas & orbiculari ferè rotunditate habere dixit, Testas tam duras ut non nisi valido ictu cōfringi possint. Labra haud quaquam in gyrum denticulata, sed Mytolorum more lævia. Movetur ut limax, & quia fortibus spondyliis constat, iis testas movendo per arenam lumbricorum more, conscendunt. In arena circa littora reperiuntur. Carnem ipsorum Icefius duriusculam, mali succi, parum nutrire, faciliè excerni, marisq; saluginem referre pronunciavit. Diphilus stomacho gratam esse addidit.

Læves Chamae, Chameleis Græcis Aldr. l. 3. c. 59. dictæ, testa duplici constant, quæ ramus digitorum compressu facile frangitur. Conchis lævibus, quæ Galades dicuntur similes sunt: ut tantam in Oceano magnitudinem adipiscuntur, ut quaternorum digitorum latitudinem, senorum verò longitudinē exsuperent. Intus & foris candidissimæ sunt, *Caro* quoque intus candida, inque ea duo foramina cernuntur: alterum os est, alterum excrementi meatus, utrumque sinuosum, ut dilatari & constringi possit: hoc ad attrahendum


Chama aspera Bellon.




Chama Lewis Rond. Tab. XIII.




Chama nigra Rond.




Chama glaucimerulis.




Chama Plores.




Ostrea marina.




Ostrea murina Rond.



Ostrea stylus Rond.




Ostrea quidaro poda.




Spondylus Aldro.





Spondylus Aldrou.



Pecten.




Pecten Virgator.



Pecten minor castaneus cum animal.






Pectines alij Aldrou.



Pectunculi.



Pecten asper.





hendumaquam, illud ad reiiciendū excrementum. Habent & *μήκωνα*, ut conchæ cætera. Latenter magis protuberante semper hiant. Facile à calido tanguntur : quamobrem mox hiantes sua labra pandunt, & facilius exanimantur, si longius fecerint à mari. In arena cum Tellinis capiuntur. Moveri à se, & sedes in littore mutare comperiet, qui eas in vasa aqua pleno immerferit; quod Veneti ut minus exanimis servent faciunt. Non elotæ propter arenam respuuntur: recentes elotæ & adhuc vivæ Tellinis non sunt posthabendæ. Differentias earum varias Aldrovandus posuit, quem in Iconibus vide.

Aldr. l. 3. c. 60. Sub Lævi comprehenduntur, *Piperata*, *Nigra Bellonii*, *Nigra Rondeletii*, *Glycymeris eiusdem*, & *Peloris*.

Piperata Bellonii *Biverone* quibusdam Italis dicitur, non tam quod ob piperis saporem sitim excitet, quam quod perpetuò bibat, neque diu sine aqua fervari possit, atque in forum allata & aquæ immersa geminam atque oblongam exerat ligulam, ut cochleæ modo perpetuò sitiens moveri percipiatur. In cæno degit, & usque adeò tenues testas habet ut transpareant. Cardinibus non junguntur invicem infarctis, sed nervo ut ostrea. Labra habent lævia magisque in rotunditatis ambitum circinantur quam Tellinæ.

Aldrov. l. 3. c. 61. *Nigra Bellonii* robore testæ cum aspera facile certat : nec crenas ita profundas in labris habet. Peloride quoque maior est & dulcior. Ideò glycymeridem putat.

Nigra Rondeletii est testis oblongis, lævibus, duris, spissisque ac veluti marmoreis. *Glycymeribus* sapor carnis dulcis nomen imposuit, facitque earum Macrobius mentionem. Sunt maiores quàm Pelorides, testa oblonga mytutorū fluviatiliū testæ modo; sed durior & spissior, rugosa, non tamen ob id aspera, ex albo rufescente, carne & succi bonitate Peloridi similes. Sunt qui Glycymeridas vocant. Aldrovandus Pe-

lorides maiores Athenæi esse credit. Frustra verò Corycia in Plinio ad Chamas glycymeridas refertur. Macedones enim teste Ægésandro, conchas asperas *καρύκας* ut Athenienses *καρείνας* id est, arietinas vocant. Macrobius in cæna adyciali Lentuli appositas fuisse dixit.

Macrob. Satur. l. 5. Aldrov. l.

Pelorides non tam à luto, (scribi debet *πυλωρδες*) quam vel à magnitudine : *πρωτόν* sive *πρωτόν* significat *πρὸ μέγα καὶ περὶ σίτον*, id est magnum & prodigiosum; vel à Peloro Siciliæ promontorio, juxta quod optimæ reperiuntur, nomen fortitæ sunt. Athenæus eas uno loco ex sententia fortasse Phililii à Chamarum genere segregasse videtur. Duabus conchis constant, ut Rondeletius reliquit, quæ nunquam ita iunguntur, quin semper hient seu vivo seu mortuo animali, etiam sine calidi contactu. Eæ oblongæ sunt & læves, ex albo purpurascens, in medio connexæ. Caro intus alba est, quæ etiam contracta, tota testa vix capi potest, extenta longior multò est, rotunda, spissa, pudendo virili non absimilis, digiti medii crassitudine. In extremo altero foramina duo apparent, alterum oris est rotundum, alterum excrementi. Bellonius à calcinellis differre scribit, quòd turbinatiori & grandiori corpore confect. Calcinellæ enim, inquit, compressiore sunt forma testa translucida, ac multo quam Chemæloij teneriores. Media autem est inter asperam lævem constitutione & natura. Non enim ita horret ut aspera, neq; ita glabrescit ut lævis, albo præterea ac fulvo emblemate distinguitur.

Bellon. de Piscib. l. 2.

Eius caro durior est, quam Tellinarum. Diphilus copiosum bonūque succum gignere tradit. Labra earum, addit idem, sunt crassiuscula, & tam arctè connexa, ut nisi vi aperiantur, & sæpe etiam rumpantur, priusquam os aperiant. Hucusq; Bellonius.

Vfus.

PUNCTUM III.

De Ostreis.

TAB. XIV. **T**estaceum quod Latini Ostreum & Ostream dicunt, Græci veteres ὄστρεον, & ὄστρεον, vel ὄστρεον, vel quasi ὄστρεον quod testa velut ostrea tegatur; moderni ὀστρίδων, Psellus ὀστρίδων, Hesychius ὀστρίδων, vocant. Invenies tamen ὄστρεον pro toto testaceorum genere sumi. Unde Suidas Echinum ὀστρίδων τὸ ὄστρεον tradit.

Descriptio. Aldrovandus. Quod ad formam Ostreorum attinet, Bellonius inter bivalvium genera hoc peculiare ait esse ostreae, & peccini, ut partem habeant pronam & supinatam, quarum altera sit turbinatior ac prætumida, altera verò plana, Plinius alibi originem atque genituram conchæ, quæ Margaritas fert, esse ait, haud multum Ostrearum conchis differentem.

Alibi quoque Thethya ostreae similia esse scripsit. Et Hegesander apud Athenæum hepatum piscem in capite duos lapides habere, colore splendoreque ostreis similes. *Capita* ostreorum generi nulla eodem Plinio. Galenus ostreis pilos esse negat, sed melius Plinius oculis carere ostreas omnes dixit. Eidem præterea ostreorum præcipua *spondylo* (caro hic interior) brevisunt, atque non carnosio, nec fibris lacinioso, ac tota in alvo. Perottus spondylum in Ostreo esse scribit, callosum illud rotundum, albicans, quod intus habeat in medio, à similitudine spondyli, quod nos verticulum dicimus appositum fufis, ut melius nendo vertantur. Nā reliqua caro circumspersa *Lacinia* dicitur. Quod *Ovum* vocatur. Wottonus non semper, sed vere habere ostreas asserit: moxque procedente tempore minui demumque totum ferè aboleri.

Aristoteles illud in altera tantum parte eis fieri voluit, idemque esse quod Echinos habere alias dixerat.

Eodem autore Ostreae meatum habent, quo excrementum secedat parte superiore. Idem Aristoteles *testas* eis tribuit scabras, alibi etiam labra crassa. Et Plinius quædam sili-cum duritia regi, ut ostreae & conchæ dixit.

Quantum ad *Generationem* nullum eis sexus discrimen, ut Plinius & Oppianus prodidere: ideo putrescente limo proveniunt, aut spuma circa navigia diutius stante, defixoque palos, & lignum maximè: sed & in cavernosis & petrosis aquarum dulcium adventu gignuntur. Obtinere tamè ex putri producta aliquid prolificum quamvis non coeant, apud Aristotelem habemus, Hinc & Plinius. Nuper compertum in Ostreariis humorem ostreis foeticum lactis modo effluere, & Perrus Gyllius, Bizantinos ostrea ferere & eorum quasi lac seminare; à spectata fidei se accepisse scribit. Grandescunt syderis ratione maximè, sed privatim circa initia ætatis multo lacte prægnantia, atque ubi Sol penetrat in vada. Sydus illud Luna est, quæ plena corpora humentiora reddit, adeo ut nec prudètes Chirurghi trepanotum aperiāt, quia tū cerebrū magis diffundi, & totam cranii capacitatem impleri est. Nullū eis idē sensum inesse apud Plinium legimus. Auditum esse non est verisimile, inquit idē, sed ad sonum se mergere solent, ideò & silentium in mari piscantibus. Tactus tamen omnibus. Carere & motu Aristoteles prodidit. Aqua marina & limo *pascuntur*, quin & rore, quare ὀστρεὶν & Ostrea, id est, roscida, Oppianus dixit.

De *Loco* in differentiis agitur: hoc tamen addere placet, non tantum in pelago, dulcibusque aquis, & ubi plurimum influunt amnes reperiri: sed & in petrosis, carentibusque aquarum dulcium adventu, sicut circa Grynium & Myrinam, quod apud Plinium legimus. Mirum verò quod apud Athenæum habetur, postea quā Appameam Phrygiæ urbem, Michridatici belli temporibus à motu terra disces-

Generatio.

Arist. de gener. ne. l. 3. c. 11.

Plin. H. N. l. 2. c. 41.

discessisset, lacus, qui ante ibi nulli comparuissent, repente extitisse, fluviosque & fontes novos exiisdem locis terræ motu excitatos fuisse, veteresque multos exaruisse, ac nimirum plurimam aquam tum dulcem, tum salinam, tametsi ab eis locis mare longè abesset, ex visceribus terræ sic emanasse, ut tractum universum illud tum ostreis, tum aliis piscibus marinis referrent.

Inimicitia.

Insestos sibi Cancros marinos & stellas marinas ostrea habent. De illis author de natura rerum ita. Cum testas aperit ostrea ut clementioris auræ deliciis gloriatur, cæcer infidias ei repentinas præterdit, & lapidè inter eius testas proiicit, ne illas cōjungere possit, & si carnes ostreæ cōmedat.

Vfus.

Vsum in Cibis habere nemo non novit, crudas, elixas, assas, omniumque testatorum nobilissimas, Bellonius prodidit. Legimus tamen apud Galen. 1. de boni & mali succi li. 3. lenum, carnem ipsarum humidiorum & tenaciorem esse, est crassi succi, humoremque crassum, crudum, & frigidum gignere. Crudæ salsum humorem de se fundunt, idè alvum movent, & tentiginem excitant, Elixæ, humore suo destitutæ, murmura excitant, secundum Iovium, secundum Iulium Alexandrinum, ob multam carnis molitiem concoctu faciliores sunt, ac pituitam potius quàm crudum humorem procreant. Assæ, (assantur autem in craticula addito aromate multo ac salis momento, sed testis suis non avulsæ) minimè noxiæ sunt. Plinius crudas stomachum unicè reficere, fastidiis mederi, ac leviter alvum mollire scribit. In pontificali cœna apponebatur, teste Macrobio, echini initio & ostrea cruda. Qui modò edere eo volet, Lunæ motum observet; hoc est, ea decrescere, ea edas: senescente longè sunt deteriora.

Macr. Sat. li. 9. c. 6.

In Medicina invenere quoque locum. Adhibentur ex mulso & pipere cocta contra tenasum. Gariopontus hydropicis dedit. Usta ad labiorum ulcera & alia prodesse, apud

Myrepsum habemus. Cinis dentes splendiores efficit. Trita & optime lævigata ulcera rebellia exsiccat, quod Galeno debemus. Cinerem veteri urinæ misceri adversus eruptiones in corpore humano & ulcera manantia Plinius reliquit. Marcellus Empiricus eundem, si in morem salis pane colligatur & voretur, statim ad removendam narium gravedinem proficere scribit. Rondeletius denique experientia comperit, ex testarum cinere factam aquam lixivam, ad minuendos tumores οιδιματώδεις pedum & genuum plurimum cōferre. Exsiccat, enim, inquit, multum digerit, & calefacit, si post ustionem cinis non lavetur.

Differentia Ostreorum sunt variæ, quæ a loco & colore sumuntur. Locum si spectes, sunt 1. λιμνόςρεα ut Aristoteles vocat, quæ in stagnis marinis nascuntur. Rondeletius ea ex duabus testis componi ait modicè concavis, & parum in dorsum elatis, foris inæqualibus & asperis, intus lævibus & candidis. Testas parvas esse; carnem mollem, suavem, concoctu facilè.

Differentia.

2. *Littoralia*, quæ in littoribus (περὶ τὸν ὄριον) inveniuntur: nec non saxi limi & aquæ dulcis expertibus. Parva sunt, dura & acia.

3. *Pelagia*, seu marina, quæ in mari nascuntur, parva & rara. Grandescunt quidem syderis ratione maxime: sed privatim circa initia ætatis multo lacte prægnantia, atque ubi sol penetrat in vada. Hæc videtur causa, quare minora in aliis locis reperiantur. Opacitas enim prohibet incrementum, & tristitia minus appetunt cibos. Sunt aliquando in Mediterraneo multa simul connexa, & supra se posita. Inter hæc repunt Scolopendræ, & vermes in canaliculis inclusi vivunt. Testæ foris sordidæ & luto obductæ, & ex crustis multis five laminis constantes, intus læves & albæ, Caro mollis: circa eam fibræ multæ veluti fimbriam constituentes, eam aliquando ambiente

Plin. H. N. li. 32. c. 6.

purpureo crine, quæ præstantiæ nota est auctore Plinio, qui Calliblephara dixit.

Inv. Satyr. 4. 4. *Britannica*, quæ omnibus præferuntur, quæque Maſſarius poſt Lucrinam inventa fuiſſe, & Ruputina Iuvenali dici putat.

5. *Santonica*, quæ magis ſalfa & acris iudicantur.

Horat. Satyr. 4. 6. *Burdigalenſis*, inter quæ Medokina ab oppido vicino Medoë, dicta, capite nigra, ſuavitate præcellunt.

7. *Circea*, quæ ab Horatio commendantur.

8. *Abydena*, quæ olim à ganeonibus celebrari ſolita, Clemens Alexandrinus in Pædagogo prodiit.

9. *Lucrina*, à Lucrino Campaniæ lacu, in ſinu Bajano, prope Puteolos ita dicta, de quibus ut & de Britannicis ita Plinius. Nondum Britannica ſerviebant littora, cum Orata Lucrina ſcilicet littora nobilitabat: poſtea viſum tanti in extrema Italia petere Brūdūſum oſtreas: ac ne lis eſſet inter duos ſapores, nuper excogitatum, famem longæ advectionis à Brundūſio compaſcere in Lucrino.

10. *Brundūſina*, de quibus ita idem. Gaudent peregrinatione trāsferriq; in ignotas regiones. Atq; ita Brundūſina in Averno compaſta, & ſuum retinere ſuccum, & à Lucrino adoptari creduntur.

II. *Cumana*, quæ Strabo præſtantiffima facit. Nihil interim de ſuburbanis circa Venetias & Adriaticis, quibus Bembus teſte Calcagnino palinam dedit, dicemus. Plinius paucis meminit, dum inquit, Dicemus & de nationibus, ne fraudentur gloria ſua littora, ſed dicemus alienā lingua, quæque peritiſſimā huius cenſuræ in noſtro ævo fuit. Sunt ergo Mutiani verba quæ ſubiiciam: Cyzicena maiora Lucrinis, dulciora Britannicis, ſuaviora Getulicis, acriora Lepicis, pleniora Lucenſibus, ſicciora Coryphantenis, teneriora Iſtricis, candidiora Circienſibus.

Quantum ad Colores ruſſa ſunt in Hiſpania, ſuſca in Illyrico, nigra & carne & teſta Circæis, quibus pal-

ma menſarum diu tributa eſt. In mari rubro flammeis illuſtrantur Zonis, ea ut diceretur varii coloris tēperatione ad colorem iridis accedere; adeò lineis perpetuo ductu inter ſe diſtantibus diſtinguntur. *Meliora* ita deſcripſit Plinius. Præcipua habentur in quacunque gente ſpiſſa, nec ſaliva ſua lubrica, craſſitudine potius ſpectanda, quam latitudine, neque in luto capta, etſi ea Veneti cæteris antecellere opinentur, neque in arenofis ſed ſolido vado, ſpondylo brevi atque non carnoſo, nec fibris lacinioſa, ac tota in alvo. Addunt peritiores notam, ambiente purpureo crine fibras, eoque argumenta generoſa interpretantur, calliblephara appellantes. Iovius maximè probari tradit, quæ magnarum navium carinis adhærent, & ab urinatoribus de manu colliguntur. Præter hæc ſunt adhuc *Oſtreæ Sylveſtria* & *Gaideropoda*. Illa vulgus in Provincia Scandebec vocat, propterea quod ſapore ſunt acris, & ideò delicatarum labra calefaciunt & urunt. Teſta ſunt pellucida, partibus quibuſdam flavefcente, alias purpuſcente, foris crinita & criſpa, intus ſplendida, leviffima, cādidiſſima. Carnem habent parvam, ſalſam, ſubamaram, & inſuavem.

Facit horum Athenæus mentionem, multiq; alimenti eſſe dicit, ſed *Athen. Dip. l. 3.* virus olentia, & ori ingrata. Reperiuntur in mari mediterraneo. Teſta in fucis mulierum lapidis ſpecularis vice uſurpari poteſt, & exſiccantibus pulveribus utiliter admiſceri. *Gaideropoda* quaſi pes aſini dicitur apud Græcos, qui daideron hodie aſinum vocant. *Teſta* eius, deſcribente Bellochio, ex imio naturæ artificio, ſuperior *Aldrov. l. 3. c. 68.* inferiori inſarſa eſt, ut quibuſdam veluti cardinibus annexa, nigroque nervo in eius medio inter tubercula & ſinus coaptato, vinſta ac conſtricta eſſe videatur.

Tubercula quoq; ſuperiora duobus acetabulis inferioribus benè correſpondent, ut & inferiora ſuperioribus: Proinde apertas *Gaideropodas*, ſi quis

si quis attentè intuebitur, in his branchias, (hoc certè ridiculum est, nulum enim ex testaceis habet) & stomachum & reliquas partes nutritorias contemplabitur: imò etiam aurículas fungi crispæ figuram referentes, magnitudine grandioris acetabuli, polypi, quæ dilatari ac contrahi soleat: umbilicum vulgus esse putat. Rondeletius hæc pro spondylis, qui Athenæο τερχύλοι, ἀπὸ τῆς τερχύτης id est, ab asperitate dicuntur. Meminit eorum Plinius & Galenus, interque ostracoderma recenset; Macrobius etiam, qui inter cœnæ Pontificalis prima fercula numerat; sed & Columella, qui inter testacea reponit. Duplici spondylus, secundum Rondeletium *testa* constat, intus cava & lævi: foris scabra, ad ungulæ asini formam rotundata, latiore parte, quæ & inferior dici potest, tenuior est, & multò minus densa, minus concava, arcta valdè & firma articulatione connexa: utriusque enim testæ binæ apophyses sunt, sive tubercula, quæ binis acetabulis vicissim recipiunt & recipiuntur: vinculo medio nigro & valido cohærent. *Caro* interna ostreor. carni similis est: circa hanc fimbriata membrana. Intus caro, sed durior, & virus olens. Adnascuntur saxi, & ita hærent, ut non nisi malleo, aut fracta saxi parte capiantur. Rondeletius idem, in saxi Fresconiis Agathensis sinus parvos reperit. Reperiuntur in eis cancri parvi. Aldrovandus aliquot spondylorum genera exhibet, interque illa elegans quoddam, plurimis extra tuberculis obtusis præditum, ab uno latere rubicundis, ab altera inter viridem & cæruleum ambigentibus, quibus tamen rubra etiam permiscetur tubercula: summum caput seu vertex candicat. Intus circulus satis conspicuus colore viridescente totam ferè concham propè extremitatem ambit: dein color sequitur castaneorum, dein albus & subviridis. In medio velut umbilicus est, addito luteo constans.

PUNCTUM IV.

De Pectinibus.

PEctines, si Gyllium sequimur, à rugis seu imbricaturis illis quibus signati sunt ita dicuntur. Plinius ali- quando à pectunculis distinguit, nōnunquam utrumque promiscuè nominat. Græci κτένες nominant, ob manuum & pedum similitudinem, ut Nicandri interpreti placet.

Descriptiones exactas in differentiis describimus, hic dicere sufficiat bivalves & clusiles esse, ut apud Aristotelem legimus, seque concludendo tueri: pectinatim eis divisas testas; ideo Athenæο ῥαβδωτον, & τερχύτης ὄργανον dici: utraque parte auritas, eademque referatiles esse. Nam ab altero latere nodo ligantur, ovum dictum altera tantum parte eis fieri: Athenæus eis ostrea in quibus nascuntur margaritæ contulit. Sponte in arenolis & limosis locis proveniunt: in sinu verò Aquitanico & Normannia capiuntur frequentissimè. Anno autem perficiuntur. Temporibus pluviosis proveniunt plurimi, quod & aliis testatis accidit. Nam squallore pectines magis trahunt rufum colorem. Iamque in Pyrrheo Euripo pectines aliquando defuerunt, non modò propter ferramentum, quo piscatores abradendo ubertim caperent, verum etiam propter siccitates. Quæ autem ova in iis appellantur, quamvis verè iis insint, moxque procedente tempore minuuntur aboleanturque, tamen nihil ad generationem conferunt, sed indicium sunt nutritionis melioris, quale in sanguineis pingue est. Oculi ut ostreis nulli, Conchis dubii, sic pectines si quis digitos adversus hiantes moveat, contrahuntur ut videntes. Volare sagittæ, modo, nisi fortè hoc ad Lolliginem pertineat, Plinius prodidit: sed & stridere sentiuntur, quoties per summa humoris nitibundi feruntur. Massarius per aëra volare negat. Cum enim, inquit, callo illo interiori ambæ testæ connexæ sint, ut difficile di-

velliqueant, non possunt ita liberè aperiri, ut volare valeant &c. Tanta tamen velocitate dehiscunt: ut ex vehementi repercussione saliant, & superiactent, ut quasi volare videantur.

Ufus.

Vsum in Cibus quod attinet, fuere olim apud antiquos celebres, nec in Coryis convivio omissi. Celsus & Archigenes stomacho aptos faciunt. Galenus succum alvum ducere non aliter ac serum lactis scribit. Xenocrati dulces sunt ac facilius ostreis concoquuntur. Magis assati, secundum eundem, minus succi habent & difficulter excernuntur: in testis suis si assentur, minus huius incommodi habent, facilius alunt, & valentiores sunt. Nativam autem dulcedinem in muria conservant & urinam movent: ac candidi quidem & lati sunt dulciores atque albi duri: ruffi virosi & urinam cient: varii autem medii sunt, & eorum aliqui fucis similes, qui per se dati difficulter concoquuntur, & tamen urinam movent. Diphilo candidi molliores sunt.

Locor. varietas bonitatis differentiam invexit. Methymnæos à plerisque gulæ amatoribus suis temporibus expeditos Clemens Alexandrinus testatur. Varro pectunculum Chium, inter cancrum ciborumque exquisitas delicias comprehendit. Horatius Tarentinos laudat, ideò in eorundem numismatib. frequenter occurrunt. Dereliquis ita Xenocrates. Pectines, inquit, optimi sunt, qui ad justam magnitudinem pervenerunt, cavi, colore nigriore: præstant autem vere ac æstate, siquidem eo tempore ad Lunæ incrementum optimè augentur. Omnibus autem antecellunt Mytilenæi, magnitudine, natura, humoris bonitate. His similis Ionium mare juxta Illyrida, Hetruriam, Salonas, & Latium producit. Iam verò & Chios & vicinæ insulæ, item Alexandria eiusmodi pisces ferunt. Pontus quidem etiam multos fert, sed minutos & qui ægrè augeantur.

Vsum in Medicina si spectes, Trallianus in colico affectu dari jubet. Pli-

nus urinam ciere, & quæ in vesica sunt moderatè detergere scribit. Ad Venerem excitandam non minus valent quàm ostrea.

Differentia pectinum sunt variaz: *Differentia* sunt magni, quibus altera valvular. latior.

tior veluti regmen superposita est; sunt & ruffi, candidi, versicolores, candidi & lati: sunt utraque parte auriti, alterutra tantum, nulla, si Bellonio fides est. Ex auritis, quidam utramque aurem habent magnitudine; alii minores aures habent quàm caput testæ; quidam tam magnas, ut ab una aure ad alteram ducta linea, caput testæ non tangat, sed potius emineant aures; alii denique una aure minores. Duos Rondeletius descripsit: *Priori*, testa est qua parte aurita, strictior, deinde amplificata in orbem circumagitur, altera modicè cava & in dorsum elata, altera veluti alterius operculum. Intus carnis multum habet, quæ circa medium etiam carnosum, longum, tenerum, alligata apparet. Inest in carne particula luteum ovor. colorem referens. Spectantur, *μυτῶν*, & os tubæ modo factum, atque intestinum tenue luteo plenum. Tota caro in ambitu membranam habet veluti fimbriam versicolorem, ex qua fila & multa & tenuia dependent. Huic similem Aldrovandus ponit, testa ferruginei diluti coloris, fasciisque ferrugineis. *Alter* superiore est toto corpore longior & strictior, amplioribus auribus, utraque testa pectunculorum Burdigalensium modo concava. Aldrovandus plurimas earundem figuras, auriculis & colore differentes exhibuit, interque eos versicolorem, castaneum eburneum, & croceum qui auriculam unam habet satis latam proportionem animalis, rudimentumque alterius. *Eburneus* in summitate macula quadam rubra condecoratur, cui alia lutei coloris insidet. Est & *asper* colore fusco, cuius locum adjicimus.

Clemens
Padag. l. 2.
Varro in
Satyra.

PUNCTUM V.

De Musculis.

TESTACEA, quæ vulgariter Musculi vocantur, Plinius quædoque *mýias*, aliquando *myiscas*, nonnunquam *myscos*, sæpè musculos appellat. Athenæus *μύας*, Aristoteles *ἐλάττες μύας*, vocant, moderni Græci *μύδιον*, id est, parvum musculum dicunt: nos musculos simpliciter minores appellamus. Rondeletius ita eos describit. Sunt ex ostracodermorum genere, quæ tenui testa & duplici conteguntur, circa saxa aut ligna nascuntur pilis, & veluti lana alligantur. Testa foris nigra, ferè semper vel musco vel lanugine obducta, intus lævis & splendens, ex albo cærulea, parte acutiore crassior & spissior, reliquo ambitu rotundo tenuior. Caro intus pallida, cum non cruda est, cocta vitellis ovorum similis, in ambitu fimbriata, in eo foramen est evidens ad attrahendam aquam, neque enim per villos trahit: in media carne est particula carnosæ linguæ similis: inest & mutis, & pituita quædam glutinosa, callo albo adhæret. Reperiuntur & in mari & in aqua dulci stagnante: nunquam verò ferè in rapidis fluminibus.

Vfus. Ubique ferè in Cibus cedunt, sed optimi sunt Ephesii. Marini commodum præstant nutrimentum: qui in aqua sunt dulci, carne sunt dura, concoctu difficili, pravi succi. Laudatissimi qui in inferiore Germania ex Oceano Germanico capiuntur. Medicinam si spectes, ad ciendam & urinas multum præstare vult Athenæus, cui Celsus adstipulatur. Marinum tritum ex oleo veteretumoribus & doloribus impositum mederi, Marcellus Empiricus reliquit. Aquatiles ad nebulas oculorum in jumentis adhiberi, restis est Gesnerus. Uruntur super carbonibus, & corium externum detrahitur usque ad medium, quod albi apparet: additur Zingiber, & chal-

canthi paribus portionibus, & ex his mistis, pollen in oculis equi inflatur.

PUNCTUM V.

De Mytulis.

MYtulorum nomen à Græcis *mytula* tuavere Latini, *μυτίλος* eos illi vocant. Dioscorides testam ipsam *μύακα* dixit: animalia Oribasius *mycas*; Athenæus *μύας μυιδάδες*, quod scyllam quidam ex iis resipiant; Aristoteles *μύας μυελάδες*, non foliatos à figura, ut Gaza vertit, nec latioris & amplioris conchæ, ut Niphus, sed in imo maris, seu gurgite nascentes, ut Rondeletius, nisi fortè *μυιδάδες*, quod in limosis producantur dici debeant, ut Gesnerus innuere videtur. Iovius cum Tellinis eosdem esse censet, sed falsò, ut in sequentibus apparebit. Dioscorides sanè, Galenus, & Ægineta distinxere, ideo separatim de utrisque agunt.

Descriptionem inter Differentias Descriquære. Spontè naturæ in arenosis proveniunt, quod ante Plinium Aristoteles prodidit: prodire tamen & aliqua ab ipsis emissæ facultate, (buccinæ & purpuræ, quæ favare dicuntur, id est quasi à feminali natura humores quosdam mucosos emittere) vel potius sobole, quippe minores subinde juxta principium adnascuntur, Massario ex ipso Aristotele visum.

Reperere & in Cibus locum, tam elixi quàm assi. Crudi virus & scyllam resipiunt. Elix, & acrioribus quibusdam, ut sinapi, nasturtiove conditi, illud deponunt. Assi, sitim vehementer excitant. Deteriores sunt qui in locis arenosis, aut inter testas figlinas proveniunt, quàm qui in algosis gignuntur. Autumno & ubi multa dulcis aqua miscetur mari, bonitatem servant, procedente tempore amaritudinem trahunt, & colorem rubrum. Optimi quoque mytuli, quando illa sic vocata ova continent. Ius corpus augere Plinius reliquit: eodem sues, teste Lemnio, pinguescunt.

Maio-

Maiores duri sunt, ideò concoctu difficiles: sanguinem procreant crassum, succumque non adeò bonum: copiosè tamen alunt, & ventrem urinamque cient.

In *Medicina*, easdem cum Musculis facultates habet. Carnes ad canis morsum valere scribit Dioscorides, sed repugnat Galenus. Iuri multum Plinius tribuit. Myacum jus, inquit, traditur alvum & vesicæ exinanire, & in teranea distringere, omnia adaperire, renes purgare, sanguinem adipemque minuere. Itaque utilissimi sunt hydropicis, mulierum purgationibus, morbo regio, articulari, inflationibus &c. Concha ad excipiendum oleum loco cochlearis utuntur.

Differentia.

Differentias aliquot apud authores invenias. Sunt enim, si locum spectes, alii *Marini*, alii *Fluviatiles*. Hi marinis sunt similes, in eo tamen differunt, quod minores sint, subrecti appareant, atque humi pinnæ modo infigantur. Sedem non mutant, grandi hiatus suas testas pandunt, easque refferatiles & clusiles, tenues, intus glabras, pictorum coloribus accommodatissimas habent. Gustus sunt ingrati. *Marini*, ut Bellonius habet, villos extrorsum habent more pinnæ, ab ea testæ parte qua scopulis hærent, per quos alimentum exsugunt, atque arenas & marina dejectamenta attrahunt. Cancrum pinnæ modo in concha nutrit, orbicularem, parvum, suis sic membris absolutum, ut & incedat & alatur, & ova excludat grandi lente multò maiora & crassiora; humi accumbant, cum tamen glandes sive muscoli adhærendo pendeant. Differunt & magnitudine, rotunditate, & gustu. In maioribus cancelli, ut dixi, nascuntur cancelli. Salem virusque resipiunt quidam. In eo verò à cæteris ostracodermis differunt, teste Aristotele, quod tenuia labra habeant. De magnitudine trium vel quatuor heminarum, quod apud Plinium legitur, nil dico. Videtur hoc Phocæ vel Lepori marino competere, vel in genere conchis debere adscribi.

Arist. H. A. l. 4. c. 4.

Aldrovandus plura earum genera cum Iconibus exhibuit, inter quæ est, Castaneus, Niger cum tuberculo adnato, alter cum striis flavis. Fluviatilium alium maiorem, alium minorem dedit.

PUNCTUM VI.

De Tellinis.

Tellinarum nomen Athenæus TAB. XV. Latinorum mytilis tribuit, Plinius pectunculis illa, quæ Tellinis à Dioscoride adscripta sunt. Nos hic illas intelligimus, quas moderni Greci *ξιφύδρα*, Lesbi incolæ Chinades, Galli Narbonenses & Romani Tellinas, *ὅτι τὰ χάρσα γίνονται πέλαια*, quod ocyssimè perficiantur, Veneti Capparazole, sive Capparole, à capparibus similitudine, appellant.

Descriptio inter differentias quæ Descriptio. ratur. Non tantum in mari, & portubus undis agitatis degunt, sed & fluviiis. Locis verò arenosis maximè delectantur.

In *Cibis* laudem præ cæteris testatis meruere. Plus succi habet earum caro, quæ etiam reliquarum carne mollior. Recentes, secundum Dioscoridem, stomacho sunt utiles, sed maximè jus earum. Elixas, dulces esse, earumque jus alvum solvere Oribasius prodidit. Venetiis, Genuæ, & Romæ rustici in saccis per urbem circumferunt, quas modiolis divendunt. Cum enim exiguo corpore (verba sunt Bellonii) constent, nec facile aperiantur, gustuique gratæ sint, mirum in modum ob id expetiti bellariorumque loco assumi solent, inprimis, si ab arena optimè, repurgatæ fuerint. Marinæ inprimis, & in his tenuiores, quæ Athenæo Basilicæ commendantur; & quod Castor Durant. in rantes ventriculo noxias esse scribit, *Thesauro de fluviatilibus* fortè sumendum est. *Sanit.* Sitim certè istæ excitant, calculosque gignant: Oribasius tamen maiores esse, & plus succi habere, Ægyptias inprimis, scribit. Clausæ sale sparguntur, & per testas humorem trahunt.

Descriptio.

Vfus.

Oribas. 2. Coll.

In

In Medicina ustæ cinerem reliquunt causticum, adeò, ut is cum cedria myxtus & instillatus, evulsos radicibus palpebrarum pilos renasci prohibeat. Arotæus in Iliaco affectu ius ipsarum propinari jubet. Pueris ad sonum tubæ imitandum usui esse, Athenæus prodidit. Sopater etiam in Comœdia quæ inscribitur Eupulotheombrotus scibit. At resiste, è Tellina repente ad meas aures suavis quidam sonus illapsus est.

Quantum ad *Differentias & Genera*, Athenæus alias marinas, alias Fluviatiles, seu quæ in fluviorum ostiis reperiuntur, fecit, & addit, in Canopico ostio & Nili ascensu multas esse. Illarum *les Moréegæ*, seu tenuiores Basilicas idem vocat, & alvum subducere, beneque nutrire ait. Hæ, quia majores, Basilicarum nomen mererentur, nisi expressa Athenæi in contrarium verba essent. Bellonius Basilicas ita describit. Lævis est Tellinarum testa, candida, nequaquam striata, crenulis tenuissimis denticulata, in longitudine diffusa & angusta mediocriter fortis & quodammodo teres. Rondelietius duas etiã species ponit, quarum una duplici testa constat, utraque simili, lævi, valida, & satis spissa, in ambitu ferrata, qua de causa ad unguen conjunctæ sunt, intus leviter cavæ; altera, in ostio Araris fluminis invenitur, in sinu Agathensi, superiori similis, nisi quod testa sit maiore, minusque spissa, & ex rubro flavescenti parte, qua testæ colligantur, in acutiorum angulum desinente. Addit & Tertiam, colore candido, testa pellucida, ex additamentis multis conflata, intus lævissima. Tenuis admodum, & ambitu magis rotundo. Aldrovandus plures apposuit, inter quas sunt nonnullæ cum dentalibus; una etiam testa diaphana & fragili;

alia cinerea, lineis purpureis transversalibus.

PUNCTVM VII.

De Balanis, & Pholade.

Balanis seu glandes, à glandium similitudine nomē obtinuerunt Pollicipedes Bellonius vocat, quia vulgo poullsepieds dicuntur, quod pollicum in pedibus similitudinem habeant.

Descripsit eas ita Rondelietius. Id genus glandem esse colligimus, quod illi cum glandibus magna sit similitudo. Nam ut glandis quercus vel Illicis pars prior levis est, & in acutum tendit, posterior aspera; sic hæc, quæ saxo exhibemus affixa, posteriore parte, qua saxi hærent, rugosa sunt, & aspera, glandiumque caliculis, posteriorem earum partem arctè retinentibus simili, Plura ex una radice pendunt è sanorum rimis. Ex testaceorum genere sunt. Pars enim prior, longa, rotunda, ex duabus testis componitur, colore & lævitate unguem, in medio rima est, ex qua capillamenta quædam veluti plumæ rubescentes prodeunt. Concha una veluti ex multis acutis unguibus constant, tota in quinque digitorum longitudinem accrescit. Crassitudine sunt pollicis in Hispania; in Britannia Aremorica minores. Pars posterior quæ saxo alligatur, corio duro asperoque potius quam testa constat, ex nigro flavescit. Plura in Differentiis vide.

De Loco non est quod multa addamus. In Hispania parte ea quo Oceano alluitur, in Normannia & Britannia frequentissimi sunt, perque vicinas urbes & pagos divenduntur. Racematim Oceani caudibus adherent.

Laudantur in cibus, tanquam optimi saporis ab Epicharmo, & qui mirum in modum fastidia stomachi sublevent, & mulierum malaciis accommodantur. In convivio quo Lenxulus flamen Martialis inauguratus est nigros & albos appositos esse, Macrobius testatur. Elix ex aqua

falsa

TAB.

XV.

Aldrov. l. 3.

c. 3. 73.

Nomen.

Descriptio.

tio.

Locus.



falsa pulpam habent duriusculam, quam auferunt, sinistra tenentes radicem, ad quam alligatur, dextra vero caput arripientes: quod posteaquam contorserint, pulpam à theca extrahunt, ut ambiens corpus relinquatur vacuum calami modo. Pulpam autem quæ inde egressa est, lumbrici modo oblonga, rubra, teres, aceto piperato maceratur ac manditur, Archigenes quoque apud Galenum stomachicis convenire scribit,

Differentia.

Differentia & Genera eorum recensentur aliquot. Sunt 1. *Majores*, quos ex Rondeletio superius descripsimus. 2. *Minores*, qui nascuntur in saxis & rimis navium, quæ diutius immotæ uno in loco manserint. Adnascuntur etiam mytulis. Striatæ sunt, foramen habent, è quo veluti frondem emittunt, multæ simul nascuntur. Intus parum carnis continent, & parvæ semper manent. 3. *Ægyptii*, qui ad Nili ostia capiuntur, & sunt, teste Athenæo, dulcissimi teneri, origrati, copiosi nutrimenti, multi succi, diuretici, & solvunt alvum. Aldrovandus etiam quosdam exhibuit, interque hos, multos modicè rubescences, simul adnatos, à Gigante sibi communicatos, eosque striatos; Ostraceum quoddam, quod meritis polyceps dici possit, quoniam veluti ex multis Balanis compactum est, læve rubescens; balanum denique sessilem, qui in parte inferna ubi insidet, maximum habet foramen.

Alibi, l. 3. c. 34. *Pholades* ὑπὸ τῶν φωλεῖν & φωλῶν, quod in cavernis & latibulis condantur, suum obtinuerunt nomen. Et rectè ita in saxis latent, ut iisdemque undique contegantur, per foramen verò exiguum & sensui vix patens aqua nutriuntur. Missum est, inquit Rondeletius, ad me alio ex littore saxum, in quo nullæ rimæ, nullæ cavernæ, sed foramina tantum apparebant tam exigua, ut vix aciem admitterent. Eo igitur ictibus multis confraeto, cavitates internæ multæ erant vario situ, & diversæ magnitudinis, in quibus conchas istas reperi. Testis constant

duab. lōgis, non in latū extēsis mytulorum modo, sed rotundis. Intus eadem ferè est caro quæ in mytulis. In saxorum cavernulis, vel vivi vel naturæ factis, aquæ marinæ appulsu procreantur, atque in concham vertuntur, quæ cavitatis seu foraminis figuram servat. In portu Veneris multæ occurrunt.

Vfus.

Nullus earum præter Athenæum meminit, qui easdem palato suaves, sed malis succi & virofas facit:

PUNCTUM VIII.

De Solene.

Solen Eustathii ἐν τῷ ἑνὶ καὶ τῷ ὀκτῷ *σολῶν* & per crasin *σολῶν*, dicitur, Græcis vocatur *σολῶν*, à canalis sive tubi similitudine, *δοναξ*, à figura arundinis crassæ, concavæ, quæ Cypria arundo Dioscoridi; Dactylus, ab humanorum unguum similitudine; *ὄνυξ* denique seu unguis, ab extremis, tenuitate & figura unguibus simili, vel à testæ colore & substantia unguibus nostris non dissimili. Veneri Cappam longam nominant, Bononienses piscem canellam. In *Cibia* à pauperibus adhibentur. Galenus dura carne esse dicit, & ob id difficulter concoqui, propriumque hac ipsis & Purpuris, ut refert Nicephorus quod cum in iussulo coquantur, id crassius reddunt. In ore mandentium relucere Plinius scriptum reliquit. His natura, inquit, in tenebris remotolumine, alio fulgore clarescere, & quanto magis humorem habeant, lucere in ore mandentium, lucere in manibus, atque in solo atque veste, decidentibus guttis, ut procul dubio pateat, succi illam naturam esse, quæ etiam miremur in corpore. Splendoris causam glutinoso Solenis succo adscribit Rondeletius, hi quidem quæ renacia & veluti glutino compacta sunt, ea lævia, æqualia, ac ac perpolita esse solent, atque ob id relucencia, *Dispersuntur in Mares & Faminas*. Illos

Plinius

TAB.

XV.

Nomen.




Vfus.

Musculus Muschel.



Tab. XV.

Musculi Rondel.


Musculi Aldrou.



Mytuli oblongi.




Mytulus niger cum Irys flauis.



Tellina



Tellinae cum dentalibus.





Tellinae congerentes.



Balanus marina. Meer Eydhlen.

Balanus alius.


Balani rubei.





Tellinae congeneres.



Balani Gygantis.






Balani sine Polycipedes.



Pholas.

Pholas Aldrou.

Phola concha alia.





Solen mascul Rond.

Solen faemina Rond.

20

21



Plinius Solenes, Aulas & Donacas vocat; has Onyches. *Mas* secundum Rondeletium, ex Concharum longarum est genere: dupli constans testâ, lævi, tenui, altera tantum parte colligata nigro vinculo, etiamsi aliter scribat Aristoteles. Cum enim *διθύγων* alia sunt altera parte liata, altera soluta, ut claudi & aperiri possint; altera utroque latere connexa, in his postremis Solenas numerat, cum contra semper altera parte solutos videas. Dodrantali sunt longitudine, pollicis crassitudine, harundinis modo cavi, extremis duobus semper apertis: anteriore caput exerit, & retrahit testudinis ritu, secundum testæ longitudinem carnem protensam habet. Testa caruleo est colore, lineas evidentes habet per transversum ductas, qua parte colligatur; crassior est, aliis partibus in tenuem substantiam definit, ut mytuli. Aqua & arena vivit. Carni facultatem urinæ ciendæ inesse Plinio scriptum: sed quia glutinati succi est, metuo ne erret. Differt ab isto *Mas Rondeletii*. Est enim lineis miniaceis, per transversum variegatus; in altera quoque Conchæ extremitate, linea lutea apparet. De *Femina* item Rondeletius. Onychas appellat Plinius Solenes fœminas, quæ colore, sapore, magnitudine, a maribus differunt, in aliis omnino similis. Testa lineis caruleis distincta non est, ob id Plinio unicolores dicuntur.

Caro dulcior est: sed vix comedi potest nisi ab arena repurgata. Sumuntur frixæ & elixæ, melioresque in prunis tostæ, quoadhient. Rondeletius deteriores existimat, quod sint exsuccæ, duriores, & sicciore. In arena stare Bellonius tradidit, sed cum omnia silent sursum è profundissimo foramine emergere, & in id sese postea abdere, unde postea nisi palla ferrea in transversum supposita, & præfundissimè impacta avelli possint, id quod & Plinius, & ante cum Aristoteles vidit.

CAPUT IX.

De Pinnis.

Pinna, Græcis *πιννα* & *πιννα*, quod TAB. semper sordibus obducta sit, dici- XVI. tur. Hermolaus Concham Ægyptia cognomine Paralios, à Democrito Pinnam vocari scribit. A quibusdam Agnus castus vocatur. Neapolitani Pernam, Veneti Asturam, vocant.

Descriptions in Differentiis vide. Descriptiones. Ex duabus testis componuntur, & à ptio. rhytulorum figura non admodum differunt. Sancti etiam in illis hospitantur. Rondeletius tantam Romæ se vidisse scribit, ut ad cubiti magnitudinem accederet.

Locus si spectes, in Acarnania Pinna oriri & uniones gignere Plinius testatum reliquit. In mari an sint ambigit Bellonius, & Rondeletius in locis in quibus mare fluit ac refluit, vix reperiri scribit. Venetiis non visitur: sed in Propontide ad latera eius finis, qui Nicomediam fertur, qua terram pertingunt, frequentia magna existit. In ruinis Nicomediæ civitatis reperiri, Bellonius author est.

In Cibo comparando, Cancellum Naturæ semper aut Squillam comitem habent, sua sede non dimoventur quin pereant; nisi iterum eodem statu humi defigantur. Nam cum eis natura hæc insit, ut rectas stare, & per villos arenulam attrahere necesse sit, jacentis vivere non possunt. Naturam eius optimè versibus Philes expressit, in cuius testa & uniones & byssum reperiri testatur.

Usum in Cibo quod attinet, Athe- Vfus. naus eas urinam pellere, difficileque concoqui & distribui dixit. Ovum, quod secundum Aristotelem continent, pro lunari potestate, aliquando minus, non ad generationem confert, sed melioris nutritionis indicium est.

De carnis dotibus ita Wottinus. Pinna, inquit, optimæ sunt, tenellæ, i 2 plenæ,

Plenæ, carnosæve, quæ in limosis (περὶ γὰρ δὲ ἱ) vadis gignuntur; & ubi mari dulcis aqua miscetur, & locis tranquillis, ac ventis carentibus: teneriores enim hic nascuntur, quàm ubi fluctibus agitantur. Grandioribus parvæ; & quæ vere & æstate capiuntur, aliis præstant. Sunt enim & ivaviore & pleniores. Quæ magnitudine mediâ sunt, carnem quidem habent mollem, candidam, ac dulcem: collum durum, concoctu difficile, corruptionique renitens, Collonamque corpus reliquum facilius corrumpitur: elixis asæ duriores evadunt, præsertim si vino fuerint aspersæ. Earum quæ in vino maceratæ sunt caro, mollior est, sed flatum generat.

Differen-
tia.

Quantum ad Differentias, Rondeletius tres differentias agnovit, Bellonius duas, Aldrovandus quatuor posuit.

Rondeletii *prima* est Minima, mytilis similis, nisi quod strictiorem partem multo magis acutam & longam habet. Testa foris aspera est, colore fusco, intus viridi, & argentei splendoris, si in arena vixerit Pinna; si in cœno, colore est magis flavescente, & minus splendente. Ab inferiore & strictiore parte in amplam latitudinem extenditur: illic arctissimè clauduntur testæ, hic faciliè discluduntur. Intus multum est carnis, cuius omnes ferè partes indiscrætæ. *Alteram* Pernam Plinio vocari scribit. Pernæ, inquit isti, Concharum generis, circa Pontias insulas frequentissimè stant, velut suillo crure longo in arena defixæ, hiantesque qua limpidudo est, pedali non minus spacio.

Cibum venantur. Dentes in circuitu marginum habent pectinatum spissatos. Intus pro spondylo (spondylus seu callus caro durior & interior ostreorum est.) Eius generis hanc esse in qua unius nascuntur, ex Theophrasto Athenæus tradit.

In Gallico mari inveniri, & in

ea uniones parvos author est Rondeletius. *Tertia* minor est, & eo differt, quòd antequam acuta & stricta parte in amplitudinem extendatur, excavata sit.

In cœnosis & arenosis locis vivit defixa: & carnem intus duram habet quæ virus resipit.

Bellonio altera *Major* est, altera *Minor*. Hæc foris magis albicat, intus ad cæruleum accedit. Molli- bus in gyrum spiculis obrusis hirta est, valvasque continuò cardine to- tolerare annexas claudit ac rese- rat, quæ parte planior esse constat: qua autem se in latum expandit, eadem byssum est veluti capillamen- tum quoddam coacervatum prædu- rum ac nigrum quod lapillis affigi- tur, limumque ac spurcitias inde ad stomachum attrahit. Illam Per- nam vocat, quæ pelagia est, rugis pro- fundis caret, duriore testâ conte- gitur, & bipedalis sæpissimè inveni- tur. Pinnophylacem, ut minor, a- lit: uliginoso ac palustri tractu na- scitur: profundiore gurgite im- mergitur, & multum ingrati saporis habet.




Ex Aldrovandi pinnis *prima* est a- Aldrov.
l. 3. c. 76. culeata, coloris rubei: *Alter*a pinnæ parvæ Rondeletii similis cum capil- lamentis: *Tertia* pinnæ Pernæ ge- nus. *Quarta*, parte interna & ex- terna depicta, testâ foris fusca, ru- bra, & aspersa; intus sanguinei, & cæ- rulei coloris. Datur & *quinta* cum tubere verrucoso intus adnata.

Pinnis adde *Conchas anatiferas*, di- versi generis. *Prima* tribus parti- bus constat cum umbilico annexo. *Alter*a quinque partibus cum umbi- lico. *Tertia*, aperta est, eique um- bilicus inseritur. *Quarta*, hiulca est ea parte qua primum plumu- læ prorumpunt. *Quinta*, fœtum intra vulvas situm ostendit. *Sexta*, fœtum imperfectum è valvis exem- ptum. *Septima*, Berniclam avem adultam, ex ejus cemo- di Concha na- tam.

Pinna magna Rond.

Pinna Porra. minor.

Pinna alia.






Pinna. alia



Pinna aculeata Aldrou.






Pinna parva Rond.

Pinna j. Perma. maior.







Patellae diversae.

Pinna alia cum tuberc. adnato.






Patellae Aldrou.



Patella Gypria maior non striata. n.

Patella Gypria maior striata. n. s.





Tab. XVII
Lepas, sive Patella Bellon.






Concha Venerea.

Concha Venerea Zoographi.

Patella feræ sive Aures marinae.



Concha Ven. Rond.






Concharum Venerearum: Speciebus.



Concha Persica maior.




Concha Persica minor.

Tubuli in quibus Vermes.





Penicillus alius.

Penicillus Meerbenfel.



Vermes in Tubulis.

Tubuli alij parvi.



ARTICULUS VI.

De Conchylijs Univalvibus.

PUNCTUM I.

De Lepade seu Patella.

TAB. XVI. & XVII. Aldrov. l. 3. c. 79. Nomen. Descriptio. Locus.

HActenus de Bivalvibus dictum: Univalvia sunt, *Lepas*, *Concha Veneracea*, *Concha Persica*, & *Penicillis*. Ad priorem *Auris marina* pertinet. *Lepades*, Plauto nisi mendum subest *Lopades*, quibusdani Græcis *παρόδια*, modernis *Petaglides*, ve. quod sint petrarum in mari quasi *λεπίδες*, id est, squammæ quædam; vel quod petræ cum eis spoliantur veluti *λεπίδες* hoc est, desquamari videantur, dicuntur. Gaza *Patellas*, à *vasis escarii* similitudine, ut *Rondeletius* autumat, exponit. Inter *μονόθυγα* censerī debere, nullum dubium. Saxi testa in dorsum data adhærent: ideo *Aristoteles* alteram partem superficiæ detectam, carnem ostendere dixit. Os ipsius verususterram, & excrementorum exitus superius habetur: *Papaver* quoque in imo, sive in suo fundo habent. *Bellonius* scribit tanta esse magnitudine, quanta extrema ovi putaminis pars abscissa esse potest. Colorem *testarum* livere vel cinereum esse cornuaque limacis instar exerere, & os, & caput habere huic persimile. Plura in *Differentia* vide.

temerè huc & illuc undis jactata feratur; neque victus illi quærendus, nam maris spuma & aqua vescitur, quâ alluuntur saxa. Quod si aquâ allui saxa desinant, ea quæ in testa relicta est absumpta, contabescere & emori tandem necesse est. Tam se fortiter attractæ faxis applicant, ut ne *Milonis* quidem digitis, avelli possint. Cultro igitur aut aculeato ferro opus est, inter ipsas & saxa immisso, quod ad oras Oceani *Aremoricorum* pueri facere solent, prodente *Bellonio*.

In *Cibis* crudæ à piscatoribus & *Vfus* mares accolis usurpantur. Coctæ facilius concoquantur, modò non nimium decoquantur. Jus alvum ciet. Usus earum & ad capiendos cibos esse, ex hoc *Tarentini* videre licet. *Obsonii* *σολάτ* dicti, præparatio in mari cuius vi in unum locum statim omnes pisces conveniunt.

Ex mari *patellas* accipito, earum scilicet, quæ circa saxa nascuntur: quarum quidam contundens carnem, exprimesque ex ea in testa aliqua inscribito, quæ sequuntur: subitoque non sine magna admiratione videbis pisces in unum locum fluere confertum. Sunt verò ipsa nomina *ταύροβαλιδ*, quibus sanè *ichthyophagi* utuntur.

Dividitur in magnam, Maris rubri *Differentia* *parvam*, & *feram*. *Major Rondeletii* testam habet non exquisiti rotundam, sed inæqualem, intus lævem, foris parum asperam, cui aliquando muscus innascitur, gibbam in ambitu liviscentem & striatâ, intus cavam. Carnosam quoque simbriam in corporis ambitu quam expandit quum hæret; soluta contrahit. Interius subest caro dura, quâ maximè saxo hæret, quæ scuti picti formam refert. Os superiore in loco manifestum est, inferiore ori adverso, excrementi meatus, non in testa, ut in ea quæ *ἀγέλα* dicitur. Os venter sequitur, in eo est *μήκων*, in imo ventre etiam pars, quæ ovum dicitur. *Maris Rubri* *lepas Bellonii*, tabellis, quas in tergo gerit, corneis numero octonis,

tranversis, lorica modo contegitur, atque undequaque cartilagine obsepta est, multis spinulis horrida, iis persimilibus quæ in stellis marinis videntur: sesquidigitum lata est, ternos verò longa. Caro rubrilimacis coloris naturam habet, esturque cocta. *Parvæ Rondeletii* testa media nucleis pinearum nucum figura similis est, & æqualis. Ex laminis parvis constat: Carnem intus habet, sed ob parvitatem partis vix discernuntur.

Aldrov. l. 5.
c. 81.

Fera, λεπτός ἀγέλας, & *auris marina*, θαλάσσιον ὅς, ob magnam cum aure nostra similitudinem, testam habet cavam, argenti vel unionum colore: foris gibbam, lineis multis depictam: parte una, cochlearum modo claviculatim contortam, à qua foramina incipiunt, initio parva, quæ deinde magis ac magis augentur. Differt à majore excrementi meatu, quod ut annotavit Aristoteles, parte ima testæ excrementum egeratur, quâ foramen habetur. Bellonius majorem vocat. Quia testa pellucida & perpolita est, idè ab aurifabris in tenues laminas dissecatur, ut inde elegantissima vasa incrustentur. Aldrovandi Cypria major striata & non striatam ad majorem Rondeletii referri potest.

PUNCTUM II.

De Concha Venerea.

TAB.
XVII.
Nomen.

Aldrov. l. 3.
c. 82.

Martial.
l. 14.

CONcha Venerea nomen fortè ex eo invenit, quòd non modò Venerigrata, sed & ob communem originem mari cognata, crederetur: celebrisque esset eius Deæ effigies, atque haud suo an ex hoc genere, ut Gelenii verbis utar, pede premens. Martialis Conchā simplicitè vocat, Hyle Poëtria Conchā Erythræam, sine dubio, quòd circa mater rubrum frequens sit. Bellonius invico nomine Tor viginti camelos his conchiliis rotundis onustos se conspexisse prodit, & Cairi incolæ iis ad lævigandam papyrum, & telas colorib⁹ permixto gummi con-

factas uti. Ideò eidè Lævigatoria dicitur. An Belliculi marini, ἐμπέλεκτοι θαλάσσιοι Myrepsi, seu ut quidam vertit, Umbilici marini rectè à Pharmicopæis nonnullis dicantur, dubito.

Putat enim interpres lapides intelligi exiguos & candidos, in littore maris repertos, umbilicum hominis referentes abstergendi facultate præditos, quos alii fabas marinas dicunt. Cordus Dentalium nominavit. Ennius fortè, citante Apulejo, *Matriculos* Mutianus apud Plinium *Muricem*. Nec aliud quid sibi χοιρίνας Græc. l. 9. c. 25. eorum volunt, quamvis eas Aristoteles præterierit. Expresse enim, eas Conchas marinas, quibus utebantur Athenis ante calculorum usum inductum, Scholiastes Aristophanis vocat: ne dicam, Pollucem quoque idem attestari. Galli *Porcellanas* appellavere, seu à quadam oris suilli specie, ut Gesnero placet, quam partes sui inter labra denticulata dehiscente, vel potius altero extremo testæ, nempe acutiorè & eminentiore, rostri suilli instar, quodammodo referunt: ἡ δὲ τῷ μορίῳ γυναικίῳ πῶς ἐοικέναι τῇ τε μεταξύ τῶν χειλῶν ὄρεϊ: καὶ τῇ ἐνδοτέρῳ κοιλότητι τῇ μητρὶ. Sane nutrices apud Varronem maximè naturam quâ fœminæ sunt, appellant Porcum, & Græci, eadem significatione Chæron sive Delphaca. Uterinos etiam calculos, qui hoc genere minores sunt, vulgus Germanorum appellat. Minimam aliqui Corvinam aut Corviolam dixere.

Descriptio si attendatur, Latior est, Descriptio. secundum Mutianum purpura, neque aspero, neque rotundo ore, neque in angulos prodeunte rostro, sed simplice concha, utroque se latere colligente. Testam omnibus admodum duram esse vel inde agnoscas, quod nunquam eam arrosam comperias. Tota intus candida est, foris colorum varietate insignis, in diversis conchis, politissima & æquabilis. Os ipsi est in ambitu denticulatum, inque eius lateribus canales breves, per quos linguam exerit. Plura in Differentiis.

V sum

Vjum in quibusdam concha sola invenit. In pillulis de bdellio ad alvum stringendam reperitur: quamvis Monachi Mesues interpretes matrem perlar. supponi jubeant. Turcæ & Cairi incolæ quomodo eis utantur, superius diximus. Galli ad suspendendas claves & conficienda cochlearia utuntur. Æthiopibus loco monetæ inservit. Ideo in tanto apud eos precio, & sæpe aurum pro ea permutent, sæpe filios suos vendant. In Concha maiore faciem sculptam & pulchrè expressam se vidisse, Gesnerus testatur.

Differen- *Differentias* Concharum plurimas
tia. apud Rondeletium; Gesnerum & Aldrovandum invenies. Rondeletius quatuor habet.

Prior ovi est figura, in testæ extremo utroque foramen habens, alterum cibi gratia parum prominens, alterum ad excrementa rejicienda. Remoram Mutiani esse credit.

Secunda, testa est tenuiore & magis perspicua, varia quoque, & pro maculis inspersis lineolas habente, Concha simplice utrinque sese colligente.

Tertia parte plana compressa magis est, maculis rotundis notata, durior secundo, colore candido.

Quarta, parte altera est in tumorem elata, in qua circulus aurei coloris. Alioqui tota foris est candida, intus cærulea.

Gesneri ruffa maior & minor non multum à Rondeletii abeunt. Illa nusquam inniti potest nisi parte plana quæ candida est, ut intus quoque gibba, quæ hæmisphærium constituit; ruffa, maculis nigris distincta. Lavitate ita resplendet, ut imagines reddat, sed obscurè. Minoris dorsum in summo varium est, albis, pallidis, & glaucis maculis. Pars interna candicat.

Aldrovandus; tredecim species, si non plures ponit, ex quibus una tota ex ruffo candicat, & maculis per totum dorsum oblongis & ferrugineis aspergitur: alia lutescebat primò

& maculis purpureis ornabatur, in humido detenta pallidior evasit, postquam superioris corticis cuticulam exuisset. *Tertia* maculis per dorsum aterrimis rotundis & inæqualibus tangebatur. *Quarta* subpurpureis, amethystinis & cæruleis. *Reliquas* ibidem vide. Nos hic tres depingi curavimus. Quam Lusitani & Æthiopes Buzios dicunt, undique alba est, nisi quod in dorso lineæ binæ flavent, in ovalem ferè speciem coniunctæ, & dorsum ipsum inæquale quàm cæteris & gibbosum, ita ut illi quoque testa incumbere possit, sed obliquè. Pars interior è rosco ad cæruleum redit.

Huc *Concham Persicam* & *Penicillos* refero. Illa à loco nomen sumsit. Est maiore sui parte rubicundâ, cætera candida. Margaritas proferre proditur. Minor tota cinericii coloris est. Tubulos testaceos *Penicillos* re-
Aldrov. l. 3. c. 84.

centiorum nonnulli vocavere. Molli quadam & laxa substantia saxis alligantur, ita ut aquarum undis cedat & agitetur. Cum id carnosum, quod nimirum intus latet, se exerit, frondem expandit, sunt & in quibus vermes delitescunt, quorum sex Icones hic damus.



HISTO



HISTORIÆ NATURALIS

De Exanguibus Aquaticis

LIBER IV.

De Zoophytis sive Plantanimalibus.

CAPVT I.

De Urticis.

TAB.
XVIII.
Aldrov. l. 4.
c. 1.
Nomen.



Quartum Exanguium aquaticorum genus sunt Zoophyta, quæ Aristoteles τὰ ἐπαμφοτερίζοντα φύτῳ καὶ ζῴῳ, seu ambigentia plantæ & animalis ut Budæus & Gaza vertunt, appellat.

Talia verò sunt, *Urtica*, Pulmo marinus *Holothuria*, *Fethyia*, *Malum granatum*, *Fungus*, *Pyrus*, *Mentula marina*, *Penna marina*, *Vua marina*, *Malum insanum marinum*, & *Manus marina*.

Urtica, ab urendo Latinis dicuntur, quod manum urere videantur, sic tangantur. Græcis ἀκαλίφα, seu quam ἀπολῆται τὴν ἀφὴν, id est, sensum corruptentes, seu tanquam ἀπάλλαι τὴν ἀφὴν id est, tactui molles ac lenes, sed per antiphrasin, asperæ quippe sunt & infestæ, dicuntur. Vocantur & κνίδαι, ὅτι κνίζειν, hoc est, δαγμὸν καὶ κνησμὸν τινὰ ἐμποιεῖν τῶν ἀπομένων χεῖρες, *morsum aut pruritus excitare tangentium manibus*: nec non μετεΐδια, à similitudine quàm cum muliebri pudendo habent: *Colyzenæ* quoque à modernis, quod colis, id est, pedunculis suis, *Polypor.* more firmiter adhæreant. In Italia *flamma maris*, apud Trottulā, *Carnes marinae* dicuntur. Iovio urticæ & vertibuli haud sine errore iidē sunt.

Descriptionem generalem si species, Descriptionem in medio habere, quod in maioribus evidentius esset prodidit. Aristoteles. Excrementa nulla in iis cernuntur, & hac re stirpib. sunt similes. Summa tenui fistula reddi, apud Plinium legimus.

Diversa diligunt *Loca*, & in variis generantur. Quædam enim nunquam absoluntur, sed saxis semper adherent, reliqua quæ vagantur, littoribus & planis locis gaudent. De saxo, quasi de testa vivunt, & prænatantes pisciculos excipiunt retinentque, Plinius carne vesci scripsit. Idem Urticis *gignendi* modus qui testa inclusis: per rimas enim, & cavernas, & fauces saxorum oriuntur, ut tradit Philosophus.


De *Natura* earum ita Plinius. Contrahit ergo se quam maximè rigens, & prænatante pisciculo, frontem suā spargit, complectensque devorat. Aliàs marcenti similis, & jactari se posse fluctu algæ viæ, contactos attritaque petras scalpentes pruritum (*Dalechampius* legit, petras scalpentes ob pruritum) invadit. Eadem nocte pectines & Echinos perquirat: dum ad moveri sibi manum sentit, colorem mutat & contrahitur. Tacta uredinem mittit, paulumque si fuit intervalli, absconditur.

Comedeatur olim, ut nunc etiā: quanquam Pythagoras abstinere discipulos iusserit, vel quod Veneris stimulos afferre diceretur: vel quod Hecata sacra esset. Ab Aristotele post æquinoctium hyemale magno pere laudatur. Hoc tempore plurimas ligneo veru transfixas, & aliquantulum aslatas, primum ex sale & aqua fervefaciunt: deinde farinā conspergunt, & ex oleo vel butyro in sartagine frigunt. Secundum Xenocratem gratæ sunt ori, sed stomacho admodum insuaves: (*Diphylus* tamen ἐν σπράγῃς facit) sed aslatæ elixis accommodatiores. Alvum cient, urinamque magis movent. Cum passo aut vino, mulso facillè concoquuntur & excernuntur. *Medicinam* si attendas, aiunt in vino potas calculosis prodesse, ut auctor est Galenus.


Urtica cinerea.




Urtica major.




Urtica parva Rond.




Urtica Rond.




Urtica minor.




Urtica rubra Rond.





Species duae.



Urticarium.




Urtica marina alia triplici aspectu.




Urtica marina saxo innata.




Urtica rubrae Rond.



Lepori marino.




Congener.



Urtica Contracta Allrou.





nus. Cum aceto scyllitico pilothrum constituit.

Differentia. *Differentias* varias apud autores invenias. Aristoteli alia sunt corpora.

Arist. H. A. I. 5. c. 16. & I. 6. I. re parvo, quæ cibo aptiores: alia maiusculo duroque. Alia sinuosis adhærent quæ nunquam à saxis absol-

Athen. I. 3. vuntur: alia plana littora amant, quæ suis abiuncta sedibus vagantur. Idem apud Athenæum habetur. Secundum Rondeletium, Alia saxis vel

cuilibet rei alteri adhærent; alia minimè. Rursus earum quæ saxis vel alteri rei hærent, alia perpetua stabilique sede illic degunt, quæ sunt Urtica parva in rimis saxorum latitans: quæ Purpuris & Buccinis adnascitur: quæ cinerea est, longisque cirris constans: Alia sedes mutant, & liberè per mare feruntur natantque, ut, purpurea urtica. Semper soluta sunt, quas vulgò Potes appellant.

Parva, juglandis magnitudinem vix superat. Tota carnosa est, cirros breves habet, contracta recti intestini extremum refert, colore vario est. Quædam enim cærulea, alia viridis, alia subnigra, sed punctis aliquot cæruleis vel flavis vel rubris notata. Græcis *καλέκωνα* dicitur. Cinerem à colore nomen sortita est. Tenuis est admodum, quia frondem magnam, id est, cirros multos habet, carnis parum. In Saxorum rimis vivit: comam semper explicatam habet, nec unquam contrahit.

Utraque scopulis littoralibus, & iis potissimum marinis tractibus qui ventorum impetum minus sentiunt, tam pertinaciter inhæret, ut nisi primo impetu divellatur, vix postea nisi in frustra concisa dirimi possit, adeò suas trichas arctissimè contrahit. *Purpurea*, seu Phœnicea, Rosa quibusdam, aliis Posterol, quòd contracta recti intestini extremum cum musculo sphinctere seu podicem referat, est primæ similis, nisi quòd frondem & longiorem & copiosiore habet.

Purpuris & buccinis adnascens, partem exteriorem habet duram & rigidiusculam, spissioreque quàm in aliis urticis, cirros brevissimos in

ambitu. In exterioribus eius partibus filum longum deducitur purpureo colore, tam jucundo tamque fluido infectum, ut cum precioso illo Purpuræ succo certet. Ideò hanc à cane Herculis demorsam fuisse Rondeletius credit. Datur & in *Lepadè nata*, de qua Ferrantes Imperator ita scripsit. In dorso esse sex rimas stellam æmulantes: in medio dorsi foveam parvam cum figura quadam inclusa Conchæ rhomboidi simili, sustinerique à lateribus lepadis mediante membrana continua, & cavitatem, quæ est in animali non habere aliud intermedium quàm membranam. A parte anteriore conspici fructum Lepadis instar penicilli pictoris in se revoluti.

Ad priores illas referri *Bellonii* possunt, quarum quædam rubro colore suffusa est, altera magis cærulea, granulis in gyrum circumfessa. Utraque marinum tuber contracta refert, explicata Cæsariem totum corpus rotundum ambientem: nam infinitis cirris, antennarum papilionibus, aut scarabæi crassitudine constat.

Huc etiam spectat Aldrovandi *Contracta*, *Cinerea Rondeletii* congener, quæ etiam saxis adnascitur, cirris tenuibus: *pileifere forma*, colore tota coccineo, excepta summitate, quæ est viridis, cum nigra rotundaque macula: & quæ ex *leporis marini* genere, coloris partim purpurei, partim albi.

Urtica soluta, seu *Potta marina* vulgi, quòd speciem quandam mulieris vulvæ repræsentet; Græcis Mongi, inhonesto etiam vocabulo, quòd, ut scribit Bellonius, partibus verendis admota, pruritus ac Venerem, imò etiam ampullas excitet, dicitur. Cum jacet, omaso similis est: cum erigitur, pulmo videtur, & adeò tanquam vitrea & lucida est, ut sine sectione interiora omnia videre possis. Suspensa, quandam Polypi imaginem gerit, nisi quod brachia tenuissima & crassissima habent. In partibus unde pedes oriuntur, quosdam meatus arenarum plenos Gyllius vidit. Formam supernè rotundam, infernè

Differen-
tia.

concavam refert Massarius, ut Conchæ videri possint; Cirros ex imo emittere ad modum Polypi.

Duo huius apud Rondeletium genera. Primum ita describit. Pars una veluti fungosa quædam massa, rotunda, cava, in medio perforata, purpurea veluti fasciola ambiente, pileum planè refert: altera parte Polyporum pedibus similis est. Octo enim pedes habet crassiusculos, extremis partibus quadratos, in acutum desinentes, nullas interiores partes distinctas habet. Corpore est adeò pellucido & splendido, ut oculos offundat. Ad eam magnitudinem accrescunt, ut pileos, quibus viatores uti solent, superent.

Alterum, quatuor duntaxat pedes seu frondes habet, qui foliis acanthi comparari possunt: in altera parte lineæ stellatim disponuntur. Huius generis illa quoque videtur, quam Bellonius ita descripsit. Mollis quidem & albus corpore cartilagineo, ac crystalli in morem pellucido, quod in mucorem facilè resolvitur. Gibbâ habet instar dimidiatæ sphæræ figuram, glabram, pollicis crassitudine: cuius pars interna nervis rectis à medio incipientibus, quasi striis fulvi coloris in gyrum radiatur, quibus se diffundit & constringit: qua corporis commotione aquam concutit, & nunc in primum, nunc in supinum effertur. Pinnarum vice pinnae tenuibus & ægrè conspicuis in orbem communitur, ut Lepus marinus. Cruciformes quoque cirros, striatos, crassos, in modum stellæ radiatos, numero quaternas, parte interna natationi accommodatos habet: quas ut exactè conspicias, erit in leberem aquæ syncerioris coniiciendus: qui si supinus devolvatur, multas fissuras in radice cirrorum ostendit.

Os quoque habet parte prona situm, quo ea quæ venatur absorbet, in quem usum quatuor cirri ad eius latera subiacent, coloris synopidis, quasi eius branchiæ essent, vel intestina. Hinc fit, ut intuitibus pulmonem in mari pabulandi gratia di-

vagantem, grandis videatur quasi pituitæ globus, qui unicum tantum colorem referret, nisi rubris illis quatuor circulis sigillaretur, & ea cruce, qua interna pars striata est, distingueretur.

Ad primum genus referenda est *Vrtica soluta Mathioli*, quam hic damus. In frustra divisa, ac in mare coniecta, vivit nihilominus ac movetur: extra mare exanimis apparet. Emortua in alto mari, ac in littus eiecta, transparentis glaciei similis est. Omnes pruritum in pudendis & uredinem in manibus movent, & acrimonia sua Venerem extinctam & sopitam excitant.

CAPUT II.

De Pulmone marino, & Holothuriis.

Inter Testacea quidem Pulmonem Tab. XIX. & XX. marinum posuisse Aristoteles videtur: Plinius tamen inter Zoophyta recensuit, quem nos sequimur. *Pulmo marinus* dicitur ita vel à pulmonum nostrorum figura, vel ab eorum substantia laxa, & molli, foraminulisque plena. Kiranidis interpretis Cunnæ marinum exponit, & sic pro *Vrtica soluta*, sed falsò, sumere videtur.



Sanè decoctum pulmonis commendant Medici: at *Vrtica* substantia est nimis mollis, & pituitæ concretæ similis, qua in aquam abit; & nec in cinerem redigi, nec in aqua decoqui, corpore aliquo superstite potest.

Descriptionem eius vix ex antiquis obtineas. Plinius per mare ferri ubi imminet tempestas, plurimumque dierum hyemem portendere scripsit: Ephesius verò non adhærere, sed absoluta esse, addidit. Commendantur ad pylos evellendos. In aceto putrefacto & mento aspersæ carnes, fugam illorum facere dicuntur. Cinis alligatus egregiè profluvia purgat. Decoctus verò in aqua, calculosis medetur.

Descri-
ptio.
Plin. H. N.
l. 8. c. 35.




Pulmo maring Matthioli.




*Polla Marina
Vulgo prona*

et supina parte.



Pulmo marinus Rond.






Holothurius Rond.

1


Holothurius Rond.

2



Thelyoruni-


3




Species.



5




4




8


Varice.









6




7







Mentula Marina Rond.




Mentula Marina.




Malum in sanum Marinum Rond.

Vua marina.



Perina Marina Rond.




Meer feder.

Perina Marina alia.




*Manus marina.
Meer hand.*


Cucumis marinus. Meer Cucumbre.



Pyrum marinum Zoophyhton.



*Fungus
marinus
Zoophyhton.*



*Malum
granatum.*

Plin. H. N. detur. Lignum si eo confricetur, ar-
 l. 32. c. 10. dere videbitur, ut sua luce faculam
 quoque vincat. Rondeletius inven-
 nit substantiam quandam faxis hæ-
 rentem, corio duro & nigro inte-
 ctam, intus mollem fungosam & fi-
 stulosam aplysiarum modo. Vel in-
 quit pulmo marinus dici potest, cor-
 pus quoddam rotundum, pilæ mari-
 næ modo, virescens, foris substantia
 filtro simile, intus totum fistulosum,
 veluti spongia aplysia. In maria aqua
 plenum est & grave: extra mare in se
 concidit, & flaccescit: in saxorum ri-
 mis delitescit & inter algas.

Aldrov. l. 4. c. 4. *Holuthuriorum* nomen unde veniat,
 nescimus. Pauca etiam de iis vete-
 res. Saxis soluta esse, sed immobilia,
 asperoque corio contegi. Rondele-
 tius duas nobis icones exhibuit, cum
 his descriptionibus. Id genus, in-
 quit, quod hic proponimus, altero
 extremo obtusum est & planum, in
 quo rosæ sculptam imaginem dicas,
 circa quam sunt acetabula. Inde
 parva appendix & mollis dependet.
 Pisculentum odorem resipit, nec mi-
 nus ingratum & insuavem ac lepus
 marinus: altero extremo tenuius est;
 intus, partes omnes sunt indiscretæ.
 Altero extremo caput habere vide-
 tur rotundum, os in medio rotun-
 dum, rugosum, quod aliquando di-
 latatur, aliquando constringitur.
 Sequitur corpus crassius, aculeis
 multis rigens: videtur in caudam de-
 ficere, ex cuius utraque parte duæ
 sunt appendices pedum pinnarum-
 ve loco, sed differentes. Superior
 enim strictior est, in ambitu incisa, in
 acutum desinens, ad quam à cervice
 producta est linea; altera latior ubi-
 que. Harum beneficio motum ha-
 bere videtur, cuius prorsus expers
 est primum genus: quod aliquan-
 do acetabulis suis faxis
 hæret, sed solvi-
 tur,

CAPVT III.

De Tethyis.

Tethyia seu ut Plinius vult, Te- T A B.
 thea, veteribus Græcis τήθεια, & XIX. &
 τήθια, modernis Sphærodotes, à sphæ- XX.
 ra sine dubio; Adriatici sinus acco- Nomen.
 lis spongiæ, quia cum premuntur,
 spongiarum instar, aquam forami-
 nibus reddant; Tarentinis, propter for-
 mam & parvos quosdam anfractus
 verticilla; aliis à colore & tumore,
 seu quod nullis fibris, ut Tubera ter-
 rena niti crediderint, Tubera; qui-
 busdam, quod callosa materia te-
 gantur Calli; nonnullis, sed falsò, id-
 que ex comparatione patere potest,
 Urticæ vocantur. Gaza cum Holo-
 thuriis confundit, Eustathius & Ho-
 meri scholiastes τὰ τήθεια ab Ostreis
 non distinguunt. Nicander τὰ τήθια
 patellas feras explicat.

Aristoteles ita eas descripsit. Quæ Descri-
 Tethya sive callos speciali nomine à ptio.
 tegminis qualitate appellamus, na- Arist. H. A.
 turam inter hæc genera (Testato- L. 4. c. 2.
 rum) peculiarem fortiri notum est.
 lis enim folis corpus toto tegumento
 includitur, cuius durities inter te-
 ctam & corium est: quam obrem mo-
 re præduri bubuli tergoris secatur.
 Adhæret id genus faxis sua testa.
 Duo à se invicem distantia foramina
 habet, admodum exigua, & visum
 vix patientia, quibus humorem acci-
 pit & reddit. Excrementum enim
 nullum in eo spectatur, quale in cæ-
 teris Ostreis, vel Echinæum, vel
 quod papaver vocatur. Dissecanti
 ea tibi primum occurret membra-
 na nervosa Carnaceo corpori ob-
 ducta.

Hac enim, corpulentum tethyi
 continentur: idque à cæteris omni-
 bus dissimile; suo in genere omnibus
 similis eiusmodi caro. Hæret hoc
 duobus locis & membranæ & corio
 ab latere: quaque hæret utraque
 parte pressius est: quibus partibus
 tendit ad meatus ipsos, qui protin-

nus per ipsum calicē extrorsum ducunt: atque hac emittit, atque exigit tum cibum, tum humorem, perinde atque si hic os sit, ille autem exitus excrementi. Atque horum alter crassior est, alter tenuior. Intus autem in parte utraque sinus dissepiti, continua re pusilla quadam. In eorum altero humor inest. Cæterarum partium, quæ vel instrumenti nomine vel officio sensuum, ac ne excrementa quidem cuiusquam modi qualia in aliis sunt, quicquam habent. Et hæc quidem Aristoteles. His addit Rondeletius, non solum petris, sed & Ostreorum testis affixa esse, & in illis veluti duros tumores cerni. Ovi, addit, figura sunt aliquantò longiore. Testa extra fusca, inæqualis, rigida, intus argentea, lævis. Tethyoro caro membrana alia alba involuta ventriculi formam refert, rotundam scilicet & oblongam, meatus crassior & amplior gulæ proportionem respondet: alter minor podice. Colore uterque est rutilo vel ruffo, reliquum corpus croceum.

Locus. In Ægypto nulla inveniuntur. In Smyrna præstantissima. In Oceano ad Gallicum littus sunt frequentia, Parisiisque in foro piscario sæpe Ostreor. testis adhærentia visuntur. Signantur etiam in cavernis saxorum: maximè verò in cæno & littoribus, quæ phyco algæ marina abundant. Inveniuntur & in musco marino, aut aliis in herbis foliisve marinis. Unde Plinius. Tethæ inveniuntur sugentes in foliis marinis, seu potius scopulis. Hinc Eustathius τῆς dicta conjicit à verbo θῶ, quod significat θῆλα quod & pro lactare & sugere accipitur. Fungorum verius sunt generis quàm piscium: & quia nullum viscus intus habent sed carnem uniformem, nihil de animalis natura habere videtur.

Motus. Motum & sensum qui illis inest ab interno provenire, cum multa Conchyliæ & Crustacea intus habeant, à quibus motus provenit, Plinius auctor est.

Vfus. Rubra cibo sunt idonea: pallida

verò aut sublutea amarulenta Mastarius prodidit. Xenocrates plurimum dare alimenti tradit, coriaque maximè eorum non confici.

Medicinam si attendamus, torminibus & inflationibus succurrere, & tenesmum dissolvere renumque vitia; in cibo sumpto lateris dolores lenire, apud Plinium habemus. Conferunt etiam ischiadicis ventrique superiori una cum ruta: item cachecticis, quorum corpus macie conficitur cum ruta & melle.

Quantum ad *Differentias* & species Differentias quatuor Aldrovandus posuit. *Primam* parte externo & interno pyri formam æmulator, & colore est cinereo: ablataque cuticula substantia apparet densa poris exiguis, vixque visibilibus referta, per quos aqua attrahitur, & per universum corpus distribuitur. Duo grandiora habet foramina, unum oblongum; alterum rotundum; hoc alvo, illud ori respondere videtur. In his quandoque conspiciuntur Scyllari, Cancelli, & alia crustacea; item trochi, turbines & Ostracoderma.

Alteram est figura mali, foraminibus duobus; rotundo, quod maius est; oblongo, quod minus. In eo Scyllarus continebatur, quæ totum ferè illius foraminis continebat intervalum. Cauda erat revoluta.

Tertia figura est inæquali, tuberosa: foramine uno oblongo maiore, quod in opposita erat parte minore. In eo continebatur Purpura, proportionem magnitudinis Tethyi, ut etiam exterius corium penetraret.

Quarta, figura est rotunda sed inferius compressa: foramen habet tam exiguum, ut vix conspici possit:

Intus, crustaceum aliquod, ut in partis superioris foramine conspicitur.

CAPUT IV.

De Mentula marina.

TAB. XX. **M**entula marina Numenio περιών, fortè *περιών* τὸ ἀείγειν τὴν πένα; aliis Aldr. l. 4. c. fortè Holothurium, à *ὁλόθουρον* libidini operam dare, *ὁλόθου* genituram significat; hinc Rondeletii altera Holothuriorum species virilis genitalis speciem pro se fert; quibusdam Halesurion, quasi *ἁλὸς ἕρως*, marina cauda, Apuleio veretillum dicitur. Albertus cuiusdam ostrei meminit, cuius species una virgam, altera vulvam præ se ferret. Moderni Græci Psoli vocar.

Descriptio.

A Bellonio ita describitur. Exanguis maris purgamentum est: solum vagatur. Sede eius natura, ut à piscibus aliis minimè tenetur, neque à quoquam in cibo expectatur. Littorale est neque alibi reperitur, quàm ubi Patellæ, Ricini, & vertibula degunt. Genitale ex hoc dicitur, quod teres sit, pedem longum, & mediocris brachii crassitudine: Distendit se & contrahit hirudinis in morem. Unde ei & nomen inditum est. Quin etiam rufi coloris est, Iners, nec nisi serpendo incedit, aspectu toroso, Nymphææ radicis similitudine. Semper ad ima fidit: nunquam natat: contractatumque in seipsum contrahitur, ac cornu duritiem habet, vixque acuta cuspide pertundi potest: alioqui permolle dum sua sponte movetur, suas promuscides quādo vult, exerit, atque ita constringit, ut ex pedali longitudine vix sex digitos longum appareant. Acetabulis quæ in promuscidibus habet, lapidibus hæret; in quibus plusquam quatuor millia nonnunquam annumeres. Ex anteriore autem capitis parte rursus crinitas emittit, veluti arbusculas acetabulis plenas; quibus quicquid palpat, ad os adducit, quod tam amplum aperit, ut vel integram conchulam admittat: vescitur enim o-

mni conchyliorum genere. Eius recrementa viscida sunt ac lenta, albissima, copiosa, quæ tandem induratur, ut cum fidibus de duritia nerva certare possint. Osingyrum officulis, dentatum habet, præterea nullis ossibus alibi præditum. Ab ore gula in stomachum differtur, quomodo in Erinaceo marino dictum est; reliqua ut intestina circumponuntur in gyrum, quæ vix observari possunt.

Rondeletius duas species facit. Differentia una coria duro constat. Dum vivit iutumescit & distenditur: flaccescit post mortem. Partes internæ indiscrète sunt. Altera ex testa spissa, dura, cartilaginea, perspicua & rugosa constat.

Gesnerus duas quoque à Sittardo accepit. Prior massa quædam informis erat, retrorsum ubi crassior aliorque veluti cornu parvum, rugosum, extendebatur: opposita pars humilior, in glande, foramen rubicundi coloris ostendit. Altera Epipetrum dictum, informis quoque, inæqualis, & tuberosa, multis acetabulis compacta, colore partim nigris, partim rubescens & albicans alicubi erat.

CAPUT V.

De Malo Granato, Fungo, Pyro, Penna marina, Uva marina, Cucumere marino, Malo insano, & Malo marina.

Malo granatum, Fungus marinus, TAB. XX. & Pyrum à figura nomen sortita sunt. Illud eiusdem est cum Punico coloris. Iste cærulei; hoc eiusdem ferè.

Penna marina est pennis magnis quæ in pileis gestare solent, perquā similis. Piscatores Itali ob extremitatis alterius similitudinem Mentulā

alatam vocant. Est enim ea pars præputio, id est, glandi similis, altera vero parte pennam refert. Pars illa crassior, quæ glandis specie est, rimas aliquot habet, quales sunt branchiarum rimæ in galeis. Quæ pennam representat, festucis tenuibus constat, quæ alumini scissili similes sunt: iis, substantia alia quadam tenera innititur. Noctu maximè splendet, stellæ modo, ob candorem & levorem. Pénam marinam *aliā* rubentem, linea per medium caulem alba, fronde simili ferè, sed parte altera, quæ fronde caret longiore, simplici, nulla cum glande dissimilitudine.


Vva marina facit & Plinius mentionem dum scribit. Rerum quidem


non solum animalium simulachra mari inesse, licet intelligere intuentibus, Uvam, Gladium, Serras. Est autem oblonga quædam & informis massa, ex uno pediculo dependens. Partes internæ indiscretæ sunt, inter quas aliquando reperiuntur glandulæ parvæ. In vino putrefacta vini tædium adfert, ut Plinius prodidit.

Malum insanum marinum, & *Manus marina*, à similitudine quoque nomē obtinere.

Cucumis, digiti est crassitudine & longitudine, tuberculis aliquot asperis veluti in Cucumere terrestri parvo. Partes internas indiscretas habet.

F I N I S.





I N D E X,

Quibus paginis Tabulæ piscium sunt subjungendæ.

n Historia de Piscibus & Cetis.


TABULA I.	pagina 8
II	8
III	12
IV	16
V	20
VI	22
VII	26
VIII	26
IX	30
X	37
XI	37
XII	37
XIII	42
XIV	46
XV	52
XVI	52
XVII	60
XVIII	68
XIX	74
XX	82
XXI	92
XXII	98
XXIII	106
XXIV	114
XXV	114
XXVI	130
XXVII	146
XXVIII	146
XXIX	146
XXX	172
XXXI	176
XXXII	178
XXXIII	184
XXXIV	190
XXXV	194
XXXVI	200
XXXVII	202
XXXVIII	204


XXXIX	206
XL	208
XLI	216
XLII	216
XLIII	218
XLIV	220
XLY	226
XLVI	226
XLVII	226

N. Tabulæ tres posteriores superadditæ sunt, ut
iconis finis piscium, exhiberetur plenarius. Ni-
mirum, quia prioribus absolutis in authorum
pervolutione, hi in Clusio, Salviano atq; Schon-
feldio occurrerunt à prioribus illis differentes,
peculiariter eos subicere visum fuit.

In Historia de Exanguibus Aquaticis.

TABULA I	pagina 5
II	15
III	18
IV	20
V	24
VI	27
VII	30
VIII	31
IX	32
X	39
XI	46
XII	48
XIII	51
XIV	56
XV	66
XVI	69
XVII	69
XVIII	72
XIX	74
XX	75






I N D E X

IN HISTORIAM DE PISCIBVS

ET CETIS, IVXTA SERIEM ALPHABETICAM

dispositus, in quo litera P. paginam descriptionis, T.
tabulam denotat.

A.	P.	T.		P.	T.	
	Bacatuaia	202.	37	Alphestes	49.	15
	Acacana	226		Ambiza	211.	
	Acara	192	34	Amia	14.	3
	Acaraaia	191.	34	Amilott	212.	
Acaramucu	202.	37	Ammocatus, vide Exocatus			
Acarnan	68.	18	Amore Guacu	190.	34	
Acara Pinima	182.	32	Amore Pixuma	194.	35	
Acara pitamba	184.	33	Amore Tinga	194.		
Acarapucu	178		Anguilla	120.	24	
Acarauna	178.	32	alia		24	
Acipenser Zelandicus		23	Anthias Rondelet.	53.	16	
Acipenser 1	111.	23	Anthias afellis conformis Rond.		16	
2		23	Anthias primus		16	
3		23	secundus		16	
Aculeatus marinus maior		23	tertius		16	
Acus maior Oppiani	157.	47	quartus		16	
Minor Bellonij	58.	15	Anthias Conger		16	
Alia species	56.	15	Antacæus Rondel.	147.	25	
Acus Aristotelis	56.	15	stellatus	147.	28	
alia species	56.	15	Antropomorphos	209.	40	
Adonis exocatus Bellonii	60.	15	Aper	10.	1	
Agonus Italicus	175.	30	Aphyia Cobites	77.	19	
Germanicus	136.	26	Aphyia Membras	77.	19	
Aiereba	205.	38	Aphyia Phalerica	77.	19	
Alauda cristata	59.	17	Apua	76.	19	
non cristata	60.	18	Apua vera	77.	19	
Albulacærulea	173.	30	Aquila	33.	9	
Albulalavaretus	171.	30	Aramaca	198.	36	
Albulalacustris Bezola dicta	172.	30	Araneus maior sive draco-marinus			
Albula minima	173.	30	maior	91	21	
Albula nobilis		46	minor	91	21	
Albula parva Gesneri	173.	30	Asellus	7	1	
Albula		46	Asellus minor seu Callarias	7	1.2	
Alburnus albus Saluiani	174.	30	niger	8	2	
Alburnus Aufonij	159.	29	Asellus alter sive Merluccius	8	1	
Alofa	105.	27	Asellus mollis	8	2	
Alofa seu Clupea	105.	27	Asellus alius		2	
			Asellus virescens		46	
				1	Asel-	

I N D E X.

[illegible]

I N D E X.

	P.	T.		P.	T
<i>Draco marinus maior</i>	91.	21	<i>Guarapucu</i>	206.	39
<i>minor</i>	91.	21	<i>Guara Tereba</i>	194.	35
<i>Dracunculus</i>	93.	21	<i>Guareriva</i>	196.	35
			<i>Guaruguaru</i>	192.	34
E.			<i>Guatucupa Iuba</i>	181.	32
E ncrasicholus	78.	19	<i>Guebucus</i>	203.	37
<i>Epelanus fluviatilis</i>	159.	28	H.		
<i>Eperlanis</i>	116.	24			
<i>Erythrinus</i>	67.	18	H arengus	9.	1
<i>Exos seu Ichthyocolla</i>	148.	16	<i>Hepatus</i>	48.	14
<i>Exocoetus</i>	51.	15	<i>Hephetus</i>	79.	19
F.			<i>Hippurus</i>	11.	1
F aber	58.	17	<i>Hirundo</i>	64.	17
<i>marinus</i>			<i>Hirundo Plinij</i>	66.	18
<i>Fario seu Trutta</i>	125.	16	<i>Histrix</i>		45
<i>altera</i>	127.	16	<i>Holotheon Bellonii seu Ostracion Nili</i>	123.	25
<i>Farra</i>	174.	30	<i>Huso</i>	115.	25
<i>alius generis</i>		30	<i>Huso seu Antaceus stellaris</i>		25
<i>Frater Hugo</i>		40	<i>Huso seu Antaceus Rondel.</i>		25
<i>Fratola seu Fiatola</i>	74.	19	I.		
<i>Fuga seu Phycis</i>	46.	14			
<i>Fundulus</i>	139.	29	I abebirete	206.	38
G.			<i>Iaguacaguare</i>	184.	33
G alei genus		45	<i>Iaguaraca</i>	180.	32
<i>Galerita</i>		40	<i>Ichthyocolla</i>	148.	29
<i>Galeus Acanthias seu Mustelus spi-</i>	27.	8	<i>Iperuquiba</i>	209.	39
<i>nax</i>			<i>Julia</i>		19
<i>Asterias</i>	26.	7	<i>Iulis</i>	45.	14
<i>Galeus canis</i>	25.	8	<i>Iuruucapeba seu Itaiara</i>	186.	32
<i>Galeus glaucus</i>	26.	8	L.		
<i>Galeus levis seu mustelus</i>	26.	8			
<i>Galeus seu glaucus AEliani</i>	26.	18.226	L acertus	97.	21
<i>Galeus Rhodius</i>	113.	24	<i>peregrinus vel rubri maris</i>	98.	21
<i>Gladius</i>	15.	4	<i>Lamia</i>	40.	
<i>Glanis</i>	148.	27	<i>Lampreta</i>	117.	24
<i>Glaucus Bellonij</i>	52.	15	<i>fluviatilis</i>	154.	28
<i>Glaucus veterum</i>	11.	1	<i>Latus</i>	104.	47
<i>Gobio Battatrix Salviani</i>		31	<i>Lavaretus</i>	171.	30
<i>Gobio capitatus</i>	140.	26.29	<i>Lavaronus Bellonii</i>	80.	
<i>Gobio fluviatilis non capitatus</i>	139.	26	<i>Leo marinus</i>		40.
<i>Gobius maior Gesn.</i>	54.	15	<i>Lepras</i>	44.	12
<i>minor Gesn.</i>	54.	15	<i>Leuciscus</i>	136.	26
<i>Guacari</i>	190.	34	<i>Rondel.</i>	138.	26
<i>Guacucuja</i>	207.	39	<i>Liparis</i>	10.	1.17
<i>Guacutufa</i>	195.	35	<i>Lota Gallorum</i>	168.	29
<i>Guaibi Coara</i>	188.	34	<i>Lucius</i>	159.	29
<i>Gumamaiacu Ape</i>	198.	36	<i>Lumpus Anglorum</i>	40.	13
<i>Gumamaiacu Attinga</i>	208.	39	<i>Lupus</i>	103.	23
<i>Gumamaiacu Guara</i>	207.	33	<i>Lupus marinus Schonfeld.</i>		47
<i>Guaperua</i>	188.200.	36.32	<i>Lycosthomus Balthicus</i>		47
<i>Guaracapema</i>	187.	33	<i>Lyra</i>	66.	24
			l 2		Mahha

I N D E X.

		P.	T.		P.	T.
M.				<i>eckinatus</i>	124.	24
M	<i>Alba</i>	27.		<i>Gefneri</i>	123.	24
	<i>Manati Indorum</i>	223.		<i>Scutatus Rondel.</i>	123.	25
	<i>Mandibula Canis marini</i>		7	<i>stellatus</i>	124.	24
	<i>Marzapannus</i>	44.	14	<i>Rana rictu</i>		45
	<i>Maturaque</i>	193.	34	<i>Spinofus</i>		45
	<i>Melanderinus</i>		14	<i>oblongus testudinis capite</i>		45
	<i>Melanurus</i>	49.	14	<i>Orcà</i>	217.	
	<i>Membras</i>	76.	19	<i>Orfus Germanorum</i>	135.	26
	<i>Merula</i>	44.	2	<i>Orphus</i>	68.	18
	<i>Mesoro vel Blennus Salviani</i>		31	<i>Orthagoriscus Rondel.</i>	29.	9
	<i>Michipellni</i>	211.		<i>Ostracion prior Aldrov.</i>	124.	25
	<i>Mitvipira vel Pirabebe</i>	187.	23	<i>alter Aldrov.</i>	124.	25
	<i>Milvus</i>	65.	12.	<i>Ostracion Nili</i>	124.	25
	<i>Milvus Rondeletii</i>	98.	22	<i>America</i>	125.	25
	<i>Molva</i>	8.	I.	<i>Ova Raiarum</i>	38.	12
	<i>Moli</i>	29.	9	<i>Oxyrinchus maior</i>	35.	10
	<i>Mola peregrina</i>		9	<i>minor</i>	36.	10
	<i>Mena</i>	82.	20	<i>alius</i>		12
	<i>Monoceros</i>	10.	I	<i>Oxyrinchus Rondeletij</i>	138.	26
	<i>Mormyrus</i>	72.	19	P.		
	<i>Mucu</i>	202.	37	P		
	<i>Mugil</i>	106.	23	<i>Arati</i>	198.	36
	<i>Mullus maior</i>	61.	17	<i>Paru</i>	177.	2
	<i>minor</i>	61.	17	<i>Passer levis</i>	99.	22
	<i>imberbis</i>	64.	18	<i>squamosus</i>	90.	20
	<i>Murena masc.</i>	20.	5	<i>Fastinaca</i>	198.	36
	<i>femina</i>	20.	5	<i>Pavo Salviani</i>	43.	13
	<i>Mustela</i>	9.	1.28	<i>Pecten</i>	76.	27
	<i>barbata</i>	151.	28	<i>Pelamys caerulea</i>	12.	3
	<i>fluvialis</i>	151.	28	<i>Perca marina prima</i>	46.	14
	<i>fossilis</i>	154.	28	<i>secunda</i>	47.	14
	<i>lacustris</i>	151.		<i>Perca marina tertia</i>	47.	14
	<i>Mustelus levis</i>	26.	7	<i>fluvialis maior</i>	156.28.29	
	<i>spinax</i>	27.	7	<i>minor</i>	157.28.29	
	<i>Mustela marina Vivipara</i>		46	<i>Petimbubaba</i>	199.36.40	
	<i>Myrus alter sive Serpens rubescens</i>	22.	5	<i>Phagnus</i>	67.	17
	<i>Mysticetus</i>	17.	4	<i>Phocæna</i>	220.	41
N.				<i>Phoca</i>	221.	44
				<i>Pholis</i>	60.	17
				<i>Phoxinus squamosus maior</i>	144.	27
				<i>minor</i>	144.	27
				<i>levis</i>	155.	28
N	<i>Hamdia</i>	199.	36		46.	14
	<i>Nhaquunda</i>	194.	35	<i>Phycis</i>	217.	
	<i>Narinari</i>	208.	40	<i>Phyfeter</i>		
	<i>Nasus</i>	139.	26	<i>Piaba</i>	193.	34
	<i>Niqui</i>	206.	37	<i>Piabucu</i>	194.	35
O.				<i>Pigus</i>	174.	30
				<i>Piquitinga</i>	186.	
				<i>Piraaca</i>		39
O	<i>Bris</i>	140.	31	<i>Pira Acangata</i>	177.	
	<i>Ophidion Plinij</i>	19.	5	<i>Piracoaba</i>	195.	35
	<i>Orcynus</i>	12.	3	<i>Pirametara</i>		40
	<i>Orbis piscis</i>	123.	24	<i>Pira jurumenbeca</i>	181.	
	<i>britannicus</i>	124.	24	<i>Pirancha</i>	189.	34
				<i>Piranema</i>		

I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
<i>Piranema</i>	178.		<i>Reversus Indicus Anguilliformis</i>		2
<i>Pirapixanga</i>	182.	32	<i>Indicus squamosus</i>	12.	3
<i>Piraguiba</i>	209.	39	<i>Rhomboides Rondel.</i>	89.	20
<i>Piratiapia</i>	185.	33	<i>Rhombus</i>	99.	22
<i>Piratia Pua</i>	197.	36	<i>Rhombus aculeatus</i>	99.	22
<i>Piraimbu</i>	191.	34	<i>Levis verus</i>	99.	22
<i>Piraya</i>	189.	34	<i>Rosmarus</i>	227.	44
<i>Piscis Anthropomorphus</i>	209.	40	<i>Iuvencus</i>		44
<i>Gibbosus</i>	46.	13	<i>Vetus</i>		44
<i>Goensis</i>	60.	18	<i>Rubellius Salviani</i>		31
<i>Gutturosus</i>	210.		<i>Rutilus fluviatilis</i>	145.	2.26
<i>Innominatus</i>	202.	36			
<i>Piscis ludicrus</i>	211.			S.	
<i>mularis</i>	211.				
<i>Remorans</i>	209.		<i>Salar</i>		29
<i>Tauriformis</i>	212.		<i>Salmo</i>	101.	23
<i>Triangularis</i>		45	<i>Salmo Salviani</i>		31
<i>Pompius</i>	14.	3	<i>Sallemas seu Salema</i>		40
<i>Porcus supinus Salviani</i>		31	<i>Salmerinus seu Salmero</i>	155.	28
<i>Pracamo Bras</i>		40	<i>Salpa</i>	73.	19
<i>Pudiano Vermelho</i>	179.	32	<i>Sandilz Anglorum</i>	90.	21
<i>Verde</i>	179.	32	<i>Sarachus</i>	175.	30
<i>Punaru</i>	203.	37	<i>Sarda</i>	80.	20
<i>Pungitius</i>	159.	28	<i>Sarda Flandrica maior</i>	81.	20
<i>Puraque</i>	201.	36	<i>minor</i>	81.	20
<i>Pusta</i>	211.		<i>Sargus</i>	71.	19
<i>Pustes</i>	217.		<i>Sargus Aldrovandi</i>		45
			<i>Saurus</i>	97.	21
			<i>Scarus onias</i>	40.	13
			<i>varius</i>	40.	13
			<i>Cretensis</i>		45
<i>Squalus</i>	174.	30	<i>Sciama sive Umbra</i>	51.	15
			<i>Scolopax</i>	10.	1
			<i>Scolopendra Cetacea</i>	221.	44
<i>Raia</i>	33.	10	<i>Scomber</i>	95.	21
<i>Raia asperima</i>	37.	10	<i>Scombrus alius</i>	95.	21
<i>Raia Asteria aspera</i>	36.	10	<i>Scorpio maior</i>	74.	19
<i>levis</i>	36.	10	<i>minor</i>	74.	19
<i>Raia clavata</i>	36.	10	<i>Scorpena</i>	75.	18
<i>clavata alia</i>	36.	10	<i>Scorpio marinus alter</i>		47
<i>exiccata & concinnata ad formam mon-</i>			<i>Idem supinus</i>		47
<i>strofi piscis volantis</i>		12	<i>Schilus</i>	175.	30
<i>Fullonica</i>	37.	11	<i>Schrollus</i>	158.	28
<i>levis</i>	35.	10	<i>Serpens marinus verus</i>	18.	4
<i>oculata & levis</i>	35.	10	<i>marinus</i>	18.	4
<i>oculata Gesn.</i>	36.	10	<i>marinus Norwegicus</i>	18.	5
<i>Oxyrrhynchus major</i>	35.	10	<i>Siluri vera effigies</i>		47
<i>minor</i>	36.	10	<i>Simia marina</i>	29.	7
<i>Piscatrix Aldrovandi</i>	35.	11	<i>marina Danica</i>	29.	7
<i>Piscatrix sive marina</i>		11	<i>Smaris</i>	83.	20
<i>minor</i>		11	<i>alia</i>	83.	20
<i>Spinosa</i>	37.	11	<i>peregrina</i>	83.	20
<i>Raia Undulata</i>	35.	10	<i>Solea</i>	87.	20
<i>Olai</i>	34.	12	<i>lingulata</i>	87.	20
<i>Rana marina</i>	37.	11	<i>oculata</i>	87.	20
<i>Remora</i>	16.	4			

I N D E X.

	P.	T.
<i>Sparus</i>	72.	18
<i>Sphyrana seu Sudis</i>	55.	18
<i>Spirinchus</i>		47
<i>Squatina</i>	39.	11. 12.
<i>Squatino-raia</i>	39.	11. 12.
<i>Stromateus</i>	74.	19
<i>Sturio</i>	111.	23
<i>Synagris</i>	69.	40. 18
<i>Synodon</i>	69.	18

R.

T <i>Amoata</i>	182.	32
<i>Tania</i>	22.	6
<i>altera</i>	23.	6
<i>Tania Bellonii</i>	23.	6
<i>cornuta</i>		46
<i>falcata Imperati</i>	23.	6
<i>Tabac pype</i>		40
<i>Taiafica</i>	177.	32
<i>Tamoata</i>	182.	32
<i>Tarcira de Alto</i>	185.	32
<i>de Rio</i>	185.	32
<i>Thymallus</i>	128.	26
<i>Thymus Salviani</i>		31
<i>Tiburonis</i>	209.	39
<i>Timucu</i>	203.	37
<i>Tinca marina</i>	9.	1
<i>Tinca</i>	166.	29
<i>Torpedo</i>	30.	9
<i>maculosa</i>	31.	9
<i>Trachurus</i>	94.	21
<i>Trutta fluviatilis</i>	125.	26
<i>altera</i>	127.	26
<i>Lacustris</i>	170.	30
<i>Thunnus</i>	12.	3
<i>Turdus</i>	42.	13
<i>eius species</i>	42.	13

V.

V <i>Arius seu Phoxinus laevis</i>	155.	28
<i>Vitulus marinus</i>	221.	44
<i>Vmbra maior</i>	169.	30
<i>minor</i>	169.	30
<i>Vmbra</i>	51.	15
<i>fluviatilis</i>	130.	26
<i>Vranoscopus</i>	93.	21
<i>Vribaco</i>	196.	35
<i>Vtilis piscis Serram ad instar Priscis habens</i>		43
<i>Vubarana</i>	183.	33
<i>Vulpecula marina</i>	27.	7

Z.

Z <i>Iga</i>	106.	
<i>Zygena</i>	29.	7
<i>Zygena seu libella altera</i>	29.	7

INDEX IN HISTORIAM DE Exanguibus Aquaticis.

A.

A <i>Ratu pinima</i>	34.	9
<i>Astacus fluviatilis</i>	18.	2 & 4
<i>marinus communis</i>	17.	2
<i>maior</i>	19.	3
<i>minor</i>	19.	3
<i>Astacus parvus marinus Rondel.</i>	18.	2
<i>supinus</i>		3

B.

B <i>Alani</i>	65.	15
<i>Buccinum</i>	43.	10

C.

C <i>Ammarus seu astacus fluviati-</i>	18.	2 & 3
<i>lis</i>		
<i>Cancris in genere</i>	24.	25
<i>specie</i>	25.	4 & 5
<i>Cancer marinus</i>	25.	4 & 5
<i>Majas</i>	26.	6
<i>Eques</i>	28.	5
<i>Cordis figura</i>	29.	7
<i>flavus undulatus Rondel.</i>	28.	6
<i>fluviatilis</i>	29.	3 & 4
<i>Leo seu Elephanteus Plinii</i>		
<i>dictus</i>	18.	2
<i>Cancer brachychelos</i>	29.	6
<i>Macrochylos</i>	29.	6
<i>Cancer maximus Guaja Apapa</i>	32.	9
<i>Congener brachychelo</i>	29.	6
<i>Cancris parvi</i>	30.	7
<i>Cancellus</i>	31.	7
<i>Chama</i>	56.	14
<i>Carara Vna</i>	33.	9
<i>Ciecie Ete</i>	33.	9
<i>Ciri Apoa</i>	33.	9
<i>Cochlea</i>	48.	12
<i>Conchylum</i>	46. 11 & 13	
<i>Concha</i>	54.	13
<i>Concha Venerea</i>	70.	17
<i>Persica</i>	71.	17
<i>Crustata</i>	3.	
<i>Cucumis marinus</i>	78.	20
<i>Cunurus</i>	33.	9

Echinus

I N D E X.

	P.	T.		P.	P.	T.
E chinus marinus	51.	13	P Agurus	27.	56.	6
			Paranacare	35.		9
F ungus marinus	77.	20	Patella	69.16	17	
			Pectines	61.		14
			Penicilli	71.		17
			Penna marina	77.		20
G uaia Aparatancer maximus	32.	9	Pholades	66.		15
Guaja alia species	32.	9	Pinna	67.		16
alia species	32.	9	Polypus	5.		1
Guaricurn	36.	9	Potiquiquia	34.		9
			Pulmo marinus	74.		19
H olothurium	75.	19	Purpura	40.		10
			Pyrum	77.		20
				S.		
L eo seu Elephantus Plinij	18.2	4	S epia	9.		1
Lepas	69.16	17	Sepiola			1
Lepus marinus	12.	1	Solen masc.	66.		15
Locusta	15.	2	femina	66.		15
Loligo maior	10.	1	Squilla in genere	20.		4
minor	10.	1	specie	21.		4
			Squilla lata	21.		4
M alum Granatum	77.	20	gibba seu Crangone	22.		4
Insanum marinum	78.	20	parva	22.		4
Manus marina	78.	20	Mantis	23.		4
Maracoani	34.	9				
Mentula marina	77.	20	T amaruguach.	35.		
Mollusca	3.		Tellina	64.		15
Murex	45.10.	11	Testacea	36.		
Musculi	63.	15	Tethyia	75.		19
Mytili	63.	15	Trochi	47.		11
			Turbines	46.		11
N autilus	39.	10				
Nerita	47.	11	V CaVna	33.		9
			Vrtica	72.		18
			Vva marina	78.		20
O strea	58.	14				
Ova Sepiarum		1	Z oophyta	72.		18



BENEVOLE LECTOR.

EA est scriptorum qui longè à prælo remoti sunt, infelicitas, ut alienis & oculis & manibus, in perlustrando & corrigendo typo uti cogantur. Hinc fit, ut multa in contextum irrepant sphalmata, quæ non irreperent, si operæ ad manus essent. Non est ergò quòd mireris idem & mihi contigisse, qui per tot terrarum spacia à Francofurto remotus sum: ut verò videas me omnino dedisse operam, ne quis nævus superesset, (commata, puncta &c. huius generis excipio) en Tibi sequentem errorum catalogum. Dabimus interim operam, ut sequentes tomi, emaculatiores prodcant.

Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta.
p. 5. infinito	infinito	p. 31. a. eminis	geminis	accendente	accedente
p. 6. veteres, Geo-veteres præter Geo-		b. masculis	musculis	Cryssallinum	cryssallinam
graphos,	graphos.	p. 32. ea.	de ea	p. 68. b. rinula	rimula
quasi scripta	quasi in eorum	corpora	Corpore	adnotant	adnatant
	scripta,	b. branchias	branchie	p. 69. b. quem cubili	quem cum è cubili
illa præcipuè	ubiq; illa,	angustum	angustum	venter	ventriculus
alii	alii me	aliud	in aliud	firmatori	firmatori
p. 7. b. avenâ	arenâ	p. 34. b. in superiore	in superiore parte	p. 71. a. ramorum ru.	ramorum utela
p. 9. a. nationis	natationis	p. 37. a. nomine	nomen	p. 73. b. virescentes	virescentia
b. in primo	in supremo	p. 38. b. insula	insulsa	Loum	Locum
per	que per	ferina	ferini	p. 74. a. in hunc picem	in hunc piscem
p. 10. a. post illa	post in illa	p. 39. a. olfactu distin-	olfactui desti-	b. Ineos	Indos
frctificavere	ferificavere	cta	nata	renia	tenne
b. se falso	sed falso	p. 39. a. ebore	ebur	procopius	per Corpus
p. 11. a. Sclopaze	Scolopaze	anulum	angulum	p. 75. a. è strangurio-	à stranguriosis
b. Locum	Glaucum	p. 40. a. crematis	crenatis	sis	rum exceptum, lana exceptum
id id	id est	b. Oniso	Oni sco	b. exenterato	exenterata
p. 12. b. eidem destinato, eadè distincta,		p. 41. a. ovi ea	ovum earum	ad hoc	ob has
asseret	asserit	colli itur	colligitur	tum quod	rumquoq;
M. DC. LXV.	M. D. LXV.	b. Capitis	Capitis	p. 76. a. pedido	factido
p. 13. a. nistigatur	instigantur	p. 42. b. Colli paræq;	Colli Pavonis,	imis	ima
tempore	tempore	p. 43. a. fusa sunt,	fusa ast,	p. 78. a. asper. so	asper. so
p. 13. b. Capi	capiti	uri	aurei	b. ingne	igne
Cordus	tardus	apurplea	purpurea	p. 80. a. à beata	à boatu
Scordulas	Cordylas	b. sinapum	sinapi	quem	quam
Auxiades	Auxidas	p. 46. b. Reges	Regis	p. 81. b. prlvaram	privatim
p. 15. a. neq;	inq;	p. 48. b. an Bello-	an competant Bel-	p. 82. b. superbius	superius
pascuum	passium	niano	loniano	p. 83. b. alio	allio
p. 16. a. ne	nec	p. 49. a. decidiis	decidiis	p. 87. b. respiciente	respiente
b. facultatis	facultas	minutum	munitum	p. 90. a. recensentes	recentes
que unicam	que in unicam	algæ	algæ	in ambientibus	id ambientibus
Carinâ	carinæ	b. viscatur	vescatur	b. multa opera stu-	multum opera
b. indiciorum	judiciorum	Calorem	colorem	diisq;	studiq;
p. 18. a. quibusdam	in quibusdam	p. 50. b. pecnliares	peculiaris	in eo medio	in eius medio
Claudienus	Claudius, ut	eadem anni	eosdem anni	p. 92. a. venatum	Venenatum
prodidere	superius dictum	& Dorione	ex Dorione	p. 95. b. arborum	abortum
p. 19. b. de eodem	ab eodem	p. 51. b. aqua	à qua	p. 96. a. abjectu.	obiectu
p. 20. a. terrefacta	torrefacta	p. 52. a. & graciliores	gracilioresq;	b. peno.	penè
Latini	Latinis	quæ		p. 101. b. certum	centum
luteis	luteo	p. 53. b. verguni	vergunt	p. 102. a. aquæ	aquæ
albo nigris	albo & nigro	tam amplis	tam maculis	b. laxis	Saxis
simillimus	simillima	amethystin,	amethystino aureo	p. 103. b. luc	hinc
b. spino acuto	spina acuta	o aureo		p. 104. a. penitendo	penetrando
p. 21. a. fluitantur	fluitant	p. 54. q. nigra	nigram	cibatj.	cibati
b. in variis	in vivariis	p. 55. a. nocivis	nocivus	b. Callo	collo
p. 22. a. Huius villam	intra huius villæ	b. Dorynicii	dorynii	p. 108. a. Nilum	Nilum
quam	modicam	pondent	pendunt	p. 110. a. branchijs	branchias
p. 23. b. gemini	gemini lobi	p. 59. a. modo	modi	p. 112. a. squamas	squamis
p. 25. a. arenarum	aranearum	p. 66. a. dicitur	ducitur	jugulum	juguli
p. 26. a. umbilica	umbilici	b. porum	parum	summo	summe
p. 29. b. mano	magno	p. 67. a. omittit	emittit		


Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta.
p.113.a. <i>plaudem</i>	<i>paludem</i>	p.156.b. <i>Perca Maiori</i>	<i>Perca maior</i>	<i>edem</i>	<i>eundem</i>
p.114.a. <i>huius</i>	<i>hunc</i>	<i>quos</i>	<i>quas</i>	p.219.a. <i>necti</i>	<i>necti</i>
<i>b. recipit</i>	<i>respit</i>	p.157.b. <i>avis.</i>	<i>ovis</i>	<i>b. tellure</i>	<i>tellure</i>
<i>aculei</i>	<i>aculeis</i>	<i>semiffas</i>	<i>semiaffas</i>	p.220.a. <i>motus</i>	<i>fetus</i>
p.115.b. <i>Coro</i>	<i>Corio</i>	p.158.a. <i>esset</i>	<i>esse</i>	<i>b. fortitudo</i>	<i>fortitudo</i>
p.116.a. <i>non ut</i>	<i>quoad</i>	<i>qui</i>	<i>quia</i>	p.221.a. <i>for</i>	<i>forum</i>
<i>similem</i>	<i>similes</i>	p.159.a. <i>testina</i>	<i>resima</i>	p.222.a. <i>immisè</i>	<i>immisi</i>
<i>Belgi, cum</i>	<i>Belgicum</i>	p.160.b. <i>duo</i>	<i>dua</i>	p.223.a. <i>Cortis</i>	<i>horti</i>
p.117.a. <i>geniculo</i>	<i>panniculo</i>	p.161.a. <i>sanare</i>	<i>sanari</i>	<i>b. vase</i>	<i>hasta</i>
p.118.b. <i>ferram</i>	<i>ferram</i>	p.163.a. <i>impotenti</i>	<i>potenti</i>	p.225.b. <i>untias latus</i>	<i>uncias latas</i>
p.119.b. <i>dispensato</i>	<i>dispensatori</i>	p.164.b. <i>disfinans.</i>	<i>distinctus</i>	<i>b. transverse</i>	<i>in transversem</i>
p.120.a. <i>sepe</i>	<i>sepe</i>	<i>ob aliquo</i>	<i>obliquo</i>	<i>resicatum</i>	<i>resicatum</i>
<i>b. minutum</i>	<i>munitum</i>	p.165.a. <i>illic quemuco</i>	<i>illicq, mucu</i>	<i>pradicatus</i>	<i>praditus</i>
p.121.a. <i>immorabantur</i>	<i>immolabantur</i>	<i>b. longiorem</i>	<i>longior</i>	p.277.a. <i>Myftaca</i>	<i>myftacem</i>
<i>latiorem</i>	<i>latior</i>	<i>ediffere</i>	<i>edisse</i>	<i>b. præcipiebantur.</i>	<i>percipiebantur.</i>
p.122.a. <i>ventris</i>	<i>ventis</i>	<i>b. contabescere</i>	<i>Contabescere</i>	Reliqua, Benevolus Lector, corri-	
p.124.b. <i>orbem</i>	<i>in orbem</i>	p.172.b. <i>separatur</i>	<i>superatur</i>	get, si occurrerit. In Græcis	
<i>Niloos</i>	<i>Niloticos</i>	p.173.b. <i>sapa</i>	<i>sinapi</i>	interdum invenire est, & pro	
p.125.a. <i>mortui</i>	<i>motui</i>	p.174.a. <i>Capto</i>	<i>Capito</i>	ἐν: ἔωον pro ζώων: φυνδία pro	
<i>portione</i>	<i>ratione</i>	<i>b. Capiti</i>	<i>Capiti</i>	φυνδία: &c.	
<i>b. offa</i>	<i>offea</i>	p.176.a. <i>litus</i>	<i>littus</i>		
<i>putaris</i>	<i>putavit</i>	<i>pinna</i>	<i>pinnam</i>		
p.126.b. <i>hic</i>	<i>huc</i>	<i>figillatur</i>	<i>figillatur</i>		
<i>humatis</i>	<i>hamatis</i>	p.177.b. <i>ditos</i>	<i>digitos</i>		
p.127.a. <i>altissima</i>	<i>altissimè</i>	p.178.a. <i>pennam</i>	<i>pinnam</i>		
p.128.a. <i>influxu</i>	<i>à fluxu</i>	<i>b. Pranema</i>	<i>Piranema</i>		
<i>b. pulchrè</i>	<i>pulchris</i>	<i>Capionis</i>	<i>Carpionis</i>		
<i>undute</i>	<i>uncate</i>	<i>calor</i>	<i>color</i>		
p.129.a. <i>ist ec</i>	<i>isthac</i>	p.181.a. <i>Inruucapeba</i>	<i>Inruucapeba</i>		
<i>b. facile</i>	<i>solere</i>	<i>Gvatacuba</i>	<i>Gvatacuba</i>		
p.132.a. <i>Idem</i>	<i>eundem</i>	p.182.a. <i>a. tinea</i>	<i>linica</i>		
<i>parvum</i>	<i>parvum caput</i>	p.184.a. <i>branchias</i>	<i>branchiam</i>		
p.133.a. <i>altero Cerasa</i>	<i>altero quando Cerasa</i>	p.185.a. <i>sensum</i>	<i>sensim</i>		
<i>aliquis</i>	<i>alioqui</i>	<i>b. triangular.</i>	<i>triangularem</i>		
<i>vasti</i>	<i>vasis</i>	p.186. <i>oeclitur</i>	<i>vestitur.</i>		
p.134.a. <i>argenteo</i>	<i>argento.</i>	<i>Capit.</i>	<i>Capitur</i>		
p.136.a. <i>purpureis</i>	<i>puerperis</i>	<i>Parabacu</i>	<i>Prabucu</i>		
<i>ferebatur</i>	<i>feribat</i>	p.187.a. <i>alius</i>	<i>alias</i>		
p.138.a. <i>voc cavit</i>	<i>vocitavit</i>	<i>b. at</i>	<i>et</i>		
<i>c. partione</i>	<i>ratione</i>	<i>illa</i>	<i>ilia</i>		
p.140.a. <i>Rb.</i>	<i>Rheni</i>	p.188.a. <i>fufcescentis</i>	<i>fufcescentis</i>		
p.141.a. <i>impeditu</i>	<i>impetu</i>	p.190.a. <i>specus</i>	<i>species</i>		
<i>Cocka</i>	<i>Cockos</i>	p.198.a. <i>hialius</i>	<i>hyalinus</i>		
<i>b. Cognominatum</i>	<i>cognomen</i>	p.203.b. <i>bifecta</i>	<i>difecta</i>		
p.142.a. <i>fluite</i>	<i>fluitat</i>	p.205.b. <i>liule</i>	<i>ligule</i>		
<i>b. parvum</i>	<i>parum</i>	p.206.a. <i>superior</i>	<i>superiore</i>		
p.143.b. <i>deteci</i>	<i>detegi</i>	p.208.a. <i>suffecit</i>	<i>fufcescit</i>		
<i>labo</i>	<i>lobo</i>	<i>b. triangulo</i>	<i>triangulum</i>		
p.144.b. <i>lato</i>	<i>lato</i>	p.212.b. <i>sed</i>	<i>sex</i>		
p.145.b. <i>minutas</i>	<i>munitas</i>	p.213.a. <i>hac</i>	<i>hic</i>		
p.147.a. <i>portione</i>	<i>ratione</i>	p.215.a. <i>magnitudo</i>	<i>magnitudinis</i>		
<i>b. Cartilaginil</i>	<i>cartilagineas</i>	<i>falsamentario,</i>	<i>falsamentaria</i>		
p.148.b. <i>polum</i>	<i>potum</i>	<i>habeat</i>	<i>habeat</i>		
p.149.a. <i>vestis</i>	<i>vestes</i>	p.216.a. <i>hora</i>	<i>horam</i>		
<i>b. quid</i>	<i>quod</i>	<i>audiri</i>	<i>audire</i>		
p.151.b. <i>tradit</i>	<i>tendit</i>	<i>septem</i>	<i>supra</i>		
<i>maculis</i>	<i>maxillis</i>	p.217.a. <i>μυστήριον</i>	<i>μυστήριον</i>		
<i>nullo</i>	<i>nulle</i>	<i>musculum me</i>	<i>musculum ma-</i>		
p.153.a. <i>à Colios</i>	<i>à colicis</i>	<i>nuum</i>	<i>rinum</i>		
<i>animum</i>	<i>nimiam</i>	<i>duce balene</i>	<i>duce Balene</i>		
p.154.b. <i>maioris</i>	<i>maiores</i>				
<i>quos</i>	<i>quas</i>				

Errata super Exan- guium historiam.

p.3.a. <i>μολακα.</i>	<i>μολακα.</i>
p.4.a. <i>hic.</i>	<i>hi.</i>
p.5.a. <i>brevieret ro-</i>	<i>brevius & rotun-</i>
<i>tundior</i>	<i>dus.</i>
<i>memini.</i>	<i>minimi.</i>
p.6.a. <i>appetit.</i>	<i>appetunt.</i>
<i>depasci.</i>	<i>depascere.</i>
<i>esse.</i>	<i>est.</i>
p.7.a. <i>cambulario.</i>	<i>ambulatio.</i>
p.8.c. <i>sphicratis.</i>	<i>iphicratis</i>
<i>vertit.</i>	<i>vertatur.</i>
<i>b. quò &</i>	<i>que.</i>
p.9.a. <i>aquis</i>	<i>arcis.</i>
<i>sortita est.</i>	<i>sortita sunt.</i>
<i>b vocant, quam,</i>	<i>vocant, parte</i>
p.10.a. <i>foli suo utitur,</i>	<i>folia.</i>
p.11.a. <i>inquit.</i>	<i>inquiat.</i>
<i>quod sepia</i>	<i>quo</i>
p.12.a. <i>parve.</i>	<i>parve.</i>
p.14.b. <i>promittentes.</i>	<i>prominentes.</i>
p.17.a. <i>purpura.</i>	<i>purpurea.</i>
<i>b. prominent.</i>	<i>promineant.</i>
<i>Euxinio.</i>	<i>Euxino.</i>
<i>que cetera.</i>	<i>quo</i>
p.18.b. <i>quas dum &</i>	<i>quos duo.</i>
<i>partis branchii.</i>	<i>parvis.</i>
p.19.a. <i>datam.</i>	<i>datos.</i>
<i>discretiones.</i>	<i>dissectiones.</i>
<i>numeravit.</i>	<i>numeravit.</i>
<i>b. illius.</i>	<i>illorum.</i>
<i>parvos.</i>	<i>porcos</i>
p.20.a. <i>squma.</i>	<i>Sequana.</i>
<i>b. ὥστε τῷ</i>	<i>τῇ</i>
<i>quas etiam.</i>	<i>chelas etiam.</i>

Erratai	Correcta.	Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta.
p.21.a. color.	colore.	p.39.b.foramam.	foramen.	p.52.a.lapidis constant.	lapidis modo,
eameatu.	eo.	p.40.b.quod Plinius	quod,cum Pli-	p.54.a.planis,	planus.
urring,latus.	utring,ad latus.	cum,	nius.	gilbus,	gilvus.
Laborace.	Labrace.	p.41.a.illam floream,	illum florem,	p.55.a.quz,	qua.
b.Cartigine,	sartagine.	Testa sua	testa sua	p.56.b.confendunt,	Confcendit,
Hi pinne,	his.	b.pro detexo,	quo,	ut,	et
p.22.b.rimine,	vimine.	ωωμ.	ωωμ.	p.57.a.latenter,	latere.
ut tam	et tam.	diffore,	differre.	vasa,	vase.
p.23.a. Icon.	Nullus apponitur.	εωδδεσ.	εωδδεσ.	Glycymeribus,	Glycymeridibus.
preguedicus.	Preguedicux,	p.42.a.sanguinis,	canis ore	b.adficiali,	aditiali
speusippe	Speusippi.	p.43.a.communes.	commune	πεγσιον	λεγειον.
b.tallele	tabelle	que,	quod.	asperam lavem,	et lavem.
cancrarium.	cancrinum,	jusculis.	juscula.	p.58.a.eodem.	eidem,
p.24.a.sine.	binc.	pro,	quo	hic,	hac
b.aperica,	aprica.	operiuntur,	operiunt.	b.fidei se,	fidei viro se,
tractatione	tractione	tusosi.	tusos	impleri est,	est necesse,
p.25.a. transeunt,	transeunte.	p.43.a.sistat,	sistunt,	p.59.a.sic,	sic,
b. Et mares.	sunt et mares	competit.	competunt.	p.60.b.deide ropoda.	gaideropoda,
plenam	plena	b.Nonnulla,	Nonnullas,	p.63.a.nascuntur,	nascuntur piles
pilose	pilos e	sicut,	sunt.	ciendam,	ciendam alvum,
p.26.a.qua	qua	ex Cinerem,	ex Cinerea	p.65.a. Aroteus,	Aretus
p.27.b. Dr	De.	plene,	plane.	b.sanorum,	saxorum,
et in levi,	et levi,	p.44.a.cotylorum,	Cotylarum,	p.66.a.manferint.	manferunt.
vividiorum,	vividior	b.supini,	supina,	b.Eustatufii,	Eustathio.
descripfit,	descripsit.	offerent,	adferent.	simili,	similibus,
pars utroq;	utroq;	aphelidos,	ephelidas	hac,	hoc
p.28.b.aquas	aquarum,	asse,	assa,	hi quidem,	siquidem.
p.29.cum invicem,	cum se invicem,	genus,	manus,	p.68.a.unius.	uniones
p.30.b.isti in aliis,	isti nisi in aliis,	p.45.b.empyremum,	empyreuma,	p.69.b.mares,	maris.
servent vitam,	tritam.	muris.	muricis.	Contundens,	contundes,
p.31.a.sine,	sinu,	p.46.a.Triplicis,	Triplices,	ex ea	et ea
p.31.b.Civada.	Civada dicitur,	Cum,	dum.	p.70.a.θαλασσιον	θαλασσιον
p.37.a. Alii.	Alia.	b.ipsis,	ipfi.	haud suo;	haud scio;
Tollina,	Tellina;	eius,	Conchylit.	p.71.a.ut sape,	et saepe
Eorum qua,	Eorum alia qua.	sedentibus,	sedentibus.	p.72.a.seri quam,	sentunquam.
et Mytuli.	ut Mytuli.	σεμειοδεσ.	σεμειοδεσ.	χιεσι	χιεσι
b. Bibacta,	pone ad marginem Pli.	p.47.b.tandem;	tantum,	p.73.a.Cinerem.	Cinerea.
p.38.a.emoli.	emoliuntur.	p.48.a.αρχαιοις μιν,	αρχαιοις μιν.	p.74.c.albus,	alba,
μωωδωε.	μωωδωε	p.49.b.Apilium;	Apitium.	p.75.b.reddant,	reddunt,
b.unicam.si ex unicam.si externa	p.50.a.raditur,	dicens,	diceres.	Continentur	Continetur:
terne eti. spectemus.Si interna	lina,	vacuas.	Lino,	p.76.b.qva,	qvi
minutas.	minutos;	b.de mat.	de mar,		





HISTORIA NATURALIS
de Insectis. Libri. III.
de Serpentibus et Draconibus, Libellus
Cum aeneis Figuris

JOHANNES KONSTANTINUS
Med. Doctor
Concinnavit
FRANCOFURTI
ad Moenum
Imperialis
Heredum Merianorum
MDCCLIII.

ILLUSTRISSIMIS ET CELSISSIMIS
PRINCIPIBUS ET DOMINIS,

DOMINO

GEORGIO,

DOMINO

LUDOVICO,

DOMINO

CHRISTIANO,

D. G. DUCIBUS SILESIAE,
Lignicensibus, Bregensibus, Gold-
bergenfibus, &c. &c. &c.

FRA-
TRI-
BUS:

DOMINIS ET PRINCIPIBUS SVIS
Gratiosissimis:

Hanc HISTORIAE NATURALIS de INSECTIS
partem, fidelissimi obsequii monumentum,
offert, utque sibi & suis subditis clementissimè
favere dignentur, demissè orat, Illustriss.
Celsitud.

Fidelissimus Client

JOAN. JONSTONUS
Med.D.




PRÆFATIO

ad Libros

DE INSECTIS.

Nomen.



INSECTORVM nomine animalia illa exanguia intelligimus, quæ incifuras parte sui vel supina vel etiam prona vel etiam utraq; habent, & corpore inus forisq; duro constant. Aristoteles ^{Plin. H. 18. l. 11. c. 2.} *ἐντομα* vocat, ab incifuris, quæ nunc cervicum loco, nunc pectorum, atq; alvi præcinctu separant membra tenui fistulâ cohærentia. Albertus *annulosa* dixit, quod corpora quibusdâ quasi annulis distincta gerant. Imperfecta ad sanguinea si cõparaveris dici possunt: nec enim tanto partium apparatu

Partes.

stipantur: si in se considerentur, quia nulla re ad naturâ suam pertinente destituuntur, perfectissima jure dixeris. *Partes* si attendamus, Antennas quæ-

Plin. H. N. l. 6. 27. 37.

dam in *capite* gerunt, quæ in Lucano cornua potius vel forcipes propter duritiem vocantur: nullas alia habent. *Oculi* in omnibus patent, illiq; duri, ut quasi per membranâ vitri modotrans lucidam cernant; mobiles iidem, ut, cû ob duritiem hebetius videât, clarius, splendore recepto videant. Nec *gena* ipsis, nec *palpebra*, *Lingua* quibusdam mollis & infirma, dura & valida omnibus, quibus non in alvò aculeus est. *Dentibus* carent, quæ cibo utuntur humido; de quibus ut & aliis cibo accommodatis ita Aristoteles: *Partes quæ cibum administrant, non pariratione data omnibus, sed plurimum differunt. Quibusdam in ore est, quod aculeus appellatur, quasi compositum, ac una linguæ & labiorum obrinens potestatem. Quibus autem aculeus non parte priore habetur, iis intra dentes tale sensorium continetur.* Ventrem, nonnulla habere advertit idem, à quo reliquum in-

Aristot. de part. lib. 4. c. 5.

testinum vel simplex vel replicatum proficiscitur. Viscus nullum est, nullum etiam pingue: nec ossa, nec spina: naturam inter carnem & nervum mediam obtinent. Cûte omnia circumdantur, sed admodum tenui. Brevissimè hæc Plinius. *Insecta ut intelligi potest, non videntur nervos habere, nec ossa, nec spinas, nec cartilaginem, nec pingua, nec carnes, nec crustam quidem fragilem, ut quædam marina, & quæ jure dicatur cutis: sed mediæ cujusdam inter omnia hæc naturæ, corpus arenti simile, nervo mollius, in quibusdam partibus siccius verius quàm durius. Pennas quædam habere, quædam non, in textu dicemus, de varietate in differentiis.* *Ελντομα* dicitur crusta quæ pennis supervenit, easq; vaginæ instar condit. *Caudam* solus scorpio, si Aristotelem sequimur, habet. *Senectam* exuere suctum illis quorum pennæ vagina continentur. *Pedes* quibus sunt in obliquum moventur: quorundam extremi longiores foris curvantur. Quæ vero saliant, vel crura posteriora habent longiora, vel gubernaculis quibus-

Aristot. de gener. l. 4.

dam saltui accommodatis fulciuntur, retrò curvatis. Causam apud Aristote-

Plin. H. N. l. 11. c. 4.

lem invenies. *Pedes*, inquit, *priores longiores nonnulla ex illis habent, ut quoniâ propter oculorum duritiem non exquisitè cernunt, cruribus illis longiorib. incidentem molestiam abstergant & arceant.* De numero sciendum, plures habere quæ pro cor-

Aristot. de part. lib. 4. c. 6.

Arist. H. A. l. 8. c. 7. Plin. H. N. l. 11. c. 42.

poris

poris sui longitudine plurimum frigent; pauciores, quæ volucres. Pennarum adiumento pedum inopia compensatur. Partim sponte partim per coitum generantur. Culices & vermiculos nec coire, nec ex animalibus nasci, Aristoteles habet. Ut mas in coitu fœminæ inserat, visum paucis, nec adeò exploratum habetur: mirumque genitale oblongum fœminis, quo genitalem auram à masculo hauriant. De illis quæ vermem generant ita Aristoteles. *Generant & vermem insecta, quæ vim obtinent generandi, & quæ non per coitum, sed sponte natura oriuntur, ex tali Origine consistunt. Nam & Erucas genus esse vermis censendū est, & fœtum araneorum, quanquam propter figuræ orbiculatam speciem, similia ovo, tum eorum nonnulla & alia complura primordia esse videantur. Verum non figura, nec mollitiæ aut duriciæ ovū definiendum est. Sunt enim conceptus nonnullorum duri, quamvis ovo diversi, sed quod totum mutetur, nec ex parte animal gignatur, id vermis est. Omne autem hoc vermiculi genus, ubi sue magnitudinis finem receperit, quasi ovum efficitur. Indurescit enim putamen eorum, & tantisper immota redduntur. Quod in vermiculis apum & vesparum atque etiam in erucis apertum est. Cujus rei causa est, quod Natura pro sui imperfectiōe quasi maturans antequam tempestivum sit ovum pariat, tanquam hic vermis ad incrementum ovū mollis adhuc pergat. Hoc eodem modo in ceteris evenit omnibus quæ non coitu generantur, vel in lanis, vel aliis huiusmodi, atque etiam in aquis. Omnia enim post vermis naturam motu cessant, & putamine obarescunt. Mox rupto putamine exit veluti ex ovo animal, tertia perfectum generatione, idque permatum quod iure multi mirentur. Erucæ enim quamprimum capiant cibum, mox non capiunt, sed motu cessant, quæ per id tempus Aureliæ à nonnullis vocantur. Vesparum etiam vermiculis, & Apum, idem accidit. Post deinde, quæ Nymphæ appellantur, proveniunt, quæ nihil huiusmodi habeant. Ovorum enim natura, adepta suum finem, non insuper accrescit, sed ante augetur & alitur, donec distinguatur, & fiat ovum perfectum: Vermium autem alii hoc intra se habent, unde excrementum ipsis nutriendis accedat, ut vermes apum & vesparum: alii de foris capiunt, ut Erucæ & ceterorum nonnulli vermium. Diu coitus durat, tardo digressu se junguntur: brevique maxima sui parte pariunt. Emittant ne semen incertum est. Quot diebus generatio absolvatur, apud Aristotelem habemus. Maximæ partis ternis septenariis aut quaternis ut in oviparis describitur. Septem ab initu concretionem & consummationem ovi sibi vendicant: reliquis tribus septenis incubant & excludunt, ea scilicet quæ suo procreant fœtu, qualis est araneus. Quoad motum nota, reperere, ambulare, volare, &c. Omnia pluribus motuum quam sanguinea generibus moveri, utpote quæ in frustra divisa, mutilatis corporib. satis diu vivere possunt. *Spiratio. Spirent necne non convenit inter auctores. Negat Aristoteles, & perfrigerari duntaxat voluit. At Plinius. Non video cur non magis possint non trahere animam talia & vivere quam spirare sine visceribus: quod etiam in marinis. (addit) docuimus, quamvis arcente spiritum densitate & altitudine humoris. Pulmone carere, nec refrigerio cum sint frigida indigere, certum. Quorsum itaque respiratio? Murmur quod Apes & Muscæ edunt, interioris spiritus agitu accidit. Quæ canere videntur, membrana septo transverso subdita, ad quam spiritus inclusus atteritur, obstreperunt. Exanimantur sub aquis multa, in cineribus reviviscunt, non quod inspirare non poterant, sed quod interior ille spiritus ab humore suffocatus fuerit, quo per calorem discusso, sibi restituitur. *Odoratus quisquis in illis, nativo spiritu ipso, corporis perficitur. Nec enim sensorio carere, si sensus adest, dicendum est. Vocem edere quis dixerit? sonum ex interioris pelliculæ attritu. Locustæ suis se atterentes gubernaculis sonant. Diversus tamen is. Murmur edunt apes: cum attritu stridorem Cicadæ. Et quia hoc genus intus sonum habere visitur, hinc Enceladum insecti genus appellari Grammatici adstruunt. Univerſim Bombycia à bombo diceret. Tenaciorem præ sanguineis sortita vitam non est quod dubites, ea in primis quibus longum corpus est, & pedes multi, ut in Centipeda videre est. Singulare illud quod in agro Liguriæ Augustinus observavit. Secti per medium vermis partes à vulnere tanta celeritate in contraria discessere, ac si duo diversa animalia fuissent. Causam ad multiplicem principii eorum partem***

Generatio
Arist. de
gener. lib.
1. c. 16.

Motus.

Aristot. l. de
som. & vig.

Odoratus.

Arist. H. A.
l. 4. c. 7.

rem referre videtur Aristoteles. Subiò intereunt, & vel folius olei aspersu ene- Aristot. de
part. lib.
4. c. 54
cantur, quod viscositate huius angustissimis per naturam meatibus occlusis,
spiritus intercipiatur.


Differentiæ sunt innumeræ: præcipuæ à loco in quo nascuntur & degunt,
quantitate, qualitate, partibus, victu, generatione, coitu & gressu, sumuntur. *Locis va-*
Arist. H. A.
l. 5. c. 10. *rius gaudent. In igne oberrat pyrausta ut Plinius vocat: in nive vermes hirti & ru-*
bidi: in aquis marinis scolopendra, pulex & alia: in dulcibus hiruðines, scarabæo-
rum quoddam genus corpore lato, compressoque, quod & in fundo reprat. In
terra oriuntur vermes, lumbrici, iuli, &c. Sæpè etiam intra fossilia invenias. Plan-
te in primis diversigenis insecta ferunt. In arborum caudicibus reperies Cos-
fos & Teredines; in ficu Cerasten; in olea plantata ubi effossa quercus, Ranam
vel Raucam vermem; in sorbo, vermiculos rufos, pilosos; in vitibus Butyros, ut
Tullius vocat; & Ipses, qui verno tempore, Austro spirante orti, oculos vitium
erodunt; & Involvulum, qui in pampini foliis intortisse implicat: nihil de Vo-
lucella dicam, quæ in vino nascitur. Cupressum & esculum infestant Galbæ, à
quib. Sulpitior. genti cognomen: Evonymum quoddam erucar. genus, quod
frondibus absumentis emoritur: vesiculam ulmipfenit: coccum, bestiola Conopi
similis, quæ fructu maturesciente erumpit: gramen, Crotones: dipsaci fructum,
vermis, qui portatus quartanam solvere dicitur: solani folia vermis viridi & cro-
ceo colore distinctus, cornu in fronte gerens, digiti longitudine: porrum Pra-
focurides: brassicam Crambides: Alphodelum vermes in volucres bestiolas
flosculorum specie degenerantes: malvam cimices agrestes: rutam perniciosi
vermiculi. In frugibus quoque peculiaria oriuntur insecta. In tritico namque
occurrunt Curculiones: in farre vermiculus teredini similis, quo cavo dentium
cera incluso, vitiatum cadere dicuntur: in faba, Mida: in lente & aliis aliis. Nec
exsortia insectorum animalia. Lendes & pecudiculi caput humanum infestant:
in manibus sub cute pedicellus vulgo dictus oritur. Dracunculi Ægypti & Indiæ
incolas, in cruribus & brachiis musculis infestant. In ovibus sunt Ricini: in bubus
& canibus Cynomia: sub lingua littæ. Mullum piscem affligit scolichia: Cypri-
num, primo nativitate anno vermiculus quidam niger circa branchias. In per-
cis fluvialibus duodecem seu uniones erui magnitudine generantur, carnosæ,
candidi, quibus singulis vermis gracilis, oblongus, & teres inest. Gobius piscis ver-
mis, quos in vêtre gestat vitiat. Leuciscus lumbricis candidis, latis, qui se inte-
stinis & visceribus circumvolvunt. Nonnullis aliis minuta quædam animalcula quæ
partum expellunt innascuntur. Carnes sale inveteratæ blattas gignunt. Taceo
ipsa insecta, ex quibus generantur alia. In Apum sanè alveis Clerus, qui aliis Py-
ranyas, invenitur. Obnoxia denique huic malo & artificialia. Teredines in pri-
mis vestibibus nasci Plinius affirmat. Tineæ in lanificio producuntur: in libris
blattæ: ubi & bestiolam scorpioni similem, chelas brachiave forcipibus bifurcis
dentata habentem, invenies. Inter Qualitates maximè Color occurrit. Alia enim
simplici duntaxat tinguntur: alia vario, ut in papilionum & Erucarum in primis
generibus. Quantitatem & figuram si attendas, sunt parva, magna, rotunda,
ovata, angulosa, hirta, glabra, &c. A Partibus plurimæ sumuntur, aliis in primis, pe-
dibus, lingua, dentibus, & aculeis. Alata sunt quædam, & nonnulla: aliqua muta-
ta forma alata fiunt, ut Erucarum genus, quod postea in alatos Papiliones tran-
sit. Ex illis sunt alia Coleoptera, quæ alas velut in vagina recondunt, vaginipen-
nia Plinius dixit, ut Scarabæi, Cantharides, &c. alia semper conspicuas & aper-
tas gerunt ut Muscæ, Apes. Εὐρυς Philosopho crusta illa dicitur, quæ pennis
supervenit. Sunt & alia bipennia, alia quadripennia. De quibus ita eleganter
Plin. H. N.
l. 11. c. 28. *Plinius. Insectorum quædam binas gerunt pennas, ut Muscæ: quædam quaternas, ut Apes.*
Membranæ & Cicadæ volant, quaternas habent, quæ aculeis in alvo armantur. Nullum
cui telum in ore pluribus quam binis advolat pennis. Illis enim ultionis causa datum est, his
aviditatis. Nullis eorum pennæ reviviscunt avulsa. Nullum cui aculeus in alvo bipennæ est.
Quibusdam pennarum tutela crusta supervenit, ut Scarabæis, quorum tenuior fragiliorque
pennæ.

penna His negatus *aculeus* etiam. Invenias inter ea & *odonthees* totipennia seu totala, quæ alas habent non scissas ut Apes & Vespæ. Papiliones farinaceas habent. *Pedum* ratione Apodes sunt Lumbrici; Multipedes Centipeda & Millepeda. Haud pauciores sex plurima habent. *Lingua* aliis mollis infirmaq; : aliis dura & valida, ut Tabanis, Asylis, &c. Omnibusq; data quib. aculeus in alvo non est. *Dentes* haud pauca habent: Non habent illa quæ humido cibo vescuntur. *Aculeus* quibusdam in ore est, linguæ ac labiorum potestatem obtinens: quibusdam in alvo est. Nos Omnia in *Terrestria* & *Aquatica* distinximus, utraque in *Pedata* & *Apoda*, prout in Historia videre est. Et hæc sunt quæ de Insectis in genere dicere volui. *Vsum* sub singulis speciebus prosequemur. Historiam Animalium, plantarum excipiet historia, cum figuris æneis, cujus gustum ante quinquennium dederam. Tu *Benevole Lector*, fave, & felicem successum, cum prospera valetudine nobis apprecare, ut & hoc opusculum, bono literariæ juventutis cœptum, absolvere possimus. Dabam Lesznæ ex Musæo 10. Junii An.

M DC LII.



HISTO-



HISTORIÆ NATURALIS

De

INSECTIS.

LIBER I.

DE INSECTIS TERRESTRIBUS,

pedatis & alatis.

TITULUS I.

*De Anelytris, seu Detecti-
pennibus.*

CAPUT I.

De Anelytris quadripennibus.

ARTICULUS I.

*De Anelytris quadripenni-
bus membranaceis.*

PUNCTUM I.

De Apibus.

DIGESSIMUS in præ-
fatione Insecta : jam
secundum præmis-
sam seriem de iisdem
agemus, de *Anelytris*
quadripennibus mem-
branaceis primò dictu-
ri ; quorum alia quidem *faviscant*, ut
Apis, *Fucus*, *Fur*, *Vespa* & *Crabro* : alia *non*
faviscant, ut *Cicada*, *Orsodacna*, *Perla*, &
Cimex sylvestris.

Ordo.

Plin. H. N.
lib. 11. c. 5.

Ab *APIBUS* incipimus, quibus in-
ter omnia insecta principatus, & jure
præcipua admiratio, solis ex eo genere
hominum causa genitis. Mella contra-
hant, succumque dulcissimum ac salu-
berrimum. Favos fingunt & ceras. Illæ
ad usus vitæ tolerant, opera conficiunt,
republicam habent, consilia priva-
tim, & duces gregatim : at quod maxi-

mè mirum est, mores habent. Præterea
cum sint neque mansueti generis, neque
feri : tamen tanta est natura rerum, ut
propè ex umbra minimi animalis incõ-
parabile effecerit quiddam. Quos effi-
caciæ industriæque tantæ comparemus
nervos ? quas vires ? quos rationi me-
dius fidius viros ? hoc certè præstantio-
ribus, quo nihil novere, nisi commune.


Virgilius eis partem divinæ mentis & *Virg. Georg.*
haustus tribuit. Scripsere de illis præ-
ter Aristomachum Solensem, qui duo-
decexaginta annis nihil aliud egit ; & *Plin. H. lib. 11. c. 9.*
Philescum Thasium, qui quod in deser-
tis apes coleret Agrius cognominatus
est ; Hyginus, & quidem diligentissimè ;
Virgilius ornatissimè, & Cels. elegan-
tissimè : ut de *Meno* inter Samnites na-
to taceam. Aristodemum cujus Augu-
stinus meminit, eundem cum Aristom-
acho Plinii esse puto.

Latinis *Apis* & *Apes*, hæc insecta di-
cuntur, seu quòd sine pedibus nasci vi-
deantur : seu quòd examina pedibus
mutuò sibi hèreant, ac firmiter sese qua-
si in botro teneant. Græcis est μέλισσα &
μέλιττα vel à μέλι, id est, melle, cujus opi-
fex est ; vel à Melissa puella, quæ cum
favos melle plenos in Peloponeso repe-
risset, alias Nymphas ad degustandum
invitavit : vel à μελέτη, id est, meditatio-
ne & exercitio, quòd semper sit in ope-
re. Hesiodo μέλισσας, αὐτὰρ μέλισσας, & ἀνθρώπων legi-
tur ; sed hanc Suidas, Aristoteles & alii,
crabronem potius faciunt. Apud Ru-
landum, ἀπὸ τοῦ σχάδων, dicitur ; apud He-
sychium

Nomen

Rulani
Synoni.


Apes . Bienen Immen




Fuci Bombylii Hummeln



Vespe . Wespen et Crabrones . Hornausen



Cicadae Krichart



fygium φώμιον. Stephanus σμελίδας quoque vocari scripsit. Vnde σμελίδω, apes alvearibus condo. Epitheta occurrunt plurima. Dicuntur enim à fingendo. πλασεις; à florum depopulatione ἀνθιδωνες; à colore ξανθαί; à natali solo βεγενεῖς; ab obtusioribus aculeis σμαί; ab alarum in aëre vibrantium sono βομβύλαι, & βομβύλοι; à loco communi ἀερίδωνες; ab aliis ἡμέμονες, ἐργόφοροι, & παλασίδες: quod cum sole & surgant & quiescant, *Solis equa*. Theocritus καίρας dixit, à corporis hirsutiae; Aufon. & alii *Cecropias*, quod in Attica regione primum conspectae credantur: Virgilius, & Martialis ab Hybla monte Siciliae *Hybleas*. Callimachus, quod omnia florum fastigia pervolitent πανακρίδες; Varro, quod mel conficiant, *mellis matres*.

Descriptio Vnicolores magis esse quam crabrones aut vespas Aristoteles prodidit: generaliter nigras, Cardanus opinatur. Tenuem earum substantiam, quia leves, facile excoqui; excoctum & humidum velut nigrum evadere. *Pennas* habent quatuor, siccas, ut cuncta volatilia infecta, pellucidas, scapulis annexas, quarum postremae minores ne remigio obessent, linguam praelongam quam foris gerunt: *aculeum* ventri confertum: *dentes*, & *oculos* subcorneos intus conditos; stomachum ex omnium membranarum tenuissima contextum, quo collectam mellaginem, non solum continent, sed etiam concoquunt & depurant. Plinius *Vtriculum* dixit. Imis *petiunculis* duo quasi digiti emergunt, quibus procellosis temporibus lapillum ad

vibrandum corpusculum ferunt, ne per ventorum impetus abripiantur. Excrementum rubrum est: ἐθρίαν Græci vocant. De Ducis seu Regis aculeo non convenit. *Querat nunc aliquis*, inquit quasi indigna bundus Plinius, *unus ne Hercules fuerit, & quod Liberi patris sepulchrum, & reliqua vetustatis situ obruta? Ecce in re parva, villis que nostris annexa, cuius assidua copia est, non constat inter authores: rex nullum ne solus habeat aculeum, maiestate tantum armatus: an dederit quidem eum natura, sed usum ejus illi tantum negaverit?*

Aristoteles habere, sed non uti scripsit: Aelianus dubitavit. At Columella, qui pleraque ab experientia scripsit, sine spi-

culo esse prodidit, *nisi quis forte*, inquit, *Colū. R. R. pleniorē quasi capillum, quem in ventre gerunt, aculeum putet.* Vt ut sit, ad unum

ictum; hoc infixio, quidam eas quæ untuntur, statim emori putant. Aliqui non nisi in tantum adacto, ut intestini quippiam sequatur: sed fucos postea esse, nec mella facere velut castratis viribus, pariterque & nocere & prodesse desinere. Nullas in novæ Hispaniæ in-

fulis reperiri scribunt quidam: nullas in Scotiâ Solinus, in Hibernia alii, sed falsò. De hac Polydori Virgilii testimoniū habemus. In illa vidimus ipsi, & in horto hospitis nostri Andreapoli, summa cum jucunditate tractavimus interdum. In Africa paucas invenias, propter nimium sine dubio solis æstum, qui & flores depascit, & fontes absu-

mit. In Mycono non gigni, importatas Aelianus author est. Frequentiores sunt in Italia circa Padum, in agro Nolano, in Arcadia, Thracia, Corsica, Sicilia, Attica, Iucatana & Goa. Hostilia vicus alluitur Pado. Hujus inquilini pabulo circa deficiente, imponunt navibus alveos, noctibusque quina millia passuum, contrario amne naves subvehunt. Egressæ luce Apes, pastæque, ad naves quotidie remeant, mutantur locum; donec pondere ipso pressis navibus, pleni alvei intelligantur, revertisque eximantur mella. In Nolano frequentes esse, loci ipsius temperies & benignitas ostendit. Maxima ibi vis Bacchi. Oleæ nusquam generosior liquor: pomorum ut omnia genera, ita nullis secunda: æstate aura perpetua, hyeme apricitas maxima. In Arcadia Aristæus Arcas primus mellis usum ostendit; in Peloponneso Melissa virgo. Corsicæ incolæ longævus idè Athenæus tradit, quod melle assidue vescantur. Ovidius ob taxicopiam venenatum facit. In Sicilia, Hyblen montem in primis incolunt, thymi & falicum opulentissimum. Abundantia, comparisonem Ovid. expressit. In Attica in Hymetto monte qui & Cecropius, ob pascua quæ solis Halizoniis cedunt, favificant. Hinc Hymettia & Hyblæa mella. At maximus in Sc-

ptentrione earum proventus. In Podolia & Lithuania, siccarum terrarum fo-

veas melle repleri, scribit Olaus, in quas

imma-

beant, pro gratissimo sunt pabulo matribus. Tempore procedente instillant cibos, atque incubant, maxime murmurantes, caloris, ut putant, faciendi gr. necessarii excludendis pullis, donec ruptis membranis quas singulos cingunt, ovorum modo; universum agmen emergat. Spectatum hoc Roma consularis cuiusdam suburbano, alveis cornu laterne translucido factis. Fetus intra XLV. diem peragitur. Fit in favis quibusdam, qui vocatur clerus, vel potius *cladus* (vermiculus est in alvearis pavimento nascens) amare duritia cere, cum factum inde non eduxere, morbo, aut ignavia, aut infecunditate naturali. Hic est abortus apum.

Alveus totus arena obducitur, & favus putrescit. Addit Aristoteles, Duces subter ad favum pendentes oriri, separatim sex aut septem: fucos quoque seorsim si Dux superest, si obiiit, in Apum loculamentis provenire: ceteras in concavis imisq; favorum. Apum vermes dum recentes sunt, & aluntur, & stercus emittunt; donec lineamenta, sub quibus Nymphæ dicuntur receperint. Quiescunt tum contracti, nec ullo pacto se patiuntur moveri, usque dum destinatam speciem referant. Minus fecundificant, vere ferotino, aut si squalor vel rubigo inciderit. *Adules* optimæ fiunt, cum mellificatur.

Scaliger genitale quiddam in cellis ponere existimat, è quo Apiculæ progignantur. Creati è toribus in foliis vermiculos; plueranisi: quanto commodius lectum rorem illum, atq; calore parentis genitali forum, tanquam ab architecto, in schedonem animari posse. Deprehensam à se cicindulam cum mare in coitu, meridie solum obivisse. Edita sub vesperam à fœmella ova, quæ intra viginti horas vivificata abiere. Visam & è grandiorib. Muscis unam, quæ in vola manu aliquandiu retenta, plusculos vermiculos candidos, mobilitate propria insignes edidit. Cur non Apes pauculis horis coire possent: deinde illico parere? Vossius deniq; ex Belgicorum apiariorum sententia ita de propagatione Apum scribit. Rex apum singulis in cellis semen emittit. Id est, folliculus albicans, unde prodit vermiculus ejusdem coloris, sem. papav. affimilis. Isti

folliculo circumdatur ab apibus viscidus ex rore humor itidem albicans. Nempe album hoc, albumini ovi, regium semen vitello respondet. Folliculo sic viscido rore circumdato, apicula incubat galline instar, ac suo id fovet calore. Ita folliculus turgescit magis & magis; donec talis fiat vermiculus, qualem pinguiorib. in caseis nasci videmus. Porro sæpe quidem tardius, interdum tñ. die nempe sereno, intra diem 10. vel 12. vermiculi ejus pellicula perrupta, exit apis, eaq; perfecta; senis quippe pedibus, alis quaternis; pallidior tamen, & paulo post adultioribus similis. Hactenus Vossius.

De Victu, de quo ex lege methodi victus. nostri ante generationem agere debemus, si quæras, nihil venantur, sed ventura hyemis memores æstate laborem experiuntur, & in medium quesita reponunt. Melle ergo, & si hoc nimium Arist. H. 8. subtrahatur, ceragine, cerintho, erythace, sandaracæ dicta vescuntur. Deterior hæc & sic dulcedine æmulatur. His deficientib. Apiarii ficus, saccharata, uvæ passas siccatas, fucos tusos, schedonum capita, lanas passlo defrutove madidas, & aquam mullam pro foribus ponunt. Crudas & recentes carnes apponi jubet Plin. Florib. odoratis & caliculatis delectantur, ex arborib. pomor. cytisi, amygd. tamarisci, casia, ziziphi, pyri, perlicæ, therebinthi, lentisci, cedri, tilia, ilicis minoris. Rhamni: ex herbis, thymi albi & rubri, fertulæ campanæ, myrti, viticis, genistæ, phlei, fabæ, serpilli, violæ, myrrhidis, roris marini, conizæ cerinthæ, meliloti, narcisci, aphodeli, citraginæ, hederæ, consiligin. origani, satureiæ, violæ agrest. amaraci, hyacinthi, irid. croci, rosæ, lilii, attractilis, sinap. spondilii, batrachii, &c. De quib. omnibus distinctè Columella agit, quem vide. Bibere eandem certum, & limpida, seu fluviatili seu fontana delectari, in qua ligna & lapides injiciendi, ut commode & insidere, & sese ablucere possint. Hac destituta, aliunde humore hausto sitem leniunt, de eoq; intus ad Reges & operatrices aliquid deferunt.

Vita ad 6.7. & ad summum 10. annos producit: seu ut Plinius. Vita eis longissima, ut prosperè inimica ac sortuita cadant, septenis annis universa. Alveos,

Arist. H. A. 3.6. c. 40.

Arist. H. A. 3.5. c. 19.

Scalig. Ex. v. 19. c. 2.

Vossius de Idol. l. 4. c. 66. p. 1511.

Arist. H. 8. 1.9. c. 40. 1.4. c. 9.

Col. R. R. 1.9. c. 4. Arist. H. A. 1.9. c. 40. Varro R. R.

Ætas. Arist. H. A. 1.5. c. 22. Plin. H. N. 1.11. c. 20.

nunquam intra decem annos durasse proditur. Sunt qui mortuas si intra tectū hyeme servantur, deinde sole verno torreantur, ac ficulneo cinere toto die forveantur, putent reviviscere. In totum verò amissas, reparari ventribus bubulis recentibus cum fimo obrutis. Virgil. juvencorum corpore exanimato, sicut equor. vespas ac crabrones, sicut asinorum scarabæos, mutante na-

Cardan. de tura ex aliis quadam in alia. Card. robu-
variet. Ker.
l. 7. c. 22.

Attollunt sese atque contrahunt cum volant. Rectà non volant, quia cauda destitutæ sunt: ideo etiam parum in volatu perseverant, aut in aëre demorantur. Prestant tamen vaginipennes. Quia exiguas pennas habent, nec rectè procedere, nec diu volare possunt.

Sonus. Vocè non edunt, sed sonum, βομβέειν id Græcis Latinis bombilare, & bombillare. Sonus ipse βομβέειν & βομβέειν, illis murmur & susurrus his dicitur. Quidam modulari, sed ineptè, dixit. Alii, nocte ea, qua natus est Iesus, magis bombos edere, garriunt. Odoratu plurimum valere inde colligas, quòd mel à longinquo sentiant. Visæ ex agris pharmacopolia & qui mel venderent invisisse, revolasseq; onustas. Retulit

Odoratus.
Arist. H. A.
l. 4. c. 8.

& Cluſius, per longū camini tubum, cum mel domi coqueret, supernè ingressas; nec aliter quam circa candelam cicindelas & lampyrides solent, circa ahenum volitasse; plerasque in illud decedentes submersas. De instrumento non est quod solliciti simus. τὸ πρῶτον illud est, & spiritus innarus, quo & moventur.

Vossius, de
Idololatr. l.
4 c. 71.

Arist. de
part. anim.
l. 2. c. 16.

Auditus. Auditu destitui Aquinati visum. Sono vehementi, ob ingentè aëris motum, qui & animal interimere, & lignum scindere valet, terreri & fugere. At plausu æris gaudet, & murmure excitantur ad opus, sonituq; quieti

Arist. H. A.
l. 9. c. 40.

Arist. H. A.
l. 4. c. 10.

Antipathia. Plin. H. N.
l. 11. c. 18.
Theoph. C.
P. l. 6. c. 4.

Odore fœdos odores, proculq; fugiunt, sed & in se. Itaq; unguenta redolentes infestant, ipsæ plurimor. animalium injuriis obnoxie. Impugnant eas naturæ ejusdem degeneres

vespæ atque crabrones, & è culicum genere qui vocantur muliones: (ἐμπίδες Arist. qui onusos in via mulos æstate vexant) populantur hirundines & quædam aliæ aves. Insidiantur aquantibus ranæ, quæ maxima est earum operatio, tum, cum sobolem faciunt. Nec hæ tantum quæ stagna rivosque obsident, verum & rubetæ veniunt ultrò, adrepentesque forib. per eas sufflât: ad hoc provolant, confestimq; abripiuntur. (alii legunt, inflantur, & provolantes eas confestim abripiunt) Nec sentire ictus apum ranæ traduntur. Inimicæ & oves, difficile se à lanis earum explicantibus. Cancrorum etiam odore, si quis juxta coquat exanimatur. Timent quoq; ab araneis, laceratis, crocodilis, upupa, paro, merope, noctua, & aliis alvearium depopulatoribus: sed & ab Echo, fulgure, tonitru, & fragore omni.

A li. H. A.
l. 8. c. 6.
& l. 1. c. 57.

Huc & morbi pertinent, repletio Morbi nempe, inanitio, siccitas, humiditas, frigus, calorque non naturalis. Repletionem nimia satietas infert, quando alvearia non castrantur, scabie tum fordibusq; diffluent, strumosaq; redduntur. Inanitio è cibi inopia oritur: Eiusdem inopia, malaciâ, diarrhæam, βλακυστίαν, & tabem affert. In malacia adeo morosa sunt, ut facilè aufugiât, nisi tinnitu, vel rerum gratissimarum suffitu retineantur. Diarrhæam extirymalli, hellebori, ebuli & sambuci floribus contrahunt. Tabe correptæ pellucescunt. De remediis & quæ huc spectant, vide Authores. De his ita Plin. H. N. Plin. Sunt & operis morbi: cum favos non expleant, cleron vocant. Item blapsigoniam, si factum non peragant. Inimica est & echo resultanti sono, qui pavidas alterno pulsat ictu: inimica & nebula. Aranei quoque vel maximè hostiles, cum prævaluere ut intexant, enecant alveos. Papilio etiam hic ignavus & inhonoratus, luminibus accensis advolitans, pestifer, nec uno modo. Nam & ipse ceras depascitur, & relinquit excrementa, quibus teredines gignuntur: fitis etiam araneosa, quacunque incescit, alarum maximè lanugine obrexit. Nascuntur & in ipso ligno teredines, quæ ceras præcipue appetunt. Infestat & aviditas pastus nimia florum satietate, verno maxima tempore

tempore alvovita. Oleo quidem non apes tantum, sed omnia insecta exanimantur, præcipuè si capite sentire eximi mella avidè vorantes. Catero præparca, & quæ aliòquin prodigas atque edaces, non secus ac pigras atque ignavas proturbent. Nocent & sua mella ipsis illitaque ab adversa parte moriuntur. Tot hostibus, tot casibus, & quòta portione eorum commemorata? tam munificum animal expositum est.

Ingenium.

Singulare ingenium regiminis & operis ratio ostendit, in quibus prudentiam, fidem, obedientiam, fortitudinem, & exactæ quasi ^{πολιτείας} exemplum, observare est. Eleganter de iis Plinius. Ratio, inquit operis hæc, interdum statio ad portas, more castrorum, nocte quies in matutinum, donec una excitet gemino aut triplici bombo, ut buccino aliquo. Tunc universæ pro volant, si dies mitis futurus est. Prædivinant enim ventos imbresque, & tunc se continent testis. Itaque temperie cæli (& hoc inter præcита habent) cum agmen ad opera processit, aliæ flores aggerunt pedibus, aliæ aquam ore, guttasque lanugine totius corporis. Quibus est earum adolescentia ad opera exeunt, & supra dicta convehunt: seniores intus operantur. Quæ flores comportant, prioribus pedibus femina onerant, propter id natura scabra, pedes priores rostro: totaque onusta remeant sarcina pandata. Excipiunt eas ternæ aut quaternæ atque exonerant. Sunt enim intus quoque officia divisa. Aliæ struunt, aliæ poliunt, aliæ suggerunt, aliæ cibum comparant ex eo quod allatum est. Neque enim separatim vescuntur, ne inæqualitas operis & cibi fiat & temporis. Struunt orsa ea concameratione alvei, texumque vel usque ad summa tecta deducunt, limitibus binis circa singulos arcus, ut aliis intrent, aliis exeant. Favi superiore parte affixi, & paululum etiam lateribus simul hærent & pendent una. Alveum non contingunt, nunc obliqui, nunc rotundi, qualiter poposcit alveus: aliquando & duorum generum: cum duo examina concordibus populis dissimiles habuere ritus. Ruentes ceras fulciunt, pilarum intergerinis à solo fornicatis, ne desit aditus ad sarcinendum. Primi ferè tres versus inanes struuntur, ne

promptum sit quod invitet furantem. Novissimè maximè implentur melle: id eoque averso alveo favi eximuntur, Gerule secundos status captant. Si cooriat^r procella, apprehensi pondusculo lapilli se librant. Quidam in humeros eum imponi tradunt. Iuxta vero terram volant in averso flatu vepribus hebetato. Mira observatio operis. Cessantium inertiam notant, castigant mox, & puniunt morte. Mira munditia. Amoliuntur omnia è medio, nullaue inter opera spurcitia jacent. Quin & excrementa operantium intus, ne longius recedant unum congesta in locum, turbidis diebus, & operis otio egerunt. Cum advesperascit, in alveo strepunt minus ac minus, donec una circumvolet eodem, quò excitavit, bombo, ceu quietem capere imperans: & hoc castrorum more. Tunc repentè omnes conticescunt.

Prima fundamenta *commosis* vocant periti, seu gummitionem, (^{κλω} ^{l. 11. c. 7.} ^{Ad. H. A.} ^{l. 1. 59.} ^{νιστιν} vel ^{κωρίαι} ^{l. 11. c. 7.} ^{Ad. H. A.} ^{l. 1. 59.} aliè legunt) cum alveare tectorio illinunt: secunda *pissoceron*, tertia *propolin*, inter coria cerasque magni ad medicamina usus. *Commasis* crusta est prima, saporis amari. *Pissoceros* super eam venit, picantium modo ceu dilutior: ceræ initium, plerumque è mitiore gummi. *Propolis* crassioris jam materiæ, (è gutta quam in foliis populi ferunt hanc faciunt) additis floribus nondum tamè cera sed favor. stabilimentum, qua omnes frigoris aut injuriæ aditus obstruuntur, odore & ipsa etiamnum gravi, ut qua plerique pro galbano utantur. Dioscorides ad styracem accedere putat. De Regi- ^{Ad. H. A.} ^{l. 5. c. 11. &} mine sic idem.

Mira plebi circa Regem (de hoc in Differentiis) obedientia. Cum procedit una est totum examen, circæque eum conglobatur, cingit, protegit, cerni non patitur? Reliquo tempore cum populus in labore est, ipse opera intus circuit, similis exhortanti, solus immunis. Circa eum satellites quidam, lictoresque, assidui custodes autoritatis. Procedit foràs nonnisi migraturo examine.

mine. Id muldò intelligitur ante, aliquot diebus murmure intus strepente, apparatus indice, diem tempestivum eligentium. Si quis alam ei derruncet, non fugiet examen. Cum processere, se quæque proximam illi capit esse, & officio conspici gaudet. (Id Homerus *βοτρυχὸν πέτασθαι* dixit;) Fessum humeris sublevant: validius fatigatum ex toto portant. Si qua lassata deficit, aut fortè aberravit, odore persequitur. Vbicunque ille confedit, ibi cunctarum castra sunt. Duce prehensum totum tenetur agmen: amisso, dilabitur migratque ad alios. Esse utique sine Rege non possunt. Invitæ autem interimunt eos, cum plures fuere, potiusque nascentium domos diruunt, si proventus disponatur: tunc & fucos abigunt. Rege peste consumto, mœret plebs ignavo dolore, non cibos convehit, non procedit, tristi tantum murmure glomeratur circa corpus ejus. Subtrahitur itaque deductæ multitudini: aliàs spectantes exanimem, luctum non minuunt. Tunc quoque ni subveniatur, fame moriuntur. Huc *latitatio, mundicies, & alia* spectant.

Arist. H. A.
l. 8. c. 14.
Plin. l. 11.
c. 6.

Quiescunt ab occasu Vergiliarum usque ad ver, & hyeme conduntur. Alii ultra exortum latere dicunt, prout ratio climatis & tempestatis tulit. Ante fabas florentes non exeunt ad opera & labores.

Clut. de Apib. l. 1. c. 3.
Voss. de lido.
4. c. 72.

Stupendum quod ex Clutio Vossius narrat, mundiciei & amoris simul exemplum. *Repererat is in hortis suis apiculam, in olla mellis submersam: alteram item ab imbre sic afflictam, ut ipsa quasi exanimis jaceret in herba. Vtramque igitur manui imposuit: cujus calore sic fœta planè sunt refocillata. Vt verò se mutuo agnovere, utraque alteram osculari & amplecti amicum in modum. Ac illa quidem mundior, quam imber sic straverat, membratim purgare cepit alteram melle sordidatam: inque opera hac prope modum horam insumpsit. Tum quæ benesicium id acceperat, os admovit alteri: eiq; grati animi ergo, de pectore suo eduxit mellis aliquid: quod ea hausit, satiatæque, in alveare revolavit.* Addo de

απολογία & præfagiis quædam. Fructibus nullis nocetur, *inquit Plinius.* *Plin. H. N. l. 11. c. 8.* Mortuis ne floribus quidem, non modo corporibus insidunt. Operantur intra sexaginta passus. Et subinde consumtis in proximo floribus, speculatores ad pabula ulteriora mittunt. Noctu deprehensæ in expeditione, excubant supinæ, ut alas à rore protegant. *Præfagia* ab examinibus ubi confedere sumuntur. Tunc ostenta, *inquit idem,* faciunt privata ac publica, uva dependente in domibus sive templis, sæpè expiata magnis eventibus. Sedere in ore infantis, *Plin. H. N. l. 11. c. 16.* Platonis tum etiam, suavitatem illam prædulcis eloqui portendentes. Sedere in castris Drusi Imperatoris, cum prosperrimè pugnatum apud Arbalonem esset, haud quaquam perpetua aruspicum conjectura, qui dirum id ostentum existimant semper. Aliter apud Dionem & Obsec- *Dio Hist. l. 54.* quentem legitur. Ille examine apum deterritum, ne ultra Visurgim procederet: hic infelicitèr dimicasse scribit. *Obseq. l. de prod. c. 114.*

Inserviunt *usibus* pluribus apes. *Vfus.* In *Cibo, Medicina, bellis, præfagiis, suppliciis,* etiam adhibentur. Vescebantur eis Cumanæ regionis incolæ. Contusæ & cum vino diuretico exhibitæ, hydropem potenter curant & calculos comminuunt. In melle mortuæ vomicas sanant: Ulcera labiorum emolliunt: dysenterix medentur. Favis immortalæ & cum melle tritæ pilos partibus nudatis restituunt. Sæpè ab obsessis in hostes emittuntur: harumque opera Lupus Barriga Lusitanus ab obsidione oppidi Xiamaticensis in Mauritania, Ann. millesimo quingentesimo duodecimo depulsus est. Apud veteres stellionatus reum, melle illitum, & ad solis radios expositum, apibus obijciebant. De *præfagiis* superius dixi. Adde, Pompeio aciem contra Cæsarem instructuro, & Dyrrhachium egredienti, tanta apum examina occurrere, ut signa obscurarent. Victus est. Severo imperante, apes in signis militaribus, in stativis

stativis Nigri maximè, favos finxerunt. Ancipites hinc inter Severianos & Nigrianos congressus: sed illi obtinuerunt. In Consulatu L. Pauli & C. Metelli hostem imminuentem præsignificaverunt. Leopoldo Austriaco Sempachum cum exercitu tendente, apum examen in oppidum irruit, ut Helvetiorum Historici produnt. Palatino Regiam Pragensem ingrediente, tegulis infedere. Mali rem ominis Anhaltinus dixit. Reliqua prætereo.

Differentiæ.

Arist. H. A. l. 9. c. 40.

Differentiæ Apum sunt variæ. Aristoteles in *urbanas* & *feras* dispescit, & ibidem, alias *gregales*, ut Apes, Reges, fucos, vespas annuas, crabrones teredines: alias *solitarias*, ut Sirenem minorem, maiorem, & bombycem. Hunc secutus Albertus, novem quoque genera facit, quæ apud Aldrovandum vide. Plinio Apes sunt & *russica sylvestresque*, horridæ aspectu multo iracundiores, sed opere ac labore præstantes, *Urbanarum*, addit, duogenera, optimæ breves variæque, & in rotunditatem cōpactiles: deteriores longæ, & quibus similitudo vesparum: etiamnum deterrimæ ex iis pilosæ. Optimè in *non operatrices* & *operatrices* distinguuntur. Inter illas sunt *Rex, Fucus & Fur*. De

Arist. H. A.

l. 1. c. 40.

Plin. H. N.

l. 11. c. 10.

Rege satis superius diximus. Duo eorum secundum Aristotelem & Plin. genera. Melior rufus, quam hirsutus niger variusque. Omnibus forma semper egregia, & duplo quam ceteris maior, pennæ breviores, crura recta, ingressus celsior, in fronte macula quodam diademate candicans. Multum etiam à nitore vulgò differunt. Varr. nullam ruffi mentionem facit. De *fusco* insequentibus agitur. *Fur* est nigrum quid, ventreq; ampliore. *Operatricium* differentia, à corporis figura, ætate, moribus, operatione, colore & aculeo sumuntur. *Corporis figura*. Sunt alia *vasta* sed glomerosa, eademque nigra & hirsuta: alia *minores* quidem sed æquè rotundæ, & infusci coloris, horridique pili: alia magis *exigua*, nec tam rotundæ, sed obesa tñ. & lata, coloris meliusculi: alia minimæ gracilesque, & acuti alvei, ex aureolo, variæ atque leves. Sic distinguit

Colum. R. R.

ex Aristotele Columel. & Virgilius: Optimæ parvula, oblonga, leves, ni-

rida, auro ardentis, & paribus lira corpora guttis, moribus denique placidis. *Ætate*. Sunt quædam *novellæ*,

vetula quædam. Illarum examen *Ælia H. A.*

quotannis avolare solitum est, nec *l. 1. c. 11.* perinde pungunt: & si annum non excessere, nitescunt, oleique similitudinem & speciem gerunt. Hæ horridulæ evadunt, & rugis obferuntur: mellificandi peritissimæ. Frigora denique & pluvias præsentunt: ideo his ingruentibus non longè ab alvearibus recedunt. *Operatione*. Sunt *inutiles*, ut

Ælia H. A. bombylius: ἐργόφοροι, πλάσιδες, ab ar- *l. 1. c. 39.*

tifici figmento fortè. Sunt & *inertes*, quæ quidem nec favos corrumpunt, nec melli insidiantur: id tamen non faciunt. Nonnullæ Regem cingunt: quædam mortuas ex alveo efferunt: alia noctu excubias agunt.

Quæ mellificant, vel in alveis, arboribus excavatis, petris, tabulatis, vel sub

terra id faciunt. Circa Thermoodon- *Plin. H. N.*

tem fluvium (in Themiscyra) duo ge- *l. 11. c. 17.*

nera: aliarum quæ in arboribus mellifi- *Arist. H. A.*

cant: aliarum quæ sub terra, triplici *l. 5. c. 22.*

cerarum ordine, uberrimi proventus, inquit Plinius. At Aristoteles illarum

duntaxat meminit, has alibi ponit. Favus ipse, addit, levis, atque æquabilis est, quem non semper, sed hybernis

duntaxat mensibus construunt. Copia in eo tractu hederæ, unde mel conficitur. *Colore*. In Ponto enim sunt

quædam albæ, quæ bis in mense mella faciunt. *Moribus*. In Æthiopia, si Alva-

rezio credendum, adeo cicures, ut intra hominum cubilia examina conficiant.

Apud Halizones cum hominibus pabulatum exire, & opus tam

concretum facere, ut mel à cera se-

jungi nequeat, Pausanias author est. Destituuntur & aculeo quæ-

dam.

De Novi orbis apibus. ita *Nierember-*

gius. Multiplex apiarium genus in novo orbe semper admirabile, licet in mellificio diversum. *Quædam* in ar-

borum cavitatibus, sed sine favo, corticem cereum prius effingunt ovi in-

star, quem imbuunt penitus liquido & suavi nectare. Hæ ova copulata si-

mul, & racemata, usque ad viginti vel triginta inveniuntur. Inditrun-

cum

Pausanias in Attica.

Nieremb. H. Exot. l. 13. c. 1.

cum cædunt, & deferunt ad usus suos plenum melleis globulis, cera quoque utilissima. *Aliæ* glandes minores conficiunt: *aliæ* non excedentes nucem avelanæ. Hoc genus apum exiguum est & mansuetissimum. *Aliæ* sub humo laborant, quædam 3. aut 2. ulnas, quædam non amplius quam dodrantem profundè, prout opportunum illis. Harum quædam mellificant in cereis quasi fistulis oblongis, quædam orbicularib. & rotundiorib. Ex his quædam *mites* & innoxæ, aliæ *majuscula* efferæ, & suos labores acriter tuentur. *Aliæ* quoque sunt *feræ* diversi opificii, rotundum conficiunt favum instar mali citrei circulando fistulas suspenduntque ex arborum fronde, imponentes favos alium super alium: aliquando sustinet frons racemum ejusmodi trium dodrantium longum. *Exiguiores* apes suspendunt minores racemos, & tenuioribus ramis; grandiores ex firmioribus (vocant has Indi *Mateeas*) quarum morsus æquat dolore ictus serpentium, & viginti quatuor horis perseverat. *Alia* mitis apum natio est in terris Haimensium, quas industria Europæorum in alvearia conclusit, ubi nec pungunt, nec irritantur, nec inquietes fiunt, recluso alveare. Mirum dictu, nec cessant à labore, tam sunt officio intentæ. Hic curiositas non indigeret vitreis, nec transparentib. vasculis, ut exemplum sedulitatis disceret. Regina & Magistra plurimum à plebe distat. Est quoque apum *nigrum* & *exile* genus, quod in sylvis sine cera mellificat. Cera subterranearum apum percommoda ceratis ad dolores ex quavis causa frigida accidentes: tumores resolvit: ad alia medicamenta etiam idonea. Albæ apes sunt in Quatema-la, mel quoque album & ceram fabricantes, nec nimis noxiæ.

Nunc ex aliquib. authoribus dabo aliqua. In *Ceyba* vastæ arboris & aliar, interdum cavis nidulantur apes, atque suum mel elaborant, non minus bonum quam in Hispania teste Cæca: quarum tria sunt genera. *Vnum* paulo maius culicibus. Ad favi quem probè communiunt, orificium, tubulum di-

midii digiti longitudine aptat ex materia cere similis, per quem apes, alis eo quod è floribus decerpserunt onustis ad suas operas ingrediuntur. Acidiusculum est mel istud, cujus paulò amplius libra præbent singula alvearia. *Aliud genus* paulo maius nigrum superius tamen candidum est. Orificium, quo in arborum cavum ingrediuntur, confectum habent ex cera alteri materiæ commixta, lapide durius. Harum mel superius bonitate longè superat, illiusque tres mensuræ, sive veterum congius nonnunquam ex unico alveari eximitur. *Tertium genus* Hispanicas magnitudine excedit, sed aculeis caret, impetu tñ. in eos fertur, qui favos eximere volunt, mireque sese capitis & barbæ pyris implicat. Harum interdum alvearia duodenas aut plures libras mellis, multò quam reliquarum præstantioris, continent.

Americana inquit Lærius, apes nostris dissimiles, & exiguas illas muscas quæ æstate, præsertim maturis uvis, nobis infestæ sunt, potius referentes, suum Mel & ceram conficiunt, per sylvas in arborum cavis, unde incolæ utrumque probè eximere norunt. Favum, è quo mel nondum exemptum yrayetic appellant: yra enim illis mel est, yrayetic cera. More nostro melle vescuntur: ceram verò, quæ instar picis ferè nigra est, in massas convolvunt brachiali crassitudine. Sed neque funalia neque candelas ex ea parant, (noctu enim nullo alio lumine utuntur, quàm certi ligni fragmentis accensis, quæ lucidam flammam parant) at ingentium cannarum ligneorum tubos (in quibus suas plumas, ne à certo papilionum genere, ipsis travers dicto, cotrumpantur conservant) ista præsertim obtulant.

Anton. Herrera in Provincia Vetræpæcis scribit reperiri apes *sine acule* clarum mel conficientes; quarum aliæ sint armatæ & noxiæ, quemadmodum nostræ, aliæ parvæ ut muscæ, optimè tamen mellificantes, aliæ noxii nectaris: quod dementer gustantes. Nullæ favum conficiunt sed condunt liquorem sub humo,

humo, aut in cavis arboribus melliquidissimum, & acescit nonnihil. Ulicus Faber scribit, *in terrâ Marchkasorum*, si quis sylvas ingressus in arbore quacunq̃ue foramen faciat, posse ex arbore quinq; vel sex mensuras mellis accipere quod instar mulsi ab exiguis apibus neminem cedentib. conficitur. Hoc mel ad comedendum optimum est, & vinum inde suavissimum præparatur.

Adjiciam hinc ab Aldrovando observatas, easq; proprijs ipsius verbis describam. Quæ inquit *priore loco* exhibetur, Apum regulus est ape duplò ferè procerior, sed fucò macilentior: magis etiam lucescit, & alvum habet in extremo acutiorem. Alæ sunt longæ, & coloris albi, flavis punctis conspersi. Caput ejusdem cum ventre coloris est. Antennæ sunt breves, sed parum benè à pictore expressæ. Apis est vulgaris, quæ *secundo loco* ponitur, color ei magis ad cinereū vergit hirta ferè tota, alvo est obtusiori, brevissima, exerit aculeum. Alæ sunt candidæ intercurrentibus lineolis flavis, breves, breviores, inquam, ipso corpore: Caput magnum; antennæ, ut in ipso regulo. Fucus, *qui tertio loco* exprimitur media est magnitudine inter Regem, & Apem; magis tamen ad regem accedit, ape duplo major, Rege corpulentior, sed brevior, colore etiã magis fusco. Alæ ferè, ut in Rege, pedes breviores, caput majus. Alvi extremum velut in duas appendices definit.

Inter *apes sylvestres*, quarum multa sunt genera, *duæ priores*, una cum suis favis expressæ, domesticis quodammodo accenseri possint. Mel enim quod parant, non omnino spernendum videtur, propter suū dulcorem, & ex favis non contemnenda cera parari possit. Ipsarum vero apum species domesticis nostris multo est pulchrior, venustiorque. Differunt autem & magnitudine inter se & colore. Quæ major est, & priori loco pingitur, favos & cellas etiam conficit majores. Has simul cum suis apibus invētas F. Gregorius Regiensis Capucinatorum ordinis, diligentissimus

Pharmacopola, & herbarum etiam apprimè peritus cum ad montem Padernum vulgo dictum in nostro agro herbarum inspiciendarum gratia ivisset, ad me attulit, cum ut gratum mihi faceret, tum verò etiam, ut tam pulchrū naturæ arcanum posteris aliquando communicarē. cellarū alię erant vacuæ, aliæ plenæ; plenarum aliæ continebant mel, aliæ sobolem albam, qualem à latere favorum pictor exhibuit. An vacuis apes quiescere putaverim. Omnium figura non sexangulis terminatur, ut in communibus, sed erant rudēs, & rotundæ, neque omnes ejusdem magnitudinis. Apis ipsa aspectu venusta admodum, tota hirsuta capite, antennis, & pedibus aterrimis, aterrima item, ac rotunda macula in tergore insignis: alæ ferrugineæ, cætera modo rubicundo, modo atro colore variat. *Altera* quæ plures & minores favos construit, minor est ut dixi, & colore diverso. Caput enim in hac pedes & tota alvus nigricant, dorsum totum rubicundum est, alæ proceræ, angustæ nigricantes. Utraque favos suos operit quisquilijs, palea & musco ne facile sit invenire. Quid si harum melle D. Joannem Baptistam in deserto vixisse dicamus.

Quæ *duæ deinceps* pinguntur, nostris rusticis *Avoni* vocantur, invicem ferè consimiles. *Prior* capite antennis, & pedibus nigris; toto corpore magis, quàm præcedentes hirsuto, & lutescente, minus in dorso, magis in alvo. Sed colorem istum luteum corporis hirsuties facit, non ipsius corpus. *Altera* eadem omnino videtur, nisi candidior esset, & paulò minor. Reperiuntur in hoc genere etiam virides, & nigrae, & aliorum colorum. Hollandi, ut audio, omnes, nescio cur *Keysers* / hoc est, Imperatores vocant, nisi dicamus propter aculeū, quo acerrimè puniunt, Reges in eo vincentes qui vel eo carent, vel si habent, non utuntur.

Nigrarum duarum hic iconem etiam dedi, *prior* major est, & brevioribus tamen alis, utraque corpulenta

est admodum. Prior undique nigra est, præterquam in cervice & superiori alvi parte, ubi macula lutea est, & in extrema ferè, ubi candicat. *Altera* easdem habet maculas, sed multò majores, colorque est intensior. Priori pedes hirsutiores, & crassiores. Utrique atri. Antennæ in secundæ breviores, ac exiliiores. Quæ *deinceps picta est*, ex earum genere est, quæ propè latrinas, & fœdas cloacas bōbos suos edere solent. Aspectu elegans est, alvo crassa ex nigro, & luteo varia, in extremo acuta, capite & dorso cinereis, oculis magnis, extuberantibus, nigris, pedibus brevibus etiam cinereis, alis proceris angustis ejusdem cum dorso coloris.

Est præterea alia *Apis fœra*, quam *aquaticam* vocavi, seu potius amphibiam, quod, & in terra, & aqua degat. Sed rarius videtur. Hanc aliquando, ut me exercerem, sic descripsi. *Api* vulgaris valdè simile insectum amphibium, extra aquam volans, in aquis natans, quadripennis, sepes. Duos pedes oblongos habet, mirum anticos, quibus utrinque distentis tantam remone simul & remigibus ad natatum utitur. Cæteri breviculi, sub ventrem contracti. Caput compressum, oculis nigris, grandiusculis ac splendidis instructum. Corpus alis tectum, prorsus atrum. Alæ superiores simul, & inferiores duriusculæ, ac crustaceæ, nonnihil majori sui parte eaque superiore è luteo colore habent, & nigro maculosæ sunt, sed extrema parte aut proxima subtilissimæ, ac pellucentes, instar inferiorum alarum, quas operiunt ipsæ, appendices duæ sunt raræ observatu; imo in nullo alio Insecto à me visæ, quarum una a teram incumbens tegit, quæ faciunt, ut laciniolæ interna parte, ac triangulo sinuatæ appareāt. Sed & extremo sui erectā seu fissuram levem habent. Rostrum aculeatum est, ut Culicibus. Pedes antea, quib. natat, tribus articulis dissecti sunt. Rustici *Bonon* *Gwardalose* vocant, forsitan quod lucente sole aquæ summa petat, velut apicari cupiens, & nebuloso cælo non conspiciatur. Ali-

quando cælum tueretur, sursum ex aqua exerto ore, aliàs deorsum, & vel levissimo strepitu aut umbra percepta, sagacitate mira statim quovis telo velocius in fundum lancinans subducit, adeo ut captu difficillimū sit.

Ad Caput de Apibus

APPENDIX I.

De Melle.

MELLIS apud Latinos nomen, à Nomea. Græco μέλι, deductum videtur, hoc autem vel à μέλας, curæ est, quod cum cura colligatur: vel à μελέα, pōmo, quod ex ejus fructibus, descendisse videtur. Apud Athenæum Alcman. ὁ πόρεαν κινέην, *cereum fructū*, Epicharmus, πόντον ὀρελον, *matutinum mare*, quod diluculò ex aëre fluat, appellat. Favus, quod vocabulum à φάειν Isidorus derivat, Perottus, à fovendo, quod in favis fœtus suos apes foveant; Martinus ab ὤφει textum; Græcis ἀνθηρίοι, κέρας, κήρυον, μέλι-δειον, μελίκερς, ὕργιον, audit. Cellula est apum sexangula, loculamentum, & fundamentum operis.

Quid sit, egregiè ex antiquis exposuit Plinius. *Venit hoc*, inquit, *ex aëre, & maxime Syderum exortu*, (μελίσα ἐν τοῖς τῶν ἀστρον ὀπισθοῖς Aristoteles dixit) *participes, ipso Sirio exsplendente fit*, (bene hinc Mercurialis in Aristotele pro ἡμεῖς, & ἐλεα legi debere putat) *nec omnino prius Vergiliarum exortu*, (oriuntur, octavo Calend. Aprilis, in octava parte Arietis, ut apud Columellam habetur) *sublucanis temporibus. Itaque, tum primā aurorā folia arbor, melle rosida inveniuntur: ac si qui matutino sub dio fuere, unctas liquore vestes, capillumq. concretum sentiunt. Sive ille est cæli sudor, sive quedam syderum saliva, sive purgans se aeris succus. Vinamq. esset & purus ac liquidus, & suæ naturæ, qualis defluit primo: nunc verò è tanta cadens altitudine, multumq. dum venit, sordescens, & obvia terre balitu infectus; præterea è fronde ac pabulis potus, & in utriculas congestus apum (ore, enim vomunt) ad hæc*

Descrip-
tio.
Plin. H. H.
l. 11. c. 12.
Arist. H.
A. l. 6. c. 21.
Mercur.
Var. Lect.
l. 2. c. 24.
Columella
R. R. l. 9.
c. 24.

ad hanc succo florū corruptus, & alveis maceratus totiesq; mutatus, magnam tamen naturæ celestis voluptatem affert. Nec abire in diversa alios videbis. Nam Aristoteles, rorem qui cecidit esse, ex eo demonstrat, quod uno & altero die cellas melle repletas inveniant Apiarii, nec, autumno, postq; detractum est, reparetur, quamvis tum flores præstent. Galenus in plantarum foliis oriri, & ejusdem cum rore generis esse; recordariq; æstate copiosum in iisdem repertum, postquam per æstatem, temperiem aëris calidam & siccam, benè frigida nox exceperisset, scripsit. Scilicet, sublatis terra & aquis, solis calore, halitus, exacteque tenuati accoëti, à frigore subsecutæ noctis concreti coaluere. In mōte Libano id persèpè, quotannis accidere ait. Itaq; coria extendunt, & decussum de arboribus excipiunt.

Galen. de Alim. facult. l. 3. c. 39.
Ælian. H. A. l. 15. c. 7.
Seneca E. pist. 64.
 Aelianus denique mel in Media, ex arboribus stillare prodidit, eodemq; in Prassiorum regione in India plueret. In herbarum & palustrium arundinum comas decidens, ovillo & bubulo pecori tā suave epulū, ut suavissimū lacerant. Seneca dubitat inveniantne ipsum in floribus, an succum tantū quendam, quem *spiritus sui proprietate*, ut loquitur, & adhibito quodam veluti fermento, in melleā substantiam densent & coagulent. Et hæc quidem veterum sententia. Ex recentioribus Senecæ Erasmus in suo Ciceroniano subscribit: *Fingunt*, inquit, *ore visceribusq; suis liquorem, ac in ipsas transformatum, rursus ex se gignūt.* Mousetus, Chylum apum in ventriculis earum consummatum vocat, idque vomitione eiici, vix hoc nobis probatur. Excrementum esse quo alimur non potest: observatumque à curiosioribus, ore quidem melleum ex floribus succum colligere, sed non implere ventrem. Onerari duntaxat crura & coxas, in quibus pilorum instar eminentia quædam repagula, ne mel decidat, reduces ad alvearia, distenta crurum & onustas melle coxas habere, à quo, à destinatis huic officio apiculis, exonerentur. Deciduum ex vaporibus humorem seu ro-

rem esse, dubito. Non colligunt summo manè, dum flores roscidi, apiculæ, fervens dies placet: nec versus cælum hiantibus insident, sed versus terram pendulis. Induere se & ad medium penetrare videbis, quo ros qui summa duntaxat folia stringit, pervenire non potuit. Herere intus melleam dulcedinem testantur, quam si leviter suxeris, gustabis. Et cur, si mel deciduum, festucis quoque & stipulis non adhæret? Cur ex certis duntaxat floribus colligitur? Benè ergo Cabeus, certor. florū succum, illumque internum & medullarem, ab apibus, naturæ genio cum aërea humiditate expressum, & qui vegetabile quid potius ac terrenum, dixit. Inde sanè fit, quod pro diversarum regionum genio, diversæ sunt & mellis fortes. Diversum hæc, floribus sal subministrant. Inde quod aquam gravitate superat, & ad eam se ut ro. ad 1. habet: inde, quod arte Chymica dissolutum, maximam partem in terram faceffit: inde, quod suavem quidem sed vehementem saporem, qui salinum & terrestre quid sapit, præ se fert.

De Electione in Differentiis agitur. Electio. Optimum est Galeno, purum, ab omnibus fordibus liberum, pellucidum, flavum, boni odoris, gustu paulū acre, sed suavissimum, & coharēs, ita, ut si attollatur, continuum defluat. Plinius, plenilunio uberius capiscribit, sereno die pinguius. *In omni melle, addit, quod per se fluit, ut mustum oleumq; appellatur acetum, maximè laudabile est, Aptissimum existimatur, è thymo, coloris aurei, saporis gratissimi, quod sit palam doliolis* (ut mel τρυγώδες esse monstrarent, Thymi folia miscebant) *pingue, marino è rore spissum. Quod concretum autem hoc minimè laudatur, Thymosum non coit, & tactu præ tenuia fila mittit: quod primum gravitatis argumentum est.* Acetum quid sit, inter authores non convenit. Alii ἀκντον, ἀγέλατον dicunt, sua sponte fluens. Quidā ἀγρίων legunt, quod statim fluxisset, nec diu in vinaceis, fratribus, favo, jacuisset. Defœcatum & sedimenti expers dixeris. Nonnulli, ut Dalechampius,

Cabeus Mercor. l. 1. textu 50. quest. 3.

Plin. H. N. l. 11. c. 15.

Dalechâp. ad Plin. H.N. l. ii. c. 15. *αὐτὸ δεῖν*, curioso studioſoque nullo labore confectum.

Laert. in Zenone. Veteribus loco ſaccari in opere dulciario erat: hoc, ſaporis, illis quæ actiora, gratia conciliabatur. Erant qui vehementer delectabantur, & vitam credebantur protraxiſſe. Zeno modicè eo cum pane utebatur. Pythagoram ſolo ſive favo, & pane eodem contentum, quidā autumant.

Athen. Diſpoſ. l. 2. Democritus in annum centeſimum & nonum ſati diem diſtulit, quod eo oblectaretur, creditur. Idem mellis odore vitam per Theſmophoria produxiſſe putatur: ſed Ficinus, vino liquefactum albo calentibus panibus infuſiſſe opinatus eſt. De Pol-

Plin. H.N. l. 23. c. 24. lione ita Plinius. *Corpora auget. Multi ſenectam longā mulſi tantum nutritu tolerare, neq̃ alio ullo cibo, celebri Pollionis Romuli exemplo. Centeſimum annum excedentem, cum Divus Auguſtus hoſtes interrogavit, quam maximè ratione vigorem illum animi corporiſq̃ cuſtodiret. At ille reſpondit, intus mulſo, foris oleo.* Apud Lacædemonios initium cœnæ fuit; ſed & in ſecundis menſis apponebatur. Placentæ quæ ex eo parabantur, mellita, pyramuntæ, & itria dicebantur. Illa in cœnis quas Nero familiaribus indicebat, quadragieſtertertium conſtabant. Pyramuntæ ex tritico & melle conſtabant: Itria, ex eodem & farina conficiebātur. Mel-

Varro R. R. l. 3. c. 16.

Tzetzes Chiliad 13. l. 478.

Apul. Miſell. l. 10.

Hippocr. l. de Affectib.

lita ſcitamenta Apulejus vocavit. Quantum alimenti corporibus largiatur, non convenit inter authores. Hippocrates, per ſe, attenuare magis & per urinam plus juſto purgare; cum aliis ſumptum, nutrire & bonum colorem conciliare dixit. Celſus inter valentiſſima reponit. Dulcedine illectas partes, plus ad ſe nutrimenti rapere, retinere, & in ſimile ſibi convertere, veriſimile. Senib. commendatur. Annoſi, Antiochus Medicus, & Telephus Grammaticus ſenes: iidem Attico melle ſæpius cocto pane vel alica excepto veſcebantur. Acrimoniam amittit, ſi aqua diluatur, ac coquatur donec ſpumare deſinat, ſpuma aſſiduò deterſa. Urinam ſic paratum tollit, & ſputa craſſa incidit. Edulii illud genus quod Cocetum Fe-

ſtus vocat, ex melle & papavere conſtabat. Paratur ex eodem *mulſum, medo, melomelites & vinum*. Mulſi frequēs apud antiquos mentio: nomen à mulcendo, quod vini auſteritas ejus dulcedine molliatur. Plinius Ariſtæum Thracium primum inveniſſe tradit: quidam cum oinomelite idem cenſent. Sed Ulpianus dulciſſimo vino idem tribuit. Ex vino & melle parabatur, ex vetere utiliſſimum, & quod facilè cum melle concorporatur, ex auſtero, Maſſico inprimis, & mons Gauranus, in Puteolor. Baja- jarumque proſpectu fundit, nobile. Craſſum & turbidum olim fuiſſe, ex Horatio colligit Mercurialis. Duæ partes uni mellis affunduntur. Aliqui, quo celerius præberi poſſit, una coquunt, & transfundunt: Alii, utilitatis gratia, ad ſex muſti fervētis ſextarios, unum mellis adji- ciunt, & poſtquam deferbuere recondunt. Adji- ciebantur & aromatica, folia mala- bathri, myrrha, caſia, coſtus, nardus, de quibus authorem Geoponicor. conſule. *Medo* Septentrionalium potus eſt, aliquando tam nobilis, ut nō niſi lautioribus menſis apponatur. Laudatiſſimus Covenſis. Moris & aromatibus condire. Per totam ferè Europam devehitur. Idem cum medone *μελίτειον*, (malè apud Ethymologum *μελίγειον*, in vulgatis quibusdam lexicis *μέλιγμον* legitur) dicerè, quod *σκήθικον πόμαλον* *ὄν ὕδαλι ἐφάρμakon* Helychius explicet, niſi & herba accederet. Cum illo convenit, quod *μέλι κόκκος* Athenæus vocat, quodque ex vino, melle, & herbis variis conficiebatur. Cambris nunc *Metheglin*, Hibernis *Vsbebach* dicitur. *Vina* ex melle redolere, Illyriis quos Taulātinus vocabant, olim fuerit. Favus aqua ſuperfuſa exprimebatur, ac ſimul ahe-

Geopon. l. c. 24. Plin. H.N. l. 22. c. 24.

Martial. l. 2.

Mercur. variar. l. 2. c. 17. Dioſcor. M. M. l. 5. c. 16.

Helychius in Lexico.

Ariſtot. in mirab. auſcult.

Plin. H.N. l. 14. c. 17.

cium,

ciunt, deinde quadraginta dieb. Canis ortu in sole habent. Aly diffusa ita, decima die obturant. Hoc vocato Hydromeli, & vetustate saporem vini assequitur, nunquam laudatius quam in Phrygia. Dioscorides ex duabus mensuris aquæ coctæ, & sub Caniculæ sydus insolatæ, ac melomelitis ex cotoneis facti unâ componit. Plutarchus ante vinum inventum, propinatum fuisse scribit. Melomeli quod & Cydonites, quomodo fiat, apud Geoponicorum authorem qui id Hydromelum vocat, habemus, quomodo ex melle vinum, apud Portam. Est & Melitites vinum; quod adjecto ad quinque congios austeri multi mellis congio, & salis cyatho, paratur. Seculis jam fieri non arbitror hoc genus inflationis, obnoxium, inquit Plinius. Dodram quoque genus potionis apud Ausonium, à dodrante novem unciarum mensurâ ita dictâ, ingrediebatur mel, cum jure, aqua, vino, pane, pipere, herba, oleo, & sale. Eodem, puritas vini probatur, si cum lacte infuderis.

Ad lapideam duritiem decoctum, & pulverizatum ex albo rubellum reddit, si transuasando misceatur. Mellina Plauti in Pseudolo Hydromeli est. Descriptiones & compositiones, Galeni, Aeginetæ, Plinij, Dioscoridis, Anglorum, qui hordeum torrefactum adjiciunt, & Moscovitarum apud Moufeturum vide; Mauritano- rum apud Aldrovandum.

Auxit & Medicorum contra morbos remedia. Nec hoc tantum Mulsum Hydromeli, seu melicratum, & ἐμυλνός, apomeli, clionomeli, Thalassomeli, Omphacomei, & Oxymeli helleboratum in usum deduximus: spiritum, oleum, & quintam essentiam his adde. Mellis quidem ipsius natura talis est, ut putrescere corpora non sinat, jucundo sapore atque non aspero, alia quam salis natura. Ideo Democritus melle condiri iussit: sicque Alexandri & Agesipolidis, nec non Agesilai corpora conservata, à Statio Papinio, Xenophonte, & Diodoro Siculo proditum, Hybleo inquit ille, perfusus nec stare durat. Hippocœtaurum in Thesaliâ natum eodemque die denatum, principatu Claudii Cæsaris in melle

ex Ægypto adlatum, Plinius vidit. Faucibus, tonsillis, angine, omnibusque oris desiderijs utilissimum est, arescentique in febribus linguæ. Jam verò peripneumonicis, pleuriticis decoctum, item vulneribus à serpente percussis. Et contra venena fungorum. Auribus sonantibus instillatur cum rosaceo, lendes & fœda capitis animantia necat. Dysentericis & cæliacis, medetur, in quo sint immortuæ apes decoctum. Tale & oculis utilissimum. Usus despumati semper aptior: stomachum tamen inflat, bilem auget, fastidium creat, alioqui oculorum angulos melle tangi suadent. Eadem apud Dioscoridem invenies. Hippocrates in secunda pleuritidis specie favum in aqua maceratum; in casu ex alto, cremorem eius decoctum, præscribit: in convululo lingere iubet. Ex apibus quæ in tumulo eius mellificabant, collectum, ulcusculis oris puerorum medebatur. Cum fructu etiam in dentitione cum butyro gingivis inunctum; in visus hebetudine & albugine cum primo infantis stercore subactum; in faucium dolore, cum agresti papavere permixtum; in lienis, demortuis apibus appositum; in dysenteria & cæliaca cum apib. vel caseo recenti coctum; testibus frigidis, cum resina temperatum; adhibetur. Cum nitro & lacte bubulo ulcera faciei sanat: cum corii bubuli cinere, phagædenas & panos curat: spuma cum oleo iuglandium, adustionem cutis emendat. Hollerius inter Diaphoretica retulit. Cum lenticula cocta, & contrita, vel myrtifoliis viridibus, vel galla, reduvia, manuum in primis prodest. Id apud Oribasium, hoc apud Priscianum legitur. A Nicandro contra Opium laudatur: ab Ovidio, cum ovis & pineis nucibus ad ciendam venerem. Celsus coctum inter alvum stringentia numerat, quod coquendo, acrimonia alvum ciens detrahatur. Minui & alimenti virtutem, addere poteris.

Aquæ mulsæ duo sunt genera, subita ac recentis, alterum inveterata & condita, & conditæ, quod propriè Hy-

Plin. H. N. l. 7. c. 3.

Plin. H. N. l. 22. c. 24.

Plin. H. N. l. 30. c. ult.

Plin. H. N. l. 29. c. ult.

Dioscor. l. 2. c. 102.

Plin. H. N. l. 30. c. 4.

Oribas. Synop. l. 7. c. 18
Prisc. Em-
porist. l. 1. c. 34.

Plin. H. N.
l. 22. c. 24.

dromeli dicitur, *Repentina*, inquit Plinius, *de spumato melle præclaram utilitatem habet, in cibo egrotantium levi, hoc est, alicæ elute, viribus recreandis, ore stomachoq; mulcendo, ardore refrigerando. Frigidam enim utilius dari ventri molliendo, invenio apud auctores. Hunc potum bibendum alsiosus: item animi humilis & præparci, quos illi dixere micropsychos. (τὰς δὲ ψυχὰς μικροψυχὰς) μικροψυχὰς, qui immodico sudore diffluunt, & languidum pulsum habent, intelligit.) Est & ratio subtilitatis immensa à Plutone descendens: corpusculis rerum levibus, scabris, angulosis, rotundis, magis, aut minus, ad aliorum naturam accedentibus: Ideo non eadem omnibus amara aut dulcia esse. Sic & in lassitudine proniores esse ad iracundiam, & in siti. Ergo & hæc animi asperitas, seu potius animæ, dulciore succo mitigatur. Lenit transitum spiritus, & molliores facit meatus, ne scindant eum redeuntemq;. Experimenta in se cuique: nullius non ira luctusque tristitia & omnis animi impetus cibo molliitur. Ideoq; observanda sunt, quæ non solum corporum medicinam, sed & morum habent. Aqua mulsæ & tussientibus utilis traditur, calefacta invitat vomitiones. Contra venenum psimythij salutaris addito oleo. Item contra hyoscyamum, cum lacte maxime asinino, & contra halicacabum, ut diximus. Infunditur & auribus & genitalium fistulis. Vulvis imponitur cum pane molli. subitis timoribus, luxatis, leniendisque omnibus. In veterata usum damnavere posteri, minus innocentem aqua, minusque vino firmum. Longâ tamen vetustate transit in vinum, ut constat inter omnes stomacho inutilissimum, nervisq; contrarium. Semper mulsim ex vetere vino utilissimum, faciliusq; cum melle incorporatur, quod in dulci nunquam evenit. Ex austero factum, non implet stomachum, neq; ex decocto melle, minusq; inflat, quod fere evenit. Appetendi quoq; revocat aviditatem cibi. Alvum mollit frigido potu, pluribus calido sistit. Eadem apud Dioscoridem habentur. Idem & ὀξύλευκός, præstat.*

Plin. H. N.
22. c. 24.

Mulsim ex austero vino factum, non implet stomachum, neq; ex decocto melle, minusq; inflat, quod fere evenit. Appetendi quoq; revocat

aviditatem cibi. Alvum mollit frigido potu, calido sistit. Corpora auget. Varro regium cognominatum morbum arquatam tradit, quoniam multo curetur. *Apomeli*, quod ex melle ex favis niveo candore splendentibus cum aqua fontis, prout ab Actio traditur, decoquebatur, deterget & digerit, urinas ciet, calidioribus naturis inimicum. Confert & ad educendum spiritum. *Chionomeli* cum nive & cum melle cōmixta fiebat, & in febrib. propinabatur. De *Omphacomeli*, quod succo uvæ immaturæ & melle fit nihil singulare occurrit. *Thalassomeli* ex æquis partib. maris, pluvie, & mellis defæcatis, & in picato vase per canis æstum insolatis paratur. Sapore & odore gratum est, clementerq; purgat. *Oxymelitis*, variæ apud authores sunt descriptiones; quas apud Aldrovandum vide. Sumpit humores crassos attenuat; ischiade & arthritide laborantib. prodest: in angina utiliter gargarizatur. De *Scyllitico* oxymelite consule Medicos. *Helleboratum* Gesnero debemus, cuius encomia in epistola ad Occonem persequitur.

Spiritus, qui per retortam exit, & vel albus vel flavus est (aquam quoq; vocant) effusiones & albugines oculorum sanat, & ad capillos producos adhibetur. *Oleum* quod instar aquæ vitæ ardet, si cum spiritu vini circuletur, gratissimi saporis evadit, & non tantum sclopetariis vulnerib. & phagedænicis ulceribus convenit: sed & dolores podagricos vehementer mitigat: maculasq; faciei cum oleo Camphoræ discutit. Componitur & cum vitriolo calcinato. *Acetum* ex cocto cum aqua fluviali & femine erucæ, quod duntaxat in petra suspenditur, destillatur. Solvit filices, reliquosque lapides: nec est quod calcinatione præmittas. *Quinta essentia* quæ sale ex fæcibus propriis incineratis acuitur, in colica, calculo renum &c. remedium creditur paratissimum. De *Elixire*, quod Doctissimus Schröderus describit, taceo.

Non permittere ut corpora putrescant, superius ex Plinio dictum: Babylon,

Hartman.
in Crol.

Agric. in
Poppium T.
2. p. 973.

Schrod.
Pharma-
cop. 5. p. 316.

Hierodot. in Thalia. byloniosq; in melle cadavera servasse dici debuit. Nunc de *purpuris*, *antidotis*, & *arborum surculis* aliqua adjicere placet. *Purpuræ* *Hermionica*;

compositæ quidem ante centum novaginta annos, sed *ἡ πρόσφατος τὸ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς καὶ ἑξαγώντος*, recentem adhuc *florem* & *novum servantis*, quinque millia talentum;

Plutarch. in Alexand. Aro M. captis ab Alexandro Sufis inventa fuisse; *Plutarchus* author est.

De *purpuris* hoc cum succo in massam redactis, vel flore, qui *Vitruvio* ostium, cum *vaginula* sola, intellige: talentum de pondere potius quam precio sumendum est, *Durationis* causa, mel, in quo massæ *punicæ* arum immergebantur. *Theriace* & aliis antidotis haud frustra admiscetur. *Cōservata*; & excipit. *Lentori*, consistentia debetur, & ne ambiens aer exhauriat. *Servari* in melle *surculos*, nec quicquam propagationi decedere, apud *Cardanum* habemus: *Scaliger* eo multa servari, multa vitari reponit. Ille mellis humido quod tenue, dulce, temperatum, non pingue; nec putredini obnoxium adscribit. Hic *juglandis* naturam in eo incorruptam propter oleositatem servari; *ficus*, *perfica*, *pyra*, tabo fluida fieri, asserit. *Tactum* a pane corrumpitur; & in formicas similiaque animalcula abit. *Fugitivo* denique & exanimi vino vitam reddit; suetum cœnopolis *mangonium*.

Differētiæ. *Differētiæ* mellis sunt variae. *Substantiam* si spectes, habetur *Aerium*, *Terreum*, *Anthinum*, *Galbanarium*, *Thymosinum*; *Cerosum*, adulteratum. *Aëreum*. Mense enim *Majo*, *Junio* & *Julio*; ambrosia quædam cœlestis, liquida; pura, suavissima; plantarum foliis illabitur, ut vulgò creditur: hanc collectam & imbibitam apes in alvearia deferunt. *Initio* dilutum est, ut aqua, & primis diebus fervet, ut mustum, seque purgat: vicesimo die crassescit, mox obducitur tenui membrana, quæ fervoris ipsius spuma concrevit: *Terreum* rore abeunte ex terræ ipsius sudore, & plantarum dulci parte exugitur, densioris substantiæ, totque differentias, quot plantæ sunt ex quibus detrahitur;

fortitur. De *Anthino* inferius dicemus. *Galbanario* nomen *Aphrodisiensis* imposuit, a pastu apum, quem *galbana* vitiant. Prodest ad oculorum claritatem. *Thymosinum* non coit, & tactu prætenuia fila mittit: quod primum gravitatis argumentum est. Si planè thymum redolet, consummatum ne dicas: quanquam venditores ab injecto laudem conciliare soleant. *Cerosum* crassius est, & in quo crassitudines quædam innatant. Adde hinc *Bithymum*, quod ex utroque thymo; albo & nigro paratur, oculis & ulceribus aptissimum.

Loci ratione est; *Sylvestre*, *Domeficum*, *Atticum*, *Cycladicum*, *Siculum*, *Cappadocium*, *Scythicum*, *Samogitium*, *Cephalonicum*, *Creticum*, *Cnidium*, *Mygium*, *Halizonum*, *Thracium*, *Lydium*, *Aegyptium*, *Medicum*, *Hyrcanum*; ut alias regiones taceam. De *Sylvestri* insequentibus agitur, *Atticum*, quod & *Hymettium*, id in primis, quod in *argentifodinis* fit; primas inter optima obtinuit. Optima quippe ibi apum indoles, & terra thymo & alijs floribus luxuriat. Vidit *Bauhini* *Veronæ* in *pharmacopolio*, illudque in vesica elephantis valde crassa; pondere librarum XXI. longitudine duorum cubitorum, latitudinis sesqui cubiti invenit. Ex *Africa* allatum fuisse verisimile est. *Cycladico* secundas *Dioscorides* tribuit. *Urbanum* & jucundum est. *Siculo* seu *Hyblaëo* tertiæ debentur. In *Cappadocia* sine favis conficitur, & perinde ut oleum crassum est. In *Scythia* quoque & *Samogitia* laudatissimum habetur: seu quod flores sint meliores, perflato a septentrionali vento aere: seu quod ibi robustiores vivant; & mel diligentius elaborent. Ex *Cephalonia* summæ bonitatis & saccaro suavius devehit, *Cardanus* auctor est; ut *Aphrodisiensis* in insulis & littoralibus optimum esse putat. De *Cretico* ita *Plinius*. Aliud in *Creta* miraculum mellis: *Mons est Carina* I X. millium passuum ambitu: intra quod spacium muscæ non reperiuntur: natumque ibi mel nusquam attingunt. Hoc experimento singulare medicamenti eligitur. E *Cnido* adve-

Alex. Aph. 2 probl. 74.

Plin. H. N. 11. c. 16.

Eliah. H. A. 5. c. 42.

Cardan. de var. Res. 6. c. 25.

Plin. H. N. 21. c. 14.

advekturi, Thasio & Hymettio proximum est. Ubi consenuit, vini conditiones assumit. De Mysio hæc apud Galenum occurrunt. *Nostre*, Galen. 1. de Antid. c. 4. inquit, in Asia, collis quidam inter Pergamum & Eleam urbem maritimam porrigitur, thymoscatens, in quo Apes optimum mel reponunt quod ibidem totum absuntur. In Mysia quoque, quæ parte nostre provincie finitima est, tractus occurrit, quem Britum appellant, in quo mel Attico simile penitus, magnâ cum admiratione conspexi, quanquam deteriora quoque mella ibi proveniant. Exibat ibi quoque monticulus quidam non magnus, saxosus totus thymo atque origano plenus, ad cujus radices agricythis plurimo abundabant. Ex eo, collis dominus mel usque adeo dulce colligebat, ut in hac parte, Atticum etiam superaret: ac retamen ut Atticum non erat: idcirco statim nauseam gustantibus excitabat. Apud Halizones ita concretum est, ut à cera sejungere nequeas. Thracicum, arenosum erat. In Lydia ex arboribus colligitur. Incolæ pastillos absque cera tantâ duritie conficiunt, ut nisi vehementiore attritu nihil inde demi possit. Aegyptium dilutum est, quod flores illius tractus, nimia Nili irrigatione humescant. In Hyrcania multo folia tinguntur. Extinguitur, nisi ortum solis colligentis præverterint, si Curtio credimus. In Medea ex arboribus stillat. Ad Amisum denique prodente Aristotele, convehitur à superioribus locis candidum, crassumque, quod apes in arboribus sine favo, quod & in Ponto fieri notum, faciunt. Brevissimè ista complexus est Plinius. Summa quidem bonitatis ratione constat, pluribus modis. Alicubi enim favi cera spectabiles gignuntur, ut in Pelignis, Sicilia: alicubi mellis copia, ut in Creta, Cypro, Africa: alicubi magnitudine, ut in Septentrionalibus, visio jam in Germania octo pedum, favo, in cava parte nigro.

Sumptas à Tempore colligendi differentias recenset eleganter Plinius. In quocunque, inquit, tractu terna sunt mellis genera. Vernum ex floribus constructo favo, quod ideo vocatur anthinum. Hoc quidam attingi vetant, ut lar-

go alimento valida exeat soboles. Alij ex nullo minus apibus relinquunt, quoniam magna sequatur ubertas, magnorum syderum, (Sirii, Caniculæ, Arcturi) exortu. Præterea solstitio cum thymum & uva florere incipiunt, præcipua cellarum materia. Alterum genus est mellis æstivi, quod ideo vocatur horæum, à tempestivitate præcipua, ipso Sirio exsplendescente, post solstitium diebus XXX. ferè. Immensa circa hoc subtilitas naturæ, mortalibus patefacta est, nisi fraus hominum cuncta perniciem corrumpere. Namque ab exortu syderis cujuscunque, sed nobilium maximè, aut cælestis arcus, (de hoc loco consule Marfilium Cagnatum) si non sequantur imbres, sed ros tepe scat, solis radiis, medicamenta non mella gignuntur, oculis, ulceribus internisque visceribus dona cælestia. Quod si servetur hoc, Sirio exorientem, casusque congruat in eundem diem, ut sæpe, Veneris, aut Iovis, Mercurijque exortus, non alia suavitas visque, mortalium malis à morte vocandis, quam divini nectaris fiat. Rutilum omne tale, ut diebus confectum siccioribus. Aestivâ mellatione decimam partem Thasio Dionysio apibus relinqui placet, si pleni fuerint abvei: sin minus, pro rata portione: aut si inanes, omnino non attingi. Huic vindemiæ Attici signum dedere initium, Caprificalem diem Vulcano sacrum. (Incidebat is in Nonas Julij, quæ & Caprotinæ & vulgi fuga vocabantur.) Tertiū genus mellis minimè probatum, sylvestre, quod ericæum vocant. Convehitur post primos autumnii imbres, cum erice sola floret in sylvis, ob id arenoso simile. Athenienses tetralicem appellant, Eubæa sisaram, quam putant apibus esse gratissimam, fortassis quia nullius tunc alius sit copia. Hæc mellatio sine vindemiæ & Virgilij occasu, Idib. Novembris ferè includitur. Relinqui ex ea duas partes apibus ratio persuadet, & semper eas partes favorum que habent erithacen.

Dantur & à Qualitatibus differentie, Plin. H. N. Laudatissimum existimatur è thymo, coloris aurei, saporis gratissimi, quod fit palam doliolis, pingue, marino è rore spissum. Tale nascitur, ubi thymus, cunicula, origanum, violæ, &c. pullulare solent, ut in Achajæ montibus, Hybla, Himetto, & aliis, fieri solet. Tale odoratum, ex dulci acre, glutin-

Galen. 1. de Antid. c. 4.

Pausan. in Atticis.

Aphrodis. 2. Probl. 74

Mela 3. de situ orbis.

Plin. H. N. 11. c. 14.

Plin. H. N. 11. c. 15.


Plin. H. N. 11. c. 16.

Plin. H. N. 11. c. 15.



Apiarium
Bienenstock

Cera Seu fauus . Honigstöck
Fau9

Bienen Korb





Vespetum Wespenneft



Vespetum Wespenneft




Hörmus
Nest







Wespenstock

Wespenstock

Hörmusstock



Hummelstock



glutinosum, perlucidum, quod minimum spumæ vomit. Tale Cretensib. Acramaumorion, Cypriis Chytrii, Cois Calaminium. Tale, si Moufetur sequimur, pingue, lentum glutinosum, grave (unde in fundo optimum) αὐτόχρονον, clarissimi therebinthini liquoris æmulum, sui ubique simile, & vel nullis vel saltem paucissimis fœcibus impuratum, blandissimo calore liquefactum, & levissimo frigore quasi in lapillos concretum. Tale denique quod Strabo in Attica ad argentarias gigni, & ἀκρόπτησον vocari scribit. *Malum* est, quod vel iusto crassius, vel iusto tenuius, vel diversarum partium est; quod thymum plane redolet; multam spumam egerit. Tale quod quia ex custodia computruit, male olet: quia è cicuta contagium contraxit, graviter; quia acre, naves odore ferit: quia sub vappa vapulat, nihil olet. *Venenatum* in Ponto ex argolethro Dioscoridi, ex Rhododendri floribus Plinio; ex Aconito Aëtio, testibus, colligitur. In Carina, Perside, Mauritania & Gertia, vel ob terræ halitus, vel virulentos succos tale evadit: livore deprehenditur. Apud Macronas insaniosum prodente Xenophonte, habetur. Nec stare quidem poterant, qui eo vesciebantur. In Heptacomitarum urbe contagiosum, & quod stupidos redderet, Strabo reliquit. In Corsica ex cicuta, Ovidius: in Trapezunto Pontica ex buxi florib. gravis odoris, sed quod insaniam curaret, Ælianus. Cognoscitur, si non omnino densatur, rutilum est, alieno odore, & ad nigredinem vergit. Duostali melle gustato in foro Romano obiisse, apud Galenum habemus. In Troglodyticæ parte quæ Balgada dicitur, adeò *Candidum* est, ut nenivibus quidem cedat; durum quasi lapis, solidum etiam ita, ut sportis contineatur. Meminit talis & Aristoteles, idque ex puro thymo confectum negat. In Tigremahon & Tagodast, Moufetus ponit. *Rutilum* est ericæum. *Nigrum fuscum, spadiceum, & lividum* suspectum esse solet. *Vinosum* apud Galenum habetur. *Ama-*

rum juxta Phasin, & in Ponto. *Eva-* dit & vetustate tale. *Dulcissimum* in Myfia superius diximus. *Fætidum* custodia evadit. Farina milii *adulteratur. Fætidum*, ex nuce Indica, & vulgarib. siliquis, quas Græci κεράνα vocant, paratur, qui Troglodyticam Arabiam incolunt, radices Zingiberis recentes in eo conservant. Mirum verò quod Eudoxus Cnidius apud Apollonium refert, Gyzanteres Africæ supra Sirtin & Carthaginem gentem, apum more flores colligere, & mellificium exercere, felicitate pari. Diodorus Siculus mellis faciendi rationem Curetes primos invenisse author est.

APPENDIX II.

De Cera.

CERÆ nomen à Græcis sumptum Nomen: est, κηρός his dicitur, seu à κεραινεν, quod curare est, ut Isidoro placet, seu à κεραινεν ραδίως quod favis ignis calore liquatis fiat; seu ab Arabico كير quod ceram Arabibus, ut murum seu parietem Ebræis significat. Et certè favorum ceræ sunt ut parietes, intra quos μελισσωνέες, liquidum mel stipatur. Dicitur & μάλθη Galeho teste, quod vocabulum quidam emollitæ tantum attribuunt. Potest tamen & duræ imponi.

Ex lachryma arborum ab Apibus confici, Aristot. prodidit. Ex omnium arbor. factorumq; florib. confingi Plin. rumice & echinopode, seu equinopode, (quidam tribulum, alii echion, nonnulli spinæ quoddam genus intelligunt) excepta. Addit. *Falso excipitur & spartum*, (genista, iisdem locis quib. & juncus sterilis nascens) quippe cum in Hispania multa in spartariis mel-la herbam eam sapiunt. *Falso & oleas excipi arbitror*, (alibi verum id esse affirmat) quippe olivæ proventus plurima examina gigni certum est. De Lampfana apud Columellam habemus. Modus elaborandi apud Aristotelem extat. Perreptant flores primum primis pedibus, quos leviter affingunt; tum in medios sese abstergunt, & affricant: tandem verò tincturam florum aqua

D

vel

Strab. l. 1.
de Insect.
p. 28.

Strab. Geogr. l. 9.

Xenoph. de
Cyri exped.
l. 4.

Strab. l. 12.

Strab. l. 12.

Strab. l. 12.

Strab.
Geogr. l. 12.

Arist. H. A.
l. 3. c. 21.
Descriptio

Plin. H. N.
l. 11. c. 8.

Plin. H. N.
l. 21. c. 12.

Arist. H. A.
l. 9. c. 40.

vel saliva sua laboratam, & compactam, in cruscula posteriorum pedum dextrè & celeriter deponunt, & magnitudine formaque lentis collectam, onustæ ad proprios lares redeunt, ut Moufetus exponit: Quomodo exprimitur Columella exposuit. *Expresse, inquit, favorum reliquia, posteaquam diligenter aqua dulci perlutæ sunt, in vas æneum conficiuntur: adjecta deinde aqua liquantur ignibus; quod ubi factum cera per stramenta & juncos defusa colatur, atque iterum similiter de integro coquitur, & in quas quisque voluit formas, aqua prius adjecta defunditur.* Brevius ita Plinius. *Cera fit expressis favis, sed ante purificatis aqua, & triduo in tenebris siccatis, 4. die liquatis igni in novo fictili, aqua favos tegente, tunc sporta colatis. Rursus in eadem olla coquitur cera cum eadem aqua, excipiturque alia frigida, vas melle circumlitis.*

Locus.

De Loco non est quod multa dicamus. Habetur ubi & apes. Corsis olim tam copiosa, ut Romanis tributi loco centum millia, (ducenta posuit Livius) pondus persolverint. Ex Russia & Moscovia in universam ferè Europam deferitur. Ad Mombazzæ urbem ingens eiusdem vis. Livones olim purgamenti instar reiecessit, à Crantzio proditum. Eiusdem usum & flavii Senegæ accolæ ignorant.

Crantz.
Vand. 16.
c. 9.

Naturæ.

Ad Naturam spectat, quod calore Solis candefiat, cum caro nigrescat: quod coacta opaca sit, liquida pellucescat: quod facile calore emolliatur; & denique, quod cum oleo facillimè, cum vino & aqua difficulter confundatur. Causas in Aldrovand. vide.

Usum nobis præstat eximium, in Medicina, scribendo, pingendo, sigillando, imaginibus, conglutinando, lucem præbendo, & aliis. In medio quodammodo est calefacientium, refrigerantium, humectantium & siccantium. Habet aliquid emplastici & crassarum partium, ut Galenus scribit. Ideo reliquorum medicamentorum materia efficitur, et ad emplastrorum, & ceratorum compositionem adhibetur. Præberetur dyfentericis cum pomo asfato. Nervis & tendonibus denudatis

Galen. de
simp. l. 7.

applicatur. Linteo in cera intincto, & calidissime appposito, juncturarum ex frigore dolores tolluntur. In Ictero cum ovi vitello ad duritiem cocto, aliquot granis croci, & syrupo absynthii, pillulæ ex eadem laudatissimæ. Valde sitim excitant. Dat & oleum, in diuresi, & tumorum emolitione eximium, cuius præparationem apud Chymicos vide. De Adulteratione & Coloratione alibi dicitur, sic & de aliis usibus.

Genera ceræ dantur aliquot. Est Differentiæ.

Nativa, est & Factitia. Habuit Aldrovandus Indicam, colore flavo, viridi, rubro, & nigro, lapideæ prorsus duritiei, quam ex lacca conficiat Acofta discimus. Laudatissima est recens, subpinguis, pura, odorata, halitum mellis referens; Pontica aut Cretica.

Diosc. M. M.
2. c. 76.

Pontica, si Galenum sequimur ob flores absynthii amara est. Plinio optima quæ Punica dicitur, (candidissimam omnium Dalechampsius facit) proxima quam maxime fulva, odoris æmellei, (hinc Cicero, unguentâ gratiora esse quæ ceram quam quæ crocum redolent, scripsit. Sic omnino legendum, non terram) pura, natione Pontica, quam constare, addit, equidem miror inter venenata mella. Deinde Cretica, plurimum enim ex propoli habet. Post has Corsica, quoniam ex buxo fit, habere quandam vim medicaminis putatur. Alba, seu candida, quam quidam virgineam vocant, quomodo fiat Dioscorides & Plinius prodidere. Ventilatur, inquit hic, sub dio sæpe cerâ fulva. Deinde fervet in aqua marina ex alto petita, addito nitro. Inde ligulis hauriunt florem, id est, candidissimamque, transfunduntque in vas quod exiguum frigido habeat. Et rursus marina decoquunt separatim: dein vas ipsum refrigerant. Et cum hæc ter fecere, juncea crate, sub dio siccant Sole Lunaque: hæc enim candorem facit. Siccantes, ne liquefaciant, protegunt tenui linteo. Candidissima vero fit post insolationem etiam incocta. Scilicet. Tollitur ita à cera mel, eæque partes exspirant, quarum tenuitate color conficitur.

Plin. H. N.
l. 21. c. 14.

Plin. l. 6.

mel ab igne, inquit Scaliger. Venetiis candidissima habetur. Talis & Tarentina fuit. Adulteratur therebinthina.

Scal. Ex.
325. 12.

binthina. Inalbescit & tractando. Vnde *ακτινὸς κηρὸς λευκοτάτης* Actio dicitur; & *πρακταί* Phavorino inallescere. Sed & *καπυέδια* tractadicuntur, quod manib. tractata albescant. Medicis utilissima est, & commendatur à Paulo ad psoram. Vsurpatur & ad excipiendos pulveres in masticatoriis, & quidem factitia, qualis Tyrhenica fuit. Convenit renib. inflammationis. Paulus *λευκὸς προποκτός* meminit. Flava ob aëream ex melle naturam magis emollit, relaxat, & dolorem solvit. Frequentius liquefacta terrestrem naturam contrahit. Ideo recens & nova adhibenda, *Virginem* vocat Hollerius, à juvene Apum populo elaborata. Actuarius propolia esse dicit. Commendatur ab eodem in ceratis. *Viridis* in Ægyptiacis numerat inter medicamenta purgantia Hollerius, vel mollita oleo imponitur. *Nigrescit* cera, addito chartarum cinere sicut anchusa admista, *rubet*. Colligitur tamen & in Moluccis insulis & America naturaliter nigra. Mirum quod scribit Aristoteles tepesfacta junior. boum cornua in cera flecti: nec sentire dolorem pedum, si ea inungantur.

Addere aliquid de Propoli & Erythace placet. Illa dicitur quasi *suburbana*, quod præ forib. alvei ab apibus ædificetur. Græcis aliàs *σμήνιον*, *σαμυδὶς* & *αἰγυεῖ*. Scribonius pro cera virginea accepit: pro fæce alvearium Sylvaticus. Bellunenensis sorditiem parietum vocat, & pro Bdellio adhiberi. Nonnulli ab arborib. stillare contendunt, alii primum esse favum: Dicere, crassio rem quandam esse materiam, inter commosin, quæ Aristoteli *Μίτῃς*, *μιασμένη* & ceram mediam, flavescentem, odoratam, styracem referentem, & in mastiches modum ductilem. Cordus apud Moufetum, lachrymam esse, arborum gemmantium oculis innascentem scribit. Collectam, circa vestibulum alveorum ab apib. suspendi, contra iniurias frigoris munimentum. Quatuor eius facit species. *Prima* è nigra tantum populo colligitur. Ægyrinam vocant. Tractatu est mollis, visci instar, colore

flavo, odore iucundo, somnifero, & styracis æmulo: sapore populneis gemmis respondente. *Secunda*, ex betula, eandem redolet, colore inter flavum, cinereum & subviridem medio, ductilis. *Tertia* ex Alpinae populi lachrymis colligitur, eaque rara. *Quarta*, ex his omnibus eaque mixta. Defitum jam est ea uti. Apiarii exemptis favis confundunt: & cera, quæ Avic. *Mum nigrū*, nihil aliud est quàm quoddam post decoctam ceram fundum petens sedimentum. Resolvitur oleo veluti cera, sed præponderat, & fundo illabitur. Syncera & odoratissima optima. Fusione in aquam facile à cera seiungitur. *Cretica* & Passidica, quod maior illius pars à styracis & ladani pinguedine colligatur. *Vsum* si spectes vitiosam materiam ex alto elicit. Celso inter anatomica recensetur. Aëtio calefacit, discutit, maturat, extergit. Varro propter multiplicem usum, multo carius in sacra via, quàm mel ipsum venditam scribit. Inde fortè *Cera sancta* apud Lar-
gum nomen. Veteri tussi suffitu prodest. Guttam rosaceam ex aqua tollit: impetigines illita extirpat, & ad plurima prodest.

Erithacæ Aristoteles *Sandarachæ* Erithacæ & *Smerion*, alii *Cerinthum* vocant. Dotti-
oribus est *Vernilago*, quibusdam à tempestate *Vernix*. Rusticis Lombardis, apud Niphum. *Carbina*. Diximus de eo ex Plinio supra. Varro gluten esse vult, quo favos extremos apes inter se compingunt. Mira ei vis elicendi examina. Vbi volunt examen confidere, ramum erithacæ, addito apiastro, oblinunt. Virgilius *gluten* vocat.

CAPUT II.

De Fucis.

Fucus à fuco, seu quod sit fucata Nomen. Apis; seu quod fucum faciat, & prætextu alvearia calefaciendi, melificia absumat, dictus videtur. Αφαγῆμαι qui deducunt, audaces nimis sunt: ut & illi qui à furando, quamvis verum sit furari. Græcis est *κηφὴν* &

Holler. In-
fir. Chir.
l. 6. c. 7.
Plin. H. N.
l. 21. c. 14.
Arist. H. A.
l. 8. c. 7.

Propolis.

Moufet.
Theatr.
Insect. l. 1.
c. 6.

Erithacæ.
Arist. de
plant. l. 2.

Aldr. Hist.
Insect. l. 1. c. 5.

θεῶναξ. κόβας & epitheton est, ὅτι τὸ κενθεῖν τὴν ἑαυτῶν ὄραν, quod aculeum, ut aliæ apes non exerat.

Descriptio
Colum. R. R.
l. 9. c. 15.
Plin. H. N.
l. 11. c. 17. Columella eos genus amplioris in-cremēti appellat, simillimum apum, atque inter gregalia animalcula col-locat. Plinio sunt sine aculeo, velut

imperfectæ apes novissimæque, à fessis ac jam emeritis inchoatæ, serotinus fœtus, & quasi servitia verarum. **Aristoteles** quartum genus apum, sed perperam, nec enim mella faciunt, facit. Vulgari ape ferè duplo maior est: imò Regem crassiore & compa-ctiore statura æquat. Duces essent, si aculeo instruerentur. Magnitudo ex vitæ instituto obtigit. Nihil superfluitatum laboribus absimitur; & interdiu & noctu sese liquore melleo ingurgitant. Colore splendente nigricant magis quàm apes. **Qui Fur**, *Arist. H. A.*
l. 9. c. 40.
Plin. H. N.
l. 11. c. 17. Aristoteli φῶρ, Hefychio φάρι & dicitur, minor est. Plin. inter apes grandissimos nominat, nigros, lataque alvo, ita appellatos, quod furtim mella devorent.

Generatio De Generatione, variæ sunt opinio-nes. Ex mûlis putrescentib. nasci prò-didit Idórus, ex asinis Cardanus, ex equis Plutarchus & Servius. Sunt qui aliunde, ex cerinthis, oleæ, vel arun-dinis floribus portari credunt. Alii ex apibus degeneratione quadam fieri existimant, posteaquam aculeos per-didere. Nonnulli has ex fucis origi-nem ducere nugantur. Quidam de-niq; in mares & fœminas distinguunt, (sanè Varinus κηφήνας τὸς ἀρρένας τὸς ἀ-πεχάτους τῶν μελισσῶν explicat) & coitu propagari contendunt. Aristoteles ex apib. longioribus & porrectiorib. prodire tam fucos quàm futes affir-mat, & quidem annis prosperis, quib. largior mellis copia speratur, abun-dante humore, quod & ex Plinio su-perius adduximus. Addit, seorsim gigni si Dux vivat: si obiit, in Apum loculamentis, & hos fieri animosio-res. Minores verò ipsis cellas confin-gunt; nec eas sparsim per alveum, sed extimis & velut eiectitiis castris. Sic intra ternarium numerum, ratio-ne generationis, totum Apum genus rede-gisse videtur. Duces & seipsos &

aliud genus gignunt: Apes fucos: fu-ci gignendi facultate destituuntur. Fœtus autem prout Apum, candidus est: ex eo vermiculi apum vermicu-lis minores exsurgunt.

Græcis quibusdam ἀσυντελής, ἀτελής, ἀλειτὲρ γιγνιέται, ἀσύμβολος, μηδὲν εἰς τὴν κοινὴν συμφέρον, fucus est: ideo Virgilius im-munem ad aliena pabula sedere di-xit. At quibusdam visum magno esse usui. Vivunt quidem, si mellificium attendas perpetuò ociosæ: imò to-tum diem in mellariis cellulis latent; nocte, sopitis somno apib. opera in-vadunt & vastant alveos, ut *Æliano*
l. 1. c. 10. proditum; sed si nos Bartholomæus Anglicus non fallit, regias mansio-nes, illasque magnificas, in apice & meditullio favi specioso cooperculo insignes, exstruunt. Tzetzes ἰδὸς φῶρος Tzet.
Chil. 8. facit: Columella seminibus, quibus *Hist. 227.*
Plin. H. N. apes figurantur insidere scribit. Ad *l. 11. c. 11.*
Colū. R. R. fovendam & educādam novem pro-*l. 9. c. 11.* lem adhiberi, exclusis pròturbari: quæ omnia egregiè Plinius. *Domos*, inquit, *primum plebeis exadificant, dein-*
de regibus. Si speratur largior proventus, *adii-ciuntur contubernia & fucis. His cel-*
larum minima, sed ipsi majores apibus. *Sunt autem fuci sine aculeo, velut imper-*
fectæ apes, novissimæque, à fessis & jam e-
meritis inchoatæ, serotinus fœtus, & quasi *servitia verarum apum. Quamobrem im-*
perant iis, primosque in opere expellunt, *tardantes sine clementia puniunt. Neque* *in opere tantum, sed in fœtu quoque adju-*
vant eas, multum ad calorem conferente *turba. Certè quò major fuerit multitudo,* *eo maior fiet examinum proventus. Cum* *mella cæperunt maturescere, abigunt eos:* *multæque singulos aggressæ trucidant. Nec* *id genus, nisi vere conspicitur. Fucus adem-*
ptus alis in alveum reiectus, ipse cæteris ad- *imit: Vel potius, si Aristotelem sequi-*
mur, cæteror. fucor. intus relictorum *alas ipsæ apes comedent: ut malè Pli-*
nus, & τὸ πρό αὐτῶν legerit, & τῶν λοιπῶν *ad apes retulerit. Sunt qui ex Aristo-*
tele favos in eodem alveo fingere *tradunt. Manent enim maxima tem-*
poris parte intus, cumque exeunt ef-
ferunt sese fusim, in sublime, gyroq; *volitant, & quasi exercitium faciunt,* *quo peracto, domum redeunt, & e-*
pulis

Arist. de
gener. lib.
l. 3. c. 10.

Arist. H. A.
l. 9. c. 40.

pulis perfruiuntur. De *Antipathia* quæ occurrit, ex jam dictis petantur. De *Furibus* hoc adiicere placet, adeò sese aliquando replere, ut vix exire aut resistere possint: sæpè in apum cellulis parere: neque mel colligere, nec ædes erigere: ingressos, verberari & pro foribus semianimes relinqui, sæpè morte affici.

CAPUT III.

De *Vespis*.

Aldrov. de
Insl. l. i. c. 8.
Nomen.

VESPE à Latinis nomen inditum esse puto, non tam quòd vesperi muscas capiat; vel vi petat & adoria-
tur; quàm quòd vesca, id est, gracili sit pede. Græcis σφήξ & σφήκιον, aut à σφίγω stringo & gracilem facio, aut σπῆξ & σφαγῆς, quòd medio ita sit dissecta, ut quasi hiare appareat, dicitur. Nicandri Scholiastæ sunt λευκοσπάδες, Suidæ δελίδες & δελίδες. Hesychio αἰλήται & πασάλερες Gazæ, sed καταχρηστικῶς αὐθενταί. Hæ enim potius Gra-

Descriptione brones dici debent.

Animal est gregale, annulosum, oblongū, quatuor alis membraneis, (quarum primæ maiores) præditum, exangue, intus aculeatum, sex pedib. instructum, colore luteo deaurato, super maculas nigras triangulatim positas, corpore toto transversim variegatum, unde forè Pollioni Ἀσχροσφῆξ dicebatur. Corpus medio pectori tenuissimo veluti filo alligatur, ut veluti elumbes & hiatulæ appareant. Aculeum omnes gerere, Moufet. exstimat. Var. eo ab Ape distingui putat, quòd Apis sit brevior, cōpactior, pectore ac dorso pilosus, capite oblongiore, acutior rostro, minus colorata albo, annulor. lineis colore ruffis, & nigris ut plurimū distincta, antennis, sub oculorum regione locatas habet: vespa verò longior, veluti quadam fistula medio cohærentib. albo & pectore, glabra tota, rotundior & brevior capite coloratior: & antennis supra oculos gerit.

Locus. Gaudent locis asperis, in iisq; magis

multiplicantur. Quædam tñ. genera quibusdam in locis, ut post dicemus, non reperiuntur. In insula Nicelin, Ortelio referente, mortem ictu inferunt. In extremo polari climate frequentissimas Olaus ponit. Condunt & vesperā, cellulis & foraminib. ple-
nos in quibus nidificant & stabulantur. Reperies ea in sublimi aliquādo, rectis, arborum truncis, montibus & quercubus: aliquando sub terra, in maceris, cavernis & speluncis. Aldrovandus & in leguminibus & in humilioribus arbusculis conspexit. Tria nobis idem dedit. Vnum ovale sub nucis iuglandis arbore, terra ad pedis altitudinem effossa: alterum, subterraneum itidem, sed orbiculatum: tertium phialiforme. Prioris hæc erat constitutio. Antrum, inquit Aldrovand. seu foramen angustum: nempe ea amplitudine, qua singulis pateret aditus in terræ superficie conspicuum erat, à quo iter erat eiusdem amplitudinis tendens ad Vespertum, non quidem rectā, seu perpendiculari linea deorsum tendens, sed ad latera per cuniculos quosdā duorum, plus minus palmarum intervallo, à primo (quod in summam humum definit) foraminis vestibulo. Hic maiori & ampliori sinu terra excavata est rotunda propè modum, ac ipsius Vesperti ovali figuræ proportionem respondens, ita tamen, ut inter Vespertum domicilium, & telluris cava latera, tantum sit spaciū, quantum ingressuris sua penetralia vespis sufficit, ad transeundum arcum illud ostiolum totius alvearis unicum, ad latera collocatum. Hac scrobe a perra, effossaque vespertum ædificium, domiciliumque apparuit, figura ferè ovali, altum ferè dodrantem, duas palmas transversas medio latum, undique ceu ovum testa, ita hoc membrana corticea obductum, eaq; subalbida arenosa, simili licheni marino, eiusdem cum favis substantiæ, non ut Apum cerea, sed lignosum quid habente, siliquisque tenuiorib. leguminū, seu lunariæ maioris bulbonaca dictæ pericarpio, aut scabiosæ similli-

ma substantia. Huius superna pars, tecti vicem gerebat, & veluti tuguria ac mappalia culmine medio in conum fastigiato ab imbre undiquaque (cum forte incidit) defendebat, inque parietum lateribus omnem hostilem incursum aditumque præcludebat. Infima basis fundamenti viceungebatur, denique undiquaque à sordibus, putredine ruitas reddebat. Hoc veluti putamine detractò senì favorum sese prodūt classes seu orbes, qui sibi mutuo ceu tabulata solaria, aut cōignatione super ponuntur, ac imminet, iustoque distitit intervallo. Sed ne tabulata superiora in inferiora collabantur, fœtusque premant, aut suffocent, singula columnis quibusdam sustinentur, quæ non susque deque formatæ sunt, & constitutæ, sed à lata basi incipiunt, & ad concavam, seu pronam superioris tabulati faciē lato, ac proteso epistilio protenduntur, instar clavi utrinque capitati pollicis lati longitudine, ita ut fornices, & hypogæa videantur, infimi ac supremi orbes exigui, & angusti, medijs amplissimi, reliqui orbes mediæ amplitudinis. Singuli plurimis cellulis abundant sexangulis, in quarum quibusdam Vespæ adultæ, in alijs fœtus juniores, at tamen perfecti, & alati, alijs Vermiculi condebantur, qui omnes posteriori parte fursum siti erant, capite deorsum.

De altero nihil singulare occurrit. *Phialiforme*, erat collo angusto, contra ventre capacissimo, cui latus pediculus appendebat. Materia constabat subtili, membranosa, qua undique circumductum erat. Forfice per longitudinem dissectum, tres membranas, illasque inani spacio distinctas, per quas circumcirca percurrere poterant, exhibebat. Prima membrana, exteriore minor, secunda amplior, tertia omnium minima conspiciebatur. In intimæ medio, septem cellæ eæque sexagonæ erant.

Victus.

Apollonio ἀποεόρα, Aristoteli μολοεῖται, quod crudis carnibus malisve maturis vescantur. Sed nec pyris, prunis, uvis, floribus fructibusque variis parcunt; nec ulmorum succo,

saccharo, aut melli. Muscas etiam grandiores venantur & amputato iis capite, reliquum corpus auferunt, ne apibus quidem parcētes. *Serpentib.* Plin. H. N. l. 11. c. 21. Arist. H. A. l. 9. c. 41. avidè vesci apud Plin. legimus, eoque alimento mortiferos ictus facere.

Sexum agnoscit Aristoteles. Majores & robustiores mares, instruunturque aculeo: minores imbecillioresque fœminæ, & carent eo. Matrices vocari possent, nisi eas Arist. latiores, ponderosiores, crassiores, & vespis maiores poneret. Dares sexus, apud quosdam indicium, quod, si vespam ex pedibus ceperis, & bombilare siveris, quæ aculeo destituuntur advolent. *Coire* visas fuisse, idem ipse scribit: alii ambigunt Vincentio, agrestes cum domesticis rem habent. De *Generatione* ita Aristotel. duob. locis. Primo, *Crabrones vespæque favos exadificant pullis suis, si ducem habeant nullum, eumque palantes quarant. Ac crabrones quidem in sublimi loco: vespæ in foramine: quæ ducem habent sub terra. Horum item favi sexanguli, quemadmodum ut apum, compositi non è cera, sed ex corticea materia & araneosa. Ad cellæ latus deponunt fœtus suos guttæ magnitudine, quæ parieti herent. Non omnibus in cellis tamen simul fœtus est: sed in quibusdam adeo grandes, ut etiam volare possint: in alijs nymphæ: in alijs vermiculi adhuc. Quibus solis subest stercus. sicuti etiam in apum genere. Ac quandiu nymphæ sunt, neque moventur, & obducuntur folliculo. Altero.*

Duces ubi cepere locum conspicuum, in eunte æstate fingunt favos: & constituunt, quæ vespeta vocantur pusilla. Arist. H. A. l. 9. c. 65. Scal. edit. Puta, quaternis

ostiolis, aut propè modum: in quibus vespæ oriuntur non autem matrices. Quibus adultis, de integro, præter superiores telas, alias majores construunt: atque his adultis alias. Adeo ut ad finem Autumni plurimæ & maxima vespæ sint. In quib. dux, quæ matricem nominavimus, non amplius gignit vespas sed matrices. Oriuntur hæ, grandiorum vermium specie in quatuor aut non multo plurium inter se continuatarum superior: cellar. labris summis. Plin. addit. *Plin. H. N. l. 11. c. 21.* Factum ipsum in æqualem & barbarum alium evolare, alium in nymphæ esse, alium in vermiculo. Et autumno non vere omnia ea. Maximo numero matrices oriuntur.

riuntur, si anno proximo vesparum
& imbrum copia præcesserat. Ver-
miculi antequam in Nympham tran-
seunt oblongi sunt, vermiculis in car-
ne (εὐλας vocat Hippocrates) & in
avellanis nascentib, non dissimiles,
albicantes, incisuris notabiles, extre-
mo corpore crassiore, linea nigrican-
te per dorsum discurrente, sine pedi-
bus non repentes, sed huc, & illuc se
volutantes & moventes. Depositò
fecu, tenui quadam pellicula cellas
obvestiunt, qua, ubi ad perfectionem
ducuntur perfecta, egrediuntur in
lucem, & a biduo volucres circum-
volant. Oriri & ex putri certum. Ex
equi cerebro nasci prodidit Pachy-
merius; ex carnibus, Plinius, Plutar-
chus, & Antigonus. Nasci ex asini co-
riò, apud Isidorum; ex Crocodili san-
guine vel cadavere apud Horum; ex
putredine arborum & fructuum apud
Albertum legimus. Ex fenis cervi, ca-
pitis sub oculo terebrato osse con-
crevisse, Vincentius Belluacensis, ex
vetustissimo quodam authore tra-
didit.

Vitam quod spectat, matricēs bimatum non superant: Operariæ una cum autumno finiunt ætatem. Imò, inquit Moufetius, utrum matricēs si ve ducēs anni superioris, novellis jam procreatis ducibus intèreant; una cum vespiis novellis, idquē simili modo semper eveniat, an amplius etiam rēporis possint vivere, multū dubium relinquunt. Agrestes vivaciore habentur. Vitæ brevitatē, tenacitas compensat. Nam si alvos à capite, hoc à pectore seiungas, ferient tamen, & quidem nec levius quàm antehac. Circularitèr volant, quia cauda destituuntur. Cedunt tinunculis, hirundinibus, noctuis, taxo, & vulpi in cibum. Vulpes caudam in vespertum inferit: onustam, ad arbores alidit: & mortuis vespiis vescitur. Pseudosphecem, quam solitariam vocat, sinistra apprehensam atque annexam, (quæ prima eo anno capitur, maxime conducit) contra quarranam laudat Plinius. Mizaldus aquæ ex vespiis stillatitiæ meminit, quæ tumores absque dolore excitet. Inflativum esse

necesse est, Curatur ictus si confusus
vulneri imposueris, vel emplastrum
ex terra furnorum, aceto, & musca-
rum capitibus. Alii *extra* succum ci-
trulli, folia teneriora siliquæ Plinii,
salviam cum aceto; cretam in pulve-
rem redactam, melissophyllon cum
oleo; asparagum tritum cum melle;
fimum deniq; bubulum laudant: *in-
tus*, succum sampsuchi cum bolo Ar-
meno & agresta folia tenuiora lauri
cum vino; Althææ decoctum ex po-
sca; rutæ vel melissophylli succum;
folia eiusdem commanducata, etiã
commendant. Si à *venenatis* ictus est,
quod stupor, delirium etiã osten-
dunt, locus primò scalpello aperiã-
tur; dilatatus sugatur, insequenti cã-
taplasmate ex terræ in qua vesicæ ni-
dificant rasura; cum aceto subacta.
Inter *preservativa*, malva & althæa
palmam tenent. Quomodo capian-
tur vide apud Mousetum. Inserviunt
& ad *præagia*. Longam portendunt
hyemem, si ante finem Octobris ap-
paruerint: pluviosam ac frigidam, si
multis in locis, ante Vergiliarum ex-
ortum, subterraneos specus glome-
ratim ingrediantur: ingentes im-
bres, si multæ autumno generantur.
Scilicet, frigida cum sint animalcula,
subterraneos quæ calent specus sub-
eunt: & quia nonnisi terra humida
& vaporosa procreantur, nimiam hu-
moris copiam, si copiose proveniant,
indicabunt. Capuæ, ingens ear-
um multitudo quæ in æde Martis
confederat, hostium adventum, &
& urbis incendium quasi præagie-
bat.

Differentiæ vesparum sunt plurimæ Aristotel. *sylvestrium, domesticarum, matricum, seu Ducum & Operariorum* meminit. Apud Plinium sunt *Ichneumones, & Pseudosphæce*. Apud alios occurrunt, *μεγιστοι, μικροιδες, Εμ-Ελικες, parvæ, magnæ, flavæ, Indæ, spuria, venenate, solitaria, Laertia, Aculeata, non aculeata*. Aldrovandus duodecem species quas observavit descripsit, quarum icones damus. Moufetus duas ex Hungaria accepit, quæ etiam hic exhibentur.

Ferum illud & Sylvestre genus rarum
est.

Ferum illud & Sylvestre genus rarum
est.

est. In montib. & sylvis nascitur: & non sub terra sed in quercu nidificat. Grandius est, porrectius, nigrius, varium, longius, fortius aculeatum. ictuque acerbius. Authores sunt, ter novenis punctis interfici hominem. Vivit toto anno; & hyeme, cæsa arbore, evolat. Hyemem in latebra exigit. Moufetus semel in sylva Esse- xienfi cum vitæ periculo observavit. A toto examine obrutus fuisse, nisi aliquot genistæ ramulis sese defendisset. Varro pilosas magis facit. *Domestica*, quæ & *Cicures*, & placidæ, seu mitiores, minores sunt. Dividuntur in *Matrices* & *Operarias*; quarum illæ biennio durant, & majores sunt. Plinius clementes facit. Latiores earum, addit, species: dubiumque an habeant aculeos, quia non egrediuntur. *Operariæ* in opere versantur, & matres pascunt. *Ichneumones*, minores sunt quam aliæ, & unum genus ex araneis perimunt phalangium appellatum, & in nidos suos ferunt, deinde illinunt, & ex iis incubando suum genus procreant. Vocantur ita, quod ἰχθυαί, exiles nempe & graciles videantur. *Pseudosphaeca* caput, fuscum, duo breviora & gracilia in fronte cornicula; oculi magni, nigri, prominentes; os oblongum, bifurcum. Pectus crassum ac prominens, quibus tres utrinque pedes affixi; scapulæ densæ, gibbosæ; corpus procerum, gracile, articulaturn; alæ fusæ, duæ; pedes hirsuti, & & colorem alarum assecuti.

Parnopes uvas tam maturas quam immaturas exsugunt. Vnde ita dicantur, nescire me fateor. Noctuarum stridularumque præda sunt. πέμ-
 Nicand. in φηδων. Nicand. Scholiasti, est animal-
 Theriac. culum σφμηδης, minus apæ, majus formica, aligerum, albo nigroque colore varium. Montes saltusque incolit, & è fruticum floribus melleos succos capit, & in cavis quercubus stabulatur. Idem esse cum τενθρήνη, aut τενθρήωνι, non facile dixerim. Βέμειξ apud Nicandrum ex vesparum quoque genere insectum, μέλαν τε τὴν χροίαν, κέντρον χρωμένον, coloris nigri: aculeo utens. Vocatur, ni fallor, & βέμειξ. Nicander sylvestre & montanum facit. De par-

vis nihil singulare occurrit. *Ma-* Ardoyn. l. 1.
gnarum, quædam capita nigra, & aculeos plurimos habent. *Flava* Ardoyno *citrina*, in duas divisæ partes, in medio tenuissimi ligamenti beneficio hærent. *Indæ* sunt & domesticæ, quæ innoxie; & sylvestres, quæ virulente. Quas Oviedus descripsit, sunt corpore magno, colore luteo, ad album tendente, alis maculatis nigris, extremitate aliquantulum albicante. *Spuriæ* apum aut muscarum figuram obtinent. De *Venenatis* in sylvestribus & Indicis dictum. *Laertæ* huc spectant, quia mortiferam plagam, ut laertæ viperæ formicæ inferunt. *Solitaria* in muris & aggeribus congestis nidificant. Ante ostium foraminis lutosa ponitur porticus. Longitudo ejus duos quasi transversos digitos æquat: intus lævigato luto emplastratur. In *aculeatas* & *non aculeatas* distinguit Aristoteles.

De suis ita Aldrovandus. Quæ à Aldrov. de
 me observatæ sunt vespæ. Ins. l. 1. c. 63.
 p. 202. edit.
 Bononiens.

Prior vesparum omnium, quotquot observavi maxima est toto corpore atro, præterquam in superna alvo, ubi quatuor sunt maculæ luteæ, illæ scilicet, quas albasicon exprimit. Caput minus, quam in plerisque alijs à cervice distinguitur, in quo oculi non nihil lutescunt. Antennæ sunt magnæ, & latiores, quam in alijs, nigræ, nigri quoque pedes, & hirsuti. Alæ argenteo, & aureo obscuro ad castaneum inclinante resplendent.

Secundum genus est vespar. minimarum, alis proportionem latiusculis, & oblongiusculis subflavi coloris. Corpore toto ex nigro ad castaneum vergente, sed zonis ex albo flavis ad croceum inclinantibus distincto. Caput erat exiguum valde, punctis duobus croceis ferè, supernè insignitum. Oculi nigricabant, antennæ nigerrimæ in extremo obtusæ. Pedes exigui, colore croceo.

Tertia magnitudine Vespar vulgari compar, vel paulò minor, sed tota atra; antennis, pedibusque longissimis, capite ovali, alvo breviori, lineis exiguis transversalibus, subflavis distincta, tenui ligamento pectori annexa.

Alæ

Alæ vero argenteæ, splendide, subrubris velut venulis percurrentibus præditæ.

Ex minimarum genere sunt *quarta* & *quinta*: quarum *prima* tota atra est, capite nimirum, pectore & alvo, quæ partes ferè æquè magnæ sunt, quod in aliis non observabis: Pedes quoque nigri sunt, & leves, antennæ item nigrae & exiles: Alæ fuscæ sunt. *Alter*a capite item est nigro, rotundo. Huic antennæ breviores sunt, sed nescio quid velut tricuspide exerit; pectore est angusto, quæ capiti hæret latiore, ac lutescente, quæ alvo angustiore & nigro, alvo ferè rotunda, primo lutea, dein modo lutea, modo nigro varia. Alæ ad aureum colorem accedunt.

Allatam ad me eam, quæ *sexto loco* depingitur, propter miram capitis formam. Similæ quodammodo aspectum æmulantem, Vespam sinuformam nominavi. Tergore est crasso, rubicundo: rubicundo it. vertice, oculis nigris, maiusculis, infra lineam semilunaris, ceu os constituit. Alvus it. crassa est, sed tenui pellicula tergori adhæret: Anterior nigricat, in extremo candicat, punctis transversalibus nigris. Alæ fusca, sed perperam duas tantum pictor expressit.

Septima inter magnas & parvas ambigit, tota atra, sed maculis undique aureis, aut flavis interstita, his autem, quæ in expressa iconè albæ apparent. Pedes non ut in aliis Vespis, tenues, sed crassi respectu corporis, quod compactius est, colore subcroceo antennæ atertinae, exiles, & breves, Alæ cinereo luteo.

Octava icon, Vespæ est imperfectioris, quam ut posset volare, seminympha adhuc, ut ex nympha recens orta. Corpus ex albo ad luteum vergere incipit, nondum maculis distinctum. Est eius generis, quod decimo subinde loco depingetur, nimirum favis insidens.

Nona pectore est longissimo, alvo mediocris longitudinis, ita invicem hærent, ac si duæ diversæ essent Ve-

spæ. Tota flavo & nigro colore alternatim constat, pedes & antennæ sunt longi, sed valde tenues, coloris ferruginei. Ferrugineæ quoque alæ sunt quatuor, quanquam tinæ tantum sint depictæ. Caput quoque luteo, & nigro colore variat.

Decima eiusdem omnino cum novissime descripta coloris est, sed breviori pectore. Vespeta talia quali insidet, ferè edificat, vel ad fenestras, vel ad arborum ramos, vel alicubi alio in loco.

Undecima elegans gentis sylvestrium vesparum est, alvo miniatæ coloris, sed annulis nigris, & nigra podicis extremitatè. Alas habet quatuor, oblongas, sed angustas coloris ferè cinerei. Pectus, & dorsum nigricant, & ad ferrugineum vergunt. Caput eiusdem est coloris, rotundum, exiguum: antennæ verò longiusculæ, nigrae in extremo acutæ.

Duodecima tota est coloris fusci, ad atrum vergentis, pedibus longiusculis, longis item antennis: capite, & alis non nihil ad ferrugineum accedit.

Decimo tertio, ac postremo loco depictum Vespis congener iudicavi, quanquam revera nondum didicerim an favificet. Corpore ex procerro, nigro, & flavo coloribus vario, tenui. Alas pictor duas expressit, sed nunquid vel duas, vel quatuor habeat, ut quod res est dicam, ignoro. Capite interim Vespas potius, quam Muscas refert. Antennæ in extremo obtusæ sunt. Pedes sublutei. Moufeti Hungaricæ, quas Vienna accepit, dorsis erant luteo atroque variè pictis; Corniculis huic pilosis, illi glabris; tertia penè parte vespis vulgaribus majoribus.



CAPUT IV.

De Crabronibus.

DIVERSUM à Vespis Crabrones genus pono, quod in corpore tantum discriminis appareat. Nec placet ab Aristotele & aliis abire, qui diversis capitibus de iisdem egerunt. *Nomen* ipsi apud Latinos velà Crabra in agro Tusculano, ubi perfrequentes sunt; vel à cabo, seu caballo, ex quo creantur, ut Isidoro visum, obvenit. Scaliger à craceo deducit, à quo Craber & Crabro: alii à κρέας carō & βόσκειν, quòd carnibus vescantur. Græcis est αὐβρόνι, fortè quòd istu carbunculum excitet.

Descriptio Duplo vespis sunt maiores forma proxime ad easdem accedunt. *Alis* instruuntur quatuor, quarum externæ internis duplo minores, & humeris obscurè fuscis & castaneo colore tinctis, affiguntur. *Pedes* habent sex, eiusdem cum pectore & humeris coloris. *Caput* oblongum, croceum. *Oculi* sunt propenduli σελιναειδῆς, inter quos antennæ duæ oriuntur, falcis æmula, eiusdem cum pedibus coloris. *Venter* tenui quasi filo humeris annectitur: cuius anterior pars media, fusco colore, & cingulo croceo notatur: posterior, tota crocea videtur, octo fuscis punctulis notata, una cum triangulo parvo, incisuris præterea quibusdam in utraque parte existentibus, quib. se extendere & contrahere pro lubitu possit. Iuxta ventrem maculas utrinque quatuor nigras habet, & in cauda, aculeo longo, robusto, & maximè venenato armatur. Hoc inter crabrones & vespas intercurrit discriminis, quòd vespis sine maiores, alvum minus gracilem habeant, eiusque pars, quæ tenui ligamento thoraci annectitur, multò sit latior; thoraxque compactior.

Locus. Favos (αὐβρόνια Suidæ) sub terra, quam formicarum instar egerunt, faciunt: duce ab alveis aberrante, sublimia & arborescunt. Ideo Plinius in cavernis arborum degere scripsit.

Nidos ad amissim omnes ferè sexangulares ædificant. Exterior facies candidis ferrugineisque segmentis distinguitur: materia membranacea est, & betulacei corticis per æstum in laminulas fatiscentis peræmula. Lenita quadam saliva, & gommosis foliis, plurib. ob prolem tabularis adaugeti eleganter poliuntur. Duos Aldrovandus observavit, de quib. ita scribit. Inveniuntur quinis aut senis, & ut plurimum sex ordinibus, seu tabularis constricti, cuiusmodi is erat, quam agricola meus, cum quercum per medium ferra divideret, offendit: cuius cacumen in superna trunci cavi parte situm, testi loco fungebatur, substantia membranea betulæ mediano cortici simili, quam ex populi nigrae & salicis ligno putrilaginoso, ac pulverulento ab exedente carie, humore glutinoso iis peculiari, compingere dicuntur: nec ea contigua, & solida est, unica veluti membrana constans; sed pluribus: ita ut lancellæ plures sibi mutuo adhærentes videantur, in eo, quod inter ipsas intercedebat interstitio, rotundos quosdam ductus canalium modo seu fistularum continuo ad fundum, seu ultimum orbem via, effinxerant, per quos supernæ deorsum ferri possent, in fundo autem cortex, quo totus alveus circumvestitur, patulo aditu dehiscibat, utpote per quem alvei penetralia subeuntes, ad singula tabulata ascendunt, inerant enim, & singulis tabularis sua foramina satis ampla, per quæ in singulas cellas singulæ se recipere poterant. Observavimus quoque alveum tam prudenter ab his fuisse conditum, quam ab aliis quibusvis, aut apibus aut vespis, nam superna arboris cavæ parte uno latere, in quod nonnihil parte superiore reclinabat, suspensus erat, eo situ, ut cellularum oscula deorsum propendentia fundum antri arborei spectarent, & crabrones ac eorum Nymphæ, & vermiciuli capite deorsum tanquam ruituræ conderentur, nec id aliam ob causam quam ut ab omni aëris iniuria, & quæ desuper in ea arbore in-

Aldrov. de
Insect. l. 1. c.
6. f. 229.

cideret

cidere poterant, pluvia, aliisque utpote adrepentibus tutiores essent. nam si cellulae ea parte, qua patent, cœlum spectassent, magnis certe incommodis obnoxii fuissent, singula autem tabulata ejusdem erant materiae, cuius cortex exterior versicoloribus lineis albis dico & ferrugineis, tanquam segmentis interstitiis. Reperiuntur nonnulli quoque alvei Crabronum maiores multo, quam prædicti, & septem tabulatis exornati eiusmodi rure meo in tuto reperi trabi appensum, altitudine duorum dodrantum circumferentia, quinque iisdem lineis aut cum superiori eminentibus albis & ferrugineis, tabulatis rotundis tanquam orbibus, cellulis plenis, digitum transversum altis, quæ digitorum duorum latitudine à se invicem distabant, ad facilem singulis ingressum; hæc columnis optimè erant fulta, in superiore huiusnidi parte foramina erant maiora, in quibus parentes degebant, in inferiori minora, in quibus filii.

Quia Cibus in favis per hyemem non recondunt, ideo jejuni rùm latent, & plurimi moriuntur. Vescuntur muscis maioribus. Captis caput abscindunt. Uvas corrodere vel inde constat, quod autumnii tempore frequentes vites circumvolitent. Carne quia magna ex parte, Aristotele teste vivunt: ideo in stercorebus sæpissimè versantur. Aves ubi cæperint, accipitrum ritu, caput primo vulnerant, deinde abscindunt. Pennius in Petropoli, in publico urbis vico, passerii accidisse vidit. In India oleum, butyrum & reliquos cibos infestant, ut nihil intactum ferè relinquant.

Ex equorum cadaveribus oriri, plarique cum Ovidio, sentiunt: ex asini cerebro Landus; ex duriore carniū equi parte, ut vespas ex teneriore Moufetus. De Coitu ita ex Aristotele & Plinio Aldrovandus. Quod (verba sunt Aristotelis) ad generationem, cognatorum iis (Apib.) animalium pertinet, ut Crabronum, Vespasumque, similis quodammodo

ratio est: sed defuit his locuples naturæ dotatio merito. Nihil enim apum genus habent divinitatis. Generant quippe matrices vocatas, primosque favos confingunt. Generatione verò coeundo inter se finguntur. Visus est enim sæpè eorum coitus. Fæturam autem Apum modo instillant ad latus cellularum favi, & parietibus admovent. Sed quemadmodum Vespasum fœtus, ita quoque Crabronum haud est æqualis, nam aliis cellis grandiusculus inest, ut queat volare, aliis Nympha, aliis adhuc vermiculus. Excrementorum vermiculis tantum ut & in Apum genere est. Nam ut ait Aristoteles, Apum & Crabronum & Vespasum vermes, quamdiu recentes sunt: tantisper & stercus emitte videntur: at cum formæ lineamenta receperint, sub qua facie Nymphæ appellantur; iam neque cibum præterea coquunt, neque ullum reddunt alvi excrementum, sed coerciti, & contracti quiescunt, nec ullo pacto movere se patiuntur, usque dum species destinata perficiatur, quo pacto evolat proles rupto quo continebatur folliculo. Cæterum quod fœtus inæqualis sit, Plinio quoque traditur. Fœtus (inquit tam de Crabronibus quam de Vespis) ipse inæqualis est & Barbarus (alii legunt ut Barbaris) alius evolat, alius in Nympha est, alius in vermiculo. Et autumnio, non Vere omnia ea. Plenilunio maxime crescunt. Mellis quoque paululum quantum gutta, in cellis Crabronum è regione parari scribit Aristoteles, Schadonesque huius generis non vere, sed autumnio fieri, crescereque plurimum plenilunio.

Vespis amici sunt. Ideo percussi à Scorpionibus, nec à Vespis, nec à Crabronibus feriuntur. Muscis inimicos esse de victu dictum. Inter Caniculæ & Arcturi ortum, apibus prodeuntibus ante alvearia plarumque obsidiantur. Iuvencis quoque sunt infestissimi. Melis plenio illorum antra ingreditur, totamque familiam destruit.

Vicus.

Arist. H.A.
9. c. 42.

Moufetus. l.c.

Generatio
Ovid. Met.
1. 5.
Landus de
Num. vet.
Aristot. de
Gener. l. 3.
c. 10.Antipater
à thia.
Palla. R. R.
l. 8. tit. 7.

Natura.

De *Natura & Moribus* pauca occurrunt. Ducem unum habent, magnitudine corporis maiorem, eumque impensè amant. In singulis hic eorum alveariis oritur, contra hostes foris pugnacissimus; facillimus domi erga subditos. Nulla fit examinis, ut inter apes emissio; novella profapia sinu parentum fovetur, & ad illius conservationem plures contignationes superstruuntur. Amplificant, inquit Mousetus, maiorem in modum favos, & jam ex valentiore quodam grege, qualos tres aut quatuor favorum plenos excipimus. In cellis parum mellis quantum gutta è regione prolis paratur. Maiorem quàm Vespæ inter volandum sonum edunt. Cicurationem non admittunt: & tantæ sunt malignitatis, ut, Syrio præsertim orto, ter novenis ictibus, hominem, imò & Equum interficiant. Haud remere sine febre esse, dixit Plinius. Remedia in Vespæ historia posuimus. Maiore duntaxat quantitate, hic exhiberi debent. Si luce crepera, sæpius nidos intraverint, quasi se occultaturi; pluviam & ventos expecta: serenitatem proximæ diei, si vesperi numerosiores obvolitavere. Ieiunos per hyemem latere, superius dixi.

Avien. in Carmin.

Vfus;

De *Vfu* nihil habeo quod dicam, nisi quòd Mizaldus prodit, aqua destillationis eorum, cutim attactam, in tumorem attolli. Mentiri sic imprægnationem coram amafis meretriculas.

Differentiæ.

Nec de Differentiis quicquam occurrit. Quæ hic de Tenthredine, Tenthrene, & Pemphredine Mousetus habet, in capite de Vespis allata sunt.

CAPUT V.

De Cicada.

Aldrov. de Ins. l. 2, c. 13

Hætenus de Anelytris quadripennibus membranaceis, favificis dictum: jam de illis quæ non favi-

fificant agemus, & primum de Cicada.

Nomen.

Nomen apud Latinos invenit, seu quod cito quasi cadat & evanescat; seu quasi κικαδων. Apud Græcos pro regionum, sexus, ætatis, & magnitudinis ratione, varia obtinuit. Generaliter vocatur κικαδων, Eleis βάλακων, Si detis σενάριον. Ponticis βάτραχον, Cretensibus σύμφυγον, Suidæ popularibus ξερσιν, quod rorem exugendo vivat. Fœmina non vocalis Aliano est κικαδων & καλαμαία: Athenæus tamen simile cicadæ animal credit. Novella, κικαδων & κικαδων, parva καλαμαία, καλαμίδας & κικαδων, alii dicunt. Τετρίγονια etiam Cicadastras significant, ut apud Cælium legimus. Epitheta apud authores plurima invenies. Dicuntur πελαγίδες, à volando: πετραπελυνίδες, quod quatuor pennis in aere remigent: ἀμήτορες, quod nimio cantu se oblectent: φιλομετορες, quod tempestate pluvia plurimæ nascantur: ἡλιόμανες, quod infano solis amore capiantur: ἀστειλίονες, quod ἀστειλῶν ἐπὶ τῇ ἡλίσ, quod à sole comburantur: κυανόπτεροι, quod alas cyaneas habeant. Virgilius querulas & argutas dixit. Nemefianus astivas: quidam graciles dixerunt. Pontanus Choralistriam vocavit, quod alternatim & chori instar canat.

Athen. Di-nos. l. 4. Hesych. in Lexic.

Virg. in Culic. Nemef. in Eclog.

Vulgares ita Mousetus descripsit. Vulgarium caput pronum, magnum videtur; & pentagonum imitatur, lateribus inequalibus finitum. Colore est viridi nigricante; (Aldrovandus superiorem corporis partem nigram ponit, inferiorem ad nigrum vergentem: unde & Martial. nigram fecit.) utrinque tumulos duos obtinens, ejusdem coloris, sed ovalis figura, & margine quadam fusca circumseptos; fusca item linea tumulos secat medios, mediumque caput jota litera nigerrima dividit. Oculos habet ex fusco non multum viridantes, prominentes quidem & magnos pro corporis ratione: (immobiles adde & lucidos) ut mirer Nigidium, qui cicadæ oculos negavit, eos non vidisse. Supinum caput sive facies, diluto ex albo viridiusculum apparet. Inter insecta omnino in hoc animalium genere una, ore caret: habet tamen prolixum quid, compactum, indivisumque, intus plerumque conditum,

Mart. l. 1. Epig. 116.

Arist. H. A. l. 4. c. 30. Plin. H. N. l. 11. c. 37. conditum, quod veluti promuscis, tum oris, tum linguae usum supplet, denis striis transversis affabrè canaliculatum. (Plinius linguam fortè appellavit: figura est triangularis; coloris castanei.)

Corpus capiti brevissimo collo, vel potius nullo annectitur: Scapulae, ex viridi & nigro maculatae; pectus viride

Mart. Epig. l. 3. ep. 93. magis albicat, (durum hoc, ideò Martialis vetulas, pectus Cicadae habere dixit.) è quo tres utrinque pedes tibiaeque erumpunt praesini coloris. (Aldrovandus subtilissimos, & in fine asperos, ut arbores conscendere possent, addidit)

Venter, in maioribus duos digitos transversos aequat, latitudine nunc: interna ventris pars, peltam refert in apicem desinentem, & limbo duodecem tredecimve articulis constante cingitur: intus incisura aliquot apparent concolores ventri, caudamque extremam mares, id est, minores, fissam habent; foeminae contrà integram. Dorsum nigricat, septem vel octo lineis & incisuris virentibus, transversim ductis ornatum.

Alae pulcherrimae, argento illitae, navisq; fuscis & maculis cum ornatu pictae, externa internis duplo longiores sunt, marginisque variegatae. Membranæ quia sunt, ideò *μυρομήτορες* vocantur. Penarum illis natura quæ apibus, sed pro corpore amplior, dixit Plinius.

Locus. Arist. H. A. l. 5. c. 30. Non visuntur in septentrionalibus regionibus, quod frigus averfentur. Nec apud Cyrenam in campo ullæ, cum circa oppidum multæ proveniant. In nemoribus umbrosis frustra quæras. Ideo oleas, quia minus opacæ ambiunt. Nullas in Gecala agri Nolani montē, nullas Neapoli proditum: seu Maronis magia id factum, ut Nipho placeat; seu incolarum industria qui atcere norunt, seu terræ ipsius genio. Scio quid signis & scripturis, quæ *σινισα*, adscribatur. Copiosas Italia, Narbonensis Gallia,

Plin. H. N. l. 21. c. 27. & Ægyptus ferunt. Mirum verò, in Milesia regione paucis esse locis. In Cephalenia annem quendam pen-

Aldrov. de Ins. l. 2. c. 13. riam earum & copiam dirimere. In Dulichio maris Ionii insula idem observatum. Vesuvium, qui agrum

Nol. l. 1. c. 1. Nolanum à meridie claudit eas necesse; Abellam, quo monte idem ab

Arcto sepitur, plurimas producere. De mutis & vocalibus in Differentiis agemus.

Rore vesci, præter Aristotelem, *Victus. Arist. H. A. l. 5. c. 30. Virg. Ecl. 5.* Theocritus & Virgilius prodidere. Excitatae, cum subvolant, inquit Plinius, humorem reddunt, quod solum argumentum est, rore easdem ali. Quia verò ore carent, quiddam aculeatum linguis simile pro eo habent, & hoc in pectore est, quo rorem lambunt, Antonius ab Altomari ex fraxini & Ornipræcipuè ramis cortici *Altom. l. de Manna.* busque lachrymam sugere dixit. Ex herbis vel de herbis more papilionum id facere, probabile est; tum quod jejuna semper & inanes repèriantur, tum quòd nihil excernere *Arist. H. A. l. 4. c. 7.* conspiciantur; nisi fortè ubi plausculum roris absorpsere, superfluum eius partem, ut rustici notarunt, removendo ejiciant. Aristoteles tamen *Arist. de part. anim. lib. 4. c. 5.* alimentum Cicadarum, in ipsa corporis humiditate situm esse, opinari videtur: foramenque se conspexisse dicit, per quem aquosum qui in ventre continetur humorem, eiiciunt.

Ex Cuculorum sputo nasci fabu- *Generatio Isidor. in Origin.* latur Isidorus. Provenire & ex putri verisimile est. Vidit Baldus Angelus sub quercubus rarioribus, imperfectas, forma solita, albas, & sine alis effossas, cum terra non culta, & ad Orientem obversa foderetur. Novimus & Anguillas ex limo nasci, quæ postea more ceterorū animalium generant: & circa Ægyptias Thebas *Basil. in Hexam.* post vehementes in aestibus pluvias, universa arva foricibus impleri, Basilus prodidit. Sed & lutum, si non debito tempore proscindatur, Cicadas proferre, testatur Paracelsus, & *Plin. H. N. l. 11. c. 26.* ante eum Hesychius. Ordinariè per coitum generant. Coitus supinis: masque inserit in foeminam, quæ genitali reciso, recipit quod à mare injicitur. Asperitate quæ in dorso, excavant foeturæ locum in terra. Quapropter magna Cicadarum, in agro Cyrenensi copia est. Pariunt & in squillæ caulibus: & in arundinibus quibus vites eriguntur, nidos foeturæ cavant. Ova alba depo-

nunt. Fit primò vermiculus: dein ex eo, quæ vocatur, Tettigometra, (theca est, aureliæ papilionum similis) ejus cortice rupto, circa solstitia evolant, noctu semper: primum nigræ atque duræ. Tettigometra in eo à Chrysalide differt, quod in hac nulla sit partium distinctio: in illa, caput, oculi, pedes, cæteræque partes exceptis alis, apertissimè conspiciantur. Color ei subalbidus, sed quimultis lineis subferrugineis respergitur. Quomodo exeat, Aldrovandi verbis visum exprimere. Cum è Tettigometra egredi cupit, inquit ille, ascendit primum arborem, & illico alicui ramo adheret, (quamvis scribat Aristoteles, ubi Cicada eruperint, oleis & arundinibus insidere) deinde exit parte superiore, in qua rima primum apparet; rupto autem operculo, ut rectè scripsit Philosophus, parum in eo relinquunt humoris; nam hoc operculum cum manibus contrectarem, humore aliquo aquoso digitos illevis. Iam tum simul atque Cicada emerfit, toto ferè corpore viridis est, dein superiore parte aliquantum ad castaneum vergit, quæ spacio unius diei subnigro fit colore; insidet tam diu huic exuvio, donec volare incipiat. Imbecilles enim primum sunt alæ pedesque, ut difficulter incedere queat. Exuvium hoc ἔκλυον dici Hefychius reliquit: aliis est *Lucr. l. 4. c. 5.* *λεβυλὶς & γάργας.* Lucretius modò *tunicam*, modò *folliculos* nominat. Æstate deponi addit.

Ætas.

Hyeme, imò in autumno perire, apud Aristotelem & Plinium habetur: in montium antris aut terra se condere, ex Aristophane quidam evincere conantur. Temperamentum in causa, quod quam aliis insectis frigidius.

Cuculo infestas esse eumque audita voce invadere, creditum quibusdam. Ideò sub exortum caniculæ cuculare definunt.

Cantus.

Quia sonoram vocem edunt, inter insecta ἐγκέλαδα numerantur, πετρίων id Græcis, *fritinnire* Latinis. Theocrito à sono πέτρες λαλαγέωνες dicuntur. Ambrosius *dulcem in exi-*

quo gutture Cicada cantilenam dixit. Ambros. Platonis eloquentiam Simon Sillio-
graphus, Cicadarum cantilenis comparavit: eundemque sonum & citharæ & harum veteres τῆς τρετῆς μᾶτος nomine vocabant. Hex. c. 22.

Incipiunt autem æstate canere; minores citius, quod citius è Tettigometra exeunt. Acheras sub Syrio astro canere, cum capræ & vinum optima sunt, apud Hesiodum habemus. Plinius cantus acerrimi facit, quo tempore Scolymus floret: floret autem serò, diu, & æstate. A libi solstitium, æstivum scilicet, ponit. Aliquot post auroram horis, cum sol validius ferit, canere, vel ex Poetis colligi potest. Hinc Virg. *Ecl. 2.* *giglius*

Sole sub ardenti resonant arbuscula Cicada.

Quam diu canant sciri non potest: autumno filere cognitum.

De modò non convenit. Ægyptii per aculeum emodulari, & motu suo stridorem ciere, veluti plectrum quo citharæ pulsantur, opinati sunt. Basilio, aëris respiratione id fieri visum. At quia & pulmonibus carent; & capite, cui illa fistula inhæret orbæ, canunt, nihil horum est. *Bas. Hexa. Hem. 3. Cardan. de variet. Rer. l. 7. c. 28.* Multo minus verum, vel dentes inter se atterendo, quos in commissura Scapularum haberent, id facere, vel alarum attritu, (hæc Procli Diadochi sententia) quod locustis fuerat, Membranulæ sub flabellis (sic vocant operimenta illa duo, post postrema crura ventri adhærentia) reverberationi id adscribendum. Sonant quippe, ut brevissimè Aristoteles, alliso ad membranam septo transverso subditam spiritu. Nam dum illa eo pacto distenditur ac remittitur; sursumque ac deorsum impellitur, sonus erumpit stridulus, non secus quàm in puerorum arundineis fistulis pellicula tenui constantibus; qua depressa, intenta, vel vibrata,

Arist. H.A. l. 4. c. 9.

vibrata, sonitum fieri necesse est. *Ælianus* τὴν ἔν λαλεῖν εἶπε esse dixit. *Pierius Valerianus*, colliso, attrito, agitatoque cavo utero. Quia verò hæc partes sub alis, haud improprie veteres Poetæ, Cicadas sub alis canere dixerunt.

Natura.
Mouset. de
Insect. l. i.
7. 77.
Hominum ita gaudent consortio, ut agros messorib. vacuos si viderint, submissius & rarius canant: si concincentes hos audiverint, maximo laterum cantu, πολυφωνοὶ καὶ ὀξύφωνοι adstrideant. Æstatem certò præfagiunt, nec unquam post Cicadæ adventum frigus rediisse visum est. Quod si citius solito aliqua die cecine: int, æstium majorem expecta. Tempestuosum tempus, si ab austro venerint: morbidum & pestilentem annum, si frequentes appareant. Raræ tamen An. M D LXXV. grassante in Italia peste visæ, quod rore destituerentur.

Vfus.
Aristoph. in
Horis. A-
then. Di-
gnos. l. 4.
c. 2.
Plin. H. N.
l. 11. c. 26.
Arist. H. A.
l. 5. c. 30.
Vescebantur Athenienses assis, quales & in Cortiis convivio appositæ Athenæus author est. Ante coitum Parthimares præferunt; à coitu foeminas, ovis earum correpti, quæ candida, suavissima eadē antequam cortex cadit, si Aristoteli credimus. Carabi Americæ juxta sinum Darienem populi, siccas vel salitas apponunt. Pro aliis mercibus commutare, Oviædus prodidit. Cedunt & canib. in escam: idque canis Aldrovandi exemplo.

Habent & in Medicina locum. Tral-lianus exsiccatas, & contritas alis ac pedibus abiectis, in balneo cum multo, contra calculum exhibere jubet. Galenus à quibusdam, tres, quinque aut septem cum parib. piperis granis, in Colica laudari scribit. Apud Æginetam, compositio diatetrigon occurrat: quam & apud Myrepium invenies. Quidam ad urinam ciendam cantharidib. substituunt: Aetius, tres ex vino exhibet. Vtilissimum eadē apud Aretæum contra vesicæ laxamentum remediū. Arida & trita cum aqua & radicis nardi pauxillo elixantur. In iisdem æger, loco balnei, ad vesicæ laxamentum, desidere jubetur. Lanfrancus ad frangendum

calculum Cicadar. spodium, ex aqua raphani vel cicer. decocto magni facit. Merum an aqua dilutum vinum sit, Cicada cognoscitur. Natat si illud: si hoc mergitur, si Gaudentio Merulæ fides.

Cicadarum plura sunt genera; Differentiæ. quorum quædam, quod solo nomine ab antiquis prodita sunt, difficulter cognoscuntur. *Ælianus*; *Membracis*, *Arist. H. A. l. 10. c. 44*; *Lachetarum*, *Cercopis*, *Acheto*, & *Acanthiæ* meminit. Quid sibi per priores velit, non intelligo. *Cercopæ* Dalechampion, sunt foemina; mutæ, pusillæ, oblongæ. *Acanthias* epitheton potius est quam generis nomen, seu ab acantho seu spina in qua habitare solent; vel ab Acantho Athamantum urbe in Ætolia, ut Stephanus prodidit; quæ quoniam ferè consilescunt, inde receptum, ut qui non loquuntur, eo insigniantur nomine. *Acheta* maior est Cicada. Apud Aristotelem, *Arist. H. A. l. 5. c. 30. c.* quoque & Plinium, *Achetarum*, *Tettigoniæ*, *Minorum*, *Majorum*, *Surculariarum*, *Fruentariarum*, & *Avenariarum* mentio. *Achetæ* sunt, ut dixi maiores, quorum corpus, sub septo transverso præcinctum distinguitur, magisque sunt canoræ & serius prodeunt, & primæ intereunt. Ex his *Hesychii* καὶ ἄλλων, quam μεγάλην τέθηκα exponit, esse videtur. *Tettigonia* minores, & quia minus vocales, idē Aristoteles ἀφώνους dixit. Primæ prodeunt, & novissimæ pereunt. Gaza Cicada-
Plin. H. N. l. 22. c. 20.
dastras vocavit. *Surcularie* grandiores sunt, & virides. *Fruentariis* nomen, quod simul cum frumentis arefcentib. appareant. *Avenaria* cum istis eadem. Fit apud authores, & *Marium*, *Fœminarum*, *Locrensum*, *Rheginensium*, *Seripharum*, *Guineensium*, & *Virginensium* mentio. Mares vocales sunt; nisi
Arist. H. A. l. 5. c. 30.
quod *ἄλκιμα* illud cuius figura frustui
Ælia. H. A. l. 1. c. 20.
Thlaspi parvi hieracifolii à Lobelio depicti, respondet, non habeat. Tam in maiore, quam in minore specie reperiuntur. *Rheginenses* silent; *Locros* translata garriunt. Vterque ager fluvio Alexe qui per profundam vallem decurrit, & Pausaniæ *Caicinus*,
Prolo-

Plin. H. N.
l. 11. c. 27.
Pausanias
in Eliacis.

Moufet.
Theatr. Inf.
l. 1. c. 17.

Ptolomæo *Locanus*, modernis *Aleſſo* dicitur. Idem de Seripho inſula apud Plinium occurrit. Mutæ ibi, ſi aliò transferantur, ſtrident. Idem dixit in Rhegino agro ſilere omnes; ultra flumen in Locrenſi canere: quod & Pauſaniæ placuit. Umbroſa ibi opacæque regio in cauſa, unde membranulæ inhumidatæ minimæ panduntur. Areſcunt eadẽ in Locrenſi aprico, & veluti corneæ evadunt, unde ſtridor emittitur. Plinius & Ælianus ignorari rationem ſcribunt. Ex *Guinea* delata *fuſca* eſt, eamq; Pennius à Ludov. Atmaro accepit. Quæ ex *Virginia*, cinerei omninò coloris erat: alis argenteis, non maculatis. Aldrovandus, præter vulgarem, ſex alia genera obſervavit, de quibus ipſe ita. 2. 5. Cicada lineis in alvo ruſceſcentibus, cum eiſdem tettigometra. Huic in pedibus anterioribus natura duabus providit chelis duriuſculis: quibus terram excavat paulatim veris tempore cum è terra prodire cœpit; poſteriores pedes quatuor in extremitates aſperi ſunt, quibus & aſcendit, & ſe ſuſtinet, ne in eundem locum recidat: ſunt & hi aliquantulum hiſſuti; chelas priorum pedum dum tettigometram deponit, relinquit, & in fine prætenues ut cætera inſecta pedes adipiſcitur, habet & mediocres antennias *Tettigometra*, coloreque tum plurimum temporis ratione variat. Nam cum primum è vermiculo exit, colore magis albicat, & quanto viciniòr eſt ei tempori, quo tettigometram exuit, eo apparet nigrior. Tettigometram, & alba materia deprehendimus. Cicada minor *Tettigonion*, aureis lineis pronam partem corporis perreptantibus. Cicada non diu ex involucri egreſſa lineis viridibus pronam partem depingentibus. Cicada major *Acheta* pronæ, &

ſupina.

†
* *

CAPUT VI.

De Orſodacna, & Cimicibus ſylveſtribus.

ORSODACNA, *Gazæ Mordella* Aldrov. de Inſ. l. 2. c. 13. eſt, quaſi ad mordendum concitetur. Conſtat 4. pennis, ore largo, & penè denticulato puſtulasq; puerorum appetit. Naſcitur ſecundum Ariſtotelem ex vermiculis immutatis, qui in braſſicæ caule generantur.

Ex alatis ſunt & *Cimices ſylveſtres*, Arist. H. A. l. 5. c. 19. iisq; quadripennibus & membranaceis. Plin. H. N. l. 27. c. 4. Læſtulariis ſunt majores ſextuploque eos ſuperant, æque ac illi fœtidi. In malvis ſæpius, in aliis plantis arboribusq; coniferis, in ulmo & ſalice quandoque, reperiuntur. In Dariene quoq; provincia reperi, Cardanus ſcripſit. Coeunt menſe Maio averſis caudis, & finem Veneri per diem integrum vix faciunt. Maſ minor, ſceminâ major & latior. Volant ſole exaſtante ſatis celeriter, ſed nec diu, nec longè.


Genera ſunt varia. Mouſſet. Theatr. Inf. l. 1. c. 29. tres, ſupinos & pronos, quos inter vaginipennes ponit, repræſentat. *Primæ*, inquit, dorſum, collum, antennulæ, atque elytra porrum referunt; alæ elytris longiores ex viridi ſaveſcunt, uti etiam oculi & pedes. *Secundus* undique inſuſcatur. *Tertio* corp⁹ nigro rubroque varium, antennæ pedesque anthracini. Omnes aureo fulgore hinc illinc micant. Quickelbergius ex agro Viennenſi duas alias ſpecies ad Pennium miſerat, aureo nigroq; undulatas. De ſuis ita Aldrovandus. Aldrov. de Inſ. l. 5. c. 3. Ii, quos ego diverſis temporibus obſervavi, differunt invicem colore magnitudineque & latitudine. ſed piſtor deceptus nominis vicinitate exiguum quædam ſilicem in quo humana facies expreſſa eſt, pro Cimice primo, & ſecundo loco depinxit. Numer. 3. Cantharidis potius quam Cimicis ſpecies. Pedibus enim ſeſt longioribus, quam Cimices habere ſolent. Vndiquaq; colore eſt minia-

ceq

Perlæ Libellæ
Maximæ

Schneider Graf-mütze
ex Mouf.

Tab. IV



cedo, sed maculis nonnullis atris respersitur. *Num.* 4. Cimex lectularius, nulli non notus. *Num.* 5. Cimex sylvestris noster, undique subflavus, lineis fuscis. *N.* 6. Colore flavo. Aliter versus caudam albescens. *Num.* 7. 8. 9. etiam flavescunt, sed veluti humanam ferè faciem per alas expressam gerunt. *N.* 10. Colore ferè castaneo, & alterius ferè generis, vel Cantharides vel Scarabæorum. *Num.* 11. Cimex sylvestris minor undique cinereus. 12. *Num.* Ex Scarabæis videtur, aut Ricino congener, si alati vultus, quod nondum observavi, ex cinereo ad castaneum vergit. *Num.* 13. Totus est coloris Castanei, lineis nigris in longum sectis. *Num.* 14. Cimex atro cæruleus propè caudam tribus notis albis respersus. *Num.* 15. Colore est castaneo, macula in extremis alis cinerea. *Num.* 16. Luteus nigro & albo cospersus. *Num.* 17. Cinereus macula argentea. *Num.* 18. Cimex olivaceus atque rubescens, macula circa anum cinerea, Mordella vulgò *Num.* 19. Mordella sive Orfodæne alia oblonga. *Num.* 20. Cimici & Ramptreno simile insectum. *Num.* 21. Cimex Cinnabrinus cruciger *N.* 22. Cimex viridis. *N.* 23. Cimex non fœrens, atque viridis, guttis albis plurimis ornatus. 24. Cimici simile insectum cinereum ferè anelytrum. *Num.* 25. Cimici simile anelytrum aliud pedibus longis locustæ. *Num.* 26. Cimex rubet lineis nigris in longum insignitus.

De *vis* si quæras, Matthiolus iis omnes vires demit. Plinius, hortenses in cinerem redactos, & cum oleo rosaceo infusos, contra dolores aurium variè commendat. Palladius, cum amurea, felle bubulo, foliis hederæ, & oleo, ad sanguisugarum virulentarum vulnera inungit. Arnoldus Villanovanus, contra disuriam, caput virgæ in oleum camomillæ calidum, in quo Cimices ebullierint, mitti, & mox cum allio pistato inungi jubet.

* *

CAPUT VII.

De Perlis vulgò dictis.

Perlæ apud Italos nomen, huic quod descripturi sumus insecto, ^{Aldr. Hist. Insect. 2. c. 10.} vel à rotunditate capitis, quæ perlam seu unionem æmularur, vel à splendore inditum est. Quatuor omnes alas habent longas, robustas, cartilagineas. *Alvum* admodum proceram, quæ in volatu non incurvatur. Mouserus, qui ^{Mouset. de Insect. 1. c. 11. p. 65.} *Libellæ* vocat, ita describit. Corporis forma aut nihil discrepant, sed tantum coloribus. Corpora enim habet duas nonnullæ uncias oblonga & teretia, quæ in tres præcipuè partes dividuntur, caput, pectus, & reliquum corpus, quod caudæ vicè supplet. Caput cum oculis magnis emissitris, ejusdem cum reliquo corpore coloris, collo est affixum brevissimo, cui priores duo pedes adhærent, reliquis pectori annexis. Pedes item posteriores longissimi sunt, ut sese melius erigant, atque sustentent. Omnibus bifurcæ caudæ, quibus adversis coeunt, ac in coitu diutissime hærent. Maxima rusticorum pars ex majoris junci aquatici putrescentibus vermibus oriri autumat: quod ut verum esse concederem, coitum tamen non tollit, & vermium ex seipsis depositionem; ut hoc modo & medio æternum crescentes, sobole propagarent. Tarde admodum volant minores, majores celerrimè, æstate concalescente solum conspicuæ. *Coeunt* more muscarum. Mas fœminæ insidet, ejusdemque sursum immittentis membrum recipit. Tenacissime in congressu cohærent, & hærentes per agros volare visæ. Æstate & autumno ceruntur, hyeme latent. Volant velocissime, sæpè solæ, plerumque gregatim, rarò altè. Meridie stipiti alicui insidentes quiescunt. Unde proverbium prandendi tempus indicans, *la perla va à sicchi*.

Differunt variè. *Antennas* quædam ^{Differētis.} habent, quædam non. *Caudam* bifurcatam quædam, obtusam & bifurcatione carentem aliæ. Propè aquas quæ occurrunt, cæruleo ferè sunt corpore.

F Aldro-

Aldrovand. viginti & ultra descripsit.

Prima ex mediocribus est, capite & toto corpore rufis, alis candidis, extremo macula nigra notatis, pedibus nigris.

Secunda capite perlâ, sive unionem nequaquam refert, non n. rotundum est, sed acutum. Oculos habet enormis magnitudinis, subcœruleos. Pectus admodum crassum: alvum proceram, tenuem, totâ lutescit, nigroque ut pictura expressit, maculatur, alæ sunt subcœruleæ.

Tertia alas habet breves, ad subcœruleum inclinantes, alvum longissimam, tam subtilem ut mirum sit, quomodo eam regere possit. Oculi quoque ut in proximo, maximi, sed caput orbiculatum infra cadicat, per dorsum superne ad latera lutescit, in medio ferrugineo colore est. Antennas habet admodum breves subflavas.

Quarta ex mediocrium genere est, corpore toto purpureo, aureis zonis undique interstincto, alis planè argenteis, nigro maculatis.

Quinta alas quoque habet argenteas, sed non tam resplendentes. Maculam in extremo singulæ habent nigricantem. Corpus totum aurei fere coloris est, nigricantibus zonis interstinctum. Pedes sunt atrii.

Ex maximis est, quæ *Sexta* in hoc ordine depingitur speciosa ac elegans Perla, capite, pectore, ac dorso viridis, alvo totâ cœrulea, per quam linea fertur à dorso ad extremum usque aterrima. Alæ cinereæ sunt, pedes nigri.

Septima oculos habet virides, totâ lutea, nigro maculosa.

Minimarum generis est *Octava* alas habens argenteas, corpus viridescens.

Nona ex maximis est, capite dorsoque viridis, alvo dilute flava primum crassa, dein tenui, alis sine maculis.

Decima toto corpore est flavo, nigro interstincto, pedibus etiam flavis alis cinereis splendidis.

Vndecima alas habet subflavas, & corpore toto flavo est, exceptis zonis, quæ sunt ferrugineæ.

Duodecima totâ viridis est, maculis

quatuor candidis, in alar. extremitatibus.

Decimatertia Alas habet breves, & laticas, primû virides, deinde cœruleas, cujus coloris quoque totum est corpus à capite ad anum usque præter oculos & pedes, qui atrii sunt. Oculosa. habet enormiter magnos, ac prominentes. Alvus in exilem acutiem velut acum definit.

Decimaquarta, etiâ aquas prosequitur, toto corpore viridi, nigris, exiguis zonis distincto. Oculi protuberant. Alæ quæ corporiherent argenteo colore, & splendore micant, deinde cœruleæ sunt, argenteis venis referæ.

Decimaquinta minimarum generis pedes habet longissimos. Araneorum pedibus, non dissimiles, sed admodum exiles. Corpore, alisque ex luteo subalbidis est, cauda simplici.

Decimasexta ex minimis est, totâ fere viridis, sed à lateribus tergore lutea. Oculi candicant, pedes nigri sunt.

Decimasextima cum decima quarta admodum similis, pariter aquas petit, alvo cœrulea, pectore viridi, alis primum argenteis, deinde cœruleis.

Decima octava, ex maximis, capite & pectore viridibus, dorso lateribus, ubi alæ enascuntur, nigris, alvo longa, cœrulea, quam nigra linea lata coloris aterrimi mediam dissecat. Pedes atrii sunt.

Decima nona mediocrium generis toto corpore viridi, aurum resplendente. In dorso nigricat: alæ cinereæ sunt, & argenteo micant.

Vigesima alvum habet obtusam, ac minimè bifurcatam, toto corpore ferrugineo, alis candidis, à latere ferrugineis.

Vigesima prima, ac postrema alvo est crassa, & brevi, lutea, nigris circumdata zonis, capite, pedibus, dorso, & alarum principiis ferrugineis. Alarum cætera candicant.

Moufetus in *Maximas Medioximas*, & *Minimas* dividit. De quibus ideimita. *Libellas maximas*, Angli quidam Brises appellant. Cujus generis octo tantum vidimus.

Pri-

Moufet. de
Insectis
p. 65.

Primam virescentem; maculæ item in collo summisque lateribus ex fusco virides ornabant, alæ argenteæ, veloces & motu impetum permagnum facientes. Septem illi nigre lineæ transversim in dorso erant protractæ; muscis exilioribus inter volandum vescitur, hirundinum more.

Secunda huic est similis, sed obscurior magis colore.

Tertia oculos margaritis similes obtinet, alas item argenteas, quarum extremam fimbriam macula fusca inficit; corpus luteo, nigroque colore varium, cauda bifurca nigra, duabus quasi plumis ornata.

Quarta, luteo est colore, latera habens quasi divisa in sex partes: juxta alarum argentearum exortum macula lata nigra conspicitur; medio lineis luteis distincta: in caudæ extremitate quatuor vel quinque spinulæ apparent.

Quinta, corpore & capite cæcio, ore nigro, alis argenteis una macula notatis: in caudâ ultima tres spinulæ tridentem referentes conspiciuntur.

Sexta alæ adnascuntur argenteæ, medio ipsarum nigrâ insignitæ: totum corpus nigrum, sed rariùs, item in dorso atque ventre lutescens. Pectus scapulæque ex nigro flavoque æquè mixtæ. Subter caudam duas spinulas recurvas trahit: in fine ejus quinque apparent, sed admodum exiguæ.

Septima caput collum & scapulæ, fusco sunt colore; reliquum corpus rubet: in Musæo Pennij procreata fuit, ex vermiculo plane illi mihi que ignoto.

Octava adhuc brevior, oculis margaritis similibus, toto corpore luteo, nisi ubi lineis transversim ductis notatur. Cauda illi quasi abscissa, in fine latiuscula & obtusa: argentearum alarum summitas nigra maculâ infusatur, inter segetes plerumque reperiuntur.

Libella media maximam naturæ elegantiam commendant, omni arte majorem.

Prima colore est elegantissimo, corpore cæruleo, alis violaceo colore saturato: Inter scapulare spatium

gemmis quatuor aureis, ceu in nigricante palâ fixus ornatur.

Secunda corpore capite cæcio apparet: alæ albescentes, cæciis item lineis in longum ductis ornantur, medio purpurascetes.

Tertia corpus atque caput subviride; alarum lineæ sanguineis veluti strijs notatæ, versus extremitates obscuram purpuram imitantes.

Quarta ejusdem ubiq; coloris videtur, fusci nimirum fatiscente viriditate commixti.

Quinta oculi cærulei in capite virescenti: corpus totum viridi cæruleo mixtum, demptis alis argento nigrefacto accuratissime laboratis, & medio obscuratâ purpura obfuscat.

Sexta viridi est omnino corpore: imo & alæ illi virescunt, sed leviter.

Libellas minimas, quatuor vidimus.

Prima corpore toto Cyaneò.

Secunda rubro, alæ utriq; patēs, colore argenteo.

Tertia corpus totum crœcœum colorem æmulatur. Sed cauda magis protuberat, & sanguinea macula alarum extremitates, uti & omnes fibræ, rubescunt.

Quarta quæ omnium minima, caudam longam habet exilem, caput magnum, oculos cæruleos prominentes duabus antennulis præmunitos: corpus oblongum tenue, subtus vires, supra nigricans; in dorso duas lineas virentes à capite ad alarum exortum protractas habet: caudâ quinque juncturis colligatam, in cujus extremitate annulus subcæruleus. Ex harum numero una est, quæ quasdam ex majoribus citissime interficit. Corpore gracili & griseo, alis item politis; nam ne vestigium quidem foraminis ullius apparet, per quod intrare possit. Pomo ipso ac seminibus vescitur. Hanc muscam Guilielmus Bruerus, vir doctissimus, & rerum naturalium indagator acerrimus, ad Pennium misit.

ARTICULUS II.

*De Aneletris quadripenni-
bus farinaceis.*

PUNCTUM I.

*De Papilionibus vulgaribus
in genere.*

Tantum de Aneletris quadripenni-
bus membranaceis, sequuntur
farinacea seu *Papiliones*, qui vel *vulga-
res*, vel *Bombycum*. Nomen videntur
à pappo, seu fugo, quod ceras & olera
exfugat & comedat, sortiti: nisi
fortè, quasi papyriones dici malis,
quod similitudinem papyri habeant.
Græci generaliter ψυχιν, seu oxyto-
nos, seu paroxytonos vocant, & οὐδὲ τῆς
ψυχῆς sine dubio, seu vento. Dicun-
tur & σηποδοκίδες, πεμφίδες, πμφαλόγες, & ἡ-
νυες, ψάλυες. Invenies & πύφου dici. In
Glossario Benedicti Abbatis Floria-
censis ἐσπυλιν, exponitur Papilio.

Descriptio Habent pedes sex, oculos promi-
nentes duos, ante quos totidem cor-
nicula ignava, ut Plinius vocat, ena-
scuntur; rostrum bifurcum; rostellum
longum intra furcas absconditum,
quo rorem, aliæ diurnum, a-
liæ nocturnum sugunt. Colorem e-
rucarum, ex quibus ortæ sunt, ser-
vant.

Locus. Amænis & apertis locis gaudent,
qui levissimo volatu feruntur: qui
gravius corpus gerunt, arborum trun-
cis, parietibus & fenestris adhærent.
Vitus. Ex malvæ floribus succum sugunt.
Columella Ideo florentibus illis maximè abun-
dant. Sed si de sylvestribus malis id
accipiendum est, de nocturnis quo-
que papilionibus sumendum hoc e-
rit: quod & Isidorus innuit.

**Isidor. Ori-
gin. 15. c. 10.**
Generatio Mensibus Mayo, Junio, & Julio
coeunt, avertis caudis, reflexis quan-
doque, & in coitu diu herent. Author
de Natura rerum, post Augustum
congregi scripsit. Vermiculos depo-
nere falsò Aristoteles credidit. Ova
edunt, tam supra quam subtus, illa-

que magna, parva, nigricantia, alba,
viridia, cœrulea, flava: quædam se-
minibus milii minora, quædam du-
plo majora, nonnulla æqualia. Re-
ponuntur sæpè in corticum arborum
cavitatibus, sæpissime in foliis. Al-
drovāndus sub Chamæfici observavit:
rusticia feminibus papilionum gravi-
da cum ferrum vomere scinderent,
se invenisse dixere. In brassica nasci,
apud Aristotelem leges, ita amplifi-
cant, ut quasi recto includantur, ne
ipsis aliquod ab imbris damnum.
Quæ Aldrovandus observavit, te-
nui lanugine involuta erant. Ex ovis
loco tepido, repositis, vel solaribus
radiis vegetatis, aliquando post qua-
triduum, aliquando decimo quarto
die, erucæ excluduntur. Ideò ma-
lè Albertus, alios ex ijs papiliones,
longis & flexuosis promuscidibus
instructos, hyeme prodire scripsit.
Ex erucis Chrysalides, seu aureliæ
fiunt, quæ in papiliones abeunt. Ob-
servatum, Erucam primò parere ova
lutea, tenui lanugine involuta, iis-
que editis, in Chrysalidem abivisse,
coloris lutei, viridis & nigri. Ex o-
vis erupere tam exigua quadripenni-
a volucra, ut visum ferè subter-
fugerent qualia in ulmorum vesicis re-
periuntur. Errat ergò in quibus-
dam Plinius cum scribit. *Multa infe-*
sta & aliter nascuntur, atq; imprimis ex
rore. Insidet hic raphani folio primo ve-
re, & spissatus sole in magnitudinem mi-
lii cogitur. Inde porrigitur vermiculus
parvus, & triduo eruca, qua adjectis die-
bus accrescit, immobilis duro corti-
ce, ad tactum tantum movetur. Aranei.
Hæc Eruca, quam Chrysalidem appellant,
rupto deinde cortice volat Papilio. Infe-
stant sæpè brassicam simul & erucæ
& vermes: nec βράφανος raphanum a-
pud Aristotelem, sed brassicam si-
gnificat. Non negaverim tamen
quasdam & ex vermibus nasci. Fru-
mentum certè humidius vermes
producit, hi Chrysalides, ex quibus
Papiliones prodeunt. Exire vidi Pa-
piliones, inquit Aldrovandus, ex ar-
borum, maxime salicum cavis, suo spolio
denudatos. Papiliones, addit, ejusmodi
cum cavitatibus crassitie, in quibus sanè
ova

Aldrov. de
Insectis 2.
c. 1.Arist. H.
A. 5. c. 19.Plin. H. N.
11. c. 32.

ova fuisse nemo dixerit. Ex singulis enim cavis, singuli exeunt Papilioes, cum qui semen in quodam loco edunt, id non nisi admodum numerosè pariant. Sunt id genus Papilioes corpore admodum crasso, alis plurima lanugine obstitis, colore plerumq; fusco ad castaneum vergente. Sed & visa eruca, à qua, cum expectaretur Papilio, ova quadraginta, grani tritici magnitudine, luteo colore, tenui obducta lanugine, in quorum singulo vermiculus prodire. Licet quoq; sentire ex putredine nasci. Bis terve erucis Bononiæ pluit, quæ in Chrysalides & Papilioes abivere. Unde hoc malum in Mileto tempore humido & lento nasci, Plinius reliquit.

Aldrov. l. c.

Plin. H. N. 27. c. 24.

Natura.

Plin. H. N. 28. c. 25.

Post coitum sensim tabescentes vivunt, ad hyemem usque, quidam ad hybernium solstitium. Sæpè in domibus per hyemem quasi torpentes conspiciuntur: plerumq; intenses gelu pereunt. Sunt qui certissimum veris indicium arbitrentur, ob infirmitatem animalis, Papilionis proventum. In ipso aëno, cum commentaremur hæc, (verba sunt Plinij) notatum est, proventum eorum, ter repetito frigore extinctum, advenasq; volucres, ad VI. Calend. Februarij speciem veris attulisse, mox severissimâ hyeme confictas. In Anglia novum eorundem bis Autumno exortum, memorat Pennius. Observatum & Pestis præfagia tradidisse, quod apud Gemmam habemus. Volabant Anno M. D. LXII. circa 15. August. ad aqua tantâ copiam, ut fluminis cursum obscurarent: sub noctem, velut instructis copiis, per vicos vagabantur. Anno MC. IV. turbavere aciem, intercepto etiam solis lumine. A. M. D. XLIII. omnem melleum succum absumere; gramin ipsum, arido stercore ubique torrefactum, exustum est. A. M. D. LIII. cruentis in Germaniæ guttis, herbas, recta, vestes, & homines aspergebant, & ingenstum eorundem copia.

usus.

Urinæ movere creduntur, & minore cum periculo. Tinunculis & alijs aviculis in cibum cedunt: sed

& morsulorum compositionem, quibus pisces allici creduntur, ingrediuntur.

Differentias speciales frequentibus punctis apponemus. Nunc eas in Diurnas & Nocturnas distinguere placeat. Nocturnæ dicuntur φαλάναι phalanæ, ὅτι τὸ εἰς φῶς ἀναδύει, quod ad lucernas advolent. Lycophroni & Nicolao κανδυλοσβέται sunt, quod candelas alarum motu sæpè extinguant: ψόγαι aliis, quod scabritie & fursure quodam diffuant.

Quia verò aliquando lucis amore in ignem se præcipitant, pyraustarum apud nonnullos Zenodetum nempe & Aeschylum obtinere nomen.

Aristoteles ἰππάλων dixit: quidam περὶ αὐτῶν: distinguere debent à Papilionibus qui apibus in alveis obsunt. Harum ova Aldrovandus, in recto alvearis, in unam velutimassam conglomerata, tenui quadam lanugine vestita, obruta invenit. Subnigra, splendida, dura, & numerosa fuere. Erucas etiam, addit idem, albicantes exiguas, quæ mihi in sequenti nocte folliculos fecerunt, quales in alveo quoq; observaveram, magnitudine pistachij invicem numerosè admodum coherentes, & in singulis suas Chrysalides, quæ denique mihi, dissectæ, Papilioes pepererunt, quales quoq; in alveis videram, Papilionibus qui in tritico oriuntur non dissimiles. Hirsuto sunt corpore, & alis veluti cinere quodam conspersæ.

Aldrov. de Insectis 6. 2.

Rarò aut nunquam, nisi erectis in dorsum alis provolant. Interdum subter folia vel obscuro quodam in loco latitant. Antennas maxima ex parte vel hirtas & latiores, vel exiguas admodum & breves habent. Ex erucarum thecæ terra obrutis proveniunt.

Adoulet. de Insectis l. c. 14. p. 88.

Et quia pulverulentæ sunt, diurno tempore ante advenientem vespem, ne pulvis solis calore arefactus excutiat, apparent. Diurnæ, quæ ἡμερῶσι, antennis longioribus & in extremo tuberosis gaudent.

Semper juxta latera expansis alis provolant. Ex aureis pendulis, vel arborum ramis affixis proveniunt. Planæ sunt, læves, glabræ, duriusculæ. Noctu volare nequeunt, ne ros nocturnus medullas madefaciat. Differentias earum speciales inferius vidè.

Nierimb.
H. E. 13. c.
89.

Nierembergius meminit ex Indicis *Hoitzitzil Papalotl*, seu papilionis similis *Hoitzitzillin*, unde nomē meruit. Oblongo, inquit, est corpore desinente in tenuitatem, & transversis quibusdam lineis, aurei coloris distincto, sed maculis nigris interfertis alarum superiora eodem colore distincta sunt, sed inferiora rubescunt; lineis haud absimiliter per transversum discurrentibus. Cætera papilionum reliquo generi consona. Sunt & aliæ innumeræ apud novam Hispaniam differentia admirandis variatæ coloribus pulcherrimæ. Illud hic obiter monebo, in quibusdam papilionibus magnis hujus novi mundi pro lingua esse filum sanguineum oblongum excedens reliquum corpus, quod convolvit ut in bucca recipiatur, quam habet, ut illud commodius extrahere possit, sectam à superiore parte capitis usque ad inferiorem, ut panē totum caput scissum sit.

PUNCTUM II.

De Papilionibus in specie, & primò de Papilionibus Aldrovandi primæ tabule.

Papilioes in specie, partim ab Aldrovando, partim à Moufeto descriptas habemus: Coincidere hujus & illius aliquas, concedi potest facile: maluimus tamen in tanta varietate omnes ponere, ne quicquam desideretur. Aldrovandus suos in decem tabulas dispescit, quarum prima quinque habet, qui à nobis ipsius Aldrovandi verbis describentur.

Primus, inquit ille, non incongruè


ἰπποφύχην dicitur. Est enim Papilionum maximus. Vespere potissimum cernitur, interdiu latet. Latus est palmum, & amplius. Alæ singulæ rotundam habent ac notabilem maculam, oculum diceris nigrum, sed primo miniaceo, dein candido circulo obductum, cætero subnigræ, aut fuscæ, molles, lanuginosæ, farinaceæ, in extremo candicant; corpus primum ad castaneum vergit, supinum non nihil albicat, corniculæ sive antennæ plumarum instar molles, satis proceræ; femora quoque mollia, sed tibiæ duræ, oculi nigricant.

Quartus in hoc ordine similis ferè proximo, sed corniculis latioribus, & filicis ramulum figura quodammodo æmulantibus, luteis: corpore etiam magis lutescente, denique oculis longè pulchrioribus: miniaceus enim circulus longè in hoc major est, minorque niger, qui velut pupillam constituit.


Secundus totus erat viridis, annulis candidis. Alæ etiam lineas habebant roseas deorsum descendentes, item maculas transversales albas; rostrum erat longum, trigonum, oculi magni, nigri: corpus procerum admodum, crassumque, in extremo acutum. Alæ pro cuius portione sunt exiguæ. Ex hoc genere alium mihi describendum ac depingendum tradidit F. Gregorius Regiæsis Capuccinus, illius infolenti forma ac colore caprus, sed in quo annuli essent lutei, alæque maculis subflavis, castaneis, subcæruleis & nigricantibus distinguerentur. Longitudo huic papiloni palmaris est. Quid si sexu distinguamus, priorem fœminam esse ex editis mihi ovīs comperi.

Tertium ex *Eruca* nasci observavi sub finem Augusti anno superiori, eaque caudata & immensæ magnitudinis suo postmodum loco depingenda. Folliculum non texit, sed in Aureliam mutata: Papilionem hunc generavit decem ferè dierum intervallo, corpore crasso ejusdem cum alis coloris, nimirum ex luteo & fusco variatis. In tergore notabilis macula est candicans, humanum quodammodo caput


Tab. 1



Tab. 2




Tab. 3




Tab. 4



Tab. 5



Tab. 6




Tab. 7



Tab. 8



Papilio Indic.





caput antèrius exprimens. Caput totum nigricat, pedesq; & antennæ, quæ latiusculæ sunt. Alæ internæ totæ ferè luteiscunt.

Postremum in hoc ordine depictum prona & supina parte anno 1592. mense verò Julio, hujusque die vigesima sexta gigni adverti ex parva quadam Eruca, hirsuta, colore ex rubro, albo & nigro variante. Hanc enim cum cepissem in tamarisco sive myrica sub meridiem, subsequenti nocte versa erat in Aureliam viridem, quæ filo sese capsulæ, cui inclusa erat, ex alvi extremitate edito appenderat, atque ita quindecim diebus continuis adhærens in eodem colore perseveraverat, deinde mutato eo lutea partim, partim nigra facta erat, quare jamjam in Papilionem abituram conjeci, cujus scilicet colores per senectam, quam mutando relinquunt exeuntes, transplenderent. Quod cum viperinis foetibus commune hisce Papilionibus fuerit, eos enim superne in ovo conspici testatur Aristoteles. Cum itaque erupisset Papilio, alis se fecit conspicuum iis, quos diximus, coloribus prone & supine. Color niger luteusque in primis alis intensior est, in supinis remissior. Alæ internæ, quæ aliàs minores esse solent, in hoc animali proceriores sunt, infraque serrata ferris eisdem coloribus distinctis, ex quibus ferè mediæ ceu cauda quædam dependet. Corpus totum prout atrum est, ad latera & supine luteum, estque pro alarum longitudine admodum exile. Oculi magni nigerrimi, nigerrimæ item antennæ, quæ in extremo obtusæ sunt, totæ subtilissimæ. In alarum internarum extremis lateribus macula rubra sive rosea conspicitur, rotunda internè, semi-circularis externè. In summa, elegans est Papilio, conspicitur passim per agros

& hortos.

†

PUNCTUM III.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula secunda.

IN secunda tabella sex Papilioes posuit Aldrovandus, eosdemque ita *Aldr. lib.* descripsit.

Primo & secundo loco supine nimirum & prone depictus Papilio, expansis alis, coloribus quatuor potissimum variat, miniaceo, nigro, albo & cinereo ad cæruleum nonnihil vergente. Suntque colores in extimis alis intensiores, ut remissiores in intimis. Capite, dorso, alvoque est cinereis, sed albis strijs subtilissimis decorum, rectè tendentibus color ille cinereus insignis est. Corpus obtinet crassum, latumque, parte supina candidans, annuli coloris sunt castanei, oculi ejusdem coloris, magni & prominentes. Alæ pariter amplæ sunt, quarum externæ maximæ sui parte cinereæ videntur, sed explicatæ quatuor, quos dixi, coloribus ita evariât, ut descriptum admodum sint difficiles, septem velut venæ rubicundæ eas percurrunt, inter quas in extremo totidem sunt velut columnæ nigre albis circulis notatæ, ac supra hæc septem etiam maculæ nigre V. litteram exactissime exprimunt; sed in dextra tantum; sinistra enim neque columnas eas, neque literas habet, in qua re mirus naturæ lusus conspicitur, coloresque omnes in hac sunt dilutiores, pallidioresque; Dextra etiam punctis exiguis nigris erat notata, quæ in sinistra quoque non sunt, nisi quæ corpori nequitur, nam deinceps in strias oblongiusculas mutantur. Postremo dextra in extremo candicat, strijsque insignis est nigris descendentibus, cum sinistra nigrescit eo loco, neque striarum aliquod habet rudimentum; Internæ verò alæ totæ sunt coloris miniacei, præterquam, ubi duæ illæ fasciæ apparent, nam hæ nigerrimæ sunt. Alæ externæ inversæ modò albicantis, modò nigri-

nigricantis coloris areas obtinent, internæ loco albedinis habent colorem miniaceum, sed dilutiorē, quàm externæ. Antennæ erant nigricantes, proceræ, leves, in extremo obtusæ.

Tertium in hoc ordine Leucomelanium nominavi, quod præter colorem alatum album, ad subflavum nonnihil vergentem, totum corpus per tergus nigrum ac exile habeat. Alæ internæ in extremo sunt ferratæ, habentque longas appendices, ut icon ipsa declarat. Supra ferras, quæ semicirculum constituunt, maculæ quoque sunt semicirculares, candidæ, atque in his maculæ rotundæ, ferè cæruleæ, quæ simul omnes egregiam speciem ac venustatem Papilioni præbent. Cætera, ut dixi, Leucomelanus est excepto ventre, qui candidat, antennæ in extremitate, quàm in plerisque obtusiores.

Talis est in quarta serie positus, qui totis alis nigricat, & quatuor habet in hisce oculorum specie maculas rotundas nigerrimas, cæruleâ velut pupilla decoratas; Alæ internæ longiores sunt externis & ferratæ, sed aliter ac in præcedentibus, hujus enim ferræ obtusæ sunt & rotundæ.

Quintus ex maximorum est generis, sed eorum, qui interdiu per hortos obvolitant, corpore est procero, mediocris crassitudinis, coloris fumati, annulis per alvum lutescentibus, alis ejusdem coloris in medio, infra candidis, & nonnihil ferratis, deinde nigris, & in ipsa nigredine maculas habentibus candidas ad latera, infra verò ad cæruleum vergentes. Antennæ longissimæ, obtusæ sunt & nigræ.

Sextus à maculatum multarum serie, quæ in alis internis tam foris, quàm intus cernuntur, *πυλοφθαλμο* nominatur. Oculi nigri sunt, pupilla candida, circulus ambiens luteus, suntque, ut dixi, in internis alis tantum, nam quæ in externis apparent maculæ rotundæ, totæ candidæ sunt; Habent tamen etiam hæ unicum oculum eisdem, quibus internæ, coloribus ad externa latera, cætero alæ

totæ ex luteo ad castaneum vergunt. Per superiora corporis ater est, alvum supina ex cinereo ad fuscum vergit; alæ internæ, item pectus longa quadam lanugine viridi, splendente vestiuntur.

PUNCTUM IV.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula tertia.

IN tabula tertia novem habentur.

Primus, inquit *Aldrovandus*, ex mediocrium genere natus mihi ex Eruca, quam olim Bononiæ pluit; capite est, tergore alvoque coloris aurei, ad latera nigri. Alæ internæ ferratæ sunt, totæ ex aureo miniaceæ, & nigris punctis conspersæ, & in extremo etiam nigræ. Alas externas venæ percurrunt deorsum descendentes, nigræ in area aurea, seu potius miniaceæ, item maculæ magnæ transversales ejusdem coloris, ipsæque alæ in extremitate undiquaque nigræ sunt, & ibi maculas habent candidas. Pedes & antennæ lutescunt, & instar pedum polypi cirris præditi sunt, ut ad ea, quibus insiliunt, fortius adhaereant.

Secundus, qui numero secundo & tertio pronè & supinè depictus est, ex eodem est genere. Corpus enim habet mediocre, nigricans, alvum ferè auream, nigris annulis distinctam. Oculi candicant, alæ externæ in extremo nigræ sunt, & albis maculis insignes, cætera aureæ, venisque nigris, & tribus aliis nigris maculis incertæ figuræ speciosæ. Internæ in ejusdem aurei coloris area duplicem habent ordinem majorum macularum nigrarum, velut oculorum, sicut in icone exprimuntur. Colores omnes supina parte variant; In internis etiam alis (ita voco, quæ corpori sunt viciniotes) qui extra erat aureus, nunc ferè est amethæstinus ad cinereum vergens, adeò, ut lutescere videatur, estque unus tantum oculorum ordo nigrorum, majorumque, hos

hōs circulus ambit candidus. Corpus etiam supinum totum lutescit, pedes cinerei sunt, alæ externæ prope caput cinereæ, nigrisq; guttulis oblongis notatæ, dein majori parte coloris sunt miniacei, & nigris maximas maculas habent, denique in extremo sunt rursus cinereæ.

Tertius, qui quarto loco depictus est, toto corpore pronè aterrimus, aterrimæ item alæ externæ, sed fascia ferè transversali coloris miniacei decoratæ, nec non alterius fasciæ candidæ rudimento, & punctulis aliquot rotundis, candidis. Internæ totæ ferè extrâ miniaceæ sunt, punctulisq; nigris admodum exilibus insignes.

Quartus, in icone quintus, cum hoc idem est, sed supino corpore pictus, alæ externæ hîc plus habent ex miniaceo & albo colore, quàm in prona parte, aterq; color remissior est. Internæ in extremitatibus ad miniaceum vergunt, cætera cinereæ, fuscis maculis resperæ, & alba ad latera externa macula conspicuæ, toto corpore ad cinereum vergit.

Quinto, in icone sexto, color totus miniaceus, notis diversis, lineisq; nigris, alis angulosis & leviter scarratis. Promuscidem habet longissimam, ac, dum vult, recurvam ejusdem cum pedibus coloris, nempe ex cinereo ad luteum vergentis.

Ex hoc genere *Sextus*, in icone septimus, esse videtur, longa item armatus proboscide, alisque præditus angulosis. Supra caput, præter antennis, etiam bina alia habet cornua, quæ in alijs plerisq; non videas, corpore, alisque colore ferrugineo; albo, cæruleo, viridiq; varius est. In supremis præterea alis puncta quedam habet viridia in alba area, in dorso item viridescit.

Septimus, in figura octavus, totus luteus est, versus caput tamen alæ ad ferrugineum vergunt, nimirum ubi maculas non habent, suntq; hæ numerosæ admodum, ac in eervi ordinis, omnes aterrimæ.

Octavus, in tabula nonus, idem est supinè sculptus, quod colorem mu-

ter, interne enim alæ partim viridescunt, partim candicant, & maculæ illæ atræ vix hic conspicuæ; externæ ferè palearis sunt coloris, inque his maculæ evidentiores, corpus etiam flavescit, pedes habet luteo, antennis castaneo colore, alæ utraq; leviter angulosæ.

Postremus in hac serie corpore nigroque capite & hirsuto, proboscide procera admodum, alis intus candidis, amethestinis striis ornatus, extrâ nigrificantibus, suntq; angustæ, laciniatæ & longiusculæ.

PUNCTUM V.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula quarta.

TAbula quarta Papiliones mediores sunt, ijque duodecim iconibus exhibentur.

Primus complicatis alis literam A quodammodo exprimit, corpore est prono fusco, pedibus hirsutis, antennis admodum exilibus, alæ externæ ex candido & aterrimo splendidibus coloribus variant, internæ totæ sunt miniaceo.

Idem supinus exhibetur *tertia* serie, in quo color ille miniaceus dilutior est, externæque alæ totæ candicant, venis decoratæ miniaceis & maculis nigris, magnis, & corpus totum ex albo lutescit, alvus nigris punctis sive guttis exiguis conspersa est.

Secundus est hirsutus & crassus, alis supernè cinereis, infernè miniaceis, lineis transversim nigris dissectis.

Quartus corpore est exiguo, nigro, luteis circulis distincto, oculis magnis, luteis, & ejusdem coloris antennis, alas habet tam internas, quàm externas etiam luteas, in extremo nigras, versus corpus ad castaneum vergunt, versus nigram verò ambientem fasciam planè est color ochros. Externæ prope exteriora latera maculam habent rotundam, nigram.

Quintus totus est ferrugineus sive castaneus, corpore intensius, alis remissius, alæ externæ unico tantum

oculo, pluribus internæ exornantur nigris, intus albis, utræq; fascias habent nigras transversales incurvas, quæ angustæ sunt, rectasq; quæ latæ sunt & extremæ.

Sexto capit est luteum, oculi lutei, luteique pedes & antennæ, corpus nigricat, alæ utræq; ferè auræ, in extremo, ut icon ostendit, aterrimæ, externæ ad latera externa maculam habent rotundam, nigram, exiguam.

Septimus ex luteo totus ad viridem colorem vergit, minus in exterioribus, magis verò in interioribus, hoc est, interiores exterioribus magis viridescunt. Externæ maculam habent nigram, rotundam, internæ albam, caput quoque nigra macula insignitum est.

Octavus antennas habet proceras, in fine obtusas, caput exiguum, oculos magnos. Corpore est luteo & nigro distincto, alæ quoque luteæ sunt, sed magis ad castaneum vergunt; externæ nigris punctis maculantur, quibus internæ carent, utræque dentatæ sunt.

Nonus ex eorum genere est, qui proceras habent proboscides, alis est primum versus caput luteis, nigris modò punctis, modò maculis, hisque & rotundis & longis maculatis, dein cæruleis, in extremo nigricantibus & dentatis.

Decimus propter insolentem vulgum, quo Satyrum quàm exactè æmulatur, *Σατυροειδής* dici potest. Corpore toto est flavo, rubro distincto, alvo bifurcata, alis nigricantibus, & velut stellis candidis elegantissime exornatur.

Undecimus corpore est nigro, alvo annulis albicantibus, alæ ejus ex albo ad luteum vergunt, sed maculæ ferrugineæ & nigrae alternatim huc illicque conspersæ luteum illum colorem ferè extinguunt suâ copîâ.

Postremus corpore etiam atro est, sed tenuiori, habetque alas internas dentatas & exterioribus proceriores, utræque aterrimo & lutescente coloribus variæ, habent tamen etiam in fine aliquid candicantis.

PUNCTUM VI.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula quinta.

Habet & quinta tabula mediores, quorum sex icones Autor ponit.

Aldrov.
l.c.

Primus corpore est nigricante, alvo extrema & dorso cinereis. Alæ externæ internis sunt angustiores, ex albo ad viridem nonnihil inclinant, magis tamen viridescunt internæ, utræque in extremo circum circa rosei coloris velut circulo ambiuntur, externæ prope finem nigrescunt, habentque in medio ferè maculam nigram. Antennæ purpureæ sunt, in extremo obtusæ & albæ.

Idem *secundo loco* datur supinus, in quo, quod in externis alis prope finem erat, nigricat, hinc viridescit, sed macula tamen nigra colorem retinuit nigrum, internæ prope corpus prorsus virides, in fine ad luteum vergunt, cingunturque eodem circulo roseo. Estque hoc observatu dignum in internis, quod maculam habeat albam cum circulo ferrugineo, quæ extrinsecus non est.

Qui sequitur pronè & supinè pictus, à potioribus coloribus λευκοχλίος dici potest, sed hunc, quia admodum maculosus est, λευκοχλίον variegatum nuncupavi. Prono corpore leucophæo est, capite nigricante, oculis instar saphiri viridibus, antennis nigris cum appendicibus in summitate albicantibus, pectore hirsuto, alis candidis, supra prope caput ad cæruleum vergentibus, maculis magis nigricantibus, inferius resperitis, dico inferius, nam, ubi cæruleæ sunt, nullam cernere est maculam, supino corpore magis candicat. Alæ externæ sunt candidæ & nigro variæ, internæ ex albo & viridi eleganter admodum decoratæ.

Quintum Papilionem *crucigerum* nominavi, quod externis alis complicatis, albis tæniis, quibus ornatus cernitur, crucem, vel potius literam X. exprimat, quanquam id in iconè pictor

pietor non exprefferit. Sunt itaque alæ illæ nigræ, fasciis seu tæniis albis insignes, & venis rubicundis deorsum descendentibus. Interiores sunt totæ miniaceæ, maculis nigris rotundis illustres. Sextus idem est parte supina exsculptus, in cuius internis alis maculas illas nigras non videas, & fasciæ, quæ in externis alis pronâ parte albæ erant, hîc aureæ sunt. Corpore est iste Papilio pronè luteo toto, supino ventre albo, nigris guttis triplicis ordinis consperso, oculi nigri sunt & exigui, exiguæ exilesque antennæ.

Sextus ac postremus alas externas ac internas exterius rubicundas, ad castaneum vergentes habet nigris guttis conspersas. Supinâ parte alæ internæ candicant, exteriores colorem eundem fermè, quem prona earum pars, conservant. Corpus pronum atrum est, supinum cinereum, cinerei quoque pedes, antennæ nigræ, oculi lutei prominentes.

PUNCTUM VII.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula sexta.

Papilionem, qui in tabula sexta primo depingitur ordine, *πυλὸς-οὐλμων* nuncupavi, quod in internis alis intus ac extra multis notaretur oculis, qui tamen, licet duo tantum, in externis exterius & interioribus elegantiores sunt. In his enim iris est nigerrima, pupilla alba. Alæ supinè ex luteo & castaneo variant, internæ intus prope corpus primum cœruleæ, dein ferè amethystinæ, in quo colore cernere erat lineas duas transversales, flexuosas, castanei coloris, sub quarum postrema color subsequitur luteus, deinde rursus amethystinus. quem lineæ percurrunt castaneo colore, atque intra has sitæ sunt, quos dixi. oculi, quos

subcœruleus cingit circulus Corpus animantis nigricat, pedes & antennæ lutei, oculi nigri.

Alter alas habet dentatas, rubicundas, ad ferrugineum accedentes, & maculis respersas nigris, in medio rotundis, ad latera oblongis ac magnis. Alæ supinè nigricant, & albam fasciam habent, quæ vel currentes æmulatur fluminis undas. Corpus supinum cinereum est, pronum nigricat.

Separatim in Bononienſi editione depictus ex iis est, qui in arborum truncis nascuntur, capite admodum exiguo, albo, antennis ferrugineis, latis & quodammodo ferratis, dorso ferrugineo & albo, alis alvòq; luteis, zonis castaneis.

PUNCTUM VIII.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula septima.

Sed & illi, qui in tabula septima dantur, ex mediocribus sunt, quorum tredecim figuræ dantur.

Primus corpore toto niger est, annulos verò habet luteos, alæ omnes candicant, & venis distinguuntur nigricantibus.

Tertius & Secundus Bombylij sunt, ex erucis bombycivomis orti, vulgò noti, undique candidissimi, exceptis antennis, quæ nigræ sunt & hirsutæ, invicem coeunt, mas est tenuiori corpore, secundo scilicet loco pictus. Inter utrumque ova appinximus exigua, coloris ferè crocei, alas habent breves, & ad volandum velut ineptas.

Quartus in hac serie totus quoque candicat per alas, per quas venas habet subcœruleas, deorsum descendentes, & punctorum rubicundorum triplicem ordinem, quæ transversalia sunt. Externæ duobus velut oculis nigricantibus decorantur, in extremo ad luteum vergunt oculi & deorsum lutescunt.

Quintus corpore ex crasso, castaneo, luteis zonis, antennis habet ferrugineas, latas & hirsutas vel plumosas, in capite & cervice candicat. Alæ etiam albæ sunt, ferrugineas habentes venas, & ubi corpori herent, striarum nigrarum rudimenta.

Sextus totus est candidus, corpore scilicet ac alis, quæ venas habent nigras, nigros item pedes & antennis.

Septimus μολύχλος dici potest propter colorum diversitatem, corpore toto nigricat, non nihil tamen ad ferrugineum vergit, sicut item pedes, proboscides & antennæ, quæ admodum tenues sunt & obtusæ. Alæ internæ totæ sunt miniaci coloris, sed nigris lineis flexuosis distinctæ, externæ, quæ corpori annectuntur, atræ, dein miniacæ, dein rursus atræ, mox albæ, postremò iterum nigræ, maiorem tamen aream albus color occupat, cumque percurrunt venæ ferrugineæ, rubescentes, notandumque est, album illum colorem infra versus corpus in luteum commutari, & guttis modò rotundis ac exiguis, modò oblongis distingui.

Octavus superioribus omnibus minor est, corpore prono nigricante, alis ex luteo ferrugineis maculis nigris refertis.

Nonus idem est, at supinè pictus corpore, quod candidum est. Alæ externæ colorem retinent, internæ planè mutant, utpotè quæ maculosæ sunt argenteo splendidissimo, & ferrugineo.

Decimo alæ externæ ac internæ nigerrimæ, maculosas habent alas, uti pictura indicat, corpus etiam nigrum est.

Vndecimus corpore ex luteo ad ferrugineum vergit; & nigro distinguitur; Alæ exteriores ex albo & nigro variant, internæ luteæ sunt, & quatuor nigris maculis insigniuntur. Externæ supino corpore pictæ, ut *duodecima* icon ostendit, etiam ex albo & nigro variant quidem, sed ad latera sunt ferrugineæ, internæ colorem retinuerunt, sed nigræ illæ maculæ minores sunt, in extremo tam hæc, quam illic nigræ sunt.

Decimustertius, qui in hac tabula postremus est, totus est ferrugineus, alæ externæ in medio oculum habet, cujus pupilla alba est, nigrum, internæ denticulatæ sunt, utraq; in extremo nigricant.

PUNCTUM IX.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula octava.

Minimi sunt, qui in tabula octava depinguntur, inter quos qui *tertio loco datur* non inuentus est, triplici nimirum colore, albo, ruffo & luteo varians per alas. Nam lineæ, quæ in his cernuntur, & transversales & descendentes ruffæ sunt, cætera vel candida vel lutea, punctis etiam notata ruffis, corpore angusto, exili & nigricante, alvo bifurcata, pedibus exilibus & proceris.

Huic consimilis est quodammodo *secundus*, corpore item nigricante, sed crassiori, crassiori item capite. Alæ externæ luteæ sunt, supernè magis, minus verò infernè, utrumque transversalis linea nigra distinguit, totæ maculis, seu punctis exiguis nigris sunt distinctæ, internæ nigricant, & in extremo fascias angustas habent luteas.

Primus toto corpore niger est, alvo in extremo acuta, alis rotundis, candidis.

Quartus corpore quoque nigricat, oculos habens luteos, alas ex luteo ferrugineas, ubique nigerrimis decoratas notis.

Quintus lutescit, punctis insignis cinereis, quæ totas ferè alas occupant. In externis alis macula conspicitur nigra, neque aliud in hoc notatu dignum, ut in præcedenti, maculas habent cinereas in area lutea.

Septimus corpore & alis totis subalbis est, pedibus & antennis nigris, in medio externarum macula est nigra.

Octavus alvo est rubrâ, nigris punctis notata, pectore & externis alis nigris quidem, sed nescio quid cærulei

fulei etiam demonstrantibus. Alæ internæ luteæ sunt, striis plenè nigris, deorsum descendentes.

Nonus corpore est admodum brevis & exili candicante, alis item candidis, ad latera subluteis, undiq; nigris guttulis refertis. In medio duæ tæniæ sunt coloris aurei, tortuosæ, in singulis gyris punctum habentes nigrum.

Decimus toto corpore candidus est, & nigris punctis variat, alas verò habet pulcherrimas, majori areæ parte ferruginei coloris, in quo mirum est, quàm luserit natura. Primum enim in eo fecit fasciam ex maculis rotundis, litteram O. exprimentibus, dein parva addidit ejusdem coloris puncta, postmodum alias duas tæniæ tortuosas, tum denique albam cum punctis intus nigris.

Vndecimus niger est, alas verò habet ex ferrugineo ad luteum vergentes, totas nigris, ut icon ostendit, maculis distinctas.

Duodecimus crassam admodum habet alvum, coloris propè cærulei, luteæ fasciæ sive circulo insignem. Tergus nigricat, ut & caput, & oculi, pedes & antennæ, quæ admodum sunt proceræ. Alæ versus corpus cæruleæ, deinde nigricant, suprâ duabus maculis rotundis luteis, infrâ tribus albis conspicuæ.

Decimotertio corpus est nigrum, præterquam in dorso, ubi cinereum est. Alæ luteæ, auro resplendentes, oculis innumeris nigris, quos circulus ambit candidus, cohonestatæ.

Decimusquartus hirsutus est, ac alis totis cæruleis parte externa, interna cinereis, maculis albicantibus (in quibus mediis punctum est atrum) ordine pictis, in extremo margine notis rubicundis oblongis, oculis caudæ pavonum similibus, albo ac nigro utrinque clausis dispositis, lineæque nigra in latitudinem alæ discurrente terminatis. Totum corpus nigerrimum, item pedes, oculi, & antennæ. Alæ in fine albæ sunt, cætera, ut dixi, exterius cæruleæ.

PUNCTUM X.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula nona.

Nona tabula viginti quatuor habet Papiliones exiguos, quorum equidem infinitus est numerus, infinitaque diversitas.

Primus in hac serie corpore pro no nigricat, pedes & antennæ sunt cinerei. Alæ prius nonnihil ad ferrugineum vergunt, mox candicant, punctis & lineis ubique atris conspicuæ.

Secundus corporis mole vix culicem vincit, quin, nî alas Papilionis haberet, culex omninò foret. Alvus ei cinereus, pectus nonnihil ex cæruleo possidet, alæ albæ sunt, ita tamen, ut nonnihil etiam fuscescant, habentque puncta minutissima nigra cum circulis ambientibus ea candidissimis.

Tertius πολύχλωρος minimus dici poterit propter alas albo, nigro, rubro & subcæruleo maculosas; Externæ in notabilem acutiem desinunt, corpus ei totum subatrum est, proboscis & antennæ lutescunt.

Quartus alas habet aureas, in margine ferè castaneæ colorem imitantur, prope extremitatem est macula ferruginea, alvus argenteo micat, pectus superna nigricat, in capite duo sunt puncta coloris argentei.

Quintus ex iis est, qui ad ignem candelarum advolant, corpore subcinereo, alis totis candidis, lineis sive venis ad ferrugineum inclinantibus.

Sextus alas habet infrâ nigras, cætera coloris rutili. Corpus cum antennis & pedibus nigrum est.

Septimus quoque niger est, sed circulis, sive annulis duobus per alvum luteis distinctus, oculi quoque lutei sunt, alæ supernè magis, infernè minus nigricant, & maculis ubique infusiuntur candidis.

Octavus ex advolantibus etiam ad lucernas est, alvo coloris flavi, nigri, ut in icone apparet, punctis recta deorsum vergentibus insignis, reliquo corpore candidissimo, alis item candidissimis, sed quæ exiguis admodum ferrugineis ferè punctulis insigniuntur, & in fine nigricant.

Nonus septimo similis, sed corpore major est, minoribusque contrariis, & in quibus majores maculæ albæ sunt, & velut argento resplendent.

Decimus alas pro corporis portione breves habet angustasque, alvum admodum proceram, nigricantem, annulis candicantibus distinctam, alæ leviter pallideque lutescunt.

Vndecimo caput magnum ac nigrum, corpus & internæ alæ miniaci coloris, lineis transversalibus nigris in extremo insignitæ, externæ totæ sunt coloris castaneæ, pedes brevissimi.

Duodecimus corpore est flavescente, proceroque, dorso crassiusculo, in quo color ille flavus paulò est intensior, capite exiguo ac rotundo, pedibus brevioribus, alis candicantibus, vel pallide lutescentibus.

Decimustertius vulgarissimus ille est, qui candelarum lumini infestus est; Corpore est admodum exiguo nigricante, alis & antennis flavis.

Decimusquartus internas alas totas habet rubras, supernasque ejusdem coloris, sed ad internos margines cinereas. Corpus totum atrum, præterquam in cervice, ubi circulus aureus est, pedes sunt rubicundi, antennæ nigræ, in extremo obtusæ.

Decimusquintus idem est supino pictus corpore, ut alvi crassities magis appareret. Nam alioqui nihil, vel parum differt. Fœmina erat, & ova mihi peperit rubicunda.

Decimosexto corpus est oblongum, & fuscescit infernè, supernè argenteo micat. Alæ ejusdem sunt coloris fusci, & argento auroque micantis.

Decimusseptim⁹ toto corpore nigricat, alas habet ferrugineas, sed elegantissimè aureo colore resplendentes.

Idem *decimooctavo* loco exhibetur supinus, quia variat admodum. Nam corpore toto candicat, alæque minus sunt ferrugineæ, minusque resplendent auro, sed contrà innumeris punctis atris maculantur, quas circuli sui ambiunt candidi. Habent verò eandem fasciam auream, prope extremum marginem.

Decimusnonus alvo admodum est procera, tota lutea, cervice nigra, pedibus, antennis & summo capite candidissimis, alæ quoque candidissimæ sunt, sed striis five lineis nigris interstinguuntur, suntque adeò breves, ut ad volandum videantur esse inutilles. Nam hoc in eo observavi, quod continuo foliis, velut zoophyton quoddam, adhæreat.

Vigesimus, nisi alas haberet latiores, ex muscarum potius, quam Papiilionum genere videretur. Corpore enim est admodum compacto, nigricante, alis ex cinereo ad castaneum inclinantibus, & aurum resplendentibus.

Vigesimusprimus ab alis tam internis, quam externis prorsus argenteo splendore emicantibus, argenteus dici potest. Corpore præterea toto candido est, præter oculos, qui nigri sunt, & antennas, quæ sunt luteæ.

Vigesimussecundus toto corpore atterrimo, alas habet nigras colore ruberrimo distinctas, pedes & antennas longiusculos, nigros.

Vigesimustertius antennas habet latissimas, hirsutas ac velut plumosas, coloris flavescentis, caput & alas candidissimas, has tamen fusce trās-eunt lineæ subtilissimæ. Alvus tota crassa est & gravis colore luteo, nihil, vel parum volat, foliis semper adhærens.

Postremus omnium minimus, brevioribus tamen, quam par est, ac latioribus alis pictus, Sunt enim angustiores ac oblongiores, totæ albicant. Triticiarius dici potest. Nam tritico infestus est, ut potè ex tritico prognatus.

* *

PUNCTUM XI.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula decima.

DE istis etiam ita Aldrovandus: Papilio *primò ordine* in hac decima tabula depictus figura corporis est admodum insolenti. Habet enim in albo seriem quandam velut plumarum subtilissimarum, penicillos pictorum exactè exprimentium, coloris partim albi, partim nigri. Corpore toto admodum crasso est, dorso & vertice summo cinereis, alvo lutea, annulis distincta atris. Inter quintum & sextum annulum ab utroq; alvi margine macula est candidissima, inter sextum verò & septimum aterrima. Alæ exterius ex cinereo fuscescunt, intus sunt rubicundæ, corpore supino, sicuti etiam, qui *secundo loco* depictus est, candicat. Antennæ latæ sunt, & ex cinereo fuscæ. Alvus supina nigra est, in medio candida. Ad mediocres pertineret, nisi tam crassus esset.

Tertius ex minoribus est, alvum habet luteam, nigris zonis distinctam. Alæ quoque flavescunt, tergus ferrugineum est, ejusdemq; coloris antennæ, quæ latæ sunt & hirsutæ, supino ventre albicat.

Quartus alvo quoque lutea est, sed magis ad croceum accedit, & punctis notatur in medio deorsum descendentibus aterrimis. Alæ internæ ejusdem cum alvo sunt coloris, & similibus quoque punctis maculantur, exteriores leviter pallideque lutescunt, tergus & antennæ colore sunt ferrugineo, pedes croceo. Habes eundem alis complicatis, prout ex sua chrysalide erumpit.

Sextus valdè est exiguus, corpore superno fermè ferrugineo, inferno planè aureo, alas habet luteas ad croceum vergentes, admodum parvas.

Septimus corpore nigricat, alas habens luteas ad ferrugineum nonnihil vergentes, & ferrugineis venis

distinctas. In exterioribus macula est nigra, rotunda, puncto intus albo.

Idem est, qui *octavo loco* depingitur erectis alis, quæ eundem planè colorem retinent, præterquam ubi corpori junguntur, quâ parte ad cœruleum vergunt, habentq; lineam albam, quæ medias percurrit.

Ex minimorum genere est, qui *nò loco* exhibetur, corpore cinereo, nigrescente, alis cinereis admodum obscuris, internis luteis. In externis macula est candida, literam V. exactè exprimens, item altera figura semicirculi.

Decimus alas habet longas & angustas, colore flavescente, fasciis sive tæneis ornatas tribus atris. Pedes & antennæ flavescunt, oculi admodum exigui sunt & nigri.

Postremus omnium minimus Papilio est triticiarius rectius, quàm in præcedenti tabula exaratus, simul cum sua chrysalide, & vermiculo sui ortus. Alas habet, ut cæteri, quaternas, albidus totus, cinereusque, corpore levi in acutum alvo desinente, argenteo splendore. Vermiculus iste Curculio vocatur.

PUNCTUM XII.

De Papilionibus Aldrovandinis tabula undecima.

RAriores sunt & formæ insolentioris, qui in undecima tabella depinguntur. Ex quibus *primus* alvo est crassissima, supernè candida, infernè nigrescente, seu potius ad cœruleum inclinante, annulis & punctis distincta nigricantibus. Tergus ac caput candicant, admodum hirsuta. Antennæ latissimæ ac villosæ, coloris ferè amethystini. Alæ ex amethysto & cyaneo mediæ, venas habent rutilas primum, post nigras: In extremo candicant, ubi punctis maculantur exiguis, aterrimis. Pedes robusti, ejusdem cum antennis coloris. In alvo notatu dignum est, quod in ex-

in extremo longè crassior sit, quàm ubi corpori jungitur.

Secundus ex eodem vel consimili genere, licet minor, corpore est fusco, capite acuto, oculis protuberantibus, per tergus & summo vertice cinereis, alis brevibus pariter cinereis, internè prope alvum rubicundis. Antennas non rectà, ut cæteri, erigit, sed ad latera extendit.

Tertius ex eodem quoque est genere, & ipse acuto capite, & ad latera emittens antennas suas. Corpulentus est, crassiori tamen thorace, quàm alvo, quæ nigris extenditur annulis. Toto corpore superno leucophæus est, infernè candicat. Alæ totæ fuscae sunt, internæ, quæ ventrem spectant, nonnihil possident rubicundi.

Quartus totus ex cinereo fuscus est, alas habens longiusculas & angustas. Alvo est crassa & bifurcata. Hæc annulis, alæ venis insigniuntur ferrugineis. Caput admodum breve est, antennæ minutissimæ, ac vix apparentes.

Quintus insolentis formæ caput obtinet, à cujus lateribus duo sunt tubercula rotunda, nigra multis capillamentis nigris hirta, & in extremo alia duo, sed quæ ejusdem cum capite sunt coloris, nimirum ruberrimi, qui quoque color communis est tergo, à cujus quoque lateribus duo alia sunt tubercula nigra, ut priora. Alæ ex infima tergoris parte exoriuntur, colore ferè nigricante, luteis aureisque lineis & guttis refertæ. Alvus est bifurcata, tota lutea, rubris zonis interstinctæ. Pedes & antennæ nigrificant.

Sextus tota alvo rubra est, aureis prope finem lineis notata, in quibus puncta sunt rubra. Alæ primum luteæ sunt, dein totæ nigrae, albis conspersæ punctis, & lineis distinctæ aureis. Caput villosum est & nigrum, tribus antennis instructum, ut pictor pinxit.

Septimus minimorum generis alis est denticulatis lutescentibus, nigris lineis & punctis rubris insignibus; al-

vus albida est bifurcata, nigris lineis ornata ambientibus, pedes nigricant.

Octavus alvum item habet bifurcatam, sed crassiorem, ejusdem prorsus cum præcedente coloris, sicut & ipsæ alæ, sed quæ loco punctorum in extremitatibus infernis rubescebant.

Nonus crassissimam habet alvum rubram, supernè luteo distinctam, alas angustas ferrugineas, nigris lineis refertas, dorsum candicat.

Postremus alvo est crassiuscula, alis & toto corpore cinereis, pedibus nigris.

PUNCTUM XIII.



De Papilionibus Moufeti, & primò quidem de Phalenis magnis.


NON cedit Aldrovando Moufetus. Plurimas enim tam nocturnarum, quas Phalænas vocari diximus, quàm diurnarum species, easque in magnas, medias & minimas distinctas dedit, quas hic etiam exhibere placuit. Et magnarum quidem octodecem species habet.


Maximæ Phalænæ venter arenosus admodum coloris est, uti & interna alarum pars; oculi cærulei videntur, caput verò lividum; inter oculos antennæ duæ emergunt subfuscae, aquilinum referentes fucum, & nigris transversim lineis funem contortum imitantes. Scapulis veluti pannus quidam adhæret arenosus, sordidus, à quo macula nigra decussati tracta scapulas finit. Cæterum corpus, si dorsum spectes, cyaneum, si ventrem, arenosi coloris est. Alæ duæ exteriores permagnæ, aquilinas colore æmulantur, maculis albisque orbibus variè distinctæ; internæ multò sunt minores, atque mellinæ, intrus furvis strilis & maculis quibusdam insignes: Crura habet lacertosa & valida, furvi singula coloris, & in extremo duobus nigris digitis forcipata. Volat magno cum strepitu, &


nocte

Moufeti. de Insector. 1. 2. 14. p. 89. ad 94.









nocte exoculata, quemcunq; splendorem ex ligno putrido, squamis piscium, aliis verebus ortum avidè consequitur. Sicut magni Tyranni minorum gentium nobiles devorant & hauriunt, ita hæ nocturnæ diurnas Papilioes sub foliis latitantes alis diverberant atque occidunt.

Secunda primæ magnitudinis Phalæna, ut mole corporis non nihil superatur: ita primam colorum harmoniæ, tono & elegantia longè vincit: ac si naturâ in hac ornanda pigmentariam suam omnem officinam exhausisset, atq; illam primam, Regem Papilionum, id est, fortem, frenum, nigellum, lentiginosum, hanc verò Reginam, mollem, tenellam, comptam, unionibus, gemmisq; confitam, opere plumato & Phrygio superbientem fecisset. Corpus lanæ quasi anserina, non nihil lævigatum & hirtum. Martis, vel Sabellionis potius pellem mentitur, capite est parvo, oculis magnis prominentibus, antennis plumiformibus duabus, buxeum colorem referentibus. Alas habet quatuor magnas singulas multicolore oculo donatas, quorum pupilla nigra, iris *πολύχροος*, circulis & semicirculis mellinis, flammeis, albis & nigris pulcherrimè distincta. Externæ alæ ab exortu ad oras albicant, nigris quibusdam venulis punctulisque insignes. Oram ipsam peniculamentum cum limbo ornat, exortu surdè fuscum, sive subflavum. Internæ alæ fusce videntur, uno quoque oculo superiorib. conformi prædictæ, tribusq; institis ornata: harum prima plana est, media opere dentato excurrens (ignei utraque coloris) extrema verò subalbida, & veluti à pellationibus asluta, cruribus incedit validis, hirsutis, lacertosis, eiusdem cum reliquo corpore coloris. Hanc Carolus Clusius Vienna misit tam elegantem formam notabilem, ut suspicere potius admirarique eam, quam verbis aptis describere facilius sit.

Tertia est corpore magno, hirsuto, nigricante; singulæ alæ uno oculo notantur, cuius pupilla nigra, circulus fuscus, semicirculus albus. Varii

quasi panni in alis conspiciuntur dilutò amethystini, fimbriæ verò alarum extremæ primùm cinerei, deinde aquilini coloris videntur. Caput valdè breve & exiguum, unum utrinque oculum coracinum emittit, pupilla albissima insignem. Inter hos duæ antennæ valdè breves & exiles fusci coloris erumpunt. Ex pilosa eruca oritur, non glabra.

Quarta caput habet magnum fusci coloris, è quo duæ antennæ rectæ & subnigræ surgunt. Collum miniata macula ornatum, pectus hirsutum, quadratū, fuscum. Scapularum pars anthracina, venter amethystinus quinque vel sex orbibus nigris dividitur. Pedes picei videntur, alæ leviter fulcæ, subnigris in longum venulosis satis conspersæ.

Quinta caput albescit, oculi nigrescunt, cornicula aliquantum flavescunt, alæ exteriores longæ ex fusco atque albo surdescunt, interiores leviter & quasi obiter pictæ rubescunt. Scapulæ nigerrimæ conspiciuntur, reliquum verò corpus subroscum, septem nigris circulis linea albescente per medium totum ventrem currente alligatis ornatum.

Sexta caput scapulæque, atque exteriores alæ, sanguineis venulis lineatæ ex fusco albescunt: Capitis oculi propenduli, hyacinthini videntur, vel potius cyanei. Internæ alæ non nihil incarnatæ oculum media sua parte repræsentant; pupilla corvina, circulo hiacynthino lucentem. Corpus carnem arescentem, & leviter infumatam refert, sex quidem orbiculis ex nigro atratis notatum.

Septima alas habet exteriores albas, fuscis quibusdam maculis undulatis variegatis insignes; collum miniata quasi pellis circumcingit, ad totas deinde scapulas capucii instar decurrens: caput rubrum, oculi margaritei, antennæ flammeæ videntur. Alæ internæ rutilæ, tribus nigris maculis lentiginosæ, pedes rubri, venterq; totus concolor, incisuris septem plenius miniatis & transversim ductis conspicuus.

Octava tota ferè Bætici coloris est;

H nisi

nisi quod omnium alarum extremitates buxæ videantur, uti etiam media antennarum pars.

Nona illi ferè est similis, sed extima alarum pars arenam nigriorem refert. Cornicula verò lata habet & repanda, ex fusco albicantia, mediam externarum alarum partem candidam rotunda macula adornat.

Decima parilem præ se fert magnitudinem, ex albo tota furvescens, nisi quod media alarum extremarum pars puncto admodum albo, oculus verò pupilla valde nigra conspiciatur.

Undecima caput tuberosum, cornicula exilia, corpus atque extima alarum pars lutum subactum æmulantur, alias verò alæ totæ obscuræ argenteæ fuissent.

Duodecima videtur subcinerea, alis nigris quibusdam maculis infestis, oculos item habet nigerrimos, pupilla candida lucentes.

Decima tertia antennulas vix ostendit exiguas, toto corpore flavescit, præter oculos (qui exigui & nigri) atque alas, quæ albidæ videntur.

Decima quarta varii coloris videtur, cornicula tuberosa nigra habet, uti & ocellos & pedes. Scapulæ albis quinque veluti plumis ornantur, quarum utramque mediam res nigræ maculæ occupant. Alæ niveæ nigris, luteis & cœruleis hic illic maculis pinguntur. Corpus illi nigro-cœruleum, articulatam, & juxta latera albicans; caudam pro arbitrio exerit vel recondit, mucronatam, subluteam, articulatam: totum corpus pulvere quasi conspersum; alias enim corniculorum tuberantium gratia in papilionum classem venisset. Ova numerosa ponit, sublutea, ac inter excludendum caudam exilem exerit, ac deinde pro libitu recondit.

Decima quinta cornicula duo habet nigra, exilia, caput atque scapulæ hirsutæ, fusci coloris, collum miniato torque decoratur, femora rubescunt. Alæ extremæ ex fusco & albo scutulatæ vel undantes potius. Intimæ verò exactè rubent, maculis

piceis infectæ. Corpus leviter miniatum institæ fex nigræ orbiculatim circumeunt.

Decima sexta mira admodum videtur, si supinam videris ubique, Xerampelinam dixeris, si pronam, ex viridi lutescentem. Scapulas autem pronas quinque ruberrimæ lineæ deductæ ornant, sicuti & septem medio dorso puncta affixa reliquum corpus. Alæ item Xerampelinis transversim maculis vel umbris potius visuntur, quarum exortus à capite ad pectus usque infimum albescente linea terminatur.

Decima septima, si compressis eam alis incedentem videris, fusca videtur, si verò expansis volitantem, alas interiores explicat coloris incarnati, sed nigricante limbo juxta oras distinctas. Corniculis donatur oblongis, & involuta quasi promuscide, canescentes scapulas macula arensa rotunda inficit, latera item & corporis omnes articuli ceu canis conferti & fimbriati videntur.

Decima octava. Clusius misit perpulchram: Antennæ illi albo-nigræ, caput piceum, nasus aduncus, oculi circulus candicans, collum coccineum, scapulæ hirsutæ, nigro quasi pallio vestitæ. Alæ exteriores nigris albisque institis interpolatæ, interiores rubræ, nigris hic illic maculis ornatae. Corpus habet piceum, sicut & pedes, sed latera corporis septem utrinque maculæ ornant sanguineæ.

Huic affinis illa, quæ est antennis omnino coracinis, mediisque scapulis instita candidissima, ceu margaritarum linea ornata.

†

PUN-

PUNCTUM XIV.

*De Phalanis mediocribus**Monfeti.*

MEdiæ molis Phalanarum septemdecem exhibentur species.

Prima ferè albescit tota, nisi quod alæ exteriores nigris nonnullis maculis & lentiginibus; interiores verò quasi variolis & morbillis ruberrimis medio albescantibus sædantur: oculos item nigerrimos, pedes, antennis subluteas habet. Nasi loco capillus provenit hirsutus, veluti in spiram sæpius involutus.

Secunda corpus totum habet hirsutum atque spadiceum, cuiusmodi alæ exteriores, (absque maculis fimbriisque albicantibus & oculo luteo fuisset): Antennas flavas nigra punctula adornant; internæ alæ calendularem colorem referunt, sed ocellis quibusdam & fimbriis uti exteriores nitent.

Tertia alas habet quatuor albas, exteriores autem cœruleæ quædam venulæ affluentius sparsæ infuscant, duæque in medio rotundæ, nigricantes maculæ adornant; linea circum alas ducta mellina videtur, qualis antennarum color, corpus caputque nigricant, oculos habet albissimos, scapularumque latera quatuor utrinque lineæ albissimæ obliquæ decorant.

Quarta cornua gerit repanda grui coloris, corporis nigri latera canescunt. Alæ subluteæ nigris multis maculis serpentariam æmulantibus inficiuntur, superius latis, inferius orbicularibus: fimbria alarum Vespertilionum more dentata & veluti spinosa nigerrima est tota, quam intus sex utrinque margaritæ positæ commendant.

Quinta tota est anthracina, nisi quod maculæ ex albo rubescentes alarum faciem adornant.

Sexta corpore & antennis nigerrima oculos albos obtinuit. Alæ illi

subtus coracinæ, extrâ aureis villis atque maculis conspicuæ, quibus vicissim lati clavi nigri coloris & argenteo quasi filo transfixi adhærescunt: extimas quoque alas mæander quidam ornat nigerrimus, auro subtus fuso & quasi striatim acupictio.

Septima laticornis, corpus nigrum cancellens, nescio an dedecori sit magis, quàm decori. Alarum primordia rubent, reliqua flavescit pars; utramque verò partem nigræ tessellæ laminatim positæ inficiunt, quarum extremitas linea una aurea splendet.

Octava quatuor cornicula habet racemosa, cinerea, duo autem prælonga, & extremitate latiora: corpus aliquale septimæ alas subcinereas obtinet, nigro tessellatas, & circa extremam oram guttis eiusdem coloris æqualiter pictas.

Nona caput, oculi, antennæ, corpus, internæque alæ arenam illam auriferam repræsentant; scapulæ externæque alæ nigrescunt, nisi quod instita quadam nigerrima lineis utrinque cinereis decorata ornantur.

Decima corpus habet luteum, nigris quibusdam guttis à collo ad caudam usque lateribus & dorso insignitum; oculi, antennæ, pedes nigerrimi; alæ exteriores candidæ, sed limbis flavis, clavis angustis nigris, maculis quoque nigris distinctæ.

Undecima alas si videris, niveam dixeris vel lacteam, nisi illam minimæ hic illic nigerrimæque maculæ inficerent vel ornarent potius; scapulæ item papposæ albicant: dorsum corpusque luteum, & articulatæ octo nigra punctula commendant: oculi prominent magni, inter quos antennæ emergunt nigræ atque hirsutæ. Noctu in pratis & pascuis volant.

Duodecima alas habet adeo productas, ut volare commodè non possit; brevissimas antennis gerit, oculos parvos nigerrimos, totum alioquin corpus albescit, lutescentibus quibusdam venulis atque villulis rariùs conspersum.

Decima tertia corpus totum (oculis demptis nigerrimis) gruinum colo-

rem subnigricantem æmulatur: antennis habet productiores, corpus hirsutum, alas corpori concolores, sed juxta oras tono quodam virescente & vitreo coruscantes.

Decima quarta pulchra quidem est, quamvis tota propemodum arenosa: cornu agestat pro mole corporis valida, nigra, & taurorum more curvata; oculi nigri & magni, caput breve, collum crassum. Alas externas nigri quidam clavilli gratiores reddunt. Spinam veluti supremam quinque nigra ceu caryophyllorum capita trifurcata insigniunt.

Decima quinta alæ ferè sunt subcinereæ rotæ, antennis sola ex omnibus destituta est, oculos habet subnigros, dorsum subluteum & quinque fuscis punctulis distinctum.

Decima sexta eiusdem penè coloris videtur, nisi quod illius exteriores alæ macula pulla transversim ducta ornabantur; hæc verò ubique unius coloris (oculos nigellos dempseris) conspicitur: corpus habet longum, articulatū; alas quatuor longas atque angustas, pedes sex, quorum postremi prioribus duplo longiores sunt; cornicula item habet exilia, sed longè excrecentia.

Decima septima ex eruca bombycina originem ducit, tota albescens præter oculos nigricantes, & venu-las quasdam subluteas rectâ per alas & transversim per corporis articulos currentes. A nobis Phalæna Bombycina nominatur.

PUNCTUM XV.

De Phalenis minimis

Moufeti.

*Moufet. l. c.
p. 97.*

DE iisdem ita Moufetus. Minimarum in classem *unam primam* faciemus mirabilem, quatuor tantum pedibus piceis incedentem; externas quoque alas cœruleas habet, internas luteas & externis (præter morem) minores: corpus item luteum adeo magnum est, ut ab alis regi vix possit: cornicula punctis ple-

na, atque oculi (dempta pupilla albi-da) nigrescunt: caput atque promuicis (longa, exilis, involuta) flavescunt.

Altera ex cœruleo viridis videtur: corpus exiguum habet, pedes & antennis nigricantes.

Tertia scapulas atque alas habet porraceas, corpus ex subluto fuscum apparet: alas extimas limbus ornat albis fuscisque maculis notatus: caput perpusillum habet, pedes & antennis cineri similes. Quinetiam in ædibus parvæ aliquot Phalænæ argenteis maculis notatæ ad lucernas advolant, quæ laneas & linteas vestes depascunt & ova deponunt, è quibus tineæ, & ex tineis vicissim hæ Phalænæ oriuntur: feruntur autem primum ex rosarum foliis, aliisque herbis putrescentibus originem cepisse.

Tres alias minores in pascuis & pratis observavi, quarum *Prima* alas externas nigras obtinet, singulas quinque maculis quasi sanguine perfusis notatas: alæ interiores totæ rubent, corpus fuscum videtur, caput, antennæ breviusculæ, & pedes nigricant.

Secunda similis videtur, nisi quod quatuor tantum sanguineas maculas in alis exterioribus habet, corporeque constat graciliore.

Tertia ferè parilis est formæ, absque antennis esset multò longioribus, & sanguineis maculis alio modo aspersis; nam circa extremitatem alarum guttæ sanguineæ duæ tantum apparent, ab exortu verò maculæ duæ longius tractæ conspiciuntur.

PUNCTUM XVI.

De Papilionibus Moufeti diurnis, magnis.

Diurnæ Papiliones quoque in magnas, mediocres, & parvas distinguuntur. Magnarum sedecim sunt species.

Prima, omnium maxima, maximam

*Moufet. l. c.
à p. 98. ad
p. 102.*

nam partem flavescit iis locis partibusque exceptis, quæ hic atramento denigrantur. Quin etiam extremi illi internarum alarum globuli cælicolorem spirant, ut genuinis saphyris confitum putares. Oculi chrysolithum referunt, magnitudinem formamque adeo exsculptam hic exhibemus, ut plura de iis attexere non sit necessum.

Secunda præter magnitudinem parum differt à prima, oculos habet nihilominus nigerrimos atque porrectiores antennas: ubi album colorem vides, ibi melinum sufficito, exceptis illis quasi oculis maioribus juxta finem alarum interiorum positis, quorum pupillam flammeam, semicirculum verò Xerampelinum reddere oportet.

Tertia non multum colore ablu- dit, nisi quod internarum alarum exphyses, totaque ipsarum extima lacinia glastiva sit, uti & tres illi spintheres, quos sub concava illarum parte vides depictos.

Quarta omnium Regina dici potest; Nam extremis alis, veluti Adamantes quatuor in pala Hyacinthina radiantes, miras opulentias ostendunt, imò ferè adamanti & Hyacintho oculum effodiunt. Lucent enim pulcherrimè (ut stellæ) scintillasque iricolores circumfundunt; his notis ita dignoscitur, ut reliquum corpus describere (licet variis pictum coloribus) supervacaneum esset.

Quinta caput, pedes, cornicula Xerampelini coloris obtinet, oculos verò hyacinthinos, dorsum atrocæruleum videtur, venter subflavus; alæ juxta basin luteo hilari, deinde tristiori nitent: extimas verò partes rubiginosas & inamœna fuscædine nigrescentes tres luteolæ maculæ adornant, internis rubigine conspersis duæ primæ luteæ, deinde tres ex luteo pallentes maculæ adhærent. Si autem supinam faciem consideres, alæ superiores ex luteo in viridem languefcunt, senis ostonisve maculis insignes: internæ

autem leviter herbidæ & virentes quibus quasi lenticulis albis inficiuntur. Venter vultusque totus subflavus, ex aurelia prædit albicante, fuscis spinulis notata.

Sexta alæ superiores extrà nigrescunt, per mediam partem limbo quodam obsoletius rubido currente, extremitates ipsarum panno, guttisque niveis micant, obscuris per ambitum crenulis asperatæ; intus autem limbus ille puriorem atque saturiorem exprimit colorem, & juxta radicem cæruleæ videntur. Inferiores alæ alteram intus, alteram foris faciem ostendunt, foris fuscae sunt totæ, excepta spinosa instita subrubente limbo perpusillis nigris quatuor punctulis & opalis duobus polychrois simul positis notata, intus autem nihil tale monstrant, sed ex nigro purpureo vermiculato in Xerampelinum tristius languentes desinunt; corpus illi nigrum, oculi, antennæ, pedes concolores, fusci.

Septima corpore tota picea, in singulis dorsi tamen incisuris punctulos duos gerit albissimos; alas ex flavo rubescentes maculæ nigræ, candidæque albæ adornant. Verum munifica rerum parens naturam extremam alarum oram potissimum decoravit, quæ nonnullis denticellis serratim æquo intervallo distantibus donatur, in quarum fimbria viginti clavi cærulei filo nigro transfixi mirificum edunt splendorem.

Octavam veste undulata & mixta peperit natura, sed vegetis coloribus destitutam: constant enim alæ ex nigro, minio, flavo, & fusco fatifcente, magisque vellere mollicula, quam ornatu splendida videtur.

Nona maximam ferè partem cinerea conspicitur; si verò internam interiorum alarum faciem intuearis, vix aliquid Indici galli alas signantius exprimit: nam pennas remiges aliæ

quasi vestitricēs & squameæ tegunt; oculus coracinus est, cuiusmodi & tuberosæ typhamque æmulantes antennæ.

Decima corpus picetum, scapulæ flava quadam lanugine, (uti & totum caput) vestitæ, antennæ item flavescunt caput tenus; quod macula ex sanguineo atrata tristius occurrit; externam omnium alarum fimbriam circinatam plurimæ ovales margaritæ æquis distinctæ intervallis gratiorem reddunt, intus verò maculis nigerrimis, lentis effigiem imitantibus scædantur. Verum sicut foris minus speciosa, ita interior internarum alarum pars, albo virore nitens, guttulis verò argenteis superinductis resplendet, & quæ extra ovales margaritæ videbantur, intus argentum purum putum non mentiuntur.

Undecima speciosam radiantium in-cæculo margaritarum institam ostentat, alæ superiores ex flammeo flavescētes ignem referunt, sex nigerrimis pannis infectæ: internarum radix anthracina, deinde flavo in igneum coruscant: corpus fuscis capillamentis hirsutum, quem colorem cornicula cum pedibus imitantur.

Duodecima eximie est pulchritudinis, alæ leviter cruentæ & maculis nigris tinctæ, radiolis micant auratis filatim ad lacinia usque ambitum dispersis. Hæc verò Xerampelina ferratim desinens intus aureis lineis lunatim ductis ornatur. Corpus ex nigro purpurascit, oculi aurei videntur, pedes & cornicula nigricant.

Decima tertia corpus & alæ nigredinem referunt, alis autem nigris & ambitu pinnatis primum capilli, deinde panni, ultimo clavi aurei medio attriuncuntur; oculi item exigui piceo in capite auro illiti; antennæ verò punctulis nigro candidis excrescunt, & in tuberculum nigerrimum finiunt.

Decima quarta culturæ lenociniis mirè arridet, corpus habet hirtum,

ex albo nigricans, oculus niger pupilla albicante: circa oculum glabrum circulum videas ferè niveum, antennæ cum priore communes; extera maioris alæ facies ex flammeo aureis lineis productis dignoscitur, quas nigri quatuor limbi dentatim ducti inficiunt, circa finem verò tres numuli argentei ferè triangulariter positi commendant. Interna autem facies pulcherrima videtur, variis auratis squamulis & clavis loricatim & imbricatim positis insignis. Extremam alarum partem aurea quoque linea adornat. Pavonem nonnihil alis refert, eiusque ritu corpus gloriosum & elegans, pedem autem & tibias aliquantum nigricantes (ne forma superbiam aleret) obrinuit. Promusci helicam refert lineam, veluti in labyrinthos convoluta.

Decima quinta quoque proboscidem habet capillarem, viminei instar viticelli sese torquentem. Est cinerea intus, torisque dilutè cæsia videtur: alas habet spiniformes, vespertilionum more crenatas, has extra fuscae aliquot lineæ interfecant, intus sex clavi nigricantes multum commendant.

Decima sexta alis superioribus exterius obscurius virefcit, quas maculæ pannique albescentes flaventesque aliquot adornant: interiores exactè rubidæ maculis decem sca- tent nigerrimis. Venter octo flavis squamis splendescit: dorsum ex rubro in flavum vergens caudæ hordeolum ostendit quasi venetum. Hirtas scapulas citrina lunula deorsum ducta commendat; oculos ru-

bentes pupilla acutiores
reddit argen-
tea.



PUNCTUM XVII.

*De Papilionibus diurnis
Mouseti mediis.*

*Mouset. l. c.
p. 103. ad
p. 105.*

Mediarum diurnarum tredecim species occurrunt.

Primæ oculi subflavi videntur, cornua obsoletè pulla, alæ reliquumque totum corpus ex pallido flavescent, interiores alæ extrà una tantum macula saturiore lutea notantur; intus autem caducæ herbida fusca quadam variola inficiuntur, dorsum ex cœrulo nigricat, venter subflavet. Ex chrysalide oritur auro illita.

Secunda minus grati coloris videtur: alæ interiores tristi in gruinum fatiscunt cœrulo, & quasi in plumbeum desinunt; externas nigriores habet, fuscis hic illic maculis notatas, tale item corpus videtur. Serratis alis summaque ora crenatis, & veluti aculeatis horridiuscula volitat, & quasi suæ gentis præfica nunquam, nisi funerali habitu tristius incedit.

Tertiam depinximus rigidulam, erectis alis sese veluti tollentem; est etiam spinosis crenis, sed exterior ala expallidior flavo tribus pannis nigris maculatur; internæ verò proxima à radice pars furvescit, media pallescit, ultima rectis, transversisque fibris cancellata subalbescit. Corpus fuscum videtur, oculus picem refert, typhæ nigricant.

Quarta duplici modo distinguitur. Nam quando passis alis se librat, corpus nigrum ostentat, atque fuscas quatuor alas nigricante peniculo veluti liratas, & in rubiginosum fulgentem desinentes eidem affixas. Quum autem floribus insidens alas attollit, prima ala luteola eleganti clypeo ornata conspicitur, cujus centrum pallidum, umbo piceus, circulus exterior citrinus. Venter atque thorax, nec non totus vultus albicant, antennæ nigricantes in flavum divergunt.

Quinta intus forisque sui similis videtur: caput alæq; pallorem monstrant, corpus livescit, veluti etiam antennæ; oculi ex flammeo rutilant, scapulae pallenti quadam lanugine hispida.

Sexta dum adversas alas expandit, arenosum æmulatur splendentem, nigricantibus maculis modo Dracontii varium: corpus item, si dorsum videas, aquilinæ nigredinis videtur, venter nonnihil fuscior, oculus niger, albida, vel potius candida pupilla clarus, antennæ coracinae; alæ aversæ ingrati bætici coloris, & obsoletioris mustellini.

Septimi generis crenulatae alæ pyriten imitantur, æreis micantes venulis, & fimbria maculisque nigris conspersæ: corpus totum nigro colore splendescente, nisi quod antennæ punctuli albi interfecant, & in picea fronte aureoli quodam modo oculi scintillant.

Octava eiusmodi corpus obtinuit, sed ex luteo rubescunt antennæ; alæ polymitæ conspiciuntur, variis plicis, liris, fimbriis, limbisq; multicoloribus insignes: surdi illi autem omnes colores atque hebetes videntur, vacui splendore omni & tono, solaque mixtione, positione & numero amœni; alicubi flammam fuliginosam, alibi ingratum fuscum, languentem rubidum præ sese ferunt, rubinique ultima fimbria albis semicirculis inclusi nihil vividi spirant.

Nonæ alæ exteriores fordidis luteolis maculis affectæ atque infectæ, ultima ferè parte clypeolo nigro (quem medium punctus ornat eburneus) ornantur. Internæ verò quatuor ejusmodi gestant clypeolos, sed circulo insuper flavescente auctos, quorum duo medii justæ magnitudinis, laterales pusilli admodum videntur. Corpus huic ex fusco candicat, oculi prominentes nigricant.

Sive

Si verò internam interioris alæ partem inspicias, fuliginosæ videntur, & è sex pulcherrimis bracteolis affabrè collocatis elegantiam habent.

Decima caput intaminato floret candore; Lacteolas verò alas maculæ quædam fuscæ & nigricantes ornant, dorsum lateraque ex flavo subrubentia novem decemve nigræ labe sub incisuris positiæ decorant.

Undecima proportionè & fermè colore formaque corporis nifum refert avicularum prædatricum. Alas habet ac reliquæ Papiliones arctiores, caudam latam & quasi plumosam; internæ alæ non ut reliquum corpus aquilina, sed ex luteo rubentes & terè flammicæ; nasus illi aquilarum more aduncus, venter veluti inanis, antennæ validæ, magnæ, ejusdem cum alis superioribus coloris, oculi satis exerti nigri, pupilla niveiscentè.

Duodecima forma eadem est, differt tantum colore; corpus cinerem refert, cauda nigrescit, atque dorsum nonnihil argentum mentitur: productiores alæ fuscæ labeculis nigris polluantur; interiores, subluteæ, furdæ videntur. Miræ velocitatis sunt hæ ambæ papilionum species & pernicitate nifum provocant.

Decimatertia omnium velocissimâ scapulis flavomuscidis apparet, alæ quidem lacteæ, in extremitatibus fuscis quinque sexve pennis notatæ, medium dorsum subflavescentes macula ornat nigerrima; ex lateribus tubercula utrinq; duo papposa prominent: uropygium nigra quâdam lanugine circumscriptur, de volatu hirundinum non metuit, atque omnes reverâ alites superat.



PUNCTUM XVIII.

De Papilionibus Moufeti, diurnis, minimis.

HARUM decem exhibet. *Primæ* alæ interna, vegeto, nitidoque cocine saturatæ, suavè rubent; exteriore^{Moufet. l. 6. p. 105. & 106.} verò luculentam purpuram ex rubro nigroque mixtam, & niveis quibusdam nervulis obductam præsentant; reliquum corpus nigrescit, etiam racemosæ antennæ.

Secunda juxta alarum basin deargentata conspicitur, quæ deinceps ex cæruleo purpurascens finiunt, superiores interius clavi duo albo nigri adornant; corpus fuscis plenum punctulis, purpureolos pedes emit tit utrinque tres, rostrum habet aduncum, è capite quatuor antennulæ, præter duas longas, erumpunt.

Tertiam si volantem videris, alæ purpurei exoleti coloris in cæruleum vivaceum abeuntes esse dixeris; variis plicis donatas: intus autem anulis oculis præditæ, cæsiæ magis videntur atq; æruginosæ. Caput ex viridi cæruleum splendet; corpus fuscis albisque institis ornatur, oculi nigerrimi, pupillæ albiissimæ videntur.

Quarta lætiore aspectu prodit, alis oculatis, cyanum cœlestem atque incomparabilem spirantibus. Fecit illam Dædala rerum artifex natura totam oculæam, adeo ut *πῦν πτηνῆ* illum in Mythologo Arctoris filium, non pavonis caudæ insertum, sed in huius alis habitantem haud ineptè fingeres: quas quidem non minori superbia adverso sole expandit, atque illa avis Iunonia, quam (præ cœlesti, quo excellit, colore) ferè in ruborem dat.

Quinta corpus gruinum, alæ superiores in caule albo virentes, medio luteæ cineritiæ, inferiores exortu atro virente sunt, reliquum albidæ: intus autem maculis in anteno vis-

fore

rore pictis frequentius conspersæ: oculi nigricant, veluti & capita antennarum.

Sexta globosis scapulis atque gibbosis planis cernitur, quæ cinerem atramento mixtum imitantur, corpus incisuris plenum, subcinereum: alas item angustas, & gruini coloris extimas stillicidiis quibusdā sanguineis intensè rutilantes habet: pedes, capitulum, antennæ corpori concolores sunt.

Septimam ex filiquastro natam illi affinem dixeris, & præter molem corporis minorem & maiorem nigredinem, primarumque alarum deargenturam vix discrepat.

Octavæ alæ omnes languidæ luteæ, vel potius pallescente flavo nitentes, punctulis quibusdam fuscis, & aliis annosam æruginem referentibus inficiuntur, ocelli huic nigerrimi, aliàs flavescit tota.

Nona alæ omnes conchis marinis ex albo fuscis pictæ videntur: extremitatibus circumatæ, & in medio albis quibusdam lineis crenulatis currentibus ornata.

Decima item conchatis & clavatis alis donata, ex albo & obscuro rubente variè miscetur, nobisque innarrabilem magis Dei potentiam, quàm narrabiles suo nomine colores ostendit.

PUNCTUM XVIII.

De Papilione Bombycum.

Bombycum Papilio, Bombylius quoque vocatur, & ex eruca staminis ferici textrice provenit. Meminit eius & Aristoteles, si Aldrovando accedimus, cuius verbis historia eius idè describere placet, quòd breviorib. clarè describi non possit. Ait ergo. Huius generis papilionum generationem paulo aliter, quam apud nos nunc fit, describit Aristoteles his verbis. *Ex quodam magno Verme, qui cornua habet, & ab aliis differt: primum quidem cum is mutatus est, nascitur Eruca, deinde Bombylius atque ex eo Necydaus. Sex porro mensibus in has omnes formas mutatur.* Sic ille paulò aliter, ut dixi de Bombylii ortu tra-

dens, quàm nunc fieri videmus. Non enim nostræ Erucæ sive Bombyces ex vermibus sunt, sed ex ovis Bombyliorum. Notandumque præterea ibi textum Philosophi à quopiam esse corruptum, ac inversum, & debere legi, nascitur Eruca, dein Necydaus, atque ex hoc Bombylius, quanquam mēdosam illam lectionem secutus sit Plinius: nisi & apud hunc quoq; corrupte omnia legi dicamus, quod certissimè affirmare ausim. Textus corruptus habet sic. Est & alia Bombycū (de Bōbycib. Vesp̄ar. aut sylvestrium Apum generis erat locutus) origo è grandiore vermiculo, gemina prætēdens sui generis cornua. Hi Erucæ sunt. Fit deinde quod vocatur Bombylius, ex eo Necydaus, ex hoc in 6. mensib. Bombyx. Ego v. lego sic. Est & alia bombycum origo è grandiore vermiculo gemina prætēdens sui generis cornua: hinc eruca fit, quæ & Bōbyx appellatur, ex eo Necydaus, ex hoc bombylius. Omnia 6. mensib. Locus Aristot. colligitur facilè ex ipsiusmet præcedentib. in eo capite verbis, quæ nos ante citavimus, ubi nimirum disertissimis verbis scribit, ex Eruca fieri Chrysalidem, & ex hac Papilionem. Idem ex Plinio diximus, idem Theophrast. tradit, binis in locis, nimirum in quinto de causis Plantar. & in secundo de historia earundem, in quo postremo loco mutari scribit *generationes quasdam per plura animalia*, ut cum ex Eruca fit Chrysalis, ex Chrysalide Papilio: sed Theodor. perperam ibi habet, cum ex tineâ Eruca, tum ex ea Papilio gignitur. Nam Theophrastus Tineâ nō meminit, sed Chrysalidem ait nasci ex Eruca. Iam verò νεκύδαλον idem esse, quod χρύσαλις, ipsum nomē indicat, cum velut morruum, vel potius sopitum sonet, unde Gaza rectè invalidam trāstulit, talem esse Chrysalidem præterquam, quod vulgò notum est, ipsemet ibid. Philosophus attestatur, cuius dictionis vim cum non assequeretur Iac. Dalechamp. in fetidissimum errorem impegit, & suo se ipsum gladio jugulat. Nam cum prius locum Aristotelis eodem planè, quo ego restituisset sensu, imò iisdē penè

verbis, in subsequenti Plinii capite, mutata prorsus sententia, quamdiu inquit filum ducit Eruca, & latebras illas sibi ædificat. Bombylius Erucæ nominè relicto, nuncupatur non à sono, quem *bombyzationem* Fest. vocat, sed à *bombycio* id est vellerè, quod orditur, unde bombycina vestis nomen habet. Post quadragesimum diem, quam Eruca se abdidit, & in bombylium mutata est, subnascens Papilio, nimirum cornutus vermis, & 4. alis pennatus, tum succum exhaurit, qui molliem velleri præbet, tum ex eo folliculo, ut exitum sibi quærat, velleris extrinsecus incubentis filum profcindit ac dissecat, ut eius tractum, qui tota carminare nititur, sequi non possit, sed discerpatur, ac divellatur. Papiliones *νεκυδάλλες*, Aristot. vocat ut equidem censeo *ἀπαγομένους νεκύνων*, veluti redivivos, morte liberatos, hac vita restitutos, commutata forma, vel *νεκυνώτατος* i.e. νεωτάτος καὶ περὶ φαιωτάτος *ἐξαπομένους* ultimos, recentissimos, novissime profilientes. Sic ille. In quib. *hoc præterea notandum*, quod Bombyciū vellus, & vestis bombycina, non dicuntur à bombylio, sed à Bombyce. Bombyx n. est Eruca, quæ textit non Bombylius, ut patet ex Plinio, cuius caput 23. libr. II. de Bombyce Coa inscribitur, & in fine capitis de bombycinis vestibus loquens, Assyria inquit Bombyce adhuc fœminis cedimus. Sed cum & in huius capitis mentionem inciderimus, in eo quoq; nodus explicandus est, locus inquam alius emendandus, non tñ. eo modo quo restituit eundem Dalechamp. Plinii verba sunt. Bombycas & in Co Insula nasci tradunt, cupressi, terebinthi, fraxini, quercus florem imbribus decussum terræ halitu animante. Fieri a. primo papiliones parvos, nudosque mox frigorū impatientia villis, inhonescere, & adversum hyemem tunicas sibi instaurare densas, pedum asperitate radentes foliorum lanuginem in vellera. Legit Dalechamp. Fieri a. primo Vermes parvos, deinde Erucas nudas, mox frigore, &c. Ego lego sic. Fieri primo Erucas nudas mox frigore. Erucæ n. prius vermes

non sunt. Vt modo ad Bombyliorum nostrorum generationē revertamur, ea plane quo dixi modo se habet, nimirum ex Eruca jam folliculo incluso fit Chrysalis, ex qua Papilio, qui folliculum terebrat.

Summæ equidem imbecillitatis, & brevissimæ vitæ Papiliones isti sunt, ut qui ex folliculo erumpentes, haud ita multo post Venerem ineūtes diebus tribus coeunt, quo peracto masculus moritur, fœmina vero, ordine iterato ova parit innumera rotunda, minuta, sem. hyoscyami non dissimilia, aut herbæ peti five Nicotianæ substrato sibi panniculo, vel albo, vel rubro, deinde emoritur: tunc panniculus cum ovis suscipitur, & ubi non non possit hyemis pettingere frigus, reponitur.

Scribit Aristotel. esse quoddam *Papilionum genus*, quod durum quiddam simile cartamo, i.e. cnici semini producit, sed intus fluidum. Docti considerent, numquid exacte hoc nostris bombyliis competat. Ego id neque negare, neque certo affirmare aulim. Modus n. ille generandi aliis Papilionibus etiam est communis, & Aristoteles in eodem post capite de Bombylio agit. Rursus cum Bombylii Erucam inquit ex magno, & cornuto verme oriri, cumque nostræ Erucæ nascantur ex ovis, aliquando credidi, Aristotelem utrumque generationis modum scripto mandasse, prout à diversis audiverat. Videtur enim ex mera aliorum relatione isthæc scripsisse. Quamobrem si ex utraque relatione unam, eamque veram conficias, reiecto scilicet cornuto illo verme, & in eius loco supposito, duo illo simili cartamo bombyliis applicari poterit. Nolim n. cum Dalechampio cornu: cum illum vermiculum inter cornutos nostros Papiliones: nam sic semestri spatio varia formar. successio, non complebitur, ut voluit Arist. repetit Plin. quanquam confirmat experientia 2. mensib. omnia absolvi. Semini a. Cnici semen Papilionum horum simulare potuit, non quia æquæ magna sint, sed quia intus utrumque est humidum. Hactenus. Aldrov.

CAPUT II.

De *Anelytris bipennibus.*

ARTICULUS I.

De *Muscis in genere.*

ANelytra quadripennia, bipennia, quæ binis, ut Plin. scribit, pinnis advolant, excipiunt; *Musca*, *Tabanus*, *Culex* & *Ephemeræ*. *Musca* primum damus locum, quod in eius laudib. diffundendis, ex veterib. Homer. & Lucianus; ex neotericis, Leo Baptista Albertus, Henricus Cunradinus, Andreas Dactius, & Franciscus Scribanus, desudarint.

Nomen. *Nomen*, à musculo accepit. Nam detractis alis, caput nervosum, corpus molle, cauda tendinosa apparet. Hinc *Muscula* apud Boëtium nomen. Græcis *μῦα* à *μῦς* dicitur. De *Caninarum* nominibus inferius dicemus.

Descriptio
Arist. H. A.
l. 4. c. 7.
Plin. H. N.
l. 11. c. 48.
Bipenne esse insectum & in anteriori parte promuscidem s. aculeum gerere, apud Aristotelem etiam habemus. Senos pedes habere scripsit Plinius, ex iisque primas longiores ut oculos quos duos & hebetes habet, detergere valeat. Variis depingi cancellatis quasi coloribus, pavonis instar, per microscopium apud celebrem illum mechanicum *Drebellium* Londini observavimus. Reliqua, quæ huc spectant, in *Musca domestica* descriptione, ex Luciano adiiciemus.

Locus. Humidis & æstuosis locis gaudent. Tam numerosæ in Apulia, ut proverbio locum dederint. Tot & in Hispania olim, ut ear. venatores conducerentur. Apud pyramides in Ægypto tam frequentes, ut aervolantium murmure concutiatur. Causam in sepulchrorum copiam, facile coniicias. Astracanæ deniq; ad mare Caspium, examina illarum oberrare, ut vix tolerari possint, navigationibus Anglorum debemus. Levibus & politis non diu insident. In Cretæ monte Carina novem M. passuum ambitu non reperiuntur. Fodinas, propter noxios halitus fugiunt. Romæ in Herculis in foro boario ædem non ingrediebantur: nec in Papho per fores Veneris aliqua, si Apollonio fides.

Pratum Bremenibus ab Emma donatum, nullas ferre, Crantzii pro-
Card. Sub- tit. l. 10. p. 609.
didit, nullas & quandam Venetiis do-
Scal. Exer. 246. f. 4.
mum ingredi, quod Cardano debemus. Causam frustra vel in sublimitate conjicias, cum tota urbs in lacunis sedeat; vel in parietum marmora, cum & in politissimis armis, & splendentibus templis, muscerdæ inveniantur; vel in amuleta, quæ nimis dubia sunt. Vidit ad arcendas muscas conflatum lamellam Scaliger, ad quam in fenestra vix depositam musca advolans, alvum exoneravit.

Omnibus fere eduliis insidiantur; victus, sed in primis, lacti, cadaveribus, meli, (mel Atticum ob thymum, & Carinæ montis excipio) & sphondylis. Plinius ideò balsami melle adulterati certissimum signum ponit, si à muscis infestetur. Varro ear. proprium *ligurare* dixit. Lycophron ideò *δ᾽ ἀπὸ* vocavit.

Generatio
Triplex videtur esse Muscar. *ge.* *Vna* è Coitu, qui in æstivum tempus, hyemem clementiorem, vèto meridionali sese vibrante, accidit. Coeunt quædam diu, aliæ non item. Mas postquam inscendit, membrum fœminæ, intra suos meatus receptum, materia & vi prolifica adimplet. Visæ in agro Heydelbergenfi mixtæ cuiusdam naturæ, à Pennio. Vicissim enim conscendebant, sed talium & Lucianus meminit. Post coitum excluduntur vermiculi, qui in muscas abeunt. Albi hi, oculos ad latera prominentes habentes, quorum similitudine staphylomatis species quædam *μυιοκέφαλος* vocatur. Altera ex putrefactione. Nam plurimæ ex fimo oriuntur, in quo inchoatæ latent, & ex quo perfectæ exeunt: nec non aliis sordib. æstivo imprimis tempore. Meminit utriusque & Aristot. *Muscarum*, inquit, *οἰσῶν* *fit in fimo, quem agricola seorsum à stramentis separare.* *Quare ii qui in hoc opere sunt, contendunt discernere reliquum stercoreis, quod sincerum non est: ibique ajunt fimum confici.* Vermiculor. autem principia exigua: primum enim, in his quoque rubor subit: atque ex immobilib. proficiunt ad motum tanquam enascenti-
Arist. H. A. l. 5. c. 19. f. 226. ed. Scal.
I 2 rentes.

HISTORIÆ NATURALIS

rentes. Deinde vermiculus evadit immobilis. Tum demum motus, rursus movere sese cessat: atque ex ea musca perficitur: moveturque status solis ve super ventu. Videtur tamen ex aliorum observatione loqui. Nulli qui per coitum generantur vermiculi: nec qui ex putredine tot metamorphoses subeunt. Crescunt primò ad justam magnitudinem, mox quasi in Nympham mutati, immobiles jacent; rupta tandem statò die nympa, egrediuntur. Scalig. non tã ex putrefactione, quam principiis quibusdam immutatis, ex gummi nempe quodam liquido oriri scribit; vel fortè ex alia aliqua materia, à Natura in hunc finem concocta. Tertium generationis modum Knivetus Anglus detexit, *Corruptum eruca corpus*, (verba sunt Mouf.) *vel parum confusum in aureliam imperfectam convertitur, tunc ex ea, non papilio, sed tria oblonga ova nigricantia eiciuntur, ex quib. muscæ vulgares, vel aliæ iis similes oriuntur.* Quandoque aurelia ipsa corrupta, nec papilio, nec ova, sed vermiculi albi, per foramen (quandoque unus, nonnũquam plures) egrediuntur, ex quibus postea muscæ valde exiles. Ex guttis sudoris de laborantium digitis decidentib. in Dariena regione prognatas, vidit Petrus Martyr. Rivello verò reb. Britannicis præfecto, ex sanguineo imbre procreatæ sunt. Videntur cum rhododaphne amicitiam colere, quod ad eam etiam in scrobe defossam undiquaque convolent. Bellum cum araneis gerere notum. De crabronibus superius diximus. Fortè cibi gratia ab iis capiuntur. *Aetas plærisque brevissima. Magnis & militariibus paulò longior. Pereunt oleo, quòd hoc angustissimos, quales ipsi, spirandi meatus, lentore suo intercipiat. Potes id & temperamento, quod frigidum, adscribere. Ex calefactæ, haud faciliè contrariam mutationem perferunt. Frigidæ, celeriter refrigerantur, & moriuntur facile. Mortuæ vel suffocatae, vel solis calore, vel cinere superfuso reviviscunt, ideò quidam immortalem animam habere putarunt. Tu calori id adscribe. Strangulatur vitalis in iis calor, cum*

exiles corpusculi meatus, copiosior humor infarcit: sublatò per calorem externum isto, suæ libertati restituitur. Obtruncatas capite, currere, salire, & plurimum reliqua corporis parte vivere, notum.

De Volatu ita Lucian. *Est illi volatus, non continuo pennar. remigio, ut vesperilionibus: neque saltu ut locustis: neq. cum stridore, ut vespis. & crabronibus: verum flexilis, ad quamcunq. aeris partem se moveat. Adde, quod non volet quiete & cum silentio, sed cum cantu & melodia: non item immite & sæve, quemadmodum Culices & Muscellæ: neque cum gravi fremitu Apum & Vesparum, horribilem ostentans sonum & minacem; sed tanto volat his suavius muscæ, quanto sunt tuba & cymbalis tibia dulciores.*

Et dum volant, & liberæ, & captæ, præcis etiam alis sonant: sed hæ, alio quam illæ modo: aliquando, exeunte in ore spiritu, ut Albertus loquitur, non sonant. Percutitur cadens inter alas earum aer: meatq; etiam non volantib. inclusus intus spiritus. Maior in volatu sonus, quòd maior aeris attracti copia ad septum transversum validius alliditur. Vix audiuntur quicquid, quòd tum se nec contrahunt, nec attollunt. Non attrahitur sic intus spiritus, cuius agitationi sonus ipse adscribendus est.

Ingenium detegunt, audacia, impudentia, & indocilitas. Nulli rei non insident: nihil non conspurcant; redeunt etiam millies abactæ. Indociles esse, sed minus hirundinib. quòd captæ horreant, hæ sua natura hominem oderint, apud Plutar. cui suffragatur experientia, habemus. Araneos insidiantes observant illorumq; casses evitare conantur. Elephantem adortæ, in pertusa rimis pelle, si constringatur, intereunt. Plura in Leone Baptista Alberro & Lucian. vide. Dolorificos interunt morsus, corporiq; diu affixæ hærent. Vnde Homer. sagittarum ictib. comparavit. Acriores illi, si aliquid de serpentib. vel venenatis gustavere. Candidis illapsæ vestib. ita eas conspurcant, ut difficulter eluas. Carnes, emissa ab alvo vermium illuvie, fœdare solent. Imminente

Martyr.
Deca 3. l. 9.

Sympathia &
Antipathia.

Æras.

Galen. de
Med. simpl.
l. 2. c. 20.

Ælia. H. A.
l. 2. c. 29.
Plin. H. N.
l. 11. c. 36.
Volatib.

Arist. H. A.
l. 4. c. 9.

Plin. H. N.
l. 29. c. 6.

Æl. H. A.
l. 9. c. 15.

nente tempestate validius mordent: seu quod frigidiore reddito aëre, calor naturalis appetitum excitet: seu quod exhaustas in circumfluum aërem, una cum vapore humidi substantifici, quod paucum habent, portioniculas, qua patet via refarcire moliantur. Tum etiam ex supremo aere ad infimum descendunt: & in aromaticis maxime apparent. Multa contra insultus ear, traduntur. Quidam coepæ frustulo carnis affixo arcent. Alii lupi caput intra domum suspendunt: ex salicaria seu lysimachia fumum excitant: folior. minoris sambuci, vel cucurbitæ decocto, vel helleboro albo cum lacte trito, loca conspergunt. Sunt qui succum origani cum lacte & suillo felle & malo granator, confuso, aqua diluunt, & solo superfundunt: viti, qui myrti aut huiusmodi plantar. fasciculos suspendebant, inque iis noctu congregatas, in faccum coniciebant. lumenta ab earum iniuriis præservare creduntur, laurus cum nigro veratro in lacte trita; nepetæ odor & folior. eius decoctum: Vnguēt. ex baccis lauri cum ol. paratum: frutices rhododaphnes, si tusi in scrobem coniciantur, convolare in eos undiquaque volumina creduntur.

Habent in Medicina usum. Illi nuntur à quibusdam cum radice lapathorum vitiliginibus. Impari numero, ab aliis, furunculis, medio digito, applicantur. *Capita* folio ficulneo asperata alopecie conferunt: cui, secundum alios, cinis cum nucis cinere contritus, prodest. Sunt qui mellē, sunt & qui lacte subigi volunt. Ad pilor. raritatē, vide ex iisdem & aliis remedium. In Epilepsia rufas & in potu exhibitas comendat Plin. *M. Servil. Nonian.* addit idem, princeps civitatis, non pridem in metu lippitudinis, priusquam ipse eam nominaret, aliusve ei prædiceret, duab. literis Græcis P. & A. chartam inscriptam, circumligatam lino, subnectebat collo. Mutianus ter Consul, eadem observatione, viventem muscam, in linteolo albo. his remediis carere ipsos lippitudine prædicantes. Galen. ad chymolin, cum ovi luteo tritas comendat. Ad pilos palpebras pungentes, Dionysius Milesius. Plin. ad eadem gignendas muscar. fimi; murini

cinerem, æquis portionib. permiscet, additis quibusdam aliis. Aqua earundem per balneum destillata, oculos à maculis & pterygiis liberari, si vespere laventur, capillos, si eadem læpius madefiant, in immensum crescere; duab. guttis, surditatem tolli, ludæus quidam apud Gesnerum retulit. Vas autumno sepeliendū, & materia sub hyemem destillanda est. *Audi vi quendam,* inquit Gesner. *solutum dare, tres vel quatuor muscas intra corpus, atq. album inde optime solutam. Rec. stor. genista g. 5. ponantur in vase terreo, cum butyro alternatim strato, quib. vas impleatur, ac optime clausum in fimo equino. solem versus per annum sepeliatur: post annum, muscas invenies, ad unguenti formam redactas, quæ omnem dolorem, in quacunque corporis parte sedant. Cedunt & quibusdam animalibus in cibum. Araneæ iis insidiantur, hirundines vescuntur. A Chameleonibus, mutacillis, anate muscaria, zygænis capiuntur & vorantur. Arrident & piscib; truttis inprimis. Adhibentur & inter supplicia. Ap. Persas, qui legib. obrectasset, dieb. viginti in Archivo vindictus, perseverabat, & melle ac lacte delibutus, nudus muscis exponebatur. Exercuisse & Deū per eas sua iudicia, Historiæ tradunt. Megareses è sedib. pepulere. Iuliani Apostata exercitum afflixere: in Caroli Gallor. Reg. A. MCCCLXV. magnum damnum mortui intulere. In Oriente tanta ex mortuis & putrescentib. exorta A. MCCCXLVIII. pestis, ut vix decimus hominum superesset. Circa medium Augustum in Brombiensis templi fastigio ingens examen quotannis confidere solere, Brighthannus author est.*

Genera Muscarum plurima occurrunt, quæ sigillatim in sequentib. ponemus. Differunt, magnitudine, partibus, colore, loco, &c. Magnitudine, sunt magna, quas segetibus & militares, Lucian. dicit, alii Canes, sonitu asperrimæ, volatu velocissimæ, vitæ longissimæ, tota enim hyeme perdurant. Sunt media, sunt minima. Partibus. Aliæ capite sunt magno, parvo aliæ: ventre quædam crasso, exili, brevi proceræ. Sunt pilosæ, glabræ, antennas in fronte gerentes, plurimæ non, In Cyrene

Fuga muscarum.

Plin. H. N. l. 24. c. 8. & 25. c. 8.

Beret. vet. Med. l. 2.

Vfus.

Plin. H. N. l. 30. c. 16.

Galen. de comp. Medicam. secund. loca l. 4. c. 25.

Mous. de Insl. l. 1. c. 12.

Vfus in cibo.

Suidas in Epicuro.

Marin. Sic. l. 2. de Hispania Regibus.

Differen. tiaz.

HISTORIÆ NATURALIS

Arben. H.
A. L. 15. c. 1.

habentur latifrontes veluti mustelæ, alia viperis similes. *Loco sunt Domestica, Sylvestres*, quar. oleum in magno precio fuisse memorat Cardā. Macedonica in fluvio Astræo, *Hippuri* dicto, quæ simul ac hominis manu cōtingūtur, alis evanescentib. colorem perdunt. Moluccanæ, Sumatrenses, Americanæ. *Colore*. Nam virides & pictas, Vespam maiores, quæque subterraneos sibi nidos forment, Hispaniola insula alit. *Albas*, aculeis acutissimis, Casparus Balbii in itinere suo

Rhodig. An
tiq. sect. 1.
17, c. 11.

vidit. Insigni albedine notabilis & illa, quæ Toleti, in macello publico, sola per integrum annum comparere solet. Sunt & cineræ, cæruleæ, luteæ. Huc pertinent *Canina* quæ canes, *Boaria*, quæ boves, *Equina* quæ equos infestant, *Napelli* & *Vinaceorum*. Illis à napello, qui in Alpib. Rheticis, mense Iunio & Iulio floret, nomen impostum est. Concolores fèrme eidem sunt, communibus maiores; alis capitibusque ex lucido viridiq; vel cæsis virent, quasi Cicindelæ, vel Citharides, ut Pena & Lobelius describunt. Guaineritis Antidotum ex eis confecit ad multa utilem, quem ap.

Aldr. Hist.
Inf. 1. 3. c. 2.

Aldrovand. vide. De *Musca vinaceor.* ita Aldr. Ælian. Ephemera inquit, animalia unum diem vivunt: ex facie vini atescente originem trahūt, aperto dolio, ut luce suscepta sunt, vita excedunt. Aristotel. v. Culices (*καύροντες*) scribit nasci ex vermiculis, qui fece accetigignuntur. Quo loco Gazapro *καύροντες* reddidit Culices vinarii, sed quam bene dicitur in Culice. Nascitur quidem in ipsis vinaceis Muscar. quoddam exiguum genus, *Moscinus* vulgus vocat; Sed hi meo iudicio, neque culices illi Aristotel. fuerint. non n. ex aceti face gignuntur, argumento, quod vindemiæ tempore tantum appareant cum nova vina fiunt: neque *Ephemera Æliani*, etiam esse puto: nam plurimos quotidie propè dolia extinctos reperire esset, quod alioqui non fit. *Moscini* a. nostri animalcula sunt admodū exigua, corpore crassiusculo, coloris ex cinereo fusci, brevi: capite rotundo, brevissimis antennis, brevib. etiam pedib. quæ ferè omnia in contrario in culicib. modo haben-

tur. Hæ namq; antennas habent longas, corpus procerum, pedes longos. *Moscini* vini valdè sunt appetentes, adeo ut in eo sese submergant, unde bibaculor. adagium cupientium *Moscinorum* more mori, h. e. in vino, ut inextinguibilem suam sitim sedent. *Vinnulas* eos vocat Scaliger.

ARTICULUS II.

De Muscis in specie.

PUNCTUM I.

De Muscis Aldrovandi

prima tabula.

MUscar. varias differentias Aldr. Aldrov. de Inf. 1. 2. c. 1. & Mouf. nobis proposuere, hic in classes certas digestas, in tribus tabellis ille. Prima 25. species continet.


Prima Megalocephale haud ineptè vocari poterit. Capite enim est pro corporis portione satis magno, cum interim vulgaribus vix maior sit. In fronte candicat, oculi rubent, alvus prope pectus sublutea est cætera fusca, alæ ex luteo & nigro variegatæ.

Secundam ad Boariarum genus reduciendam iudico: longæ est duos ferè digitos, lata transversum pollicem, colore per totum corpus luteo, capite triangulari, in medio luteo & hirsuto, oculis colore castaneis & figuræ ovalis. Pectore lato, eminente, gibboso, utrinq; ad latera depresso. Ventre lōgo, angusto, annuloso, deorsum inflexo, in extremitate acuto, colore lutescente ac lucido, in fine nigricante. Alæ subluteæ totum corpus longitudine æquant, quas, dum quiescit, simul coniungit, & supra supernas partes ita extendit, ut fere totas obtegant. Pedes flavescunt, in extremo ferrati, vel denticulati & bifidi; pro na parte ex luteo ad fuscum colorem accedere videtur.


Tertia muscis vulgaribus maiorib. paulò maior, utpote ex Boariar. genere, corpore est crasso & rotundo, coloris nigri saturati, lucidi & splendentis. In capite maculæ sunt aureæ duæ, oblongæ & obliquæ C. literæ confimiles. Alæ quæ pectori hærent, eleganter admodum lutescunt. Pedes aterrimi, sed minimè splendidi. *Quarta* propter cinereum seu leucophæum colo-

Muscarum Aldrov: Tab. 1
Musca. Fliegen vnd Hundts Mücken


Tab VIII
Aldrovandi figurae
numeris notatae sunt



Tab. 2





Tab. 3



Culices. Mücken. Snacken

Vide Muscas Moufeti. Tab. Seq. X.





colore Caninis poterit accēseri. Vulgarib. aliquantō minor est, figura corporis eleganti & vivida, colore cinereo, sed alæ ad luteum vergunt. Caput rotundum, venter oblongus & hirsutus, pedes rufescunt.

Quinta forma it. corporis est admodum venusta, caput rotundum habēs & rubescens, lineolis duab. candidis insignitum. Pectus, quod leucophāū est, duab. maculis nigricantib. perornatur. Alæ cinereæ nigris maculis eleganter variegantur. Venter oblongus, & rotundus in extremo, ceu in aciculam desinens. Partem supinam lineæ duæ albicantes transversim secant. Prona pars cinerea est; Pectus primum cæruleum. *Sexta* pectore est æneo, valdeq; splendenti, ventre rotundo, colore viridi, sed 3. lineis transversalib. nigricantib. distincto. Prona tota virefcit. *Septima* maiori muscæ compar est, capite in medio coloris argentei, antēnis brevib. pectore leucophæo, alvō supina subrubra, quæ tñ. si Soli obversetur, colorem etiā quandam lucidum cinereum præ se ferre videtur. Prona tota similiter subrubra est, & toto ferè corpore hirta.

Ostava novissimè descriptæ valdè cognata est & similis. Capite similiter albicat, corniculaq; eadem in fronte gerit, & toto corpore pilosa est. Colore tñ. quodammodo differt. Pectus n. & alvus ex cinereo ad cæruleum vergunt, & si Soli obvertatur, subrubri quid in eius alvo conspicitur. Est præterea aliquanto minor. *Nona* à vulgarium muscar. generibus ob alvi gracilitatem degenerare videtur, & ad Culices accedere. Caput ei rotundum, pectus nigricās, dein color cernitur luteus, qui lineis duab. nigris invicem instar crucis interfecantibus insignitur, cæterò nigra est. *Decima* tota lutea est. Alas, cum quiescit, supra alvum coniungit & explicat. Pectore est latiusculo, ventre angusto & gracili. Alas habet valde subriles, & punctulis innumeris variegatas. Caput subtrus albicat, supra lutescit, & è medio duo brevissima cornicula erumpunt. *Vndecima* contractior & brevior est, pectore cinereo obscure, ventre nigro, sed ad cæruleum quo-

dammodo tendente, tota hirsuta.

Duodecima valdè pusilla, capite rufescente, pectore sub albo, multis tñ. nigris punctis eleganter variegato; alvo similiter sub albo, aut cinerea dilutè, quàm lineæ multæ nigricantes transversim secant, alteratantum per longitud. excurrente. *Decima tertia* in arborum truncis, pyri verò & pomi potissimum insidere deprehenditur. Color toto corpore æneus, aut viridis, sed admodum obscurus. Venter a. supinus soli oppositus cinereo, lucido nigroq; variegatur, pronus obscure virefcit. Pectus supinum lineis quibusd. rectis exornatur. *Decima quarta* ad maiores muscās ferè accedit, pectus ei obscure lutescit; alvus admodum exilis est, angusta, & in extremo acuta, ex luteo & nigro eleganter variegata. Lineæ namq; quaternæ nigra ipsam cingunt, quar. duas priores linea alia quædam intermedia coniungit, & fere unit; sed reliquis punctula quædā nigra substernuntur. Alæ corporis longitudinem æquant. *Decima quinta* vulgaris magnitudine est, alvo graciliori, colore luteo obscuro, capite rotundo, in medio eleganter rubro, oculis nigris, pectore lato, prominente, & utrinq; ad latera depresso: ventre exili & gracili, & deorsum reflexo. Alæ & pedes dilutius, quàm reliquū corpus lutescunt. *Decima sexta* vulgares aliquantō excedit: pectore supino nigro, sed pilis quibusd. lutescentib. insignito. Alvus depressa est, & versus pectus duas habet maculas luteas, cæterò penitus nigricat; præterquam extremo, quod obscure albicat. In alis, quæ pectori connectuntur, macula lutescēs utrinq; conspicitur.

Decima septima ex Caninar. maiorū numero cinerea est, sed junctis quibusd. nigris depingitur. *Decima octava* tota viridis, ac maximè splendidi coloris, pedibus ac capite nigricat.

Decima nona illis videtur accensenda, quæ carnes æstivis temporib. defædant. Figura n. omninò est eadem, colore tñ. magis fusco, lucido, & ad cæruleum obscurum tendente: toto præterea corpore hirsuto, alisq; circa exortum flavescentib. *Vigesima* vulgarium magnitudine est, corpore tñ.

HISTORIÆ NATURALIS

obefiori. Pectus admodum obscure lutescit. Alæ maculis duab. vel. trib. fuscis pinguntur. Eadem in exortu flavescunt. Alvus tota ex cæruleo nigricat, & admodum plana est. *Vigesima prima* corpore est rubro, oculis colore castaneo, pectore piloso, alvo nigra, sed trib. lineis subluteis transversis insignita. *Vigesima secunda* ex Caninar. maiorum numero, sed aliquantò minor, pectus habet atrū, & in eo lineas subalbas per longitud. ductas, alvum cinereum, ac admodū lucidam, maculis multis partim nigris, partim rubescentibus respersam. Pediculi sunt aterrimi. *Vigesima tertia* alis est colore argenteo ad aurum tendentib. In ore aculeum gerit. Caput majusculum & pectus obscure lutea sunt. Alvū planè luteam linea longa in 2. partes supine dissecat. Fucum fermè exprimit magnitud. Sicut insuper *vigesima quarta*, quæ ob varietatem color. valde speciosa est, caput habet album, oculos amplos spadiceos, thoracem nigrum, sed lineis 2. subalbis rectis exornatū. Alvus oblongiuscula est nigra, aliisq; coloribus conspicua. Quæ n. pectori jungitur, maculas 4. luteas habet, 2. utrinq; intercurrētes lineæ nigræ distinguūt. Cætera albo, nigro, luteoq; elegantissime variat. Prona pars penitus flavescit, præterquam in extremo, ubi nigricat. *Vigesima quinta* vulgaribus muscis magnitudine æqualis pectus habet nigrum, lineis aliquot subalbis variegatum, alvum colore æris politissimi & splendidi.

PUNCTUM II.

De Muscis Aldrovandin. tab. secunda.

Totidē species & 2. tabella habet.

Primo & secundo loco quæ positæ, invicem fere similes sunt, quamquam prior caudā sursum, altera deorsum flectat. Vtraq; anteriori parte muscas cōmunes ad amussim repræsentant, capitis sc. & pectoris figura. Dorso sunt eminenti, elatoq; ac gibboso pilosoq; Alæ longæ, angustæ, ad caudam propemodum extremam expositæ. Alvus nigra, angustaq; in 8. determinata annulos, tandem ita acuitur & reflectitur, ut Scorpionis caudam efformare videatur. Pedes oblongi scabri, in extremo veluti in

minutulos digitulos divisi. *Tertia* exigua admodum alas habet argenteas, lineolis nigris ternis transversim fectas, alvo breviores, quæ initio crassiores, sed postea magis magisq; attenuata paulatim in mucronē definit. Quicquid alvi ultra alas protenditur, id totum nigerrimum est. Petioli colore sunt ferrugineo diluto ad luteū vergēte. In ventre aut eius apice nulla observare licet segmenta, quæ annulos vocat Albert. Caput & dorsum nonnihil rufescunt superne. In dorso extremo, ubi alvo jūgitur appendicē parvam quandam habet albicantem. *Quarta* oblonga est & gracilis, capite pro corporis portione magno fusco, fusco it. thorace, qui gibbulus est. Alvus exilis in medio rubra, cæterò nigricat. Pedes atri, quor. posteriores longissimi sunt. In *quinta*, quæ tota cinerea est, nihil est præterea notatu dignum. *Sexta* culici formis est, caput & dorsum fusca sunt. Caput culicis exiguum, sed nulla fistula. Alæ longæ & angustæ, ad extremā alvū expositæ, aut etiam ulterius, ex fusco splendide. Alvus annulosa, angusta, oblōga; dorsum supinū, luteū, nigris maculis varium. *Septima* in media fronte inter ocellos nigros pūctulū aliquāto prominet jujubæ. Proboscide armatur insigni. Corpus totū, pedes & alæ colore sunt ferrugineo. Mēbroi. constitutionē icon exacte ostendit. *Octava* ex minimar. genere est tota nigricās. Alæ in ipso exortu, nigræ, cætera argenteo splendēt. *Nona* pariter ex minimis est, colore viridi perelegātī cōspicua, q. si Soli obversetur, velut aureus apparet. Alvus angusta brevis, & in extremo nonnihil acuminata. Alæ ultra anū protēsa. Ejusd. generis, imò minor est *decima*, & ipsa pariter viridis alvo exiliore, magisq; acuminata. Alvū quoq; acuminatā, sed nō adeo, habet *undecima*, colore nigro est, sed maculis albis in capite, dorso & media alvo varians. Alæ argēteæ purpureum, quid si Soli obversantur, ostentant.

Duodecima à minimis illis viridib. nihil differt, nisi quod ano est rotundiore, crassioreq;. *Decima tertia* ad maiores accedit, tota atra, præterquā in alvo (quæ compacta & crassa est ubi tribus, quatuor vel lineolis seu circulis cinereis transversim secatur. Alæ amplæ, & duplo fermè toto corpore longiores, in extremo albicant, cætera aterrimæ.

Decima

Decima quarta vulgaris muscæ speciem refert, sed thorax & alvus ex cinereo viridescunt. Alæ & pedes flavescent.

Decima quinta Fucum & Vespam refert, illum corporis crassitie, hanc colore potissimum alvi. Hæc n. lutea est, lineis quatuor transversis nigris insignita, per quarum medium linea aliàs eiusdem coloris rectâ percurrit. Pectus pariter subluteum, & maculis item duabus nigris utrinque decoratur. Caput in medio lutescens linea quædam nigra transit. Oculi sunt fuscis, antennæ admodum exiguæ, pedes lutei, in extremitatibus quodammodo nigri.

Decima sexta ex caninis maioribus est; Oculos rubros, magnos, prominentes linea alba interfingit. Pectus cinereum est, sed tribus lineis rectis, albis distinctum. Alvus quadrangulis fuscis, albisq; invicem alternatim subeuntib; varia, latrunculorum lulum repræsentat. Ipsa tota in prona parte ex cinereo ad fuscum tendit.

Decima septima exigua est & nigra, muscæ vulgaris fortè nondum adulta.

Decima octava apem quodammodo refert. Alvum luteam & pilosam linea quædam nigra supernè à pectore ad extremitatem protracta rectâ percurrit. Pectore est nigro, capite albo, oculis fuscis extuberantibus. E media fronte cornicula brevia, nigra & apicibus rotundis insignita emittit. Alas subluteas & splendidas habet. Anus niger est & hirsutus, cætera lutescunt præter pedes, qui nigricant, præterquâ in extremo, ubi albicant.

Decima nona toto corporis habitu vulgares refert, sed magnitudine inter majores & minores ambigit.

Vigesima eadè magnit. est tota ferè atra. Alæ maculis fuscis colorantur.

Neq; ab his discrepat magnitudin. *vigesima prima* hirsuta, pectore nigro, alvo rufa, sed supinè nigris notis ad podicem usq; nigrum item continuatis variegatur. Alæ fusco maculantur.

Vigesima secunda maioribus congener, tota penitus cærulea est.

Vigesima tertia vulgaris domesticæ est, nulli non nota.

Vigesima quarta coloris est spadicei auri ad instar rutilantis.

Vigesima quintam, quæ ultima est in hac serie, totam penitus auream alæ argenteæ cohonestant.

PUNCTUM III.

De Muscis Aldrovandi
tertia tabula.

IN tertia tabella viginti duæ exhibentur.

Priori loco quæ depingitur, corpore est exili, capite, alvo, antennis proceris, pectore nigro, alvo rubente.

Hac aliquanto maiores sunt duæ *subsequentes* pulchræ admodum & valdè similes. Prior capite & thorace, pedibusque est cæruleis, corniculis oblongis, alis luteis, alvoq; inter rubrum & luteum ambigente.

Quæ post has in eadem serie *quartum* & *quintum* locum obtinent, vespe quodammodo speciem præ se ferunt, quanquam minores sint, antennis pariter instructæ, capite & pectore fuscis, alvo & alis lutescentibus, his intensius, illis obscurius.

Sexta corniculis adeò brevibus, ut carere eis videatur. Corpus totum annulis aureis, & nigris alternis variegatur. Alæ auro & argento mistis resplendent.

Septima ex iis, quas Tavanellos vulgus vocat, longa proboscide, brevissimis corniculis prædita, thorace obscurius, alvo dilucidius lutescente, alis argenteis.

Octava ex maiorum numero est tota penitus viridi colore obsoleto vestitur, sed caput rubet, alæ albent.

Nona eadem videretur, nisi multò gracilior & minor esset.

Decimam quoque ex muscarum genere judicavi. In ore promuscidem habet valde longam & bifidam. Capite est rufo & hirsuto, antennis exiguis, corpore toto plano & depresso, colore aterrimo & splendido instar holoserici: alis longiusculis, quæ in parte externa nigrescunt, in interna argentû referunt. Totum corpus supinum admodum hirsutum & pilosum est, in medio nigricans, ad latera albicans, pedibus est flavescentib; hirsutis. Alæ tametq;

HISTORIÆ NATURALIS

tamet si flavescant, si soli obversentur, argento splendent.

Musciforme insectum, quod *undecimo loco* exhibetur, libuit appellare, quod proboscide, capitis & pectoris conformatione omnino muscam referat. Caput nigrum est, thorax item niger: viridis in dorso macula longa: alvus valde longa, deorsum inflexa & acuminata, ferruginea & maculis atris supinè per longitudinem ductis. Crura item sunt ferruginea.

Duodecimo ordine depictum Insectum musciforme quoque dici potest, capite crasso ferrugineo, pectore & alvo oblongis, angustis, colore viridi: alis albis, nigris fibris intercurrentibus, pedibus subflavis.

Tertium & decimum Insectum alvo pariter est admodum procera, colore modò nigro, modò croceo lutescente distincta, tenui & in extremo obtusa. Alæ latiusculæ sunt argenteæ, breves. Per tergus luteum fusca linea deorsum tendit. Caput nigrum, cervix lutea, antennæ perbreves, perbreves item pedes, qui cinerei sunt.

Iam *v. decima quarta* in hoc ordine elegans musca est, alas habens plane argenteas, caput nigrum, nigras item & subtilissimas antennis, oculos flavos, cætera viridia, præterquam in suprema alvo, ubi elegantissimo miniaceo colore insignis est.

Decima quinta exigua est, at longis proportionem alis, iisque fuscis. Tota ipsa candicat. Caput rotundum est, exiguum, alvus hirta.

Decima sexta muscula est omnium minima, tota aterrima, alis albis longissimis pro corporis exilitate.

Decima septima alis pariter longis & totam cooperientibus prædita est, corpore fusco & nigro, superius vario, pedes habet posteriores valde longos, longas item antennis, easque nodosas & flexiles.

Decima octava tota est coloris fusci, corpore exili, brevissimis antennis.

Decima nona alis & alvo coloris aureis splendidissimis, longiuscula, pectore fusca. In capite puncta habet duo lutea, antennis nigras in extremo obtusas.

Vigesima capite est nigro, antennis brevissimis nigris, alis argenteis, cætera ex cæruleo viridis.

Quæ *penultimo loco* picta est, similis est ei, quæ in secunda tabula depicta est sexto ordine, sed crassior & elegantior, nigra & luteis annulis: alis item proceris ex luteo ad castaneum vergentibus, capite nigro rotundo. unionem nigrum æmulante, antennis brevibus, quæ capiti inferuntur, admodum tenuibus, in extremo crassis & obtusis: pedibus longis, subflavis.

Postrema ex Tavanellorum vulgò dictorum genere est, sed insolenti aspectu, quo ranam, bufonemve quodammodo æmulatur. Corpore est procero, crassoque, coloribus nigro & flavo variegato, oculis nigris, amplis, & obtuso rictu ranam, bufonemve (ut dixi) exprimente. Antennis caret. Pedes sunt brevissimi. Alæ longitudine alvum excedunt & latitudine; color iis aterrimus.

PUNCTUM IV.

De Muscis Mouf. aquaticis.

Moufeto duplices sunt muscæ, Mouf. Theatri Insect. pag. 69. *Aquaticæ* nempe & *Terrestres*, quarum illæ *Phryganides*, *Macedonica*, *Tigurina*, *Aeschne*, *Lutea*, *Fusca* & *Tipula*. Ælii. Græcis seu lacustres nomen tale, quod rebus aquis innatantibus, vescantur, & super aquas potissimum degant, sortitæ sunt.

Phryganides, inquit Mouf. ex *Phrygania* vermiculo (quem Angli *Cados Worme* appellant) in aquis degente, & mense Aug. ad superficiem aquar. ascendente exit, quaternis alis, colore fusco, corpore oblògo, 2. antennis breves habens, caudam verò bifurcatam, vel duas fetas è cauda exeuntes. Varia hujus muscæ est forma, quia *Phryganiorum* ipsorum tanta varietas.

Ap. Maced. circa fluvium *Astræum*, qui inter *Berocam* & *Thessal.* medius fluit, volitat muscar. genus, quæ non ubique reperitur, nec ad aliar. muscar. similitudinem quicquam accedunt, nec Apum *Vesparumve*, aut crabronum faciem gerunt; harum tamen, cujusque aliquid referunt: nam magnitudine crabrones, colore vespas, bôbitatione

apes

Muscae referendae ad Tab. i. Aldrov :




Ad Tab. 2. Aldrov.



Ad Tab. 3. Aldrov.



Culices. Mücken.




Musc. Lupus.

M. Carnivora

M. Aquatica

M. Bucularia. Afil9



Afil9 Apiaris

M. Tabanides

M. Scorpuros

M. Bip. 1. Mouf. 2

M. Bip. 3.

M. Bip. 4.

M. Tripilis

M. Bip. 5.

M. Mirabilis

M. quadripelo

apes, audacia reliquas muscas repræsentant; ἰπποδῆρος indigenæ vocant. Equifeles Latini; per summas aquas volitantes piscibus in escam cedunt.

Musca aquatilis æstiva maior frequens circa Tigurum conspicitur mense Majo (vulgò tes glafft vocant) quam à generoso nominatam accepimus & à Tigurinis describi optamus.

Aeschna muscæ sunt aquaticæ, colore cinereo, alis quatuor, sex pedib. juxta caudam multos quasi exiguos pilos lanuginosos habentes.

Musca aquatilis lutea ex fusco lutescit, alas habet lōgas, in scapulis semper inter volandum erectas. Oculi illi magni prominentes, cauda longa articulata, cuius in extremitate duo pili longi exeunt; juxta flumina & paludes semper versatur, rarius alibi, præsertim à pluviis.

Fusca alia est quatuor alis longis, longisq; crurib. corpore articulo; duas longas antennas in fronte gerit, parvum caput, oculos prominentes & nigricantes. Alæ fuscæ, sed dilutæ magis, quàm reliquum corpus. In sylvis juxta paludes & stagnantes aquas ferè semper reperitur.

Deniq; inter rariores muscas illam *Cardani* referam, à semetipso descriptam his verbis: Animal, inquit, habeo scarabæo simile, quod non fœtet, molle, celerrimum omnium, quæ novum, annulo forum: colore est fulvo obscuro, non nigro, 6. pedib. duabus alis per brevibus atque tenuibus, quæ caudam minimè tegunt, caudam habet eiusdem cum capite figuræ & formæ, ut bicipitem esse putares. Nam ut supina capitis parte os habet, duoque ibi cornicula sub mento brevia: Sic duo item alia in prona: toto animali longiora, totidem quoq; habet in cauda, sed his duobus, quæ in capite longissima sunt, breviora, ex his tamen superiora inferioribus longiora sunt & crassiora. Quam sanè bestiolam non vulgarem utinam cum Cardano vidissem, ut descriptioni huic iconem adjecissem.

Et tantum de Muscis Aquat. Mouset. Ego quadripennes ad Zygānam potius vel Papiliones referrem.

PUNCTUM V.

De Muscis Mouseti terrestribus Ζωοφάγοις.

Terrestres muscæ ad quas & minutissima illæ, quæ celerrimè currunt, & in novellis sceniculi foliis subinde reperiuntur, sunt vel αἰθιλοφάγοι, vel ἐπεροφάγοι. Illæ magnæ sūt, μακροκνημοί, & muscis potissimum vescuntur. Hæ aut sunt ζωοφάγοι, exq; *Carnivora*, *canina*, *Equifuga*, δαμαληφάγοι *bucularum osiores*, *ovifuga*, ὀφιοβόροι *serpentinivora*, σκατοφάγοι, *merdivora*, βεμβυλοφάγοι, *bombylivora*, vel αἰζωοφάγοι. *Carnivora* musca est fere omnium, si corpus respicias, maxima, capite rubente, corpore pūctulis ex fusco albicantib. variegato: vêtre crasso, cœruleo, pellucido, alis duab. nigris, hirta pilis, carnes avidè appetit. Solitaria plerumq; volat, rarius multæ simul conspiciuntur, nisi forte in carnario atq; macello: ubi lanii lanistas agunt, muscario muscas continuò cedentes aut abigentes, ne illar. vermib. (Hipp. βλάς vocat) obsonia scatentia pervilescant. Proditum memoriæ est (Cælio Rhodig. narrante) ap. Tolet, in publico macello unā muscam albedine nivea notabilè per integrū annū comparuisse. Quā huius generis fuisse non dubito affirmare, quū in macello tādiu fuerit cōspecta.

Κυνομύια, Musca canū, Angl. à dogge Flye, Germ. *Hundesfliege*/ *Hundsmuschel*/ Pol. Psia mucha ex Isid. Euthym. & Philon. sententia Musca est sylvestris, catulor. aurib. infesta, quam et si frequenter excutiant, importunè tñ. revolat, ac diutius ubi inhæserit, erosione carnis ulcus excitat. De hac Homer. Iliad. φ. τ. ἰ. π. αὐτὴ κυνομύια θεὸς ἐείδει ξυνηλαίνεις; Athen. item eleganti cuidā scorto ob singularem impudentiam, mordacitatem atq; molestiā, κυνομύιας nomen additum libro quartomemorat. Est enim κυνομύια (ut or Philonis verbis) ἐντομονλίαν διακτικὸν αἰταιδὲς καὶ ὀπιθεῖλον. Videretur mihi in sacris literis (nēpe Exo. 8. Pl. 77 & 104.) insector. nocentiū generale hoc esse nomen, ut ex Chaldaica paraphrasi apparet. Quod speciatim aliquid significet, nulli generi muscar. magis cōveniet, quam

quàm nigris illis grandiorib. latiorib. compressiorib. vulgaribus. quę impudenter involant jumentis, & non tantum ichorem, ut reliquę, sed ex alto sanguinem maximo cum dolore eliciunt atq; exsugunt. Carent proboscide, verum illius locogeminos dentes, ut vespę habent, quos altè infigūt cuti, potissimum v. pendulas canum aures infestant ap. Germ. (asserente Camerario) atq; sæpe excoriant. Has nobilis quidam Anglus in Italia se vidisse dixit, alis exceptis Ricino per omnia similes: quem ita compressis alis repræsentant, ut utrumq; doctissimus ille Barbarus confundat. Niphus illi ut summam velocitatem, ita rotunditatem corporis assignat.

Ovisuga ad κυρμύαν proximè accedit, dum volat, horrendum quid studet & Asilo gravius & tardius volat. Duę sunt eius species, solum magnitudine distant, maior sylvicola, minor verò sepicola.

Ἰπποβοσκίαι, Germ. *Hosmücken* / sunt muscę magnitud. vulgariū, corpore cōpresso, duro, plano ac tenaci adeò substantia, ut inter digitos vix rumpi possint, nigricant magis quàm vulgares, nunquam rectà provolant, sed lateratim, uti dicam, & quasi per saltus, nec diu continuare volatum possunt, neq; longè. Equos præcipuè ap. Anglos vexant, eos circa aures, nares, testes & emuntoria perpetim lancinantes, quor. sudore juxta cutem ad radices pilor. diffuente vivunt. Angliis à fide flyn vel à horse flye nomina imposuerunt, ut & Græci πλεγοποτίτες vocant. Quidam è Græcis κυνοεχίαι appellant, ac etiam in calidiorib. regionib. easdem canib. quoq; molestiam afferre maximam affirmant. Crotonis speciem alatam ac volatilem dicunt, sed hanc plane aliam speciem esse arbitror, ac solis equis infensam.

De Buculariis seu δαμαληφάγοις in cetero agemus.

His proximè accedit alia musca, bobus & jumentis interdum sole fervido infesta, quam Pennius *curvicaudam* σκυρομερον jure appellat. Semper n. crurib. aut ventri iumentis insidens, caudam versus ipsam recurvam tenet & spiculum exertum, quò ad percu-

tiendum cauda sit paratior. Hanc Angliā Whame andā Burrell flye proprie vocant, nec nisi in Anglia facile invenitur. Musca hæc api ferè similis forma & colore, sed corpore est crassiore. Non adhæret, nec sanguinem fugit, sed solummodo stimulo in cauda pungit, atque ut equos affligat, per longissima itinera ipsos volando persequitur. Equi natura hanc muscam timent, & ad eius solum contactum quasi horrent, cauda pedibusq; & labiis tam cruentum hostem abigere sæpe conantes. Sunt, qui putant, hanc muscam non aculeo pūgere, sed stercorea pilis equi affigere cauda, unde postea molestissimæ lendes gignuntur; Sed hoc experientia dixerit, nam ratio in re tam minimè probanda fileat & obmutescit.

οφιόβη in Dryini præsertim serpentis squamis latibula habere dicitur Aët. quæ tandem ipsos serpentes exanimis reddit, hæc pennis æreis donata χαλκή πνία vocata ab Hesych. ὅτι χαλκίζει τῇ χειρί, cum cantharis vescitur, & morfu calorem serpentibus ingentem parit, deinde sitim inextinguibilem & mortem. Horum pastæ cadaveribus si postea hominem momorderint, lethale infligunt vulnus & insanabile.

Merdivoræ muscæ plurimæ sunt, alia est Creophago similis, sed maior oculis obscurè rubentib. scapulis atratis, in quib. circulus oblongus pauxillum albicans, dorsum nigrū ex lineis transversim ductis ornatum. Alæ argenteę, corpore lōgiore, circa stercus humanum plurimū versantur, aliàs perrarò.

Est & musca *viridis* toto corpore, splendore nimio quasi lanterna Putnica pellucens, capite fusco, alis argenteis, in sylvis frequens, circa stercorea ferè versatur, vulgaribus muscis magnitudine æqualis. An sit Giacucul Sylvatici ignoro.

Aliam κορεσφάγον deprehendimus, musca viridi minorem, corpore fusco, capite rubro saturato, lineā mediū quasi caput secantē.

Aliam item vidimus corpore hirsuto, subflavo, oculis nigris prominentib. scapulis & dorso nigro pulcherrimè maculatis, cauda sublutea.

Alia

Alia item est, cui scapulæ dilutum rubent, ad croceum colorem parum accedentes. Duas habet antennis cæteris longiores, alas argenteas, totum corpus tegentes, caput nigrum, quadratum & exiguum; in stercore potissimum equino frequens asidet.

Denig. in sterquiliniis (unde eas gigni probabile est) muscæ quædam crocæ apparent, corpore reliquis magis oblongo ac gibbofo.

Muscæ item raram, nec ubiq; obviam, murum ex aggesto fimo & materia putrescente factum depascentem vidi, omnino nigram, si absque alis quatuor argenteis fuisset. In scapulis etiam quatuor puncta alba, in reliquo corpore octo, id est, utrinque quatuor. Oculi albi, frons candido veluti asterisco notata, ex qua duæ antennæ nigrae & longæ emergant; habet item in supremo quoque femore album punctulum aspersum. Hanc muscæ etiamnum in pyxide mortuam & conditam varietatis causa custodio.

Bombylophagus musca est montana, magna, nigerrima, corpore hirsuto, oculis oblongis, magnis, capite spadiceo, prædæ causa acrem cum Bombylio pugnam init, & volatu superans dorsum agilis conscendit, eiq; tenaciter inhærens tam acriter mordet, ut hostem præcipitem in terram mittat, & melle qualicunq; absorpto victrix abeat. In summis Cartmeli montibus se hanc pugnam, donec acies staret, confexisse memorat in schedis Pennius, sed fortuna muscis favente Bombylios vita fuisse ejectos narrat.

PUNCTUM VI.

De Muscis Moufeti terrestribus *ἡ ζωοφάγοις.*

ἡ ζωοφάγοις rebus ab animalium natura diversis victum quæritant, suntque *Humifuge* & *Herbivore*, quas itidem Moufeti verbis describere placet.

Humifuga corpore est fusco, in ca-

pite juxta os albicante macula resplendens. Venter & pedes nigri: secus alarum exortum macula utrinque album gerit, dorsum griseum. In scapulis secundum longitudinem quatuor lineas obscurius albicantes obtinet, alas argenteas, & (si in aquâ positæ fuerint) noctilucas. In semitis & talparum tumulis recens egestis invenitur, amat etiam humum pedibus complanatam & lævigatam, unde ab Anglis vocatur Thegray path flye: floribus raro insidet, eâ præsertim tempestate, quando talpæ terram evertunt, cujus se humore sustentant.

Herbivorarum varix sunt species, quarum tres apibus ferè similes, Luciano *ἡ ἐγὼ λήδες* dictæ, id est, militares. Sunt enim aliis muscis grandiores, animosiores, magisq; athleticæ, aspectu pulcherrimæ, alis argenteis duabus per insignes.

Harum *maxima* & *primaria* caput nigricans habet, dorsum medium inter duas lineas transversas veluti decussatum, extrema cauda nigra. Aliàs corpore est luteo.

Secunda non multum dissimilis, capite nigricante, scapulas quatuor lineæ flavæ, & tres nigrae secundum longitudinem ductæ ornant, reliquum corpus eodem ferè modo & iisdem coloribus est distinctum.

Tertia atque minimæ harum scapulæ flavent hirsutæ, caput rubet, reliquum corpus quatuor lineis nigris totidemque flavis per transversum actis distinguitur. Omnium corpora splendent, ac quasi inania translucent. In hortis versantur, & floribus assidentes succum eliciunt.

Lucianus militares muscas ita describit: Nascuntur, inquit, & maximæ quædam muscæ, quas militares multi appellant, nonnulli verò canes, sonitu asperrimæ & volatu velocissimæ. Hæ & longissimæ vitæ sunt, & totâ hyeme incubatæ perdurant: contractæ præsertim & connexæ tectis & culminibus. In quibus & illud est admiratione dignissimū, quod utrumq; & sceminarū & mariū faciunt,

K ut Mer-

ut Mercurii & Veneris filius, qui mi-
sta natura fuit & duplici forma. His
fortè συγγενὴς est alia musca apiaria
dicta, cum splendore nigra, bipennis,
cerilega, collectos florum succos pos-
terioribus pedibus affigens apum
more. Autumno apparet, rarissimè
aliis temporibus. An hæc Aristote-
lis Sirenis? Sanè alarum tantum nu-
mero dissentit, quoniã illam τετραπτερον
fecit, hæc verò duas tantum alas à na-
tura consecuta est.

Harum alix sunt *σφαλιόπτεροι*, alix *ἐ-
ννόπτεροι*, alix *χελιδόνιοι*.

Strutiopteron tres species vidimus.
Prima tenera est & mollis, sepes, bi-
nis alis, alvo oblongâ, à capite pau-
lò supra oculos duas veluti struthio-
rum pennas præmittens, ceu cornua
lanuginosâ mollitie ne ipsis quidem
plumis cedentia: scapulis utitur gib-
bosis, reliquo corpore albo, nigris
suis alis longiore.

Secunda est ejusdem generis colo-
re albicante, capite fusco, aliàs pa-
rum differt.

Tertia est omninò similis, sed an-
tennas adeò molles & plumosas non
habet, cauda albicat, corpore oblon-
go, quatuor albis lineis transversis
insignitur, pedes longiufculi, albo ni-
groque colore distincti: dum gra-
dus confert, caudam paulatim ele-
vat, atque alas binas translucidas
veluti jactabunda diverberat. Hæ
tres species verno tempore cum pri-
mis apparent in hortis sepibus atque
umbrosis locis, post atq; ante pluvias
frequentes.

Erinopteros tota alba est musca,
vel potius argentea, exigua & ubi-
que plumosa, adeò, ut, dum foliis in-
fidet, nisi penitus intuearis, plumam
diceret: alæ illi quasi dissectæ, sepa-
ratis pennis avium ferè modo dis-
junctæ. Ab Edmundo Kniveto de-
pictam accepit Pennius, deinde in
sepibus & ligustrinis topariis sæpius
vidit.

Musca, *χελιδών* dicta, volatu post
se omnes relinquit, lateribus, cau-
dâ, capite fusca & pilosa, oculos
nigros habet propendulos, rostrum
vel potius nasum mucronatum, è

cujus apice antennæ duæ erum-
punt; scapulæ summæ, ut & dor-
sum, nigræ: alæ duæ argenteæ, qua-
rum partes anteriores pedum nigre-
dini respondent. Quandoque in u-
no loco residet, veluti immobilis, ve-
rùm ubi propè accesseris, incredibili
celeritate oculos fallit, & ne hiru-
dini quidem celeritatis palmam (un-
de dicta *Hirundo*) unquam con-
cedit.

Quam à Clusio Pennius accepit,
nigra erat, alis duabus argenteis in-
structa, oculis albis conspicua. In
dorso septem maculæ luteæ cum ni-
gro in medio puncto erant.

PUNCTUM VII.

De Muscis Moufeti seti- candis.

PRÆTER has Muscarum species ob-
servavit adhuc Moufetus, *setican-*
das seu *pilicaudas* *τετράπτερος* & *Raras*. Il-
larum alix *unam*, alix *duas*, alix *tres*
quatuorve setas habent.

Henothrix five *Vnifeta* (sunt ver-
ba Moufeti) est musca caudata, to-
to corpore nigra (medio dorso ven-
treque rubesciente excepto) alis dua-
bus argenteis prædita, scapulis cras-
sis, antennulis duabus nigellis facta,
pilum unicum longum è cauda emit-
tens. Hanc depictam ad Pennium
idem Joachimus transmisit, affir-
mans eam non nisi Ameo præstantiori
insidere, reliquas herbas non at-
tingere.

Διπότερες sunt muscæ duas in cau-
da setas pilosvè habentes, quarum
alix sunt corpore fastigiato, alix tu-
beroso. Prioris generis duas vidi-
mus alis quatuor argenteis sine ma-
culis, capitibus & scapulis nigrican-
tibus, reliquo corpore fusco, nigris
lineis transversis variato. Utrique
longæ & exiles antennæ, similesque
in cauda pili duo, sed paulò longio-
res, corpore tuberoso.

Bipiles quinque habemus. *Prima*
Henothrici p omnia ferè similis, nisi
quod

quod huic plus quam media corporis pars flavescit, duos in cauda pilos prælongos, quorum unus extensus canis leporarii currentis caudam refert, alter intus convolutus lineam spiralem.

Secunda muscarum longarum species est, quatuor habens alas argenteas, pedes longos mediocriter flavescentes, totum corpus nigrum, scapulas crassas, antennas duas longas & tenuēs, ventrem versus caudam protruberantem, è qua duæ breves setulæ sursum versæ erumpunt; In sepibus degit.

Tertiam Carolus Clusius Viennamisit: corpore ex fusco nigricante, alis duabus largis ex argento cæruleis donatam, corpore præditam acuminato, ex quo duæ setæ (ut Pennius notavit.) vel plumæ potius excrescunt perdicei coloris, maculis nigris fuscisque mixtim ornata.

Quarta globoso est corpore, quod unciam longitudine æquat, caput, scapulæ ac pectus nigerrima, antennæ breves, pectori crasso sex pedes affixi nigerrimi, quorum priores omnium brevissimi, posteriores longissimi. Inter volandum pedes simul conjunctos pendulos dimittit, alæ quatuor obscuræ, argentei coloris, oculi nigri splendentes, caudæ extremitas nigra, unde duæ setulæ paucillæ longitudinis se monstrant: à scapulis ad mediam usq; caudam colore est ferè sub croceo, cauda tenui quasi filo longo scapulis conjungitur. Velociter currit quasi per saltus, in terra nidificat, muscis & erucis parvis famem extinguit.

Quinta longè hac minor est, figura eadem, sed alas verè argenteas monstrat, totumq; corpus ad caudam usque fuscum rubescit.

Tripilium muscarum quinq; duntaxat observavimus.

Prima oblongo est corpore & nigro, cujus medium valdè ex nigro rubet: antennas habet duas, etiam nigras, alas argenteas, quarum supremam oram maculâ nigriuscula adornat. Crura rubent, cauda tres crines longos emittit, velociter volat.

Alterâ similis, sed minor, toto corpore nigra, priore multò longior, tenuior atq; exilior; alæ item argenteæ, antennæ priori similes, ac cauda tres longos pilos protrudens, volatus celeritudine à prima longè superatur.

Est & musca *tripilis* toto corpore albicans, nisi quod alæ quatuor maculis nigris distinctæ videantur, quarum exteriores majores, interiores verò breviores, has, dū quiescit, semper erectas tenet. Sex habet pedes, quatuor minores corpori affixos, duos anteriores majores, nigras, è collo ferè oriundos; inter duos oculos nigras prominentes globosas duæ antennæ nigræ atque breves exeunt. Corpus gracile, teres, longum transversum digitum: in cauda tres visuntur setæ corpus longitudine æquant, quas volando in veri trianguli modum expandit. Majo & Junio mensibus ante & post pluvias potissimum apparet; circa fluvios paucis comitibus stipata convolat, quibuscum in itinere sæpè colludit. Anterioribus pedibus utitur quandoq; ad palpandum, ecquid in via impedimenti sese objecerit, extendit enim illos corniculorum more. Talem anno 73. observavit Pennius.

Sequitur *quarta* mirabilis structura, alas habet duas argenteas, totum corpus nigricat, os forcipatum & aquilinum, in fronte duo cornicula brevia erumpunt: quatuor illi tantum sunt pedes, sub pectore duo graciles & breves; paulò inferius reliqui robustiores. Ex oblonga cauda primum duo brevissimi pili exeunt, atque sub his tertius multò longior, in extremo tuberosus oritur. Semel tantum se hanc muscā circa Hinningham, olim Comitum Oxoniensis castrum, vidisse memorat Pennius.

Ultima toto corpore & cauda nigra est. Corpus habet oblongum, alas duas corpore nonnihil breviores, pedes ex croceo flavescentes, caudam longitudine reliquum corpus æquantem, nisi semel in Cantio circa Greenhivē visā perhibetur à Pennio.

Quadripilis musca corpore Tripilem primam repræsentat, sed magis versus caudam protuberat; pedes item nigri, ut antennæ, alæ item proceræ, quarum externæ internis triplo majores circa medium nigrâ maculâ distinctæ. Quatuor è cauda pilos emittit.

Deraris muscarum speciebus, quarum quædam ad Papilionum censum spectant, ita idem.

Prima est musca papiloni minori æmula, alis quatuor argenteis, nigricantibus maculis corpus argenteæ lineæ transversim ornant, cauda rubens ex fusco; caput nigrum, scapula ejusdem cum cauda coloris, antennæ tenues, nigrae, breves, pedes exigui, nigri; in sepibus versatur præcipuè tempore matutino.

Secunda parum à prima diversa est, nisi quod unâ cum corpore antennis, pedibusque & cruribus fusca sit.

Tertia est item *terrestris*. Sunt autem longiores illi alæ, maculis nigris distinctæ caput majusculum, nigrum, punctulis luteis pauculis notatum, antennæ tenues, duæ, nigrae, pedes sex subalbicantes, pectori crassiusculo affixi: scapulæ lutescentibus ex albo maculis variegatæ; dorsum quinque lineæ transversim ornant luteæ, ac punctulus unicus inter duas lineas conspicitur colore subluteo; in cauda quinque vertebræ rubent, cujus extremitas bifurcata est.

Quarta est non valdè dissimilis, sed alas habet argenteas, sine maculis antennas nigras longiores. Corpus septem lineis transversis albicantibus insignitur.

Vidimus & duas muscas *scorpionum*.

Prima similes habet præcedenti alas argenteas, sed paulò minores, & in extremitate ipsarum tribus transversis lineis nigris signatas, caput nigrum, pectus (ut & scapulæ pedesq;) albicat: reliquum corpus nigrum, cauda quinque quasi juncturas habet, quarum tres dilutè rubent, duæ nigricant; extrema cauda bifurca, furcæ autem nigrae, & scorpionum modo sursum curvatæ.

Secunda ferè similis, sed extremitas caudæ crassior, furcæ obtusæ, caput luteum, oblongum os, alæ singulæ sex maculis nigris ornatae.

Est & alia musca *quadripennis* corpore virescente, alis quatuor corpore longioribus, è liquido quasi argento factis, quarum nervi virescunt; antennæ huic tenues & nigrae, oculi aurei (unde jure Chrysopis dicitur) volatus languidus, odor terribilissimus, quem, ut blattæ, cum vita amittit. Hortorum hospes vivit sambuco insidens. An ex Eruca oriatur, papilionum more, an verò ex vermibus arborum, equidem ignoro. Doctissimus ille atq; humanitate clarissimus Joachimus Camerarius primus illam Pennio ostendit.

ARTICULUS III.

De Tabano.

ET si Isidorus & Junius Tabanum Nomen **E**cum Oestro seu Afilo, eundem faciant: ipsa tamen descriptio, diversitatem inter eos ostendit, Græci *μωπτα*, à stimulando fortè, nam *μωπ*, calcar quo equi stimulantur significat, dixere. Apud Latinos tabe, quod corpore tabeat, id est gracilis sit, nomen obtinuit.

Totum corpus oblongum est, in Descriptio ^{ptio.} tres præcipuas partes divisum, caput nempè scapulas & ventrem, quinque vel sex incisuris distinctum. Nigricat ex diluto albo totus. In ore proboscis longa, torosa. Sex non octo ut Ardoinus prodit, nigris pedibus instruitur: reliquis maximâ *κρυμνισαν* refert, Cauda ei stimulgera nulla. Plin. H. N. 11. c. 28.

Frequentes sunt circa sylvas & vias Plin. H. N. 11. c. 33. ^{regias}, sepibus arboribusque munitas. Ex ligno, Plinio teste, proveniunt. Ex eodem nasci scripsit Aristoteles. Julio & Augusto mensibus propter nimium æstum ferociunt: homines tum, equos & serpentes affligunt. Equum in sylva ad arborem alligatum, sex horarum spacio à Tabanis occisum, Mouserus ab amico fide dignissimo accepit. Quia longè videre nequeunt, jumenta per sudoris odorem conse-

consequuntur. Gerunt cum teterimi fœtoris serpente; circa Hellepontum bellum. Camelos etiam infestare, pinguedine piscium abigi, prodidit Plinius.

Nicand. in
Theriaca.
Plin. H. N.
31. c. 2.
Differētia.

Diversa Tabanorum in India Occidentali genera esse, Oviedus observavit, sed non descripsit. Duo apud Aldrovandum habemus. *Vnum* est corpore minore, capite nigro, antennis brevissimis, ut vix appareant, pectore & pedibus nigris, alis subluteis, circularisque concoloribus qui alvum ambiunt. *Alterum* minus adhuc, capite nigro, duobus albis punctulis in vertice insignito, pectore ex nigredine ad subcinereum colorem tendente. Alvo & alis subcinereis.

Moufet. p.
62.

Proximè Tabano illa musca accedit, quæ *Χελιδὼν* & *Curvicauda* Pennio. Apiferè est similis, corpus duntaxat crassius. Stimulo in cauda pungit, quam jumento insidens, versus ipsam recurvam tenet. Non facilè nisi in Anglia invenitur. Sunt qui sterora equi pilis affigere, sic pungerè credunt; quòd molestissimæ postea indelendes nascantur.

Moufet. In-
sect. 1. c. 11.
p. 61.

Huc referri potest & illa apud Moufetum *Tabanides musca*, quæ capite & corpore virescit. *Scapula* ex virore splendent: *alas* habet duas extremis mediisque partibus albicantes, reliquæ ex fusco nigricant. Pennius semel Hanvorthi talem observavit.

ARTICULUS IV.

De Asilo seu Oestro.

Nomen.

A Silus à Calepino & aliis cum Tabano confunditur. Perperam, superius dictum. An à Silaro amne ad quem frequens, nomen sumpserit, dubium: ab affiliendo, vel quòd atellos infester, verisimilius mihi est. Græcis est *οἰστρὸν*, (Latinis Oestrus & Oestrum) *ἀπὸ τοῦ οἰστρεῖν*, insanire, quòd armētā in furorem agat. *Αἰόλον* Eustathius ex Homero vocat, vel quòd forma sit *ὑπό χαλκόν*; vel quòd turbinis in modum moveatur. A feroci natura Oppianus *ἀγρίον* dixit.

Est *χλωροκεφαλὴς*, & toto corpore

ὑπό χαλκόν, five subarratus, superat Descriptio
Tabanum proboscidis magnitudine; ab eodem verò bombi stridore vincitur. Gestat antèrius, durum, robustum, & benè compactum *aculeum*, Suidas. quo boves tergore facilè pertundit. Eustathius muscæ per omnia similè; sed majorem facit. Alii locustæ similem (perperam) colore varium, mobilem, *ὑπό χαλκόν* ponunt.

Circa stagna & fluvios versantur, ad Silerum Lucaniæ amnem maximè. E latioribus quibusdam bestiolis, quæ fluvios supernatent oriri, ex Aristotele habemus; quas fortè alio in loco culices aquaticas nominat.

Naturā.

Arist. H. A.
5. c. 19.

Nicandri scholiastes hirūdines, interpretatur: quasi sanguivora soboles ex sanguisugis matrib. prodiret. Nasci & ex putri, nemo fortè negaverit. Tantummodò boves laceſſunt, quos interdum furibundos reddunt; æstu inprimis urente. Ne attingant, piscium fortè adeps, ut apud Plinium legimus, faciet. Celerrimè volant, & præcipites.

Homer. in
Odyssæa.

Plin. H. N.
31. c. 2.

Moufetus *Ocularij*, *Apiarij*, *Indici*, & *Moscoviticij* meminit. Prioris jã meminimus. *Apiarius*, in extremis partibus favorum nascitur. Caput est spadi-
cei coloris: linea albā à fronte ad occiput intercurrit: scapulæ & dorsum fuscescunt. Non florum duntaxat succo, & melle, sed & sanguine vescitur. *Indicum* Virginia præfert, muscæ maximè capite subrubente magnitudine, capite nigro. Linea argentea à scapulis ad os pertrahitur: ipsæ ex fusco nigrescunt, & geminas alas argēteas emittunt. Caudam sex vel septem subalbidi coloris incisuræ stringunt, reliquum corpus subnigricat. Venter ex cinereo lutescente dilutè virescit. Celerrimè volat. *Moscoviticum* Elmerus Chirurgus Moufeto misit. Alæ huic argenteæ, toto corpore longiores; oculi magni, oblongi, & maximam capitis partem replētes, rostrum nigrum, duriusculum; tripartitum, quo citissimè caligas è triplici panno consutas penetrabat, & cutem ipsam ad-
mordebat.

Differētiæ

Plin. H. N.
11. c. 16.

ARTICULUS V.

De Ephemero, & aliis quibusdam.

Ephemeron muscam vocat Aristoteles, quæ Aeliano ἐφήμερος, Helychio μολύσκη, aliis ἡμερόβητος, Latinis Diaria vocatur. Meminit ejus & Cicero. Quatuor alis, totidemque pedibus movetur, ut apud Aristotelem legimus. Scaliger addit, caput quale muscæ, oculos grandissimos, promuscidem in se convolutam; caudam longissimam, sectiunculis coægestatam atque coaptatam, in extremo bifidam & trifidam; colore subaureo in majoribus, in minoribus subfusco illustrem, ventriosa est. Taurini Moniettam vocant quasi Monachiellam: Adriatici ad Maranum & Tergestæ Cuzotullum; alii Sitivolam, quasi Sagitellam. Una cum sole oritur, adolescit, vigescit, languescit, moritur. Scaliger nullam manè ad Sarcam & Benacum conspexit, circa vespërâ omnes, captam per noctem servavit. Sub solstitio æstivo ex folliculis quibusdam uvarum putrescentium erumpit, Plinius tenues membranas vocat. Frequentissimæ ad Hippanim fluvium inveniuntur, prodeunte Aristotele. An verò folliculi isti Chrysalides sint, à quibusdam E-rucis prodeuntes, difficile est dicere. Succo animulam sustentant, nec aëri nec terræ quicquam debentes. Michovius eorundem ad Borysthenem meminit. Sunt, inquit, vermes, & volucris alata, quaternis interdum senis alis, manè supra aquam currendo, circa meridiem juxta ripas volando sese exercent, sole verò occidēte, quotquot eo die nata sunt, eodem obeunt. Huc pertinent, Pennii ἐφήμερος, Aeliani Ephemerus, & Scaligeri volucella Τελύμνηστος corpore est oblongo & papilionari: Capite parvo subluteo: oculis grandibus, prominentibus nigris; promuscide involuta, verbasci lutei coloris, quo rorem à floribus fugit. Cornicula duo nigra, longiuscula, paulo supra oculos affixa habet: ventrem & dorsum sublividum,

Scalig. Ex-
tr. 194. f. 5.

Arist. H. A.
5. cap. 19.
Ex de par-
tib. Ani-
mal. 4. c. 6.

Michov.
Sarm. Eu-
rop. l. 2.

Monf. et.
Theatr. in-
sect. 1. c. 12.

extremam caudam ferè luteam. Alas quot pedes; quarum exteriores lividæ, extremis fimbriis ex fusco sublu-teis; interiores ex fusco flavescētes. Alæ externæ, cum ad corpus regen-dum conjunguntur, adeo sunt con-tiguae, ut contactum earum vix anim-advertas. Tardivola est, nec diu in volatu durat. Inter malvas & urti-cas, & quidem triduo duntaxat, vivit. Quam Scaliger Volucellam vocat, illa Cardano Muscilio est, Moufeto Bibio, Aeliano fortè ἐφήμερος, Grapaldo Mu-scilla, muscula, & Muscio. Aelianus suam è fece vini acefcētis oriri scribit: Grapaldus suam per autumnum in vinaceis. Nullum etsi rostellum ha-bere videatur: ajunt tamen, dolia un-ciali robore confecta ab iis pertundi, ut vinum totum effluat. Frequentis-sima est in cellis, nec quicquam præ-ter vinum appetit.

Coronidis loco duas adhuc Mu-scarum species adiciemus. Una in florum calicibus, herbæ illius quæ Benalbum à plurimis vocatur, latet, & quidem florivora: ut à Bruno Pennius accepit.

Alterâ in occidentalis Angliæ ur-bis cujusdam agro (Tanton vocant) in fructu mali arboris, quem Velin ap-pellant, ætate ad umbilicum mor-tua, viridis ac splendens reperitur. Malo dissecto musca evolat, & ex vermiculo quodam ibidem orto gi-gni videtur.

ARTICULUS VI.

De Culicibus.

Culex vel ab aculeo, quod eo san-guinem sugat & carnem tere-bret, quod Isidoro visum, Latinis dictus est; vel quasi Cutilex quod cutem laciât. Usurpatur in virili & mulie-brigenere. Moufetus Cuticem vocare mallet. Græci, generali quo omnes culices comprehendant, nomine ca-rent. κόρυς amplissimum est, quod πόρνοψ Pausaniæ. Hinc Octæis Her-cules Conopius, qui culices abegit: Βαοτίις Parnopius Apollo. Rulando, ἐμνίς, νυκτελός, κόρυς, αὐξητήρ, στέφας, στυλός.

Nomen.

Isidor. O-
rig. 12. c. 8.

Monf. et.
Insect. 1.
c. 13.

ἐκνήψ, & ἐκνήψ, Synonima sunt. Nihil quidem certius ἐκνήψα culicem apud Aristotelem Gazæ esse: sed Aristophanis scholiastes, ζῶον ὑδατὶ γινόμενον, ὁμοίον τῷ κώνωπι, μείζον δὲ τῇ περλοχῇ, καὶ δὲ τὸ μέσον λευκῷ περιεσφόμενον, seu animal propè aquas genitum Conopisimile, majus verò in circumferentia, & circa medium, lineâ albâ cinctum, interpretatur. Alibi tamen κώνωπα dici ponit. Κινώπε & Hefychio sunt κινώδαλα θηρία, animalia reptilia, Nicandro, ἐν τῷ πένθῳ κινέμεθα, ἐκνήψ peculiaris generis nomen esse videtur, quod fortè Plinio sub *Culicum mulionum* nomine venit. Hefychius volucres culici simile exponit. Σελήνητοι, eisdem sunt κώνωπες. Σέβφο denique animalculum formicæ aut veri simile Varino. Videtur & Σέβφο dici. Constantinus animalculum Culici simile exponit.

Miratur hoc insectorum genus Plinius. *Vbi, inquit, tot sensus collocavit in culice? Vbi visum in eo prætendit? ubi gustatum applicavit? ubi odoratum inseruit? ubi verò truculentam illam & portione maximam vocem, ingeneravit? quâ subtilitate pennas adnexuit? prælongavit pedum crura? disposuit jejunam caveam, uti alvum? avitam sanguinis & potissimum humani sitim accendit? Telum verò perfodiendo tergori, quo spicularit ingenio? Atq; ut in capaci, cum cerni non possit exilitas, ita reciproca geminavit arte, ut fodiendo acuminatum pariter, sorbendoq; fistulosum esset.* Corpus eis oblongum, proboscis, quam omnes in ore gerunt, quia ex bipennibus, muscarum proboscide triplo longior. *Alæ duæ, magnæ, ex gibbosis scapulis oriuntur. Crura sex vaccia, prælonga, valga, è pectore prominente & quadrato nascuntur, cum ut melius ambulent; tum ut facilius sese humo attollant.*

Paludosis & aquosis locis plarumque gaudent. Mesopotamia insignes & leonibus infestos alit. In Aegypto magna eorum copia. Bellonium cum comitibus ita circa Cairum vexavere, ut exanthematibus correpti viderentur. Eorundem cantu famosa Adriæ littora facit Martialis. In India Occidentali invenias qui

vestes pertundant. Antiochiam & Byzantium ne possent ingredi, Apollonium Thyanæum fecisse, Tzetzes auctor est.

Acidis delectari reliquit Aristoteles & post eum Plinius, reliquit. Nec dulcia respuere certum, siquidem sanguinem humanum, qui dulcis est, eliciunt. Hauriunt & vinum, consumptoque moriuntur saliceto, ut Martialis habet.

Quia non coeunt, ideo necesse est, ut ex putri, vel aliunde nascatur.

Albertus ex aquosis vaporibus oriri scribit. Ex coffis provenire primus Pierius, & falsò, prodidit. Ut verbo dicam, Alii ex putridis cadaveribus, ex putrida in paludosis aquis materia alii: ex herbis, arboribus, ut polio, lentisco, ficu, therebintho, palmâ, ulmo, quidam prodeunt. *E vermiculis*, inquit Moufetus, *in napo, lignstro, lentisco, therebintho, ficu, caprifico, aliisq; arboribus veluti seminum sparsis, & per non putrescentem sed animantem naturam natis, culices prodire nemo nò novit.* Brugerus verò insectum longis admodum pedibus, quod culicem majorem dixisset, in lacuna valde fordida, ex theca coriaceâ molli sese proripere, vidit: putabatq; ex verme aliquo erucæ simili ibidem incluso ortum duxisse: quod casula talis intus fuisset, in qualem sese erucæ transformare solent. Plura in Differentiis.

Olfaetu plurimum valent. In volando, aërem, ob alarum mollitiem & alvi tenuitatem, non commovent. Lumine adeò delectantur, ut sæpissimè in lucernas incidant. Strepitum alarum continuâ & replicata concussione edere, credibile est. Chærephon apud Aristophanem, an per podicem, an per os canant, faceret ex Socrate quærit. Quia morlu valent, ideo non mirum, Myuntem urbem, è palude quadam, quam Mæander fluvius obstructo limo ostio, effecerat, olim vastasse: Acarnensium urbis quæ juxta Asiæ Pergamum frequens habitabatur, pulsos incolas, quod apud Pausaniam habetur.

Idem leonibus, in Mesopotamia, & apud Rizophagos qui Astaboran & Asta-

Mart. 4.
Rer. Oceani
ni 4.

Desad. 3. &
l. 9. Decade 7.

Tzetzes.
Chil. 2.
Cibus.

Arist. H. A.
4. c. 7.
Plin. H. N.
10. c. 70.

Generatio

Moufet.
Theatril.
scilicet l. 1. cap.
13. p. 84.

Natura:

Pausan. in
Achaïis.

Aristoph. in
Avib.

in Nebulis.

Descriptio
Plin. H. N.
11. c. 2.

Locus.

Bellon. obs.
2. c. 35.

Martial.
Epig. 3. 93.

Astapan fluvios circa Meroën incolunt, Oriente Syrio olim accidere fuetum, Diodorus Siculus & Strabo authores sunt. Licet exiisdem & *præfagium* sumere. Divergente sole, si in aprico colluserint, calor, si in umbra, tepidas & mites pluvias; si prætereuntes pupugerint, frigus & nimbos præfagiunt. Congressi aliquando inter Shenæ & Sionis monasteria in Anglia, (pugna per quatuor horas duravit) Monachorum exilium quibusdam innuisse credebantur: Bella in parte Occidentali nonnullis cum anno M.D.LXXX. per quatuor continuos dies, ex Italia, in Occidentem evolarent. E pomo quercino, si circa Michaëlis festum culex eruperit, bellum hostile Mizaldo præfagire videtur. Aquam subesse Paxanus eo loco pollicetur, quo se sole exorient, trabis instar contorquent.

Remedia.

Multa eorum exitio, vel ut fugarentur, vel vitari possent, humana industria invenit. Conopæo olim Alexandrini utebantur: hodie in summis ædibus sub dio habitant. Indiarênâ obruti, faciem frondibus inter ramos contegunt. Culices, eorum quidam, ut sibi pareant, adorant. Septentrionales tentoriolo ex panno lineo vel cortice facto se includunt. Merula cannabis humidæ ramusculos in lecto apponendos suadet. Angli suum *Fencanapy* palustre conopæū, seu tercus bovinum, patulum, planum, semiaridum, vel duriusculum filo ad imum lectum suspendunt. Huic odore illecti, totam noctem infident. *Abiguntur*, coniza, cupressi pillularum cum arboris coma, absynthii, melanthii, lupinorum, juniperi, rutæ, vitrioli, &c. suffitu, de quibus apud Dioscoridem, Plinium, Galenum, & alios legimus. Rhases pilum equinum per mediam domum extertum commendat: Pedemontanus, pulverem cumini subtilissimè triti, cum vinoque misti, quo pampini vitis, aut alicujus arboris frondes irrorari, cubiculorumque ostia, & fenestræ aspergi debent. Adhibetur & aceti cum origano decoctum. Ne jumentis noceat, serpentariæ suffitum

Plin. H. N.
17. 21. l. 19.
c. 10. l. 23. c.
6. c. l. 27.
c. 5.

facere, Olaus M. author est: ne hortis, amurcam recentem & ex caminis fuliginem hortis inspersam, Palladius, malicorii aut galbani fumum, Plinius. *Enecantur*, si rutam decocto conyzæ madidam, in ædium angulis deposueris.

Vilis licet, abjecta & molesta bestiola, usum tamen aliis animantibus præstat. Solo quippe culice Thymalus piscis, Ticini fluvii incola capitur. Crocodilus iisdem victitat. Aves *κνιπόλογος* dici diximus, & *κνιποφάγος*. Plura in Differentiis dicemus.

Magnitudine inprimis, & generandi modo præcipuè differunt. Sunt quidam *magni*, quidam *parvi*, quidam *minimi*. *Magni* *ἐλεῖοι* dicuntur, quod palustribus locis oriantur & vivant. Corpore sunt oblongo, duabus alis prædito, quas elimatas & politas, supra humeros extendunt. Ocreas sæpè & triplices caligas perforant; & morfu venenato, modò dura & livida tubercula; modò vesicas, modò punctula pruritu plena inferunt. In Hispaniola & calidioribus regionibus sunt crudelissimi. An *εὐγες* Theophrasti? Strabo *μεγάλους κόνωπες* vocat. *Parvi* morfu mitiores sunt, æstate umbrosa, hyeme nivosa incolentes. Salsum duntaxat sudoris pabulum morfu eliciunt. Unde tuberculum jucundi pruritus plenum exoritur. Juxta sepes & arbusta mutuis quasi cursibus collidunt. *Minimi* in Anglia aquilonari, pyramidalis semper figura provolant: figuræ suæ aciei fines nemo transit. *Sursum deorsum* (verba sunt *Moufeti*) feruntur, nictu oculi, & dicto citius, in latera aciem deducunt, totumque subitò exercitum in latera dispersiunt; qua si ve muscario si ve pulvere, si ve aqua affusa, si ve spiritu violento fregeris, coeunt tamen confestim, & ante digiti crepitum, in pyramidalem sese formā omnes recolligunt. Ex uligine putrescente oriri credo, vaporemque aqueo ali. Intestinum siquidem iis tenuissimum, album, ferè invisibile, spumeo, albo, tenuissimo, & nullius ferè tenacitatis humore plenum. Longius quandoque ab aqua volitant: & loca à flatibus libera amant. Pierius Valerianus, cujusdam

usus.

Differētis.

Theophr.
de C. P. a.
c. 4.

Moufeti. l. c.

Pier. Hist.
rogl. ph. 26.
c. 24.

gene-

generis inter minimos mentionem facit, quod tam est exiguum, ut visum inter volandum fallat, nisi intēderis; sed tam acuti ictus, ut cutem perterebret.

A modo generandi differentias apud Græcos habemus. Εμπίς, ψύν, κνίψ, præcipuæ sunt. Εμπίς quid sit superius dictum. Albo cingulo à natura ornatur. Unde Aristophanis scholiastes, εἰς δὲ κώνωπος ὁ ἀπὸ ποταμίων ζῶντων ἔχοντες, dixit. Muliones quidam vocaverunt: sed perperam. Hi enim uno tantum die vivere dicuntur, & tanquā Melliones, quod solo melle vescantur vocari. Rostrum habent pici arboræi instar, longum, acutum. Crapulâ disrupti statim expirant. Erupidas ex Ascaridib. (malè tipulas vertit Theodorus) fieri scribit Arist. *Ascarides autem in limo puteorum, quo aqua subsidente cōcretionē terrenā conflunt. Principio limus ille putrescens, colorem capit candidū; deinde nigrum: postremō sanguineū. Tum ex ea quadam perexigua rubra oriuntur, alge pusillæ speciei. Ea aliquandiu herentia moventur: postea abrupta feruntur ab aqua, & vocantur ascarides. Diebus haud multis post, tollūt sese rectas ab aqua; neq. moventur, & sunt duræ: tandē abrupto putamine culex superinsidet, donec sole vel flatu moveatur, ut inde avolet.* Ψύγες ficarii sunt culices. Generantur ex caprificis eorumq. putrescētib. granis. Ideo cum evolavere nō inveniuntur intus gta-na, quæ in eos versa apparent. Ufus in maturandis ficubus. Nam fraudati alimento in matre, putri ejus tabe ad cognatā volant, morsuq. ficuum crebro, hoc est, avidiore passu, intus solem secum primò inducunt, cerealesq. aures immittunt foribus apertis. Mox lactē humorem sive infantiam pomi absumunt: quod fit & sponte: id eoq. ficetis caprificus præmittitur ad rationem venti, ut flatu culices e volantes in ficus ferat; qui ubi ingressi fuerint, turgent fici. & celerrimè maturescētes altum tumescunt. Ad hos pertinent quos κνίπας νεανιστὰς Græci, Latini Culices Herculeos vocant. Inertes vivunt, & non nisi ex occisis sui generis culicib. cū succo & sanguine plenos conspexere, victitāt. Κνίπες, vel σνίπες, ὁπὸ δὲ κνίβειν, quod mordendo vellicent & pruritum excitent dicuntur: Theophrastus vocavit et-

iam ψύγες. Videtur, secundū Plinium, ex humore dulci subdito corticib. in quercub. nasci, quod ex Theophrasto sumptū est. Velarandus Insulanus Pharmacopæus, ex quercus pillula, & gallæ foraminulentæ meditullio frequētes prorumpere observavit. Proveniunt & in ulmo, napo, rapis, polio, lentisco, terebintho, & aliis, cum vel sine putrefactione. Humorem ulmi vesicis primā germinatione inclusum si aruerit, in κνίπας mutari, Symphorianus author est. Hortos præcipuè riguos infestāt & incolunt. Pyramidis instar in aëre sublimes videntur, vesperi præcipuè, & juxta sepes. Obliti ferè eramus *Vinaceorū*, quos fortè Arist. κώνωπας vocat. Trahunt ex vermiculis, qui in fæcē aceti gignuntur, originem, ἐκ σκωλήκων, οἱ γίνονται ἐν τῇς περὶ τὸ δξὸν ἰλῶ. Generantur ter septē dieb. V Vottonus in igne quoq. nasci scribit: quod difficulter credetur.

In America circa metā incognitam & ad Nicolai portū miræ sunt magnitudinis. Incolæ *Yetin* vocant. Leri⁹ inter pulices numerat apud Nieréberg. nisi sphalma nō est. In Brasilia est gen⁹ quoddā paulo min⁹ vulgarib. tinnulis, elegātissimi coloris. Crura habet exilia sex brūni coloris, raris pilis hirsuta: Caput rotundum in duas partes veluti fisisū, superiusq. ex viridi elegātissim⁹ color resplēdet ad latera purpascēs. Posterius corpus desinit in aculeū faris longū, superius ex viridi elegātis aurei coloris & pilis raris hirsutū: habetq. quinq. jūcturas subnigricātes: alas duas tenues satis lōgas, iridis colores respresentantes, imò superātes: in capite cornicula duo, &c. Sed hæc per microscopiū explorāda. In Hispaniola invisibiles quidā sunt, sed adurentis ictus. Littora amāt, nec in interiorib. inveniuntur. In ramis arborum circa eos præsidium. His domos cingunt. Huc fortè *Musca Culiciformis* Moufeti spectare, nisi coire scriberet, quod Culicibus negavimus.

Aldrovand⁹, ne & circa istos nobis deesset, duas iconum variorum tabulas proponit, iisdem duas alias species adjicit. Qui exactè cum muscæ moufeti cōparaverit, haud paucas inter eas inveniri fatebitur. Primā ta-

L bula

Theophr.
H. P. 2. cap.
ult.
Theophr.
H. P. 4. c. 17

Arist. H. A.
5. cap. 19.

Arist. H. A.
5. c. 20.

Marçg. H.
N. Brasl. 7.
c. 7.

Nieremb.
H. E. 15.
c. 10.

Aldro. 3. de
Insect. c. 5.

Arist. H. A.
18.
Scalig. edit.

Plin. H. N.
15. c. 19.
Arist. H. A.
2. c. 32.

bula n. 1. Culex communis dicitur.
Vide p. 386. Bonon. editionis.

TITULUS II.

De Insectis Coleopteris seu Vaginipennibus.

CAP. I.

De Locustis.

ARTICULUS I.

De Locustis in genere.

Tantum de Anelytris tam quadripennibus quam bipennibus sufficiat: sequuntur *Cleoptera* seu *Vaginipennia*, *Locustæ* nempe, *Gryllus*, *Scarabæus*, ad quem *Proscarabæus* spectat, *Cantharis*, *Ips*, *Buprestis*, *Coccojus*, *Cicindela*, & *Blatta*. Nullo aculeo infestare, difficulter volare, pennas fragiles & cortici inclusas habere, sedentia potius quam alata videri, commune omnibus. De Locustis tanquam maxime notis primò agemus.

Nomen,

Videntur apud Latinos fortitè nomen, vel quod sint longis pedibus instar hastæ, vel quasi loca usta, quod messes & alia quod attingunt urant. Græci in genere ἀνείδαι, ἀνὰ τὸ ἀκροῦν τῶν αὐτῶν καὶ τῶν φύτων νέμεσθαι, quod summitates segetum & plantarum depascuntur, vocant. Μάσσι, κέρνοψ, πέρνοψ, μόσσει, ἀφελάβ, βρύχ, ἀκαρ, μανίς, κόρνωψ, τρώξαις, μίξαχσκη, quod apud Dioscoridem legitur, specierum quarundam nomina esse videntur. Creteneses Ἀχρον vocāt: quibusdam fortè βρέττανα, & φίβαα, quæ iisdem ἀκρῆς dicitur. Denominib. Ebræis consule Aldrovandum. Dioscoridi μεγαλόκωλ vocatur, quod posteriora duo crura longiora habeat.

Dioscorid.
2. c. 37.

Descriptio

Egregiè & breviter Claudianus depinxit.

*Horret apex capitis, modo fera lumina
surgunt,*

Vertice cognatus dorso durefcit amictus,

Armavit natura cutim, dumig, rubētes

Cuspilib. parvis, multis acutere rubores.

Albertus, caput habere figura equi

scripsit: & ante os duo additamenta dura, quæ labiorum & dentium vicem suppleant. Aculeus est pro cauda, pedes sex, posteriorum crura longiora & ad seipsa reflexa, (Plinius foris curvari dixit) ut melius de terra attolli possent; intestinum unicum sanie & sordib. (succus is plantarum est) plenum. Nigidius oculos iis negat: sed Plinius concedere videtur, quod & Claudian⁹ facit. Insectorum, inquit, omnium, & quib. testacea operinenta, oculi moventur, sicut quadrupedum aures. De alis perpetuum nō est. Aliæ simplicibus, plurib. aliæ volant; quædā salient. Nec color, q. auctori de rerum natura visum. Sunt virides, nigre, livide, variegatæ. Exuvium serpentum instar deponere, quo tēpore operculum circumrumpitur, Arist. testis est.

Plin. H. N.
11. c. 29.

Aristot. de
part. anim.
4. cap. 6.
& H. A. 4.
c. 6.

Plin. H. N.
11. c. 37.

Nulla eas nō ferè terra alit; in quibusdam tamen frequentius grassatur hoc malum. Visæ nupin Russia, cum servi & mæcipia ad signa cōvolarent, & legiones facerent. In Syria militari imperio olim necabantur. Italiā ex Africa, inquit Plin. maxime coorta infestant, sæpè populo ad Sybillina coacto remedia cōfugere, inopia metu. In Cyrenaica regione lex etiam est, ter anno debellādi eas, primò ova obterendo, deinde fœtū, postremò adultas: desertoris pœna in eum qui cessaverit. Et in Lemno insula certa mensura præfinita est, quā singuli enecatarum ad magistratus referant. Civitatem in Africa ab eis pulsā M. Varro author est. Apud Nigritas singulis trienniis ad duodecē milliarium spaciū terrā inumbrāt, si Cadamusto fides. Circa Brūdusium quotannis agros absumunt. Apud Cassini mōtis incolastot, ut Seleucidas aves à Jove sibi precentur. Planis verò rimosisq; locis maximè gaudēt; quanquam & in montanis, ubi Cotinus provenit, invenias.

Arist. H. A.
8. c. 17.

Locus.

Plin. H. N.
11. c. 29.

Victus.

Herbis & segetib. victitāt. Ideo μάσκα Nicander στρωφάρον vocat. Amygdalorum floribus impinguntur, si authorē de natura rerum sequimur: folia quoq; lauri depascuntur & vites. Ideo haud sine causa Plinius. Pabula petere sciunt. Deorum ira pestis ea intelligitur. Namq; & grandiores cernuntur, & tan-

Plin. H. N.
11. c. 20.

Et tanto volant pennarum stridore, ut alia alites credantur: solemq; obumbrant, sollicitè suspectantibus populis, ne suas operiant terras. Sufficiunt quippe vires: Et tãquam parum sit maria transiisse; immensos tractus permeant, diraq; messes contegunt nube, multa contactu adurentes; omnia verò morsu erodentes, & fores quoque tectorum.

Plena de iis Historiarũ monumenta, inter quæ & memorabilia quedam occurrunt. Anno Christi 591. tantam Italia intulerè pestem, mortuq; ad littora ab Africa delata; ut DCCCM. hominum periisse, Julius Obsequens scribat. Quæ anno 874. Galliam vastabant, senis pedibus, ac duob. dentibus durissimis instructæ erant. Duces præmissi pridie castra metabantur. Volitabant diurno itinere, quatuor aut quinq; millia passuum. Britannico absorptæ mari, mox ad littora rejectæ, ingentem pestilentiã excitavere. Anno 1542. alis per initia earebant; mox binas, tãdem quatuor assumebant. An. 1543. in Lucano agro tam frequentes convenerant, ut glomeratæ cubiti altitudinem excederent. Sub exortum Tartaricorum & Cosaciorũ apud nos ante biennium motuum, visæ quoq; iisdem quib. tumultuatum est locis. Tantum eorum agmen, ut postquam consedissent, equorum in viis ungulas obtegerent. Mirum, non ulterius rabiẽ eam rusticam progressam, quã istæ pervernerant. Nondum Lublinum attingerant, cum versis velis, Orientem à quo ferebantur, repetiere.

Generatio Generantur ex putri & per coitũ. Ex phalangiis procreari, apud Aristotelem, ni fallor habetur. Ex putridor. corporum, sicciorẽ in primis temporis constitutione, apud alios. Sub bello civili in Sicilia; insepultis mortuor. cadaverib. ingens Artelabor. prodiit copia, si Plutarcho credimus. Veris autem tempore à Zephyro & Lybico ventis, si Diodoro Siculo, ex deserto ad Aethiopas Acridophagos deferuntur. Austro & urentẽ ventõ de ferri Sacra Scriptura habet. Ibidem ut & in Lybia, Strabone prodente; quod rarò aut nũquam pluat, & lacus cœnosi fiant; magna copia oritur.

Fœminas ex se concipere; Vincen-
tius in ea quam nutrit, & prægnan-
tem invenit docuit.

Vincen. in
speculo.

Coitus idem qui & insectorum omnium; quæ coeunt, marem qui minor, portante fœmina. Mas in cõgrefsu duos illos aculeos dorso ult. eminentes, per caudẽ inflexionẽ in fœmellæ uterum immittit: fœmina subagitata intente alvum movet, & se ima parte mari applicans, illũ diutius continet, modò vulvę hiatu, modò ejus contractione, venerem sibi jucundiorẽ reddens. Visuntur enim meatus duo in fœmine pudẽdo, interstitio quodam disjuncti; (verba sunt Moufeti) & crassiusculo operimento contecti: quod externa sui parte nigricat, durumq; est & cartilagineũ, intus autem leviter hirsutum, rugisq; quibusdã quasi scabũ videtur. Ad hujus operimenti fundum uterus albicans, instar muliebris pudendi cernitur. Quia ita hærent, ut nec saltu, nec motu, vix manibus avulsæ discludantur, tardo digressu coire Plinius scripsit. Parere in terra fixo cauliculo illo: κατὰ πηχάαι τὴν πρὸς τῇ κέφαλῃ αὐλὸν) qui caudæ adnascitur: ac universim, & loco eodẽ, fectum simul non sparsim deponere; ita ut quasi favæ esse videatur, apud Aristot. habemus. Hinc vermiculos specie ovi oriri addit, qui terrena quadã prætenui tanq; membranula ambiuntur: dissecta emergunt locustę & evolant. At verò ova ineunte Autumno condensu parere, experiẽtia habetur: tãq; mollis fœtura hæc est, ut ad tactũ levissimum cõeratur. Ea durant hyeme sub terra, cujus viscerib. cõmittuntur. Subsequenti an. exitu veris, (cõcoctione quasi pacta) emittunt parvas nigratẽs, & sine crurib. pennisq; reptatẽs. Mori matres cū peperint certũ est, vermiculo statim circa fauces enascente, qui eas strangulat. Eod. tempore & mares, dissipatò p̃ validam Venereĩ calido, obeunt. Alii duplicẽ earum foetum, geminũq; exitũ tradunt. Vergiliarũ exortu parere: deinde ad canis ortũ obire, & alias renasci. Est verò & aliũ eorũ obitus. Gregatim sublata vento in mare aut stagna decidunt. Fortè hoc casu evenit, non (ut prisca existimavere) madefactis nocturno humore alis.

Arist. H.A. s.c.28.

Plin. H.N. II. c.29.

Aristot. l. c.

Plin. H.N. II. c.29.

Plin. l. c.

Theophr. de animalib. quæ colorẽ mutant.

Animales
actiones.

Arist. H. A.
4. c. 9.

Plin. l. 6.

Plin. l. 6.

Majol. Col.
loq. 10.
Plin. l. 6.

Aristot. in
auscult.
mirabilib.

Visu sunt hebetiores, quod durissimis sunt, propter palpebrarum carentiam oculis. Vox earum ab occipitii proficisci videtur eo loco, ubi commissura scapularum. Ut Dalechampius legit: ut in textu est. Eo loco in commissura scapularum quasi dentes habere existimantur; eosq; inter se terendo stridore medere, circa duo æquinoctia maxime, sicut cicada circa solstitia. Aristoteles *τῇ δαλίοις πὸν ψόφον* facere scribit, per quæ alas & fœmina innuere videtur. Alis edit observavit Casserius. Impositæ sibi invicem alæ moventur; quarum superior parte intima corpus habet subnigrum, durum, per transversum locatum: inferior ejusdem substantiæ corpûsculum in extremitate oræ superioris parte externa, cui per bellum tympanum adjacet. *Veteres nec volare eas noctibus propter frigora tradiderunt, ignari, etiam longinqua maria ab ipsis transiri, continuata plurium dierum, (quod maxime miremur,) fame.* Sed hic volatus divinæ præceptionis signum potius est. Alias non tam volât quàm saliant, iterumque pennis deficientibus cadunt in terram. Dum se in aërem attollere conantur, cruribus primum se impellentes subvolant, postmodum alis evaginatæ evolant. Altius sese efferunt, æstu urente. Militari ordine uti quibusdam exemplis firmatum est. *Tam frivolaratione morientes, serpentem cum libuit, necant singula, faucibus ejus apprehensis mordientes.* Vidit id & Majolilolitor. Graculi adversu volatû earum exitio occurrunt. Ideo à Lemni incolis colebantur. Idem Galeritæ & Ibides faciunt. In Argo cum scorpione congregiuntur, inde Scorpionum diti, & aculeo exarmatum, interficiunt, & devorant.

Pestem famem & bella portedunt. Illam infecto à mortuis & putrescentibus aëre. Hanc, absumptis satis, & quicquid fructuum arbor ferre potuit. Ista, cum militari quasi ordine procedunt. Cum Anno 1543, stupendis agminibus per Illyricum in Italiam convolarent, Turca Rhegium occupavit, Ostræa subsedit, Nicæam cepit, & multa Christianorum milia, cum sexcentorum millium duca-

torum præda abduxit. Idem tumultuantibus Cosaccis & rusticis nuper in Polonia factum: & quod mireris, eo usq; lymphaticam illam nebulonum colluviem pervenisse, observatum, quousque locustæ, quæ præcesserunt, delatæ.

Variis tantæ pesti remediis, conata est occurrere humana industria. Nonnulli cucumeribus sylvestribus & lupinis amaris in muria fervefactis eas conspergunt. Quidam vespertilioes ex sublimibus arboribus suspendunt. Nonnulli captas exurunt. Odore illius fumi vertigine corripiuntur. In Chuerch Scytharum Carai-norum civitate, lacus cujusdam præsentia eas arceret. Mediolanensis præfectus Anno 1542. constituto in collectas præmio, brevi tempore duodecem mille saccos implevit.

Mane colligi debent, dum torpidæ sunt: collectæ terrâ obrui, ne ex occisarum ovium novæ prodeant. Vites non attingent, si propè radicem tria sinapeos grana cõseveris, si Geoponicorum auctori credendum. Aristoteles odorem cornu cervi, sulfuris, aut styracis suffitum commēdat. Arnoldus bovini aut vaccini stercoreis, aut cornu sinistri fumum. Palladius fluviatiles vel marinos cancores fictili vali cum aqua immisos, si recti sub dio statuuntur, ut decem diebus in Sole vaporentur. Quicquid ea aqua perfunderetur, illæsum manebit. Magorum remedia apud Plinium vide; plura apud Moufeturum in Theatro Insector. p. 125.

In Cibis olim Aethiopibus Sillis, falsugine duratæ erant. Nec non Africanis, Syris, Persis, Arabibus, Mædis, & qui Lybiæ loca incolunt. Hodie in Orientali & Occidentali India comeduntur. Sed brevis eorum qui vescuntur vita. Quadagesimum ævi annum nullus supergreditur. Quin successu temporis dracunculi in pedibus exoriuntur: quos huic victui Mercurialis adscribit. Cibus & Iohanni Baptistæ fuere. In Medicina quoq; adhibentur. Suffitu stranguriæ maxime mulierum juvantur. Stercus pahn confert, & morphææ: pedesq; earum verrucas eradicant.

Remedia
contra lo-
custas.

Arist. H. A.
4. c. 8.

Pallad. R.
R. 1. Tit. 35.

Plin. H. N.
37. c. 9.

Ufus.
Plin. H. N.
6. c. 28.

Mercur.
var. lect. 2.
c. 20.








Plin. H. N.
30. c. 14.

Locustæ . Heuschrecken . Moufeti .


Fœm . 2 .

L. Vulg. Major fœm . 1 .

Fœm . 3 .




Mantes Italica . 1 .




Mantes Africana .






Mantes Italica . 2 .





Locustæ Aldr .
Tab . 1 .



Tab . 2 .



Tab . 3 .



ARTICULUS II.

De Differentiis Locustarum Moufeti.

Tantum de Locustis in genere; Differentias ex Aldrovando & Moufeto dare visum est. Hic in *non alatas & alatas*: illas in *vulgares & rariores* distinguit.

Alatarum vulgarium locustarum sex sunt *Majores* omnes virides, tã fœminæ quam mares, quinque *Minores* multicolores. *Prima* Majorum cucullo veluti herbaceo, caput, collum, mediumque ferè corpus contegit: alæ à collo subtus oriuntur, virentes, parvis paucisque nigris maculis insignitæ, dorso item virenti, venter fuscus subjicitur, caulis extremo nigricante; magnum illi os, & dentes validi latique, ad fruges absumendas egregiè nati. *Secunda* huic similis videtur, sed epomis collo annectitur; nasus item & os ipsum magis rubescunt; puncta que in alis habet majora. *Tertia* viridis omnino vultus; crura albicant, cauda nigricat; alas maculosiores obtinet, & circa extremitates ex albo rubescentes.

Hæ autem *femina* sunt, à quib. tres itidem mares hoc discrepant, quod vel extremâ caudâ, vel supra caudâ, duos tresve gestant aculeos, medioque item caputio magis rubent. *Prima* minorum species *Holspecht* Tigurinis dicta, corpore nigro, externis alis maculosis, internis minio illitis conspicitur; crura absoletius fusca, lineisq; nigerrimis fusque deque productis accuratè picta. *Secunda* antennæ oculi tibiæque suave rubent; crura lineis item nigris variegata, alæ lentiginosæ; venter surdè rubens ex flavo, scitam nobis bestiolam & pulchram exhibent. *Tertia* ex nigro cinerea videtur, antennas habens brevissimas, atque alas præter morem corpore longiores. *Quarta* undique absoletè viret, nisi quod caputium nigris duabus lineis ornatur, tibiæque postremæ vivida quadam rubedine resplendent. *Quinta* non-

nihil minor cæteris, sed colorum situ, & varietate gravior. Corpus illi nec non facies & pedes Xerampelinialis virentibus gestit; caputioque aurea quadam instita per medium ducta splendente. Omnibus istis minoribus alæ longitudine corpori æquales, vel longiores; nullum item caulem, nullum in cauda spiculum gestant, pratisque & in pascuis (raro inter segetes) luxuriant; ut in Galliis nostraque patria Britannia sæpè vidimus.

Rariores trestantummodo species vidimus, *Italicam*, *Græcam*, & *Africanam*. Ille *mantes* dicuntur, vel quia suo adventu, (primæ enim omnium apparent) ver præfagiunt, ut Anacreon cecinit; vel famem prædicunt (ut Cælius & Scholiastes Theoc. annotarunt) Vel quia anteriores pedes veluti manus, supplices semper tenent atque elatas, varum more; qui eo gestu orationes ad Deos fundere solebant. Mantis *Italicæ* (cujus hic Iconem repræsentō) mentionem facit *Rondeletius* lib. de Piscibus ferè in hæc verba. Pectus habet longum: tenue; cucullo tectum; caput simplex: oculos sanguineos, satis magnos, antennis breves, pedes sex; locustarum more, sed anteriores multo crassiores longioresque cæteris, quos quia junctos plerumque elevat, (precantium ritu) à nostratibus Preque Dieu dici solet: totum corpus macilentum est. Tam divina censetur Bestiola, ut puero interroganti de via altero pede extento rectam monstrèt, atq; raro vel nunquam fallat. Cauda illi bifurca, setaceis duobus aculeis prædita: atque ut manuum elevatione vates refert, ita etiam & motus similitudine, neque enim ludit ut alii, neque saltat, neque gestit; sed lentè obambulans modestiam retinet, & maturam quandam ostendit gravitatē. Hanc quamvis in agro Monspeßulano sæpè se vidisse Pennius affirmet; tamen Iconem ejus ab ornatissimo Antonio Saraceno Genevensi Medico missam fuisse, in schedis memorat. *Alteram* Mantis speciem *αὐθγο-γερφθείων* Vienna misit Carolus Clu-

fusè Græcia allatam quæ magnitudine & formâ priori similis, alium tamen colorem ex naturæ loci dono accepit, habet enim cornicula saturatè lutea, hiacinthinum ocellum; alas ex luteo fatiscientes; corpus reliquum amethystinum, nisi quod tibiæ priores filioresque suffragines albescerent, & recurvæ digitorum chelæ nigrescerent. *Africanam* è Barbariâ nostris aliquot sumptibus accersivimus, gracilem, quinque uncias longam, cucullatam, capite pyramidalis, (ut *Macrocephalum* putares) è cuius penè vertice duo cornicula latiuscula, unciam ferè longa se erigunt, galerumque illum Turcicum, biplumem (quali Janisarij utuntur) superbiorem repræsentant. Paulò infra summitatem ejus oculus utrinque emergit satis prominens, grandis, obscurè rubens. Corpus illi oblongum, purpureo cruentum; cauda hirundinia, bifurca; alæ quatuor subcinereæ maculis quibusdam fuscis ornatæ. Priores quatuor pedes tibiæque pergraciles; posteriores, robustæ, lacerosæ, longæ, & ex maculis transversim per femora ductis subnigræ.


Atque hæcenus de vulgaribus locustis aligeris, atque etiam rarioribus satis dictum sit: nisi fortè alias differentias adjicere necessarium mecum una existimaveritis. Nam *vulgarium* facies torvâ, oblonga, rugosa, velut squamis munita, quæ os ferè contingunt: dentes illis supernâ parte affixi, lati nigricantes, durissimi, quibus aristas facile mandunt, maximoque cum stridore fortiter conterunt. *Græca* vero & *Africana* locusta breviori apparer vultu, dentibusque adeo est languidis, ut mollissima tantum graminâ & summitates herbæ depascat. Vulgaribus antennæ longæ admodum; Manti verò perbreves: thorax illis durus, cartilagineosus, validus; huic ferè nullus, inanis, languidus. Illis item alvus mollis, longa acuminata: his contra, durior, plena & torosa. Utrisque quatuor alæ membranæ quasi ex nervorum filis contextæ; nam licet interna cōplicata duplex videtur, ubi tamen extenditur sim-

plex apparet. Id quod Jodoco VVillichio fraudi fuit, dum oculorum errore lapsus, sex locustis alas imprudentius ascriberet. Jucundum sane fuerit in nonnullis utriusque generis locustis animadvertere quorundam femora sexangularia, affabre in suis areis levigata, plexuque retiformi artificiose picta. Vulgares locustæ oculos habent magnos & prominentes: unde ἀγλαοφθαλμὸς nomen Ebullo cuidam inditum ab Athenæo lib. 10. cap. ult.


Non alata locustæ sunt *Bruchus Attelabus* atque *Acellus*. *Bruchus* ὀστὸς βρῦχην, mordendo seu vorando nomen inditum. Quatuor eorum species: Maris prima, tres reliquæ fœminarum. Mas collare gestat subcruentum, sub quo duplex pendet cucullus leviter ex flavo virens; dorsum ad caudam usque sex porraceæ laminæ transversim ad latera ductæ adornant. Ventris (qui satis magnus) caudæque tres illi parvi aculei ad recens natæ herbæ colorem accedunt flavoviridem, veluti etiam & femora, facies atque antennæ; sed tibiæ rubidæ videntur. Prima fœminarum æuginosa est, absque linea esset *Xerampe*lina à caputio ad caulem per dorsum ducta: caret item aculeo in caule nascente; videtur etiam plicis vel potius quasi orbibus 10. viridib. circumcincta. Secunda ferè omnino spadicea atque fusca; ventre tamen parum flavescit, aculeumque geminum gerit principio caulis infixum. Tertiæ vultus, caput porcinum vel vitulum marinum refert: antennarum loco barbellam quasi juxta nasum utrinque sitam obtinet; duo in suprema fronte tubercula, urfi veluti aures repræsentant, duosque in caule habet aculeos, fusci, (ut totum corpus) coloris neque parum acutos.

Attelabus ἄττελαβος ὀστὸς, quod tam minutis pennis conspiciantur, ut cedere alis credantur, dicitur. Hefychius parvam locustam, Plinius è minimarum genere vocavit. Omnia quasi in pollinem atterit. In arvis cesantibus parit, & postquam peperit, moritur. Ova autumnalibus aquis inter-


Tab. 3



Tab. 4.



Mantes



Grjål. domest : 1.

Grjlli Mouset

Grijllen

G. C. Fœmina


Gr. Campestris mas.

Grýllotalpa

Cicada aquat

Grölli

Aldrouandi



intereunt, cum nimis increvere; ac sicco autumno largior proventus.

Asello, qui ♂ Dioſcoridi, tarditas nomen impoſuit. Sine alis eſt, craſſioribus, ſed præter aliarum morem brevibus cruribus ventre propendulo. Αΐάλλης fortè Scripturæ, μάσας & στίβο- & Nicandro: quamvis Ambraciatarum dialecto omnes μάσας dicantur, quòd frumentum cum ſt ridore mandant.

Quas Judæis licitum comedere quatuor erāt, *Arbeth*, *Salaam*, *Chargol*, & *Chogab*. *Arbeth* Chaldei *Gebab*, Græci ἀρεθὰ vocant. A fœcunditate nomen fortita eſt. *Salaam*, Chaldæis eſt *Chargola*. LXX. ἀΐαν, Hieronymo *Scarabeus*, Kimchi ſpecies locuſtæ *Raſphon*, dicta, Abenezræ *Salaam*, quod infideat ſaxis. Quatuor prioribus pedib. graditur, duob. poſterioribus qui lōgiores ſalit. *Chargol* LXX. οφιδμαχον dixere. Pugnat enim cum ſerpente, quod Nipho incredibile. *Hagab* vel *Chagab*, Hieronym⁹ ἀΐαν vocat. Naſcitur in terra frugum fœcunda ex ovibus quæ parens depoſuit. Caulem etiam ipſum confringit. Habentur in ſcripturis & aliæ, nempe *Gazam* à tōdendo, *Ielak* à lambendo, *Chafil* à perdedō, *Telatſalà* rubigine, & *Chenamal*, à manendo, quod ſtationem non deſerat, dicta. Quā verò formā fuerit μελεις Suidæ, μυλαεις Cælii, μαλακεις Nicandri, βρεττανα, ἀχρη, πετλεις, αϋρα, πολανος, Hefychii, πέρνοφ Ariſtophanis, μάσας Euthathii, ἀλιγ & πύαλις Phavorini, *Ludolochra* Iſidori, ignoratur.

ARTICULUS III.

De Locustis Aldrovandinis.

Aldrovandus quatuor diverſis tabulis, diverſas Locuſtarum exhibuit ſpecies, inter quas Papiliones quosdam ſuperius exhibitos invenies. In prima tabula, omnium maxima eſt quæ prima depingitur &c. uſque latitudinem diſtenſas eſt in-
tueri.

Secunda tabula duodecim habet locuſtarum diverſas ſpecies &c. uſque & poplitibus diſtinctis.

Tertia tabula tredecim habet locuſtas. *Prima* &c. uſque nigro diſtin.

In *quarta tabula*, primus eſt *bruchus* &c. uſque Poſtrema tota purpurea.

Eſt & Locuſtæ genus apud Indos quod *Tenamaſuanapaloo* nomen meruit à lapillis pedibus apprehenden-
dis, quæ eſt ejus natura. Cornua fert tenuia longa, à ſeipſo triplo prolixiora. Cruſtatum animal, ternis utrinque pedibus, longisque, ſed qui ſenſim procedentes verſus caudam ſiant breviores. Innoxium eſt.

Nieremb.
H. E. 13.
c. 23.

CAPUT II.

De Gryllo, & Gryllo talpa Mouſeri.

Locuſtæ Gryllum, quòd cum ea
in multis conveniat, ſubjungi-
mus. Quidam à clamore arguto no-
men accepiffe putant, qui grylliſmus
vocatur: alii γρύλλον Græcis vocari,
ſed nullo authore. Junio eſt ἀχέτι, ſed
perperam. Freigio γρύλας, animal-
culum impenne, quod Gryllus
non eſt.

Sunt *Campeſtres* & *Domestici*. Hi no-
cturno ſt ridore vocales aridā terram
inter focos & furnos excavant. Sunt
partim *mares*, partim *femine*. Fulcum
illi totum ferè corpus, & oblongum;
doruſum ex fulco varium magis nigri-
cat: quod juxta medior. pedum exor-
tum, duæ lineæ tranſverſæ, nivis in-
ſtar albicantes adornant. Caput or-
biculare. Oculi nigri, antennæ in
omnes partes mobiles. Cauda bi-
furcata. Non videntur oſ habere, ſi
Alberto credimus: ſed invenitur
in capite ejus, (verba ſunt Alber-
ti) longum membrum linguæ ſi-
mile, & naſcitur ſuper anteriorem
capitis ipſius partem, & pars illa non
eſt fiſſa, ſicut ſinduntur ova anima-
lium. Julio & Auguſto, undosè vo-
lant, nunc alis expanſis aſcendendo,
nunc deſcendendo conſtrictis.

Albert. 4.
cap. 7. apud
Mouſeri.

Fæmi-

Joel 1.
Amos 4.

Fœmina major est, alveolōgiore, alis quatuor; quarum externæ breviores, internæ arctiores simul & longiores. Saltant celeriter. Liquore & sanie carniū vescuntur, & spumam juris zythique avidē liguriunt. Nulla tamen in ventrib. eorum superfluitas. Delectant cantu homines; idē Fesæ in Africa caveis ferreis habentur & magno venduntur. Ad somnum inducendum & Scaliger in pyxide fervabat: quam si cribro crebrius pertusam reddidisset, tertio post die non mortuos, sed diu superstites invenisset. Moufetus, subdito pabulo marem & fœminam fervabat: octavo post die marem fœminæ latus erosisse cōperit, qui etiā biduo post expiravit. Vix seclusi ab aëre vivere possunt, quia præter vocem & aërem nihil continent. Aquā vitriolo tinctam si in vitrū immiseris, fugabis. Discum aqua plenum, cum farina avenacea cinctum, si apposueris, infiliēt. Ad auxere & sylvam medicam. Purulentis aurib. cum terra sua effossus, prodest. Manibus contritus sacro igni medetur. Curat allegatus parotides. In cinerem redactus, cum oleo, putrida ulcera. Aqua dilutus, calculum & dysuriam. Alligatus, faucium dolores, si Marcello fides. In collo suspensus, quartanam. De stridore in sequentibus.

Scalig. in
Aristot. de
plantis.

Moufetus. de
Insect. 1.
6. 17.

Scalig. Ex-
erc. 273.

Campestrium alii quoq; sunt *Maris*, alii *Fœmina*. *Mari* corpus oblongius quam *Cicada*, color nigricans, caput magnum, oculi exerti, frons antennata. Antennæ articulis carent. Sex pedum postremi lōgissimi ad saltum vegetiorem. Alæ insculptæ & incurvæ totum corpus tegunt cauda bifurca. *Fœmina* minor, ventricosa, viridis, oculis herbaceis, antennis rubentibus, caudā tridentis æmula. Per æstatem in campis, terra excavata nidificant: hyeme leniore latitant: per graviolem pereunt. Omnibus commune antrorsum & retrorsum incedere. Alarum attritu sonum edere, credidit Plinius: per duo obstrepentia corpora, quæ motu & agitatione alarum percuterentur, Cassorius: alvi parte cava, Scaliger: dentium

collisione Sabinus Garretus Pharmacopæus alis avulsis, eundem sonum imitando assecutus est. Albertus, si medius dividatur, diu adhuc vivere scripsit. Vescuntur panico, maturo frumento & pomis. Loca umbrosa negligunt, prata sequuntur. Avidius strident magis à nobis diffiti: proximi silent. Formica capillo circumligata & in antrum coniecta, efflato primò ne se recondat pulvere, capiuntur. Ramulo cavernæ aliquoties inserto & extracto erumpunt, quasi quæsituri, quis forib. injuriam faciat.

Albert. 4.
c. 7. apud
Moufetus.


Plin. H. N.
29. c. ult. 1

Ad Gryllos Moufetus *bestiolam* quandam alatam, Tryxalida & cicadā *Rondeletii aquaticam*, refert. De illa ita scribit. Restat adhuc una *bestiola alata*, quam an ad cicadas an ad locustarum classē referam plane ignoro. Quæ enim catervatim volat ac segetes erodit, locusta videtur; forma tamen ad cicadam proximè accedit. Mira sanè hujus *bestiolæ*, & quasi infantis facies. Caput galeæ triangulari tegitur, in cujus superiore parte, quatuor sunt maculæ nigrae, duæ oblongæ, & aliæ duæ ferè orbiculatæ, inter quas, duo etiam minutissima puncta nigra observabis. Alas habet quatuor, quarum internæ duplicantur, quiescit, ita ut *ἐξάντη* videatur. Atque hi fortè erant illæ locustæ, de quibus Cuspinianus è Sigeberto sic scripsit: Mense Augusto, Anno 74. immensa locustarum vis senis alarum remigiis volitabat ab oriente, & cum senis pedibus & cæ. à quibus tota ferè Gallia divastata est. Dixeris primò aspectu caputium scapulas ornare, sed propius intuenti, partes sunt superiorum alarum veluti semicirculo inclusæ. Totum corpus valde crassum, nigro fuscoque est colore: posteriorum alarum partes infinitis nigris maculis notantur. Petrus Quickelbergius Antuerpianus hanc ex Africa portatam ad Peninium transmisit, quam nos etiamnum exanimem in thesauro *ἐντομῶν* servamus, & cicadastram nominamus.

De

Locustæ


Indicæ



Grüllj

Grülln

Heimichen



Grüllotalpa

De *Tryxalide* habet ista. Non minus in *Tryxalide* hæremus. A rodendo nomen fortè obtinuit: verum ut vel *tryxalides* *Bruchos* esse censeam, vel *olerum locustellas*, vel *cicadas*, vel *Gryllos*, nequeo quidem induci. Non solum quia *Athenæus*, *Plinius*, alique eo ipso *Philosophi* sibi non constant; verum etiam, vel quod forma, vel natura longè discrepent. Et quare obsecro *τρυξάλις* à *τρυξω* i. e. stridor, non male non derivetur? quòd si verum sit, sanè *Gryllis* maxime conveniet, quas tum aliàs tum per stridorem à *Blattis* *Peucerus* meritò distinguit: id quod *Ioachimus* noster *Camerarius* (magni illius filius, & virtutum ex asse hæres) primus notavit. *Plinius* ex his viginti terreri jubet ac bibi è mulla contra orthopnceas atq; hæmoptoicam passionem. Cinis illitus cum melle margines duos ulcerum complanat, & mulierum purgationes reventas præclare adiuvat.

Cicada Rondeletii aquaticæ caput pèrangulum imitatur. Oculi exerti atque globosi, non magni & nigri: antennæ ore extimo erumpunt per breves; pedes utrinque ternos habet, postremos longissimos: in dorso vel alas, vel earum rudimenta gerit. Cauda illi bifurca, venter sæpe veluti incisus; corporis color subfuscus vel potius ex albo nigricans. In aquis limosis stagnantibusque reperi, sed naturam eius nondum habeo perceptam: hoc à terrestri differt cicada, tum quod capite sit magis exerto, & cervicis aliquid habere videatur; tum quod alas habeat inutiles ad volandum, licet ad sui correctionem non ineptas. Hæc in foliis nymphææ, potamogeti, aliarumque aquaticarum herbarum insidens, iucundum quid (more *Cicadarum* terrestrium) stridere dicitur: sed à nobis hætenus non est audita.

De suo *Gryllo talpæ* hæc habet *Mouferus*. Bestiolam quam expressimus, Cordi *Sphondylis*, *Dodonæi* vera *Buprestis* est: perperam uterque nominant & nullo iure. *Sphondylis* enim alas non habet, hoc insectum vides alatum. *Buprestis* *Cantharidi* similis

apud omnes dicitur; hoc verò animal nec figura, nec colore, nec magnitudine quicquam eo accedit: ut taceam elytrorum hic absentiam, quibus *cantharides* carere nemo sanus contenderit. *Gryllum* dicimus, quia eundem cum *Gryllo* stridorem nocte appetente facit. *Talpa* quia terram continuo fodit. Insectum visu horrendum ac monstrosum, quadruplo maximam superans *Cantharidem*: præcipuè ætate si fuerit provectiore. Formam ob oculos habetis: ego colores addam. *Fæmina* levius, *Mas* saturatè fuscus. Illi præter duas longas antennas fibulæ quatuor, quasi è naribus labiisque propendent: oculos item habet maiores, & alarum radix miniata macula ornatur. *Mas* verò fibulis illis nudus, earum loco setas duas fibulis duplo longiores obtinuit; concolor sibi undique videtur, & sine macula. Vtriusque ungues coracini sunt. Anterioribus pedibus robustis admodum, & varis tumulos perfodit uterque & cuniculos agit: mediis insistit; ultimis quando opus est, saltat. Cauda illis bifurca; alæ corpore longiores membranæ; corpus incisuris variis insignitum. Iuniores ferè toti nigricant, adultiores implumati videntur. Sub terra palustri & humida maximam ætatis partem vivit, noctu tamen egreditur. *Tardigradum* valdè est animal, volatusque ejus saltum refert: unde in locustarum numerum à nonnullis ponitur. Sole occiduo primum prodit; *Gryllorum* more, suæque cantilena, sonora quidem satis, & supra mille passus stridente sibi applaudit; quam ubi audiunt agricolæ, oppidò exilarantur: ac si ejus adventu terram humore gravidam, & calore solis veluti maturatam scirent. Grana tritici, hordei & avenæ colligit, ac in cavernam asportat, inde fortè hyeme victurus. Quidam stercoribus eum

equinis vesci affirmant.

†

M

CAPUT

CAPUT III.

De Scarabæis.

ARTICULUS I.

De Scarabæis in genere.

Moufet.
Insect. l. 1.
c. 24.
Nomen.
Aldrov. de
Insect. l. 4. c. 3.

VNDE huic animalculo Scarabæi sit inditum nomen, vix ausim dicere.

A Cabo seu Caballo, quod ex eius fimo prodeat, dici ineptum esse certo scio. Græci *καυθαρον*, Tyrreni *βύρρον* vocant.

In eorum Descriptione nihil fere in genere occurrit. Duas alas habent, teneras illas & valde fragiles: ideo superveniente crusta inclusas tutelæ gratia gerunt, ne à durioribus corporibus offendantur. Quatuor habere perperam Albertus dixit. Aculeo destituntur: & omnes senectam deponunt.

Vbiq̃ue fere degunt, in Asia, Africa, Europa & America. In monte Ætna felicissima eorum progenies. In Thracia juxta Olynthum locus est parvus, in quo, cæteris animalibus illæsis, soli exanimantur. Ob hoc *Cantharoletrus* dicitur. Cornuti mense Julio & Augusto frequentissimi in agro Neapolitano visuntur.

Diversos cibos pro varietate sua appetunt: Sunt qui ligno arido; sunt & qui frumento & panibus vescuntur. Vivunt ex jumentorum excrementis. Ideo apud Aristophanem servus quidam Cantharo fæces humanas apponit.

Eriphiam quandam herbam prodidere veteres, Scarabæum in avena habentem, sursum deorsumque decurrentem, cum sono hædi, unde & nomen accepit.

De *Ortu* variæ sunt inter authores sententiæ. Isidorus ex putridis equorum carnibus nasci putat. Plinius ex asini, quidam ex muli. Aristoteles, Cantharos in fimo quem voluit per hyemem condi, vermes parere, ex iisque procreari. Nonnullis visum fæmineo sexu destitui nec coire: quod

tamen in Carabis falsum esse, Aldrovandus observavit. Variare ortum pro specierum diversitate ego putarem, idque in Differentiis patebit.

Tanto stridore volant, ut per eos Natura. Deorum cum hominibus fieri colloquia Laërtius dixerit. Quia *κορόσμοις* deleantur: ideo rosam averfantur, & odoratis illiniti exanimantur. Hemerocallis Dioscoridis quoq; à quibusdam *αὐτιμάνθαρος* vocatur. Tacti, immobiles redduntur & indurescunt. Solis & Lunæ coitum pillularii ostendunt, ut postea dicemus, ubi & de vindicta quam de Aquila sumere solent, agetur.

De *Vsu* in genere nihil occurrit. *Differentias* ex Moufeto & Aldrovando sumemus.

ARTICULUS II.


De Scarabæorum apud Moufet. Differentiis, & primò de Majorib. Cornutis.

EGregie Scarabæos in sua genera dispartit Moufet. Sunt alii *Maiores*, qui vel *cornuti*, ut *πλατύκερας*, *ωρόκερας*, *βέκερας*, *ρινόκερας* & *κερόκερας*; vel non *cornuti*.


Cornutorum primus & præcipuus est *πλατύκερας*, qui cervina cornua imitatur. Nigidio dicitur *Lucanus* apud Plinium; aliis taurus: nonnullis Cervus volans. Hesychio *ἀκάνθης*, quia cornubus spinosis obvia comprehendit; Comico & Eustathio à magnitudine *ἰπποκάνθαρος*, Cardano *σκαρβελάφης*, Gazæ *καράβης*. Quatuor ipsius occurrunt genera. *Primus* femina, *Lonicerus* Marem facit, sed mares inter insecta minor sunt. Colore ex obscuro, verba sunt Mouf. spadiceo nigricat præcipue circa elytra & pectus. Cornua illi duo integra, sine articulis, ramosa cervi instar minimi digiti longitudinis in adultioribus, in minoribus minora ac breviora, vel (ut Plinius loquitur) prælonga cornua & mobilia obtinet, bifulcis dentata forcipibus, cum libuerit ad morsum vel compressio-

Scarabæi ex Moufeto Capricorn


Puicij



Scarab. Buceros Nasicornis : 1



2



Scar. Xpioxepros

3



Sc. Melanocijanes

Sc. Pilularius



Sc. Melolonthes Mas

Fœmina



Mel. Clusii



Thelasy



Sc. Atratz. 1.



Sc. Atratz. 2.

Sc. Arboreg




Sc. Arboreg




affinis



Sc. Fullo



Scarabæi Minores



Proscarabæi

Meijwurm . Meijkefer .






Prof. wieri supine

Prosc. Mas .

Fœmina .

Prosc. Knivetti

Prone



pressionem coeuntia : stringit enim mirum in modum ; atque cornubus utitur cum in finem, in quem chelis cancri atque astacii oculi duri prominentes, albiduli, juxta quos utrinque antennis habet, unas in radice inter cornua & oculos racemosos, quarum articulus rectum ferè angulum facit ; alteras vero media fronte erumpentes, rectas atque planas, in tuberculum leve desinentes. Pedibus incedit sex, prioribus reliquis longioribus atque maioribus.

Alter *mas* est, illi omninò, magnitudinem si excipias, tum corpore tum cornibus similis : quæ licet non ramantur, acrius tamen compressa pungunt digitum, quam fœmina jam descripta.

Tertius priori triplo vel quadruplo minor, colore piceo, cornua admodum parva & bisulca, juxta quæ duæ antennæ plurimis articulis distincte oriuntur. Oculos habet prominulos, & pro corporis ratione magnos. Scapulæ utrinque in angulum acutum desinunt. Vescitur maximam partem succo tenaci atque pingui è quercu exudante, nec facile extra querceta conspicitur.

Capite præciso diu reliquæ corporis partes vivunt : caput reliquo corpore diutius. Lunæ sacer esse creditur. Cornua, in primis quæ excedunt, infantum morbis ex collo suspensa medentur. Strumis quoque & podagræ apposita conferunt. In oleo decoctis si arteria in brachio inungatur, febres apud Mizaldum tollunt. Oriuntur ex vermibus, putrido ligno innatis : forte & ex stercore.

Αἰγόκερος, dicitur & *παραγόκερος*, *καρχήμειλος*, *καρχήμειλος*. Græcis ; *Capricornus* Latinis. Magnitudine coloreque Platii, ceroten refert. Tredecem eorum genera occurrunt. *Primus* caput habet latiusculum, oculos bovinos & grandes, tres fere transversos digitos longos : os illi forcipatum, hians, aduncis duobus dentibus durissimis horrendum, quibus dum ligna rodit, (experi scribimus) argutulum porcellorum grunnitum diserte exprimit. Hoc forte in causa fuit, cur eas ar-

bori alligatas, culices ficarios abigere tradidit Hesychius, Scapulæ eius curiosule à natura sculptæ, manubrium ebeno factum & perpolitum oculis obiiciunt. Pedes sex habet, tribus quoque geniculis distinctos : sed imbecilles admodum & languidos, tantoque oneri sustinendo longe impares. His ferunt auxilium cornua duo, supra oculos nascentia, toto corpore longiora, novem decemve articulis flexibilia, non exacte teretia, sed asperitatem capri imitantia ; quæ licet in quamcunque partem movere possit, tamen dum volat, directe ea tantum protendit, atque volatu festus pro pedibus utitur. Consciis quippe horum imbecillitatis, cornubus arboris ramulum circumplectat, atque ita pendulus quiescit, ut in agro Heidelbergensi vidit noster Bruerus ; avem paradisi eò referens, quæ pedibus destituta pendulis illis nervis ramos illaqueat, atque ita laboris satur quieti consulit.

Reliquos ita describit Moussetus. *Cerambyces* præter hunc memoratum varios vidimus, *unum* primo huic similem, sed magnitudine & colore varium : nam & paulo minor, & colore fuit fere cinereo : Venter, crura, & cornua, dilute cœrulea : scapulæ, cauda & elytra, nigris quibusdam maculis variegata. Cornuum quoque articuli nigricabant ; postrema crura reliquis longiora crescebant. Hos à Quickelbergio obtinimus Antuerpia transmissos. *Alterum* habemus extra viridem, supinè fuscum ; caput, scapulæ, elytra obscure virentia, & auro itidem micantia : corpore est paulò porrectiore, priori similis videtur, sed paulò minor : cornua purpurea obtinet, crura pedesque Hyacinthinos. *Tertium* huic concolorem ipse primus Pennio dedi, nucem moschatam & cynamum verè spirantem. Verùm fragrantia illa dulcis (stacten contra non cara) cum vita in auras statim effluit, & cadavere exulans, sese in pyxidem (qua fuerit servatus) tota insinuat. Cardan. mentionem facit huius Scarabæi : sed qui ante me invenerit neminem novi. Est

quoq; *alter* cum splendore nigricans, ventriosus, crassus, corpore, cornuq; breviori reliquis. Cornuum juncturæ non sunt (ut in aliis) globosæ, sed utrinque leviter ferratæ. Hunc Carolo Clusio Penn. se debere fatetur. *Quintus* capite, ore & dentibus primo omnino similis oculis nigerrimis, colore per totum corpus fusco, ore patulo dentato, capite, collo, & alis minutulis punctis nigris dense conspersus; corporis magnitudine ferè secundam æquat Cerambicem: rariùs conspicietur; in ædibus vivit, & lignis aridis. *Sexto* cinerascenti caput valde exiguum, oculi albiduli, cornua longiuscula, articulata, candescentibus maculis distincta elytris, imo toto fere corpore varius est; in ædib. item versatur, sed an etiam in lignis habitet, ignoro. *Septimum* ex Russia ab Edoardo Elmero allatum vidi, toto corpore infuscatum; juncturas habuit in cornubus globosas, septem vel octo: facile ex forma cognoscitur. Ab hoc *octavus* magnitudine, & forma parum ablutit, nisi quod capite, scapulis & alis subcæruleis præditus videtur. *Nonum* misit ad Pennium Ioach. Camerarius (de literaria repub. optimè cum primis meritis) cui alæ pedesq; arenosi erant coloris; caput, cornua, venterque subnigricabāt: cornub. repandis videbatur, ex pluribus verticillis nodulisque compositis, quæ in utramvis partem noctu citius versabat. In plantis (& potissimum Cithyso) repitat. Huius generis esse puto Scarabæum quam Ioh. de Choul (l. de var. querc. histor. cap. 26.) ita describit. Degit in quercu animal de Scarabæor. tribu (quantum coniectura ducimur) colore rubricante, proceris cruribus geminos capite gerens aculeos, modice inflexos: quib. acerrimè stringit adversantia. Hanc bestiolam fabri lignarii quercus dolantes, in ipsis visceribus vivam invenere. Rustici Lugdunens. Thurro nomināt. In laquearib. feliciter diutiusq; vivit, seque hypocausta colentib. levi cum strepitu prodians conspiciendū subinde præbet. *Eundem* vel illi similem quendam p. m. Gesner. Epist. l. 3. ab anu pleuri-

tim passa deiectum fuisse testatur in hæc verba: Per alvum inquit à potione ex Oxytelite nostro cum decocto scenugræci exhibita prodiit vetulæ pleuritide laboranti scarabæi genus nigrum, longis pedibus, longis it. cornubus flexibilib. articulatisque, rudi plenum pure, vivum; longitud. duor. articulor. erant digiti. *Decimus* totus ex nigro purpurans, os forcipatum habet. *Undecimus* ubiq; atrescit. *Duodecimo* cornua minus articulata, caput scapulæque cyaneæ, reliquum corpus totum spadiceū videtur. Horum omnium in iconib. utcumq; cornua aliàs directā, aliàs curvata cernitis (explanationis gr.) tamen plerumque nonnisi (caprorum more) ad humeros reflexa gerunt, veluti primus Cerambyx.

Ad Carambyces spectat *Quici Bra-* Marcgr. Hist. Bras. l. 7. c. 8.
siliensium. Insectum est corpore ovali instar Scarabæi. Corporis longitudo unius & trientis digiti, Crura habet 6. quodlibet trib. internodiis constans, estque ultima pars crurum ferrata, & quodlibet habet duos unguiculos. Caput & ocelli parvi: duo cornua propè oculos exoriētia, longa, posterius versa & in arcum porrecta, duos & semis digitos longa, longè excedētia corporis longitudinem; & singula habent internodia decem, undecimo inseruntur in caput: crassitie æquant filum crassius. Caput & anterior sectio obscuri & brūni coloris cum splendore nigri mixti, posterior & alæ brūni obscure splendentis. Per mediū a. alarum seu dorsum transversim lineæ lata flava pallefcens tendit. Crura lutea, & ad internodia obscuro brunneo maculata. Cornua diversicoloria luteo & nigro, nimirum ad genicula nigra, cætera alternatim lutea.

Βένερος seu *ταυρόκερος* cornub. duob. tauror. more exertis & directis cernitur. Ex spadiceo circumquaq; nigricat, & ferè *αὐτοφαλ.* videtur. *Capite* est exiguo, brevib. crassisq; scapulis immerso. Media fronte, spina peracuta exit. Defensionī à natura destinata videtur.

Nasicornium quatuor species vidit Mousset. *Prima* omnium maxima atq; rarissima

rarissima apud Indos vivit, colore nigerrimo: nasum habet ad faciem rostri navalis cornutum & extra curvum, circa cuius umbilicum aliud cornu intus reflexum è tuberculo nascitur, quale etiã è scapulæ tumulo. Totum corpus ab ultimis cornub. ad caudã, longitudinem quatuor unciar. continet, latitudo ferè duarum est. Cantharorum lege fœminam non habet, sed ipse suæ sibi faber est formæ; fœtũ solo sibi genitum producit. *Secundam* Nasicornium speciẽ ratam atq; pulcherrimam Mercurio sacram Carol. Clusius Viennæ depictam misit; in cuius agro frequens est. Forma illi, qualem vides, absq; ventre saturate rubro fuisset, totus videretur piceus: narium cornu illud recurvum adeo acutum est, ut (quod de præliaturo barro fertur) aciem illi rupis tenacis affriktione addi putares. *Tertius* nasicornis & *quartus* pariformes pene videntur, nisi quod illi alæ longiores elytris excreſcunt, huic verò breviores apparent. Splendente atramento perfusos dices, usque adeo undiquaq; nigricant.

Κερόκεως seu *Aries*, cornubus est nodosis hyacinthum æmulantib. capite ex auro viridante, scapulis miniatis, purpureo ventre, elytris capiti concoloribus pedibus, cruribusque spadiceis incedit, alæ vero vagina inclusæ albicantem arundinis membranulam scite exprimunt.

ARTICULUS II.

De Scarabæis Majoribus non cornutis & minorib. omnib.

Maiores Canthari *ἀνέρες* five *Excornes* plurimi sunt. *Pillularius* nempe *Melolonthes*, *Purpureus*, *Atratus*, *Arboreus*, & *Fullo*. *Pillulario* nomẽ quod ingentes pilas averſus pedibus volutet. Dicitur & *Stercorarius Fimariusq;*, tum quod ex fimo nascatur, tum quod illo gaudeat. Græcis est *κοπερανός*, *ἡλιοκάνθαρος* & à forma *αἰλὺς μορφος*, id est, felliformis. Stercorib. vaccar. ita delectatur, ut ad ea frequens & citus advolet. De eius *Generatione* hoc habetur, pillulam è stercore ad cœli formam conficere, eamq; ab ortu ad oc-

casum tãdiu versare, donec ad mundi figuram perduxerit. Mox eandem subter stercus, ubi nidificat, ad mensẽ lunarem reponit. Hoc exacto *fi.* *Ael. H. A. l. 4. c. 11. & l. 10. c. 15.* gillatim singulas eiectas aqua dissolvit. Sic prodit scarabæus impenis, sed qui paucos intradies absolutus, in volucrem abire solet. Nulla ergo in genere eor. anima. Porphyrius, genitiram in cœlum emittere, mox pillulas magnas posteriorib. pedibus fingere ait. Apollini idẽ sacros Ægyptii voluere. Imò expresse Plinius. *Propter* *Plin. H. N. l. 30. c. 11* *hunc Ægypti magnam pars, Scarabæos inter numina colit, curiosa Apionis interpretatione, qua colligat Solis operum similitudinem huic animali esse, ad excusandos suæ gentis ritus.* Per coitum quoque propagari observavit Aldrovand. Vidit n. mens. Majo vermiculos albos plusquam 42. horar. spacio, figura Curculionis prodire. Erucas esse opinatur parvas Bombycum modo progrediẽtes, quæque intra 5, aut 6. horas filitenuissimi folliculos, illosq; candidos, Melopeponis seminis magnitud. sine cortice texere cœperunt. Addit, fodere terram rutilos & prægrandes, favosq; parvæ & fistulosæ spongiæ medicato melle fingere. Nidos ex lutosa valdeque fragili materia à Greg. Capucino eidem cõmunicatos, in quor. uno mortuum Cantharum invenit, hic habet. Vnapudendi est figura, unico canali constans. Parti infernæ duo veluti testes appensierant: singulis suis ductus, cum unico illo canali continuus: in hisce Scarabæi. Aliquando plures sunt hi testes, & figuræ oblongæ. Rosas averſantur. Hederæ umbra gaudent. Hyemẽ vix ac ne vix sustinẽt. Solis calore excæcatos mori, tradidere quidam: plerumq; à pedic. suffocantur, quib. undiq; scatent. In *Marcell. de Medic.* sculpitur Smaragdo cõtra veneficia. Oleo ros. cum terræ intestinis cocti, aurum dolorib. medentur. Ex iisdem ad calculi dolorem pulverem Lanfr. conficit. Ad hæmorrhoidas unguent. quod vnguentum populcum, cum ol. rosac. in quo Scarabæi cocti, aselli, & crocus ingrediuntur. Habet & Villanovanus contra spasmodum suum. Lethargicos excitabis, si duos vel tres sub mediæ juglandis cortice conclu-

Plin. H. N.
l. 30. c. 11.

Trallian.
l. 12. c. 8.

l. 12. c. 8.
l. 27. c. 10.

fos, occipitio bene raso, musculis brachior. anteriorib. & plantis pedum aligaveris. Bene cecidit M. Ioh. de Florentin hoc experimentum. Quartanariis medetur, si fulvo linteo vivus inclusus collo appedatur. Expertum se Trallianus scribit. Chelonitide gemma aureis guttis insigni, cum Scarabæo in aquam ferventem missa tepestates ciere velle, insani esse puto. Huic similis est *Melanocyaneus*, cum illustri quodam splendore. Facie est felina. Augusto à pediculis intra crura hærentibus vexatur, & tandem interficitur. Vbiq; occurrit.

Melolonthen, Attici *Melonthen*, quidam *χρυσάριδα* vocant. Nonnullis est *χρυσομελόνθη* & *χρυσοκαύθαρος*: quibusdam *Cantharis*; Aristophani *χρυσίον χρυσίζον καύθαρον* ὁμοιο; Eustath. *Vespa maior*; Poluci, *animalculum volucre*: rusticis *Lōbardicis* & *Gazæ Galenica*; aliis *scarabeus arboreus*. Hesych. eum coloris aurei facit: Aristophan. scholiastes flavi, recentiores Smaragdinum sed auro radiantem volunt. Idem & Plin. sentit. Mas undique viret, oculos si exceptis rubicundos. Elytra fœminæ castanei coloris, grato splendore micantia. Pectus utriq; mucronatum. Stridulum edunt sonum. Generantur è vermib. fimi bov. aut jumentorum: si Arist. credimus: si Steph. ex Teophr. ex florib. pomor. Sunt eius duæ præterea species. Priori quæ Clusii, caput, scapulae & pedes nigricant, sed è cœruleo. Anten. sunt corneæ, elytra striata, sed in circumferentia non nihil rubent. Alter est Thilesii, totus præter oculos qui nigricant viridis. Venter ex auro parum rubescit. Medium dorsum luna elytris concolor adornat. Ideò Equus Lunæ vocatur.

Purpureus Constantinopol. delatus fuit: Totus talis & violaceus erat, nisi oculi, venter & pedes, picæ retulissent.

Arratus totus nigrescit. Os ipsi forcipatum; scapulae fere quadratae: tibiæ & antennæ breviusculæ: In lignis aridis habitat. Frequentius graditur quàm volat, & inter gressum, obmuratur.







Arboreus obvius est. Iulio in primis & Augusto mensib. Vaginæ alarum,

puniceæ sunt, & tenuissimo polline conspersæ, leviterque splendent. Oculorum circulus, antennuleq; parvæ flavescent, juncturæ ventris albescunt. In Normandia tertio quoque anno sunt frequentiores. A. 1574. vigesimo quarto Feb. tot in Anglia in Sabrinam delapsi sunt, ut molendinorum rotas sisterent. Affinis huic est totus ex fæco albicans, glauco ventre & quodammodo canescente. Inservit anatium venationi. Grues quoque eo capiuntur, ut Gesnerus prodidit.





Scarabæus, quem Plinius *Fullonem* dixit, *Gaza καύθαρον* Aristotelis esse opinatus est; Scarabæum rubeum Plinius, animalculum cauda forcipata Junius, est Arboreo maior, cervo volante fœmina minor. Caput gerit corneum, antennulis duab. ornatum. Oculos, & pectus hirsutum, ex albo flavescentia; pedes anthracinos. Venter caudaque plumas referunt gruinosa. Scapulae & elytra, albis nigrisq; maculis variegantur, tam pulchre, ut vestem Damascenam, Phrygia ac intertextam jurares. Non ubiq; est ob- Plin. H. N. l. 30. c. 11.

Plin. H. N. l. 30. c. 11. tantum, commendant. Tantum de maioribus cornutis & Moufet. de Insect. l. 1. c. 28 non cornutis sufficiat. *Minores* vel *maculati* sunt corpore, vel *immaculati*: illos *ἀμαρξέους*, hos vero *μονοχέους* Græci appellant. *Maculae* aliorum ex nigro albicant: alii flavescent, alii rubescunt. *Albicantium* è nigro septem, flavescentium tredecim, Rubescentium duodecim; quos hic sua quemque classe donavimus. Immaculator. color corporis idem deprehenditur: atq; inter eos sex nigricantes, duos spadiceos, globosum unum ex cœruleo nigrum, alterum ex luteo vidimus. Quidam quoque nuperrime à nobis, inquit Moufet, deprehensus est fūco puniceo, alter muricis succo inebriatus comparuit. Aurecentes quinque habemus, parvulos illos quidem, sed clare micanteque auro undique suffusos, quos etiam ne invidisse nepotibus videamur, sculpi appingique curavimus.






Scarabaei Schröter. Aldrovandi. Tab. 1.






Tab. 2.



Tab. 3. et 4.



Tab. 5.



Tab. 6.



Tab. 7.

ARTICULUS III.

De Scarabæis Aldrovandi.

Aldr. Hist. Inſ. l. 4. c. 3. **A**ldrovandus eosdem in *Cornutos*, & non *Cornutos* distinxit. Ex illis alii unum, alii duo, quidam tria cornua habent, & raro vident. *Διέκριτοι*, aut sunt *Lucani* sive Tauri, quorum cornua sunt dentata, ac forficum modo aperiuntur & clauduntur: aut *Carabi*, quorum cornua nodosa sunt, & ad prætendendum iter facta. Triginta & quinque utriusque generis sunt species, quas sex diversis tabulis exhibet. Exhibeo & ego omnes, ut si quid inter jam enumeratos omissum est, adiciatur, & comparatio inter utrumque melius institui possit.

Prima tabella septem continet, ex quibus primus est Caraborum videtur esse genere, quoad figuram corporis quam habet communem cum aliis Carabis, quamvis locum, quo nascatur, nequiquam observaverim. Toto corpore niger, antennis longiusculis, parvis nodulis constantibus, longis in postica capitis parte sitis cornibus, seu potius appendicibus binis prope os nodosis, item crassioribus, quam sunt antennæ, sed plus quam media parte brevioribus; pedibus in extremo bifurcatis, asperis: caudam constituunt duæ appendices vaginarum, cum coniunguntur.

Secundus est Scarabæus aquaticus prohus & supinus. Aquaticum nuncupavi, quod præter reliquorum morem in aquis degat, inter maiores fanè coniunctandus: toto item corpore niger prone & supine exceptis capillamentis, quæ in pedum extremitate cernuntur itemque antennis, nam hæ rubescunt.

Quartus est minimorum genere, pollicem enim latum longus, totus quoque niger, capite parvo, trigono, minutis antennis; quarum extremitas obtusa, & veluti rotunda quadam pilula insignitur, pedibus bifidis in extremitate, paulò versus corpus habebat quasdam asperitates, seu appendices, quibus ingressu juvabatur,

tanquam cirris polypus. In ea parte, qua vaginæ sese invicem in aliis contingere solent, evidens apparebit rimula, qua dilatata & aperta prodibant alæ subvirides, sed nonnihil ad castaneum vergentes: cum eas ad volandum expandit, toto corpore maxime splendet, alvoque robustissima.

Quintus est Scarabæus pilularius, seu Cantharus compacto latoque corpore & nigro, sed cœruleum splendentem. Capite plano inferius, & superius nonnihil arcuato & lato cucurbitæ instar, ac multis eminentiis superius conspicuis, è quo ab utraque parte duæ prominent antennæ breviusculæ, sed in fine divisa in plurima tenuia filamenta, pedes sunt anterieus serrati in fine, ita à natura facti, ut illis, cum continuo in stercore vitam transigat, abstergere anteriores capitis partes facilius posset. Crasso magnoque pectore, cuius medio ab utroque latere pedes priores annectuntur.

Sexto loco datur Scarabæus viridis Melolontha Aristotelicorum quorundam sententia, quem inter volandum putant sonitum edere: corporis parte supina & alvi maxime colore est obscure viridi, unde nomen sortitus, capite parvo nigro ferè, & ab utroque oris latere duobus cornibus nodosis insignito, itemque dentibus, quibus apprehendit valide, antennis longis, æqualibus, in extremo paulatim in acutum desinentibus, pectore autem rotundo, tenuiori; ligamento alvo, latæ annexo.

Ultimus eiusdem tabulæ nigro corpore est, in quo maculæ virides, sed aliquid flavedinis in se habentes, proceris cornibus eisdem maculis conspersis, quæ versus posteriora flectuntur, eisdem quoque maculis & ipsi pedes, præsertim eorum femora; alvo procerâ, quam non universam vaginæ contegunt.

In secunda tabula est Lucanus Nigidii, Cervus volans Leoniceri, Scarabelaphus Cardani, Taurus Scaligeri; aliqui Scarabæum bicornem appellant; apud Thessalos *καραβύκα* dici & *ξύλοφά-*

ξύλοφάγον βέν, quasi bovem ligni edacem autor est Antonius Liberalis. Gallis dicuntur Cerfs volantes: Turo Lugdunensibus rusticis fortè à Tauro derivato nomine, Italisque cervo volante, Bucarone del corno, Gufano con cuernos Hispanis. Ferrantes Imperatus cervi volanti vocat. Belgis een vliegende hert. Germanis ein Schrötter dicitur. Nigro est toto corpore & maximo, huic duo cornua prætenduntur ramosa seu dētata, quibus cum constringuntur, validè apprehendit: oculi utrinque à latere horum positi, intra verò cornua duo parva cornicula veluti antennæ; capite latiori quàm pectore, sed minus longo; huius & caput & corpus reliquum à se invicem divisa diutius vivunt.

Qui vero hunc ordinem consequitur, cætera priori similis, ut magnitudine tantum differre videatur, qua dimidia parte minor est.

Sequuntur *duo alii μόνονες*, hoc est, unico cornu in summo capitis, quos ab Ægyptiis Mercurio dedicatos supra meminimus, corpore nigro, cui nonnihil rubri admistum sit, crasso magnoque capite. Horum posterior hirsutus atque pilosus est prona parte, horum species Rhinocerotas appellat Ferrantes Imperatus ob similitudinem cornuum, quam habent cum Rhinocerote, animali quadrupede, tarde volant, quò fit, ut ultrò fere in manum eius, qui prehendere voluerit, involent.

Quinto loco est Lucanus Papilionis similis, est enim versicolor toto corpore duos digitos per transversum longo, cornibus instar cervi dentatis nigris, quibus ab utraque parte posterius ante oculos prominent antennæ tenues, longæ, ut ad latera viam tendant factæ, nam ad latera utraq̃ue protruduntur, capite albis insignito maculis, per quas rubor quidam obscurus perfunditur, pectore angustiori, quàm capite est, tribus albis maculis in medio notato, alvo prolixa, crassa, longa, ut Papilionibus quibusdam contingit, annulis rubris, alis non universam alvū con-

regentibus, sed multò brevioribus, & ut puto, farinaceis. Nam, ut verum fatear, id nunc me fugit, cum eiusmodi Insectum inventurum existat, nec eiusdem descriptionem exactam, quam olim feci, reperire postea unquam potuerim; variis coloribus huius alæ exornantur, nam suprema parte, qua superiori alvi parti cōtingunt, vicinæque sunt pectori, rubicundam maculam ingentem præbent cordis, quod vulgò pictores depingere solent, compressio mucroni seu cono similem; reliquum deinceps alatum corpus nigrum est, maculis aliquot primum argenteis, deinde lineis latioribus obscure rubentibus, quæ utraq̃ue aliquoties pervices iterantur, ita, ut in huius animalculi alis natura illuisse pictores attemque eorum videatur.

Tertia tabula tota Caraborum plures continet species, excepto primo, qui ad Lucanorum genera potius pertinet, parvo corpore, nigerrimoque cornibus incurvis parvis sine dentibus ad eundem usum, ad quem Lucanorum aliorum, his item antennæ postponuntur singulis à latere, pectore modice crasso & crassiori, quàm caput est, alvo duplo longiori, eiusdemque crassitie & latitudinis. Cervettino vulgò dicitur.

Secundo loco datur Carabus inter minima genera referendus; ejus caput, quod parvum est, itemque pectus, antennæ & pedes nigra sunt: sunt autem antennæ longæ; nodosæ, vaginis rubris ab utraque parte, quæ in medio maculam nigram grandem habent. Porta terra vulgò Italis dicitur.

Huic ex ordine *secundo loco* succedit Carabus, quem Aristotel. verum esse arbitror, cum aliquoties in ligno is sit repertus arido, è quo postea evolavit.

Tertius Carabus è ligno arido quoque nascitur, ut vidimus, nodosis procerisque cornibus, quæ nodis constant novem aut decem grandioribus, primum prope caput, deinde minoribus, in quos singulos extremitates tenuiores superiorum nodorum inferun-

feruntur ita, ut articulationes nodosæ appellari possent. Ultima autem articulatio ex parte constat nodosa & absque nodis ita, ut ea, quæ nodis destituitur, tenuis in fine in nodosam partem inferatur, veluti in ultimis digitorum articulationibus facile est videre. Porro hæc cornua, quæ antennæ merito ab Aristotele nominantur (supplent enim earum usum) quandoque corpore multò breviora, quandoque longiora sunt, vidi quandoque duplo longiora ipso corpore; cæterum colore nigerrimo, ut totum corpus. Capite paulò minor, quàm pectore, quod inæquale est, venter omnium longissimus latissimusque, prona parte annulis quatuor aut quinque latis constans, in ventris fine, ubi alvus est, hirsutus, pedum extrema ferrata sunt & aspera, multis hirsutis particulis constantia, quarum ultima bifidula, seu bifida, & adunca in modum hami, qua validissimè cuique obviæ rei, velut lapidi, ligno, linteisque adhæret, ut vix inde tutò avelli subito possit. Unde Portapeso ab Insucribus dictus putatur. Nam etiam si parvum sit animal, tamen quandoque sustinet, retinetque pondera sex-tuplo, aut amplius ipso animalculo longiora cum suis cornibus suspenditur, & in altum evehitur; hunc aliquando in pertusa pyxide conservavi vivum per aliquot hybernos menses, apponens lignum aridum & cariosum; Sed hybernis illis temporibus observare non potui, num eo vescatur, quod quidem verisimile est, cum duobus dentibus aduncis sit instructum, ut reliqua Scarabæorum genera; his enim se coniungentibus sectum alimentum ori ingeritur: universum autem corpus exceptis cornibus longum duos digitos, latum minus uno.

Qui descriptum sequitur eiusdem generis, differt autem corporis universi colore, qui fuscus est ad castaneum vergens, cornua sunt tenuiora, longioribus constantia internodiis, sed tenuioribus, pectore multò minus caput, in quo oculi sunt satis conspi-

cui, siti in posteriore magis parte, nec ita distantes, & ad latera, ut in præcedenti, pectore quoque minore, ventreque longiori & nigra cauda insignito.

Succedunt *duo alii* sub eodem Caraborum genere referendi, minores, corpore nigerrimo: capite maiori, quàm pectore, quod linea quadam fusca à pectore separatur, alvo seu ventre figura ferè ovali, qui totus vaginis binis cooperitur, secus quàm in prædictis, pedum extremitas non usque adeo aspera, ut cuique obviæ rei adhærere possit.

Vltimus est Carabus dubius: nam eæ antennæ, quæ in aliis nodosæ erant, in his veluti Papilionum sunt quorundam plumatæ, toto corpore nigro, capitis ac pectoris magnitudo ferè eadem, sed in pectore ab utraque parte duæ appendices videntur nodulis aliquot constantes, quæ, cum pectus pedibus duobus destituatur, secus ac in multis aliis pedum vicem supplere putantur; pedum utique constitutio differentia est notabili; nam secundus eorum articulus, atque tertius iisdem villis est, seu asperitatibus, & capillamentis, quibus sunt antennæ & descriptæ appendices pectoris; universi autem corporis ea est parvitas: qua in iconè cernitur.

Quarta tabula duos tantummodò continet, quorum primus ad Caraborum quoque genera referendus, ac præcedenti tabula quarto loco descripta congener, dorso multis punctis protuberantibus resperso, alvoque caudata.

Secundus totus niger dentato capite absque cornibus nodosis, quorum loco duas antennis nigras æquales mediocriter longas habet.

Quinta tabula primus uvas corrodit, toto corpore niger, exceptis pedibus vaginis & antennis, quæ sunt colore castaneo, antennæ in extremitate multifidæ sunt veluti scopæ, vaginæ ad finem alvi non pertingunt.

Alter ferè eiusdem generis caudatus, pectore & capite nigris viridè resplendentibus, vaginis non totam alvum circumdantibus colore castaneis,

neis, pedibus in extremitate magis rubentibus, item antennis eodem colore præditis, quæ cum in fine crassæ apparentur, ut fructus tenues & oblongi, æqualesque, parvo admodum pediculo capiti adnectuntur.

Insecta tria quæ subsequuntur, ad Cantharidum genera referuntur, quorum *primum* toto corpore nigrum exceptis vaginis, quæ miniacæ fere totæ sunt. Nam lineæ nigra in principio latiuscula à medio vaginarum ambarum, qua parte sibi invicem contingunt, oritur & versus anum protenditur, finitque; antennæ sunt in eo longæ. *Secundum* capite, pectore, antennis, & duobus prioribus pedibus ferrugineo colore, reliquis membris colore nigris cæruleum fere splendentibus, seu plumbeis. *Tertium* & *ultimum* pedibus antennisque nigris, reliquis membris miniaceis.

Sexto loco ponitur Scarabæus vermis facie, toto corpore niger, duabus in ano appendicibus crassis, antennis proceris.

Septimus caudatus est, toto corpore ex cinereo ad castaneum vergente, pectore & vaginis aurum splendentibus, antennis tenuissimis, oculis conspicuis à latere capitis collocatis.

In sexta tabula ordine primus ponitur Scarabæus foetidus dictus, quod tetrum haberet odorem, in campis repertus, Scarabæo pilulari magis, quam alteri alicui insectorum similis, antennis est nigris geniculatis, in quarum extremitate duo sunt globuli seu pilæ, maculamque prope has habet ferruginei coloris, ceteræ partes omnes nigerrimæ, exceptis vaginis, in quarum suprema parte quatuor apparent maculæ ferrugineæ; pedes erant in fine maximè ferrati & asperi, cauda annulosa, quam extendere & retrahere poterat. Dum tangitur, stridet, curritque velociter. Notandum in hoc eodem animalculo in parte inferna circa os vermiculum, aut exiguum animalculum extitisse, quod utrum ei naturaliter in sit, an verò per accidens, adhuc me profectò latet: nam tamdiu, quam

apud me continui, semper apparuisse deprehendi.

Secundus & ille foetidus, totus niger, minor, antennis ferratis & absque pilulis, pedum extremitate aspera.

Tertius serpentarius à nobis nominatus, non quod serpentis figuram referat, sed quod in occisi serpentis corpore, cuius carnem vescabatur, deprehensus sit, pilulario minor, angustiorque corpore, capite nigro depresso, antennis nigris, parvis, quarum apices flavescunt, rostro bicorni, oculis emissitris, pectore nigro scuti formi, vaginis quadrangularibus brevibus (non enim totam alvum cooperiunt) nigris, quarum utraque duas in medio habet fascias luteas paululù ferratas, alvo valdè annulosa & circa extremitatem valdè pilosa: pedibus omnibus ferratis, quorum tamen anteriores in extremo articulo reliquis erant latiores, ut manum quodammodo imitarentur, subtus verò flavescentes. Inter medios & posticos pedes colore est aureo, obversusque ea parte Soli splendorem emittebat: sed hunc colorem aureum pili quidam rufescentes efficere videbantur; In pectoris parte supina cruce erat notata, inter antennis macula obscurè lutescente & triangulari: pars eius inferna multis pediculis scatebat.

Quartus è Pilulariorum fortè est genere: nam circa excrementa eum versantem deprehendi, brevi corpore & obeso, nigerrimo colore & relucenti capite rotundo, & instar scuti militaris efformato, è cuius medio cornicula duo exierit breviora cum apicibus, & alias duas appendices his multò exiliores: Pectore item scuti formis, quod tamen in anteriori parte appendicem quandam protensam & acuminatam habet, ut tertium cornu referre videatur, vaginis striatis, pedibus in fine ferratis & asperis: anteriores horum minus asperis, posteriores magis; ad latera pilis quibusdam rufescentibus vestitus, ani figura medii scuti figuram exprimit.

Quintus niger, parvo capite, antennis

nis longioribus, nec pedibus asperis. Sextus aquaticus minor dictus, quod in aquis degat, corpore est nigrò, lucido, ad viridem quodammodo accedente, pectore ac ventre lato, vaginis ventre maioribus, in medio ventre inter pedum exortum appendicem quandam habet, qua pedes à se invicem separari videantur.

Duo postremi minimi, dorso uterq; variegato. Prior pectore scutiformi, ac capite rotundiufculo, duabus antennis exilib, insignito, dorso autem multis punctis seu granulis resperfo, coloreque nigro. Posterior corpore magis rotundo & compacto, capiteq; exiguo, antennis longioribus, dorso toto variegato, & colore magis nigro.

Postrema tabula primus è minimo genere est, toto corpore nigerrimus, compactus, antennisq; exiguis, vaginis universam alvum tegentibus.

Qui hunc ordine sequitur, maior, & corpore item nigro, magis oblongo, antennis longioribus, pedum extremitatibus minimè asperis, sed levib. & æqualibus, ut ad scandendum non usque adeò aptus videatur, nisi eius parvitas has asperitudines cernere non finat.

Tertius inter Scarabæos quoq; à nobis relat9, quod cum eor. natura corporisque constitutione magis, quàm cum aliorum conveniat, capite parvo, cuius articuli cum dorso aurei sunt, cæteræ partes nigerrimæ.

Quartus corpore universo niger, capite rotundo parvo, antennis mediocribus, pectore triplo maiori, vaginisque universum ventrem contegentibus.

Quintus è minimiorum genere niger fere totus, præterquam in vaginis, in quibus aureus color, sed obscurè videtur; capite rotundo, & exiguis valdè antennis, nec facile conspicuis.

Sextus totus niger, capite ferrato & magno, pedibus ferratis & asperis, in fine bifidis, vaginis brevibus, nec alvum totam contegentibus.

Septimo loco positus est Gryllus potius: oblongo corpore, colore flavo, sed circum latera præsertim vaginarum nigris quibusdam maculis va-

riegato, antennis rectis, longis & nigro atque flavo colore distinctis.

Octavus supine depictus, capite rotundo & exiguo nigro, antennis parvis & tenuibus nigris cum pectore, quod maius capite est, pedibus item nigris, inferna ventris parte seu pronabra rubra.

Nonus totus niger & oblongus: capite minutissimo, antennis mediocribus acuminatis, pectore grandi, quod à ventre divisum longo interstitio & exiguo ligamento connexum: pedum ultimis articulis ferratis & asperis.

Decimus quoq; niger excepto dorso, quod quodam argenteo splendore nitet, mixto scilicet cum nigro, capite est exiguo, exiguisque antennis, ventre paulatim versus inferiora gracilescente, pedum extremis particulis bifidis.

Ultimus & is exiguis antennis, totusque niger, minus gracili extrema parte alvi, inter minimos hic computandus.

CAPUT IV.

De Proscarabæo, & Scarabæis aquaticis.

Quem Latini Proscarabæum dicunt, ^{Mouf. de Ins. l. 1. c. 23} xere, illum Paracellus Meloen, Agricola *pinguiculum*, Græci *αὐτοάνθρον*, & *ἐλαονάνθρον*, vocant. Germani Majalem Scarabæum appellant. Corpus ei molle, è cæruleo obsoleto, cum splendore nigricans. Scapulis alæ duæ, vel potius alarum rudimenta innascuntur, celeritatis in gressu adjumentum. Circuli, dorsi ventrisque fasciæ, viriduli in junioribus, in adultioribus, cærulei apparent. Agricola falsò quadrupedem facit: constat nam sex pedib. Wier. ap. Clut. sic describit. Hic vermis, in capitis & colli circuitu colore purpuræ saturato aut violaceo annotatur, paulum scintillans, alæ delitescēte viriditate tinctæ sunt; Sub alis atq; in dorsi ambitu circuli visuntur diverso colore imbuti, subinde viriditate micantes, subinde flavedinè obscura distinctæ; venter

atque pedes colore caput & collum repræsentant; in utroque latere ventris tres pedes continentur. Rostro a. incurvato aliis congenerib. & rostratis non abfimiles. Vbi ætas tenerior est promiscuè cæruleo colore tinctiores censentur; excrescunt in duor. articular. digiti longitudinem & unius crassitiem. Contritus fragrantia fundit. Foliis violar. & graminis tenelli præcipue vescitur. Rarè extra Majum conspicitur. Reliquis anni temporib. vel latet vel semine pillulis incluso, obit. In ericetis colligitur: solet & exfossa herbacea rorida erui. Coeunt avertis caudis, scemina, quæ maior & oris forcipati, quæq; levissimo attactu oleum fundit, trahente marem, qui minor, & quasi exsuccus, ut retro reptare cogatur. Wieri supinus, (*vermem Majalem* vocat) ad faciem humanam maxime accedit. Alas longiores reliquis gerit, & cingulis plurib. corpus ambientib. distinguitur. Quem Edmundus Knivetus vidit, parvus & exsuccus erat. Habent in *Medicina* usum. In Ditmarsia filo circa collum appenduntur. Ibidem in Epidemico capitis dolore tres exsiccati & in pulverem redacti, in Cerevisia propinatur, ad sudandū per novem dies. Sed solemnus in arthritide vaga usus. Manib. eos tangere cum colliguntur, religio est. Numerus semper impar, prima vice unicus post ternos assumitur: quinq; ad summum: in pulverem redacti, in cerevisia calida exhibentur. Maxima hinc primò ventris perturbatio, maximus & circa urinæ ductus dolor, ut cum morte conflictari videantur: hinc vomitus, cardialgia, ardor urinæ, & similia. Serum tandem copiosum proliciunt, & aliquando restituntur. Paracels. in hydropo aqua ex dr. x. Meloum & sem. raph. unc. j. ab unc. ij. ad unc. iij. propinat. Destillati tumores oculor. tollunt. Pinguedo fissuras manuum sanat. Kegler. in oleo dulcissimo suffocatos, ad bubones & carbunculos commendat. Quid de *Scarabæo Culiæ* Marcellus scribat, vide apud Moufetum.

Moufet. de
Insl. l. 6. 23.

Scarabæum Aquaticum Moufetus ita describit. Scarabæos aquaticos Græ-


ci *ὄδοντι* *ῥαγῆς* appellant. Horum omnium ventres spadice infecti, dorsaque carbone notata, præter Anglicanum; In cujus icone si limbum scapulis totoque corpore ovali circumcurrentem leviter infuscaveris, atq; oculos argenteos feceris, non est quod amplius expetas ad illius descriptionem. Sex quilibet pedes obtinuit, posteriores longitudine latitudineq; cæteros vincentes, quibus pro remis internatandum utuntur. Sed elytris nigerrimis, membranae latent alæ argento tinctæ, quibus noctu aquis egressi, celeriter convolant per aërē, quem interdum perrarò (forte nunquam) diverberant. Omnium v. minimi sunt illi, qui irrequieto motu huc illuc in aquæ superficie multo nullo ordine transcurrunt, & quasi collidunt, & aqua turbata vel se fundendo immergunt, vel in riparum foraminib. abscondunt: Deinde v. mutis & tranquillis fluctib. iterum gestiunt. Christoph. Leustner. se *Scarabæum* in loco quodam invenisse scripsit ad Gesnerum, vaginaria (ut solent) crustula, cui quasi formicæ caput subluteum, atque alæ multæ erant affixæ; ventre inferiore pinnae spargebantur, caudis astacorum similes: quibus (ceu in aquis remiges) divagabantur. Cauda prominebat pro sua munitione exigua, sed in longissimas setas divisa. Ex aqua palustri in fontanam coniectus paucis interiectis diebus vita excessit.

CAPUT V.


De Tauro volante Brasiliensi, & ei congeneri.

TAuri volantis, seu *Scarabæi* platyceroris quatuor sunt apud Brasilienses species, *Enena* incolæ vocat. Marcgr.
Hist. Bra.
l. 7. c. 2.


Totius corpore in primo longitudo plus duorum digitorum Rhylandicor. crassities a. fere quatuor. Totum corpus splendide nigrū, sed pilis flavescens opertum, ita ut flavescens videatur. Sex habet pedes seu crura duos antè versus, duos ad latera fere extensos directe, & duos post se extensos, nigros omnes splendidosq; & su-



Tambeina



Bras




Cantharides Maj.

Canthar. Mouf. Golt keffern

Maj. lat

Maj. lata



Cant. Major oblong




Maj. lata

Grüne Kefer, Spanische fliegen




3 Canth.



2 parva




1



4



3 Cantharides



2 Aldrovandi



1

Tab. 1



4



3



2



10



9



8



2



7



1

Tab.



4



3



2



8



7



6



5



4



3



2




1

Tab.



12



11



10



9



8



7



6



5




4



3



2



1

Tab.



15




14




13



12



11



10



9



8



7

Tab.



6



5



4

Tab.

3

2

1

Tab.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Tab.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Tab.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Tab.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Tab.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

& superius raris pilis præditos; in quolibet autem pede tres ungues, cum parvulo digito, qui quasi tertius unguis: suntque crura variis denticulis armata. Vnius fere digiti intervallo à capitis initio (quod minimum) sectio est corporis. Capitale cornu habet magnum, & in extremo sectum, nigrum & splendidum, unum pene digitum longum: oculos nigros eminentes & propè illos duos cirrhos extensos, singulos tribus apicib. qui in extremitatibus sunt fusci. Prima sectio corporis tricornis in summitate anteriori habens cornu protensum & paululum deorsum flexum, longitudine dentis humani: & utrinq; ad latera unū, ejusdem magnitudinis. Alæ ejusdem coloris cum toto corpore, pilosæ ac duræ. Posterior sectio corporis inferius multas habet divisuras. Prior sectio superne magis rufescit pilis, posterior autem magis flavescit.

Alter paulum diversus à priori est. In toto corpore superiori obscure castanei seu nigricantis splendentis coloris, in infimo per totum castanei coloris splendidi. Totius corporis longitudo, duor. & semis digitor. crassities circiter quatuor. Corporis anterior sectio, unum digitum longa. Caput parvum: oculi nigri splendentes, non tñ. prominuli, ut in prioribus: propè oculos duos habet cirrhos ut prioribus: proxime caput cornu erectum & paululū versus posteriora reflexum semidigitum longum; & ad latera in sectione anteriori superius versus utrumque cornu crassum erectū, paulò brevius & obtusius quam prius illud. Alas habet ut alter & corpus ita conformatū: Crura sex trib. juncturis, & trib. digitis, & uno minimo pro quarto: media crurum pars inter secundam & tertiā juncturam aculeis pyramidalib. munita: integra autem crura sunt hirsuta pilis castanei coloris, uti & circa os ac in sectione corporis.

Tertius, rarissimæ est conformationis. Magnitudo illi eadem cum prioribus; crasso & rotundo ventre: crura habet sex, singula duab. juncturis constantia: anteriora autem quinque; processus acutos quasi digitos habent, quib. terram fodiendo citissime, sub

eam se ingerunt. Alas habet duas striatas, & in prima sui corporis sectione eminentiam fellæ formem, & ante illam foveam s. cavitatem subrotundam, avellanæ maioris capacē, in qua magnus numerus fœtuum vivorum visitur, coloris brunni & filamentis quibusdam in fovea annexorum, qui magnitudinem referebant semin. papaveris, sed Megascopio quilibet inditus magnitudinem ostendebat pisi, eratq; omnib. numeris absolutus & cornutus ut parēs. Caput semilunaris fere figure & compressum, cui cornu impositum, satis crassum & plus digito longum, erectum, sed in summitate paulum versus posteriora inclinatum. Pone cornu huius exortum, in quolibet latere oculus grani milii magnitud. rotundus, niger, splendens. Totum a. corpus, crura & alæ sunt insignis splendentis coloris, ex nigro, viridi, & aureo mixti; estq; totum subtilissimis pilis vestitum. Validissimus est, nam scatulæ crassiæ à me inclusus, ac latere cocto crasso imposito, nihilominus se semper exferebat, ut funiculis fuerit coercendus. Hirci pene odorem de se fundit.

Quartus. Crura habet sex, quatuor in posteriore, & duo in anteriore sectione corporis: pedes desinūt in duo lunata cornicula: singulaq; habent tenuius tenaculum. Anterior sectio digitum longa in cornua desinit duos & semis digitos longum, teres & paulum deorsum incurvatū, & duos habens velut dentes versus posteriora. Inferius in antica parte corporis, sub exortu huius cornu, jungitur caput, parvum quidem sed & cornu habens sursum incurvatum, duos fere digitos longum, cum processu tripartito in ipso acumine. Oculos habet rotundos, nigros, splendentes semin. cannabini magnitudine, pone oculos a. duos processus coniformes, contortos, posterior sectio duos digitos est longa, atque alis crassis recta, cum anterior sectio glabra & solida testa tegatur, quæ & in cornu extenditur.

Tota a. anterior sectio cum cornib. capite & cruribus, atq; inferiore ventre, nigri & splendentis est coloris, & superius seu longum cornu, versus inferiora,

feriora, villosis pilis, obscure flavis sive luteis vestitur, ita ut ad tactum holosericum referat. Iunctura ad caput quoque villosa; crura a. & infimus venter brevioribus vestitur pilis obscure flavis. Alæ exteriores constant testa colore fructus olivar. cui obscure flavum admixtum, & variegantur sparsim punctulis fuscis. Cornua illa duo magna coniungere potest & illis aliquid tenere.

Marogr.
Hist. Bras.
l. 7. c. 10.

Congener Tauri volantis Brasiliensis, corpus habet bissectum, cuius anterior pars tertiam partem digiti longa, posterior paulo plus duob. digitis. Caput habet quasi quadratū & duos forcipes exsertos pro dentib. oculos magnos prominulos ellipticos: duos cirrhos ante oculos, in exortu latiusculos, hinc angustiores plus duob. digitis longos, novem juncturis constantes: crura sex, duo in anteriori sectione, quatuor in posteriori quodlibet duos digitos longum, trib. juncturis constantes, pedes latiusculos, & in extremitate duos ungues adūcos. Anterior sectio ad latera definit in quatuor aculeos, testa nimirum qua tegitur: posterior quatuor habet alas tenues, duabus testaceis testas. Totum corpus superius obscure est flavescens, seu lignei coloris; caput, oculi, cirrhi, forcipes, crura, inferius corpus splendide nigra & venter præterea cana lanugine obductus.

Marogr.
Hist. Bras.
l. 7. c. 8.

Hic Colophonem imponat *Tambirwa*, insectum testudinē terrestrem non male referens, mediocris avellanæ magnitudine; alæ, nimirum exteriores duæ testaceæ, figura ut clypeus testudinis: anterior sectio corporis testa coloris splendidi quasi aurum viridi colore tinctum transplēderet: in ambitu a. testæ coloris est splendentis instar rubro tincti. Duo cornicula ad quodlibet latus obliq. extensa. Crura habet sex nitentia ut aurum quod elegantissimo rubro transplēderet. Corpus inferius ejusdem splendoris. Tarde incedit nec facile a-volat.

Nieremb.
Hist. Nat.
Brot l. 13.
c. 20.

Facit denique quorundam Scarabæor. Indico. mentionem Nieremburgius; quorum cornua derafa, &

in aqua sumpta, venerem mirificè excitare ajunt.

CAPUT VI.

De Cantharide.

Nomen quod insectum istud apud Græcos habet, ap. Latinos quoque obtinuit. Variegata κατωιας dicitur, quod in modum testudinis compuncta, & variis maculis conspersa sit. Plinius omnes parvos scarabæos vocat.

Descriptio in Differentiis adferremus. Qui παχύλος eas describunt, alii vespa similem, sed corpore longiorem faciunt: alii vermem terrestrem, coloris viridis, auri colore superlucentem: nonnulli insectum oblongum parvum aurei coloris. Quidam denique animalculum parvum, varium, luteis lineis, quas in pennis transversas habet, promisso corpore, blattarum modo præpinguem.

Occurrunt in Italia & aliis regionibus, in quibus frumentis, rosas, fraxinis, & oleastris insident. Nec tamen omnia ubiq. genera occurrunt. Nam in Belgio, & ultra ejus ad Septentrionalem plagam provincias, ea quæ in frumento inveniuntur, reperiri, Aldrovandus negat.

Arborum foliis & fruticum quorundam floribus ut & frumento, vitant. Vnde καὶ ἀπὸ τῶν σιτηρῶν, Nicander meminit. Noctu in unum diem congregant, & mutuis auxiliis, formicar. instar, conservantur. Die per totum locum volare Vincentius prodidit. Ex putrescente humido & sicco, oriuntur, seu humore foliis insidente, in summis fraxini ramis, ficubus, pyris, pinis, populis, & Cynanthas. Ex erucis illarum arborum gigni, Aristoteles prodidit: & Plinius expressè. Cantharides nascuntur ex vermiculo in spongia, maximè cynorhodi, quæ fit in caule, sed fecundissimè in fraxino: cæteræ in alba rosa.

Coenunt tamen & quidem tardo motu generantque vermiculum. Perit ficus, si in ea prodierint. Picem liquidam referunt, gustu Cedrum,

Nomen

Description

Locus

Aldr. Hist.
Ins. l. 4. c. 4

Vitus.

Alia, H. &
l. 9. c. 39.

Generatio

Theophr. de
Caus. plan-
tar. l. 5. c. 13

Cedrum, ut Nicander prodidit, Calidissimæ sunt & siccissimæ. Ideo corpus adurunt, erodunt, & exulcerant.

Intervenena reponuntur, periiif-
seque illis assumptis, Caium Carbonem, Pyrrhum, tertiū ab eo qui cum Romanis bellum gessit, Cossinum it. amicitia Neronis notum, proditur. Adde & Abbatem illum, cui scortillum, ut in amore detineret, condimentum pulvere cātharidum aspersum apposuerat, ut apud Paræum habetur. Catoni denique Vticensi ob-

jectæ sunt, ceu venenum vendidisset in auctione regia, quod eas sestertiis LX, addiderat. Largius si bibantur, vel diutius extra hæreant, dolorem in visceribus qui ab ore ad penem extenditur excitant; vesicam ulcerant, penem & vicinas ei partes inflamment: sanguinis & carnis mictum; sæpè diarrhæam, dysenteriam, syncope, mentis alienationem etiam cōcitant. In ore sapor picis sentitur. In capite quidam & pedibus venenum hæreere judicant: negant alii. Variis malum impugnatur remediis. Lac humanum ab ubere sumptum, caprinum, bubulum, singulis horis exhibitum, clysteres ex jure pingui cum oleis emollientib. quos nitrum ex hydromelite non malè excipiet. Oleum liliorum, amygdalinum recens ex ovo forbili, Samium, ænanthinum, &

quā Lycus Neapolitanus pro antidoto posuit, portulaca, vehementer laudantur; Oleum verò cydoniorum certissima huius morbi Theriaca est. Nec fraudari suā laude debent, acetum scillicet, terra samia, lutum Armenium, quod vi emplastica erosionem prohibet. His quidam theriacam & Mithridatium, quæ tamen refrigerantibus & erosioni resistentib. doloremque levantib. castigari debent, adiiciunt. Nec vomitionum obliviscendum est. Ideo à Dioscoride imperantur.

Circumspectè in Medicina adhibeantur necesse est. Vesicæ enim ita sunt infestæ, ut quidam, manu duntaxat detentas, sanguineam urinam prolucere credant. Montagnana cer-

te cum alteri genuum applicatæ fuissent, quinque sanguinis per urinam libras eduxisse scribit. Cautè agetur, si mensuræ, medicamenti, & ægri habitæ fuerit ratio. Tria vel quatuor præbentur intus grana; exterius, majore copia opus est. Calidiores ægerimè ferunt; destituti virib. aut viscerum scirrho affecti planè non. Ipsæ cantharides, abiectis alis, capite & cauda à quibusdam exhibentur, quod & Hippocrati in usu. Audax qui has partes abiecto corpore adhibuit Medicus, mortis in uno & altero hydro-pico causa erat. Nonnullis tamen totis utuntur, quod & Galenus fecit. Alæ reliquor. remedium. Vnde Plinius. Alæ medentur, quibus dēmptris lethale est; nisi forte mutilatus sit locus. De cætero, ad urinam ciendam, lichenēs tollendos, verrucas, faciei pustulas, scabiem, podagram, metisium suppressionem, scæminarum sterilitatem, uteri strangulatus, quartanam, &c. adhibentur. Scapulis vel brachio appositæ potenter urinam provocant. Excoriatorium lichenum Pamphili, quo Romæ usus est, dum mentagra morbus grassaretur, Cantharidas recipit. In quartana telæ aranearum involutæ, de collo ægri suspenduntur. Reliqua in Aldrovando vide. Venerem excitare notorium est. In gravissima symptomata, & penis distentionem perpetuam incidunt, qui incautius propinatas hauserunt. Formulas passim apud Medicos invenies. Viperas si domi in vitro vase alere volueris, cantharidibus cibata. Suffitu stercoreis bubuli cum galbano, à frugibus depelluntur.

Mouset. in majores & exiguas distinguit. Maiorum alæ sunt, ut verbis eius utar, oblongo corpore crassæ, ex tritico collectæ, ac Blattarum more pingues, variæ aureis lineis, quas in penis transversas obtinent (atque hæc in medicina potissimæ habentur) alæ minutiores, macilentæ, latæ, pilosæ, interiores dictæ; & ad medicos usus inutiliores. Maiorum quoque non omnes ex viridi radiantes vidèris, sed alias item ex Xelampelino; inexplcabilis omnes splendoris, & colore oculis

Galen. l. de vict. rat. in acutis.

Galen. l. ii. Med. simpl.

Plin. H. N. l. ii. c. 31.

Differen-
tia.
Mouf. The-
atri Insect.
l. i. c. 20.

Nocu-
mentum.
Cic. ad. Pe-
rum l. 9.
Epist.
Plin. H. N.
l. 9. c. 4.

Plin. H. N.
l. 29. c. 4.

Galen. l. de
Ther. ad
Pison. de
Tem. l. 3. c. 3.
Nicand. in
alexiphar.

Plin. H. N.
l. 20. c. 13.

Plin. H. N.
l. 23. c. 2. &
4. l. 28. c. 10.

Vfus.

oculis gratissimo donatæ. *Parvum* genus Cantharidum Thomas Decatæus primus mihi communicavit; forma nonnihil & mole dispares videntur; sed virtute Cantharidea & ortu consentiunt. Harum (scil. minorum) *prima* corpore, & capite oblongo est, & forcipato, oculis nigerrimis prominentibus, antennis longis atque nigris, alis circa medios lumbos extuberantibus, quæ duobus punctis argenteis, & maculis paucis albis notantur: in Cicutaria herba per æstatem plerumque reperitur, pedes habet & crura, gracilia admodum atque longa, purpurascēte minio ornata. *Secunda* eiusdem cum prima coloris est, nisi quod antennæ oculique virides videntur. Caput huic exiguum, scapulæ globosæ, atque gibbosæ. *Tertia* caput & scapulæ confunduntur, coloris æruginosi, sed ocelluli picem referunt nigerrimam: alas habet capiti concolores, sed striis quibusdam aureis micantes: pedes item piceos & breves. *Quarta* tertiam æmulatur, sed herbaceo potius colore est, quam æruginoso; aliàs præter magnitudinem (quippe omnium minima est) non differt.

Aldrovandus quinque tabulis eadem repræsentat.

Prima tabula primo loco depingitur Cantharis è maximarum genere, colore viridi, atque aurum lucente in rosa aperta.

Secundo prolixiori corpore, lineis luteis, in capite, pectore ac dorso, antennis longiusculis ac nodosis, luteis, ut etiam pedib. in rosa ex eruca nata, in qua & *tertiam* reperi rotundo corpore nigro & piloso, violarum speciem existimo.

Quarto ac quinto loco est Cantharis rotunda seu Viola nigra prona & supina, obscuris in vaginis punctis albicantibus & rarioribus, in alvi vero parte prona quatuor lineis parvis & albis eiusdem generis, & ea est, quæ hanc sequitur, nisi quod punctula illa alba, quæ in priori rariora erant, magis sint frequentia & conspicua.

Septimo loco est araneus, quem exactius suo loco describemus.

Proxima huic cantharis oblonga capite ac pectore nigra, duabus antennis satis conspicuis, in extremitate pilulam habentibus, pedibus item nigris, vaginis rubro & nigro colore transversim maculatis.

Eadem sequenti pictura expansis alis ostenditur, ut alvus, quæ tota rubra est, exactè videri possit.

Decimo loco est Cantharis alia fusco colore, seu potius subcinereo ad obscurum tendente antennis longis.

Undecimo colore nigriore multo, antennis nonnihil nodosis & in fine obtusis.

Duodecimum locum negligenter Culex occupavit, longis alis & antennis, rubicundis pedibus.

Postremo est Cantharis tota viridis, & in vaginis colore mixto aureo, pedibus nigris.

Secunda tabula prima est viridis, antennis longiusculis, è mediocrium genere, oblongo corpore. *Secunda* inter minimas numeranda, tota cærulea. *Tertia* inter fabas reperta, prædicta paulò maior, tenuibus antennis, lineis in vaginis transversalibus nigris, reliquo corpore nigro. *Quarto & quinto numero* notatur Scarabæus $\chi\lambda\omega\rho\acute{\chi}\epsilon\upsilon\sigma$, sive colore viridi in supina parte, qui soli expositus aureum fulgorem edit, ut in alis quibusdam Cantharidibus, tamen inter Scarabæorum genera referendus; forte erit Scarabæus viridis Plinii, quem ait suo jucundo aspectu contuentium visum exacuere. Prona parte niger totus, antennis exiguis.

Sexta est Cantharis parva pectore nigro, antennisque exiguis, vaginis subaureis, recteq; ob parvitatem describi nequit. *Postrema* è Violarum, seu rotundarum Cantharidum specie, capite nigro & pectore, antennis longiusculis, vaginis rubris, pedibus in fine nonnihil divisis & rubris. Melancephalon appellavi.

In tertia tabula primo loco ostenditur Cantharis omnium minima cærulea. *Secundo* Longicolla dicta paulò minor Vespa, toto corpore nigro, rostro seu collo protenso, cui utrinque duæ insunt antennæ.

Tertio

Tertio minima colore aureo & viridi.

Quarto numero notata, est capite, antennis ac pedibus nigris, vaginis luteis, quibus sex nigra, rotundaque insunt punctula, bina superiori parte, quæ caput proximè contingunt, reliqua in parte extrema versus alvū per transversum ex ordine posita. Hanc *alia* sequitur latiori corpore atro, capite & pedibus lutescentibus vaginis obscurè, longiusculis antennis.

Sexto loco ponitur Musca viridis, antennis longis, inter Muscarum genera referenda.

Septimo & octavo duæ exiguæ, prior cœrulea tota, altera cinerea.

Octava oblonga corpore, capite, pectore, antennis ac pedibus nigris; vaginis rubris.

Nonus numerus significat convolvulum, ^{Græcis} Tagliadizzo vulgo apud Italos agricolas, corpore cœruleo, pedibus obscurè lutescentibus in vite repertum, ac folia ejus depopulantem; nascitur hic ex ovis Bombicum, ovis similibus magnitudine, colore rubicundis, hic cum parere vult, multa cumulat, convolvitq; folia (unde forte à Latinis id nominis datum) atque in his sua ova reponit.

Sequens numerus aliam ejus speciem cœruleam continet.

Duodecimus Cantharidem nigram duabus maculis fuscis, nigris in vaginis distinctam. Minima & è viridi aurea *decima tertia* est. Hanc sequitur nigra semicirculis mineaceis in crustis insignita. *Postrema* mineaceis vaginis, sed nigro maculatis, pedibus antennis, ac capite nigris.

Quæ in *quarta tabula* proponuntur, omnes ferè sunt cantharides rotundæ, violæ dictæ à nobis nomine & idiomate Italico, è quarum numero prima est lato corpore ac pedibus nigris, quos extendit in utraque latera cancri marini aut Paguri modo: capite nigro, antennis ejusdem coloris longis in fine obtusis, vaginis rubris, quatuor maculis nigris rotundis æquè à se invicem distantibus, quadratæ figuræ modo.

Secundo loco Culex idem, quem prima in tabula numero duodecimo exhibuimus, hunc eximere sumus veriti, ne notas numerorum atq; ordinem depictorum interturbarem, quemadmodum & cum, qui hunc ex ordine succedit, numero undecimo primæ tabulæ delineatum & ibidem descriptum.

Sequuntur *Coleoptera duo*, quorum primum fuscum corpore, alterum viride, & usque adeò exiguum, ut ad aliquod genus rectè referri non possit, nos inter Cantharides retulimus.

Sexto loco datur Viola colore rubra, maculis nigris insignita.

Septimo & octavo eadem, sed nigra utraque, quarum prior linea rubra cingitur.

Nonæ est ex prædictorum genere, rubro nigroque colore varia.

Alia decimo numero notatur rubra duobus punctis aspersa nigris.

Undecimo & duodecimo pectore sunt nigro albis punctis maculato, vaginis luteis, maculis nigris aspersis.

Quinta & ultima tabula quatuor continet violas, quarum *prima* est minima punctis albis ornata, *Secunda* magna, nigro & aureo varia, triangulo in lineas dissecto nigras, dorso pulchra. *Tertia* nigra quinque aureis notis ornata. *Ultima* exigua cinnabari colore tincta.

Est & in India genus Teocuilin cantharidum parvarum, rubricapitis, pectoris smaragdini, & reliqui corporis fulvidi. Ajunt, lepræ illitas, atque confricatas, mederi. Vivunt apud Hocitalpenfes: Est autem Teocuilin vermis igneus, & ab igne aut urente naturâ impostum est insecto huic nomen.

Nieremb.
lib. 13. c. 17.



CAPUT VII.

De Bupreste, & Ipe.

Nomen.

Veget. ve-
ter. l. 3. c. 15.

Quem Ardoinus Buprestem vocat, is Vegetio, *Vulpestris* & *Bulpestris*, Sylvatico, *Bustafaris*, *Bublistes*, & *Bubeftis* vocatur. Græcis βυπρεστις, Nicandro βυδαῖον, & βυβρωσι, dicitur: quanquam fortè hæc pro araneola illa ruberrima boves mordente sumi possit, quæ devorata eadem cum Bupresti Symptomata inferat. Bupresti verò, nomen βυπρεστις τοῦ πύρρως βύς, quod boves rumpat; seu βυπρεστις τοῦ πύρρως, quod incendat, impositum est. Primò enim per summam acrimoniam intestina inflammantur, mox tumor, febris, & tympanites ingruunt: tandem membranæ ruptis, crepunt pecudes mediæ.

Descriptio

Aldrov.
Hist. In-
sect. 4. c. 6.Moufet.
Theatr. In-
sect. l. 1. c. 19Moufet. l.
c. p. 142.

Difficulus describi potest. Nam & apud veteres altum de ea silicium. Scarabæo longipedi similem, & in Italia raram scripsit duntaxat Plinius; in Lybia frequentem Lucianus. Ideò nondum se veram Buprestem reperisse reliquit Aldrovandus. At Penninus veram se in agro Heidelbergensi invenisse gloriatur. Ex Cantharidum genere, esse dicit, quod & apud Galenum, Aëtium, Aeginetam, Phavorinum & Avicennam habemus, sed oblongiore corpore. *Elytrum* exterius aurum imitatur. *Caput* est parvum, *Orpatulum*, durum, robustum, forcipatum, dentatum: *Oculi* globosi & prominentes. Ex fronte duo oblonga & articulata cornua. *Venter* in longum productus. Bellonio in descriptione montis Athos, est bestiola aligera, Cantharidi similis, sed major, colore flavo seu luteo. Vifa & altera Buprestis vera, corpore paulò brevior, & circa ventrem latior; caudâ magis acuta; capite parvo, oculis prominentibus, ore hiatulo; & forcipatio; elytra secundum longitudinem striata, colore saturata gramineo, ex auro splendens, ut Moufetus habet. Addit idem, crura pro corporis mole longiuscula tantum sex

habere, (malè Grevinus & Mathiolus octo ponunt) eaque nigricantia; cornua prioris cornibus duplo minorâ & subtiliora, &c.

Locus.

Rarò in Italia reperiri scripsit Plinius: frequentior tamen nunc.

Vescitur muscis, erucis, lacertis, Vicus. lumbricis, & aliis insectis. Araneum etiam interficit. Morticina non tangit, & ubi se interfecit implevit, reliquum ad cavernas trahit. Nitrofi est saporis, fœtoris vix tolerandi. Venenum. Tam exquisiti veneni, ut infectas cõtagio herbas, pecudes, si, depascantur, intereant. Intus sumptum, corporis tumor, flatuum inter cutem & carnem copia, labiorum livor, sapor in ore virosus insequuntur: nè de urinæ suppressione, ventriculi & intestinorum dolore, quicquam dicam. Hinc benè capitis ejus propinatores tenentur.

Remedio sunt, aphronitrum cum aqua; lac muliebre è mammis affatim extractum; urina muliebris epota & vomitu reddita; pyrorum sylvestrium omnia genera; quæ tamen corpore tumido exhiberi non debent: Cantharidum alæ & pedes, si quibusdam credimus. Reliqua apud Dioscoridem vide. Bos vel equus si comederint, inflantur, stercora minutim & frequenter reddunt, & cibum averfantur. A cursu & venæ in palato sectione remedium. Quidam oleum naribus infundunt. Plura apud Aldrovandum habes.

Ælian. H.
A. 6. l. 35.
Remediũ.

Usum nihilominus in Medicina invenere, si Cantharidum instar præparentur. Dioscorides eas super cribrum ferventi cinere torret, Galenus aceto macerat, Hippocrates capita, alas, & pedes abiicit. Cum sevo hircino, septicâ vi, lichenas tollunt, ut Plinius prodidit. In desperatis mensibus, cum duplo ficus pulpæ, ab Hippocrate supponitur; ne deuteri scirrhus & suffocatione, aut molæ ejectione quicquam addam.

Quantum ad Differentias Moufetus duas Scaraboides describit, alteram ex auro virescentem, alteram ex flavo nigricantem. Illa priori major, alæ externæ auro saturato lineatim ducto

Galen. l. 1.
τὸ π.
cap. 1.
Differentiæ

ducto illitæ, & pauxillo viridi (verba ejus sunt) adumbratæ : Inter lineas umbones concavi, eleganter sculpti, assurgunt. *Alteram* à Jacobo Quickelbergio ex agro Viennensi accepit. Lonicerus, Cornarius, & Cordus propter foetoris magnitudinem Gemicem sylvestrem pro Bupreste sumferunt. Aldrovandus tres proponit. *Prima* in arvis deprehensa, rictu satis magno, coloris candidi, in interna parte serrato; supra cuius duo cornicula, quibus constat, aliud corpus habetur candidum similiter, in ipso rictu appendices illi quatuor breves, & pilosi, quibus videtur primum gustare cibum antequam in os sumat. Capite est obscurè viridi, item dorso, & vaginis, quarum utraque maculam habet rotundam, albamque. Antennis longis. Lineam quam utraq; vaginæ, cum in alvi medio conjunguntur, constituunt, ænei coloris, sub alis viridis, ut elegantiorum colorem vix intueri quispiam posset, pedibus longiusculis pilosis, colore non semper uno, sed prout soli obvertuntur, ita nunc colorem viridem, nunc æneum referentibus, plus tamen ænei participantibus. Color qui supina est parte nullum colorem de se fundit : in parte pronâ omnia eleganter micare conspiciuntur. *Secunda* superiori similis, colore tamen differt, qui in toto (exceptis pedibus, qui flavi sunt) niger est, & hæc quoque in arvis reperta. *Tertia* est Jacobi Grævini, quam quatuor pedibus ab utroque latere depinxit, colore viridi. Similem depinxit Matthiolus in suis ad Dioscoridem Commentarijs. Sed cum ibidem eam non describat, dubito num eam velit esse Cantharidem, quibus in Medicina utendum est, an Buprestem.

Ips Plauto est *involutulus*, Italis rusticis *Tagliadizzo*. Proprium ejus in vitibus versari, easque ut & cornua arrodere. Hinc ab *ἰσσω*, id est *βλάσσω* noceo, nomen accepit. Qui Serpentis genus esse putant, ab Hermo-lao redarguuntur.

* *

CAPUT VIII.

De Cucujo.

Insectum Indis familiare Cucujus, seu Coccojus, & ex Scarabæorum genere esse videtur. Septuplo cicindela nostrate volante major est, digiti minimi crassitudine, duarum unciarum longitudine. Haud pauci cervinos scarabæos æquant. Vespertilionibus paulò minores ex Petro Martyre Nierembergii dicitur. *Corpus* duodecim incisuris ornatur, ex cinereo parum nigricans. *Caput* est longum, cuius anteriori parti nigra superius quasi in medio, triangularis macula insidet; breves antennæ; *Oculi* grandes, juxta cornicula prominuli & nigri, prope os locantur; reliquum caput coloris est spadicei ferè, exceptis duob. clavis propè *collum* aureis, è quibus *radij* splendentes, in volatu præsertim, atque alis expansis, insigni fulgore exeunt. *Pedes* sex nigri à corpore exeunt. *Elytra* quibus alæ reguntur, colore ferè castaneo videntur. Icones ex Moufeto apposui. Hic, à Candido, pictore peritissimo, qui eas in Hispaniola & Virginia, observavit, accepit.

Lucere nocturno nemo dubitat: quæ parte non convenit. Oculis duntaxat radiare quidam prodidere. Unde Moufeto *κεφαλόλαμπς*, dicitur. Quatuor lucidissima specula habere, Nierembergii; in oculorum sede duo, in ilibus sub vagina latètia duo: quæ tunc ostendit, quando more scarabæi evaginatis tenuibus alis, ærem captat. Navigatores oculis & clunibus eandem adscribunt. Alii visceribus & cuti ventris diaphanæ. Nullum aliud olim Indis sive domi sive foris lumen. Noctu gradiuntur duobus ad pollicem pedis allegatis: gestant & manu unum, dum *Vias*, seu cuniculorum genus murem magnitudine superans, venantur. Tantum id, ut quivis in cubiculo legere, scribere, & necessaria peragere possit. Imminuitur, dum fatiscunt: post

mortem, evanescit. Quare vix credi potest, formari ex eo pastam, quæ ad faciem & pectus attrita, lucere ea faciat. Candisio & Dudlejo, cum ad Indiæ littora appulissent, imposuisse Moufetus ex itinerariis Anglorum author est.

Captura.

Nieremb.
H. N. 13. c. 3

Quomodo capiantur, & culices, quorum gratiâ captura instituitur, capient, Nierembergius ex Martyre perdidit. Primo noctis crepusculo exit domo cucujorum indigus, titionem manu gestat ignitum, tumulum unde queat a cucuijs prospici, ascendit vicinum, elatis vocib. cucujum appellando, circumrotat titionem, cucuje, cucuje inclamitando, aërem obtundit. Ad vocantis reboatum simplices putant nonnulli, cucujos, eo delectatos strepitu, convolare veniunt namque properanti ac præcipiti accessu. Ego vero accurrere arbitror ad titionis fulgorem cucujos, quod ad lucem quamcunq; agmina culicum advolent, quibus cucuij vescuntur in aëre ipso, uti cipfelli & hirundines. En cucujorum numerum optatum, titionem venator manu projicit. Titionem aliquando sequitur cucujus aliquis, & solo se dimittit: captus facilis tunc est: uti scarabæum ambulantem vaginâ clausâ, licet viatoribus si quis eo indigeret, carpere. Negant alii hoc pacto solere capi cucujos, imo aiunt paratos habere venatores frondosos maximè ramos aut latâ lineam, quibus alto circumvolantem percutiunt cucujum, in terramq; impellunt, ubi jacens torpescit, & capi se patitur; vel, ut alii dicunt, secuti volucris lapsum frondoso eodem ramo, vel linteo projecto super eum, prædâ assequuntur. Ut cumque sit, venator venatore cucujo apprehenso, domum revertitur. Ostiolo domus clauso, prædâ solvit. Totam circuit præcipite volatu domum quaritando cucujus culices, sub lectis pensilibus, & circum facies dormientium, quas implere culices assueverunt. Custodum officio, ut quiescere queant inclusi, fungi videntur.

Moufet, l.c.

Sunt & aliæ ibidem bestiolæ, volantes quæ noctu lucent, sed nostris

multo majores, & lucem etiam majorem emittentes. Lucent enim adeo clarè, ut qui itinera constituunt, capitibus & pedibus, has cicindelas arte quadam pendulas vivas figant. Sic enim de longinquo oculis facile percipiuntur, & ideo rei veritatem ignorantes attonitos reddunt. Mulieres non alia luce ad negotia sua peragenda in ædibus noctu utuntur.

CAPUT IX.

De Cicindela.

PLura hoc insectum tam apud Græcos quam apud Latinos accepit nomina. Græcis enim dicitur λαμπρὴς, Aldr. Hist. λαμπρὴς, πυρολαμπρὴς, & κισσολαμπρὴς. Aristoteli βόσρυχον, Suidæ πυρολαμπρὴς, Hesychio πυρολαμπρὴς: vel potius πυρολαμπρὴς, igniclonis & luciclonis. Aliis λαμπροδὼν, & Σπίντης metaphoricè, μυκήτης Aristophanis quidam Cicindelas exponunt. Male φάλανα dicitur, κἀθαρὴς verò vocabulum mari competit. Apud Latinos invenies appellari *Cicindelam* & *Cicindelā*, quod candorem cieat, *Noctilucam*, *Nitidulam*, *Nocturnigilā*, *Lucionem*, *Luculā*, *Luciolam*, *Flammidem*, *Venerem*. (Levinus vetustissimus author, sic vocavit,) *Lucernutā*, *Incendulā*, ut ex Cicerone, Plinio, Scopā, Agricola, Varone, Festo, Plauto, Scaligero, Turnebo, & aliis videre est.

Descriptionē in Differentiis vide. Nul-
libi in hyeme apparēt. Mensib. Aprilis, Maii, Junii, & autumnō, quo rarò volant, in pratis vesperi cernuntur. Plinius, ideo, ante matura pabula aut post discessum conspicuas dixit.

De Generatione dissentiunt authores. Baptista Porta è rore nasci putat: apud Hesychium aliquid de stupa φρύγανα legitur. Crediderim locum generationis innuī. Arist. non volantes, ex erucis non magnis, densis, nigris, hirsutis procreari scripsit: ex his pennatas, oriri. An βόσρυχον dicatur, & utrum hæc ex pennatis oriantur, non facile dixerim. Ephesius sanè Græcus, τὰς βόσρυχας à cicindelis prodire, & rusticis *Ciccās* ac *Platas* vocari (Ricinos Niphus vertit) reliquit. Cardan⁹ ex genere Crabronum oriri voluit. Primus Scaliger, Ex. 191. fœmi-

Nomen.

Aldr. Hist. de Insectis. 4. c. 8.

Locus.

Generatio
Porta Phys. 109. 6. c. 3.

Arist. H. A. 5. c. 19.

Moufet. Theatr. Insect. 1. c. 15.

Scaliger. Ex. 191.

fœminā cū suo mare in coitu deprehendit. Mas, ne contactus quidē destitit: postero die in meridie solutus obiit. Ab ea hora sub vesperam usq; multa ova edidit fœmella: quæ intra viginti horas vivificata abiere. Idem Guil. Bruerus Anglus observavit, ut apud Moufetū habetur. In eo à Scalig. erratum, q; ova benè nō observaverit. Aristotelis opinioni Merula favet. Observavit is vermes noctu splendentes pilosos, tā in forō Lebetiorum in fossis herbis & aquis carentibus; q̃ in lacunis circa Viglevanum, quod veteres Vergeminum appellabant. Diu in coitu hærere, solutas parere citò, Aristoteles, tradit.

Ad Naturam ipsarum pertinet, noctu lucere; quod tamen non omnibus competit. Mares n. in Vasconia, teste Scalig. non lucent, sed fœminæ quæ vermes. In Italia & agro Heydelbergensi fœminæ omnes sunt ἀλάμπες mares lucigeri. Exit utrinq; à lateribus & clunib. fulgor, si hient & efferantur: Cōpressis tota lux obscuratur. Fulgorē igni similem alarum cōpressu tegi, secumq; lucem & noctem habere, dixit Plin. Non ante crepusculum vespertinum conspici, hinc Plinio, stellantes volatus, & terrestres stellas, apud Politianū habemus. Innoxie sunt: nec morsu nec punctione impetunt. Ad candelas frequenter & avidè advolare, prodidere nonnulli.

Liquorem ex Cicindelis fieri posse, seu ipsis per se sumptis, seu cum ligno salicis putrido, felle canis & albumine ovi commistis, qui nocture splendeat, docuit Vitalis, & Cardan². Quomodo destillari debeat, Weckerus & Mizaldus. Ridet hæc Scaliger, & lucē hosce de cœlo deductā, in materia, tanquam in tritemem capтивum remigem imponere, atque in cæteris habere velle videri, tam verè quàm facete, ait. Sanè, bestiola mortua, aliquot post hōris, pars illa albidā, ac in tenebris splens, lucem omnem amittit. Vitro lucido cum gramine inclusas impenne, lucem per duodecim dies de se largiri, si recens semper injiciatur gramen, ipsæ

libero fruantur aëre, cōcedere Moufetus videtur: Sed illam fatiscentibus imminui, mortuis planè evanescere addit. Quid Ardenus Anglus fecerit, apud eundem vide.

Duplices sunt, pennatæ nempe, & impenne: quarum istæ, adeò clarum noctu splendorem emittunt, ut ad illud majusculæ literæ legi possint. Utrasq; in *Masculos* & *Fæmellas* Moufetus distinguit. *Masculus* (verba ejus sunt) animalculum est pusillum, volucre, quatuor alis, quarum exteriores coriaceæ, interiores membranæ, colore argenteo, translucentæ. Corpore est oblongo parum cōpressioet latiusculo, quinq; incisuris prædito, ut pro lubitu extendi & contrahi possit. Corpus extensum, alis longius videtur; contractum brevius: Caput latum, fuscum, compressum ad cuculli formam fabricatum. Cornicula duo è media fronte tanquam ex uno centro exeunt, juxta quæ antè caput parum extuberat. Non procul ab antennarum exortu minutissimus utrinque globulus niger apparet, Gagatis splendore nitidus, qui oculorum vicem supplet.

Caput collo corporique brevissimo coniunctum est, colore ex fusco nigricante: pedes sex pectori juxta caput affixi, quorum posteriores & crura, juxta subluteo sunt colore, reliquæ pedum partes nigricant. Tardius & gressu quasi composito prorepat; pectus parum extuberat; corpus juxta incisuras albicat, juxta caudam duas habet maculas; utrinque unam, ad lunæ crescentis formam: ex quibus noctu splendor emicat pellucidus, sulphuris accensi æmulus, ut scintillas lucidissimas per aërem volare crederes: hîc nunquam in Anglia apparet, vel saltem si hic degat, non tamen lucet. Cicindela Europæa fœmina, tardigradum est animalculum, alis carens, duos plerumque digitos transversos longa, (licet in Vasconia longè maiores longioresq; luctartas ibidem dictas vidit Josephus Scaliger) erucæ magnitudinis mediocris, cui ferè est similis.

O 3 Caput

Differētiæ.

Moufet.
Theatri
Insect. 1. c. 35

Merula
ebf. 3. c. 61.

Arist. l. de
gener. c. ult.

Scalig. Ex.
194. Mon.
fer. l. 5.

Plin. H. N.
18. c. 28.

Ufus.

Aldrov. H.
Insect. 4.
c. 3.

Caput illi parvum, compressum, durum, nigrum, oblongum, & os versus acuminatum: è cuius extremitate duæ exeunt antennæ, breves nigræ. Sex habet pedes, parvos, nigros, tribus articulis distinctos, juxta caput, erucarum ferè modo. Corpus oblongum crassiusculum, tæniæ instar compressum, duodecim incisuris profundioribus præditum, præter collum quod pro arbitrio nunc exerit, nunc laceffit, retrahit & abscondit: partes intermedia nigricantium laminarum sese ingressu elevantium faciem obtinèt. Per dorsum linea admodum exilis & parum candicàs à capite ad caudam usque decurrit. Lateralia ventris ex xelampelino suave rubent. Cauda atque venter juxta caudam albicant. Uropygium tamen ipsum nigrum est. Cujus beneficio & nisu sese attollens arenatim repit, & furculis inde enatis sese pendulam affigit, sub hoc Uropygio excrementum ab alvo reddit subviscidum & filosum, mellis æmulum, quod caudæ furculis ad os reductum, denuò absorbet, staminaque exinde retrocedens fingere videtur lentoris prodiga, quæ secunde devorat, eorumque revomitione & resorbitione sese sustentat. Partes albæ in tenebris mirabili splendore fulgent, & stellas quasdam terrestres repræsentant: adeò ut cum lucernis lunaque de lumine certare videantur. Hoc observatione dignum; clarissimum istum splendorem una cum spiritu vitali prorsus evanescere, ubi ergò perpetua illa lux, de qua nonnulli putidi Paraphysici tam ineptè imprudenterque garriunt? In arvis sæpius pennatas, quandoque verò intra opidorum mænia per plateas volitantes vidimus.

Aldrovand.
Hist. In-
sect. p. 6. 8.

Aldrovandus quoque aliquot species nobis exhibuit, de quibus ita loquitur. Insectum hoc, quod *primâ tabulâ* Erucae ferè simile, in sepium fovea repertum Lampyridem ἀνέρον esse judico, cum, & ipsum proprio suo lumine in fovea latens noctu proditum fuerit, tinea est instar compressum, pollicem ferè longum, sex pedibus anteriori parte instructum, nullis

posteriore. Capitulum nigrum quatuor cirris tanquam corniculis Limacis instar munitum collo albo, quod ad libitum modo exerebat, modo contraherebat, præsertim laceffitum sub primæ incisuræ lamellam tanquam galeam caput contegentem. Compactum enim est segmentis duodecim, sibi mutuo imbricatis succedentibus, ac se subeuntibus laminarum instar dorso æqualibus, ac compressis nigris, quæ tamen singula ad latera puncto utrique notata purpureo. Pedibus, inquam, senis oblongiusculis, & trium articulorum: stans, & caudam trahens dracunculi quodammodo speciem præbet. Cum verò his pedibus anticis progreditur, caudam sub ventrem inflectens & antrorsum complicans postica parte arcuatim repit. Nam & cauda pedum eorum vicem subit, qui in posteriori parte in veris Erucis existunt. Hanc enim candidam, & tricuspidem promit, quæ posticam corporis partem inter serpendum sustinet, & cuilibet rei utraque affixæ adhærescit pendula. Prima & antica segmina longiora sunt, breviora verò versus caudam vergentia, & medio latissimum corpus paulatim in caudæ penicillatum mucronem attenuatur. Alvo extrema egerit excrementum quoddam lentum, ac ceræ in modum fulvum, quod ipsum nonnunquam cauda ad os adducta in circulum ceu vertitur, contractum ori admoveat, quo tamen etiâ similem liquorem vomere videtur, ac veluti filo facto, retrocedit, illud diducit, ac protrahit lentore sequax, deinde denuò absorbet. Parte prona modicè nigrescens diluta purpura qualis Persici florum est, admixta variat. Qui purpureus huic est macularum color, in quibusdam magis lutescit. Julius Scaliger in Vasconia sine alis Cicindelas esse scribit, Erucae majoris quantitate, crassiores, vetricosas, Lucrambam ibi vocari. Ex harum grege ea forte erit quam secunda tabella pronam, & supinam ostendo, una cum Lampyride alata.

CAPUT X.

De Blattis.

Nomen. Blattarum nomine, non tantum vermes quæ in auribus & alvearibus nascuntur, Phalænæ dictæ veniunt: sed & p. grani in ilice humili nascentes vermes; nec non farinarii. His illi intelliguntur, quos *ჭიჭას*, & *ტილას* Græci, Itali *Platellas* aut *Buccaroni* vocare. Nec audiendus est Hermolaus, qui *καρβυς* & *παρακαρβείδας*, blattas vertit.

Description & alia. Insectum est lucifugum, scarabeo simile, sed elytro carens. Plura in Differentiis occurrunt. De *Ortu* non constat. Alii ex vermibus & erucis provenire credunt: quidam, ut Cardanus ex ligno. Omnes senecturem exuere, Aristoteles & Plinius restantur. Mares majores, & omnes alati esse creduntur: foeminae ventricosæ, & alis destitui.

Ufus. Faciunt contra furditatem & aurium dolorem, si duodecim alis abjectis, in vini veteris & mellis ana uncia una semis, cum malicorio uno, pomi succi sesquicyatho, coquantur; post terantur, & tritis unguentum Syriacum, pix liquida, & succus è quatuor cepis expressus, adjiciantur. Fugantur herbâ blattaria dictâ; vervecis recenter macerati ventriculo, ex consilio Diophanis, si is in loco in quo versantur, deponatur; oleo denique spicæ, si eo inungantur: & hoc laudatissimum est.

Differentiæ. Tres Blattarum sunt species, *Mollis*, *molendinaria*, & *fetida*, cui *Pernan* addere possumus. *Mollium*, mares omnes alati, & minores: foeminae, magis ventricosæ, & alis destitutæ. Caput habet parvum, unde duo cornicula, prælonga, & in quamcunque partem mobilia exeunt. Pectus unâ cum scapulis orbiculare, cum septem incisuris. Alæ corpori concolores: Cauda bifurca & forpiculata: pedes sex. Visâ Petropoli in templo, vulgari sextuplo major, sanguinem venantibus eliciens. Visâ & in Philipponaviâ Draco capta, molliores no-

stris, coloreque magis fusco. Cursu omnes valent: & struthiocameli instar, currunt magis quàm volant. *Arist. H. A. 8. c. 17.* Latrinarum & balneorum incolæ. In oleo decoctas, verrucis efficaciter illiniri, experientia testatur. *Σιτοφάγης* dixere quidam, quod farina vescantur. Dioscorides *ἐν ἀρτοκρηταῖς ἐνερσιονένας* dixit. *Molendinaria*, Græcis *μυλωνῆς*, *μυλωνῆς*, *μυλαβείς*, *μυλαίς*, & *ἀρτοκρητῶν*, ita à Mousetō describitur. *Fœminâ*, nifallor, vidi, quia alis caruit: vulgari illa molli longiorem, crassiorē, & cum majore splendore nigriorem, os forcipatum illi, parvum, quasi sub ventre positum, antennas habet primæ similes, oculos item exiguos concavos, vel potius oculorum signa atque vestigia. Pectori penè quadrangulari quatuor primi pedes affiguntur, posteriores ventri: supra scapulas alarum quasi rudimenta cōspiciuntur, alæ tamen dici nō debent; corpus reliquum crassiusculū, variè orbiculis incisum, quos si à latere intuearis ferram referunt. Caudæ apex & furca utrinque una innascens, ad tridentis formam accedunt; stabulantur istæ Blattæ in locis tepidioribus, pistrinis & vaporariis. Vix magna in fame lucem ferunt: vel si victus quærendi gratia in apricum procedere coguntur, celeri cursu ad tenebras recurrunt, vel pulvere sese te-
gentes, venatores fallunt.

Μυλωνῆς Polluci est insectum, magnitudine Cicadæ, colore exalbido, quod farina in molertrinis vescitur. *Σίλφην* appellatum, Stephanus addit.

Fetida, Græcis *ჭიჭη βδέα* & *βδέσζα* dicitur. Plinius, acuta clune facit: recentioribus scarabæos pillulares, abscissa cauda, graphicè representat. Nigerrima est, *ἀπέρθε*, etsi alatam & elytro rectam crederes, ore bifurco, cruribus longiusculis & gracilibus. Nocte lentissimo gradu prorepat: profundis in cellis habitat: lucem fugit, & fœtore universam viciniam inficit. Vix tanè marem in hoc genere alatum inveneris. A quibusdam cum Cimice confunditur. Datur & alia ejus species in Hungaria, Gryllo similis. In aggeribus & apricis invenitur. Di-

rum

rum quid dū volat strepit. Hyeme lucis socia, quam fugit æstate. Tempore pestis, ceu arcanum gestatur, imò à quibusdam deglutitur. Frequentiores, ubi vina generosa nascuntur, invenias. Pinguitudinem, si caput avelatur, cum rosaceo tritam, aurib. mirificè prodesse, scribit Galenus : sed lanam paulò post extrahendam; cum pissellæo ulcera sanare traditur. *Poruane*, Aranets dictæ, gryllorum sunt magnitudine, & gregatim noctu volitant, omnem ferè mollem supellectilem ambedentes. Melius fortè inter gryllos recensueris. Aldrovandus unam, pronam & supinam, colore fusco; pedibus tamen & antennis paulò plus rubentibus, quam corpus reliquum.

CAPUT XI.

De Forficula.

*Monfetus
Theatri
Inf. 1. c. 27.*

ARnoldi *Forficula*, Latinis recentioribus *Auricularia*, Priscis *Mordella* dicitur. Niphus *Velliculam* appellat à Vellicando. Gallis *Aureilliez* vel *Perceauraille*, Germanis *Ohrenwurm*. Belgis *Orenvuetel*. Anglis *Earewig*. Hadrianus Junius *Fullonem* esse existimat, quum ramen à Scarabæi forma multum differat. An hæc Græcorum *ὀφροδάκτυλον*? Sane & ortus ratio, & morsus conspirant; nam & hæc generatur in caulibus herbarum fistulosis (utpotè Pastinacæ sylvestris, Angelicæ, Ferulæ) & in Brassica frequēs conspicitur. Boreales Angli obsceno nomine *Tuничбаллок* nominant, quasi *Scortimordium* vocaveris, vel *ὀφροδάκτυλον*; nam ubicunque rugosam plicatamque cutem invenerit, vel ore mordendo, vel cauda bifurca stringendo, maximum dolorem excitat, quod semel nobis pueris accidit inquit Pennius.

In duas auriculariæ species incidimus; utraq; volucris erat, cōtra multorum opinionem. Nam si eas in loco aliquo tabulave inclusas, scyrpohuc & illuc repuleris quod Illustrissimus Knivettus Pennium docuit, ex-

pansis continuo alis, quæ sub elytris conduntur, avolat. Sed diligenter cavendum, ne festuca aut scyrpōdurius prematur, aut vulneretur; tunc enim si velit maxime, avolare minime possit. Vulgatio corpore spadiceo cernitur. Antennæ, pedes, caudæq; forficularia, flavescent. Altera (quæ in Angliâ rarior & semel atque iterum duntaxat à nobis visa) vulgatiore major est, corpore nigricantiore, collum, argenteus quidam torques adornat: extrema elytra subpunicum referunt colorem; os forcipatum habet & flavum. In dorso utrinque juxta latera quinque macule fusillæ oriuntur, caudæ furca brevis est & nigra, qua versus caput sublata per aërem irata provolat.

Reperiuntur sepè in Brassicis & ferulaceis arboribus, ulmiq; foliorum tuberculis. Ex vermibus in caulibus ortis generantur: pellem quotannis veterem exuunt, quæ spoliata nivea videntur. Sed cum ætate renascitur pristinoq; colore imbuitur. Anglicæ mulieres maximo eas odio habet ob garyophyllati flores depastos, atq; exesos, insidiasq; struunt hoc modo: extimis arcis bacillo in terram defixo ungulas bovinas, suillas, vel veteramenta cava supponunt pannis vel stramine leviter infarcta: quæ dum per noctem (pluviæ vitandæ animo, & tegumenti causa) Forficulæ intraverint, manè veteramenti subito ablati atq; excussis, magnus earum numerus excidit, atq; ita pedibus contrita diem obeunt. Arnoldus eas in oleo communi vel flammulæ coqui consulit: eoque convulsorum arterias, tam in temporibus quam carpo inungi, ut febris convulsionis medella inducatur. *Iosephus Michaelis Halus*, Medicus non incelebris, magnum earum numerum colligere solebat, ac in vitro arctissime clauso per balneum in pulverem tenuissimum redigere. Tunc urinæ leporis tantum admiscebat, ut in aurem infundi manè vespertiq; possit. Arcanum hoc esse in surditate pellenda sæpius protestabatur Pennio. Alii pulverem cum oleo garyophylli miscent, atque adhibent

*Breviar. 1.
cap. 25.*

bent ut supra. Gallinago minor (Sni-
te ab Anglis dicitur) & gallinæ, auri-
culariis vescuntur: maximumque ha-
rum omnium numerum in ventricu-
lis earum reperisse, me fat memini.

CAP. XII.

De Scorpio, Formica, & Pe-
diculis alatis.

SCorpiones alatos dari, negavit A-
ristoteles, Apollodorus teste Plin-
io, Pausanias, Nicæder, Aelianus &
Strabo asseruere. Sane homo Phryx
alatum in Joniam attulit. Psylli eos-
dem in Italiâ importare conati sunt.
Latinis *Nepales* quasi *ncpæ* alata dici
possent. Colore sunt melleo, unde
μελιχλωροι dicuntur. Flammeos Aelia-
nus facit. Summæ caudæ niger nodus
est, duplici prædatus aculeo. Septino-
dem Strabo facit. Alæ locustæ Malaci
similes. Magnitudo vulgaris. Repe-
riuntur in India apud Prasios, in Aeg-
ypto, Palimbrotæ, &c. Intra Siculi
cœli regionem non vivunt: in Italia
sunt innocui. In Joniam allatos supra
diximus. Communis his cum impen-
nibus generatio: venenum calidū est.
Lacertas, araneos, & omne genus ser-
pentum enecant. Suo vulnere appli-
cati medentur: & si exusti nidor ad al-
ios scorprios pervenerit, ædib. exigit.

De Formicis alatis, quæ Aristoteli, ut
Mousetus vult *ιππομύρμηκες* & *ιπποεις*,
hæc pauca adiicimus. nempe *νύμφας*
& *σέρφας* quibusdam appellari: vulga-
rib. corpore & lacertis esse majores,
& inter nigrū furvūq; medias: qua-
tuor alas argento perlitas, externas
majores & longiores toto corpore;
internas duplo minores habere. Quæ
de Indicis, vulpib. non minorib. auri
indefessis custodibus, & quarum pel-

les quasi pantherinas se vidisse Onc-
sicitus scribit; & cornua Erythris in
æde Herculis miraculo fuisse, Plin.
produntur, mendacia sunt. Plura
capite de formicis vide.

De Pediculis alatis ista habet Mou-
setus. Agatharchides author est, à
maris rubri incolis non multū distare
Acridophagos, sive locustarum esor-
es, quæ quidē gens staturæ aliis bre-
vioris, aspectu macilens, ac supra mo-
dum nigra. Sub æquinoctium vernū,
quando apud Italos Africi & Zephy-
ri spirant, ex loco quodam incognito,
ineffabilis magnarum locustarū mul-
tudo una cū illis ventis ad ipsos pro-
vehitur, quæ ab avib. volandi facul-
tate parum, at corpore longè diffe-
runt. Ab hoc animalium genere toto
tempore nutriuntur, iis salitis atq; al-
io modo paratis vescentes. Venan-
tur a. ipsas fumo ex aëre in terram de-
jicientes atq; hi agilitate quidem &
velocitate pedum pollere dicuntur.
Sed quum valdè siccum nutrimentum
capiant ultra quadragesimū annum
vitam minimè producant, imò vita
sanè miseriorem mortem obeunt. Si-
quidem appropinquante senectute,
eorum corporib. alata quædam pedi-
culorum genera innascuntur, figurâ
quidem caninis muscis similia, sed
alioquin minorum. Incipiunt à pe-
ctore ac vêtre, breviq; universam fa-
ciei cutem depascuntur. Atq; horum
alii scabiosorum instar afficiuntur,
deinde semetipsos graviter dilace-
rant, tandemq; morbo consistente,
nec non cum bestiolarum exortu te-
nuibus effusis humoribus, intolera-
biles cruciatus subire miseri cogun-
tur: sicq; vel ob succos, vel ob ali-
mentum, vel ob aëris pravi-
tatem intereunt.

* *



HISTORIÆ NATURALIS

DE

I N S E C T I S

LIBER II.

De Insectis terrestribus pedatis non alatis.

TITULUS I.

De Paucipedibus.

CAPUT I.

De Insectis sex pedum.

ARTICULUS I.

De Formica.



ANTUM DE INSECTIS terrestribus alatis sufficiant: sequuntur non alata, eaque vel

Paucipeda, vel *Multipeda*. Illa sunt pedum sex,

octo, duodecē quatuordecem. *Sepeda* sunt, *Formica*, *Cimex*, *Pediculus*, *Ricinus*, *Pulex*, *Lens*, *Forbicina*, *Talpa*, *Sphondyle*, *Staphylinus*, *Asellus arvensis* & *Anthrenus*.

Nomen,

Incipio à *Formica* stupendæ naturæ insecto, & ad quod hominum genus obstupefcat & confundatur. A ferendis farris micis Latinis dictas, Isidorus opinatur. Græcis *μύρμηξ* est, *μύρμηξ*, & Doribus *μύρμηξ*, quib. etiam *μυρμηδὼνας*, *μύρμηκας* vocari, Hesychius scribit.

Descriptio

Plin. H. N.
11. c. 37.
Votton. de
Different.
Animal.
c. 210.

Notissimum animalculum describere, superfluum est. Promuscidem ore contentam gerunt. Plinius ipsis linguam tribuit; Vottonus dentes; addit, parte posteriore aculeum gerere. Nulli in capite propter parvitatem oculi: super quædam addita-

menta quæ ceu duo pili de capite egrediuntur, habentur. Alas fenes, nec diu supervicturæ emittunt.


In quibus degant locis, nemo est, Locus. qui ignoret. In acervis, quos congestere condi, notum omnibus.

Frugum granis vescuntur, unde Victus. *frugilegæ*, & *agmina granifera* dicuntur. Cupressi & papaveris femina, expectere, apud Plinium & Plautum habemus. Plin. H. N. 17. c. 10. Plautus i. Trinum. Fructus exsugunt, nec à mortuis anguib. abstinent. Cadaveribus, humanis fortè parcere, Aelianus prodidit. Alij frugibus, si menstruo sanguine polluantur.

Hyberno quoque tempore coire, Generatio & serenis austrinisque diebus nasci, Arist. H. 1. 5. c. 9. Plin. H. N. 13. c. 30. Aristoteles prodidit: vermiculum ovivis similem, vere gignere, Plinius. Oblonga illa, & columnatæ figuræ, in locis calidis & muscidis, extra corpus, incrementum accipiunt, si Alberto credimus: vermes ipsi albi, & paniculis involuti erumpunt. In America ex mortui parentis corpore prodire dicuntur: miroq; modo vivunt, donec ex subterraneis specubus alati evolent.

De Ingenio, ita eleganter Plinius. Plin. H. N. 11. c. 30. Natura, & Ingenium *si quis comparet onera corporib. earum, fateatur nullis portione vires esse majores. Gerunt ea morsu. Majora aversa postremis pedibus moliuntur, humeris obnixæ. Et iis Reip. ratio, memoria, cura. Semina arrosa condunt, ne rursus in fruges exeant è terra. Majora ad introitum dividunt. Madefacta imbre, proferunt atq; siccant.*

Ope-





Operantur & noctu, plena Luna. Eadem interlunio cessant. Iam in opere qui labor? Et quoniam ex diverso convehunt, altera alterius signara, certi dies, ad recognitionem mutuam, nundinis dantur. Quæ tunc earum concursatio? quàm diligens cum obviis quadam collocutio atque percontatio? Silices itinere earum attritas videmus, & in opere semitam factam, ne quis dubitet, qualibet in re, quid possit, quantulacunque assiduitas. Sepe liuntur inter se viventium sole, præter hominem, defunctosq; in granorum folliculis efferunt. Hieronymus, alias herbarum quædam semina forcipe oris traxisse: alias humum de foveis egressisse, & aquarum meatus aggeribus exclusisse, vidit. Quædam venturæ hyemis memores, ne madefacta humus, in herbam horrea verteret, illata semina præcidebāt: quodque magis mirum est, in tāto agmine, non obtabat egrediens intrāti: quin potius si quam vidissent sub fasce, & onere concidisse, suppositis humeris adjuvabant. Aelianus, ad pabulādum profectas, natu grādiore agmen ducere, segentes ascendere, spicas abscessas deicere dicit. Natu minores sub stipulāstant, spicas distrahunt, & grana vaginis inclusa explicant. Interlunium sentire apud Plinium habemus. Alvi onus, quod urinę simile, in ædibus non ponere; ubi per cenum facto itinere, maculosæ redeunt, in ipso ædium vestibulo, ad asperum sese corticem eliminare; recentiora ova in ulnis gestare, ubi ad amplitudinem eam devenere, ut laborem remorari possent, alto sinu deponere, ab aliis observatum est. Exclusis, fœtum ad laborem instruunt: denegatur tardioribus cibis. Hinc sœtutem, ut robustiores, unguiculis, ore, rostellis, terram egerant, egestam accumularent, cumulatam stipulis interspergant: sapientiores ædificant; minores in cuniculis versentur; peritiores, mæandros, labyrinthos, concamerataque cubilia efformant. Languens otio, ædibus ejicitur; pro foribusque ductum, facta omnium ordinum corona, capite mulctant. Intus Veneri operam dare, modestiæ debetur. Ad-

ditum & prælagas esse. Scilicet, exposito ad siccandum à formicis frumento, nunquam imber cecidisse visus est. Democritus, cum cœlo sereno id facere observasset, ut messiem sub tecta referret, fratrem monuit; subsecutumque diluvium. Theophrastus pluvias portendere putat, vel, cum densioribus & in se invicem per viarum angustias concurrentibus agminibus, prædam convehunt: vel cum ova ex depressione & cavo loco, in eminentiorem deportant. Quæ de Nerone apud Suetonium, & Cimone apud Plutarchum dicuntur, sublimiora sunt. Piaculum esset, domiciliorum, in quib, exstruendis singulare artificium adhibent, oblivisci. Tortuosissima illa, ut vel invia sint, vel aditu saltem difficilia. Terra pro foraminibus aggeritur, tanquam muri & propugnacula, ne descendente pluvîa, alluvione intereant. Triplex ijsdem regio. Mares & fœminæ in androne habitāt: Panmyrmecium verè dixeris: in Gynæceo fœminę pariunt: tertium granorum acervis destitatur. Plutarchus, in una, vitam degere & comedere; in altera, alimēta tanquam in granario recondere; in tertia, mortuos sepelire, scripsit. Radices & extremæ monticuli orę Cœmiterio assignantur. Domicilium sibi visum Majolus descripsit, Aldrovandus unius & alterius, quæ in putrida quercu, & semiputrido trunco observata sunt, iconem apposuit. Apparuit, inquit ille, in argilloso humo urbs quædam quadrangularis, longa pedes fere quatuor, lata ultra pedē, in qua per vias velut ad negocia ultro, citroque cursitare, velut cives, ipsæ formicæ viscebantur. Admiranda erant angulorū, laterumque directæ delineatio, quam artificum amussim, circinoque; fabrefactam putasses, quod æqualis semper dimensio longitudinis, latitudinisque servaretur. Urbis lōgitudinem media servabat via quædam directissima, profunditate, latitudineque digitali: quam rursum per transversum æqualib, inter se spaciis tres aliæ viæ eadem digitali profunditate, & latitudine directissime in-

Aelian. H.
A. 6. c. 43.

Aldrovand.
H. Insect. 4.
c. 1. p. 309.
edit. Bonon.

tersecabant, ut ita tria compita, foraque spectarentur.

Majolus

Dier. C.

nit. coll. 7.

In extremis viarum angulis, velut angiportib. spectabamus collecta in accervos servari ova, unde Formicarum proles gignitur. Altera urbis parte antra vidimus frumento, ita oppleta, ut in vias ipsas redundaret. Mira fuit omnium viarum mundities, nihil in illis lapillorum, nihil pulveris, nihil festucarum, nihil humoris, ut deprehendas urbem illam à suis civibus ita curatam, ut prolis eximium studium, annonæ, & structurarum ornatus ubique spectaretur: qui omnes illi cives communi studio ad Reip. beneficia incumbentes, dum alij domi de rebus consulunt, alij foris res agunt, summa pace, concordiaq; curandam Rempubl. nos docebant; studuisse quoq; iidem cives visi sunt omnium incolarum incolumitari. Erat enim in urbis longitudinis medio unica porta Zephyro obiecta, quod ab Aquilone, Euro, atque Austro, immunem urbem sua Philosophia oportere esse didicissent.

Plut. de solert. anim.

Simile domiciliū in putrida querquinentum, rusticus ad Aldrovandum attulit, quod secundo loco in icone expressum est. Admirandum quoq; in quod Cleanthes incidit spectaculum. Venisse formicas de suo cavo ad aliud formicarum examen, formicam portantes mortuam, verba sunt interpretis Plutarchi, *ascendisse alias formicas, tanquam ad colloquiū, rursumq; descendisse. Id bis terve factum. Tandem has, sursum extulisse vermem, tanquam redemptionis precium pro mortua. Hoc illas accepto & reddito formicæ cadavere discessisse.*

Antipathia.

Elephantos atq; ursos læsæ ab illis lædunt. Serpentes & Dracones in rabiem agunt, seu quod laborantibus viam obstruant, seu quod cavernis venenatum halitum afflent. Cicadas gliresq; summo prosequuntur odio: illas quia cantando hyemem contemunt; hos, quia dormiendo eandem perdunt. Pugnam & inter se inire, Aeneas Sylvius, post Pontifex observavit. In agro Bononiensi, inquit ille, pyrum aridam, passus gratiā ex mi-

Sylv. l. de Europæ. 40. Mouset. Theat. Inf. 2. c. 1. p. 244

norib. formicis famelicis complures ascendunt, supervenere majores non parvo numero, quæ illas erepto faucib. bolo partim occiderant, partim dejecerant. Dejectæ ad suam revertentes Myrmeciam sive acropolim, in itinere cū obvijs quasi habito colloquio injurias memorant, omnemque fociorum vim & numerū castris educunt. Post duas ferè horas tot Minorum Centuriæ, tantæ acies exortæ sunt; ut totus ager nigro agmine atratus videretur, accessere stipatæ omnes, & arboris utrinque stipitem circumdantes, paulatim ascendere cœperunt. Majores, ubi hostes adesse animadvertent, conglobatæ supernè pugnam expectaverūt, postquam simul commissio prælio acies convenerant, Majores è minorib. permultas morfu rabido interemerunt, omnesq; primo impetu ascendentes miserimâ strage confectas disjecerunt, ut mortuorum cumulus ad pyri radices non parvus in terrâ succreverit. Reliqua minorum pars mediaque acies, non animos propterea ponere, aut loco cedere voluerunt; sed concenturiatis spiritib. tentant, pertinaciusq; instantes, atq; aciem acie prementes majori quam antea numero arborem conscenderunt, hostesq; à tergo, à latere, & à fronte undique pungentes, manus herbamq; date vi coegerunt. Magnæ majorib. vires ad victoriam valuissent, nisi minorum prævaluisset numerus, unamq; viginti simul essent adortæ. Hæc acta sub Eugenio IV. Pontificis cathedrâ occupante, spectante Nicolao Pistoriense juris consultissimo viro, omnemq; pugnam bona & sincera fide narrante. Tale quid Olaus Magnus recenset Upsaliæ & Holmiæ contigisse, antequam Barbarus, & immanis ille Tyrannus Christiernus Secundus à Sueciæ incolis è Gothorum Suecorumq; regionibus fuit expulsus. Quo in prælio illud non omittendum. Minores post adeptam victoriam suorum cadavera inhumasse, relictis hostibus, & ad corvos, porosque expositis. Martis item in aream Campanile elegerant altissimum, ac si Tyranno-

annorum prodigium ejusq; Satellites, ad sui fati ^{ἡλικίας} ~~ἡλικίας~~ penæq; imminētis contemplationem, clarâ voce vocarent atque attraherent.

Ufus.

In Indijs in *cibis* sumi, & quidem pipere conditas, inferius dicemus. In *Medicamentis* maximo sunt usui. Aqua ex ijs destillata vomitū excitat, & febres solvit apud Gesnerum. Omnem intermittētē febrem curabis, si eger

Plin. H. N. 28. c. 7.

omnium unguium præsegmina proformicarū forib; projici curet, & primam ea trahentem apprehenderit,

Plin. H. N. 27. c. ult.

colloq; subnexam gestaverit, si proidentib; fides est. Ova trita & auribus imposita, quemvis obtusum auditum fanant, si Marcello credimus. Eadem inter psilothra numerat Arnoldus, & ad phagædænas commendat. Quidam conterunt, & aquosam substantiâ expressam instillant. Balneo myrmecino calculus pellitur. Oleo, & aqua destillata virilitas promovetur. Gesnerus, ollam melle intus obductam, & ad medias formicis plenâ accipit, pyrethro, nuce moschata, cardamomo, pipere longo, & butyro additis. In fimo macerata destillantur. Aquæ aliquid jejuno exhibetur. Brunfelsi⁹ quatuor in potu sumptas, omnem coëundi potentiam auferre scripsit. Cum sale communi, ovis & axungia, panno interposito applicatas, Ischiadicam tollere idem author est: Impetigini cum modico sale appositas, præsentī remedio esse, Marcellus; pruritus & scabiei è papulis, Serenus: status potēter dissipare, Albertus: clavos & tumores auferre Nonnus. Uris in nausea ex plenitudine, & postquam mandragoræ poma degustavere mederi, ex Plutarcho; supcilia cum muscis tritas denigrare; tritas, adjecto sale, pforas, lepras, & lentigines curare, quinq; contra phalangiorum morsus auxiliari, ex Plinio habemus. Idem, terram à formicis egestam, aliquos strumis illinere scribit.

Plut. de serp. anim.

Plin. H. N. 30. c. 3.

Damna & Remedia.

De Ufu dixi: meminere & *damnorum* authores. Venenum morsu suo spargere, & pustulas excitare, Albertus prodidit. Apud Cumanenses, capita, inter venena quibus sagittas in-

ficiunt, sumuntur. Ova pota, flatulentiam & ventris tormina excitant. Agris, hortis, horreis, arcis, arboribus, vitibus, frugibus, fructibus, cibis insidiari, notius est quàm ut demonstrari debeat. *Remedia* passim apud authores occurrunt. Rubrica & pice liquida ab arboribus abiguntur, si caudices perunxeris. Sunt qui caudicem succo Cyrenaico, ex acetosoluto inungunt, vel hedera amiciunt. Non excedent vitem, si bitumine cum oleo cocto, imas vites tetigeris. Ex latibulis pellētur, si vel tithymali ex aqua decocto, vel cochlearum testis cum styrace ustis, vel organisulfurisq; pulvisculo, ea consperferis. Sabinus Tyro, apud Plinium, heliotropio necari putat.

Differentiæ formicarum, à *consuetudine corporis, loco, quantitate, colore & effectis* sumuntur. Illam si spectes, sunt quædam *alatae*, quædam *semiformicæ*. *Alatae*, de quibus suprà, apud nos senes sunt & inutiles, & ejusdem generis, nymphæ dictæ. In India Orientali laccam conficiunt, & in Brasilia, ut post dicemus, rubri sunt coloris. Habentur & in aquilone *alatae*. *Semiformicæ* quæ & semivermes, in Occidentali India inveniēs, Comixen indigenis dictas. Alba velut cauda prorepunt, & ligna erodendo penetrant. Arbores vel parietes scansuræ, opercula terrea, digitum crassa secum ferunt, in iisque ad quatuor & ultra palmos productis, nidulatur: Ex Loco, sunt *Indicæ*, *Brasilienses*, *Philippinæ*, & *Aquilonares*. De *Indicis* ita Plinius. *Indicæ formicæ cornua*, *Erythris* in

Arist. H. A. 4. c. 8. Plin. H. N. 19. c. 10.

Differentiæ

Ovid. Ind. Occid. c. 52.

Plin. H. N. 11. c. 31.

ad Herculis fixa, miraculo fuere. Aurum ex cavernis egerunt terra, in regione septentrionalium Indorum, qui Dardæ vocantur. Ipsis color felium, magnitudo Aegypti luporum: Erutum hoc ab iis tempore hyberno, Indi furantur æstivo fervore, conditis propter vaporem in cuniculos formicis: quæ tamen odore sollicitatæ provolant, crebroq; lacerant, quamvis prævelocibus camelis fugientes. Tanta pernicitas feritasq; est cum amore auri. Nearchus earum pellem, pardi pelli similem sibi visam scribit. Solinus, pedes illis leoninos tribuit. Aelianus Campylin

Strabo Geogr. l. 15.

Aelian. H.
A. 3. c. 4. &
h. 9. c. 7.

fluvium nunquam transire author est: domunculas, sinuosis foraminibus obliquas, in excelsis locis construere, ut fluviorum alluviones effugiant, addit. Aggeres aggesti confirmantur magis. Primum enim ex matutino rore pulveri admixto, tunicâ tenui sed validâ vestiuntur: inferiore parte, de fluviali cœno, cortex muscosus adnascens, aggerem stringit. Fides sit penes authores. Strabo talia prodētes, ridet; Arrianus reiicit; moderni navigatores tacent, non omisuri, si veritati respōderet relatio. Taceo ergo & Rhasis formicam, publicè in regno Persidis nutritâ, quæ in dies singulos libram carnis comederet: taceo & illas, quæ apud hydrophagos, catuli magnitudine reperiri dicuntur. *Laccam* in Orientali India conficere certissimum. In regno Pegu cum terra pluvia, vel aqua iusto plus irrigatur, ligna tenuia ab incolis disposita conscendunt. Ex illis certa gummi species defluit, quod illæ exsugunt, & circa ramos, ut Apes mel ac ceram diffundunt. Stercus favaginemve ipsarum esse, Dalechampoo visum. A costa arborem nominat, Lusitanis, Mancanos de la India dictam, quæ alatis perpetuò onusta æstate videtur. *Brasilienses*, velut forfices in ore habent, quibus fata & fruges abscindunt. Morsu earum arefcunt omnia. In sinu Salvatoris inveniuntur. De rubris in sequentibus agitur. Apud eosdem, si non alibi, aliæ agros depopulantur, aliæ eosdem, vastatores pellendo conservant. De *Philippinis* ita *Nierembergius*. Reperiuntur in Philippicis, duo formicarum genera, *solum* dicta, quarum aliæ sunt sex digitos longæ, ac crassæ digitum latum, coloris nigri nitidique, rictu dimidii digiti, prædura maxilla, & eodem quo corpus colore, cui tres hærent dentes tenues & firmi, vivuntque in montium arboribus. Aliæ sunt alatis *formicis similes*, & aliquanto majores. Vivunt in campestribus, atque adversus hyemis injurias congerunt arenæ acervos incredibilis magnitudinis intra quos favos construunt, ubi & tutæ & munitissimè degunt.

Cardan. de
subt. l. 9.

Dalechæp.
H. P. l. 18.
c. 1.

Nieremb.
Exot. l. 13.
c. 13. p. 28.

Aquilonarium una species est, quæ ex frondibus pini & abietis in edito aliquo in campis loco, nidos ædificat. Urso insidiantes adeò solerter invadit, ut ejiciat. Si vel unica pilis immersa in latebras delata fuerit, ita foetificat, ut & inde urfi pellantur.

A quâtitate, aliæ sunt magna, quales Indicæ, aliæ minima, quales in novo orbe reperiuntur. Domum modii magnitudine sibi exstruunt, lutum adeò durescit, ut glutinis instar appareat, nec gladio penetrari possit. Ad ingressum ostium latens constituitur. Apud Brachmanas palmaris sunt longitudinis: in nova Hispania, scarabæos æquant. Majores Aristoteles *πρωγμύνας* nominat; Gaza formicas equites vertit, Plinius *Herculanæ*. Ille in Sicilia inveniri, Abensina in Lycia negat. Ad minores & illæ spectat, in novo orbe, quæ domos luteas, sphaericas, capitis magnitudine, parat, quas per prælongum accessum, quasi exiguam fistulam, ingrediuntur, ibidemq; horrea cōficiunt. A calore sunt albæ, vel rubræ. Illas in regno Nigritarū, Senegæ, Pephno parva insula, vel potius Pheneo Laconicæ invenies. Humiles in Senega casae exstruunt, & absq; calce ferruminant; clibanos vel ruscule in ordine dices. Aliquando n. centum & centum quinquaginta se subsequuntur. De albis etiâ ita *Nieremberg*. Circa montē Leçne, album genus formicarum est, idolis inclusarum. Vocant idola quædam *Chimas*, quæ pyramidis artificiosæ formam referunt, in quibus formicæ albæ, quæ foras non prodeant, sed internis cellulis distinctæ, ut quo vivant cibo incertum sit reptantes cursitantesque apparent. Has Chinas formidant barbari. Quocitres mancipium coëmunt, ante pyramidi huic vinum aliaque offerunt, mancipium sistunt, ei que quodammodo devovent, orantes ut ipsum, si fugam ineat, serpentes, lacertæ, tigridesque dilacerent. Quas servi minas adeò exhorrescunt, ut etsi ab heris acerrimè vapulent, inire fugam minimè ausint.

Ovied. in
hist. nov.
orbis.

Scal. Exot.
96. 7.

Scalig. Exot.
erc. 367.
Pausan. in
Lacon.


Nieremb.
H. E. 13.
c. 13.

Rubra

Cimices

Wantzen

wandtleufs




Perlæ

Libellæ

Schneider

Graf-mätze

Aldrov



Libellæ

Moufeti
Maximæ

Rubra in provincia Mangi, quibus cum pipere vescuntur, & Brasiliâ visuntur. Magnâ hæ, & dum conteruntur, cedri odorem spirant. *De iis*

Aldrov. H.
Inf. 4. c. 1.
p. 516.

ita Aldrovandus. Verno tempore, hoc est, mense Septembri magnum sensum fortium agmen educunt idq; eo potissimum die, qui pluviâ subsequitur, atq; tonitrua, cum videlicet Solis æstus viget maxime. Parentes præcedunt, ducesque sunt liberis, ore aperto huc, illucque cursitantes, viasque undique complentes, morsus multo quam alijs temporib. acerbiores inducunt, ad sanguinis effusionem usque. Sequuntur subinde liberi magnitudine prævalentes, volatuque novas sibi habitationes quærunt, tanto sæpè agminæ, ut velut densissimam in aëre nubem efficiant. Ubi quiescunt terram eo in loco effodiunt, ac quæque sibi habitacula construit. Vita earum brevis est ut ex singularum ventre ingens fæctuum numerus erumpit. Cum latibula sua egrediuntur, accurrunt Indi, accurrunt & volucres cæli. Indi autem magno cum desiderio tempus hoc expectant, Formicas istas ceu novos fructus in cibi usum colligentes. Accedunt autem ad cavetharum ingressus, eas aquæductibus circumtepiunt, adversus mordaces, & graviter morfu vulnerantes patentes formicas sese defendentes. Novas recentesque eas formicas, in multos dies servant, ac igne torrentes devorant. Quam modo suavem, delicatumque cibum præbeant, testantur Iesuitæ, qui & ipsi illis vescuntur. Ab *Effectu Venenata* quædam dicuntur. Tales Telephus Cretensis *Lærtas* nuncupat. In Brasilia nidum, hirundinum more in arboribus faciunt. In isthmo del Sur & Nort, tam duras casas erigunt, ut vix securibus rumpi possint. Indi his sagittas inficiunt. Ictis, necessario, moriendum est.

* *

6

ARTICULUS II.

De Cimice.

Aldrov. H.
Inf. 4. c. 2.
Nomen.

Cimici nomen Latini à *κειμαι* cubo, quod in cubilibus nascatur, imposuisse videntur: nisi fortè à *cama*, lecto brevi, & circa terram deducere volueris. Græci *κέειν* vocant, à Cori herba, quâ Latini Cimicariam dicunt. Appellatur & *ἀφίς*, & à recentioribus *κέειν*.

Fastidiendum natura animal est, ut Plinius loquitur, & simile ferè rincino. Corpore est rhomboide, colore nigro, parum rubente: pedibus tribus, & juxta collum brevibus: dorso & ventre incisuris notato: Curi apprimè tenera, ut vel levissimo contactu media crepet, fæctoremque abominandum expiret.

Reperiuntur in lectis, abiegnis inprimis, & quorum lintheamina & stramina rarò renovantur; parietib. lectis proximis, & alabaistro obductis; coturnicum caveis; libris chartaceis.

In insula S. Thomæ non inveniri, prodidere quidam. De die in parietum rimis stabulantur. Ex cujusdam mulieris aperta calvaria, magna Cimicum multitudo prorupit. Hominum sanguine, quem sugunt victitât: post morsum vestigia purpurascencia cum dolore pruriginoso tumida relinquuntur. Victitare & aliis vel exinde colligas, quod in ijs etiam lectis inveniantur, quos nemo frequentat. Ex humore per summa corporum animalium exsudante, generari apud Aristotelem habemus. Oriri & ex humoribus aliis circa lectos putrescentibus, & è lignis paulatim exsudentibus nullum dubium. Vidit Aldrovandus peregrinantium vel rus euntium lectos subinde à Cimicibus infestatos, cum nulli præsentibus apparuerint. Scaliger etiam inter chartaceos libros, oriri innuit. In coturnicum caveis, maximè brevi tempore multiplicantur. Propagari & per coitum Pennius in agro Aurelianiensi animadvertit. In dissecta vagina adultos & juniores, cum magno

Descriptio.
Mouset. H.
Inf. 2. c. 25.

Locus.
Scalig. Ex.
246.5.
Vires in
Dialogis.

Victus & Generatio

Arist. H.A.
5. c. 31.

Ael. H.A.
20. c. 42.

ovo-

ovorum dilutius albicantium numero comperit. Cardanus Carthusianus cum iis non conflictari, quod carnibus abstinerent, ridiculè credidit. *Scalig. l. c.* Tolofati lectuli, inquit Scaliger, carnes non esitant, & nihilominus eâ peste sunt infames. Vulgò jactatum est è contritis alios oriri. Pestem multiplicatos præfagire, apud Alexandrum Benedictum habetur.

Fuga. Arcentur ab ingressu, cucumeris anguina aquâ alicubi reposita, felle bubulo aceto permixto & lecto inuncto: crinibus equi in ostio cubiculi suspensis: nigellæ & cicutæ fumo. *Fugant eos*, Canabis in lecto posita: sterco tauri si eo suffitus fiat: Genistæ communis filiquæ semine prægnantes, si sub pulvinari ponantur: odor rubrarum pellium, quas *Reuschleder* Germani vocant: pix liquida, & cucumeris, sylvestris succus cubilibus inspersus. Cornu cervinum vel leporis pedes circa lectum pendentes: fæces butyri coctæ: obolus lecto substratus, &c. *Necantur*, tinctura sulphuris: foliis hederæ cum decem hirudinibus tritis; lupini madentis imbre: foliis utriusq; filicis fumo Chalcantidis & æruginis: calce cum lixivio fervente mixta, staphidiagria, hydrargiro, sulfure, & oleo laurino, additis; illis deniq; quæ apud Aldrovandum occurrunt.

Ufus.

Conferunt, in serpentum moribus, si cum testudinis sanguine sumantur: contra epilepsiam ab utero, si suffiantur agræ. in Tertianis si cum allio & mero tribus diebus vel ovo sumantur. Generis fidem facit: in quartanis, si cavis fabarum inclusi, ante febrium significationes septeni devorentur: in urinæ suppressione, si fistulæ urinariæ indantur. Plinius in aspidum morfu commendat: Vegetius in stranguria equorum si unus in aurem, alter in meatum penis imponatur: Galenus in urinæ incontinentia: in Calculo Valerandus: in eodem cineres per clysterem injectos, recetiores & quidem mirè: in colica Generis quatuor ex vino manè bibi-

tos, per tot dies donec duodecem devorati fuerint. Sic Functium urbis Tigurinæ nepotem liberatum, &cæt.

Alij sunt *Domestici*, de quibus hic: *Differetia* alij sylvestres, de quibus inter alata egimus.

Adeos pertinent *Hocitexca*, & *vermis cornutus*. *Hocitexca* denarium æquat magnitudine, terribimo odore, & haustu sanguinis infensa: morfu excitat rubeas eruptiones. *Vermis cornutus* apud Mechoacanêses ytzuaqua & sipantipe dictus. Duob. corniculis rubris iter præterat; nigro fuscoque variegatus. *Nieremb. 13. c. 15.*

ARTICULUS III.

De Pediculo, & Syronibus.

Pediculo à pedibus nomen est. Plinio dicitur *pedunculus*, alijs priscis *Pedes*, & *pes*; & quidem in foeminino genere: nonnullis *sexcubes*, *vermis serpens*, &c. A Græcis vocatur communiter, *φείρ*, modernis *φύγ*; Achæis *νίγ* & *νίρ*; alijs *καρ*, *εγκαρ*, *καθ*, *εθ*, *αρεπεδωθ*, *εθ*, *αλ*, *εθ*, *κα*, &c. *πλόποδε*, & *λικνία*, species sunt. *Nomen. Aldrov. H. Ins. 5. c. 4.*

De *Descriptione & Loco*, non est quod simus solliciti.

Ex carne oriri, & futuris, pustulas quasdam emergere; ex punctis, pediculos fundi, Aristoteles putavit; ex corrupto sanguine Theophrastus: ex materia putri calida & humida, quæ in cute redundat, Mercurialis.

Sanguinem inprimis pituitosum hic locum habere dicerem, cum biliosus & melancholicus, interimat eosdem, & felle illito intereant. Locum si spectes, inter cutem & carnem prodire visus est dixisse Galenus: in toto gigni corpore, cum ubique porosa cutis sit, nemo negaverit.

Dicendum tamen, in capite magis, & ad axillarum & inguinum emuntoria, erumpere. Copia ibi excrementorum

Generatio. Arist. H. A. 5. c. 31. Theophr. de Caus. Plât. 1. 2. c. 22.

Mercurial. de morb. cutan. l. c. 6 torum colligitur, & pilis obteſcē for-
des, diffilatione negata promptius
longē putrefcunt. Nec collum, licet
detectum & glabrum eximendum
eſt. Cum enim & illic emunctorium,
cum ampliffimis quæ humorem ad
caput deferunt vaſis, frequentior &
copioſior illic ſudor excitatur. De
efficiente tot ſunt ſententiæ, quot de
ſpontaneo viventium ortu occurrūt.
Principium ibi occultum eſſe neceſ-
ſe eſt, animatumque illud, ſed quod
ab alio in actum deduci oportebit, ut
Plin. H. N. l. 20. c. 2. Galen. l. 2. de al. fac. aſibi dicemus. Occaſionem ortus
nonnulla præbere, experientia do-
cuit. De Ocimi cibo id apud Plinium
legimus; de caſtaneis & ficubus, ap.
Galenum. Idem de raphano, xyloa-
loë ſuffita, apio horrenſi, daſtylis, &c.
apud Diodor. in Empiricis tradun-
tur. Lanam ovis à lupo admorſæ, ſi
veſtis ex ea ſudore mædeat, eos pro-
Plut. Symp. 2. q. 49. Mouſet. The- atrii Inſect. l. 2. c. 22. creare, apud Ariſtotelem & Plutar-
chum habetur: imò pannos equino
adipe illitos idem efficere, ap. Mou-
ſetum. Accedit complexio, regio &
cultus. In India Occidentali Chri-
ſtianis ne in capite quidem innas-
ci, prodidit Oviedus; incolis ubique.
Ovie. c. 82. In ſula S. Thomæ, nigri pediculis ſca-
rent, albi ab iſdem non attinguntur,
ſi Veſpucio credimus. Iter maris Indi
qui ingredi ſolent, pediculos, ubi A-
zores inſulas à tergo reliquere, con-
feſtim tabeſcere ajunt: ſubitò oriri
ubi eas reviſerint. Oviedus de traie-
ctu æquinoctialis lineæ id ſumit. In
rota Hibernia ob immunditiem dif-
fluere dicuntur, nihil de ergaſtulis
dicam.

Morb. pedicular. Pedicularis hinc aliquando mor-
bus, quo haud paucos mortuos, Hi-
ſtoricis proditum: illos inprimis, qui
vel ſævitiæ famam quærere, vel divi-
nitatem aucupari volebant. De An-
tiocho Epiphane in Maccabæorum
libris legimus: de Herode Aſcalo-
Macc. l. 2. c. 1. nita, apud Iosephum. de Herode An-
tipa in Actis Apoſtolorum: de Phe-
retima Cyrenęor. regina, poſtquam
Barcæos ob interfectum filium cru-
Ioseph. An- tiq. l. 18. c. 8. deliſſimè ultæ eſſet, apud Herodo-
tum. Eodem morbo periſſe tradun-
Herod. l. 4. tur, Phereſides Syrus Pythagorę præ-

ceptor; Caſſander Antipatri Fil. qui
Alexandri matrem & filios interfe-
cit; Sylla, quem Plinius, erodente ſe-
ipſo & ſupplicia ſibi gignente, periſſe
Plin. H. N. l. 11. c. 13. ſcribit: Vidiſſe ſe ſævo ab agmine
vinci Sammonicus. Idem de Euno
ſervo in Sicilia, Galerio, Maximino,
Speuſippo Eurymedōtis filio, Iuliano
Iuliani apoſtata avunculo, qui An-
tiochiæ ſacram menſam perminxe-
rat, & aliis proditum eſt.

Remedia contra eos plurima apud *Remedia contra morbum.*
authores invenies. Dioſcoridi allium
cum origano decoctum, vel corian-
dum cum eodem tritum probatur.
Plinio Staphidis agriæ ſemina cortici-
bus abiectis trita: ſinapi, allium cum
Plin. H. N. l. 22. c. 25. aceto & nitro, oleum raphaninum,
extra: ſeneſta anguium trita, myricæ
ſemen, aqua ex raphani foliis, &c. *in-*
tra laudantur. Oribasius, ad helxines
ſuccum diu infricarum confugit: ad
berberis folia Rhæſis: ad argentum
vivum oleo roſaceo, nec malè, Aben-
ſina. Fallopius ceratum ex oleo, ar-
gento liquido & cera componit, eoq;
corpus inungit. Nonnulli ſtatim in-
terimi putant, ſi cingulum ex lana eo-
dem illitum, nudo ventri circumli-
getur. Idem linimenti, quod ex pomi
cocti medulla cum argento vivo cō-
ponitur, author eſt. Quidam apud
Mouſet, Noſocomii præfectus, virgis
betuleis nova pelle ægros veſtiebat,
quæ vibicibus picta, pediculos poſtea
non admittit. Plura apud Aldrovan-
dum & Mouſetum vide.

Cumani, ſi navigatoribus creden-
uſus. dum, & crudis & coctis veſcuntur,
quod & Phitrophagis olim ſvetum.
Ictericis, ſi duodecim contuſos ex vi-
no vel cum butyro exhibebis, certo
certius ſubvenient. Quidam in dyſu-
ria vivos & grandes coli immittunt.
Si ex diuturno morbo decumbenti-
bus, in capite naſcantur, ſolutionem
morbi indicant.

Differentiæ à ſubiectis ſumuntur. Differen-
tia. Sunt enim alii *Hominum*, alii *Bruto-*
rum, quibus & qui in *plantis* Mouſet. *Ariſt. H. A. l. 5. c. 31.*
adiungit. *Homines* qui infeſtant,
vel ſunt *Manſueti* vel feri, vel *Syrones*
& minimi. *Manſueti* inter digitos le-
viter fricati quadranguli videntur, &
puli-

pulcib. paulo duriore. In capite nati, maiores sunt, nigriores, quod succus ibi pinguior, longiores & velociore; in reliquo corpore magis obefuli, ventriosi, tardi, obscure albidii, & nigricantibus liris insigniti. Aldrovandus oblongiores cæteris, in postica parte crassiores, versus caput in acutum desinentes dixit. Gignuntur & in vestibus laneis, leucophæis imprimis. Pueris magis, viris minus in capite oriuntur: nec malè tum illud valet. *Feros alii pediculos inguinales, Ciccos, ricinos humanos, & vulturinos pediculos* vocant. *Italis Piatole & Piatones*, aliis *Plactule & Platula* dicuntur. Palpebras, pubem, inguina & axillas occupant. Compressiore sunt corpore, acutiore rostro, quo tam alte cutem penetrant, ut vix cum capitis iactura avelli possint. Rarò vagantur, sed loco quem sibi excavavere affiguntur. Duriore mansuetis Aristoteli dixit. Quia minus turgiduli, aridiore & quasi semiaflatam materiam fortiti videntur. In Synonymiis, *Motes & Im-motes* dicuntur. Palpebras sæpè ita infestant, ut oculis exulceratis, visus aciem obtundant. Evelli primò diligenter debent: mox sapone nigro accerrimo locus optimè inungi, & si corpus fuerit calidius, argento vivo, pomi dulcis pulpa excepto. Lixivium senæ, vini facem, succum geniftæ, magnificiunt Medici: Varignana, decoctum ex staphidis agriæ unc. ij. vini phialis iij. setarum porcinar. unc. ij. Hydrarg. purgati unc. j. parat. *Syrones* antiquitati ignotos, Thomæ à Veiga opinio; *ἀνακιδιον* Aristotelis esse, Moufeti. Videntur *ἀπὸ τῆς σιπέδης ἐκπεύ* dici, quia tractim sub cute repunt. Latini *Pedicellos*, Taurini *Sciros*, Vascones *Brigantes*, Itali *Cirones* vocant. Lægius inter pediculos refert, Moufetus non item. Nulla illis expressa forma præterquam globi: vix oculis capitur magnitudo tam pusilla; ut unum ex Epicuri atomis diceret. Colore sunt albicante, capite excepto; propius intuenti nigricant, vel parum ex nigro rubent. Ita sub manuum crurum & pedum cute habitant, ut actis, quamvis pedib. destituantur, cunicu-

lis, & excitatis aqua plenis, penes quas habitant pustulis, pruritum maximum ingenerent. Acui extracti, movent se, si calore Solis adiuventur. Ungue pressi, haud sine sono crepant, aqueumque virus reddunt. Intra oculos, & toto corpore generari, certum. Illud, le Ieune Chirurgus prodidit, apud Moufetum: hoc in nobili quadam Angla sexagenaria accidit. Interdiu & noctu, labiis, gingivis, plattis pedum, capite, naso, aliisque partibus lacinata, tandem carne depasta occubuit. Maior succedebat soboles, quo diligentius acubus adstantium effodiebantur. Maximum & præsentissimum eorum venenum, acetum falsum, & vini sublimati portio. Abenzoar corpus pulpa melonum fricat, vel succo foliorum Persici. Plura in Moufeto vide. Huc *Tineæ* Tineæ. pertinent, quas Græci *τελχοβρώτες, τελοχωρώκλαι, σήτας, τελοβίρες*, vocant. Nascuntur sæpè in capite, & pilorum radices exedunt. Succo limonum cum aqua vitæ & sale usto mistis, & inunctis, depelluntur. Alii, panis siliginei calidi micæ sæpius alligatas comendant. Fortè nec semen in abiete summa crescens, in cineres redactum & aspersum oberit. Oviedus *Nigua* bestiolæ apud Indos Occidentales meminit, de qua sub pulice. Nec est quod *Dermestis* insecti obliviscamur, quamvis ad hominem non pertineat. Pelles id consumit, & pro earum ratione colorem mutat. Pulicis est magnitudine, pedum sex, & forcipati rostri.

Bruta quod concernit, *Leo* adèò à pediculis in palpebris infestatur, ut aliquando in rabiem conjiciatur. *Equi* rubentes capitibus, reliquo corpore albicante habent. *Bovum* & *vitulorum*, nigri sunt. *Porcorum*, qui *Vrii* ab urendo, adèò grandes & duri, ut vix digitis interimantur. *Canum* sunt parvi, lentiginosi, capite albicante, reliquo corpore excæruleo livente vel nigricante. *Ovium* minuti valdè, quibus capita rubent, corpora candicant. *Cervorum*, capiti concolores. *Caprorum*, ab ovillis parum differunt. *Avium* exigui sunt. In capite potissimè atq; alis oriri,

Mouf. It.
Ins. l. c. 24

Lang. Ep. l.
2. ep. 42.
Scal. Exer.
194. 7.

Col. R. R. 1.8. c. 7. oriri, Columella testatur. De Phasianis, perdicibus, coturnicibus, Gallinis, &c. taceo. *Asino* parcunt, quod tardo gradu incedens, nullo sudore perfluat. *Salmones* macilentiores sub brachiis pediculis scatere vidit Plinius. In Abrotano, Absynthio, Nymphææ floribus, & potissimum Aquilegiæ foliis, mense Iunio, ob singularem ejus dulcedinem haberi, Mouferus author est.

ARTICULUS IV.

De Ricino, & Reduvio.

Alar. Hist. 1.8. c. 5. **R**icinus, nomen à Ricini plantæ feminibus, quæ æmulatur, apud Latinos obtinuit. Vulgo Græcor. dicitur *κρίτων*, Helychio *ασκότον*, Suidæ *κρότ*, aliis *κυνόραγης*, Ferlinis, ut ex Didymo Zelonote ap. Hermolaum Barbarum accepimus, *ραγης*. Gaza *Reduvium* vocat, Albertus *Tacam*, Guillerinus de conchis *Eugulam*, Sypon-tinus *κυνόμυτιαν*, sed falso, Scaliger *Cicam*, vel *Ceccam*. Insectum est parvum, compresso valde & plano corpore, cute admodum tenaci, figura corporis rhomboide, colore nigro cum quodam splendore, aut ex fusco obscure nigricante. Sex habet pedes collo affixos, rostellum acutum sed breve, exitum excrementi nullum. Æstate ineunte in pascuis inter gramina, & in sylvis inter folia ex putri quodam humore nascitur. *Observavi*, inquit Aldrovandus, *sepe in canibus, quod cum domo egrederentur, prorsus Ricinis rarerent, redeuntes vero ex agris, ubi frequentior spissior, & altior herba erat, iis infecti essent*. Infixo semper sanguini capite vivit, atque ita intumescens, quia ei, ut dixi, nullus cibi exitus, dehiscit nimia satietate, alimentoque ipso moritur. Æque est mira sanguinis, ut Hirudinum generi in palustri aqua fitis. Perfert tamen & famem per septiduum. Sanguis igni sacro auxiliatur: mulieris lumbis si inungatur, veneris tædium parit. Ex aure sinistra canis avulsus, omnes dolores adalligatus sistit, ut Plinius ex

Nigidio prodidit. Præservantur ab eo canes, si aures oleo nucum avellana-
Plin. H.N. 1.22. c. 18. narum & amygdalarum amararum illinantur, vel ex vino, aceto, cumino & aqua salsa abluantur.

Adeò similis ricino *Reduvius*, ut Moufer, l. c. sæpe inter se confundantur. Rostellum ipsi longius, pedes obscure rubent, dorsum cineritio est colore, tribus minutissimis nigricantibus punctis distinctum, & ad cordis figuram effigiatum. Corpus à maxima repletione nunquam ita distentum, quin semper compressum, nunquam globosum videatur. Caput rarius cuti infigitur. Sanguinem per vices exigit, & excrementa inde genita per alvum exprimit: quæ lanam viridi colore ita tingunt, ut vix calido lixivio ablui possit. In vellere detonso annum integrum vivit, & boves, oves, capras, barbam etiam hominis & inguina infestat.

Tolluntur mandragoræ radice, cedria, pice liquida & sevo ovillo, amurca optime depurata, & vini fortioribus fœcibus, cum decocto lupinorum, si iis oves detonsæ illinantur. Reduviorum pulveris drachma una & semis, in potu exhibita, Ictericam certissimè & cito sanat, si quibusdam Anglis credendum.

ARTICULUS V.

De Pulice.

Pulex, quod ex pulvere genere-
Aldrov. de Insect. 1.5. c. 5. tur dicitur. Græcis est *ψύλλα*, *ψύλλας*, Mouf. Th. 1.2. c. 28 *psyllas*. *Caput* illi exiguum, Descriptio *ostorosum*, *collum* breviusculum, *proboscis*, cuius mucro rigidior, sine dubio cava, ut sanguinem exugat, & intus transvehat. Duæ minutissimæ è fronte antennæ, quibus tum viam explorat, tum de obiectorum natura judicat. *Oculos* habere vel inde colligas, quod luce se subducant. Posteriora cruscula ventrem versus retrò flectuntur, anteriora ad pectus, *Extremæ tibiæ*, bifidæ, uncatæ, acutæ, & corneæ quasi, tum ut certius subli-

Vicus.

Locus.

Ortus.

Natura.

Fuga.

nia scandat tum ut glabræ cuti fir-
mius adhæreat. *Intestinum* unum mi-
nutissimum & implicatum, quod pro
cibi quantitate, vel relaxatur, vel
contrahitur. Non tantum in anima-
libus canib. vulpib. homine reperiun-
tur, sed & in terra subsiliunt. Hea
civitas propter caprarum abundan-
tiam, eorum est feracissima. In terri-
torio Sigelucensi. nec ii quidem qui
importantur vivunt. Loca calida &
sole illustrata amant. *Sanguinis* sunt
appetentissimi. *Oriuntur* ex pulvere.
inprimis si capræ aut hominis urina
præmadefiat. Sed & inter pilos can-
nis, ex humore succido putrescente.
In Perienna regione, è mancipiorum
sudoris guttis, quæ statim in pulices
delapsæ convertuntur. Coeunt mare
fœminam conscendente, diuque in
coitu hærent. A coitu gravida fœmi-
na obefior videtur, ovorum plena;
quæ in ventre oblonga, minutissima,
numerosa & candida videntur; ex-
clusa, repente nigrificant & in pulicel-
los minutissimos abeunt. Ova non
lendes parere, apud Philoponum ha-
bemus: quod & Niphus tradidit. De
Natura hæc habet, carni putri vel mor-
tux non insidere, nec morbo regio
laborantes, & quidem ob succi ama-
ritudinem, nec morituros, ob eius-
dem foetorem, attingere. Nocte in-
primis infestare. A pastu in lodices
villosas vel pulverem se abscondere.
A morsu locum rubicunda macula
notatum dimittere. Imminentibus
pluviis maximè mordere: frigore de-
ficere & mori.

Pelluntur variis, inprimis verò, e-
quæ urina & fœcibus; aqua marina;
decoctionis arsenici aut sublimati;
calce viva cum hellebori albi succo
permixta, &c. Eidem negotio inter-
viunt caules, ebuli folia, filix, anchusæ
radix, pulegii flores, ruta, colocyn-
this, rubus, oleander, mentha, lupu-
lus, rapi semen, cuminum, staphis a-
gria, persicaria, sinapi, & alia, quæ ap.
autores vide. Alcairi redigitur in
pulverem persicaria: pulveris circa
lectos sparsi odore ita soporantur, ut
non mordeant. Numidiæ mancipia
quia calceis destituta, iniuriis huius

animalculi nimis sunt obnoxia, ferro
& igne eadem arcere solent. Multi
ex eo digitis pedum, vel pedibus in-
tegris mutilati superfuere.

Sunt alii *Communes*, rariores alii. *Illi* Differētiæ.
pediculi, magnitudine, sed molliore
corpore, dorso gibbofo, & ferè
porcino. Pectus venterque ex nigro
flavent. In catellis candidis sunt di-
lutiores, in ruffis fulvidiores, in nigris
nigriores. In Hispaniola non sunt ma-
gni: sed mordent dirissimè. Ex Ra-
rioribus sunt illi quos iuxta Niguam
fluvium parit India. *Pulicellus* est, in- Scal. Exer.
quit Scaliger, *roftro acutissimo: pedes po-* 44. l. 8.
tissimum invadit, (raro partes alias) non Marcgr.
ingredientium tantum, sed & Cubantium Hist. Bras.
quoque. Idè in sublimi cubant Indi. Fre- l. 7. c. 3.
quentissimè partem illam quæ subest un-
guibus lancinant, quarta die crescere tu-
mor incipit, tum ad eam turget magnitu-
dinem, ut pisum superet. Tumor fœtus est
lendis candidis: quibus extractis, cali-
dos imponunt cineres. Quæ de Numi-
diæ mancipiis superius diximus, ad
eundem spectant.

ARTICULUS VI.

*De Lendibus, Forbicinis, &
Talpa Ferrantis Im-*
perati.

TRia hæc animalcula Moufeti & Monf. Tha-
Aldrovandi verbis describimus. atri Insect.
Lendes, inquit ille, Græci *δέννας* & *κόιν-* l. 2. c. 35.
δας, Itali Lendine. Hispani Liende.
Germani Nifs. Angli Nits. Illyrici
guida, appellant. Sunt autem mi-
nuta quædam animalcula albicantia,
Syronibus, (si pedes haberent) quam
simillima, sed duplo ferè minora:
corpore item oblongiusculo, ex qui-
bus nihil aliud gigni posse Aristoteles
testatur. Inter unguis compressi cum
sonitu moriuntur; non solum in ho-
minum capillis & ciliis, sed etiâ boum
& equorum macilentiorum crinitus
scarent; pedum exfortes tam perti-
naciter nihilominus adhærent, ut ea-
dem opera totum pilum qua illos au-
feras. Has Trotula *τρυποβώτας* non
ineptè

ineptè dixit, nam ut cochleæ herbarum, sic istæ capillorum succo victitant, eosque depascunt.

Philosophus ex pediculorum coitu provenire eos affirmat, quorum proinde ova dicuntur. Sunt autem Iasmini florum apud nos crescentis similia. Nam sicut ille flores profert seminis expertes, sic pediculi ova pariunt effœta. Moriuntur aut alimentii inopia, aut pectinis densioris usu, aut medicamentorum vi: qualia veteres neotericiq; medici multa præscribunt. Plinius alumen cum aceto, vel acetum cum felle vitulino miscbat, & lacte item caprino eas tolli affirmabat. Laudat item nitrum cum Samia terra illitum, & scrobem cornu cervini cum vini epotam. Abinzoar cum centaurea minore, & Alkitrum capillos inungere præscribit. Sulphur in aceto tollit lendes, uti quoque oleum cum lixivio illitum. Marcellus sterces suillum cum vino & succo rosar. mixtum, mellis item cum sale armeniaco inunctionem, sed præsertim oleum raphani cum fortissimo lixivio variè prædicat. Hildegardis ex dactylorum ossibus lixivium parat, quo cum oleo radiculae mixto lendes enecat. Ardenus sublimati hydrargyri parum cum vino ardente miscet: atque etiam dicit, Si caput primum ovo gallinaceo, deinde cyclaminis succo, vel aqua marina irrigetur, nunquam renascitur esse lendes. Gilbertus Anglicus fel cuiuscunque animalis, uti etiam amara, mundificativa, & aromatica, cum succo calendulae mire effert.

Ejusmodi insecta vulgò *Forbicinae* dicuntur, quod caudam habeant bifurcatam ad instar forficis: apud Belgas (ut audio) Oor Vuormen, i.e. vermes auriculares, seu potius aures pectentes, siquidem Belgæ existimant in aures irrepere, ut cerebrum offendant. Habitant multum inter uvas, in cavis arborum, foraminibus parietum, sub lapidibus, sub terra. Color eis ferme castaneus, pedes sex, corpus oblongum. Quæ prima pingitur, omnium est vulgarissima, sed nec dum magnitudinem suam adepta.

Secunda rara & insolens, capite etiam bifurcato, corpore crasso, tota subfusca, & flavescent. *Tertia* ejusdem cum proxima speciei, minima, candida. Prima verò in secunda tabula, nescio an è forbicinarum genere (alata enim est) leucomelana, sive nigra & alba, alis expansis. Numer. 2. eadem clausis alis atro-castanei coloris caudam habet, & bifurcatam & ferratam. Num. 4. omnium est vulgarissima. Quinta omnium minima caudâ habet trifurcatam: sicut etiam sexta corpore admodum crasso, magnis & crassis pedibus, tota nigra. Postremo loco pictum insectum, è Gryllorum forte potius, quam Forbicinarum genere, coloris leucophæi, cauda trifida.

Ferrantes Imperatus Neapolitanus diligentissimus ac eruditissimus aromatarius, in naturali sua historia Insectum, quale hic depingimus, *Talpam* nominavit, quod Talpæ more pedibus anterioribus ceu manibus terram effodiat: sunt enim pedes utriusque animantis simillimi. Rusticis Neapolitanis, inquit, Guffulo dicitur, sed cur, non explicat. Nostri rustici vocant Zuccaram, quos ego secutus vermem cucurbitarium nominavi. Siquidem cucurbitas quas Zuccas vocant, summopere infestant. Imperatus hoc insectum hortulanis apprimè odiosum esse ait propter plurima, quæ stirpibus damna infert, earum radices devorando. Insectum est quatuor digitos longum, unum verò latum, habitu, corpulentia fere locustæ. In tria segmenta præcipue dividitur. Caput enim prima sectione ab ea parte, quam pectus liber appellare ventri superstitem, separatur. Hoc Locustæ ora, & faciem fere antè repræsentat, sed oculor. medio quidpiam eminens nonnihil conspicitur, quod nasi vices, & locum tenet. Ocelli utrinque aterrimi splendentes gagatis in modum: sub his duo velut cornicula oblonga tenuia, forsan ad prærentandum iter extant. Extremo rictu, seu fræno alia velut emissicia cornicula, seu appendices in articulos seu internodia quaterna, aut quina ad commodiorem flexum, minora

Q

tamen

tamen superiorib. intra verò rictum ipsum, ac oris lateribus aliæ binæ utrinque appendices, deniq; sub mento utrinque una protenduntur, quibus ut opinor, tanquam digitis quibusdam, alimentum in ore retinet ac complectitur, & forsân comminuit, ita ut partim dentium manus obeant. Terni utroque latere pedes. Primi antici lati, tribus articulationibus compacti, quarum extrema velut in digitulos secta est plures acutos serræ dentes referentes, cristam galli diceret, aut equitis calcar. Media & postica crura similiter tribus constât articulis, sed hæc maiora & in femore crassiora in altum supra tergum elevato medio, seu poplite, anticis longiora, sed minus lata maiora mediis, hirsutie molli infernè. Venter lanosus octo compactus est annulis. Dorsum vestiunt quaternæ alæ, superiores breves, & latæ, aliis angustis longioribus, & ad caudam fere extensis incumbentes. E cauda geminum exit spiculum longiusculum, ac subtile: cum Gryllo Locustæ specie affinitatem quandam habere videtur, estque colore fere per totum subcastaneo.

ARTICULUS VII.

De Sphondyle.

DE Sphondyle seu verticillo (ita dicitur, quod circa radices ita convolvatur, ut verticilli speciem gerat) diversæ occurrunt sententiæ. Plinius serpentem facit. Aristoteles & Absyrtus, domesticæ meminere, quæ selphio similis Hefychio & Camerti ex Aristophane, averſa coit; si retigeris, fugit, & præ metu malè pedet: exiguo eadem corpore & subnigro. *Sylvestris* fit apud Theophrastum mentio. Natura eius nullam radicem etiam acrem intactam relinquere. Agricola eum longitudine & crassitie minimo digito æquat. Capite rubro, reliquo corpore albo, nisi quod superne sit aliquantò, ubi cibo sumpto turget, nigrum, sepe dem, addit. Redit radices cucumeris asini, chamæ-

leontis nigri, centaurii, peucedani, aristolochiæ, vitis sylvestris, &c. Tercio suæ generationis anno formicarum instar prorumpere, & Moguntinensem diœcesin infestasse, Malleolus author est: anno suum ortum sequente in scarabæos maiales verti, Cordus. Germanis *Enger* forte quasi *γγελοι* dicuntur. Anglis Aprili & Majo mensib. plurimum nocent.

De *Differentiis* ita ex sua Observatione & Camerario Mousetus. Habeo penes me sphondylam cruciformem, colore ex cinereo albicante, capite nigricante; tacta veluti sese in sphaeram colligit, & Verticillū foeminarum fuso nentium scitè exprimit: unde nomen. Extra terram torpet, æris impatiens. Vulnerata liquorem emittit dilutius atrum, quo tanquam encausto literas scribere quis possit. Habeo & rubram sphondylam, intra terram ad duorum pedum profunditatem viventem: cui caput nigerrimum, os forcipatum, collum ex luteo rubescens, dorsum cocco infectum, sex pedes anteriores miniatuli, venter reliquumque corpus omnino flavum; nisi lateri utrique iuxta ventrem, octo rubescentia punctula, ornatus nomine addita fuissent. Medium digitum lōgitudine æquat, & vergente ætate in muscam transmutata abit. Vidimus quoque lucidam, corpore crassiore, satis à medio dorso ad caudam cœrulescentem: à collo autem cassi magis coloris videbatur, caput illi flavescens uti & pedes: os forcipatum atque rubeculum. Dum juvenis est, tota candidat corpore: Livor ætatem sequitur, incipitque à cauda. Mirum quomodo corpus in latum longumque; undoso quodam motu sine loci permutatione agit, ac inter movendum colores sæpius mutat. Nam dum in terra quiescit, albicat tota; dum verò agitur, quasi per iracundiam, livescit. Omnino Cossis maioribus simillimum Insectum, quod ad corporis formam attinet; sed illi sese in verticillum agere & torquere nequeunt. Ex isto vermi magnum muscæ genus natum conspeximus, quatuor alis donatum.

Malleol. l. de exorcif.

Mous. Theatr. Ins. 2. c. 6.

Arist. H. A. l. 5. c. 8. Plin. H. N. l. 27. c. 13.

Theoph. H. R. l. 9. c. 14.

Agric. de animalib. subterr.

natum. Aliam denique habemus juxta *caparadices* inventam, eiusdem fere cum livida magnitudinis, capite viridi, albo, Xelampelino, coloribus mixtis notato: nos *Cepariam* vocamus; quarum hic omnium icones representamus. Nunc insuper Ioach. Camerarii de sphondylis sententiam addere placet, cuius mihi iudicium semper integrum. Sphondyli (inquit) forte sunt isti vermes qui in terra inveniuntur, initio Veris, planè candidi, aut potius nonnihil lividi; qui autumnò fiunt obscure virides; & pellucente è cute, pullo quodam succo colorantur: Caput iis spadicum, nigricans & satis durum, ut facile radices arrodere possit. Erucæ statim conglobantur, & moriuntur, aliasq; resumunt formas, muscarum aut erucarum.

Crassitie sunt digiti unius & longitudine sesquiunciali; pedes habent octo in medio corporis, quod caput spectat: nostri vocant Erdtvorme. Guilandinus dicit Sphondylos esse vermes, sic dictos, quod instar verticilli radicibus herbarum circumvolvuntur. Alii etiam vermes, *nigri subrubentes* testaceoque cortice, multis pedibus instar Scolopendræ præditi (cui etiam cognati videntur, nisi quod rotundiores, nec ita lati) reperiuntur in terra eruta prima æstate, eo quo dixi modo (si quis eos tetigerit) convoluti. Engerlin quoque vocant. Germani vermes subterraneos, flavos, nigro capite; juxta quod pedes tenues; in reliqua parte corporis nulli. Hi cum eruti fuerint, in globum se formant, atque Soli expositi statim tabescunt. Vivunt etiam tantum intra terram, & plantarum radices arrodunt. Omnes hi sese conglobantes vermes, quis non inter Sphondylas censeret?

†

ARTICULUS VIII.

De Staphylino.

Staphylinus Sphondylo domesticus, apud Absyrtum, similis est, qui cum nobis ignotus sit, non est mirum, nec tantam Staphylini notitiam esse. Mouferus duo insecta cum suis iconibus proponit.

Absyrt. in Hippiatr. Mouf. Theatr. l. 2, c. 7

Prima tota cum splendore nigricat Blattis non multum dissimilis, sed corpore magis gracili ac longiore. Totum corpus duos digitos transversos vel minus longum, cauda bifurca; quam dum aufugit (fugit autem atq; currit valdè velociter) quasi in sui defensionem elevat, ac duos veluti aculeos candidissimos, breves, extrudit: Verum nec pungere eum vidimus, nec ferire; minoresque & molliores aculei sunt, quam ut penetrare possint. Hos dum per iram exerit, effundit cum iis albam & crassam quandam substantiam, sed humido unguento molliorem. Vivit maxima ex parte subter terram; sæpius tamen inter segetes supra terram conspiciuntur.

*Alter*a quam à Kniveto depictam accepit, quæque frequens in Norfolcia, caput habet parvum, è puniceo fuscum, fere globosum; os forcipatum atque exiguum. Proximè à capite tres utrinq; pedes; quorum duo priores breves sunt, (Erucarum more) quatuor reliqui colore ferè sanguineo, quadruplo longiores. In medio corpore sub ventre octo habet pedes obrutos, veluti etiam Eruca. Cauda tuberosa, & duabus setis bifurca. Venenatam utriusque naturam ex eo didicimus, quod equi duo, dum cum feno eas devorarent, toto corpore inflati interierunt.

Meminit Staphylinorum & Cordus, qui Gallis Courtilles. Inveniuntur in hortis parvi digiti quandoque longitudine, tumulosque elevant, more talparum, in quibus dormiunt. Thymum potissimum & sambucum infe-

infestant; sed non ita, quin aliis quibuscunque herbis plantisque vim inferant.

ARTICULUS IX.

*De Anthreno & Afello
Arvensi.*

REferre huc placet Anthrenum & Afellum arvensem Moufeti. Illud Græci ἀνθρήνον ἀνέγον, alii Crabronem reptilem; quidam speciem Phalangii Plin. pennistantum à Crabronib. differentem. Rostrum illi, inquit Moufetus, aduncum, & forcipatum, vultusque erectus. Noctuum illam cornutam (qualem in Belgio vidimus) plenè exprimit; Oculos habet piceos, pectus hirsutum valde & fulvum; pedes ortu flavi, deinde fusci: octo incisuris ex rubro flavescens, constat reliquum corpus, quas maculæ in dorso Coracinæ valdè ornant. A summo rostro antennæ five cornua emergunt flava, hirsuta, flexibilia, tamen tactu nonnihil dura. Morsum ore infert ægrè curabilem; non ita tamen lethalem, ut Phalangium videatur; nec ita lenem quin Crabronis superet *κακοῦ βίαιον*.

Afellus arvensis ob similitudinem, quam cum afello habet, dicitur. Reperitur inter arvos, segetes, pedum duntaxat numero (quippe sex tantum parvos & nigricantes habet) à reliquis discrepans; Collum illi brevissimum, corpus latiusculum, compressum; cauda aliquantum mucronata. Iulio mense agro Colcestriensi cum Pennius vidit, alias nunquam reperit. Quem in Medicina usum obtinuit, nobis adhuc inexploratum est.



CAPUT II.

De Insectis apteris octopedum:

ARTICULUS I.

De Scorpione.

INsecta aptera octo pedum sunt Nomen.
*Scorpio & Araneus. Scorpium nomen Aldr. Hist. Inf. l. 5. c. 11.
apud Græcos *σκορπίον* τὸ σκορπίον τὸν ἰόν, Mouf. Theatri Insect. l. 2. c. 10.
quod venenum jaculetur; vel ut alii *σκορπίον* τὸ σκαίωσεν, quod flexuose ferpat, nomen invenit. Plinio *Scorpio* etiam, Ciceroni & aliis *Hepa*, Pandeetario *Satocollos* dicitur.*

Animalculum est colore subatro & Descriptio
veluti fuligineo, corpore oviformi, *Capite*, quod in pectoris summitate gerit, latente, *Oculis* tam exiguis ut penè nulli conspiciantur. *Pedes* habet octo: chelis & forcipibus solidis furcata bina *brachia*, ceteris grandiora, fluviabilibus astacis & cancris haud absimilia. Aristoteles quinque bifidulis dentata forcipib. habere scribit. Ex corporis imo, *cauda* producit, globulis multis septem plerumque, aliquando sex, & novem, quorum ultimus, cæteris longior, solus præfixo simplici vel duplicato aculeo, & nonnihil reflexo ad ipsius extremitatem, armatur. Dentem Plinius dixit. De Plin. H. N. l. 11. c. 37.
lingua nescio quid apud Gordonium habebis. Lambere ea cutem dicuntur. Antenui fistula quod Plinio, Nicand. in Theriac. Plin. H. N. l. 11. c. 37.
Æliano, & Nicandro, visum, pertusus fit aculeus, qua venenum ei aculetur, Ælia. H. N. l. 9. c. 4.
autores viderint. Galenus certe negat. Admitti fortè potest, cum & in viperæ sectione, sub dentibus vesicula lateat, è qua venenum, cum mordet, effundere solet. Galen. de loc. aff. l. 6. c. 5.

Loca frigidiora nullos alunt: innoxii qui in Germania & Helvetia habentur. In Italia, Romæ imprimis, America, Persia, inter Susas imprimis & Mediam, Canariis insulis, Numidia, Scythia, Pescara, Barbaria, Æthiopia, India Orientali prope flumen Locus. Strab. Geogr. l. 16. 17. Plin. H. N. l. 5. 7. c. 1. 3. 16. 29.

Ælia. H. A. men Estamenum, tanta multitudo, ut incola solum vertere necesse habuerint. Plura in differentiis occurrunt. Sub lapidib. & in parietib. plarumq; latitare solent.

Vitus & Generatio Terra vivunt, & aliquib. in locis, herbas, lacertas, aspidas, verticillos, & blattas comedunt. Non coire, sed nimio Solis calore procreari, apud *Ælium* habemus. Per putrefactionem ex paguris, Crocodili cadavere, *sifymbrio*, *ocymo*, & si Alberto fides, lignis putridis, nasci, dubitari non debet: per coitum, & quidem vere & autumno, sapius undenos, Moufetus author est. *Vermiculos*, inquit, quod vidimus albos, vivos, ovorum specie pariunt & incubant: mox ut prolem perfecerunt, pelluntur ab ipsa, interimunturque magno quidem numero. Antigonus fœtum ab ipsis devorari arbitratur, unum modò solertissimum relinqui, qui ipse marris clunibus imponendo, tutus & à cauda & à morfù fiat: reliquorum hunc ultorem, & supernè parentes conficere.

Natura & Mores. Non nisi pilosas partes attingunt. Cum incedunt, transversos sese inferunt. Propter longitudinem enim pedum posteriorum, quos in vacuum ponere necesse habent, ingressionis corrumpitur quadratura. Nunquam mansuescunt, quod Galenus prodidit. Vnum per viginti duos dies in oleo vixisse, & in imo vasis ambulasse, Alberto author. Quid, in fœtum committant, & ab eodem vicissim patiantur, paulò ante dictù. Umbram solis declinantes, umbram petunt: nec nisi calcati, prodeunt & aculeos exerunt. Capite abblandiuntur prius, ut cauda commodius feriant. Nec Iſidis sacerdotes circa urbem Copton lædere, nec Pſyllos, apud *Ælium* invenies. Porci nigri percussi, omnino moriuntur: non nigros ab ictu liberos dicunt. In *Æthiopia*, qui eor. excrementa calcavere, ita pedib. exulcerantur, ut vix convalescant. Nulli animalium nocere, cui non sit sanguis, reliquit quidem *Plin.* sed *Wolphius* cum vipera, conclusum, mutuis periisse vulnerib. vidit. Cum omni virulentorum insectorum genere, escæ

causa configere, *Ælian.* author est. *Æl. l. c.*

Pestis importuna veneni, nisi quòd *Venenum* & Medela. graviore supplicio lenta, per triduum morte conficiunt, virginibus lethali semper ictu, & fœminis ferè in totum, viris autem matutino, exeuntes cavernis, priusquàm aliquo fortuito ictu egerant venenum. Constat eos, quib. *Plin. l. 12. c. 25. & l. H. N. 11. c. 25.* septem aut novem caudæ internodia fœviores esse: plurib. enim sena sunt: feriunt obliquo ictu & inflexo. Venenum omnib. medio die, summa item ætate exasperatur, cum incanduerè solis ardoribus: itemque cum sitiunt inexplebili potu. Maximè exitiales sunt, si suū genus adeant, antequam noceant. Incurabile venenū, si ictus eo die ocimum comederit. Non sentiunt puncti dolorē, si manu cnicum tenuerint. Symptomata varia affligunt. Locus affectus inflammatione corripitur, indureſcit, intēsius rubet, vicissimque dolore premitur: modò æstuat, modò frigore corripitur. Vulneratum affligit sudor & tremor. Extrema frigescent, inguina attolluntur, flatus per sedem prorumpunt, capilli eriguntur, facies distorquetur, &c. Dodonæi famulus tam frigido sudore perfusus erat, ut argentissima nive se opprimi quereretur, &c. Infinita contra ictū apud auctores prostant remedia. Ex herbis sunt Absynthium, Abrotanum ex vino pota; Amomum, Ammi, Anisum, Allium, Aristolochia, Asphodelus, Asa fœtida, Attractilis, Attriplex, Blitum, Caltha, Calamintha, Cæpa, Cætaurea, Chamæpitys, Colocynthis, Cyperus, Galbanum, Hordeum, Iris, &c. Ex fruticib. Balsamum, Myrtus, Paliurus, Rosa, Rubus, Laurus, Morus, Thus, Vitis. Ex anim alib. Sputum humanum & urinā, Mumia, Ranae fluviatiles, Coracini pisces in Nilo, Scorpio deniq; ipse tritus, & cum sale, lini semine & althæa impositus. Tacco composita, quæ ap. Diosc. *Plin.* Rhafen, Albucaſin, Oribasium, Serapionem, Sylvaticum, & alios extant, & à Moufeto ac Aldrovando collectæ sunt. Villanov. herbam trinitatis, cum succo radicis ebuli, & vino, tanquam unicū remedium commendat. Ioh. Arden. Chirurgus

rurgus Anglus præsentissimum ait, si tres quatuorve sanguinis guttæ juxta vulnus extrahantur, eodemq; vulnus statim illinatur. *Fugantur* suffumigio ex sulfure, galbano, & ungula asini.

Plin. H. N. l. 20. c. 4. *Non egrediuntur*, si raphanum incisum cavernæ imposueris. Rhasis radicem enulæ gestatam laudat, &c. *Torpescent*, si delphinium herbam subtraveris. *Necantur*, si raphanum commassum, basilicum latifolium, in aqua nascens, aconitum, helleborum nigrum,

Plin. H. N. l. 35. c. 19. *Antipathia* habet. Scorpionem & Crocodilum, simul atque alter alter. conspexerit, in mutua funera sponte rapidi ab Ægyptiis proditum. Stellionem, visu quoque pavorem ipsi inferre, & torpore infrigidi sudoris. Cum sol in Cancro est, serpentes ictib. torquere. A vipera devorari. A vespis, apib. & crabronib. non attingi, qui à scorpionib. percussi sunt. Reviviscere mortuum ajunt, si quis helleboro candido linat.

De odio inter eos & aconitum, ita

Plin. H. N. l. 27. c. 2. *Plinius. Hoc quoque tamen in usus humane salutis vertere. scorpionum ictib. adversari experiendo datum, in vino calido. Ea est natura, ut hominem occidat, nisi invenerit quod in homine perimat. Cum eo solo colluctatur, velut pari intus invento. Sola hæc pugna est, cum venenum in visceribus reperit: mirumq; exititaliaambo cum sint, duo venena in homine commoriuntur, ut homo supersit. Imo verò etiam ferarum antiqui remedia prodiderunt, demonstrando, quomodo etiam venenata ipsa sanarentur. Torpescent scorpiones aconiti tactu, stupentque pallentes & vinci se consentunt. Auxiliatur eis helleborum album, tactu resolvante: ceditque aconitum duob. malis suo & omnium, &c.*

Ufus in Medicina. Galen. l. de Theriac. ad Pison. c. 9. Magni est in calculo atterendo & pellendo usus. Combuitur aquibusdam, & cinis cum pane felicissimè exhibetur. Alii Olea conficiunt, inter quæ laudatissimum & mirabile, quod Matthiolo debemus. Habetur & apud lanum Damascenum confectio.

Differentiæ. *Differentiæ* Scorpionum, à forma, sexu, loco, quantitate, colore & viribus sumuntur. Formam si respicias est 1. *Gibbosus*, cauda pro corporis pusilli ratio-




ne magna, quam post se convolutam trahit. Pallidus videtur: sed aculeus admodum productus albescit. Omnium celerrimè, & calidum solum, venenum infundere, prodiderunt Arabes. Ad ictum, calor corporis in singulas ferè horas variat, & ex viridiflavo, albo, rubidoq; alteratur: acuta febris affligit, lingua tumet, urina sanguine tingitur. Remedia vide ap. Mouf. 2. *Caudati* & non caudati, & vel unum habent aculeum vel duos. Qui paguros imitantur, splendescunt colore, & eadem quæ alii inferunt accidentia. 3. *Alati*, quos Mauritania alit, Lybiam dicit Lucianus. Alis sunt tenuib. ut Cicadæ. 4. *Non alati*, quos ibidem inveniri Strabo asserit. 5. *Paguror. & cancror. instar*, qui splendescunt colore sunt, & eadem quæ alii accidentia inducunt, vide infra in Differentiis de colore. 6. *Septem vel octo nodis*, qui se vires. Sex qui benigniores. 7. *Caudati* qui vel unico mununtur aculeo, vel duplici. *Excandes.*

A Sexu sunt 1. *Mares* graciliores, 16. *Plin. H. N. l. 11. c. 25.* maiores, ventre, chelis & spiculo maculatiores, qui venenum habent infestius. 2. *Feminae*, quæ maiores, pinguiore, vetricosiores, placabiliores.


A Loco sunt 1. *Pescarensis*, in Afr. à qb. ictu continuo moriuntur. Idè cives relicta temporis ætate urbe, ruri ad Novemb. usq; mensem commorantur, si Leoni Africano fides. 2. *Ægyptiaci*, qui maximi, & statim interficiunt. 3. *Lybici*, qui vel terrestres, multis corporis vertebribus insignes, vel volatici, de quib. antehac. 4. *Americani*, omnium minimi, sed maximè virulenti, si Africanos demseris. 5. *Castellani*, quos agricolæ, dum terram aratro scindunt, formicar. more congregatos, inveniunt, ubi per hyemem delitescunt.

A Quantitate. 1. *Minimi* sunt Americani. 2. *Maximi* Africani, & illi qui in India Orientali.

A Colore septem sunt apud Nicand. *Alia. H. N. l. 5. c. 26.* genera. *Primum* albicat, & minimè est lethale. *Alterum* ore est rufescente: ad ictum, vehemens ardor, febricitatio, & sitis intolerabilis sequitur. *Tertium* luridum & nigricans, cuius ictus inconstantem membror. ictum facit, cachin-



Aranei Spinnen Aldrov. Tab. 1.





cachinnumq; Sardonicum. *Quartum* colore ad viride inclinante. Adiectum frigus & horror invadunt. Septena aut novena habet internodia. *Quintum*, lividum pallidumq; est, amplo & distento ventre. Vescitur herba: & dente quoque mordet. Virus ejus Nicander βεβρωσιν vocat, quod ab ipso vulnerato, homini bubo intumescit. *Sextum*, & *septimum*, ad differentiam ex forma pertinet. *Illud* cancro marino littorali simile est, corpore grandiori, orbiculari. Matthiolus nigros, ferrugineos, virides, in Arcinonenſi comitatu vidit. *Hoc* ad Paguror. formam accedit, ex quib. in sicco cavernam aliquam ingressis, & postquam mortui sunt putrescentib. oritur. *Ælianus flammeum* vocat: quod pagurum coctione rubentem æmuletur.

A viribus sunt 1. *Noxii*, de quibus in præteritis. 2. *Innoxii*, quales sunt in Noricor. subalpinor. regione, Pharo, Avaniensi territorio, Helvetiæ agris, & Germaniæ regionibus.

ARTICULUS II.

De Araneo.

PUNCTUM I.

De Araneis in genere.

ARaneum, seu Araneam, lĩd. quasi ab aëre nutritam & natam esse vult, perperam. Sollicitè muscas capere scimus: scim⁹ & coire, & ova ac vermiculos excludere. Melius cum Becman. ab Ebr. ארנא textūr deducas. Græc. ἀράχνη & ἀράχνης, ἀράχ τὸ ἀραχία ἵχνη ἔχειν: ἢ ἀράχ τὸ εἰς τὸν ἀερα ἀρεῖν τὰ ἵχνη, dicitur. Alii μυοχαῶτην muscatricem, Kiranides θήραφον, Hesych. σιβὴν vocat. Οἱ λυδοὶ quoque nonnullis araneus, φάλαγγε & φάλαγγιον pro araneo quovis sumuntur, *Lydiam* & *aridam* Juvenalis vocavit. Illam propter Arachnen puellam, quæ in hoc insectum à Pallade immutata dicitur. Hanc, quod telam aridam texat. *Audax* est Claudiano, quod cum Pallade congredi ausa fuerit.

Caput omnibus minimum, excepto uno, quod grandissimo capite Plinius esse dixit. Omnibus terna in cruribus internodia, quibusdam bini pedes

prelongi accedunt. Nam omnes eiusdem longitudinis habere, diversitas operarum innuit. Quibusdam fila quæ neverunt, attenuant, & in longum protrahunt: aliis eadem in telam deducunt, ac invicem conjungunt: aliis denique per eadem prorepunt, & cum volunt, ex iis ceu immobiles se suspendunt.

Nulla ferè non regio Araneos alit. *Locus*. Gaudentius tamen Merula in vetusta prope Gratianopolim in Gallia curri non inveniri, immisos emori, author est. De *Phalangiis* in Differentiis agitur.

Vicitant muscis, asilis, tabanis, vespi- *Vitus*.
spis, læpè & parvis Lacertis. Nihil conficere vel recondere, author est Aristoteles. Quicquid ceperint, foras sugendo evaporare. Filo suspendere, alii existimant.

Ex feminib. aëriis situ & corruptione putrefactis generari inde colligere licet, quod novissimæ ædes, primo ferè quo dealbantur die, eorum corporib. telisq; scatent. Propagatio plurimque coitu fit, cujus actio & desiderium fere totum ver durat. Tum

retis mutua & repetita attractiuncula, venerem quasi accendunt: continuo inter trahendum propius accedunt, tum deniq; averſis clunib. quia ille coeundi modus, (ob globosam corporis formam) maxime erat conveniens. De Partu ita Aristotel. Parit *Arist. H. A. l. 5. c. 22.*
*vermiculos pusillos primum. Totius n. mulatione sunt, non ex parte. Subrotundi per initia sunt: cum peperit, incubat, ac figurat trib. dieb. In tela sua parit omnes: sed partim in tenui & brevi, partim in crassiore, & alia insinuata: nonnulla etiam aliqua ex parte circumdantur à tela. Non omnes aranei simul generantur: statim nati & saliant & filum emittunt. Humor idem in vermiculis attritis, & in juvenculis araneolis: quippe crassus, candidus. Circiter quater septenis diebus absoluti sunt. Vifa *Plin. H. N. l. 11. c. 48.*
ova multa, modica, livida, exiguis maculis aspersa, mollia, viscida. Visi & ex unico ovo multi prodeuntes fœtus, tam exigui, ut vix oculis percipi queant. Visus deniq; sub captæ araneæ alvo, magnus ovorum, adeò exiguor. ut atomis comparare licuisset, Aldrov. l. 6.*

candidorum, & quæ digito compressa, crepitum excitabant, cumulus.

Antipathia.

Plin. H. N.

l. 11. c. 24.

Cum stellione, lacertis, & serpentibus. dissident. Lacertor. catulos venantur, hos primum tela involventes, & tunc demum labra utraq; morfu apprehendentes, amphitheatrali spectaculo cum contigit. Librat idē verba sunt Plinii, se filo in caput serpentis porrectæ sub umbra arboris suæ, tantaq; vi morsus cerebrum apprehendit, ut stridēs subinde, ac vertigine rotata, ne filum quidem desuper pendens rumpere, adeo non fugere queat: nec finis ante mortem est.

Plin. H. N.

l. 8. c. 24.

Plin. H. N.

l. 11. c. 24.

De Prasagiis hoc habet: ruinas imminentibus. cum telis primos cadere: incremento omnium futuro, telas altius tollere, & quia sereno cœlo non texunt nubilo texunt, multas araneas imbrui signa esse. Sub Leuctricæ pugna tēpus, albas circa templi valvas texuere telas: adoriētibus. fines Macedonibus. nigro opere omnia cōplevere.

Pausan. in

Bæoticis.

Ingenium.

Arist. H. A.

l. 9. c. 39.

Plin. H. N.

l. 11. c. 24.

Ingenium solum texturæ artificium testatur, quod in tertio genere post Aristotelem Plin. elegantissimè describit. *Orditur, inquit, telas, tantique operis materia uteris ipsis sufficit, siue ita corrupta ab vi natura stato tempore, ut Democrito placet; siue est quædam intus lanigera fertilitas, tam moderatō ungue, tam tereti filo, & tam æquali ducit stamina, ipso se pondere usus. Texere à medio incipit, circumdato orbe subtegmina (νεῶνα) annexens: maculasque paribus semper intervallis, sed subinde crescentibus, ex angusto dilatās, indissolubili modo implicat. Quanta arte celat pedicas scutulato rete grassantes, quam non ad hoc videtur pertinere cribrata pexitas tela, & quadam politura arte, ipsa se tenax ratio trame? (villosa & lanuginosa filor. natura) quam laxus adflatus non ad respuenda quæ veniunt finis: derelicta laso præterenti summa parte, ut arbitrari licet illa quæ difficile cernuntur: atque ut in plagis linea offensæ precipitant in sinum? Specus ipse qua concameratur architectura, & contra frigora quanto vilosior? quam remotus à medio, aliudque agendi similis? inclusus vero sic, ut sit nec ne, intus aliquis cerni non possit? Age firmitas quanta irrumpentibus. venis? quapulverum mole degravante. Latitudo tela*

sapè inter duas arbores, cum exercet artem & discit texere: longitudo fili à culmine ac rursus à terra per illud ipsum reciprocatio, subitq; pariter ac fila deducit. Cum vero captura incidit quam vigilans & paratus ad cursum? licet extremum hæreat plagii, semper in medium currit: quia sic maxime totum concutiendo implicat. Scissa protinus reficit ad polituram sarcians. Namq; & catulos lacertar. venantur: hos primum tela involventes, & tunc demum labra utraq; morfu apprehendentes, amphitheatrali spectaculo cum contigit. Fæminam putant esse quæ texat, marem, qui venatur, ita paria fieri merita coniugio. At Aristot. fæminam & venari & texere scripsit. Flandris ideo similes Scaliger facere dicit, qui otiose agitant: mulieres negocia exercent. Novam verò telam mane & vesperi texit: illudq; tam firmum, ut ex alto se filo demittens, parieti vel arbori adeo affigat, ut ne ab imbre vel ventis detrudatur. Mango- Arist. l. 6. c. 2. de imo loco se suspendit, ut inde bestiolæ irretiantur; minor superiorem loco excubat, in exiguo se telæ foramine occultans. Sensus esse exquisitissimi vel exinde colligas, quod in medio suæ telæ residentes, Muscam in remotissimam etiam partem impegisse sentiant.

De Nocumētis & Remediis in Difficiliis exacte agetur. Oleis & vitibus sunt inimici, domosq; conspurcant. Demorso penis erigitur. Si quis casu devoravit, vinum mellissæ superbibat necesse est. Prodest & resina abietis sumpta. Morsui allium cum ruta permistum & ex oleo tritum feliciter superimponitur. Huic emplastr. de muscis, adeps humanus, sanguis testudinis, cinis unguis arietinæ, stercus capræ dissolutum, cerebrū capi cum pip. in vin. dulci sumtum, &c. faciunt.

In Cibis ap. quosdam fuisse admiratione non caret. Fit cuiusd. meretricis tempore Alex. M. quæ à juventute araneis nutriebatur mentio. Meminit & Albert. Colonienf. cuiusdam puellæ. Sed & Heroïna quædam ap. Anglos, teste Mouf. eis non abstinebat. Notat & Cardan. triennem, in Medicina haud contemnendi sunt uti- sus tam aranei, quam telæ. Aranei faciunt

Scalig. ad

Arist. H. A.

l. 9. c. 62.

f. 203.

Mango- Arist. l. 6.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

c. 2.

ciunt ad *quartana* avertionem, si alutē vel nucisputamini inclusi, lacerto aut collo appensi fuerint: quod per experientiam verum fuisse scripsit Pen-nius. *Ad auri dolores*, si oleum cui in-cocti tres auri immittatur, vel succus eorum exprimatur. Plin. aceto mace-rari, conteri, & cum croco immitti debere scribit. *Ad uteri suffocationem*, si ceratum ex iis confectum umbilico superponatur. *Ad suppressam alvum*, si cum filo descendens, sinistra manu apprehensus & contritus, umbilico appositus fuerit. *Adstringi* ajunt, si af-cendentem ita adhibueris. *Ad Con-dylomata*, si dempto capite pedibusq; infricetur, &c. *Tela* adstringit, refri-gerat, siccatur, glutinat, & nihil putre-scens diu subesse permittit. Ideo hæ-morrhagias, dysenteriam, & alios flu-xus sistit. Emplatri febrifugi compo-sitionem apud Strobelbergerum in-greditur. Cum oleo imposta, articu-lorum vulnera consolidat. Ingredi-tur unguentum contra serpigines. Condylomata, alligata absumit. *Verru-cæ* si rudior in pilæ formam convo-luta, & verrucæ imposta, accenda-tur, & in cineres ibidem redigatur. Paratur apud Ægyptios ex multis a-raneis & telis medicamentum, cum oleo rosaceo linimenti instar: vel ara-neas in ipso oleo incoquant, quo cali-do carpum ambar. manu inungūt.

PUNCTUM II.

De Araneorum Differentiis,
& primo de Innoxiiis.

DE Araneis dicturis occurrit Mou-fetus. Hic enim Araneos elegan-ter, in *Noxios* seu Phalangia & *Inno-xios* qui vel *Domestici*, vel *Subdiales*, di-stinguit. Utrosq; denique in *Retiarios*, *Telarios* & *varios* dispescit. Omnes cum ætate maiorem acquirere periti-am; lanis inclusos, pinearum gene-rationem augere, & senectutem quo-tannis sapius exuere addit. Apud A-ristot. tria habentur genera. *Primum* mordax: *alterum* luporum: *tertium* e-rudita operatione conspicuum, de

cuius tela superius diximus. Aristot. σφόνδατον καὶ γλαφυρότατον, sapientissi-mum & elegantissimum dixit. Aldro-vandus à se observatos duabus tabel-lis expressit. Nos, ne quisquam omit-tatur, utrumque coniungemus.

Ex *innoxiiis* ergò, de *Domesticis* jam in genere ex parte actum est, qui o-mnium maximi *subdiales* à rapacitate, venatorum, & Lupor. λύκων nomen accepere. Hor. minimi non texunt: qui verò maior est, asperam parvamq; telam apud terram aut sepes orditur. Cavernarum exigua vestibula præ-tendens, & primordiis telar. intus po-sitis, observat dum aliquid in tela of-fendens commoverit; mox accurrit ut capiat.

Ex *Retiariis* unum maximum vidit Moufet. *Corpus* illi spumæum ovali ferè figura. *Caput* sub ventre exiguum & forcipatum. *Dorsum* variis maculis candicantibus ornatum. Brevi tem-pore à pisi magnitudine ad eam cras-sitiem ascendit. Interrosar. ramulos autumnò rete expandit, & muscas, culices &c. mira dexteritate fune ar-tracto illaqueat.

Telarii vel *subtilem* telam texunt, vel *mediocre*m, vel *vilem*, *crassam*, ru-dem & deformem. *Priores* sunt Do-mestici, ex quibus unius, fusci colo-ris, & cuiusdam si inter oculos solem-que ponatur pelluciditatis. Ex illis qui *Mediocre*m texunt est Agrestis seu *Sylvestris*, qui in sepib. cum sago lin-teamen expandit. *Corpus* ipsi fuscum, leniter hirsutum. *Pedes* polymiti, ni-gris & albis maculis seriatim varii. Os forcipatum, acetabulis munitum. Puncta in capite supra os duo, albi-cantia, forte oculorum vice. Tela ne pluvias quidē transmittit. *Filum* du-cit & quasi in fasciculum colligit hic *Campestris*. Pennius eum in Colce-strensi agro inter Origanum muscis insidiantem observavit. *Corpus* est globi æmulum. *Dorsum* quindecim maculis notatum. *Annus* quadrangu-laris & nigra. *Pedes* proximo descri-pro similes.

Huc spectant tres *Subdialium* spe-cies. In murorum rimis degunt. Sor-didam & parvam telam texunt, &

extra speluncam spe prædæ longè vagantur, eandemq; correptam in antrum trahunt. *Maximus*, inquit Mouf. fusco est colore, caput illi quasi ovale, corpus globosæ ferè rotunditatis, utrumque latus duæ parvæ ac breves lineæ albæ exornant, circa medium dorsum colore est magis albicante: pedes habet ex nigris fuscisq; maculis pulchre varios. *Medius* minor est tinctura *grisea*. Spinam albæ tres quasi margaritæ illustant, quar. quæ collo proxima, maior & longior. Tertius *nigrior* videtur, dorso crucem gerens transversam, rectangularem altissimam, ideoque à quibusdam Sanctus vocatur. Eluporum hos esse genere conjicio, quia currunt cum saltu quodam, & voracitatem miram produnt, nihil enim in crastinum reponunt, sed omnes uno die prædas absument. Cinereum huius generis vidit Gesner.

Moufet. l. 6. p. 234. Ex variis sunt *Longipedes Nigri*, *Albi* ex *atro rufescentes*, & *Rubri*, de quibus idem Moufetus ita. Sunt præterea Aranei *Longipedes* inordinatæ rudissimæque telæ artifices. Campestem corpore ferè globoso & fusco, graminicolam, ovisequū, Angli Shepherd sive opilionem nominant, vel quia ovium consortio gaudet; vel quòd agros illis refertos, pastores noxa & veneno carere (est enim & ipse tam intus quàm extra sumptus, animal innoxium) existimarunt. Sunt adhuc plures Araneorum species. Est enim araneus quidam *niger* breviusculis pedibus, ovum sub ventre niveum secum portans & celeriter currens; rupto ovo araneoli multi egrediuntur, qui cum matre ad pastum omnes unà procedunt; vesperi verò parentis dorso conscenso requiescunt. Hunc verrucis asperum credidit Pennius, donec stipulæ contactu araneolorum descensum planè viderat. In putridis quoque & cavis arboribus Aranei nigerrimi, magno corpore, pedib. brevissimis, cum Afellis & Iulis habitantes. Vidimus item (inquit Gesnerus) totos *albos*, compresso & latiusculo corpore, in flore Oreoselini, in rosis

atque in gramine, pedes illis tenuissimis longissimi, os macula, latus vero utrumque rubicunda linea notatur. Venenatum credit, quia certopithecum ejus esu penè exanimem vidit, & vix oleo infuso liberatum. Novimus quoque oblongo corpore araneos & acuta cauda ex *atro rufescentes*, veluti etiam *virides*. Sunt & *rubri* duum generum. Vnum majus in terræ cavernis tantum habitans, pectore miniato, pedibus ex rubro flavescentibus, cauda atque ventre ex fusco colore ad flavum nonnihil tendentibus. Aliud genus valde minutum, reduvio ovili minus, (intense veluti ex Cocco) rubens. Sex tantum pedes habet, ut monstrum aranei referat: caput illi araneis simile, sed parvum valde. Intra terram habitat, rudissimam telam operans, & indigestam; quandoque foris oberrat, & in præda captanda magnam agilitatem monstrat.

Aldrovandus suos duabus, ut dixi Differentiæ ex Aldrov. de Inf. l. 5, c. 12. tabellis expressit. In *priore* viginti & unum delineat. *Prior* è parvorum genere est, corpore crassiusculo ac oblongiusculo, pedibus octo instructus, totus cinereus, parvam textit telam, araneum lautum vocant. *Secundum* pictus minimorum generis, totus est viridis, Araneus pratenfis nuncupatus. Numero 8. Araneus est pedibus brevibus, totus subcastaneus, asultim ingreditur, arbitrorque eum esse, quem Pulicem Aristoteles nuncupavit. Eiusdem generis est, eiusdemque coloris, qui *quarto* numero datur. Ex minimis est *sextus*, campestris, rotunda albo, alboq; pectore vero castaneo, tribus albis notato punctis; cum totidem nigris notetur alvus: pedibus tenerrimis, longiusculis, telam textit oblongam, in medio, quo residet, rotundam. *Septimus* totus viridis, & ipse pratenfis, protenso corpore, & acuta albo, lineis candidissimis quinque insignita. *Octavus* ex minoribus est, brevissimo corpore, albo admodum orbiculata, crassissima proportionem corporis,

poris, pedibus mediocris longitudinis, totus nigrificat. *Nonus* corpore maximo, at brevi & compacto, adeo ut vix pectus eius sit conspicuum, figura marsupium æmulatur, totus ruberrimi coloris. *Decimum* lautum quoque dicunt, alvum habet bifidam, qualem in aliis non invenias, pedes verò qui hirsuti sunt, illius quã pictor expressit proceritatis ac crassitie. Color ei cinereus, maximè in pedibus, corpus enim non nihil ad castaneum inclinat, & punctulis candidissimis undique maculosum est, *Vndecimus* quasi triangulari alvo, totus flavescit, quemadmodum *duodecimus* huic postremo congener, totus candidat. *Decimus tertius* albo, & cinereo fusco varius telam texit, parvam, rotundam & subtilem ex mediocrium genere. *Decimus quartus* admodum exiguus, rotundus, coloris flavi, longissimos habet & subtilissimos pedes, agros colit. *Decimus quintus* corpus habet rotundum, videturque pectore careere, colore est subluteo & subviridi, maculis tortuosis, serpentium gyros æmulantibus varius. *Decimus sextus* idem forte est, licet paulo minor. *Decimus septimus* pratenis est, corpore procero, pectore candido, alvo flava, pedibus crassis, quorum penultimi cæteris paulò sunt breviores, nulla in omnibus apparent internodia; antennis caret. *Decimus octavus* sextantummodo pedibus instructus folliculum texit candidum, sicuti in expresso hic mori folio videre licet, unde aranei generis esse vix credo, corpore Araneis simile animalculum est, cinerei coloris. Numero 20. expressus ex minimorum genere, colore ex castaneo, lineis duabus flavis per alvum notatus. Postremus in hac serie, capite, pedibus, & pectore a terrimis, alvo ex albo cinerea ad maiorum genus redigitur. E phalangiorum genere videtur.

In secunda tabella novem sunt aranei. *Primus*, terrestris quoque dici potest, quia terram habitat è Pulicum genere, salitenim. Corpus habet breve & breves etiam pedes, ex cinereo fuscus totus. Secundus huius ordinis

corpore est atro, albo variante, grandi capite, candicante, brevibus antennis, pedibus cinereis. Tercius exiguus, subalbidus ad luteum vergens, maculis variegatus nigris. Quartus araneus fœmina prolem tergo ferens, sed ea orбата: corpore procero, pedibus crassis, crassissimo item pectore. *Quinto* loco exprimitur ejus fœtus. *Sextus* idem forte qui quintus, prole tam numerosa onustus, ut quadam hirsutic villosus esse videatur. Proliger dici potest, color ex leuco-phæo ad atrum vergit: *Septimo* & *octavo* loco pictus Araneus prono & supino corpore, ὀχρὸν λέγεται dici potest, atro enim & luteo variat. *Nonus* est ex minimorum genere totus flavus alvo triangulari.

Addamus hic *Indicos*. In Cumana adeò firmas telas texunt, ut difficulter dirumpantur. Alibi adeò virides ut serico ejusdem coloris æquari possint. In Hispaniola ipsi aranei pilas luforias corporis magnitud. æquant, si Oviedo credimus. In *Brasilia* sex species observavit Marcgrav. *Nhamduin*empe, *Elegantissimum*, *Elegantissimum similem*, *Faba magnitudine*, *Muscar. magnitudine* & *Pisi quantitate*, quos etiam ita describit.

Marcgr.
Hist. Bras.
l. 7. c. 2.

Nhamdui Brasiliensis, araneus magnitudine Cicindela, clypeum in dorso gerit triangularem, splendidissimum, in laterum circumferentia sex conis acutis præditum albi coloris, cui brunnæ maculae immixtae. Ad os habet denticulos duos & splendidi coloris, incurvatos.

Elegantissimus Cicindelam superat magnitudine, corpus vix semidigitum longum; anterior ejus sectio minor continet crura octo, duobus internodiis constantia, ferè digitum longa, ex flavo & brunno variegata. Posterior sectio maior: prior tota argentea, splendens: posterior ad medietatem etiam tota argentea, & in hac ponendo posteriorem partem deorsum, quasi facies humana egregie apparet, quasi sculpta & argento esset obducta: reliqua medietas quasi ex argenteo & brunno glaciata. Similis quoque mixtus color in inferiori

riori corpore. Inveniuntur & duplo maiores.

Elegantissimo similis, maior est eo. Anterior sectio corporis parva, magnitudine seminis cannabin. sed paulo longior; posterior avellanâ maiorem æquat: & anterior sectio ut & posterior ad medietatem argentei coloris splendidi, ultima posterioris medietas flavi & maculis duabus argenteis notata, in quolibet latere una; ceterum in flavo illo subtilibus lineis fuscis variegato, varia sibi imaginari quis potest. Crura octo variegata ex pallide flavo & fusco omnia in anteriori sectione: tenacula adhæc duo prope os eiusdem coloris. Telam facit more cæteris communi.

De *Araneo fabæ magnitudine* hæc habet. Araneus alius fabæ magnitudine, frequentissimus in ædibus: Prior corporis sectio subrotunda æquat pisum, altera longior & fabæformis. Crura habet octo, in quolibet latere quatuor, sesquidigitum longa, tribus internodiis constantia & quartum est insertio in corpus. Anterius etiam duos propedes habet, vix quartâ partem crurum longos, quibus apprehendit: duos denticulos nigros, ut maximus. Totus est coloris ex flavo, albo & saturato rubro instar holoserici fusci detriti: pilosum corpus, uti & crura. In superiore corpore magnas habet maculas nigras: crura quoque per intervalla punctulis nigris notata. Hi quoque Aranei cutem exuunt, ut maior ille. Fœtus in orbiculari folle sub ventre progenerant. Noctu texunt. Reperiuntur & huius speciei dimidiæ magnitudinis.

Araneus paulo maior muscis vulgari- bus, cinerei coloris, hirsutus instar holoserici. In lateribus nigro serico vestitur. Crura habet sex, brachia duo, quibus apprehendit, cinerei in totum coloris, punctulis nigris.

Araneus pisi quantitate, testa clypeata sexangula argentei coloris, cum maculis nigris elegantissimis regitur. Capitulum & crura sunt nigra.

Placet & Hernandi Araneos proferre, quor. undecim habentur genera. *Primum* genus *Teacoltocatl* seu *Nier. H. E. stercoris araneus* vocatur, mediocri corporis magnitudine & colore, inter nigrum & fuscum constans. *Secundum* quod maius, *tocamaxacualli* dicitur eodem colore. *Tertium* *tocatl zintlatlauhquei*, minus prædictis, ac nigri coloris, valde venenatum, & quod contusum ad motumque dicatur lateris sedare dolorem. *Quartum* *tzintlatlauqui* huncupatur, quod etsi toto ferè corpore nigrescit, macula tamen rubea insignitur. *Quintum* dicitur *tocamaxacual* corpore magno, fulvo atque hirsuto, difficile sanabilia infligit vulnera, quæq; (si cicatrice obduci contingat) aliis atque aliis locis renoventur, eademque non morsu aut ictu excitata, sed incessu, confricatione & redditis alvi excrementis. *Sextum* omnium maximum *tlalhocheatl* coloris nigri pallefcientis atq; cinerei est. *Septimum* *ocolotocatl*, ita nominatum, quod tigris pellem colorum quadam varietate tenus imitetur. *Octavum* est *Hoitztocatl* seu araneus spinosus, morsu dementat, superiore & media corporis portione ater cætera luteus, forma aculeata & similis tribulo, inde impetravit nomen *Hoitzli* spina est. *Nonum* *atocatl* seu araneus versans in aquis, rubro, aureo, & nigro variatum colore telam ducens magna ex parte, vitamq; agens juxta plantam vocatam ab incolis *metl*, levissimi atque innocentissimi ictus, mirum qua dexteritate opus peragat, filis hinc atque illinc distractis, & in orbem velut circino quodam compositis staminibus, deinde verò intexto atq; stipante subtegmine. *Decimum* excellit columbinum ovum *ahoachtocatl*. Alii qui *tlalhocho- catl*. dicunt. In tanta mole nullius veneni est. Aliæ apud Caribes araneæ exæquant dimidium malum citreum sed crurib, exiguis. Dentes illis longi & acuti. Elaborant telam satis constantem (posset fœminis pro calanticis servire) & cum ora seu fimbria texunt. Ablui potest & alba redditur. In aliqua-

Nier. H. E. 1. 13. c. 28.

Idem l. c. c. 25. 26.

Idem c. 27.

Mayep. l. c.

aliquat. telis si passer incidat aut alia

Idem c. 25. volucris irretietur. *Vndecimum* Lava-
lava, Aranei parvuli sunt, aureique,
& punctis rubris distincti. Vulnus est
noxium, ictusque agit in insaniam,
Nieremb. 1.
6. cap. 24. membrisq; subinde stuporem indu-
cit, non sine anxietate & dolore. Pre-
sidium est tubæ prioris tambalaguisæ
& pilipoc singulorum tres obolos tū-
dere, atque ex vino palmarum reso-
lutos deglutire, aut oleum cuius mi-
xtionem narravit Franciscus Her-
nandus inter plantas novæ Hispaniæ,
illinere vulneri. Cavendum tamen
primis tribus diebus à potu; aut si bi-
bendum sit, vinum palmarum aut no-
stratum, quod præstantius est sumen-
dum; præterea ab aëre & sole. Vi-
vunt in pratis herbiferis Philippica-
rum insularum.

PUNCTUM III.

De Phalangiis & Ta-
rantula.

Tantum de innoxiiis Araneis, *Xo-*
xii Phalangia vocantur. *Nomen*
accepit, quod internodia terna in
cruribus habeant. *φάλαγξ* enim digi-
torum internodium propriè signifi-
cat. Italiæ ignotum inquit Plinius:
at nunc tota meridionalis ora illis ab-
undat. Singula in reti pariunt, & ma-
gno numero incubant: cumque ipsa
proles increverit, matrem amplexa
interficat & ejicit. Nec parcat patri
si ceperit. Fœminam enim incuba-
tu adjuvat. Pariunt autem & trecen-
tos. Aestate duntaxat venenati mor-
sus esse Alexader ab Alexandro pro-
didisse ait Moufetus: quod tamen de
Tarantula duntaxat sumendum est.

Plin. H. N.
29. c. 4.

Alexand.
ab Alexan-
to Genial.
dier. 2. c. 16.
Differetiæ. Circa specierum enumerationem
haud levis est inter Authores *diffe-*
rentia. Plinius, similis *Formicæ*, *Lupi*,
Rhagionis, *Asterionis*, *Tethragnatij* mē-
tionem facit. Aëtius, sex genera e-
numerat, *Rhagium*, *Lupum*, *Formica-*
rium, *Cranocolapten*, *Sclerocephalum*, &
Scolecium. Nicander illis quæ Plinius
attulit, addit *Rhoga*, *Cyanei*, *Agrostis*,
Dysderi, sive *Sphecium* & *Formicarium*.

Aetius 13.
c. 19.

Basilii decem Phalangiorum gene-
ra dicit, sed non describit. Avicenna,
in Aegyptiacum, *Nigrum*, *Rutilum*,
Rachen, *Album*, *Citrinum*, *Vveum*, *For-*
micarium, *Cantharadeum*, *Vesparium* &
Orobaten distinguit. Nos sedecem co-
rum genera, nempe *Formicarium*, *Ve-*
natozem, *Rhagium*, *Stellatum*, *Cæruleum*,
Sphecium, *Tetragnathium*, *Canthari-*
deum, *Ervestre*, *Cranocolapten*, *Sclero-*
cephalum, *Scolecium*, *Lanuginosum*, *Ap-*
pulum seu *Lentiginosum*, *Cretense* & *Bra-*
silianum ponemus; iisdemq; illa, quæ
Moufetus minora phalangia vo-
cavit, cum similibus adjiciemus.

1. *Formicarium*, seu *Myrmecion*, *Plin. H. N.*
29. c. 9. prægrande, est formicæ simile, sed
multo majus; rufo capite, reliquâ
corporis parte nigra, albis intercur-
santibus respersum guttis. Aëtius;
cervicem cineream facit dorsum vel-
uti astris insigni. Ad ejus morsum
adeo somno obruuntur ægri, ut in
sempiternum *πανθηλον* tandem inci-
dant.

2. *Venatozem*, Nicander *ἀγρόσκη*, *Aldrovand.*
Aëtius *λύκον*, quod Aldrovandus qui
cum Pulice Aristotelis eundem cre-
dit, non probat, vocat. Muscas, ve-
spas, culices, apes, tabanos, vespas
venatur: & inde nomen sortitus est.
Corpore est lato, volubili, rotundo.
Circa os tres eminentiæ enascuntur.
Partes circa collum incisuram ha-
bent. Doloris expertem plagam in-
fert.

3. *Rhagium* ut Aëtius vocat, *ῥάγ*
Nicandro, *ῥάγ* Aeliano, ab acini uvæ
nigræ similitudine dicitur. *Figura* est
rotunda, colore nigro, splendente
corpore & globofo, pedibus brevissi-
mis (apud Aelian. *μυρῆς πόδας* lege)
& quasi imperfectis, ore sub alvo de-
tato. Accumulatis pedibus mo-
vetur, & velocissimè incedit. Non
multum ab Aristotelis *Mordace* ablu-
dit. Ab ejus morfu exiguum quidem
vulnus, sed genæ & oculorum infe-
riores partes rubescunt: totum cor-
pus inhorrescit: urina emittitur, & se-
men profunditur. Aeliano Lybicum
duntaxat animal est.

Aelian. H.
A. 3. c. 36.

4. *Stellatum*, idem cum *Rhagio*
esset, nisi stellatis quibusdam & vir-
gulis

gulis niveis, pinguibus illis & lucidis distingueretur. Solus ejus Plinius post Nicandrum meminit. Isti enervantur & clumbes fiunt.

5. *Ceruleum*, Cyaneum, Plinius lanugine nigra hirsutum sed perperam vocat: Nicander *πιδόγον*, quod sublimibus utrinque & longissimis pedibus incedat. Ictus ejus vomitum araneosum, lypothimiam, coma & mortem concitat.

6. *Sphecium*, Vespiforme, Nicandro *διδόνη*, à crabrone rubicundo penna tantum differt, & vehementer rufescit. Solo tactu venenum ingerit: & speculum crystallinum levi transcurso, Scaligero teste, confregit. Lento veneno tabem inducit.

7. *Tetragnathium*, corpore est latiore, subalbulo, pedibus scabris. In capite duo prominent tubercula, unum rectum, alterum latum, ut videantur ora duo & maxillas quatuor habere. Magnus eorum circa Arrhatam in India numerus, exitio incolis fuit, ut Aelianus prodidit. Unum est cinereum, posteriore parte candicans, quod telas muscis in parietibus latissime pandit. Aliud, cui caput medium linea una alba, & transversa altera distinguit. Locus ab eis percussus in albicat, membrum ad articulos gracilescit. Cinereum Nicander morfu venenum infundere negat.

8. *Cantharideum* parvum est, specie Cantharidi simile, colore flammeo ruberrimo. Invenitur messis tempore in leguminibus. Pustulas excitat, mens perturbatur, lingua balbutit, &c.

9. *Ervestre*, quod in ervo provenit. Eademque præteritum edis & equos devorantes, juventaque, siti exardescere, mediaque crepere censetur.

10. *Cranocalaptes* Dioscoridi *κεφαλοκαρδης*, quia prætereuntium capita ferit, seu per filum descendat, seu se præcipitem det. Phalænæ papilionis specie est, capite nutabundo, ventre gravi, corpore oblongo, colore viridante. Aculeum in summo gestat, *ἐν τοῖς φύλοις τῆς περὶ σέας ἀγροφύτου, καὶ τὰ μέγιστα ἔχει ὁμοία τῷ ἐν αἰς κύστις ψύχαις*. Unde Scholiastes nobis insinuare videtur, alatum esse. Quidam Tarantulam esse opinantur. Plinius lethiferum

nimis ipsius vulnus ponit: Nicander & Aetius nullo negotio sanari.

11. *Sclerocephalum*, caput habet saxi duritie: totius corporis lineamenta illis animalculis similia quæ lucernas circumvolitant.

12. *Scolecium* longiusculum est, & maculis quibusdam, præsertim circa caput, variegatum. Earundem cum *Cranocalapte* & *Sclerocephalo* virium.

13. *Lanuginosum*, grandissimo est capite: quo dissecto inveniri dicuntur duo vermiculi, qui mulieribus corvinâ pelle ante sobolis ortum adalligati, præstant ne concipiant: estque hæc vis eorum annua, ut Cæcilius in Commentariis reliquit. An sit virulentum, nemo determinavit.

14. *Lentiginosum* Moufetus appellat, quod *Apulum* & *Tarantulam* à Tarantino agro, vel fluvio Thara alij. Reperitur quidem & in Calabria, Sicilia, Romanisque campis, æstivis mensibus: sed sine ullo ad saltandum incitante veneno. Aldrovandus idem cum *Solipuga* facit. Multiplex est specie. Aliud est cinericium, albis nigrisque maculis: aliud dorso cinereo, rubris aut viridibus: quoddam mole majus, fibris nigris, ex cinerea rubroque emicantibus, aut etiam virgulis subinde undatim per corpus porrectis. Moufetus & *fusci* meminit, cujus iconem Pennio ab Italo mercatore datâ, damus; & *Crocei* clarique, quale Aegyptum dare scribit. Effigies à Kircherio exhibitæ, Francisci Corvini Pharmacopæi Romani Musæo debentur. Visum & illas quæ ab Imperato habentur adjungere. Mira venenum icu infusum *Symptomata* excitat. Alij perpetuò currunt; alii rident, plorant alii, alii clamitant, dormiunt, vigilant, vomunt, saltant, sudant, tremebundi fiunt. Nonnulli coloribus ita delectantur, ut iis conspectis, in lypothimiam, nisi potiantur, incidant. Exemplum Kircherus habet. Alii, verba sunt Kircheri accurate ista exponentis, Musica incitati, in saltus prorupunt gladio evaginato; vel alterâ armaturâ fulgidâ & corusca (quo fulgore vehementer afficiuntur) gestientes; variaque corporis agitatione, & ridicula prorsus gesticulatio.

Kircher.
Artis Ma
gnæ. 3. par
te 8. c. 2.

latione, nunc eā dextera, nūc sinistra, nunc ore excipiūt; nunc in altum gladiatorū more projectā dexterē recipiūt, nunc in terrā p̄icientes, pugilū more veluti duellū initari adeo peritē tractant, ut in palēstris publicis instructi, omnes artis regulas observare videātur; modo verbis quibusdā obmurmurātes, eā veluti incantare, nūc prono, nunc supino corpore sup̄ eam sese distēdere solent, & extēsi sic aliquantisper, veluti novo Enthusiasmo excitati, ad novos conflictus, saltusq; hinc inde lymphaticor. more debacchantes accingere solēt. Alij, quæ res maxima admiratione digna est, nūq̄ quiescere solent, nisi vitreū vas plenu aqua manu circumferāt, cū quo eosdē gestus, quos gladiatores fecisse diximus, peragunt. Quidā ardentē videre desiderant in medio loco saltui deputato, cōchas aqua plenas, circumdatas viridibus herbis, potissimum arundinū folijs, quibus uti & aqua maxime delectātur, intra quā brachijs & manib. quin & capite toto nō secus ac mergi, & anates concussione alarū aquā veluti ventilantes, sese idētidem submergere solent. Nonnullos quoq; non sine risu videas milites in duello cōflicantes, quosdā temulentorum vario jactātium personas induere; alios Hispanicis verbis ad pompam & gravitatē affectatis nescio quem duce & gubernatorem agere; visi sunt quidā, qui ex arborib. crurib. penduli hærēāt, eaq; pendicatione multum afficiantur, hoc affectu laborant potissimum ij, qui à Tarantulis fila ex arborib. ducentib. feriuntur. Multi deniq; postquam aliquandiu saltarunt, sedentes manib. tam fortiter collidūt genua, ut aliquam gravem passionem calamitatemq; suspiriis & voce miserabili egerere velle videātur. Alii etiam per terram extensi, tali impetu & vehementia manibus, pedibusq; terram concutiunt, ut epilepticis ac lunaticis non multum sint absimiles.

Venenum principio parum sentitur: anno elapso, ad saltus violentos cogit: bimestri spacio, appetitus frustratio, febres ardentes, artuū dolores, *ναρκελα*, iētericus dolor, &c. insistant. Unicum in Musica remedium:

quæ pro diversitate veneni variat. Aliqui afficiūtur, inquit *Kircherus*, tympano quodam, vulgo, (furdastro) pleetris ligneis utraq; parte pulsari solito, cui cōsonare faciūt, ut plurimum fistulam pastoritiam, vulgo (la Zampogna rustica de' pastori) sonus autē multum à Turcico illo superius dicto participat & ob vocum gravium acutarumq; jucundam commistionem multum aurib. gratus est. Alii ut plurimum cātu recreantur, cui Auletarum, sive tibicinum strepitosa musica cōjungitur: delicatiorib. sonantur testudines, lyra, cytharæ, clavicymbala simul concordata; mirum tamen est, quod nō omni tono musicæ, sed certis tonis afficiantur, sin. tonus harmoniæ humori veneni punitivo, Vellitantiq; nō fuerit proportionatus, patiens tātum abest, ut aliquid inde levaminis acquirat, poti⁹ miserabiliter eū hoc impproportionatō ad humorem sono torqueri cōtingat: quod satis insolitis suis gestib. ut oris oculorumq; distensione, brachiorum, manuum, pedumq; cōplosione, totiusq; corporis in hanc, nunc in illā partem contorsione, similibusq; gestib. quantum sibi istiusmodi musica contrariā sit, demonstrat; qui tamen mox ubi ad amicam harmoniam converti ipsū contigerit, veluti ex tenebris in lucem emergens, agillimo motu in saltus pristinos, amico modulamini aurib. oculisque admotis veluti applaudēdo erumpit; durabitq; spectaculum eo usque, dum veneni vis frequenti saltu, pro isto anno excitata, aliqua ex parte sudore evaporavit: atque ita tandem unius anni spatio cum morbo constituuntur induciæ.

Harmonias apud eundē vide. Contrariari unam ratione Musicæ alteri, Hispanus quidā Tarenti, nimis incredulus, suo exitio expertus est. Morsibus enim à colore & qualitatē diversis, ultrò acceptis, cum remedium à Musica quæreret, ab uno quidē modulo se ad saltādum sollicitari sensit, sed qui à contrario cohiberetur. Observatum in civitate Andria, palatio Ducali, & hoc, bestiolam ad proportionatū humori sonū saltasse. Quod si citharæ di in plures incidere, nunc

hæ nuncillæ tripudiare, pro ratione modulorum cōperiuntur. Causas tātor. Paradoxor. apud Kircherū vide.

Bellon. ob-
serv. 1. c. 12.

15. *Cretense* sic describit Bellonius. Insecta sunt, parva, admodum pernicioſa, Araneo paulo majora, octo pedibus prædita, utrinq; quatuor: singuli pedes seu crura quatuor articulis constant, binosq; unguēs habēt incurvos: bina utrinq; crura anteriora illis data sunt ad progrediendū, bina posteriora ad retrocedendum, obliqua in terrā foramina inhabitāt binos pedes alta, quæ retrocedentes ingredi solēt, atq; cibum ita attrahunt: aditum foraminum quæ inhabitāt stramine muniunt, ne obturentur, sed aperta maneant. Corpore sunt superiore parte cinereo, binis rubentibus maculis anteriore dorsi parte insignito: inversa autem, nigris maculis notata conspiciuntur ea parte quā singuli pedes corpori inhærent: venter flavet. Si quis a. scire cupiat quā parte nocere queant, eorū os intueatur, & binos parvos nigros aculeos deprehendet, iis similes quos Scolopendra obtinet, quib. mordent atq; cibū retinent: telas Araneorū more texunt, muscisque & papilionibus vescuntur. Circiter sexaginta ova ponunt, & pectori adherētia fovere solēt, pullosq; exclusos ventri inherentes gestāt donec adoleſcant. Piloso sunt corpore: quoniā autem magnitudine differūt, foramina pro corporum magnitudine excavant: variare autē inter se pro insularum diversitatē observavimus. Immortale est dissidium inter exiguum hoc animal & Vespē cujusdam genus à Latinis Ichneumon vocitatū.

Marcgr. H.
Brasil. l. 7.
c. 3.

16. *Brasilianum* Marcgravius depinxit, incolæ *Nhamdu Guacu* appellant. Araneus maximus sive Phalangium. Totum corpus tres & semis digitos longum & bisectū. Anterior pars major est & penē duos digitos longa, sesquidigitum lata, subrotunda ac compressa: posterior magis orbicularis, nucis Muscatæ majoris magnitudine & figura. Sesquidigitū longa. In dorso medio versus posteriora foramen habet umbilicale. Capite caret speciali, sed supra os in anteriori parte corporis ocellos habet minimos splen-

dentes, instar punctulorum: & ad utrumq; oris latus prominentiam unguiformem, semilunarem, semidigitum longo, & ita binos dentes, quib. pro dentiscalpijs utimur auro inclusis. Crura habet decē, utrimq; quinque, priora duo prope dētes duos digitos longa, & præter duplicem articulationem qua corpori conjunguntur, quatuor habentia internodia, & in extremitate unguiculum curvum, nigrum, splendidum retrorsum versum. Secundi paris crurum, quodlibet penē quatuor digitos longum & præter duplicem articulationē prope corpus, alias quatuor habet articulationes. Tertium par tres & semis digitos longum, totidem articulationibus. quartum par tres digitos & paulo amplius longum, cæterum ut præcedentia: omnia a. crura, in extremitate duo habent exilia cornicula nigra, & bisecta ut cancri. Prope anum habet duos processus semidigitū longos juxta se positos, fili crassioris crassitie, quib. nere solet. Totus araneus vestitur cute pilosa brevib. pilis, nigris ad visum, ad tactū instar holoserici. Per totam autem superficiē crurum partis posterioris, laterum & processuū, qui dentes continent pili copiosi sunt insparſi, ex albo & gryſeo rubidi coloris. Tota posterior sectio corporis in adultiorib. plerumq; nuda est pilis, & cutis ex albo incarnata. Vescuntur muscis & aliis insectis. Diu vivūt: nam ad bienniū in scatula me aluisse meminī, qui certo tempore, cutem exuerunt integram, dentibus etiam adherentibus, nova subtus generata.

Ad *Minora* & *Phalāgiis* similes beſtiolas, refero, *Pulices*, *Phalangia parva* *Bellonij*, & *Tungam Brasiliensiu*. *Pulices*, *Ψύλλαι*, apud Aelian. sunt procaces, acuminati, salaces, & assultim incedētes. *Pitheci* simiive nuncupantur. *Orribates* nonnullis, quod in arboribus, præsertim montanis reperiantur: *Hypodromi*, etiam quod sub foliis degant. Animalia sunt pilosa: ventre leniter inciso, ut sectio notata filo videri possit. *Phalāgia parva*, vel potius animalia phalangio similia, Bellonius in itinere à rubro mari Cairum versus observavit. Octonis erant prædita pedibus,

Aelian. H.
A. 6. c. 26.

Bellon. ob-
serv. 2. c. 68.

bus, id est, utrinque quaternis, & dum equorum crura conscendebant, mirum in modum eas divexabant, *Tunga* Brasiliensium, Floridanis *Nigua*, aliis *Ton*, Hispanis *Bicho* vocatur. Eadem cum pulicello Ovidi & Scaligeri superius adducto. Insectum est parvulum, inquit *Marcgravius*, figura pulicis, nigricantis coloris, duos cirrhulos in capite pro barbâ habes, in pulvere more pulicum generatur, & pedibus se infinuat, potissimum plaræ, digitis & sub unguibus, imò & manibus, aliquando vidi. Statim autem quando intravit pruritum excitat, qui certum indicium est, itaque *Tunga* statim acicula eruenda, nam si sinatur, tridui aut quattidui spacio sobolem progenerat innumerâ, lendium modo, quæ folliculo pellucido rotundo magnitudine pili includitur, huic insidet *Tunga*, hic folliculus acu eruendus & manet in carne foramen rotundum ejusdem magnitudinis, quod sponte sanatur, vel inspergitur pulvis pyrius. Crepitant unguibus, uti ut lendes. Familiarissimum malum, sed quod magis per negligentiam incrementum sumit quam per se.

CAPUT III.

De Insectis apteris duodecem
& quatuordecem pedum.

ARTICULUS I.

De Erucis in genere.

INsecta aptera duodecè & quatuordecem pedum sunt *Erucæ* de quibus in genere & specie dicendum est. *Nomen* vel ab erodendo obtinuerit, quasi erodæ, quod frondes, olerum in primis abrodunt: vel ab hærendo, ut *Apulejo* placet, quod pertinaciter adhærescant. *Plinio*, si *Turnebum* sequimur, dicuntur *Vruca*, quod prata & arbores urant. *Columella* hirsutas, *Ovidius* *agrestes tineas* vocavit. Græcis dicuntur *καμπαι*, ab undoso & arcuato gressu, quo se rependo curvant & attollunt, & *πρωξαλιδες* ab erodendo.

Fortè & *πρασσυειδες* apud *Hesychium*, *πρασσυεις*, inquit iste, est ζών χλωρον κέρρον τὰ ἐν τοῖς κήποις λαχάνα: est animal viride rodens in hortis olera.

Magni omnes arborum & herbarum helluones. Hinc *Philippus* parafitus, *erucam se thymo & olera vescentem* dixit. Aliæ frondem depascuntur, aliæ florem. Cum rodunt eduntve, sonum quendam qui *τσίσιμ* & dicitur, edunt, ut *Scaliger* notavit.

Circa ortum dissentiunt auctores. *Aristoteles* eas è virentibus foliis brassicæ nimirum aut raphani oriri tradit, femine scilicet milioformi, sub autumnino ibidem relicto; unde vermiculi nascuntur. Ex his vermiculis trium dierum spacio erucæ fiunt; morituro vere; quæ auctæ satisque alitè motu cessant, at incuntes autumno cum *Chrysalide* formam vitamque mutant. *Plinius* rorem calore solis densatum in foliis relinqui tradit; unde *Erucarum* genus speciemque omnem deducit; cui suffragatur *Arnoldus*. Alii earum originem papilionibus ferunt acceptâ; quæ simul ac aureliis exiverint, supra vel subtus vicina folia; ova quædam (stercora vocant *Barbari*) excludunt, pro ratione sui corporis majora vel minora: horum aliquot testæ cœruleæ, aliorum flavæ, albæ, nigricantes, virides, rubentes) quatuordecim ferè dies tota solis calore, rupto cortice *Eruculas* excludunt, parvulis lumbricis similes, sed coloratas; quæ primo ortu famelicæ, foliis floribusque devorandis totæ incumbunt, præcipuè illarum arborum atque plantarum, quibus olim in ovo fuerant.

Ego singulis his modis oriri posse non dubito: maximè vero humidis temporibus cum humor resedit, in primis si acrior sol post ufferit.

Ubi devorandi tempus præterit, vagulæ huc illuc & jejunæ migrant, sensimque marcescentes fame, aliæ intra, quædam supra terram, locum idoneum quærunt, ubi sese vel filo appendens in aureliam membranâ testâ, vel in nudam thecam transformant. Hoc media æstate si contigerit, post viginti quatuor dies rupto cortice evolat statim papilio: sin adultiore autumno,

Nutrimētum.

Scalig. sup. Theoph. l. 5. de c. plant. c. 19.

Generatio. Arist. H. A. 5. c. 19. Moisset. Thaat. Inf. 2. c. 24.

Natura? Monf. l. 6.

tumno, per totam hyemem durat aurelia, nihilq; ante calorem vernalem excludit. Nectamen omnes in aurelias abeunt, sed alia, *volucres* nempe, putrescunt; è quibus nonnunquam ova quasi tria excidunt, Cætharidum vel muscarum matrices. Quando serò papiliones coivere, ova ad ver usque proximum depromunt, vitalia: ut in Bombycibus usu venit, quorum ova per uncias librasque vendi apud Hispanos notum.

Ufus.

Habent in Medicina locum. Oleraceas cum oleo inunctas, tutos à venenosorum moribus reddere, Aegineta scribit. Tela & involucrum e-potum, muliebrem fluorem sistit. Ligustrum depascentes non solum Cyprium piscem mirè hamo obducte alliciunt, sed & earum fimus naribus inditus, Epilepticis ab utero mulieribus statim succurrit, si expertissima obstetrici, à qua Moufetus habet, credendum: Uta & narib. indita hæmorrhagiam cohibet. Vesicas omnes excitant, & cutem deglubent. Equus si devoraverit, tumores surgunt, arefcit induraturque cutis, oculi excavantur. Omnes hortis, pomariis, herbis & floribus sunt infestissima.

Dammum.

Remedia.

Remedia apud Geoponicos, & qui de re rustica scripsere occurrunt multa. Pelluntur, felle tauri, si eo arbores illinatur; sulfure pauco, si eum stramine sub arbore accendatur; terrâ sub esculi arboris radice effossa, si in horto spargatur; scillâ, si in hortis feratur, aut suspendatur. Alii mentham, ervum, absinthium, in hortorum ambitu serunt. Fumum è vespertilionum stercoribus, vel fungis sub nuce arbore nascentibus, exierant. Multi in ficulneo lixivio semina præmacerant. Nec male post pluvias matutinis horis arborum rami & frutices olerum succutiuntur. Decidunt enim nocturno adhuc frigore torpidæ.



ARTICULUS II.

De Erucis in specie, & primò de Erucis Moufeti.


PUNCTUM I.


De Erucis glabris.

ERucarum differentia infinita ferè sunt, seu quantitatem, qualitatem, & partes corporis; seu etiam actiones, & alia observes. Sunt glabra, hirsuta, magnæ, parvæ, mediores: virides, nigrae, variae, rigidae, molles, cornutæ, excornes. Plurimæ in aurelias, hæ in papiliones abeunt: quædam non, sed cum omnia depastæ sunt, ipsæ quoque consumuntur & intereunt. Quæ aureliæ sunt, alia immediate in eas abeunt, & hæ non texunt, alia prius ova pariunt. Quarundem aureliæ leves & æquabiles; aliarum hispidæ, rugosæ, acuminatæ, asperæ: quarundam, ut duriorum, nudæ; aliarum musco vel capillis sericis obductæ. Plurimæ ex ovipapilionum nascuntur: quædam in arborum foliis ex semine proprio ibidem in tela per autumnum derelictò, vel rore aëre vel illi incluso & putrescente. Quædam foliis, alia floribus, nonnullæ fructibus vescuntur. Undoso & celeri motu plurimæ gaudent, alia placide & lente incedunt. Alia leberidem quotannis mutant, alia non. Quædam texunt, quædam non. Illæ vel more aranearum telas faciunt; vel folliculos sæpè adeò compactos, & duros, ut ne acutissimo quidem telo rumpantur, &c.

Placet & hic tam Moufeti, quam Aldrovandi differentias ponere & describere. Illi vel sunt *επερὸγενεῖς* si-
ve affines à papilionibus & aureliis factæ: vel *αὐτογενεῖς* & consanguineæ, ex sua tribu profectæ. Utræque vel sunt *glabra* vel *hirsuta*. Glabra in Bombyces, de quibus post agetur, *virides*, *flavae*, *vinulas*, *fuscae*, & *variae* distinguuntur.

Vir-





Virides sunt quintuplices. *Prima* quod ligustro insideat, *ligustrina* dicitur, cui vultum, ambiens circulus pedesque omnes & recurvum in caudâ cornu, ex rubro nigrescunt; maculæ lateribus transverſim inductæ dimidio purpurascētes albicant: rubescunt punctula: ceterum verò corpus undique virens videtur. *Alterâ Sambucina*, quæ non multum ab ea differt, nisi quod undiq; viret, transverſis illis maculis albissimis, & punctulis quibusdam lacteis exceptis. Sambuco rosea inprimis vescitur. *Tertia Lactucaria* ubiq; viridis in thecam sese fuscâ appetente autumno vertit: solera comedit molliora, lactucas præsertim. *Quarta Mespilaria* minor est, undique virescens in thecam cinereâ maculis nigerrimis conspersâ sese recipiens. *Quinta Quercina*, omnium minima, in arboribus (quercu præsertim) fila ducit, per quæ descendit in itinerantium capita vestesque & galeros illaqueat; notissimum æstate animalculum, & ubique obvium rudi tela sese implicat autumno ingruente, & rubro-viridi theca inclusa, moritur hyeme, decem duntaxat pedibus donatur, ut superæ omnes. *Flavescentes* dicimus, quæ maximam partem flavent. Tales hæ figuræ repræsentant; quibus servatur quicquid à nigro liberum: id si pallidiori flavo infeceris, Icones habes depictas. Vivunt mollioribus foliis, præsertim tiliæ. *Vinula* elegans mercuriales Eruca, & supra fidem speciosa: in salice eam invenimus avidè pascentem: labra atque os illi subflava, oculi anthracini, frons purpurea, pedes extremumque corpus herbacei: cauda bifurcata ex vinaceo nigricans. Corpus universum veluti crassiore rubicundoque vino intinctum; quod à collo per scapulas decussatim transiens, ad caudam usque linea albissima, mirifice adornat. *Fusca Porcellus* Eruca dictus, ex fusco nigricat, major præsertim; in minore quos vides orbiculos, albicant: trifolij palustris foliis frequenter insident, eaque mira celeritate devorant.

Varia decem sunt, quæ conspiciuntur. *Prima* facies cærulea, oculi nigerrimi; corporis cuticula cæſia, nigris flavisque punctulis multum conferta: in aurellam convertitur spadiceam, alba membranula vestitam, brassicas amat, & genus universum naporum. *Secunda* caput, pedes, caudamque nigerrima obtinuit, cæcelli quadrati, flavi sunt: intus quæ pinguntur tessellæ, striis nigris glaucisque alternatim in longum ductis distinguuntur. Fœniculum amat, anisumque atque cuminum. *Tertia* ex albo viridis gibbosa in incessu graditur; est enim utrinque sepes duntaxat, sicuti omnes *Urticæ*. In aureliam echinatham mutatur, colore furvam: oleas absุมit. *Quarta* draconium depascens viperam maculosam refert: incedit semper capite erecto, & pectore potissimum se sistit: amat juncos, & fluvii in nascentes plantas pappiferas. *Quinta* descendentes costas si obsoleto minio infeceris, pauca in Icone habes quæ desideres. In *Sexta* quod album vides, ochra impleas: gaudet utraque populo nigra, eaque sese ingurgitat. Striæ in *Septima* ductæ ex flavo albescere debent: reliquum totum corpus fusci coloris in aureliam spadiceam se vertit. *Octava* cinerea videtur, ex nigricante undulata: thecam facit nigro puniceam, è qua pulverulenta Phalæna. *Nona* varia quidem, & meritò censeri debet: incisurarum orbès virent; cornu caudæ reflexum, cyaneum: sub qua miniata macula ad ornatum facit. Media incisurarum pars cinerem æmulatur: aurelia demum includitur Xerampelina, hæc in via publica invenimus: gaudet ranunculo pratensi. *Decima* glauconigra: quod enim hic album est, id glauco superinducto bestiam exprimet. In thecam spiralem transmutatur dilutè cæruleam, spiris subrubentibus, quæ ad buccinæ conchæ formam proximè accedit. In Solano sylvestri (quam Itali Belladonnam vocant,) glabra eruca provenit, crocei viridisque coloris, cornu in fronte gerit digiti longitudine; quam se sæpius vidisse memorat Cardanus.

Pun-

PUNCTUM II.

*De Erucis hirsutis densius
pilosis Moufeti.*

Pilosa omnium maximæ maleficæ, vel densiore sunt pilo, vel rariore. Ex illis sunt, *Pityocampe, Ambulones, Coriaria, Polymide, Nenstrie, Tuberculosa, Mesoleaca, Vrticaria, Brassicaria, Sepiaria.*

Pityocampes, i.e. pineæ piceæve, Erucæ, digitum minimum crassitie æquant, tres digitos transversos longæ. Undecim incisuris in per caput & caudam constant, sedecimque (more reliquarum) pedes habent: nempe juxta caput utrinque tres, medio corpore utrinque quatuor, & ad caudam extremam utrinque unum. Priores vero sunt adunci & exiles, quib. viam tentant; reliqui latiores, & multis crenulis ferrati, ut folijs firmiter insistant. Caput formicæ; reliquum corpus Erucis vulgaribus simile. Hirtæ sunt pilis, villisq; rectis undique obseptæ: pili in lateribus nati albicant; in dorso fulgent, cujus pars media maculis veluti oculis ornatur. Villis abrasis, cutis subest nigricans; pili valde exiles: pungunt tamen quam urtica acrius, maximumque dolorem, ardorem, febrem, pruritum, inquietudinem adducunt: veneno scilicet subito sine sensu vulneris infuso, & ad partes visceribus proximis delato. Telas subtiles quales aranci texunt, prioribus pedibus fila ducentes, ac disponentes: has, veluti tentorium, nocte ingruente subeunt; tum, ut frigoris tum ut procellarum vitent incommoda: tentorii hujus tam tenax & subtilis materia est, ut nec ventos curet furentes, nec imbribus inundet. Amplitudo item tanta ut vel millia plura erucarum facile ferat. In ramulis Pini & Piceæ supremis nidificant, ubi non solitaria, (ut alia) sed gregales vivunt. Quacunque iter fecerint nentes fila ducunt telaria: primaque luce (faveat modo serenitas) catervatim minores majores comitantur, ac viduatis fronde arboribus (omnes enim absunt)

textrinam strenue colunt. Solæ pini piceæque pestes, ad alias coníferas arbores non accedunt. In Atho monte; nemoribus Tridentinis, atque transalpina convallibus, (ubi frondis nutritiæ copia) admodum abundant, ut Matthiolus testatur. Virulentissimæ profecto bestię, siue extra premanur manibus, siue intus exhibeantur: tam certissimi veneni olim habebantur, ut Vlpianus legem Corneliam interpretans de Sicarijs, in eorum numerum & pœnam, Pityocampæ propinatorum vocaret: Alii. ff. ad leg. Corn. de sic. Haustis Pityocampis dolor os & palatum graviter affligit; lingua, alvus, ventriculus ab erodente veneno valde inflammantur: Etiam ingens dolor exerceat, licet initio pruritum quendam jucundum passi videntur: insequitur æstus, cibi fastidium, & perpetua, sed irrita vomendi dejectiendique cupiditas. Tandem nisi occurratur, adurunt corpus, & ventriculo crustas inducunt, Arsenici ferè modo. Diosc. Aet. Plin. Celsus. Galen. item i. simpl. cap. 5. & Avic. 10. cap. 25. Hac de causa Aetius & Aegine-ta mensas sub pino sternere, vel commorari, noxium dixerunt, ne forte cibinidore jusculeorum vapore, vel clamore hominum Pityocampæ suis fedibus motæ, in escas decidant; vel femina saltem æquæ lethifera demittant. Qui ab his læsi fuerint, ad Cantharidum antipharmaca respiciant: liberabuntur enim iisdem remediis: propriè tamen melinum oleum (quod est Cotonis & oleo temperatur) ad vomitum usque bis terve hauriendum est, ex Diosc. & Aetij præscripto. Generantur vel potius regenerantur (convolvulorum more) ex semine Autumnali in tela certis vesiculis relicto, vel ex ipsis Volvocibus putrefactis ut Scaligeri sentire visum est.

Ambulones dicimus, quibus incerta domus & esca: unde superstitiosulè peregrinantium modo vagantur, & (ut mures) semper comedunt alienum cibum. Quare Angli eos *Palmerrvormes* appellant, ab erraticis nimirum vita, (nusquam n. consistunt) quamvis ratione hirsutiei *Bearevormes* dicuntur.

Cer-

Erucae

Raupen




Mouf

Er.

Corilaria

Er. Polymita


Er. Neustria Minor



Er. Neust. Major.

Er. Tuberculosa

Er. Vrticaria



Er. Brassicaria




Ova.

Er. Sepiaria Min.

Er. Mesoleuca



Major.





Er. Geranicola

Er. Antennulata




Er. Iacobæa






Echring 1

2



Er. Rubicola








Pytiocampe Vergeri



Erucae

Alia



Certis folijs aut floribus non astringi se sinunt, sed audacter percurrunt delibantque omnes plantas ac arbores, & pro arbitrio vescuntur. Undecem ponuntur. *Primo*, quas vides in latere maculas albas, tales revera esse debent: corpus universum nigrescit, pili inferiores omnes subcrocescere oportet; superiores vero omnes in dorso positos canescere; tribus iis ordinibus exceptis, qui in collo juxta caput nascuntur: ii enim eundem cum ventris pilis tenent colorem. Ex cuius aureliæ exit, quem hic vides papilio; cuius iconem coloresque & naturam superiori libro descripsimus. Si *Secundi* collum, ventremque atque ibi nascentes pilos flavos feceris, non est quod plura expectas. Theca ejus fusca videtur; ova pallida, papilionem inde nascentem superiori libro expressimus. *Tertius*, toto corpore pilisque fusco flavus, nisi quod maculæ lateratim in unaquaque incisurâ obliquatæ lateſcunt, caput puniceum furca quadam nivea ornatur. *Quarto*, venter atque inferiores pili infuscantur, dorsum atque superiores ex fusco flavent. Linea in facie bifurca feri colorem vel lac dilutum refert. *Quinto*, vultus spadiceus, ventris latera canescentia; corpus pusillis varium guttulis sublucis, atque hæc supra, piceis: pili quasi radioli exeunt flavi, arguti illi quidem, & medio acuminatius crescentes: multum vicinas herbas & segetem lædit. *Sextus* colore est leucophæo, nisi incisuræ nigris lacteisque hic illic maculis essent infectæ. Setæ infra supraque natæ, & tanquam serratim posite, hispidae valde sunt & rigidae, sed à colore corporis non recedunt. *Septimum* cute nigra, pilis autem nonnihil lutescentibus donatum, *Peniculum* vocare soleo, quia utrinque ex fronte atque etiam in uropygio peniculus erumpit mollis, colore coracino. Quas vero cuneiformes in dorso eminentias conspicias, radice lacteæ; cæterum, nigellæ videntur. *Octavus* murinum colorem exprimit, cuius in dorso cunei septimi illius respondet. *Nonus* coloris peregrini & rari; sin-

gulæ enim incisuræ variis ab invicem coloribus, sed mixtis invicem omnibus pinguntur, quas clavus, quamque argenteus pulcre adornat. *Decimus* inter naturæ luxuriantis lusus, non minus elegans quam rarus; nigris, cæruleis, viridibus, atque luteis liris, & nervis scabris striatus: quos guttulæ quædam aureæ mire efferrunt. Pilos admodum molliculos gerit, miræ gratissimæque viriditatis, thecam habet purpuream, membrana munitam. *Undecimi* incisuras albicantes, prasinæ imaginare; velusque & pilos medio virentes facito.

Corylaria undique cum virore pallet, tribus inter cuneolos maculis nigris exceptis, & cornu illo in ultimo dorso, & quasi ouropygio crescente, quod rosaceum ruborem latè suscipit. Coryli præcipuè folijs insidet, unde *Corylariam* dicimus, duas illarum species vidimus; alteram saturatè, alteram pallidius viridem.

In *Polymitis* multiplex naturæ venustas resplendet: quib. licet faciem Aethiopis Maurivè tribuit, vestem tamen concessit Polymitam; vario opere, vero artificio fulgentem. In fronte pili, veluti in cirros nexi nodosos, antennas referunt; quales item in ultimo dorso; cutis iridis æmula, orbiculis splendet muricè inebriatis, quos veluti latos clavos costis affixit natura. Vellere enati pili fulgorem solis repræsentant, oculosque oculato die perstringunt.

Neustrias è Normania duas accipimus. Majori vultus cæruleus, albis, rubris, cæsiisque furculis corpus liraturn; pili aureo splendore coloreque grati. Minor convolutus, echinum exprimit: Caput illi nigerrimum, corpus glastinis quibusdam guttulis variè perfusum: pili croceum fulgorem imitantur. Tuberculosa pyri germina corrumpit, capite atrato, corpore nigris rubentibus, & lacteis quibusdam liris ornato; mediis quasi humeris, & ad finem ferè dorſi, tumuli sive tubercula assurgunt livida, albis punctulis conspersa. Ova è quibus nascitur, spadicea sunt; qui est

T etiam

etiam aureliæ, & pilorum color. Aliam vidimus congenerem, sed duntaxat tumulo gibbosam.

Mesoleucam à capite ad dimidiatum dorsum, obsoletè luteam, dein liliaceam peperit natura. Venter luteo cinereus, clavis medio tessurato fixis ornatur.

Urticariæ pedes si fatiscente luteo leviter tetigeris, parum à naturali icon differet: rigidulos & erectos pilos habet spinatim crescentes. Levi tactu vulnerant; primumque blandum, sed venenatum pruritus, deinde vix ferendum dolorem superinducunt. Haud desunt qui eam *Pityocampes* malitiam malignitatemque vincere asseverant.

Brassicaria, eruca capite est cyaneo, corpore flavis furculis duobus utrinque lineato: inter quos subcæcia quasi area nigris quibusdam seminibus confita videtur: pili aureliæ (quæ cinerascit) colorem obtinent.

Sepiariæ binæ offeruntur. *Majori* crocesceret vultus; nisi quem nali loco triangulum videtis liliasceret. Corpus albis flavis rubisque & nigris, (quas expressimus) maculis, nullo ordine locatis, variatur: pilis subluteis horret. Sepes populatur, & nudat frondibus: ubi tamen serici rudioris relicto glomo, in thecam spadiceam, quasi in *Sarcophagum* se recipit. *Minoris* facies subcærulea, uti & totum corpus, absque maculis quibusdam nigris albicantibusque esset: pilos cum prima concolores sortita est.

PUNCTUM III.

De Erucis rarioris pili

Conferi.

Rarioris pili sunt *Geranivora*, *Iacobæa*, *Antennula*, *Echinus*, *Rubicula* & *cornuta* illa bestiola, quam Germani *Hornworm* appellant.

Geranivora magnitudinem formæque ritè hic dedimus, & affabrè explicatam. Albas maculas, cingulos nigros ornâtes, ferrugineas facere oportet; ventremque pedesque & album inter cingulos spatium porra-

ceo, viridi ornare. *Camerarius* ad *Pennium* hanc misit, cum hac *Hypographie*: *Erucæ grandis*, hortis tantum agrestibus victitans, & potissimum *Geranio palustri* *Batrachopoda* infesta.

Antennulæ corpus varium: à capite ad tertiam incisuram cretâ illitam diceret; quinque aliis sequentibus nigrocineream; tribus iterum postremis cerussatam: *Antennulæ* ex pilis veluti colligatis constant; quales item ultimo dorso, cristæ instar, se erigunt. Quatuor illi erecti in dorso cirri, è pilis quoque fiunt dentatim ordine crescentibus.

Iacobæa sive *Senecionem* majorem depascens eruca, capite pedibusque obsoletius purpurantibus, vètre pallidiusculè virente; corpus habet inamæno viridi fatiscens, & nigris flavis flammeisque maculis ornatum. Pilorum color ventri consonans.





Echinorum duas animadverti species; unam è cæruleo virentem, alteram *Mesoleucen*. Primus *Echinorum* tessellato prodit corpore, ex nigro flavoque varius: spinæ luteæ videtur; ineunte autumno in aureliam cineritiam vertitur. Secundus reverrà *Echinum* præ se fert; dorsum dimidia pars, prior nempe, ex flavo nigricat; posterior cum flavedine albescit; spinas gerit argutas valde & crassas, colore cæcio.

Rubicola nigrocineream liris utrinque tribus pallidè flavescens pilis pinxit natura; pilos rariores gerit, planè nigros.

Est & *Cerastes* cujus varia loca è luteo virent, pili medio dorso nati canescunt; cornu vero crenatum rubescit.

Varia item in verbasco, lupulo, *Scrophularia*, *Glycypticra*, *Solano*, *Alno*, *ulmo*, *ocymo* & *Tithymallo* nascuntur: imo quævis penè herba peculiarem habet erucam vastatricem: quas, ne infinitus videar, quasi notas pertranseo.

Gesneri *fætida*: *Erucæ cornutæ* similissima est, sed & cornis, & colore aliquantum discrepans. In muro repentem cepi exeunte. Augusto Anno 1550. Gravem spirat odorem, ut planè



Vermic. Dipfaci,

plane venenatam crederes. Iracunda perrexit capite cum anterioribus duobus pedibus semper erecto; cœcam puto: digitum longa & crassa, paucis parvis pilis per dorsum & latera horrescens, dorsum nigricat. Ventrīs laterumque color ex flavo subrufus: internodiis quatuordecim totum corpus distinguitur. Singula internodia fulcum in superiorem quandam ceu rugam per dorsum habent: caput illi nigrum, duriusculum; os forcipatum, denticulatumque vel ferratum: his forcipibus, quicquid comprehendit, mordet: pedibus 16. graditur, ut maximam partem omnis Erucarum natio proculdubio venenosa est. Vergerus Pityocampen putavit, alij scolopendram: sed pedum numerus non patitur scolopendram dici. Vix ferebam odorem, dum vivam describerem: duo hypocausta nimio & abominabili fetore adeo infecit, ut manendo ferendoque non essem. Hæc Gesnerus.

ARTICULUS III.

De Erucis Aldrovandi.

PUNCTUM I.

De Erucis primæ Tabula.

Aldrovandus sex diversis tabulis nobis diversa Erucarum genera exhibet. In prima novem exhibet. *Prima* primæ tabulæ ex maximis est, & caudata, cauda nimirum instructa sursum revoluta: tota est lutea, annulis verò cœruleis, iisque triangularibus, inter quorum singulas singula ab utroque latere nigra sunt puncta. Os item nigricat. Cum eam aliquo tempore domi aluisssem, telam nō texuit, aut folliculum, sed in Chrysalidem immutata Papilionem progeneravit luteum, eum quem in prima Papilionum tabula tertium exhibuimus. *Secunda* quæ ejusdem est magnitudinis, identidemque caudata, leviter lutescit, subfusca tota, nigerrimis punctis,

ac annulis instructa. *Quarta* ex inediocrium genere, etiam caudata est, ad latera sublutea, per tergus flexib. arcuatis coloris elegantissimi minia-cci decorata, annulis verò nigris, sed quicandidis notentur punctis. *Tertia* caudam habet in extremo acutissimam tota viridis, annulis nigris, pedibusque, qui sunt quatuordecim. Brassicas, & olera infestat, ex hoc potissimum genere Papiliones illi exiguo corpore progenerantur, subvirides & albicantes. Papiliones enim erucarum suarum colorem fere reservant, ut Aristoteles quoque testatum reliquit. *Quinta* ex maximis est, colore flavo, & viridi, & lineis per dorsum latis triangularibus, viridibus, & punctis maculata purpureis. Caudam gerit semper erectam, & caput etiam erectum, quare cum incedit, incessum carnis quodammodo æmulatur. Cauda hirsutis quibusdam villis præmunitur, parteque infernè notabilem habet maculam nigram. Ligulstri foliorum esu gaudet. Sedes habet quatuordecim. *Sexta* corpore major est, rostro, & pedibus exilioribus, colore tota eodem, sed dilutiori, lineis verò transversalibus flexuosis magis ad cœruleum quam ad viridem inclinantibus: Inter singulos annulos, singulis infra notatur punctis nigricantibus, nam cætera puncta, quæ per supernum corpus conspiciuntur, ad purpureum vergunt. Supernè per tergus color magis est luteus, inferne ad pedes magis viridis. Degit plerumque in viti sylvestri. Cauda superiori similis. *Septima* tota est flava, infernè ad croceum vergente colore, lineis distincta supernè triangularib. ut in quinta, sed cœruleis, & quæ punctis conspurguntur atris. Pedes & rostrum nigricant. *Octava* admodum est exigua, caudata ramen, maximâ sui parte nigricans. In tergore lineas habet binas admodum exiles, luteas, inter quas altera est lata, viridis. Caput habet rotundum, pedes quatuordecim, in extrema alvo appendicem, quam per terram trahit; cauda pro corporis portione majuscula est,

Postremam paulo rudius, quam par erat, pictor expressit: nam puncta illa candida, quibus modo majoribus, modo minoribus toto corpore conspergitur, obscurè admodum apparent. Tota colore ferè est ferrugineo, extremo alvi, cauda, pedibus, & capite rubris, rubra item linea lata à capite, ad anum usque per dorsum extensa fertur. Anterior corpus exilius est, quam extremum, extremumque exilius medio, sanguisugam dixeris.

PUNCTUM II.

De Erucis secunda tabula.

QUæ in secundâ tabulâ dantur Erucæ, omnes ferè bicaudæ sunt: in quibus hoc notandum est, quod caudæ sint in extrema alvi, cum in ijs quas pinximus in prima tabula, in extremo dorso sursum enascantur. *Prima* tota purpurascit, præterquam inter primum, & secundum flexum, ubi viridis est. Binæ item lineæ, eo quo pictor expressit modo à capite ad extremum usque alvi extenduntur, candicantes. Cauda utraque nigricat. Pedes habet quatuordecim. *Secunda* caudis duabus instructa minimis tota atra est sed luteis interstincta zonis. *Tertia* corpore est crasso, & compacto, ex luteo virescente zonis annulisve admodum viridibus. capite verò, quod exiguum est, & primo flexu coloris aurei. Pedes quatuordecim habet, nigricantes; caudas exiles, proceras. *Quarta* brevissimis est caveis; oblonga, sed exili, ac tenui corpore, tota ferruginei coloris, exceptis annulis semicircularibus, qui ab ima parte flavi sunt, ab altera nigri. *Quinta* monstruosæ quodammodo figuræ, quod partim ex Eruca, partim ex Araneo constare videatur *Ἐρυνόκωπιον*, sive Erucaraneum nuncupavi. Sex primum à capite ex primis corporis flexibus pedes Araneorum pedibus simillimos emittit, dein interpositis aliquot flexuum intervallis, alios octo more Erucarum,

quas alioqui toto corpore refert. Tota ex cinereo ad luteum vergit, sed annuli coloris sunt planè castaneorum, sicut etiam pedes, & alæ. Insolentis profecto etiam formæ est, quæ *sexta* in hac serie ponitur; capite scilicet, cum id contrahit, compresso, facie Muris, aut felis, sed nigra. Supra enim rotundam illam nigredinem linea est alba, sub qua puncta duo, nempe ab utraque ejus parte unum, nigra, velut aures efformant, in medio verò nigredinis puncta alia duo oblonga nasum, qui illis animalibus admodum est compactus, tria denique alia sub his minima, aliquo rudi modo æmulantur. Tota est viridis, corpore pallidius, intensius annulis. A capite ad caudas usque porrecta linea alba per medium corpus transfertur. Caudæ eriguntur, & punctis atris consperguntur. Pedes numero quatuordecim, quorum qui posteriores sunt, admodum sunt crassi: *Septima* eadem est naturali situ procedens. Rursus *Octava*, à primo loco depicta differt tantum in eo, quod primo post caput flexu sit luteo, duobusque punctis nigro distincto: item, quod lineæ illæ, quæ per superiora feruntur, inter quintum, & sextum flexum, invicem conjunguntur: denique, quia in hac subinferiori linea, inter singulos flexus, album sit punctulum. *Nona* eadem est cum secundâ, bis per errorem depicta: infestum est hoc genus brassicæ. Habes *decimo* loco Scolopendram terrestrem parvam, sed de hac suo postmodum loco. *Undecimo* loco depicta exhibentur Erucarum ova lutea; simul conglomerata, exigua. *Postrema* Erucularum minima, in frumento inventa est. Insectulum hoc tam tenui, ac exili est corpusculo, ut potius fili cuiuspiam particella, quam animalculum videatur: longum est digitum transversum. Maximum tantillo in corpusculo robur adverti, velociter movetur, & nunquam ferè à motu cessat. Pedes multarum Erucarum more habet quatuordecim. Capite nigricat, cætera cinereus. Sex integris diebus nihil edebat.

PUNCTUM III.

De Erucis tertia tubula.

Tertia nobis novendecim exhibet. *Prima* Echinata ipsius videtur Hippocratis, zonis luteis, & punctis nigris, & candidis variegatur: quam, vel saltem simillimam superiori ad me allatam ætate sic descripsi. Vermis est digitum, & medium longus, posteriore parte caudæ vicina latior, quam anteriore, duodecim constat annulis, sive segmentis, sive flexibus, qui supini nigro colorati sunt, linea medium dorsum secante castanea. Interstitia annulorum pallent. Caput duabus appendicibus velut corniculis armatur. Sex pedibus, tribus utroque latere ante instructus graditur, postica parte Erucæ instar arcuatur, quæ latior est. Quatuor in eo villorum in penicilli formam adunatorum ordines in singulis annulis conspiciuntur, bini singulo latere: unus superior ad marginem dorsum, alter inferior ventri propior, ille octonos annulos ultimos eminentibus penicillis ornat, hic novenos. In ultimo, quem caudam dicas, extant duo, colore omnes ferrugineo. Convolvitur in glomum ad instar verticilli: quemadmodum etiam, quæ subsequitur, quæ in orbem convoluta depingitur, simillima ex toto cum illa, nisi quod in hac inter singula interstitia puncta candida non sunt, quæ illic summam conciliant venustatem, contra in hac puncta iisdem locis nigra sunt, & semicircularibus maculis ex albo lutescentibus ambiuntur. *Tertia* tota aterrima est, sed castaneis tantum interstincta zonis & punctis. Supina parte, quæ quarto loco depingitur, minus nigrescebat. *Quinta* tota longissimis vestitur villis densissimis, fuscis, sed & ipsa eruca tota ad latera fusca est, supina lutescit, pluribus prædita annulis nigri-

cantibus, à capite ad extremam alvum linea item nigricans defertur, mediam alvum distinguens.

Loco *Sexto*, quæ datur, ex minimarum genere est, quin etiam paulò minor quam pictor expressit. Nisi moveri, aut incedere videas, alvum à capite vix interstingues. Pedes habet innumeros. Toto corpore coloribus miniaceo, nigro, luteo, & albo varia est. Caput totum est nigrum, nigri item pedes, nigra capillamenta, dorsumque & venter tergius miniaceo colore conspicuum est; annuli nigerrimi, inter quas supra punctum est album, infra luteum. *Septima* paulò major iisdem ferè coloribus variat, sed pedes tantum habet quatuordecim. Totum corpus quadrangularibus punctis constat, primò (à tergo ad inferna descendendo) nigris, dein flavis, tertio miniaceis, quæ latiores sunt: quartò iterum nigris, quinto flavis, sexto nigris, flavis rursus septimò, ultimò ac octavò nigris. Caput totum, ut in præcedente nigrum est, pedes item nigri. Sed capillamenta ferè ferruginea. *Octava* murem montanum, qui vulgo Marmota nobis dicitur, facie æmulatur. Tota coloris est castanearum, admodum hirsuta, longa palmum. Color propè annulos dilutior est. Cum invertit se color inter annulos apparet niger holoserici instar micans, & cum ingreditur, capillamenta quæ sunt à lateribus, ad cinereum vergere videntur. Caput totum est nigerrimum.

Nona ex mediocrium genere est, corpulentior tamen, tota viridis, exceptis tuberculis, quæ per singula annulorum intervalla tria habet, & quartum in dorso, ex quo capillamenta, enascuntur similitudine penicillorum, quæ coloris sunt planè aurei. Os nigricat. Pedes anteriores lutescunt, posteriores virides sunt; omnes numero quatuordecim. *Vndecima* similiter per dorsum habet tubercula rotunda cum suis penicillis, nec non inter singulos corporis flexus, sed cærulea, rostrum item

cœruleum, & pedes præter tres anteriores, qui minores sunt, & coloris ex castaneo rubicundi, quo colore corpus totum constat. Durum mihi peperit folliculum. Pedum numerus corpori, flexibus respondet. *Decima* tota etiam est viridis, tuberculis, & floccis cœruleis, rostro & anterioribus pedibus ferrugineis, reliquis nigris. In alvo maculam habet ferrugineam. Habes *duodecimo* loco huiusce decimæ *Erucæ* expressum folliculū coloris ferè ferruginei, admodum densum, & durum. *Decimozertio* loco picta tota hispida est: Linea candida à capite exorta ad caudæ finem per tergus fertur. In dorso duodecim habet velut puncta, aut potius tubercula rotunda, sex ad singula latera colore mali punici; item quatuor alia à singulis lateribus ex nigro ad castaneum vergentia; ex quorum omnium medio capillamentum quædam exeunt numero quatuordecim, quorum octo magna sunt, parva sex. Cætera per dorsum cœrulea, supina pars, & pedes flavescent. *Decimaquarta* colore est ferrugineo, superne admodum diluto, & ad luteum vergente, inferne admodum intenso. Annulos habet nigros, & punctis ad latera maculatur exiguis candidissimis. *Decimaquinta* inter minimas majuscula est, colore tota flavo, inferne ad aureum, superne ad castaneum inclinante. Caput & alvi extremum nigra sunt. In dorso nigra etiam habet puncta, sed intus candida: capillamenta penicillorum instar distinguuntur invicem. Pedes habet exiguos ferrugineos. *Decimafexta* eadem est, ideo picta, quod tacta se velut in vertibulum contorquens stellæ figuram exprimat coronatæ. *Decimaseptima* rubra est, annulis nigris & albis, ubique maculis variegata, capillamentis exilibus, rubicundis. *Decimaoctava* capite est coloris aurei, corpore vero toto cœruleo. Linea aurea nigris conspersa guttulis, rotundis à capite ad anum, usque per superna fertur. Ab utroque illius lineæ lateribus, rursus aliæ maculæ sunt, seu potius puncta mi-

nima nigra ipsa posita, ut etiam lineas duas, hinc inde unam efficere videatur. Alvi extremitas acuta est, & nigra, nigri quoque pedes, numero quatuordecim, licet quatuor ab utroque latere in anteriori parte pictor pinxerit. Capillamenta habet subtilissima plenè aurea. Ova mihi peperit candidantia, quæ appinimus postremo loco.

PUNCTUM IV.

De Erucis quarta tabula.

IN quarta tabula quatuor duntaxat dantur. Quæ primo & secundo loco, ex maximarum genere est. Alvum habet bifidam, & ex dorso extremo, caudæ exerit erectam. Toto corpore ferè uni colore ex luteo fusca. A vertice ad quartam usque vertebra lata est linea aterrima, exiguis aliis una recta, cæteris transversis candidis insignita. Supremo etiam vertice atro est, facie anteriore flava, pedes habet monstroscæ magnitudinis. Supina parte ad cinereum vergit. *Alteræ*, quæ *tertia* est in hac serie, tribus constat coloribus, viridi, aureo, & nigro. Corpore nimirum undique toto viridi, sed annulis nigris aureis punctis distinctis. Inter annulos singulos linea est annularis item sublutea. Pedes habet quatuordecim virides. Fructumne arboris an potius folliculum cujuspiam Insecti dicas, quod quarto loco depingitur; id Frat. Gregorius Capuccinus Regienis mense Julio anni 1597. in abiete offendit. Folliculum esse arbitror: erat enim intus plenum telis Araneo similibus. Inerant & ova. Quare cum *Erucas* aliquot ova edere observaverim; *Erucæ* cujuspiam esse judicavi, eam hoc sibi fabricare operculum, ut ova ab omni externa injuria protegat. Figura, & colore maturas æmularur olivas. Ejus exterior substantia erat cartilaginea, & variis exiguis tuberculis ceu punctis extuberabat.

Sed nūquid hæc *Eruca* ipsa texat, & veri-

verisimilius est, vel aliundè Crabronum more allata materia conficiat, necdum didici. Fructum interim non esse abietis exemplo discimus, quæ conifera est; nisi quis dicat abortivum esse, quales multos observamus in quercu. Cum reperiretur, non erat unicus, sed quatuor simul erant conjuncti: quatuor ni fallor Erucarum opus ac labor. Quâ in conjecturâ si fallar, lector boni consulat.

PUNCTUM V.

De Erucis quinta tabula.

INs, tabula sunt novæ, quæ *primum* locū habet, magnitudine est duorum digitorum transversalium, colore fulco, quaternis macularum nigrarum seriēbus distincta: capite flavescēte, toto corpore glabro; utrimque ad latera propè ventrem lineā quadam flavescēte insignito: subtus toto colore albicante. In brassica nasci rustici dicebant. *Secunda* descriptæ aliquo modo est similis, quoad formam & glabritiem, sed minor tamen, coloreque castaneo magis diluto; capite duabus maculis nigricantibus insignitur. Ab eo ad extremum utropygium duobus macularum ordinibus, partim atris, partim luteis decorata est; & utrimque ad latera lineā quædam rubescens per longitudinem fertur, cui in singulis annulis punctula quædam in medio cædida, & in circumferentia nigra supersident. Parte supina tota dilute lutescit. *Tertia* biua è laterib. frontis emittit cornicula exilia, & brevia: caput etiam habet parvum & nigrum. Toto corpore hirta est, & colore ferrugineo, annulis vero nigricantibus. Capillamenta penicillos æmulantur ubique, præterquam in cervice, & dorsi initio, ubi vix ipsa videntur capillamenta, quia rarissima sunt, & exilia admodum. Cauda etiam penicillis horret, quod nec dum in aliis vidi. *Quarta* ejusdem cum secunda magnitudinis, colore est terræ illius, quam umbram pictores dicunt: Inter

singulos annulos tria habet tubercula, ex quibus pili oriuntur penicillorum figura coloris castanei. Albicans vero lineā per dorsum rectā à capite ad caudam ducitur. Pedes anteriores magis, quā posteriores nigri sunt. Inter singulos quoque flexus à lateribus punctula sunt albicantia alternatim posita. Quod *quintum* datū in hac tabula, id dispari fructu nascitur. Celebre est apud Plinium aliisque probatos scriptores ad quarthanam. Alibi de hoc insecto, hoc etiam prodidit loquens de remediis adversus dolores dentium. Is quoque vermiculus, qui in herba labrum Veneris appellato invenitur, cavis dentium inditus mirè prodest. Nam Erucæ brassicæ, ejus contractu cadunt. Idem mihi proprijs ante multos annos manibus ostendit Cardinalis Paleotus: neque id amplius videre potui, licet multos fructus, diversis aperuerim temporibus; donec tandem an. 1592. sub finem Septembris cum fortè speculaturus, nunquid potius in maturis quam immaturis nascerentur, inveni illis, qui maturi erant. Longitudo digiti auricularis transversim dimenti: sed cum nunc exactius descripturus id intuerer, offendi ex erucarum genere esse, nam quatuordecim progreditur pediculis. Caput atrōre splendet, ut semen amaranthi æmulari quodammodo videatur: cætera albicat. Dioscorides etiam meminit, sed nemo veterum Erucam esse scivit. *Sexta* à lateribus leviter lutescit, infra, ac supra colore est castaneo, annuli quoque castanei caput nigrum, pedes exigui, sublutei. *Septima* pictura est induramenti cuiuspiam Erucæ affabrè facti ex folio quodam arboris, aliaque materia bombicina. Folium id extrinsecus multis velut laminis sericis albicantis coloris erat obvolutum; intusque quidem eodem modo, sed pluribus laminis intricatum erat. In centro, seu medio laminarum plurima ova, nigra, parva seminib. vel hyoscyami, vel nicotianæ comparibus, una cum fœtibus etiam numerosis latebant. Ex quo docemur etiam Erucas esse, quæ

que & ova, & eodem etiam anno fœtus edant. Aliud nidulamentum sive folliculus exhibetur loco octavo, figurâ pudendi humani. Inferna enim parte referebat quodammodo scrotum, superiore virgam, ac eò magis cum duabus, ut hæc instructum esse fistulis aut ductibus. Eo aperto vidimus rami frustulum, & folij pediculum figuram virgæ efformare: hæc enim simul complicata Eruca filis obtexerat; sicut item folium, quod scrotum efformabat. Intus ut in proximè descripto, & ova & fœtus delitescabant. Erant ambo isthæc nidulamenta ita undique clausa, ut ne hilum quidem aëris, ne dum pluvix admitterent. At cum ita undique clausa sint, quispiam quærat, quomodo ea ibi posuerit Eruca, cum hæc intus non reperiatur. Responderem ego texere quidem primo folliculum Erucam non totum, & in ea, quam texuit parte ova edere, dein occludere, & abire, sed nunquid postmodum moriatur, aut in Aureliam cōvertatur, nec dum didici. *Postremo* loco depicta Eruca tota erat viridis punctis conspersa nigris, capite rubro.

PUNCTUM VI.


De Erucis sexta tabula.

IN ultimâ quindecim depinguntur. *Prima* est tota viridis, lineis transversalibus, sed singulis tribus aureis punctis decoratis, quales in pluribus aliis observavi, annulis luteis, sub quorum singulis punctum est atrum: rostro etiam atro est, atris anterioribus pedibus, posterioribus viridibus. *Secunda* quoque est viridis, sed in hac lineæ nigræ illæ corpus ambientes latiores sunt, & binis tantum maculis aureis insigniuntur; præterea annulos habet nigros, & luteas, latasq; velut è capite antennis emittit. *Tertio* loco habet figuram Cossi, de quo suo post loco separatim agemus, hic ideo positam, quod si posteriores haberet pedes, omnino esset Eruca. *Quartum* depicta Eruca glabra, ex minorum genere, toto corpore ex viridi lutescit,


sed annulos habet nigros, & inter singulos puncta oblonga tria, itidem nigra. Caput rubescit, retro, quod duobus minutissimorum punctulorum nigrorum ordinibus conspergitur. Pedes quatuordecim nigricantes. Habes *sexto* loco Erucæ suæ involutæ folliculo rubicundo Chrysalidem, sive Aureliam. Ad tactum tantum mobilis, & tota viridis est, & nigrum habet inter singulos annulos punctum, quod supra candicat. Habes deinceps aliquot Geometrarum icones, ideo hic adjectas, ut quomodo ab Erucis differrent, unico intuitu conspicias. (Geometras eas voco, quod hominis Geometræ ferè instar incedendo agros dimetiantur) Pedes enim in hisce animantibus contrario sese habent modo, ac in Erucis, quibus nimirum antèrius pauciores sunt, postèrius plures (loquor autem de ijs quæ habent quatuordecim) cum Geometræ sex habeant antèrius, postèrius etiam toridem, in medio ventre nullos, quo fit, ut eo, quo pictura prima ostendit, modo incedant. Aristoteles huic Erucarum generi nomen non dedit, sed appellat *καμτίας, ἀκνυάμωσι τῇ πορείᾳ* hoc est Erucas, quæ undatim incedunt. Parteenim, inquit, innitentes priore contrahunt sese, adducentes posteriorem, arcuatimque incedunt, & ex his scribit nasci *τιμρία*, & *ὄτρεγ*, quæ Gaza vertens Acias, & superas dixit. *Prima* tota lutescit superne, infernè ad ferrugineum accedit: A lateribus inter singulos flexus punctulis nigris maculatur. Quæ subsequitur eadem est extenso corpore depicta. Caput candicat, pedes nigricant. Nona in hac serie Geometra est omnium minima, tota viridis, vel potius coloris herbacei, excepto capite, quod rubicundum est. *Decima* pictura ejusdem est in spiram revolutæ: nam si tangas, eo modo se contrahunt, & caput colant, contra pericula, ac injurias. *Vndecima* ex minorum genere est, corpore coloris ferè ferruginei, à lateribus lutei. Pedes, caput, & extremum caudæ habet nigra. *Duodecima*, rursus ex vulgarissimarum Erucarum, quæ bras-

ficas


Erucarum Aldrov. Tab. 6



Aurelice Aldrov.



Bombyces. Seidenwürm Mouf.



Bomb. supine sect,

B. ferico exempto.




Papilio Eruptur,

Bomb. Mouf. P. Erupt,


Papil. Erupturus

Follicul, Bomb.



Papilio Bombyc.

Follic. incluso Papil.



B. gravid,

ficæ infestant, tota herbacei coloris, exceptis annulis, qui lutescunt. Decima tertia eiusdem coloris herbacei, sed annulos habet aterrimos, ferici instar splendentes; præterea inter singulos annulos rotundos habet velut oculos luteos, & in medio horum nigerrima puncta. Caput luteum est, punctisque nigris minimis maculatum. Quod *decimotertio* loco depingitur insectum, corpore quodammodo Erucas æmulatur glabras, sed pedes habet ab utroque latere ternos, quanquam bini tantum à pictore expressi sint: toto corpore est nigerrimum. Epidauro id allatum mihi donavit Antonius Maria Alberghinus Philosophiæ & Medicinæ D. eximius, inquit illius pulverem ad strumas curandas remedio esse peculiari, ac præstantissimo. Ex minimarum genere est *postrema* Erucula, tota fere cinerei coloris, annulis vero subluteis.

ARTICULUS III.

De Bombyce.

Nomen. Bombycis historiam separatim
Alar. Hist. nos daturos supra diximus. Sta-
Inf. l. 2. c. 4. mus ergo hic promissis, addituri in-
super & de *Chrysalide* seu *Aurelia*, ali-
quid. Eruca ista *βόμβυξ* est Aristo-
teli, Hesychio *ὀλομήτης* seu *ὀλησμήτης*,
ut quibusdam placet; Ambrosio &
Basilio *vermis Indus*; Alberto, *vermis*
lanificius, Baptistæ Pieræ, *Eruca bombi-*
civora; Scaligero *Ser*; Aufonio, *Ser ve-*
stifluus; Pausaniæ *Seres*.

Descriptio Omnes septem habent annulos:
Pedes quatuordecem, anteriores
sex, qui minores sunt, posteriores o-
cto, qui post tertium annulum inci-
piunt: postremæ duæ omnium sunt
maximæ, supra quas cauda est, acuta
& surrecta. Inter singulos annulos
macula conspicua est nigra. In dorso
inter eosdem annulos, quatuor sunt
Semicicla literam G maiusculam
formantiâ, quorum priora eviden-
tiora sunt postremis, quæ nempe
tam sunt exigua, ut visum fere effu-

giant. A capite ad caudam usque li-
nea per dorsum medium fusca fer-
tur. Rictus omnibus idem, porco-
rum ferme similis, oculi magni, & ni-
gri, uropygium caudæ piscium ferme
specie.

De generatione & aliis, hæc nos
olim in Naturæ admirandis diximus.
Vermis primo est, Folliculo inclu-
sus emoritur informis. E folliculo
dentuo prodit alatus papilio. Itaque
insectum reptile in volatile per me-
dium Zoophytum motus atque sen-
sus expers, admirabili metamorpho-
si commutatur. Exclusus enim pri-
mo vermiculus, alimenta quærit co-
piofa, quibus avidè depastis, capitis
crebra arrectione cum veterno ve-
luti luctans, tandem obdormiscit
triduum vel biduum, pelleque in-
terea exutus ad consueta redit ali-
menta. Cum quater pastus, quater
obdormiens, quater renovarit, spre-
to deinde pabulo sublime petit, &
virgultis conscensis, alvo rite pur-
gata, lanificii rudimenta inconditis
primum mæandris per ramos exer-
cet, mox folliculo inclusus pelluci-
do, indefessi laboris fructum e centro
ad circumferentiam protrudit pilum
album, viride, flavum, ovali figurâ,
cum æqualibus veluti certans, no-
vem dierum spatio, absolutoque o-
peri immoritur. E folliculo loco sub-
terraneo deposito, papilio post deci-
mum diem prodit cornutus, sed ala-
rum alimentique immemor, brevis
ævi iacturam fœtificatione repara-
turus, molli impositus velleri, concu-
bitu perpetuo per triduum, rarius
quattriduum fœminæ connexus, e-
moritur, nec multo post vidua, reli-
cto post se instar granorum milii se-
mine, centenario fere, mariti fata
sequitur. Sed de his & aliis quæ cir-
ca bombyces occurrunt, accuratissi-
mè egit, *Andreas Libavius*, in sua ob-
servatione, quam hic in gratiam Naturæ
indagatorum appono.

Cum difficile sit singulorum au-
ctorum sententias & experimenta
ad amissim explicare, quæque illi
diversis temporibus aut locis obser-

vavere, ad unam historiam revocare, proq; huius fide damnare vel astruere, quod quisque verum usu & notatione rerum deprehenderit: ubi forsitan eveniet, ut nec Plinius, nec Pausanias, nec cæteri, qui videntur secus ac à nobis cognitum est, commentati esse, repudiandi existimentur: adjiciam specialem historiam bombycum domesticorum, quam anno salutis reparatæ 1599. Rotenburgii ad Tubarim ipse ex diligenti istorum cura & attentione ad naturam, & opera consignavi, vel utique in diarium conjeci. Si quid diversi in India, Græcia, Italia, & alibi aliis temporibus, ministerio, educatione, consuetudine, & cæteris, perspectum est: quanquam natura dicatur semper agere eodem modo, nec nisi accidentibus variare: id quoque conferent, qui notaverint, ut sic ex multorum experientia naturæ historia accipiat incrementum & absolvatur.

Circa vigesimum quintum Aprilis ovabombycum in charta simplici superiore anno procreata, & per hyemem in tepidario cubiculi servata exponebam Solis radiis per fenestras orbes incidentibus. Quæ plumbea seu nigra erant non quidem omnia uno die in eruculam abibant, sed tamen ante finem eius mensis cuncta, sub auroram potissimum vermibus erumpentibus, prout quisque perfectionem suam erat consecutus, relicta vacua testa seu putamine coloris albi, in latere orbiculo eroso, qua in parte extremitates nonnihil nigrescebant, propter terminum rodendo acceptum. Punicea, & citrea, sive puta, sive nigro puncto discreta, nihil edebant, quod vel intacta fuerant masculo semine, vel principium in eis suffocatum. Hæ eruculæ intra ovum nanciscuntur suam speciem, & in circulum convolutæ jacent, unde exesa testa primum nigrum splendensque caput exerunt, postea tractim prorepunt osculo, & pedicellis nisu suo, & in pavementum impa-

rtione, adminiculum præbentibus. Statim tunc notavi filamenta ab oculis dependere eaque tenuissima ut vix conspicias nisi obvertas luci. His sese librant, pendentque à foliis, aut etiam sicubi delapsæ ex altiore loco eum repetunt, vel experiendi gratia suspenduntur, multiplici flexu involvunt, atq; ita sursum contendunt, more vulgarium erucarum arborum folia & flores depascentium. Vermiculus niger est & pilosus cum albo circulo, in confinio pectoris & cranii, & alio in ea regione, qua venter contingit petusculum, eique cohæret, quitamen ob pilositatem non est admodum conspicuus in prima ætate. In fine dorfi, ubi est alvi exitus, pinna quædam parva prominet: Et plane cætera forma eadem est cum bombycum specie, nisi quod hirsuties & nigredo per aliquod pellis mutationes in glabritiem splendentem, albedinemque transmigrant, & ex parvula bestiola fiat vermis, medium digitum viri mediocris tribus articulis junctis longus, crassus ferè auricularem, quanquam non omnium eadem sit magnitudo.

Invenias aliquas eruculas cum caudæ plectro triplici, aut duplici, ita ut majus surrigatur ex circulo ultimo dorfi: minora ex subiecta statim lorica caudæ. Vnum vidi maius hinc inde binis stipatum minoribus, in quorum loco aliàs duntaxat sunt protuberantia puncta.

Progressio erucarum est ut bombycum. Nam caudæ fulcra pavimento infigunt, & postea tractim per circulos sese promovent, sublati primo partibus, inter caudam & pedes posteriores: postea his fixis interstitio interpectus & pedes, donec ad pectus ipsum & pedes anteriores perventum, quibus hærentibus cauda vicissim tollitur & fulcitur gressus. Nam motus animalium fit aliquo quiescente & stabilimentum præbente. Natis statim præbui tenera mori folia, in quæ transiit

transfili eas cultello levi, vel etiam sivi per se irrepere in folia, cum quibus eas cistellæ lignæ demandavi, invadunt autem folia ab extremitatibus & planitie superius inferius. Non enim impediunt rostri appendices. Ita pascebantur ab Ultimo Aprilis, & circiter, usque ad Octavum Maji, quo animadverti primam senectam positam, quæ erat oscillum nigerrimum splendens cum exili nigra pelle. Solent autem aliquando ante quasi cunctari, & dormire somnum renovatorium, siquidem somnus est appellandus. Abjecta senecta, statim apparent grandiores, leviores, & nigredine dilutiores. Nam corneum capitis tegumentum, quod subnascitur veteri, secundum proportionem maius est. Detracta pelle, etiam intumescit reliquum corpus, quasi prius incrementum prohibuerit angustia corii. Idem tegumentum seu cranium capitis, cum recens est, albicat, postea cum firmatur itidem evadit nigrum, donec plures procedant mutationes: Sicut autem ante positionem leberidis abstinent esca, ita & post aliquantulum quasi pigrescere videntur: nam tenerius est instrumentum quam ut carpere folia possit. Dum percuritant folia, non raro altera alteram transit, idque patitur ea placide nisi nimis offendatur. Tunc enim sublato pectusculo capita concutiunt hinc inde motitantes, idque etiam bombyces faciunt. Semel atque iterum tunc præbetur pabulum, & angusto in loco degit multitudo. Cum satis comederunt, ad dormiendum inducuntur. Tunc videas eas instar statuarum, aut eorum qui catoche laborant, pectusculis sublati cum osculo in foliis quasi obriguisset. Sed si pabulum novum injeceris, statim excitantur & comedunt rursus. Olfactu videntur folia deprehendere nova. Nam etiam nondum tangentia erectione corporis affectant. Fieri tamen idem etiam alteratione quadam qualitatis tactilis putes. Excrementum alvi tunc exile est, & nigrum in-

stat pulveris pyrij. Decimo sexto Maji aliquæ secundo mutarunt pellem, aliquæ quieverunt, & sequentibus diebus exuerunt membranas, Rumpuntur eæ in capitis confinio hærentesque foliis manent, eruculis per circulos ordine motos sese expedientibus, oscillum etiam non statim cadit, sed pender aliquanto spacio ab ore novo.

Tunc color niger in gryseum mutatur, & erucæ grandescunt magis. Pectus tamē album conspicitur, plenumq; succi adeo, ut pellucere credas. Quoniam autem non uno die omnes mutant corium, si placet, potes pares ab imparibus segregare. Sed ego una reliqui, tantumq; recentibus suppeditavi novam escam, cæteris in veteramentis adhuc conviventibus, & metamorphosin expectantibus. Non enim tunc potes stabulum expurgare, sed differendum negotium est, donec evigilarint, & possint in folia pellici nova. Tertia mutatio incipit 22. Maji, quo dormierunt multæ, aliquæ etiam pellem devolverunt. Ea non amplius tam nigra erat, sed albedinem præ se ferebat cum oscillo, ipsique vermes exhibant candidiores, relicta senecta, corrugata magis quidem ea, quæ non adhærebat foliis per filamenta, minus autem eæ quæ affixa erat. Nam hæc in longum porrigebatur trianguli specie, ratione altitudinis. Etenim deorsum acutum surgit è medio, quod quidem ego fieri puto per caudæ apicem ea tractum & elevantem corium. Extremitas posterior huius leberidis est instar caudæ piscium bifidæ. Pascebantur erucæ liberatæ rursus usque ad 25. quo somnum renovantem animadverti, & aliquas etiam eodem die novas: sed 26. dormiebant plures, aliquæ etiam 27. paucæ 28. & 29. ita ut jam maius esset discrimen. Quæ tamen dormiebant 27. eæ sequente mutabantur, & ad pabulum post cunctationem aliquam redibant.

Hac quarta mutatione ex erucis facti sunt bombyces glabri & albi, cum maculis tamen plumbeis, & oscillo albi cornu instar. Hic est men-

sis primus vitæ, & prima ætas. Sed cum in tertia & quarta renovatione cuticulæ omnia sint notatu facilia, pateantque liquidius, uti observavi, accuratius paulo describam. Eruce tertiæ & quartæ mutationi vicinæ, pellem habent subsquallidam aspectu, & rigidiorē quam vermis incrementum ferat. Itaque subtus nascente cuticula molli abscedit paulatim, & quia cohærent nerveis quibusdam vinculis in utroque latere, qua sunt punctorum vestigia, hæcque non facile distrahuntur, maior nisus est in exeundo, & quies fere bi-duana.

Cum itaque foras contendunt, vetus oscillum corneum separatur à subnato novo, vermis ipse, siquidem affixa folio leberis est, pedes & crucula convellit, modo contrahens modo remittens, donec ex ocreis vestustis eos extraxerit. Interim & cutis laterum corrugatur, corpore per squamas diviso in se contracto iterumque extenso. Sic toto corpore laxantur exuviae. Mox in antierius sese promover vermis, & lateralia vincula paulatim ducit, promotis ordine squamis iterumque reconditis ut fere initio dubites *πρόσω* an *ὀπίσω* exiturus sit vermis. Sed tamen isto modo vincula abruptuntur. Primum juxta pectoris confinia observatur promotio. Ibi enim puncta secedunt, & duo in verme, duo in leberide apparent. Dum porro squamæ trahuntur, quasi linea violacea existit in latere utroque senectæ, tum ob puncta, tum vincula intus applicata lateribus. Interim cauda rugatur, pedes exinaniuntur, prorepiq; octava horæ parte vermis novus, vetus oscillum ori præfixum habēs, ut mulus capistrum. Videas in extremitate caudæ etiam chordam albam trahi, qua pelvis dorso cohæsit. Facilius enituntur effixi, solutis verò miris modis sese convolvunt in dorsum, latera, ventrem, donec tandem expediuntur. Et horum leberis in globum fere coacta est, illorum vero extenta. Si duo extrema unguibus prehendas, & diducas, justam longitudinem recuperes,

cum vestigiis pedum omnium & squamarum. Nihil enim deest præter oscillum. Longe a candidior quartæ mutationis cutis est quam tertiæ, ut & cranium. Vermes ipsi jam bombyces sunt, modo recte & sedulo sint curati & nutriti, pingues candidique, quanquam alii aliis minus, adeo ut videantur nonnulli subflavisse, alii ad plumbeum non nihil accedere. Pedes & ora initio sunt mollia. Itaque & tactu foliorum & comestu aliquantulum abstinent, hærent eis pertinaciter, & caudæ quidem adminiculo possunt retrahi & explicari, pedes autem posteriores obtusiores, crassioresque tribus quasi articulis constantes in medio nigrum punctum habent, quem ego puto esse prehensionis instrumentum, quod queat pro arbitrio, ut unguis felium, promi & recondi. Anteriores non tantum gradiendo inserviunt, sed & prensando folia, trajiciendo corpus, distribuendo fila & aliis usib. partes secundum longitudinem à capite ad caudam in dorso sunt caput, gibbus seu tuber pectoris rugosum, octo semicirculares squamæ & tripartita cauda. Tuber pectoris in capitis confinio aliquibus albet, aliquibus distinctum est maculis duabus lividis, quas dividit linea flava, quæque diversis diversimode sese habent. Nam color aliis remissus, dilutusque & fere evanidus est, aliis intensior. Qua verò sese attollit ille gibbus, quatuor nodi conspiciuntur, quibus assistens cutis rugosa efficitur. Sequuntur semicirculi: Hi junguntur membrana tenuissima tanquam linea viridante ex cæruleo. Ipse vero squamæ albet, quamquam in nonnullis aliquid plumbei subluceat: & cum jam maturi sunt bombyces serificio, spicei evadunt. Singulæ etiam in utroque latere insigniuntur puncto, quem ambit circulus parvus. Dixi ibi vincula esse, id quod etiam apparet in chrysalide. Deinde squama octava, aut duobus punctis lividis distincta est, aut semicirculis lunatis, quasi duas lunulas se mutuo respicientes cornibus inscripsisse. Veruntamen non sunt pares in omnibus.

Nam

Nam alicubi magis sunt conspicui, alicubi evanidi, subtiliores, tenuiores, magis plumbei, magis albentes, &c. Hinc bini circuli leves post quos qui sequitur duos nodos habet, usque ad eum qui podici imminet, & apicem seu cuspidem furrigit. In maioribus observantur protuberantiæ in squamis singulis, sed tamen hæ sunt eminentiores in tertiis. Cranium ipsum corneum quidem est, sed divisum quasi in tres partes, dexteram scilicet & sinistram, quas putas oculorum notas esse, & deinde oris compagem, quæ iterum in appendices & maxillas suas, in quibus serratæ dentium figuræ distinguuntur. Per totam dorsæ longitudinem gula protenditur, usque ad fulcræ caudæ, super quibus inter ultimam squamam est exitus alvi. Conspiciuntur etiam in dorso usque ad plectrum caudæ, quidam nervi continua diastole & systole mobiles, quo pacto moveri cor & arteriæ solent. Et hi nervi ex albedine flavent, cumque distrahuntur, viridem gulam, seu intestinum detegunt. Cohærent plectro, tanquam ibi esset respirationis quidam exitus, quanquam non respirent. Sed vitæ sedem ibi esse non est dubium, licet deprehenderim in nymphis partem quandam rubeam, ut infra docebo, palpitantem per se solam instar cordis. Cum refecatur istud plectrum, exit humor liquidus subflavus, & vermes ipsi non quidem moriuntur, sed tamen moventur vehementius, seseque convolvunt, & reflectunt, ut iudices dolorem exoriri acerbum, nerveo principio læso. Stercora cibum referunt, suntque sicca, sexangula, oblonga, quasi stellata, unde intestini vel alvi dispositionem quis colligere possit. Virent quidem ex esca, sed tamen quia stipantur dense, & exicca sunt, nigra apparêt, sicut plus viridescunt humidiora. Fœminas à maribus distinguere hic jam queas si attentus sis. Evenit enim & in his, quod de aliis fœminis scripsit Philosophus, ut scilicet sint maiores, & pinguior, humidiores, molliores, candidioresque maribus, qui austeriores, maculis lividiores, te-

nuiioresque. Si digitis attrectes, omnes frigere animadvertas; Sæpe se erigere solent in pedes posteriores, & tanquam statuæ sic manere. Cum vesci volunt, foliorum margines, & venas protuberantes invadunt, contra ac erucæ. Puto obstare appendices oris, præstat tamen aliquid adiuventi pedum anteriorum in tenendo cibum officium. Exedunt autem folia circulariter, seu in orbem, ut lacuna maneat rotundi ambitus: Pasti secedunt, & coniuncti multi quasi cumulo quiescunt, delectari puto mutua calefactione & tepore: ut dormientes à mutaturis pellem discernas, observanda erit nervorum in dorso systole & diastole. Nam in dormientibus par est vigilanti, motio, at in exuvias posituris tardior obscuriorque, ut intelligas tunc potius ægrotare. Deinde dormientes os habent simplex, sed senectam abiectionem præferunt ossillum. Verum hoc non in bobycebus sed erucis adhuc locum habet, quidam iam quater renovati circa caput polluantur fuscitudine, & tamen pergunt vescendo. Quidam non proficiunt admodum incremento, sed parvi manent.

Dictum superius est à Maji 25. quartam mutationem in pelle usque ad 29. eiusdem in diversis factam esse. Ab hoc itaque tempore usque ad Septimum Iunii, & deinceps per octavam, nonum, decimum, undecimum, studiosè affectarunt pastum, itaque pingues & grandes evaserunt, fuitque ter die, & ultimis diebus quater, vel sæpius præbendus cibus. Nam cum serificio & maturitati sunt vicini, vorant cōtentius, invadentes folia cupidissime atque & nervos absumentes. Notabis autem circiter tredecim dierum spacium intercessisse inter renovationem quartam, & à cibo abstinentiam seu serificii meditationem. Respōdent enim sibi tempora à 25. Maji ad 7. Iunii à 26. ad 8. à 27. ad 9. à 28. ad 10. à 29. ad 11. quo ultimam inclusi excepto uno parvo masculo qui diutius perseveravit in pascendo. Iam circa ultimos dies plerique incipiunt, spicem colorem adipisci, qui à posteriore

riore parte incipit evidentius apparere, hincq; ad gibbum pectoris ampliari & progredi, quamquam aliqui magis & fere toti flavent, aliqui albi misto extulco manent. Cum fata instant secedunt ad latera capsulæ, nec adoriuntur folia ore, quamquam perrepent. Nonnulli ad angulos fila figunt, quasi iam exorfuri vestibulum: alii repunt per extremitates, & hinc inde speculantur, inquiruntque aptum latitandi locum. Inclusi pletrōsque cucullis chartaceis, quos alii cubi commodè disposui & affixi, in quibus rodendo, vellicandoque parietes aliquantum strepunt, sed postea alvi sicco & humido excremento (nam tunc duplex emittunt) projecto ex posterioribus parietibus chartæ affigunt ea tenacitate, ut glutine firmatam putes. Postea triduo continuo, occupati folliculum pertexunt, quo absoluto, quintam ponunt pellem cum capite & cauda, transformanturque in nympham; Aliquos non inclusi chartis, sed in capsula lignea dispositis ramusculis sivi sibillo-cum nidi eligere, ubi observes potissimum sequi angulos, & latebras, & plerumq; multi eodem in loco bombycia faciunt, si fieri id possit, alii statuentes ea in rectum, alii in obliquū, alii in latum. Si locus est angustior, comprimitur à latere folliculus, nec plane ovalem tumorem retinet; est alius alio longior, amplior, densior, pro magnitudine & firmitate bombycis. Discrepant etiam colore. Sunt enim aurei, argentei, citriniq; & hi duplices. Quidam enim virorem referunt, quidam plus ad citrinum declinant, quamquam hi omnes ab aliis soleant virides appellari. Omnium prodromus, quantum ego observavi, albet, præter paucos, qui stupam sub-citrinam præmittunt. Aurei aliqui etiam internam tunicam habent albam, nec est stabilis color citrinus. Nam cum explicantur ex aqua folliculi candidum fit filum, in lixivio flavescit, &c. Sed operæ pretium est, contemplari serici materiam, & quid sit id, quod tanta longitudine continuum præbet filum.

Cum itaq; grandem vermem vagabundum conspicerem, funiculum collo injeci, & ad sectionem protraxi. Vixit pertinaciter etiam coarctata gula, exquisite sensit. Nam ad singulas incisiones dorsi, etiam vix applicato cultello, violenter se convolvit, quasi ore & anterioribus pedibus sibi opem laturus. Divisa cute conspexi longum intestinum, quale est lupi piscis, anteriore parte tumidum & capax, posteriore arctius. Ei intestino nervi seu arteriæ pulsatiles cum continua systole & diastole incubebant, & definebant in plectro caudæ. Hoc reciso, non tantum humor flavus perspicuus erumpebat, sed & capita nervorum; in motu inde sese exerebant, & agitatio fiebat languidior. Habet autem intestinum duplicem tunicam, unam externam crassam, alteram internam tenuissimam. Crassa sentit accurate, estque juxta gulam visciditate multa obductum, quæ postea fit materia alarum, & pilositaris in necydalo, sicut humiditas excrementitia externa in aureliæ putamen cogitur. Crassa tunica pertusa, exit intestinum, adhuc involutum tenui, & multum cibi hesterni è foliis viridibus continet. Videre verò etiam est ex pelle secta; & crassa tunica intestini effundi liquorem sat copiosum & transparentem, quem ego puto pro sanguine esse, & mutari coctione in serici materiam, membraq; bestiolæ. Capite præfecto extumescit initium gulæ, & plane exhibet obtusum nymphæ caput. Exempto intestino cum contentis fecibus in abdomine conspiciuntur speciem lumbricor. concreciones quædam lentæ & glutinosæ, aliæ flavæ, aliæ albæ, & duæ quidem magnæ cæteræ parvæ, tam similes lumbricis ut nihil desit, nisi pellis & vita. Vtrinque desinunt in acumen acutum. Situm autem in ventre talem habent, ut uterq; apex versus sit ad caudam, corpus verò reductum & geminatum. Dicas pensum esse complicatum, Si exordium filationis est ab apicibus, necesse est, ut ad os à cauda revocentur. Existimo parvas & albescentes portiones imbecillius

cellius sericum stupamque præbere, magnas verò firmius. Exemi hos lumbricos, vidique in charta statim exiccati, & fragilem duritiem induere, perinde ut bubulum gluten solet, ut tendines animalium & intestina, Homogeneum totum est, & pellucidum corpus huius materiæ, quam nullus hominum queat in tam renuia subtiliaque fila diducere, sed bombycibus hic labor est, ut araneis sua tela, relinquendus & solis dicandus. Corium exterius foris quidem albedinem plumbeo colore mistam habebat, sed intus subducitur cuticula partim livida, partim aurea splendens, ut in halece. Circa ventrem, ubi disponebatur materia serici, sat crassa substantia erat nerveis constans ductibus, & textura continente pinguedinem albam nerveis tunicis implicatam: talis postea etiam conspicitur in nymphis & necydalis, estque in his vulva & genitale membrum. Sub illa substantia plumbeæ sunt propagines in pedes dimissæ, tanquam tendines, aut chordæ. Pellis hæc manente matrice & genitali membro, intra bombycium exiit cum omnibus prominentibus membris: ita ut nympa & papilio inde natus nihil assumant ex bombyce præter alvum cum intestino, & in his existentibus nervosis partibus. Humor autem in intestino & genitalibus subsistit sat multus. Vnde postea & seminis materia, & excrementitia proluvies alvi. Verumtamen qui in intestino est humor, crudus adhuc est, & partim viret, partim flavet, crassus quadantenus, quadantenus aquosus. Si quis pinguedinem à nerveis tunicis genitalium separet, & chartæ illinat, cum resiccata est, sebaceam friabilemque inveniet. Putes conferendam esse cum lactibus piscium. Patet ergo in bombyce foris quidem hæc membra esse, pedes triplices, squamosam ventris coarticulationem, pectus, caput, os, anum, pellem, caudam, plectrum: intus autem intestinum, vitales arterias, vel

si mavis, nervos, carnem albam pectoris, genitalia, inter quæ & intestinum continetur, serici materia, & præterea panniculos membranasque nerveas, quibus continentur membra.

Cor habeant, nec ne, alius investiget. Necessè tamen est aliquod tale principium esse, idque non in capite, nec alibi præterquam in confinio pectoris, unde vis vitalis per totum distribuitur. Et maximè tamen elucet motu nervorum, vel arteriarum (uti libet appellare) in dorso ventris, non pectoris, usque ad plectrum caudæ. De nymphis & necydalis posterius dicam. Nunc de praxi serici ducendi quæ observaverim addam.

Cum abstinent pabulo, & ut dictum est, locum folliculi construendi explorant, circa alvi exitum plerumque maculam virentem aut lividam habent, cætero corpore albo, cum virore, vel livore, vel spiceo. Vidi tunc etiam crebro consistere inter vagandum, & ore veluti hiscere, sicut ruminantes vaccæ, cum ex ingluvie revocant cibos ad mastiandum. Consentaneum est bombyces tunc conari materiam serici ad os convertere & protrahere. Si includas cucullo chartaceo, rosionis sonus subinde per integrum diem auditur, & tunc in conum cuculi demittitur excrementum primo siccum, pilulæ nigræ viridis, aut luteæ forma. Penultima pilula plerumque viret, ultima lutea est & flaviofa. Numerus pilularum pro excrementi copia est. Nam deprehendi in una charta modo duas pilulas, modo plures, usque ad duodecim diversi coloris, utpote nigras, virides, flavas, easque non stellatas, sed rotundas; Cum ultima pilula lutea exit aquositas item diversicolor & consistentia dispari. Alicubi enim crassior est, alicubi dilutior, habens aliquid puniceæ & flavedinis, virorisque.

Saniem tamen quandam dicas subcruentam vel fuscā, qualis apparet

paret in charta pura, ubi tamen interdum notes etiam viriditatem pollutam flavedine, interdum quid cretaceum. In vitro lixivii faciem exhibet. Ne vero dubites, ore an alvo reddatur, scito, ore tantum expendi sericum, alvo excrementa, quanquam etiam ex ore emittant humorem tum morbidi, tum stranguati aut compressi. Deprehendi autem bombycem liberum è posterioribus utrumque excrementum reddentem. Ab aliquibus multus liquor excernitur, à nonnullis paucus. Qui multum vacuantur, videntur debiliores esse, & minus serici collegisse. Nam plerique parva bombycia texunt, non tamen omnes. Quali sericum sit futurum colore, ambiguum est. Nam contemplatione capitis, tergi, ventris, pedum facta, plerumque sum deceptus divinando. Nam non eiusdem coloris sericum ab omnibus ducitur, sæpeque stupa & postrema tunica albet, medium sericum aureum est. Putabam spiceos bombyces flavum, albos album reddituros, sed falso.

Nam album ab utrisque promebatur. Semel atque iterum scopum attigi, & vaticinatus sum, citrinam sceminam tale edituram filum; quale tamen etiam tractum est ab illo bombyce, cuius venter albo plumbeus erat, macula frontis flava. Vidi & scemellam totam albam, album sericum fingere. In parvis angustisque chartis, juxta proportionem tamen vermis, minores fiunt folliculi, sed spissiores & minus stupæ. Notavi tamen in amplioribus etiam parvos folliculos. Qui non inclusi libere sibi locum eligunt, in stupa temeraria multum absumunt filorum. Vnde jactura est in serico. Nam bombycia plerumque sunt minora, & minus dense stipata. Si velis attendere, rationem texturæ accurate cognoscere in his potes. Et enim postquam aliquamdiu vagati sunt, & modo hic, modo ibi exordium operis facere tentaverunt (id quod sedulo corporis nisu præstant,

dum hærentes pedibus posterioribus, caput & totum pectus sursum, deorsum ante retro, & ad latera, varie movent, sicubi sese offerat commodus bombycii affigendi locus, nec visu, sed tactu hoc peragunt: sunt enim hebetes oculis) tandem stamina producant, & firmamenta domus, eaque simplicia aut multiplicia, prout stabilimentum requiritur firmum. Si juxta pavementum id fit, posteriore parte inhærent huic, sin in alto, pendent eadem, seu à ramis, seu aliunde. Nam pectus & caput liberè vertunt, sique opus est, etiam posteriorum situm mutant. Ita conficitur vestibulum seu prodromus. Iam autem sicca excrementa ab alvo sunt reddita, vestibulo absoluto, ita ut jam vermis securus sit, tutusque ab insidiis externis: stercus ultimum excernit cum liquore, de quo ante.

Et hoc sæpe polluitur stupa, per quam tamen defluit, ad fundum. Exonerata alvo, parumper quiescit textor, & nudat podicem quasi laboraret tenasmo. Tunc revocat veri serici materiam, eamque continuat usque ad extremum halitum, & bombycii absolutionem. Paulatim tunc stipat fila ex amplo, in angustum, ita ut fiat forma ovalis, in cuius capacitate sese possit vertere. Os, pectus, & anteriores pedes in continuo sunt motu. Posteriora hærent, transferuntur tamen ad aliam plagam, cum ad basin vel apicem formandum sese accommodant. Qui in imo juxta pavementum folliculos texunt, videntur insidere pavimento nudo, sed paulatim sibi subtexunt fila, & universum folliculum pariter ubivis stipant, præterquam in acumine, ad quod in angustis non possunt pertingere. Itaque huius fabrica magis ab initio fingitur, sed basis magis in fine, quanquam nec hæc negligatur in exordio.

Itaque cum fila explicantur retinendo, apex nudatur primum, & relinqui-

linquitur interna tunica forma digitalis tegumenti. Texunt ita ad diem tertiam: Et adhuc potes laborantes videre secundo, si folliculum soli vel luci obvertas. In cucullis chartaceis basis sursum versa est, apex deorsum: Et rarior illa apparet binis diebus. Tertio demum densatur: & tunc vermis exiit senectam, sitque nympa, id quod facile potest deprehendi; Nam cum adhuc texunt, adhærent, nec percipitur lapsus brutus. Cum vero nympa evasit, quasi lapillus inclusus esset, moto folliculo, nympa cadit: Et hic brutus casus durat, usque dum in necydatum mutata fuerit.

Tunc enim expletur capacitas iterum, & necydalus hæret folliculo exitum quærens. Vnus autem vermis, sub mea cura unum folliculum texuit, cuius prodromus in inclusis chartæ, solida tunica est, in liberis variis modis ultro citroque dispositis & diductis constat filis. Alii vero animadverterunt in uno folliculo etiam duos, quin & tres inclusos fuisse. Verumtamen cum angustior futurus esset locus, sectus ille folliculus communis tribus est, & in eo inventi bombyces coarctati, adeo ut speciem trium digitorum coniunctorum retulerint. Liberati postea singuli aliquid pensi, parum tamen denuo edidere.

Notandum est, animadversum esse, quosdam bombyces, in charta nullum sericum fecisse, sed statim in nymphas abiisse: quod illis evenire crediderim, qui lactuca pascuntur, licet non omnibus, aut quibus pabulum minus iusto datum est, aut qui morbo correpti non potuerunt colligere serici materiam, quam sicut adeps, ex sanguine abundante sepositus, fieri existimo.

Eveniunt & alia monstra, de quibus suo loco.

Omnium folliculorum oblonga quidem & ovalis est forma. Vidi tamen unum album, ferè exactæ rotunditatis, ita ut utrinque basin haberet sphericam absque acumi-

ne. Erat parvus cum suo prodromo, sed tamen spissitudinis justæ. Verum bombyx in eo non abiit in nympham, nec necydatum absolutum, ut mox exponam.

Illud videtur dubium esse, num sericum ex alvi exitu promant, an ex ore, quanquam semper ore & anterioribus pedibus distribuant. Non leve argumentum est, quod iuxta caudæ fulcra in imo ventre conspiciatur quoddam rimæ vestigium, & extremitas utraque materiæ sericiæ in ventre respiciat illum locum. Adstipulatur & egestio excrementorum in ipso operis initio.

Sicut enim cum infantem exclusura est puerpera, quicquid sordium est in vesica & recto intestino, id compressum expellitur, ita in bombyce, à serico foras contendente fieri quis existimare possit. Ita instante labore venter tumentior apparet; à ventre incipit maturitas flavitie designata. Ea exit primum, ubi prius maturuit. Eruca & bombyces insuper lanugine quadam filosa, circa pedes iunguntur pavimento. Nonnulli inter texendum conspiciuntur à dorso initi, ut è ventre sericum extrahatur, & digeratur ore, pedibusque facilius. Hæc poterant afferri, pro prima sententia. Sed hanc falsitatis redarguunt alia firmiora. Nam ipse oculor. obtutus contestatur, quiescente ventre filamenta ore deduci, eaq; viscositate suâ adhærentia retracto collo, paulatim protrahi. Itaque non tantum in dorsum reclinati bombyces sic filum trahunt, sed & prostrati in ventrem, ubi tamen vermis totus libere sese vertit. Deinde nec ano, nec rima sub caudâ exire potest. Nam ex serici loco ad intestinum nulla est via, Et rima caudæ, quæ designat genitalia futuri necydali, obducta est pelle. Insuper, antequam sericum exeat, crebro gannunt bombyces, quasi vomituriendo pellicerent ad fauces materiam. Nec intumescunt circa caudam, sed in medio ventris, In capsula etiam chartacea,

cum nullum in pedibus appareret filum, solo ore vidi promoveri & affigi; quin secundo Iunii, cum attente spectarem sibi machinantem bombycium, principium fili prehensum ex vermibus ore, madens extraxi in iustam prolixitatem, pedibus & ventre plane à serico nudis. Ita eruculæ ab ore suspenduntur, inde emissio filamento. Nec aliter aranei & campe arborum sua faciunt vellera. Et hæc quidem de hac quæstione.

Cum folliculus est absolutus, mutato bombyce in nympham, rapiuntur vellera, selectis prius ad instaurationem generis, matibus & foemelibus ad arbitrium. Sexus discrimen aliqui ex colore bombyciorum dignoscere jubent, aliqui ex magnitudine: Et sane aliquid est in hac re argumenti. Nam quia foeminæ plerumque maiores, etiam maius struunt domicilium: Veruntamen aliquando fallimur, quia fieri potest ut mas firmus, maiorem architectatur folliculum, quam foemina debilis. Et vidi pares quantitate, vidi etiam foeminarum alibi enutritarum bombycia longe minora meis masculis. Itaque concurrere signa ipsis bombycibus notata oportet, de quibus supra. Cæteri folliculi in aquam ferventem iniiciuntur, ut nymphae intereant, vel suffocentur calore clybani, post exemptum panem, adhibita cautela ne comburantur. Tunc stupa detracta, famulæ, vel socii laboris præsto sunt, qui exordia filorum expediant, quibus inventis iniiciuntur plures in pelvim aquæ frigidæ, aut tepidæ, assidensque minifra instrumento tractorio continuo devolvit fila, triginta vel quadraginta aut etiam plura simul iuncta. Si quæ rumpitur stamen, socii est, requirere principium & reddere explicanti, id continuatur, donec usque ad interiorem tunicam perventum fuerit, quæ cum difficillime retexatur, exiccata disceperitur in stupam & carminatur.

Dum ita replicantur fila, pulverem multum in aërem emittunt, &

cernere etiam in fundo vasis est quædam sordes è staminibus prolapsas. Sedulo attentabam num una opera possem absque ruptura totum expedire folliculum abstracta stupa, quæ ob variam implicationem, infirmitatem & diversa principia non potest continuo ductu retexi. Affectus sum votum tantum in medio serico; nam prodromo quod proximum est, etiam rumpi facile solet. Sed medium tenacius est. Ultima tunica pondere addito (nam tunc nymphea prolabitur) explicata à me est cautissime usque ad pelliculam parcam, quæ vix unguem pollicis adæquabat. Qui folliculi basi ad diametrum respondent apici, feliciter evolvuntur: Difficiliter incurvati & gibbosi, & quorum apex stricturam habet. Nam hic filum hæret & implicatur, ut vix citra rupturæ metum cedat. Apex primum nudatur & devolvitur totus usque ad medium folliculi.

Vnius bombycii filum continuum lineæ præscriptæ longitudinem septies millies, in alio octies implevit & amplius. Non tamen par est omnium densitas, & magnitudo, id quod etiam ex distractione in cuticulas videre est. Quædam enim vellera diduxi in duodecim quædam in octo plus minus exiles tunicas. Sylvestris bombyx prodromum habet simplicem tunicam & paulo crassiorem folliculum. Itaque etiam tenuiores facile cedunt prementibus digitis; densiores resistunt.

Cum fatiscit, apex fere usque ad medium, unde sat amplum est foramen elapsuræ nymphae, procidit cum senecta ultima, in qua caput & pedes omnes. Plerumque huius senectæ caput apici folliculi obversum est, ut intelligamus eam exutam esse, dum vermis consummato folliculo per angustias sese stringit, vertitque sursum.

Nymphae vertex respicit basin, cauda apicem; eumque bombyx plus quàm duplo lon-

pio longior fuerit, nympha ad parvam staturam contrahitur, ut vix impleat longitudinem internodii secundi in digito medio viri. Vixit illa vitæque indicia evidentia exhibet, motu reflexuque apicis seu caudæ cum tangitur. Si formam externam respicias, squamosum vermem dicas, ut qui caput velamento occultaverit. Squamæ sunt fusæ, tanquam fumo inquinatæ, octo numero usque ad confinia verticis. In singularum lateribus, bina sunt puncta umbilicalia, ex quibus tendines, seu vincula ad necydatum pertingunt. In vertice est macula alba quasi ibi os necydali traluceret cum punctis tribus parvis nigris. Inde à parte anteriore typi pedum & cornuum sunt, à posteriore versus latera vestigia alarum. Si interiora quoque contemplari libet, quarto die ab occultatione, antequam transeat in necydatum, aperire potes. Videbis nihil aliud, quam capacitatem unam communem, inque hac tres distinctos humores, unum aquosæ dilutæque consistentiæ, coloris flavi. Hic per totum spacium æqualiter diffunditur. Alius rubet, sanguinolentum dicas: Hæret hic in parte superiori, qua futurum caput, & pectus est. Cordis rudimentum esse judices, quia postea in necydalo vidi talem quandam massam per se mobilem more cordis, si modo cor huic bestię est attribuendum. Tertius humor est albo-luteus, refertque ovum gallinaceum in aquam ferventem iniectum discussumque vel lac caseatum, si quid lutei addas. Vbi foris alarum pedumque cernuntur vestigia, latitat phlegmatica visciditas apta constituendis membranis.

Nulla videas membra distincta, vitam beneficio nervæ tunicæ proximè externo cortici subiectæ inesse puto. Nam & bombyx ea parte exquisitum exhibebat sensum, motumque arterialem & cordis; planè utriculū humoribus confertum appelles, qui tamen collatus ad

chrysalidem, postquam erēpsit necyдалus, longe est crassior, ut corticem dicas tunicis intus & visciditate tenace vestitum. Inde postea est lanugo necydali, alæ, pedes, cutis, & cætera interna. Ita in gulam ventremque abiit bombyx, cuius unius cura antea fuerat detentus, nihil tamen hic viroris apparet, qui multus erat in bombycis jam texturi intestino.

Pars itaque excreta est ante folliculi exordium, pars mutata in alium succum. In apice caudæ etiam erat quiddam viscidum instar crudi albuminis. Rudimentum partium genitalium judicabam. Nam eo reiecta est matrix, & vasa spermatica, quorum principium conspicitur, etiam in bombycis ventre. Humores in charta pura excepti & arefacti nigredine infecti erant, quasi atramentum futorium miscuisses. Sebacea tamen substantia albescebat adhuc, & alicubi enitebat macula subrubens, & crocescens, cum albo puncto cretaceæ consistentiæ. Itaque colligere erat nigrorem illunduntaxat aquosi flavi que humoris fuisse, qui etiam solus in charta, ubi densior concreverat, splendebat, ut nitens atramentum. Cæteras nymphas partim spoliatas omnium serico nudasque, partim simplici tunica adhuc inclusas, partim in toto bombycio salvas, nulla alia tractavi cura, nisi quod in capsula positas in fenestræ limine dimitterem. Distinxeram tamen loculamentis diversis, quas fœminas, & quos mares putaveram, nec me fefellit iudicium, excepto uno tantum. Ita à prima inclusione, usque ad exclusionem processerunt dies viginti sex aut septem, in musæo meo exposito Soli promeridiano, tempore æstivo Iunii, quale erat anno nonagesimo notio. Nam undecimo Iunii sepulta fœmina, exiit necyдалus octavo Iulii. Qui mas nono Iunii texere incēperat, quinto Iulii evasit papilio.

Eodem duæ fæminæ exhibant in folliculis albis maiusculis; & unus mas ex citrino minore. Sexto Iulii sub auroram (nam omnes mane prodeunt) mas fuscus hirtusque ex mediocri alboque bombycio enisus est; fæmina vero alba teneraque ventricola, cum magnis alis: ex folliculo citrino subviridi. Ita & ante, secundo Iulii ex aureo folliculo mas prorepebat, & fæmina ex albo. Hi decimo Iunii inchoaverant bombycium. Cum ex integris folliculis erupturi sunt necydali, non amplius movendo sentitur brutum pondus; & tunc frangitur, circa dorsum thoracis aurelia; postea multus humor limpidus, albusque, ore effunditur, & permadescit locus, quia sunt foramen facturi. Per hunc foras annisu quodam & labore contendunt. Vidi octavo Iulii fæminam exeuntem. Ea tantum liquoris præmittebat, ut in capsulam decideret notabilis gutta. Tunc capite emicabat intus nixa pedibus. Post caput paulatim hos exerebat, statimque comprehenso pavimento sese fulciens, circulos alvi conando sensum protrahere; ut primo extracto, cum vellet secundum propere, sese contraheret tota parte anteriore, quasi sic prehensum circum sequentem una evocaret. Vtuntamen consentaneum est ista contractione dilatatum esse magis foramen, ut postea alvus minore cum labore prodiret.

Huc facit etiam varia ad latera conversio. Interim crassiores necydali, & plus humoris in ventre habentes, exprimunt aliquid inter elutandum, & folliculum pertusum, tum intus, tum circa foramen fecundant alvi spurcitie marmorosa. Qui minus laborant, & tenuiores sunt, purum relinquunt. Videas tunc caniciem totam nonnihil madentem à liquore ex ore effuso ad pertusionem facilem.

Solent etiam alicubi quiescere, & sæpius ventrem inflare, diducere, atque iterum contrahere, quasi luxata membra reponerent, & ad legiti-

um situm revocarent. Adeo autem diducuntque laxantque circulos, ut juncturæ emineant impletæ citreo liquore, quasi inflatæ essent. Nymphas nudatas, cum intus absolutus papilio est, triduo, vel biduo ante, sese videas crebro movere, quasi rupturas vincula, quibus alligatur aureliæ necydalus. Earum unam tunc cultello, unguibusque aperui ipse ut viderem congruentiam extremorum lineamentorum cum suppositis membris. Id fiebat quarto Iulii, cum jam circiter dies viginti à serificio præterissent. Remota squama prima, juxta principium pectusculi in tergo prodibat, in conspectum circulus superior ventris tener, cutaneus, hirsutic humente tectus, brevi tamen & complanata ut vix pateret oculis languo. Sub dispositione alarum laterali, quam in aurelia compares omoplati, veræ alæ necydali latitabant binæ junctæ, & altera alteri imposita.

Omnes erant brevès, tenuesque, utpote nondum perfectæ quantitate. Inter alas thoracis posterior nodus eminebat, prolixiore pilositate utrinque stipatus, sed nondum plane tectus.

Alis & rubore hoc expedito, perveniebam ad deorsum flexas lineas superiores, sub his erant cornuæ; sub sequentibus vero in pectore pedes recumbebant, obliquè versus alvum compositi & directi. Sub alba macula in nymphæ vertice, necydali hirsutus vertex & pregma est, cui proximè adiacet aculeorum typus forma duorum punctorum atrorum. Hinc sequitur nota oris satis extans initio propter humiditatem, & speciem habet spongioforum punctorum alborum duorum, quæ tanquam in Leonino labio fissura dividuntur: Alvus tota est instar fuci albi.

Pili in ea opprimuntur humiditate, & lævigati apparent. Constant circulis, ut & bombyx & nympa. Non autem expediebam totum necydalum, sed ipse seipsum suo nisu protra-

protrahebat ex reliqua aurelia. Videbam quo conatu sese absolveret à vinculis alvi, quæ instar albarum chordarum è punctis circulorum dependent, & in aurelia vacua relinquuntur. Hæret & podex artius. Itaque apex aureliæ contrahitur versus pectus introrsum. Erat autem mas cum alis & villis imperfectis. Eum reliqui in capsula. Quievit usque ad diem sequentem. Tunc paulatim inaluit, & hirsuties conspicua est exactius. Alæ quoque creverunt, & tunc alacrior paulatim factus, admissusque tertio die concubitus peregit strenue.

Necydalorum quæ species sit, tum ex dictis patet, tum superius satis est expositum: Illud addendum est, quod alvus in aurelia contractior sit, & foris distentione inflationeque crebra tertia parte fiat longior, & maior. In aurelia est ruptura trifida à vertice per dorsum thoracis. Et ibi prodit necydalus, Cæteræ partes sunt integræ.

Omnibus jam necydalis natis reliquis ante decimum quartum Iulii, duo folliculi integri remanserunt, quasi nihil reddituri, licet densi admodum essent. Unus masculus sphaericus parvus, alter fœmineus duplo longior & satis amplius, paululum circa dorsum vermis in gibbum elatus, uterque albæ stupæ, sed ferici subviridis in citrio; quanquam dilutior esset color in illo. Cum sphaericum cultri acie dividerem, cadaver in conspectum prodibat semibombyx, & seminymphea foris. Nam anterior pars planè bombyx erat, posterior nympha, siquidem non totam exuerat pellem, sed tantum eius posteriorem portionem, quæ juxta aderat in folliculo.

Dispositio cadaveris; erat incurva, ita ut priores pedes in pectore fere tangerent posteriorum par primum. Hic enim inter primam posteriorum tyzygiam & secundam ruptum erat corium, ita ut nympha esset galeata pristinis exuviis, in

quibus caput pectusque cum sex pedibus, & portio ventris cum primoribus duobus. Remota pelle, & aurelia, intus absolutus stabulabatur necydalus mas, isque vixerat, argumento, quod dum conaretur exire bi-duo antequam secarem, folliculum liquore perfudisset; imo & iam 19. Iulii cum liberarem penitus, motus indicia in ventre & pedibus luculenta præbuit: Causa cur non potuerit, sese exuere & prodire, deprehensa est in cranii bombycis pertinace cohæsiōe, ut & in pedum anteriorum, lorica firmiter connata.

Itaque licet in dorso thoracis rimam tam in aurelia quam senecta fecisset, tamen extrahere caput & pedes non potuit. Sic ergo paulatim elanguit. Animadverti hic naturæ ingenium. Nam cum in exunda senecta exarmentur priores pedes, & posteriores etiam plane secedant; tamen ibi relinquit vestigia, sub quibus postea renascuntur alii. In veterum autem bombycis loculamenta, alarum binnæ insertæ erant, totumque necydali caput cum cornibus cranii galea includebatur. Talis mas erat. Fœmina omni vita cassâ adhuc monstrosior apparebat. Perfecto opere fericii (quod erat bombycium maius, & duorum articulorum auricularis digiti longitudinem adæquans sed longe tenuius masculo; intus album & leve splendensque, foris subcitreum villosum) exuere pellem bombyx conatus erat, indeque protraxerat totum dorsum, quod valde protuberabat, anterioribus in circulum contractis; sed ab oscillo se liberare ob pertinacem symphysin non potuerat. Itaque ibi senectæ caput, nymphæ vertex, & necydali coniuncta conspiciebantur; quæ coniunctio retinebat senectam in ventre, ne potuerit penitus avelli, & destringi. Ideo & cohærebat, cum alvi acumine, non aliter ac si quis sacco fuisset inclusus; & circa caput astrictus; facto vero in tergo

foramine dorsum extraxisset quidem, sed adhuc hæreret capite, & podice, ita jacens incurvus & examinis. Sic se habebat senectæ. Ex hac prominebat & aurelia, quod attinet partem superiorem. Ex aurelia vicissim necyдалus fere totus eluctatus erat, fracto putamine in dorso, solitaque regione; sed capita cohærebant indivulsa, sicut & alvi extrema.

In ventre exorto magna copia ovorum conspiciebatur colore flavo. Nam femina statim etiam intra aureliam ovorum formam in sua matrice absolvit, sed quæ sine maris aspergine sint infœcunda. Itaque etiam vidi ova parturientem eam, quæ nullum marem fuerat passa. Conspicuum hinc fuit, quomodo natura exuat primum veterem bombycis pellem cum forma; postea transeat in nympham, cuius aurelia vicissim exuta prodeat necyдалus. Triforme hoc monstrum erat dignumque contemplatu. In eo notasses etiam aureliam ea parte, qua alæ erant designatæ, nigram fuscamque, quasi afflata fumo fervente fuisset: deinde quantopere conata fuerit femina necyдалus exire, perspicuum erat ex ovis eminentibus ex interstitio circulatorum squamiformum.

Cohærent aliis ventris circuli interveniente cuticula tenui, contigue. Sed in hoc adeo erant circuli disiuncti, ut Zona juncturæ latior esset circulo. Apex alvi, senectæ, & aureliæ, ad lucem transparebant, ita ut cernere exacte posses confinia. Ad dimidiam verò aureliæ capacitatem pertingebat extremitas necyдали circa dorsum hirsuti, licet imperfectè, quemadmodum & alæ nondum affecutæ legitimum incrementum. Et hæcenus de monstris.

Necyдалo vegeto rēnax vita est, præsertim in pectusculo. Nam & capite & alvo abscissis, alas motitat strenue, & pedibus discurrit, idque

usque in alterum diem aut amplius. Secta femina in alvo matricem exhibet ovis plenam, adeo ut post quadringenta jam edita, nihilominus superfuerint plura. Insistere & involuta esse subtilissimæ tunicæ videbatur.

Apparebant & nervosi quidam ductus, instar meatuum intestinalium. In medio ventris vesicula extabat, continens terreum succum coloris ravi seu fulvi. Hæc vesica per se continua systole & diastole agitabatur. Vitæ principium ibi tanquam in corde esse judicabam. Circa collum matricis; nodus geminatus albus, nervosus, qualis vesica animalium esse solet, durus splendensque cernebatur, idque intra ventrem. Nam de mammosis processibus externis postea. Nodulus unus maior erat, alter minor. Collum vulvæ est instar tubi, cui succulento foris astant utrinque flavi noduli mammarum instar. Circa collum ambitus cum retinaculis corneis, latis, inque summo obtusioribus, quibus genitale maris vicissimprehendit. Pectus carneum est. Caput membranofum & corneum. Cornua triquetra eminentes dorso albo, pennis vero utrinque demissis, ut fieret triangulus. Si vis præfeces succus quidam tralucidus ex dorso, seu culmo pennati cornu exit, intusque meatus appareret. Ita se habebat femina quam vivam aperiebam. Mortua nihil in ventre exhibuit præter cavitatem notabilem alvi juxta pectus, deinde humorem illum vitalem. In vesica, quanquam nunc non amplius vidum; tandem matricis evacuatæ reliquias nerveas & membranofas. Maris superiora congruunt cum femineis. Ventrem si feces, rubeum humorem multum intus inveneris, & præterea liquamen quoddam nervis plenum, cui connectitur meatus genitales.

Genitale autem habet peculiare, carens & cæteris quæ feminae sunt propriae. Ejus historia hæc est. Sub cauda

caudā lanuginē prolixiore stipata, foramen est notabile, cum ambitu membranoso duriciei corneæ, in duos quasi dentes diviso. In huius ambitus medio collum genitalis est trifidum, cum extremitatibus corneis. Circa hoc dispositi sunt aculei punicei (cornei processus omnes punicei sunt ad nigrum accedentes) duo superiores hamati, seu in uncōs recurvati, ut sit forma videntia unci, ut cornua caprearum deorsum reflexi: inferior unus rectus. Hi aculei proximi sunt collo membri. Paulo citra in ambitus medio alii tres stimuli sunt parvi. Tot retinaculis comprehensam fœminæ vulvam attrahit, sibi que jungit adeo firmiter, ut si distrahere congressos velis, citius videatur ruptura ventris & circulatorum compages, quam remissura coitio, id quod sæpius attentavi. Sed & hinc pertinaciam conjunctionis æstimare licet, quod viderim totos dies æstivos una manere, & noctu, nescio qua hora, consentaneum, versus auroram, disiunctos perceperim, mane inventis ovalibus vermiculis pluribus, ipsis autem seorsim quiescentibus. Frigidæ aquæ iniectioni nihilominus cohærent, sale insperfo & muria caudar. iuncturæ durarunt: aqua chalchantina similiter addita non sunt divulsi. Immerfi marem aquæ, fœmina in margine sicco relicta, etiam iniectione atramento & sale in aquam; sed vixit, & coitum retinuit. Tandem ita reliqui per noctem in aqua, mane aliquot centuriarum ovorum in vasis fundo erant, ipsi necydali natabant vivi. Alteri mari in congressu præcidebam caput, non avulsus est.

Divisi pectus à ventre; hic hæsit donec per vim abstraherem. Caput & pectus, ut divitæ muscæ diu vixerunt, diutius tamen pectus. Hic mas in coitu ita dissectus in ventre similiter habebat humorem lutosum, spadiceum, cum quadam substantia intestinali, sublutea, membranosa.

Mas natus quarto Iulii ob Imbe-

cillitarem quinto mortuus, sectusque; nihil aliud continuit alvo. Alioquin vita necydali septem aut octo pluriumve dierum est. Ut enim dixi est pertinax; adeo ut cum confringerem quatuor ictibus principia alarum & pectus; post etiam alvum aliquoties, tamen vita manserit quasi inviolata, licet spiritu tandem dissipato, altero die ut plurimum ita tractati moriantur. Coitum mas ferventer appetit, parva mora post exitum ex aurelia; idque sæpius exonerato ventre, nonnunquam tamen etiam nullo humore emisso, & hoc evenit etiam in fœmina. Qui vegetus est, post primi diei congressum, interveniente noctis quiete, altero die repetit eandem fœminam. aut in quamcunque inciderit, adeo ut ter quater peragat coeundi vices. Fœmina quoque toties marem admittit: quanquam non semper ova promat. Non enim gignit, nisi ova in se habeat, licet rore masculino concepto.

Post solutionem à congressu statim deponuntur ova ordine alterum post alterum, ubi videas quas cum conatu & contractione alvi protrudi, excludique, ex matricis collo exerto, adeo ut pavimento tangat. Numeravi quadringentis plura ex una fœmina, ex aliis ferè quadringenta, quæ tamen dissectæ adhuc multa in sua matrice habebant. Quod ergo Vidas de centenis scribit, id de macris parvisque necydalis potest intelligi, quales ego vidi evasisse ex neglectiore nutritione, aliis triplo fere maioribus. Quidam mares emittunt alvi proluviem ante coitum semel, & iterum post secundum congressum. Interdum mares soluti, nec dum satiati, incipientem ova ferere fœminam interpellant, & coeunt denuo, quanquam fœmina per vim cohæreat, cupiatque contracta alvo & pedum posteriorum detensione solvi. Ita una ante concubitum 17. emittebat, post primum soluta centū nonaginta quatuor & tunc iterum

iterum coiens; post quatuor horas revulsa, edebat 245. inde appetentem mare humorem tanquam ex siphone ei aculabat, iterumque congesta, & liberata adhuc ova plura vicinis. Quæ ova quarto Iulii erant edita colore citrio, septimo evadebant punicea, & inde plumbea. Detinebantur in capsula post fenestram pomeridiano soli exposita. Sterilia tamen colorem non mutabant, sed subsidebant duntaxat. In necydalis solutis observes aliquoties motum tremulum, qualis est à rigore & horrore febricitantium. Neque tamen febri laborare dixerim. Sed eam concussionem esse puto, ex alteratione & promotione seminalis materiæ, exhalante inde vapore & herveas partes convellente. Ultimus necydalus pumilio vigesimo quarto Iunii inter duo folia mori tēxens folliculum parvum prodiit decimo tertio Iulii, in quo præterquam quod minimum fecisset bombylium, etiam hoc peculiare erat, quod non exiret in basi folliculi sed iuxta apicem facto foramine; contra ac alii omnes, mas autem erat, qui non timebat coniungi cum femella iam ter matrem passa & vix spiritum trahente. Bis autem coitu impleto postea projectus est. Alæ etiam videbantur pictæ aliter ac cæterorum. Nam cum reliquorum sint lineis in longum & latum distinctæ, tanquam limbis, hic quidem quatuor eiusmodi lineas plumbeas in latum acceperat, sed inter secundam & tertiam, versus sinus alarum extimos, interiectus erat parvus quidam circulus, non exactus, lividus, cum puncto albo in medio. Verum enimvero tam ingeniosa natura est in hoc insecto, ut cum plura observaveris, scripserisque, semper tamen restent notanda plura.

Quantum ad *Differentias* sumuntur illæ à loco & colore. Sunt *Indæ*, *Hispaniæ*, *Calabriæ*. Illæ pollicis humani magnitudinem excedunt, domus earum capitis. *Hispaniæ* Italicis minores, maiores & præstantiores folliculos texunt. *Calabriæ* maiores & plus

serici largiuntur. Alibi quæ visuntur, magnitudine omnibus istis cedunt. *Coloris* ratione, sunt albæ, cinereæ, subflavæ. Aldrovandus tribus tabulis eos depingit. In prima priori loco depicta femina est, & tota candicat, exceptis posterioribus pedibus, qui flavescunt. *Secunda* tota est albocærulea, mas. *Tertia* ex albo læviter flavescit, & pedes habet omnes candidos. Hic album texuit folliculū. *Postrema* ita picta est, sicut nonnunquam sese contrahunt, vel metu vel frigore. *Prior* folliculus totus erat candidus, & à candido bombyce textus. *Secundus* pariter candidus est, & bombycis feminae opus. *Tertius* totus fere viridescibat, maris opus, postremus feminae, eiusdem coloris. Qui in secunda tabula ponitur quartus, gemellus est, à mare & femina una laborantibus factus, vulgus hoc folliculorum genus doppiones vocat. *Tertius* quodammodo lacertæ vel alterius animantis caput æmularatur oblongum, deinde paulatim extenuatum in acutum declinabat. Primi aureo sunt colore, uterque etiam monstruosus, quoniam ovales non sint. Quorum unus amygdalam efformare videbatur, cortici suo etiam nunc involutam, alter malum Armeniacum. Tales vulgo nobis Venturini dicuntur. In tertia tabula primo loco habes Bombycis jam serico gravidi integri iconem, secundo supina parte sectam, sericum velut quædam intestina demonstrantem, tertio sericum exemptum, quarto, quinto, sexto, diversas figuras Chrysalidum, prout nimirum, magis vel minus perfectæ sunt. Septimo, octavo, & nono Bombycum diversa exuvia, decimo folliculos duos invicem coherentes, undecimo folliculum planum, & compressum, duodecimo alium folliculum oblongum, ex quo Papilio jam jam erumpere tentat, decimotertio Chrysalidem ex qua exiturus Papilio media sui parte propendet, decimoquarto folliculum, qui cerasum magnitudine vix excedit, postremo semichrysalidem, quæ ex folliculo pyri figura erumpit.

Usum in cibis invenere. Vir doctus, Germanos milites trixas comedisseribit. Cohortales aves appositis impinguntur: apponi possunt, si de ægrè habentium salute desperaveris. De *Educatione* Aldrovandum consule. Sericum, de quo alibi, combustum, putrida vulnera mundat; cum sale mixtum, dentium rubiginem abstergit: cor corroborat: ideo confectionem Alkermes ingreditur. Funiculo ex eo facto, si viperæ suffocentur, in angina Medici feliciter utuntur.

Chrysalidos seu *Aureliae* nomen, ovo Aristoteles tribuit. Omnes enim *Erucae*, quæ folliculos texunt, cum se iis incluserint, figuram prorsus mutant. Nam cum prius molles essent, pedibus instructæ & moverentur, eederentque: tum indurescunt, pedes non apparent amplius, non moventur, nisi ad tactum, & veluti ovi speciem accipiunt. Mirum autem est *χρυσαλίδες* à Philosopho vocari: cum plurima etiam sint viridia, nec pauca pallida. *Νευδαλα* dici, alibi monuimus. Cum verò in *Aureliam* *Eruca* transit, infantis fasciis involuti formam imitatur, facie humana propè, cum mitra & cornibus.

Aldrovandus quatuor Icones unica tabula dedit. *Prima* insolentis, & forsan monstruosæ est figuræ cum ob enormem magnitudinem, tum maxime, quod in capite annexam habet velut promuscidem. Tota aureo colore resplendet, sed annulos habet nigros. Ejusdem coloris sunt *Chrysalides*, sive *Necydali Bombycum*, ex quibus quoque unam depinximus, eam autem, quæ secundo loco posita est. *Tertia* coloris est viridis, non nihil ad cæruleum vergentis, punctis toto corpore maculata aterrimis. Hujus generis *Erucae* folliculos non texunt, sed in *Chrysalides* immutaturæ, eo quo hîc pingitur, modo super aliquod lignum, foliumvè aut etiam lapidem extendunt, & solis ardore dein mutantur in papiliones, eos autem, qui ex albo viridescunt. *Quarta* etiam viridis est, sed auri in-

star resplendet, depicta est prone, & supinè, item à latere.

Habet & novus orbis æmulum *bombycis* alium vermem, *temicli* dictum: qui se, postquam injustam magnitudinem adolevit, in membranam feralem ab ipso filis intextam condit; & deinde ac si parum esset, suapte sponte detrusum in carcerem exhalasse animam, se libitinamque suam à furculo aliquo suspendit, ut procedente tempore, in volatilem papilionem vertatur, ac insperatas subeat transformationes.

ARTICULUS IV.

De Curculione,

Curculio, quia in Papilionem abicit, *Erucae* subjungitur. Nomen per *αὐστηρον* accepit, teste Varrone, quod nihil penè aliud in eo quam gula videatur. Græcis est *κίς* & *μύδα*, fortè & *κράξ*. Multa eorum vere prodeunt examina, ubi frumenta recens demessa, eaque madida, antequam occalluerunt, reponuntur, vel ubi granarii fenestræ Austrinis flatibus, sunt oppositæ.

Inveniuntur tam in faba, quam in tritico. Unicum *ortus* remedium, frumenta benè & commodè recondere: & fabam, cum in area exaruerit, confestim priuquam luna incrementum capiat, excussam, inferre. Cato, areas amurcâ subigi præcipit: Columella eadem, parietes subactoluto, obliniri jubet, &c. Perimuntur fælugine in qua allium decoctum est, si ea pavimenta & parietes irri-gentur. Refugiunt sabinam, hederam, lupuli salictarii flores, juglandis folia, absynthium, abrotanum, nigellam, &c. Naportum semen miram in prosterndendis vim habere, nostra & avorum memoriâ observatum est. Quia dulce & oleosum, appetitur: eo distenti, intereunt. Plura de iis vide in vermibus frumentariis.

TITULUS II.

De Insectis terrestribus non
alatis multipedibus.

CAPUT I.

De Asello.

INsecta multipeda non alata sunt; *Asellus, Scolopendra terrestris, & Inlus.*
Nomen. *Aselli* vocabulum insecto huic Latini imposuere, non quod asino sit similis, sed quod ad colorem ejus accedat. Quidam, *Cutionem* & *Porcellionem* vocant. Plinius *Centipedem* dixit. Aristoteli est *ὄνις*; Medicis Græcis *ὄνις*; Theophrasto *ὄνις*; Dioscoridi *κατακλιδεῖς*, Absyrtio *ὄνικς*, Asiaticis; Galeno teste, *κνέμις*, seu à forma fabæ, cui similis dum se in globum contrahit: seu quod è fabarum folliculis & culmis prodire soleat. Plinius *πύλον*; à cutis callo & duritie vocati: alii *ἰσλον* sed perperam:

Descriptio. Insectum est parvum, inquit Moussetus, digitum transversum vix longum, semidigitum ferè latum, colore livido nigricante: Quatuordecem illi *pedes*, utrinque septem; singulis pedibus unica junctura, vix perceptibilis: duas breves *antennas*, quibus viam tentat: latera circa pedes serræ modo dentata. Tactus se in globum colligit:

Generatio. Sub regulis, & hydriis, planè asininum colorem refert; quatuordecim illi pedes utrinque septem; singulis pedibus unica est punctura, vix perceptibilis; duas habet breves *antennas*, ut viam tentet; tactus se in globum colligit; vel (ut Galenus loquitur) ad fabæ similitudinem, unde *κνέμις* nomen indidit: latera circa pedes serræ modo dentata: sub regulis, vasis aquariis, in medulla arborum exesa, inter corticem & caticicem putrescentem nascitur; uti etiam sub petris, ex humido putrescente nati. Deinde coeunt, & à coitu ova deponunt (undè vermis) can-

dida, splendentia, margaritulis similia multa, & eodem loco coacervata, ut anno 1583. observavimus: tepido humore vivunt, in rimis parietum aut ædium latebris hyemem, transigunt. Ex ovis primum vermes duriusculi excluduntur, qui aliquantisper ferè immobiles hærent & albicantes; tandem parentum more, liquorem atque rorem fugiunt. In calidis regionibus & siccis etiam reperiuntur; sed ibi nocturno rore vaporemque resarciunt; quicquid per diem humoris fuerat exhaustum. Galen. hoc Asellum pacto describit. *Ὅνις κατὰ κλιδεῖς ζῶον ἐστὶ πολὺ πᾶν ἐν τοῖς ὑδατοῖς ἀγγείοις, καὶ ἐν τοῖς καπνίοις γενόμενον; καὶ δὲ τὰς τῶν δακτυλῶν ἐπερείσας σφαιροειδές.* Aristoteli fuisse eum cognitum id probat; quod pediculum marinum huic similitimum dixerit, de præ caudâ.

Usus eorum est in *Medicina*, multiplex. Aperiant, attenuant, discutiant. *Prima difficultati* auxiliantur, si ex vino triti potentur. *Calculus pel-*
lunt, si duo triti, cum stercoris murium & columbarum semidrachma, hauriantur. In *regio morbo* ex mulso Galenus propinat. In *asthmate* ab Asclepiade, si combusti, cum melle sumantur, commendantur. Fidem Hollerius & Agricola firmant. Oculorum ferè omnes morbos, ab adnatis vel innatis ortos tollunt, catarrhacta excepta, si recentes benè contriti, ex convenienti liquore sumantur, vel extra adhibeantur. Nihil de aurium dolore, parotidibus & strumis dicam. Vivi *paronychia* applicati medentur. *Pavos* cum resinæ terebinthinæ tertia parte tollunt. Unguentum ad hæmorrhoidas dolentes utilissimum, ex unguenti populei unc. j. olei rosacei, in quo decocti sunt aselli unc. j. f. croci gr. 4. paratur. Alii cum adipe & butyro coquunt, & oviluteum addunt. Olei violacei unc. iij, in quo quatuor aselli ebulliere, ad tertiæ partis consumptionem, falsum humorem extra inunctæ reprimunt.

De Calculo quod dixi, certum Laurembergius pronunciat; cui & Hartmannus ad stipulatur. Sequitur post assumptum medicamentum totius


Dioscor. M. 2. c. 37.

Plin. H. N. 10. c. 8.

Hartman. Praxis chymiatr. pag. 160.







Bombijces Aldrov. Seidenwürm .
Tab . 1 .

Tab XXIII








4. *B. sese Contrahens*

5. *Follicul9*




2 Tab . 2 .



Tab . 3 .









Ajellus Mouf .



Scolopendræ Mouf .
Scol . Maxima Terrestr .



Scolopendræ Terr. Aldr .



Iulg , Glaberi Mouf .

I. Hirsut9

totius corporis calor: fitisq; molesta, & circa pubem dolor affligit. Præparationem apud Laurembergium peculiari tractatu vide. Comeduntur à lacertis aquaticis, ranâ terrestri, & serpentibus. Ad Asellos pertinent *Pollin & coyayhoal*. Mirificam vim excludendi spicula *pollin* habet. Insectum est parvulum, centipès: tritum & impositum, aculeos & sagittas ocyus extrahit. Prædurus vermis est *coyayhoal*, alijs *tzinchoillin*, alijs *ichcaton* dictus, supernè fulvus, pede numero purpurascens. Arefactus, rufus, & aqua dilutus, maxillisque quotidie bis illitus, dolores dentium placat.

CAPUT II.

De Scolopendra terrestri.

Nomen. *Scolopendra* nomen ex eo datum, quòd σκολοπι aculeū habeat ενδεδεξ, volunt nonnulli. Quidam, *Ηερᾶ, Centipedam, Millepedam, Porcum lutofum, & Multipedam* dixere. Aristoteli est σκολοπένδεξ, Theophrasto σκολοπία, Dioscorid. à serpentum interitu σφιγκτική. Varino & Hesychio ἀμφιδεσφάραν, alijs σῖψ, nonnullis μυελόπις & πολύπις; vulgo. Græcorum σκολοπίτρα dicitur. Nicædro ideò ἀμφικαρῆς, biceps, quòd pari facilitate prorsum capite, retrorsumq; ducente cauda incedat.

Descriptio. Plurimos pedes habere, & pennis carere, Agricola scripsit, quod Julo potius debet colorēque eis æneum, corpus tenue, & latum, tres digitos aut ad summum quatuor lōgum addit. Asplenii folio similem Aldrovandus facit. Moufetus tantum à Julo differre vult, quantum locusta marina ab Astaco. Robertus Constantinus in cauda, cornigeram comminiscitur.

Natura. In truncis arborum, aut lignis, vel palis terræ infixis, & gignitur & vivit, A motis egreditur; aliàs plerumque latere solet. Circa radices gladioli reperiri apud Theophrastum habemus. Olim Rhytienses & Obterietes sedibus suis pepulerunt, si Aelianò & Plinio fides est. Ex fre-

quenti exitu, serenitatem aëris rustici præfagiunt. Ad *morsum* ejus, **Morsus.** locus undique livescit, putrescit, intumescit, & vini rubri fæcibus similis videtur. Contra eum commendat, *intra*, salem ex aceto; Aegineta trifolium asphaltites cum vino: Actuarius neperam cum eodem; Dioscorides, rutam sylvestrem, radicem dracunculi tritam; serpilli ramos & folia; Aëtius absynthium & mentham cum vino. Quidam morbum remedia respuere credunt. *Extra*, locus scarificari, mox profundè incidi debet. Venenum per cucurbitas extrahitur. Tum succum centaurei minoris cum tertia parte vini dulcis, ad mellis consistentiam coctum imposito, & corium superligato, per octo aut quatuordecim dies; locum tandem cum spongia vino calido intincta foveto, & Scolopendræ morsum certò curabis. Reliqua apud Plinium & Dioscoridem vide.

Habent tamen & in *Medicina* aliquos usus. Oleo decocti capillos cum levi pruritu auferunt. Cimices suffiti interficiunt, &c. **Ufus.**

Aldrovandus *Ophioctonen* diversam à vulgari esse credit. De cætero, aliquot ipse species observavit. *Prima* est colore amethystino, albis ruberrimisq; punctulis maculosa. *Altera* lutea, maculis obscuris insignita. *Tertia* minor, colore rubicundo, per tergus atro. *Quarta* Vulgaris, aurei coloris ad castaneum nonnihil vergentis. *Ultima* viginti instructa pedibus, proceriusculis & longissimis antennis, colore subferrugineo. **Differentiæ.**

Moufetus tres species exhibet. *Prima* est maxima, terrestris Scolopendra, ea quam vides crassitie & lōgitudine est, color totius corporis ex fusco nigricante splendens. Singulis incisuris pedunculus appendet luteo, id est in singulis latetibus sexaginta prorsum & retrorsum æqua facilitate promovet. Nam & caput versus ingreditur & in caudam; ideòq; à Nicædro & Rhodigino *biceps* dicitur. Partē inter caput & alvū non simplicē sed multiplicem habet: quo fit ut præcisum hoc genus vivere possit. Irritatus

hic Scolopendra tam acriter mordet, ut Ludovicus Armarus (qui nobis eum à Libya dono dedit) quavis Chirotecis dupliciq; linteo munitus, vix eū manu petentem ferre potuerit: alrē enim in lintheum os forcipatum ad egerat, diuq; pēdulus vix tandem excuti permisit. Horum alium ex novā Hispaniolā allatum linea quēdā flammea medium per dorsum ornat, atq; æneus later pilorumq; color cōmendat: habet enim capillares pedes, atq; armatim se tollens celerrimē currit. Hoc summa admiratione dignū est, quum natura huic animalculo caput minimum dederit, memoriā tamen, vimq; rationis æmulam, neq; congio, nec urceo sed amplissima quadam mētura tribuisse: cum enim innumeri ad sint pedes, quasi remiges, & à capite veluti clavo alij permultum distant; novit tamen quisque officium suum, & pro imperantis capitis mandato, in hanc vel illam partem se converterunt.

CAPUT III.

De Iulo.

Mousetus
Theatri In-
sect. 2. c. 8.
Mometti.

JULOS Græci, mea quidem sententia, inquit Mousetus, non à lanugine, sed à nucum juglandiū atq; avelanarum veluti caudis, quarum villi callo compactili infixi, Julos hos representant; unde & ipsi ἰούλιον nomen sortiti. Ego Latine Julum dici non nescio, sed tritemem quoque dicere auderem. Quandoquidem Lycophron Paridis trirēmes numerosis utrinq; scalmis celeres ζυλοπέζες vocat. Eandem similitudinē Nicanor Scolopendris applicat, unde pariformes esse Julum ac Scolopendram facile apparet. Hos Hispani Centopeas, Itali Centogambi: Angli (ex me forsan) Gally vvormē dicturi. Numenius Lūbricos terrestres nigros Julos itē vocavit Athenæo teste libro 7.

— — — — — ἰούλι

“κέκλυται μέγανος γαῖν φάροι ἐν τῇ γαίῃ:

Nihilominus nisi fuerint etiam multipede, in Julorum numerū nomenq; non venient. Sunt autem Juli breves,

(ut dixi) Scolopendre, pedum numero non asellum tantum atq; Erucarum gentem, sed omnia alia insecta vincentes. Julorum alij glabri, cernuntur, alij hirsuti. Glabrum unum vidi in lactuca capitata, parvi junci fluviatilis crassitie, atq; ea quam videtis magnitudine: caput illi nigerrimū, dorsum aut ea tinctum flavedine. Venter ex cæcio argentatus; in cūsurā pedesq; capillares totidem, ut oculos & memoriam faciliē fugerent. Secundus totus nigrescebat, alba linea excepta, quæ à capite ad caudam usque recta per dorsum ducitur. Tertius obsoletius flavescit; caput illi rubescit, uti & pedes; antennæ autem & nascentes juxta caudam setæ livescunt. Quartum si corpore nigrius punicatē feceritis, pedib. autem & antennis levius, faciliē expedietis. Hor. alios ē musco arborum corticib. innascente prōdeuntes, alios sub ollis truncisq; putridis latitantes cepimus. In hirsutos non plures incidi quam duos. Primus hac figura & forma albicans, in muro reptit; pili brevissimi innascentes nigri fuerunt. Secundus ventre sublivido dorsoq; inamœnia flavedinem maculato: est illi os punicatum, ocellus niger, pili canescentes. In arborib. effætis, atq; annosis inter corticem & lignum latitat, atque etiam inter saxa musco villosa ac denso obducta. Omnes Juli tactu se in gyrum colligunt & convolvunt.

An sint venenati equidem ignoro: sed si fuerint, sanè per beatum Penniū! qui variē ipsis nuda manu irritatis ac læsis, immorsus tantusq; evasit. Georgius Agricola ænei coloris Julum, (sed is Scolopendram vocat) his verbis recenset, Scolopendra admodum exigua, in truncis arborum, aut in palis terræ infixis, (unde nomen invenit) gignitur & vivit; quibus amotis vel commotis egrēditur, aliās omnino latitura. Pennis caret, sed plurimos habet pedes. Si quando reptit, corporis partē mediam, veluti arcum intendit; si bacillo aliavē re tangatur, se contrahit: color illi æneus, corpus tenuē, nec latum, tres transversos digitos longum, ad summum quatuor.


Alia

Alia item specie, iisdem ferè locis reperitur, corpore exili & terete, filii ferè crassitie, spadicei coloris dilutè: pedibus adeò numerosis atque exiguis, ut eos numero complecti *ἐν τῶν ἀδυνάτων* sit, quatuor digitos transversos longa est: sub ollis degit & asseribus putridis. Avicennæ Scolopendra, (qui etiam Julus) solummodo 44. pedes habet, palmam longus, tam exilis ac tenuis, aures ut intrare possit libro quarto Feh. 6. tractat. 5. capite 19. Hujus (inquit) aut nullum aut languidum venenum est, nec magnum dolorem excitat: qui floribus Asphodeli, vel sale cum acetato mixto statim sedatur. Juli nocturnes, (inquit Gesnerus) si in ædibus fuerint, ad Saccharum Thomæ, id est purissimum (ceu ad optimum caseum mures;) congregantur. Brueus noster (peritus ac industrius naturæ explorator) Scolopendras se in Anglia vidisse, & habere referet noctilucas, in ericetis muscosis toto

corpore fulgentes. Cui licet, mentiendi nescio, ultrò credam: eò tamen magis, quod Oviedus idem in nova Hispaniola per agros; & Cordus in Germania in cellis humidis observasse se scribunt. Mirum est quod Plutarchus refert, bestiolam asperam multis pedibus celeriter ambulantem, multo cum semine ab Ephebo Athenis ejectam, libro 8. Sympos. probl. 9. Julus cellarius in pulverem crematus, mirifice urinam provocat. Merula. Julorum humor cum cruore ex asellis expresso, ad albuginem oculorum tollendam divinum & efficacius remedium. Arnold. Brev. 1. capite 18. Atque hætenus de Julis, de quorum natura Hesychij, Aristotelis, Nicandri, Lycophronis & Ardoyni varias opiniones præter-

eo, quia variæ non veræ.





HISTORIÆ NATURALIS

D E

I N S E C T I S

L I B E R III.

De Insectis Terrestribus apodibus.

CAPUT I.

De Vermibus in genere.

HAEC DE INSECTIS
terrestribus pedatis volui-
mus. *Apoda* sunt *Vermes*,
Teredo, *Lumbricus terrestris*,
Tinea, *Limax*.

Nomen.

Vermi nomen inditum, quod se
in multas partes vertat ac torqueat:
vel quòd verrat, seu ad partes oppo-
sitas se trahat, ut *Isidoro* placet: nisi
fortè ab ἔργω deducere malis, quod
reperere significat. Græcis est σκώληξ,
aliquando δερμίδη.

Generatio

Mater omniū non tam putredo est,
ex humidinimia abundātia, cum ca-
lido iuncta exorta: quam semē vel se-
minale principium, quod idoneam
materiam nactum, & à calore am-
bientis excitatum, sese exerit, & vi-
tales operationes exercere incipit.
Unde accidit, ut & in illis quę putre-
scere nequeunt reperiantur: molito-
resque dum suorum lapidum læ-
viorem stylo castigant, vermes ibi
natos reperiant.

Natura.
Plin. H. N.
l. 11. c. 37.

Nulli generi oculos esse *Plinius*
asseruit: levissimum quibusdam ve-
stigium *Galenus*. Sentire, gustare
datum. Percepto sonitu latefcunt.
Amara refugiunt, dulcia requirunt
& fugunt. Repunt, in arctum corpu-
sculi sui partes colligentes, & poste-

riora attrahentes, quod εἰλυσπᾶσθαι
propriè Græcis. Motu undarum mo-
veri *Galenus* dixit. Nullum iisdem
ingenium vel memoria. Unde qui-
dam *obliviosos* dixere. Medio corpo-
re dissecti, utraque parte vivere vi-
dentur; iisdemque aluntur, ex qui-
bus constant.

Galen. de
Diff. puls.
l. 1.

Cedunt aviculis & aliis animalcu-
lis in cibum, sed & ab Indis omnigeni
comedi dicuntur. Crudos vorare,
Lopezius testis est. Quæ de Schamir
verme; cujus in findendis lapidibus
ad templi Salomonici structuram u-
sus, *Judæi* scribunt, nugæ sunt.

usus.


Multæ eorum *Differentia*, sive ma-
gnitudinem, locum, colorem, sive
alia attendimus. Sunt parvi, medio-
cres, longi, & quidem ita ut ad cubitos
se extendant. Sunt nigri, rubri, igneo
colore micantes. Quidam rubicundo
circulo propè caput insigniuntur.
Habent alii caudam, carent eadem
alii. Anno M. CC. LXXXV. Scor-
pionum instar caudati in Prussia va-
gabantur. Intra diem tertium pun-
cti exstinguebantur. Author libri de
Natura, aurei coloris quosdam esse ait,
qui statim ac nati sunt à parentibus a-
lantur, deinde absque cibo vitam
transigunt, ut quasi immobiles ja-
ceant. Constituto tempore revivi-
scere addit. Vestiantur nonnulli pi-
lis, quidam non item.

Differentia

Apud Mechoacanenses, *Itzuaqua*
vermis, qui & *Sipantipe* dicitur, duo-
bus corniculis rubris iter præterat,
nigro

Nierb. H.
Exot. 13. 6.
16. 21. 22.


Vermes Arborej . Holtzwürm Mouf .




Vermes Fructuum fleguminum Mouf



Vermes Hominum Menschenwürm Aldr .
Spülwurm .



Limaces Schnecken .



nigro fuscoque variegatus. *Tlaxquippillin* Mexicanis seu marsupium terræ vermīs quidam niger dicitur, cuius pulvis inspersus medetur lepræ. *Coyayahoal*, aliis *Tzinchoillin*, & *Icha-ton*, prædurus vermīs est, supernè fulvus, pedē numeroſo purpurascens. Arefactus, rufus, & aquā dilutus, maxillisque quotidie bis illitus, dolores dentium placat. Anno M. C. IV. ignei vermiculi, incertā specie, in Italia per aërem vecti, ceu densa nubis objectu, solis etiam lumen humanis oculis auferebant, &c. Nos secundum subjecta, in quibus nascuntur, dispecsemus.

CAP. II.

De Vermibus in specie.

ARTICULUS I.

De Vermibus qui in plantis nascuntur.

PUNCTUM I.

De Vermibus arborarum.

Vermes alii plantis, alii animalibus, alij homini innascuntur. Nihil de lapidibus dicam. Plantarii vel sunt *Arborarii* vel *Fruticarii*, vel *Leguminarii*, vel *Fruentarii* vel *herbarii*. **ARBORARIJ**, quidam lignum, quidam corticem, nonnulli folia, flores, & fructus exedunt.

Ligni perdes dupliciter distinguuntur, vel ab ipsis arboribus, vel lignis: infestant nonnulli ficum, alii sorbum, alburnum, esculum, Cinnamomum, Platanum, Quercum, &c. Eorum qui in *ficis* existunt, alij ex ipsis nascuntur arboribus: alius item paritur, qui vocantur *Ceraſtes*. Quum enim vermium magna pars specie formave inter se differunt, discrimen tamen præceptum in his est, quod in aliâ arbore fructuæ nati, translati in aliud genus servari nequeunt. Ceraſten autem & in olea nasci, & in fico pa-

rere asseverant. Habet itaque & ficus suos vermes, & illos quoque emittit, quos alienos receperit. Omnes tamen in Ceraſten figurantur, sonumque edunt parvuli stridoris. Syponſinus duo illi cornua in capite assignat. Cum erodendo tantum loci excavaverit, ut semetipsum circumagere possit ὥσπερ οἱ μύσσοδοι, aliud animalculum progignit, & unam speciem in aliam (erucarum more) transmutat.

Et *Sorbus* arbor infestatur vermiculis rufis, pilosis atque ita emoritur. *Mespilus* item in senecta vermes tales procreat, sed grâdiores quam in aliis arboribus, ut Theophrastus refert: *Alburnus* vermem profert Thripiformem; ex quo Culices deinceps vel Phalaenarum species nascuntur, ἀρχαῖα δὴναι ζῶα πῦρ ἐνλοφάρα Helychio, quia Pyros sylvestres acriter infestant.

Vermiculus in *Esculo* arbore (*Galbus* à Suetonio dictus) miræ est exilitatis, unde qui primus Sulpitiorum Galba cognomen tulit, à summâ gracilitate ita vocatus est. Carabum *Platanus* producit, (testibus Helychio & Aristotele) vermem cancris marinis similem, sed sex tantum pedibus donatum: καστορός ὁ σιδήρης Helychij hoc modo nascitur: (Theophrasto autore;) ligni Cinamomi ramulos binum digitorum longitudine abscindunt; recentesque bovinis tergoribus insuunt; tum exinde lignis putrescentibus vermiculos nasci ajunt; qui lignum corrodunt, corticem nullatenus tangunt ob acrimoniam: lignum hoc in ædibus Peninij visum est, à vermiculo erosum, quod cinerei fuit coloris; non valde durum, insipidum prorsus, & inodorum, contra quam Lusitani aliquot mercatores, & medicaſtri simplicium ignari, affirmant.

Rauca vermes *Quercus* radici innascuntur, iisque nocent. Olea (inquit Plinius) male ponitur, ubi quercus effossa fuerat: nam relictæ in quercus radicibus rauca vermes, ad oleæ radices transeunt, atque eos infestant.

Cor-

Corticarij vermes pauci à veteribus nominantur. Decempedem illum *Clopt* dictum superius descripsimus.

Folia arborum & flores depascunt *Syronès* dicti, quorum crassities quantilla sit ex eo cogitare possumus, quod inter folij tenuissimi membranas fodiendo serpit, salva utraque epidermide. Post acetilumbricos: (inquit Joachimus Camerarius) nullum vermiculum vidi adeo compressum. Cuniculi, quos agit, subtilissimas aliquid lineas & fibras referunt; folia cerasi & mali maculata plurimum lædunt, atque post satietatem excidunt, & videntur ex multis seminibus peponum secundum latum conglutinatis formati, nisi quod longè sint minores. Ab his emortuis aliud prodit insectulum, veluti & hi ab alio.

Syronibus per similes *ἀνάρτοι* quos Angli tam in lignis, cortice, folio, florequē & fructibus arborum, quam caseo & cera genitos, mites id est minutulos sive atomos appellant; à Syronibus eo differunt, quod ex multis *Acaris* constare videntur. *Acarus* autem ipse globosum, album, sepes, & pedicillo simile est animalculum; tam nullius ferè substantiæ, ut inter digitos pollicemque fortissimè compressus, ob exilitatem lædi sentire nequeat. Antigonus eum & Aristoteles *ἀντρίμιον* vocarunt, id est Jovis promum; eam fortè ob causam quod crassissima vini dolia rostro perforat. Et sane nisi Jovisei aliquid inesset aut divinæ virtutis, quomodo tantæ vires in tam pusillo & pænè nullo corpusculo cernerentur? In *fagi* quoque *foliis* tubercula parva reperiuntur, in quibus vermiculi exiles.

Fructus etiam arborum (ut Theophrastus loquitur) est *σκαληνός βρωτός*: etiam cum adhuc crudus est, ut in Sorbis, Mespylis, pyris, malisque cernimus. Oliva tam in cute quam nucleo vermes *καρπας* vocatos patitur: unde haud contemnenda pestis Theophrasto dicitur, quæ non solum succum & oleum absorbet, sed etiam

nuclei tam duri ossa exedit. In *Gal-* *lis* perforatis vermiculi etiam deprehenduntur, ipsa intima medulla geniti; è quibus postea muscarum & culicum quorundam genus oriri, Valerandus Doures Pharmacopæus Lugdunensis auctor est. In *Quercus* item glande & pomis illis fungosis vermes aliquando nascuntur; eoque anno famem & annonæ caritatem Astrologi præfagiunt. *Nucibus* avellanis vermes inesse notius est, quam ut de iis contendam: præsertim æstate humida, & vento ex Austro flante. Mirum est quod Ringelbergius libr. experiment. scribit. Hos vermes lacte ovillo ad serpentis magnitudinem enutriti posse. Cardanus tamen idem confirmat, modumque nutritionis, septimo de rerum variet. ostendit. Vermiculi in *ficibus* arefactis similes iis qui in avellanis nascuntur, capite nigro, reliquo corpore ex luteo albicante, sed minores. *Conos cedri* vermibus esse obnoxios compari, (inquit Bellonius) quemadmodum & pineos. Cicindelam fecminam crassitie referunt, digitum transversum longi, capite formicæ, sed magis compresso; incisuris duodenis; pedes *juxta* caput utrinque tres, antennæ circulares binæ, venter crassus, cauda mucronata. In præduris quoque & lignosis *opali* pericarpis, semen inest latiusculum & sæpè, vermiculis exesum: quorum veluti aurelias ibidem reperies. Nullus denique fructus nominari possit, quem non tinea aut vermis inficit: imo ipsum aliquando Manna (ut Poëtæ fingunt, Deorum; ut Scriptura asserit, Dei filiorum cibus) putredinem & vermem admiscit, quum, præter Jehovahæ mandatum in crastinum reponeretur.

Huc refer *Nopal Ocuillin*, seu Tunarum vermes, *Axocuilin*, & *Cuchipiltl* Indorum. De illis ita *Nierember-* *gins*. Familiare est huc *uxutlæ*, provincie Panicensis, tunarum genus, folia ferens longa, & angustiora cæteris, intra quæ solent vermes generari lineis candidis cyaneisque distincti, mirabilis facultatis in curanda in-

*Nieremb.
H.E.l.15.
c.30.*

da infania, si bini tusi, & resoluti ex aqua semel intra fumantur; aut si inveteratus sit morbus, bis aut ter: inducitur enim è vestigio somnus, permixtusque æger dormire, paulo post mente constans expergiscitur, atque resipiscit. Sunt autem hi vermes innoxii, neque ullum inferre nocumentum solent, si intra corpus deglutiantur: quo fit, ut intrepidè possint propinari. Addunt, paralyticis atque epilepticis eadem mensura conferre.

De *Axacoulin* ita idem. Plurimum usum vilissimæ etiam naturæ hîc videbimus. Nascuntur inquit Franciscus Hernandus, in arboribus guampatli, aut aliis, quas nostri ob similitudinem prunos vocant (cùm tamen ad myrobalanorum Arabicorû pertinere genus alicui fortassis videri possit) vermes quidam hispidi, *axacoulin*, seu ferentes axin; pallentes, vix longi binos latos digitos, ac pennam crassi anserinam. Hos indigenæ ab arboribus deturbatos permittunt ad ignem ex aqua elixari ac discoqui, donec comminuantur, & adeps ejusdem coloris, axin nomine, supernatet atque emineat. Colligunt hunc ad usus multiplices incolæ, & conformant in globos, è butyro vaccino parari solitis haud absimiles, olei odore & lenitate, & ad omnia, quibus oleum conferre solet, præstantissimos, non tamen in nutrimenti usum adhuc venêre. Dolores, quamcunque partem corporis obsederint, sedant: nervos tenfos laxant, emolliuntque, discutunt tumores, aut, si natura in id potius propensa sit, maturant: erysipelatis desinentib. conferunt, ulceribus ferunt suppetias, convulsisque, nec non enterocelis, addita resina ac picierl, collectionesq; cujusvis generis brevi admodum minuunt atque discutunt.

Cuchipilutl ita describit Nierembergius: Vermis genus est juxta moros aut salices versans, bombycis magnitudine, & pænè forma, sese illius instar Octobri mense firma convolvens membrana, ac prodiens Aprili, conversus in papilionem. Suspen-

dunt hunc Indi infantium cunis, atque ita somnum illis conciliari credunt. Unde imposuere ei nomen. Idem in pulverem redactus, ac ex vino proprio, quod pulque vocant, totus potus, Venerem stimulat. Mexicanis agris provenit, & ex his quas dixi arboribus victum sibi quærir.

A lignis in quibus prodeunt sumptas differentias, si attendas, vel innascuntur virentibus truncis, qui *δῆκες* dicuntur: vel in aridis & exsiccis qui *ἐγξυλα*, vel in solidis & siccis qui *Thripes*, vel in lignis calidioribus qui *Termites*: vel in solidis & siccis qui *Cossi*: vel in navium tabulis qui *Teredines*.

Δῆκες fortè *Σπὶ δ' ἀκνεν* nomen sumperunt, adeò ut sæpè ad earum radices magna pulveris vis, mordent enim & mandunt vivas arbores, quasi ferratione facta, conspiciatur: caput huic deforme; varium, tegmine coopertum, quod exercere & contrahere pro lubitu potest. Pedes habet in posteriore parte caudam versus, sicut *Cossi* in pectore; reliquum corpus tunica arenosa tegitur, quasi putamine; qua exuti moriuntur, ut cochleæ testis nudatæ. Tempore à natura constituto, in thecam aureliæ similem obdurescunt, sed quæ bestiola pennata inde provenit, nondum animadvertimus. *Cosso* longe major ob nimiam edacitatem, & minus delicatus. Pici martij, aliæque ligniperæ aves rostro virentes arbores percutiunt, & sono concavitates investigantes, eo loci perforant & pertundunt, donec ad mordellas istas pervenerint, ipsasq; deglutiverint. Valdè enim delectantur hoc cibi genere, ejusque gratia integros aliquot dies in perfodienda arbore insumunt.

Ἐγξυλον in ligno surdo reperitur, & pumicoso, quod ne baculo quidem percussu sonû edit: Ceraftæ Theophrasti, & pityocampæ Medicorum valdè cognatus, nisi quod tres tantum utrinque pedes consecutus sit. Virosum illi & pertinacem odorem, & vim valde septicam tribuit Gesnerus.

Θεαπὲς à terendo dicti videntur,

Z

vul.

vulgares satis vermiculi ac frequentes, parvi, corpusculis albidis; capitibus nigricantibus vel ex rubro infuscatis; pedibus sex juxta collum tenuissimis, exilibus, & cum rubedine non magna nigricantibus; vermiculo avellanæ nucis structurâ corporis persimiles, sed medio minores atque breviores; nigra ligna non amant, sed albicantibus duntaxat (qualia sunt Alburni, Coryli, Betulæ, Cinamomi, Platani) innascuntur: quæ jam arida solidaq; perterebrant, & absorpta humiditate cariëm inferunt.

Termitem produciunt ligna solis nimio calore torrefacta; qui (Servio authore) ex ipsa medulla genitus; matrem tantum absomit, osseamque & corticeam substantiam non attingit. Ingratum sanè animalculum, tantoque aliis verimbis deterius, quanto cordi arborum, & vitali ipsi fonti perniciosius; vivunt enim aliquando eute & ossibus spoliata: atqui medulla absorpta, statim pereunt, nec mederi tanto valet vulnere natura. Corporis effigie Cossos referunt: sunt autem minores multo, & non parum molliores.

Cossi rugosi admodum sunt corporis, unde & Consules quidam Romani Cossi vocabantur. Majores Cossi ferè minimum digitorum crassi videntur, & tres digitos transversos longitudine adæquant; colore albicante, erucis majoribus ferè similes; quare à Plinio prægrandes Cosses dicuntur; pedes utrinque tres, non procul à capite penduli, breves, exiles, nigricantes. Corpus annulis duodecim constat, versus caudam semper minoribus & pellucidis; caput crassiusculum, colore nigro, duæ in fröte laminæ; juxta os sunt exiguæ quasi setæ aculeatæ, singuli annuli in lateribus, singulis punctis rubentibus: modicè cavis notantur. Tardigradum valde est animal, & motus vix perceptibilis; qua de causa ventricosos & desides cossos appellat Festus. Oculos habet parvos valde, dorsum teres, ventrem nonnihil concavum, colore albicante dilutum; obesuli videntur & valde molles, lignis noviter sed

intempestivè cæsis innascuntur; si verò diutius resecta fuerint, plurimamque humiditatem amiserint, minores oriuntur Cossi, magnitudine solum à majoribus diversi. Veteres in Ponto & Phrygia, (ut Plinius & Hieronymus tradunt) iis quasi delicatiori cibo vesci solebant, atque eum in usum farina saginabant, ut vermiculi quoque altilles fierent. In medicum etiam usum veniunt Plinio teste; sanant enim ulcera, lac augent, nomas illiti percurant; id quod Albertus quoque confirmat.

Teredines, capite ad passionem grandissimo, rodunt dentibus, perforantque robora, vel sono teste. Hæ tantum in mari sentiuntur (Theophrasto teste) nec aliam putant teredinem proprie dici. Horum alios tam longos in navibus Venerorum quæ diu in Alexandriæ portibus constiterant, repositos meminimus, ut cubitum longitudine, pollicem crassitudine æquarent. Quales etiam inclytus ille Franciscus Drakus, alter quasi Maris Neptunus, in nave sua orbivaga (canè jam penè spongiosa) domum reduxit. Vidimus alias Teredines unciam longas vermi farinatio persimiles. His corpus teres, caput ex luteo splendentem, parum rubens, os forcipatum, à cujus quasi labris parvæ spinulæ nascuntur; pedes utrinque terni, incisuræ corporis undecim, aliquantum rubentes; reliquum corpus dilute livescit cum splendore; quo majores fiunt, eò ex phæniceo obscurius splendent; quò verò minores, eò intentius albicant. Itali Byssam, Hispani ab edulio Bromam vocant: exedit enim naves & perforat; unde Aristophanes in Equitibus triremem exesam, loquentem, introducit his verbis ὁπὸ τερδόνων σαπὴς τὰ ταύτη καὶ ἄρνη ἐστὶ σπῆμα. Sic etiam Ovidius l. de Ponto. Estur ut occulta vitata teredine navis. Teredines non naves tantum, sed & ædium trabes infestare. (Pace Pennij dixerim) ex Homeri Scholiaste. (O. diss. λ.) constat, cujus hæc sunt verba: Melampus, cui Draco aures purgaverat, ut Brutorum sermonem intellexeret, ob boves Iphieli abactos in car-

carcerem conjectus est. Ubi cum intellexerat ex Terebinthi colloquio, parum superesse de trabe, efferri se iussit, ne illa decedente vitam finiret. Atque dum à viro & muliere sublimis factus efferretur, domo corruente, uterque reversus periit. Patet id etiam ex Comitorum Latino- rum facile principe, quam Philolachen adolescentem his loquentem verbis introducit:

Atque illud sæpe fit: tempestas ve-
nit,

Teredo ades ingreditur, & vermis
malus.

Venit imber, lavit parietes, per-
pluunt.

Tigna, putrefacit aer operam fa-
bri, &c.

Magnis hi præsertim nocent *arboribus*, nempe Quercui, pyris, malis, castaneis, larici, juglandibus, fagis, mespilis, ulmis & latifolijs falicibus: in quibus immaturè cæsis, & plantatis, pinguedo quædam mollis & mala oritur (alburnen & alburnum saltuarii dictum) omnium Terebinthi seges & fomentum. Quo sicciore, amariore, oleosiore, atque duriores sunt arbores, eò magis à Terebinthe liberæ creduntur: tamen aliquando cupressu, juglandi, Guajaco, & Tiliæ, Ebena etiam ipsi, vim facit. Modus autem generationis ipsorum in lignis huiusmodi est. Pleriq; innascuntur, non foris se inferunt; depascuntque sua principia, ut ex quibus constant, ex iisdem constare pergant. Materialis causa & conjuncta, est dulcis & alimentarius lignorum humor putredine infectus, quemadmodum ex pituita dulci lumbrici intesti- norum nascuntur. Putrescit autem dulcis ille humor duplici de causa. Dyscrasia scilicet vel continui solutione: per Dyscrasiam qualitas corrumpitur; per vulnera vero, non tantum innatus effluit, & se effundit humor, sed alienus quoque per pluvias caliginesque illatus putredinem efficit. In vetulis, raris, & siccatis per ætatem arboribus, maximi sunt vermiculi: tum quia humidum radicale magis

minuitur, tum quod Dyscrasia color- que & humor peregrinus magis au- gentur: quemadmodum & senes ple- rumque dira scabies, & syrones aca- rique crebrius infestant. Sub lunâ exposita ligna citius vermiculantur, ob nimiam aëris humiditatem; sub so- le autem calidiore, ob nimium ar- dorem. Qui verò innascuntur, hi omni tempore generantur: Illatitii autem, & ex semine culicum, mu- scarumve natis, ver potissimum atq; æstas amica sunt: hyeme enim con- glaciati pereunt. Cælum quoque & solum magnam vim habent, ligna quippè Hibernica rarius putrescunt, ex Solis virtute; quemadmodum & Arabica, ex cæli.

PUNCTUM II.

De Vermibus fruticariis.

Vermes fruticarii, Salicem, Ili- ^{Mouset. l. c.} cem, Juniperum, Cynosbathum, & reliqua infestant. In *Salice* humili- ori, (præsertim quando galle tuberculo- se erumpunt) nonnunquam qua- si rosæ inveniuntur, quæ vermibus scatent, uti etiam in lentisci folijs ac- cidit.

Ilicis (inquit Quinqueranus) duo genera: alterum arborescens, alterum frutex exiguus, sesquipedali proceri- tate. Latissimè viret, folijs lævare præfulgidis, spinarum vallo ambi- tis numerofo, stolone assurgit in mo- dum rosarij: à nostris Fagi appellatio- nem sortitus, quamvis nullam fagi imaginem repræsentet. Provenit locis planis quidem, sed in altitudi- nem evectis, exilibus & sitientib. col- libus, sed infœcundis. Vere medio- rorati imbribus frutices, *Coccum* hoc modo ordiuntur. Ubi muscivorus se in duo brachia sortitur, in horum me- dio primum omnium increfcit ro- tundum quiddam magnitudine & colore pisii; hoc Matrem vocant, quod ex eo cetera grana producuntur. Ma- tres porrò habet ut plurimum quinque; quælibet cespitum familia, quæ in- eunte æstate æstuq; minutissimorum vermiculorum catervam profundit,

fatiscuntq; in summitate. In animalia prorepi nova soboles colore cāda pro se quisq; in sublime. At ubicunq; vermiculi vel germinantis furculi axellis occurrerint, decident, & incrementis aucti Milij magnitudine fiūt. Inde liberius adolescentibus, albus color in cinericium trāsīt, jamq; non animal, sed Pisum rursus apparent. Tuncq; ea grana maturitatem adepta colliguntur, jam coloratis vermiculis fœta: dum asportantur mercatoribus, ambiens pellicula præ ténitate rumpitur. Vermiculorum quidē qui circa vaginulam habentur pretium in libram quamlibet, aureus solatus in granorum vero quæ adhuc eorum partē retinet, hujus quadrans. Torpēt interim vermiculi, ac immobiles jacent. Cæterum, quū primum tempestivitas adest, in lintea præcipitati Soli exponuntur. Tum libato colore statim prorepunt, atq; aufugere nituntur, sed à custode, qui cōtinuus affidet, concussu lintei in mediū eorumq; rejiciuntur, donec emoriantur. Tanta quidem dum hæc fiunt, totoq; mox triduo, odoris suavitate ac gratia, ut non Cibetæ, non Moscho, non Ambra, sed ne Citriorum quidē florib. concesserit. Si quæ verò grana legentis effugerint sedulitatē, ea mox alatorum animalium numerosum exercitum in auras effundunt. Observatum est uno anno ex campo lapideo, in Arelateni agro, hunc proventum undecim aureorum millib. æstimatum. Hæc Quinquemus.

Similis Cocci parandi ratio, etiamnum meo tempore (inquit Carolus Clusius) in Gallia Narbonensi, atque etiā in Hispaniā observabatur. Areas enim sub dio habent ad id destinatas eminente aliquantulum margine, quib. linteo panno instratis Coccum effundunt, custodibus cum bacillis summo fervore Solis perpetuo assidentibus, & extrema lintei cōcutientibus: ut vermiculos effugere properantes, in interiorē lintei parrem repellant. Verum Petrus Bellonius lib. 1. obser. cap. 17. aliam præparandi Cocci rationem refert. Cocci baphicæ (inquit) proventus in Cretā ma-

gnus est: Pastores & pueri eam colligunt. Inveniunt mense Junio in exiguo quodam frutice ex Illicis genere quæ glandem fert, sine pediculo inhærens illius fruticis stipiti, colore ex cinereo albicante. Quoniam vero istius fruticis folia spinis horrent, uti Aquifolia; pastores ferulam sinistra gestant, quā ramulos deprimunt & inclināt. Dextra falcem putatoriam, quā ramulos demetunt; à quibus vesiculas rotundas, exigui pisi magnitudine auferunt, qua parte ligno adhæferant apertas & hiantes, plenas exiguis rubris animalculis lendē minorib. qui per hiatum istum effugiunt, & vesiculam vacuum relinquūt. Pueri Coccum jam relictum ad Quæstorem deferunt, qui ex dimenso ab illis redimit. Is à vesiculis animalcula cribro segregat, deinde ea summis digitis lenitèrprehendēdo in pilas efformat ovi gallinacei magnitudine: Et enim sinimum comprimeret, tota in succum resolverentur, & color periret. Itaq; duo infectionis genera, unum pulpæ, alterum vesicularum; & quoniam pulpa inficiendo magis utilis est, ejus pretium quadruplo majus quam vesicularum.

In summis *Juniperi* furculis, exiles è croceo rubentes, Gesnerus observavit. In *Cynosbati*, sive rosæ sylvestris spongia vermiculi nascuntur albicantes, ex quibus Aristoteles Cantharidas provenire scribit. Post duos mēses, (inquit Gesnerus) in hypocausto servata spongia magnum numerum vermiculorum viventium effudit. Spina item, & sentis, Rosa, Erica, Genista, Colutea, Rubus Idæus, Myrtillus, Capparis, uva crispa, Carpinus, Oxyacantha, ligustrum, vitex, glycyrriza, omnis denique frutex, & suffrutex à vermibus exeditur: neque Ricinus ipse (Jonæ, divino illi vati, nimium exæstuantiumbram præbens) ab hac peste legitur immunis.

* *

PUNCTUM III.

De vermibus leguminariis
& frumentariis.

Alonsetus
Theatr. 2.
c. 20.

Legumina sunt *σκοληνός*: sed quomodo id eveniat incertum est. An quoties diffundi nequit humor ob æstum & squalorē, ut Theophrastus innuere videtur? An potius dicendum à sicco humorem appeti, humorem aut illum refugere tanquā adversarium? Sic pendentes arido parieti videmus guttas. An calor nimius corrumpit naturalem, cum calorē, tum humorem intus contentum? Sanè eo modo putredinē induci, morbidissima Æthiopia testis est. Fabas depascitur vermiculus, Midas Theophrasto, Hesychio *κρίελα* vocatus. *τρώξ* ἢ *κρυματρώξ* vermiculus leguminaris dicitur, sed præcipuè in Pisib. versans, & ab erosione nomen obtinens: qualis etiam in Cicere, posteaquā pluvis ab eo elota fuerit salugo; ut præter Hesiodi Scholiasten Phavorinus & Theophrastus statuunt; leguminibus dulcoribus sæpè innascuntur, tum ob alimenti aptitudinem, & Elementi verminantem naturam. Dulcia enim vermes citò generant, generatosq; nutriunt & signant.

Frumentarii.

Frumentarij vermes, in genere *ψάμμες* dicuntur: qui tritici, filiginis, panicis, avenæ, orizæ, milij, & secalibus radicibus, stipulis, calamis, spinisque victitant. Eorum alij amylo vescuntur frumento, ut *Farinarij*: alij integro & mola nondum confrecto, ut *Curculiones*. *Farinarios* Angli Mealewormes appellant, teredini similes, sepedes, capite parvo & spadiceo, corpore anuloso, & pro farinæ diversitate vario colore: proba enim & albißima farina, albos generat; vetustior flavos; macra & furfuribus immixta etiā fuscus. Cardanus eos *Blattas frumentarias* vocitat, sed (ut sæpè fit), incogitanter. Furfure nutriti mirum est in quantam excrescant multitudinem, & ex decem trecetos brevi videas. Apud panni lancitextores

quovis ferè tempore inveniuntur: hi enim ex furfuribus, aceto & axungia mixturam faciunt, undè copiosissime nascuntur. Integri frumenti, sive tosti, ut in βύνη Aëtij (quam Mault Angli, cerevisiæ matrem, appellant) sive crudi, strages curculio: sic enim rectissime meus Comicus, et si Virgilius atq; Varro Gurgulionem, & Curculionem scribant.

Kis Græcis dicitur, Animal trirostrum. Triticum præcipuè sed etiam alia quæcunq; vastat frumenta; præter cassam tenuemq; membranulam nihil reliquum faciens; nam ut Georgicorum vates; populatq; ingentem farris acervum, Gurgulio. Ad Scarabei minuti faciem formatus, rostrum habet sibi peculiare, & trifurcū. Corpus aliis nigrum, aliis subfuscū, aliis, & majorib. subviride, cujus medium isthmus coarctat. Bestiolæ tanta est siccitas ut primo quoq; tactu levissimo in pulverem abeat. Vere maxime generatur paucorum dierum spacio, antequam examina faciunt apes. Nascuntur (inquit Theophrastus) ex alia grani parte; quod vero reliquum est, pro cibo utuntur: rustici nostri *σποφάρον* hoc animal in parietum rimis ac inter tegulas ova ponere pro explorato habēt, unde per procreationem nova soboles. *Tria* de his bestiolis mira memorant. *Primum*, quod licet ab initio paucæ fuerint, brevi in infinitam sobolem propagantur. *Secundo* quod inter tegulas ac in rimis parietum triennium ac amplius ferè sine cibo vivunt.

Tertio, si una cum hordeo vel tritico per triduum submergantur, tandem exemptæ reviviscunt. Syliardus notiter (diligens naturæ observator.) *Curculionis* propagationem ita describit: Quum formicæ aristæ culmen exederint, ascendit curculio, & per exiguum illud foramen, ovum unum vel alterum, (rarissimè tertium) deponit, magnitudine ferè grani milii; oblongum fulvum, liquidæ materiæ & fulvæ plenum: ex quo deinceps novus prodit Curculio. Datur in hoc infe-

culo uterq; sexus; siquidē coeunt an-
tequam hanc injuriam inferunt. Pe-
trus Comestor ex fabarū corruptione
provenire affirmat, cui præter Guille-
rinum de cōchis nemo subscribit, ne
curculionem cum Mida malè cōfun-
derent. Præter vulgo notū hūc Cur-
culionem Joach. Camerarius ē Ger-
manor. horreis duos ad Pénium alios
misit, ventre longe turgidiore; quor.
unus subcineritii, alter viridis colo-
ris. Est etiā in tritico (inquit Scali-
ger) Curculio quidam erosiris, quem
fortè Plinius Scirabei frumentarii
nomine subintellexit.

Circa Lentzburg oppidū Germa-
niæ in agris reperitur Insectum, q̄ alii
veput, nonnulli Korne vvormme, qui-
dam Kornevele appellāt. Dicitur ef-
se adeo venenosum & noxiū, ut agri-
colæ aratro relicto obvium illud per-
sequantur, & interficiant. Ex rubro
parvo nigricat inter segetes habitās,
& grana comedens. Vermes in vitib.
nati Cocciillos vermiculos æmulātur,
quales in Pimpinellæ radicib. colligi
putat, imo p̄tinacius instat Brassavol⁹.

PUNCTUM IV.

De vermibus Herbariis.

Herbarii nascuntur, in Violis, Cy-
nara, Ocymo, Saccharo, Lupu-
lo, Aphodele, Pimpinella, Dypsaco,
Carlina, &c. *Violarū* vermes minutif-
simi conspiciuntur, & nigri, celeri re-
pētes cursu; ut Jacob. Garetus, Phar-
macopola diligentissimus, & simpli-
cium cognitione inter paucos cele-
bris, observavit. Eradice *Cinaræ* pro-
dit vermis Hexapus, eruciformis, al-
bicans, capite ex nigro rubescente.
Cinaræ radices qua rodit nigras red-
dit; ac tandem interire facit; tales i-
tem Raphanus producit.

Referunt, (inquit Cardanus) ver-
mem *in ruta foliis* inventum, lacte o-
villo, eodem modo quo Avellaneus,
ad magnitudinem non parvam enu-
triri. Vermiculus filius rosis, Ocymi-
que hospes, corpore ferè erecto, po-
steriorib. pedibus hæret, dum priori-
bus locū, captet. Ex *arundine* saccha-
rina, saccharū paratur, omnium qui-
dem salium dulcissimus, & (ut vulgus

medicorum existimat) putredinis o-
mnino expers. Tamen fretus Scali-
geri clypeo, in saccharo pusillū ver-
mem, longum, pulicis colore, & (si
rostrum adimas) Curcullioni persi-
milem nasci asseveramus; & saccha-
rinū propterea merito dicimus. Hu-
jus item Bellonius mentionem facit.

Videtur etiā rara admodum ge-
neratio ejus Insecti quod Germani (u-
tor Camerarii verbis) Maeyn vvorm-
len appellāt. Quippe mense Majo se-
pè cadunt rores insalubriores, qui si
in lupuli folia inciderint, vertuntur
in animalia, Hoppen dicta. Eorum a-
liquot inter millia unum interdum
videris aliis longe majorem (quamvis
ipse pediculum obesiorem vix supe-
rat) cui lurei circa ventrem circuli,
dorsum striatum, cauda satis proten-
sa, color maximam partem corporis
subniger. Huic cum ros deficit ali-
mentarius, reliquos sui gregis sigilla-
tim devorat semper à proximo inci-
piens. Bombycum instar cutem mu-
tat demum ubi totus ferè perlucet,
deposita ultima tunica, capite & pe-
dibus per gluten quoddam tenue fo-
lio affigitur, atq; ita emoritur: Hunc
vermem lupularium vocare quid im-
pediat?

In *Aphodeli* caule vermis gignitur
aidglwoerdh, cum herbā florere incipit;
ex huius Scapulis alæ sensim excre-
scunt, atq; tum volucris factus, lares
deserit. In *Persicarie* Siliquosæ & Car-
dii sylvestris geniculis extuberanti-
bus, vermiculi nascuntur albicantes,
ut in floribus *Pseudocacaliæ* purpura-
scentib. sublutei, in *Pimpinella* radice
miniati. *Apio* fœminæ vermes lanugi-
nosos; in *Fungis*, & *Brassica*, graciles,
nigricantesq; in *Acori* radice albidos
sepe vidimus. In radice *Enulæ* sive He-
lenii virentis & crescentis, vermis al-
bus decem vel undecim articulis cō-
spicuis oritur, ad pēnæ anferinæ cras-
sitiam, capite parvo & nigro, pedibus
sex brevissimis, & colore anthraco-
co. Indorum reges (Aeliano teste) in
planta quadam vermem repertum,
ignē tostum, secundis mensis adhi-
bent, & pro cibo suavissimo blandif-
simo laudant.

In Dy-

In *Dysfaci* capite vel caule vermiculum vidimus exiguum, capite parvo pedibus sex nigris, incisuris decem vel undecim. Primum caulis medullam illam spongiosam depascitur, eaque deficiente, per inopiam pabuli commoritur. Mensis Octobris initio facile invenitur, quavis Marcellus in Dioscoridem, insigni sane audacia, id denegat. Hic est ille, ni fallor, quem Tatinum appellant veteres. Galedracon vocat Xenocrates plantam leucanthemo similem, (inquit Plinius) Caule ferulaceo, alto spinosoque capite, & oviformi. in hoc una cum ætate vermiculos nasci tradunt, in dolore dentium peritiles. In radicibus Carlinæ, (quæ planta in excelsis Sabaudia montibus luxuriat) vermiculus reperitur, in quibusdam nascens, in alijs adolescens, in plurimis alatus, & avolare paratus. Albus est, in aliquot divisus articulos, oculis nigris conspicuus. Animalculi in potenti herba geniti usus in re Medica forsitan eximius est: cujus curiosis secretorum naturæ indagatoribus disquisitio committatur.

ARTICULUS II.

De Vermibus qui in animalibus nascuntur.

Vermes in animalibus qui exoriuntur, superius quoque cum de pediculis ageremus attigimus: nunc ut omissa addantur: de quibusdam duntaxat qui in piscibus & quadrupedibus reperiuntur, agere placeat. *Pisces* quod concernit, *Mullus* idè sterilis est, quod in ejus utero vermiculi, postquam ter peperit, inveniuntur, qui semen absumunt, si Athenæo credimus. *Cyprini parvi* nigrum sub bronchiis aliquando gerunt, qui eos in tabem deducit. Duodecem veluti uniones, inquit Bellonius, erui magnitudine, carnosos tamen, candidos, & calli duritiem habentes, in quibusdam *Cernuis*, (sic vocat, teste Gesnero, percas fluviatiles) conspexi: quorum unusquisque vermem in-

clusum, gracilem, oblongum acterem contineret: qui ex venis mesaraicis dependerent inter colon & ileon, ad eos anfractus, in quibus lantes esse solent. Circa Basileam omnibus dulcium aquarum piscium generi innaſcuntur, Leuciscis inprimis, quos Schvvalen ibidem vocant. Albifunt, longi, convoluti.

Æstate afficiunt: & ex ventris duritie, magnitudine, & albore deprehenduntur. Quatuor lumbricos, in secunda Leucisci Rondeletii specie Gesnerus invenit; vivos, candidos, latos, exigua crassitie. Major, digitos ferè decem longus erat, latus dimidium. Idem sub finem Maij, in Cyprino lato, aliquot offendit, ad digitum longitudinem, unum albicanterem. Sed & *Gobio* vermiculos in ventre gestat.

Ex *Quadrupedibus* laborantiisdem, Equi, Oves, Lupi, Capræ, Boves, Cervi, Canes, &c. *Equis* in quavis ferè corporis parte exoriri possunt. Paschalius ventris facit crassos & albos: gutturi, breves, rotundos, & crassos, qui etiam aliquando in intestinum rectum descendant: inter costam natos, longos, & capillorum instar tenuis. Ruinus quatuor *lumbricorum genera* in eorum intestinis exponit. *Crassos* & breves, in modum pistachiorum sanguineos. *Longos* rotundos & albos, qui teretibus in humano corpore respondent. *Parvos* ac tenues, *Tarme* Italici, qui quandoque cum facibus egrediuntur. *Ascariides* fortè. Nam se foramini recti intestini copiosè ingerunt. *Breves* denique & crassos instar fabæ, pilosos, qui se interiori recti intestini parti applicant. Brassavolus in pullorum ventriculo, ingentem copiam rubrorum & seminigrorum Ferrariæ reperit, seminis cucurbitæ forma. Ruinus propè stomachum, in equis mortuis, plusquam centum, pistachii ferè magnitudine, sanguineos, qui prima stomachi membrana erosa, ad secundam pervenerant. In *ovium* hepate reperiri, nullum dubium. Adherent & bifidus eorum ungulis. In cava vena diebus canicularibus, Coiterus in-

Ruin. de
morb. e-
quor. 4. c. 1.

Athen. Di-
gnos. 6. c. 16.

rus invenit. *Lupis* in vulneribus & ulceribus facillimè oriuntur. Ideo fortè lapides, ne lædantur, pertimescunt. *Caprarum* gregiarum caput, multis vermibus juxta cerebri basin naturaliter affici, scripsit Trallianus. *Boves* sub lingua, nec non inter cutem & carnem sæpissimè affligunt. In cerebro *Cervino* semina cucurbitulæ emulantur, in aqua mortui videntur, in vino reviviscunt. Propè vertebram nati, iis qui carnes fœdant, similes sunt. *Canes* sub lingua vexantur. *λίσσα* vel *λίττα* Græcis. Alij, nervosam quandam congeriem dicunt, quâ cunicularibus inflammata, rabiem concipere opinantur.

Huc pertinet *μυλαί*, qui in carnibus nascuntur: *Tarnia*, qui in lardo. *Mel-dera*, qui in casco. *Cleri*, qui in favis apum. Habent & *Locustæ*, postquam pepererunt, circa fauces suas, qui eas strangulant. Inventi & in phalangio duo. Qui in mortuis corporibus reperiuntur, vel ulceribus Chirurgorum aliquando incuriâ, *βλαί*, Hippocrati & Plutarcho, *seva vermina* Lucretio, *κακὰ ὄνεια* Suidæ, dicuntur. Sunt vel caudatæ, vel caudarum expertes. Gallinæ utrisque vescuntur. Democritus eorum ex Oraculi consilio usu, & Theognosti Democratii ductu, à comitali morbo liberatus est. De *Fuga*, & quomodo occidantur, veterinarios vide.

ARTICULUS III.

De Vermibus qui in homine.

DE vivo homine res est. Nam ex cadavere exurgere certum: natumque aliquando ex medulla spinali serpentem, Camerarius author est. In variis verò illi membris reperiuntur. In *Cerebro* nasci, testantur, Hollerius, Thomas à Vega, Cornelius Gemma & alij. Frequens id olim in Hungaria & Germania: quique laborabant in phresin & maniam incidere solebant. Unicum in alio, quod cum vino sublimato exhibebatur remedium, Vir apud Benivenium

robustus è dextra nare palma longiorem eiecit. Prodiere ex auribus in peste, ijque crassi sed non ita longi. Hinc *ὁ τὰ σκαλημιών* Dioscoridi.

Vidit & Valescus de Taranta duos vel tres, granorum pini magnitudine, crassiores tamen. Sub lingua nasci, Montuus author est. In *Dentibus* Sinones à quibusdam vocantur. Bat-tæo Syriæ Monacho ex nimia inedia, enatos fuisse, Sozomenus tradit. Per oculi internam partem puellæ trimæ vermem semipalmarem, album, educit, Amatus Lusitanus scribit. Stabulari aliquando in aspera arteria, Avenzoar; in pulmone, Aloysius Mundella, in vesica & renibus, Dodonæus, Rondeletius, Fernelius & Jacotius; in utero, Priscianus & Garzias Loppius, testes sunt. Ejectus ex pectore per tussim; egressus per penis meatus & quidem spontè unus: minxit quidam Perusinus parvos & latos: Italus quidam elychnii crassitudine, vivos & rubentes; vide & apud Moufetum exempla. Exiit per uteri collum magna multitudo. Prodiit & ex polyposis naribus postquam foliorum tabaci succo cruciaretur. De eorundem mictu, Tulpium consule. In brachiis, cruribus, turis, & cute reperiri, Dracontia pueror. Nigra seu Toni Americanorum, & Indorum Orientalium, ostendunt. Quid plura? Nec cor fortè liberum erit.

Darienim & in sanguine lumbriciformia animalcula, corpus exesura, apud Plinium habetur. Cum femine ejectos, apud Plutarchum. Et qui non nascantur ibi vermes, ubi angues bifidi flagellati, ut in Appendice ad serpentes diximus, inventi sunt.

In intestinis qui hærerè solent, sunt *Lati*, *Teredes* & *Ascarides*. Priores omnes ætates infestant, Græcis *ἐμύθηος πλατέας*, & *κηρία*, Latinis propriè *Teniarum*. Per tota enim aliquando extenduntur intestina, corollæ in seipsam ductæ instar. Tricenum pedum esse notat Plinius, Platerus quadraginta vidit. Partes eorum non ita exactè semen cucurbitæ referunt, sed ubi abruptuntur, & moram aliquando jam

Holler. l. i.
cap. 1.
Vega in c. 5.
de locis affec-
tibus Ga-
leni.
Gemma in
appendice
operis Co-
smocrit.
Beniven.

Examp. 6.
100.

Mont. tom.
4. c. 19.

Sozom. H.
Ecc. l. 6. c. 34.

Lusit. c. 6.
VII. cur. 63

Mundella
Dialogo 4.
Dodon. ad
Beniv. c. 7.
Rondoler.
de dignos-
morb. c. 17.

Monfetu
Theatri
Inf. 2. c. 30.

Tulp. obser.
2. c. 49. 50.
c. 51.

Plin. H. N.
26. l. 13.

Plin. H. N.
11. c. 33.

jam semimortui trahunt, pars quæ ad latera tenuior, putrescit : quæ verò in medio veluti nodus, figuram seminis cucurbitæ vel cucumeris refert. Quatuor historiæ apud Fabricium Hildanum vide. Ad hos illi, qui <sup>σικυει-
δεις</sup> seu cucurbitini vocantur pertinent. Ideo quibusdam alterum Teniæ genus. Ex partibus multis, quarum singule semen cucurbitæ referunt, constant. Ex his illum fuisse puto quem Lulitanus describit, quatuor cubitorum, latitudine semiunguis exigui, albus, capite verrucoso, ex quo totum corpus procedebat, quem mulier Illyrica tussicula vivum eiecit. *Teretes* ^{στρογγυλοι}, seu rotundi Græcis, si magnitudinem spectes, sunt aliquando, longitudine sesquipedali, quinque pedum sæpe, nonnunquam palmam non excedunt: si colorem, sunt rubri, flavi, nigri, ex parte albi vel fulvi, & virides: si constitutionem, visus est rubro capite, pisi magnitudine, lanuginosus, cauda lunata: visus dorso lanuginoso, pilis rubris confito, &c. Platerus octodecem ulnarum exsiccatum habuit, quem Mouferus vidit. Trecentorum pedum longitudine eiecit, Plinius author est.

Ascarides ^{δοτό τῶ ἀσκήν}, quod mordicationem & pruritus excitent: vel ab ^{ἀσκαρίζω} moveo, dicuntur. Vereres *jumentarios* dicebant, quod sæpius in equis, canibus, & boum genere apparerent. Sunt lumbricis terrestribus similes, sed unciam raro superant. In extremo languore reperiuntur.

Dantur præter hos & *Monstrofi*. Benivenius unum pedibus quatuor, cauda novæ lunæ instar falcata, digitorum duorum longitudine observavit. Gabucinus, nigrum & pilosum: Capriana, binis cornibus flexilibus, & centum utrinque pedibus subviridem, & qui mire progrediebatur. Rondelet. Scolopendræ similem, sine oculis. Schenckii filius variantem, rostello acuto & sanguineo excrevit. Rusticus apud Wierum octopedem, rictu oris capiteque anati simillimum. Puella Lovaniensis apud Gemmam Anguillæ similem, &c. Plura apud Aldrovandum & Moufetum invenies.

CAPUT III.

De Teredine & Lumbrico
terrestri.

DE Teredine pedata, superiuscum de vermibus plantariis ageremus, egimus. *Depedis* meminit Agricola, quem ab æneo colore *Rupfferwurm* <sup>Agricolæ
animalib.
subterraneis</sup> vocat. Serpit, inquit, quia & pennis caret & pedibus. Crassitudo ipsi quasi parvæ anserinæ pennæ, longitudo scolopendræ. Teres est, sub lignis putridis natus, & plerumque juxta scolopendram inventus.

Aldrovandus quatuor teredinum genera constituit. *Vnum* Plinii & <sup>Plin. H. N.
lib. 6. c. 41.</sup> Theophrasti, quod dentes habet & duntaxat in mari in lignis reperitur. *Alterum* Vermiculus dictum; *Tertium* Thrips, *Quartum* Cossium quem vermem multipedem in lignis quidam faciunt. Ipse observavit vermem pili longitudine in ligno nascentem, colore album, figura fere Erucæ sylvestris similem. Linea in dorso à capite ad caudam usque conspicua, more <sup>Aldrov. H.
lib. 1. c. 53.</sup> Erucarum repentem fere, undecem incisuris constantem, in singulis lateribus, punctulis quibusdam castaneis, ore nigro ex duobus veluti introsum se curvantibus dentibus confectus, qui admodum constringeantur, plusculis prope os pedibus. Ex ore succus quidam viscidus, lentusque emanabat. Hunc vermem *Cossium album* existimat.

Multæ tamen sunt arbores quæ teredinem non sentiunt, ut tilia, quævis corticis & foliorum succus dulcis sit, ob odorem; buxus, ob duritiem; abies circa germinationes decorticata; Mori materiem æternam Theophrastus reliquit. Alexandri verò Magni comites prodiderunt, in Tylo rubri maris insula, arbores esse, ex quibus naves fierent, quas CC. annis durantes inventas, & si mergerentur in corruptas. In eadem esse fruticem baculis tantum idoneæ crassitudinis, varium, tigrum maculis, ponderosum;

sum: & cum in spissiora decidat, vi-
tri modo fragilem &c.

Lumbrici
terrestres.
Aldr. Hist.
Insl. 6. c. 6.

Lumbrici terrestres, Græcis *γῆς ἐντερεῖς*,
δεῖλοι, ἀλάκται, Siculis *zaffari*, quod ter-
ram comedant; Latinis *Intestina ter-
ra*, Monardi *Onisculi* & *Nisculi* dicen-
tur.

Duo ipsorum genera Lumbricis in-
testinalibus quidam sunt similes; alii
Ascarides. Illi colore sunt interdum
subalbido, interdum subsanguineo:
& pluvius cadentibus subito è terra
prodeunt. Hos qui parvi, non unius
eiusdemque coloris dicit Agricola.
Sunt candidi, lutei, nigri; sæpiusque
aratro excitantur. Vastant sata radi-
cibus subsecutis. Ad eos pertinent
Zuccarola Italici dicti, crassi, longi pau-
lò minus digitum. Sub aeris æstum,
è terra prodeunt. Terra pingui alun-
tur, & dulci radicum succo. Ex eo-
dem nasci, Gaudentius Merula scrip-
sit. E terra egressos coivisse obser-
vavit Aldrovandus. *Tangunt se tan-
tummodo*, inquit, *plusquam dimidia fere
corporis parte, atque ita arte sibi invicem
adherent, ut non nisi pedum duriusculo cat-
catu & frictione absistant. Videtur autem
uterque cum coeunt, unus lumbricus in me-
dio corporis paulo crassior ceteris.* Plu-
viam præfagiunt, si pertusa quasi te-
rebello humo, affatim foras erum-
pant. Terra namque ab Austro &
aëre vaporoso madefacta, perfacilem
iis transitum largitur. Interveniunt in
eis piscibus, avibus, turdis in primis
& cornicibus. Sed & gallinæ iisdem
viciantur. Haud spernendi & in *Medi-
cina* usus. Profunt ad icteritiam tol-
lendam si pulverizati in vino vel com-
modo vehiculo exhibeantur: contra
arthritidem scorbuticam vagam, si
cum sabina, aristolochia, &c. exhibe-
antur: in nervorum vulneribus si triti
imponantur: in calculo si ex vino
passo bibantur. Mercurialis in lactis
defectu nutritibus cum nucleis pini,
amygdalis, semine petroselini, feni-
culi, rapis, &c. exhibet. Ex iisdem
oleum lumbricorum componitur.
Lixivio, & amaris aquis occiduntur.
Aqua verò, in qua semina cannabidis
decocta sunt, ad superficiem
proliciuntur.

CAPUT IV.

De Limace.

Limacis nomen testudini terrestri Aldr. Hist.
perperam Albertus imposuit. Di-
stinguit & à Cochleis Plinius & quo-
ties cochleas vocat, nudas adiecit.
Nominis rationem locus suggerit. In
limo enim nascuntur. Nec apud Græ-
cos peculiare nomen habent.

De *Forma, Genere & Differentiis*, ita
scribit Aldrovandus. Limacum, seu
nudarum Cochlearum, aliæ magnæ
sunt, aliæ parvæ: Magnæ Germanis à
colore ruffæ dicuntur (quanquam in
hoc genere etiam nigrae sunt) de quibus
sentire scriptores quidam docti
putant, cum ad medendum cochleas
nudas postulant: Parvæ gregatim fo-
lia sectantur, & hortos infestant, ci-
nerici, aut fusci coloris, & hæc quidem
semper nudæ sunt, quod sciam. Plin.
Limaci magnæ similem esse scribit e-
chinum. Sunt vero partium distin-
ctiones, ut & Scaliger annotavit, in
hisce animalculis admodum obscu-
ræ, quæ hic exprimuntur primo loco,
ex cinereo nigricant, albis per tergus
maculis, cornicula exerunt, quatuor
è capite, quibus iter prætendunt. *Ter-
tia* tota nigra: postrema cinerea albis
maculis per dorsum, iisque longis va-
ria. Albertus in eorum extremo sitos
habere oculos asserit. Plinius co-
chleas hasce nudas sive Limaces non
tamen omnes in capite lapidem ge-
rere memoriæ prodidit, idque verum
esse docuit quotidiana experientia:
nonnunquam officulum, ut post pa-
tebit, idem Plinius nominat. Carda-
nus Limacium lapidem vocat his
verbis. Limacius lapis in capite Li-
macis, quæ cortice non integitur, so-
let generari. Hunc ut ostendere pos-
sum candido colore, & aspera super-
ficie esse oportet, quod ex aquæ sub-
stantia coactus sit, & ob id etiam par-
vus, quod in parvo animali inventus.
Lapillus quem ego propriis manibus
exemi è capite nudæ cochleæ, post-
quam in multis frustra quævissem,
albi-


albidus erat fabæ ferè magnitudine, multò tamen humilior, compressusque magis, modice transparens, inæqualis, admodum glaber, parte altera planior, altera velut in oculū protuberans durus, sed dentibus friabilis, ita ut in arenulas atteratur. Venduntur, & alii lapilli multò maiores, magis protuberantes, minus candidi, obscuri intus foveam habentes sed eiusmodi è nudis cochleis eximi non puto. Noctu potius, quam interdiu animalia isthæc ad pascua exeunt, degunt autem non modo in campis & hortis, sed in cellis vinariis, latrinis, cloacis & aliis subterraneis, uliginosisque ædium locis.

Vfus. De *Vsu* hoc habe. In Africa quædam edi, si Brasavolæ credendum. Ex iisdem in Medicina, sale gemmeo aspersis, & cum aqua Limonum infusa insolis, donec quasi in unguentum abeant, Cosmeticum ad faciem lævigandam fieri. Illinitur, & mox aqua florum fabarum abluitur. Pro-

rantur, cinis cum thure & albumine ovorum superlinatur: in *hernia*, ruffæ imprimis, si emplastris illinantur: in *verrucis* & *gangliis* tollendis, si ex bene salicis liquor colligatus, iisdem affricetur. Producent in jumentis pilos ruffæ, si ex exenteratis & sale aspersis unguentum fiat. In iisdem, ex sero acido tepidè propinata, sanguinis per vesicam & anum excretionem, cohibent.

Lapillus qui in capite, quartanam Plin. H. N. l. 30. c. 15. l. 29. c. 6. solvere solet. *Ossiculum* quod in dorso reperitur, ad dentitionem alligari jubet. Inter duas orbitas inventæ, per aurem cum ebore trajectum, vel pellicula canina adalligatum, doloribus capitis medetur. Mizaldus strangu-
riosis prodesse scribit: nec non parturientibus, loca ipsa
laxando.





HISTORIÆ NATURALIS

DE

INSECTIS

LIBER IV.

De Insectis aquaticis.

TITULUS I.

De Insectis aquaticis pedatis.

CAPUT I.

De Insectis aquaticis paucipedibus.

ARTICULUS I.

De Squilla, Locusta, Scorpione, Notonecta, Cicada, Anthreno, Forficula, Lacerta, Corculo.

INSECTA aquatica, in Pedata & Apoda distinguuntur. Illa vel paucos vel multos pedes habent. Paucipeda sunt, Squilla, Locusta, Scorpio, Notonecta, Cicada, Anthrenus, Forficula, Lacerta, Corculus, Musca aquatica, Cantharis, Scarabeus, Tipula, Attelabus Arachnoides, & Ligniperda seu Bellonii Phryganium.


Rondel. de
fluviatil.
c. 374

Monf. The-
atr. l. 2. c. 37

Squilla primus, quod sciam meminit Rondeletius, sed crustatæ duntaxat. Pedes ternos utrinque habet. Cauda in duo longa & tenuia veluti fila definit, caput rotundum & compressum quatuor corniculis instruitur. At Mouterus plura genera observavit, & icones expressit. Squilla

insectum, inquit iste, à Squilla pisce parum differt, nisi, quod & breviores multò antennas, & colorem magis spadiceum vel terrestrem potius obtinuit. Horum alii testa fragili obducuntur, alii plani sunt & nudi. Testacei in rivulis præsertim degunt, arundinum vel gladioli radicibus adhærentes: colore sunt subflavo, nonnunquam autem albicante atque cinereo. Sex tantum pedibus incedunt, reliqui hic appendices pinnarum munere funguntur. Nudi, vel molles sunt vel crustacei: Molles figura hæc constat satis, modo caput spadiceum, reliquum verò corpus obsoleto cinere tinctū imaginemur. Crustaceorum genera omnia articulata sunt, sed alii globosi articuli, alii alii: globosi effigies graphicè hic repræsentatur, si ipsam leviori spadiceo mollius attigeris. Talis *primi* & *secundi* non globosi color. *Tertia* autem species dorso nigricat, ventre fusco: at omnibus os forcipatum & apppositi pertinax. *Quartus* prioribus tribus pedibus se movet, cæteris appendiculis pro remis utitur. Collum illi & antennæ forcipesque minio dilucius illitæ; corpus fuscum, vel magis cinereum. *Quinto* caput longè nigerrimum; corpus planè malicorio simile. *Sextus* à *Qal* videtur, ea quam vides forma & colore cinereo. His omnibus oculi duri, picei, membrana vitri modo perlucida obducti, qui non minus continuo moventur, quam

Squillæ Aquaticæ Mouf.




Squillæ Aquaticæ Aldr.



Mouf. Scorpiones Aquatici




Notonecta



Lacertæ

Aquaticæ

Forficulæ Aquat. M.




Corculis



Locustæ


Mouf.



Cantharis


Aquatica

Aldr.



Tipulæ

Mouf.



Cicada


Mouf.




Pedicul. Marini

Meerleufs

Pulices Marini Mouf



Æstrus Afils aq: Meeresf.



quam quadrupedum aures. Assulant illi protinus, ut Squillæ pisces, in coitu, & ubi licentia audacia crevit, implent femellam. Hoc tēpus specularis index morfu levi significat: illa ore compresso quicquid inclusit examinat, partemque socio tribuit: coeunt enim ore, cancrorum more & locustarum. Quem verò in Medicina usum sortiuntur, nequeo ex scriptoribus vel Empyricis ullis, quibus vel ignoti Squillæ vel despecti videntur, recensere. Id tamen constat, mense Aprili & Majo, nihil ad pisces inescandos utilius haberi posse.

Locusta piscem imitatur. Colorem habet pallentem cum virore. *Scorpionum* palustrium tria vidit, atq; habuit genera *Moufetus*. Primus nigricabat nonnihil, reliqui arenam candicantem referebant.

Notonecta non ventre ut alia, sed spinâ innatant. Horum aliis oculi, scapulæ corpusque nigricant, aliis virescunt, aliis pyropum, aliis picem referunt. Raro duos eiusdem videris coloris.

Cicada fluviales, & ventris latitudine & pedibus natant, utrinque ternos habent, postremi longissimi sunt. Hoc à terrestrib. differunt, quod capite sunt magis exerto, & cervicis aliquid habere videantur.

Anthreno fuscum ubique corpus, oculis piceis exceptis.

Forficula idem ferè color, sed magis faturus; carere oculis videtur, sed intrus conditis cernit atq; dijudicat objecta.

Lacerta varii coloris est, & piscatorum gaudet intuitu. Circa rupes Britannicas non infrequens, ubi piscibus insidiatur.

Corculus cordis effigiem, pedibus capiteque demptis, scitè exprimit. Ocellos habet perexiguos & nigros; tibias sex concolores, duob. digitis instructos.

†

ARTICULUS II.

De Musca aquatica, Cantharide, Scarabeo, Tipula, Attelabo Arachnoide, & Ligniperda.

DE *Musca aquatica* ita Rondeletius. *Rondel. de fluvial. c. 40.* Muscas volantes, in aquæ extremitate sæpè vidimus æstate. Oculi sunt magnis pro corporis magnitudine, dorso rotundo, ventre plano, senos habent pedes, posteriores majores ad corpus in aqua impellendum. Inter natandum geminas alas extendunt. Quare & in aëre volare, & in aqua natare possunt. Natant ventre in cælum converso, contrario situ volant. Vtrumque per vices faciunt. Venter lineis nigris & viridib. distinguitur, his pisces insidiantur.

Vide verò quæ de iis in Muscis diximus.

Cantharides, in paludib. circa lacum *Aldrov. H. Inf. l. 7, c. 1.* prope Bononiam, reperiuntur, quæ per superficiem (placet hæc & sequentia verbis Aldrovandi describere) aquæ modo irrequieto huc illuc circa eundem ferè semper locum mira celeritate se traiciunt: nec in summo tantum, sed etiam profundius feruntur. Magnitudine, & forma Cimices referunt. Cruscula sena habent subruffa. Vaginæ è nigro virides, præsertim ad solem, & splendentes alas tegunt sed non penitus: ad caudam n. alarum extremitas prominet, quæ cum in aqua celeriter feruntur ut solent, mirabili candore, splendoreque conspicuo argentum vivū, quodammodo refert: Vnde, & *Pygolampides* si quis appellat, nomen ipsorum naturæ conveniens posuerit. In aërem si prorepserint, volare etiam possunt. Icon ear. hæc est. Cum de *Scarabæis* ageremus, diximus etiam aquaticos dari. Eos audio esse majusculos corpore lato, compressoq; & à Germanis *Wassergugen* appellari, & in quatumvis aquarum fundis reptare. Sed videre eos mihi necdum licuit. Observavi verò Insectulum quod-

piam; vel ex Scarabæorum, vel ex Cantharidum genere: Rustici violam aquaticam dicunt. Cantharide minor est, forma oblongiori, angustiorque utrinque in acutum desinens, aterrimo splendens colore duas juxta rictum appendices breves habens, seu cornicula, senos pedes colore ferrugineo. Observavi & aliud Scarabæiaquatici genus, Scarabæo stercoreario minori per omnia simile, nigerrimum, coleopteron, gressu, cursu, celerrimum, saliens etiam dorso impositum, maximo nisu in aëra se vibrans, subsultim in ventrem se convertit: pedes habet inæqualis magnitudinis: priores breviculi ad gradiendum tantum apti sunt, duo postremi, cum ad natandum servire debeant remigum loco, multo sunt longiores: aliis verò illis communibus, æqualis pedum omnium est magnitudo. Huius icon postea dabitur una cum Tipulis. Inveni & aliud in horti publici vasis aqueis, in quibus plantæ aquaticæ conservantur. Insectum è Scarabæorum genere, superiori in eo plurimum differens, quod anteriores pedes haberet duplicis usus, nimirum ad natandum & gradiendum. Sagacissima enim natura latissimos eos fecit in medio, haud aliter, ac avium aquaticarum pedes sunt, & ne latitudo (rotunda, ac cava) ad ingressum non esset inutilis, eosdem in extremo rursus fecit exiles, robustos tamen & hamatos, ut eis unà cum duobus subsequenteribus, qui contigui sunt, ac æque longi, ea carentes latitudine, ad progrediendum uti posset. Postremi pedes duplò sunt longiores, in extremo velut in pinnam molliusculam desinunt, in medio ventris siti, longè à primis, qui sunt in pectore. Horum quoque duplex est usus, ad natandum, seu potius ad natatum regendum, tanquam pinna aliqua, aut cauda, & cum cubat in dorsum, (apricatur enim libenter, & apricantem ego cepi) ad insiliendum. Salit enim cum in dorsum cubat, iis sese ad saltum à terra elevans. Cum cubat in ventrem, vel omnib. pedib. insistit, hosce posteriores tanquam ad

incessum inutiles per terram trahit. Coleopteron est hoc insectum vaginatum teetum durissima, ventre quoque durissimo, ac propè osseo, color ejus ex atro ad castaneum nonnihil vergit. Antennas à lateribus capitis erigit adeo exiles, ut visum pene fugiant, castanei coloris. In summa elegans animal est.

Tipularum, quæ etiam *Macropedii*, *Pedones*, & *Gruinæ* à pedum longitudine, *Moufetus* quatuor, *Aldrovandus* duas observavit differentias.

Prima Moufeti species est tibiis longissimis araneo sylvestri similis, corpore ferè ovali, cinereo albicante, alis argenteis, oculis nigerrimis prominentibus, antennulis duabus brevissimis, cauda mucronata: volat subinde (ut struthiocamelus) quasi gradiendo: aliquando tamen in aëre volat, sed nec longè nec diu. Lucis adeo est appetens, ut lucernæ amore sæpè conflagret: autumnus in pascuis & pratis frequens cernitur. Sed hæc de mare. *Fœmina conformis* videtur, sed paulo nigrior, & caudæ mucronem quasi demorsum obtinet. Has Angli, Schepherds vocant: id est opiliones: quia ubi oves vescuntur ibi sæpius apparent. *Secunda* Tipula caput magis habet, oculos prominentiores, antennis quatuor exiles, corpus luteo nigroque colore varium, alas obscuriores. *Tertia* ferè similis, sed corpus totum luteum 6. vel 7. maculæ nigræ magis adornant; habet item tam mas quam fœmina caudam trifurcatam. *Quarta* species rara & perelegans videtur, capite & maxime ore furcato, scapulis turgidis, brevioribus pedibus, corpore duplo cæteris crassiore, dorso nigricante, ventre & lateribus croceis, cauda mucronata & nigra. In sepibus versatur æstate, rarius in campis reperitur. Coeunt dictæ tipulæ averfis caudis, atque ita volant & recurvantur tamen quandoque velut in complexus. Aldrovandus binæ Tipularum genera observavit. Prius in aqua stagnante scrobis, foveæ, cui cannabim macerandam immergunt rustici Bononienses, quæ ab eo usu Maceratolo vocatur, inven-

tum,

Aldrov. H. Inf. l. 6. c. 1. tum, longum erat integrum palmum, colore fusco. Attelabo sive locustæ apteræ non absimile, nisi quadrupes fuisset. Antennas binas, sed articulas, propè medium, extremo nonnihil deorsum reflexas, ac hamatas unico anicularum unguiculis simili, quibus obvia apprehendit, altera nempe articulo reliquæ antennarum longitudine annexas. Capitulum exiguum ante exigua appendice, velut corniculo acuto armatum, figura fere trigona, ocellis utrimque eminentibus atris, ac splendidis immobilibus instructum. Alarum est pennis quaternis longis, & angustis, subtilissimis. Caudæ loco appendices binas longissimas filamentorum instar, statim ab ano dispartitas gestabat. Pedes quaternos, singulos tribus articulationibus distinctos, nempe ob longitudinem, sed imbecillimos, quales ferè Araneis sunt, anteriore corporis parte, pectore locatos. Unde cum in aquis degant, Belgæ & Germani, ut audio suo idiomate *Water-spinnen* vocant, i. e. araneas aquaticas, Collū à capite subest oblongiusculū, quod à ventre paulum latiore excipitur, & ipso tandem in acumen paulatim extenuatō. Dorsum ei erat planum, quod alitègitur, ac ferruginei coloris. Venter supinè utrimq; in sulcum conspicitur exsculptus, prominente medio tereti, seu cauliculo herbæ cuiusdam, ut polygoni sceminae internodiis, ac geniculis quinque quos annulos vocant, secto. Horum singulorum interstitiis macula, seu punctum nigrum conspicitur. Cum itaque quadrupes sit hæc Tipula, ab ea quam se pedem Festus esse dicebat, plurimum differt. Sed & hanc observavit. Mira corporis levitate, & pedum agilitate aquis quoque inambulat, oblongiusculum, & angustum, sed priore multò minus, & multis ab illa partibus discrepans. Sepes est nec alarum, nigrum toto corpore, sine cauda, sed antennas exiguas, veluti filamenta subtilissima ante gerens, quibus etiam ingreditur nonnunquam. Est, & aliud genus inter hanc, & maiorem medium Vere, ut Aprili aquis supernatans, ac repens, corpo-

ris figura maiori planè simili, sed & multò minus, oblonga caudæ appendice carens, & maculis in ventre, quarum loco in mediis alis nigris albidam terete gerit.

Attelabum arachnoidem nominat *Aldrovandus* insectum quoddam, *Aranei* speciem ferens, sed sex tantum pedibus dotatum, colore cinereo, ac vulvæ, seu fundi lutosi (in quo sese occultit, aut summa superficie eius sedet, aliquādo reptans, nonnunquam natans) adeò simili, ut nisi lynceis oculis data opera diligentissimè intuenti eum deprehendere, aut observare non liceat. Rictu fere est Locustæ, ocellis utrinque altè satis extantibus, cætero corporis habitu non male araneum referens, alvo tota annulis plurib; secta, parte prona compressa, supina nonnihil rotunda, ita ut mediam quandam formam inter Araneum, & Attelabum, seu locustam apteram brevem habeat.

Ligniperdam aquaticam non videtur *Aristoteles* agnovisse. Etenim festucas; lignave colligere eam scribit, quibus sese induat, atque cum post iis spoliatur, emori, cum eiusmodi animal, quod *Ligniperdam* aquaticam nominavit, spoliatur suis festucis, quæ variis ex partibus herbarum constant, minimè moriatur, sed subinde novas festucas recolligat, in quarum vertice exiguum ligni, at non cuiuslibet, sed quod levitate sua aquis supernatare cognoscit portiunculam supra oervicem suam, ne mergatur, immiscere novit: alioqui à terrestri nihil vel parum admodum differt. *Bellonius Phrygantium* vocare videtur, & sic de eo scribit; *Phrygantium* fluviatile æque, ac marinum dejectamentum, Galli Charree appellant, quod cinereum excrementis sit persimile. Pisciculus est, aut potius vermiculus, quo piscatores utuntur pro esca: sic appellatus, quod *phrygana*, id est, fremiasive festucas, sive thecæ, aut tegumenti lateribus, filo tanquam araneæ ab eius ore dependente (novit enim nere ut aranea) agglutinans circumponat, ex quibus auget cens, casam ampliolem sibi costruit. In quo pinnoterem imitatur:

tur: nisi pinniores sibi ipsi domum facere nescirent. Senos utrinque pedes habet, quibus in aquæ etiam rapidissimæ rivulis incedit: nare etiam nescit. Estque animal tenue, oblongum parvæ Erucæ simile, quem avidissime appetunt Truttæ. Est enim profluentibus aquis, ac torrentibus frequens. Eo etiam pisciculi, si sua theca, seu involucri nudetur, affatim capiuntur. Chrysippus Philosophus, inquit Plinius, tradit, Phrygianum alligatum remedio esse quartanis: quod autem esset id animal, nec ipse descripsit, nec nos invenimus, qui novisset.

Quid de eo sentiat Gesnerus, vide apud eum & Aldrovandum.

CAPUT II.

De Insectis aquaticis multipedibus.

Insecta aquatica polypoda sunt *Tinea*, *Pulex marinus*, *Pediculus marinus*, *Asilus aquaticus*, *Scolopendra marina*, & *vermes in tubulis delitescentes*.

Aldr. Hist. Inf. l. 7. c. 2. *Tinea* vermes sunt perparvi, & quia convolvi solent, minores aliquando, colore albo, *pedib.* plurimis per totius corporis alveum contiguis, & molliorib. *Cauda* oblonga in alveum definit. *Oculi* sunt perexigua puncta alba, cum centro longe minutissimo. Reperiuntur in fontibus bonis & frigidis; Martio præsertim mense. In terra propter pedum seu molliem seu multitudinem (nam & ab ore veluti pedes prominent) progredi nequeunt: in aquis, corpore in latus alterum inclinato currunt; & nisi fallor, retrorsum quoque incedunt. Cum aqua epotæ ventrem inflant, & largo haustu vini pelluntur. Forte & therebintinæ, oleo, butyro, lacti & sero cederent. Gesnerus Galis easdem cum Scrofulis, quas Agrovellas vel Escroelles vocant esse putat. Multipedes sane faciunt, corpusculo brevi, cauda reflexa, inveniri que in fluviis, puteis & fontibus.

Arist. Hist. Anim. l. 4. c. 10. *Pulex marinus*, qui Aristoteli *ψύλλον*, Rondeletio est tenui crusta intecta bestiola, quæ facie homines

ridiculos pictos, aliis partib. locustas *Rond. de Piscib. l. 18. c. 27.* repræsentat: & tam parva, ut particula corporis nisi ab oculato, discerni non possit. Gignuntur, inquit, in profundo mari tanta fecunditate, ut escam ex pisce confectam, si diu in imo manserit, totam corrodant. Aldrovandus hunc inter crustata refert. Niphus cum Scolopendra marina confundit. Kiranides minimum animal, quo piscatores utantur, esse dicit: salireque per littus. Moufetus *Monf. de Inf. 2. c. 39.* Afellum marinum vocat, & sic describit. *Pulex* sive Afellus marinus squillam molliorem refert, nisi quod quatuor tantum pedibus (pace Gesneri dixerim) donatur, & frequentibus longisque saltibus se liberat, à numero pedum. Afellus dicitur à saltu, Aristotelis *pulex*: à dorso gibboso, Scrofula nuncupatur: color illi lividus cum nigredine. Longitudo fluviatilium digitum transversum: latitudo, semidigitum non superat: marinorum maior dimensio, qui litore refluyente, & in aquis dulcibus sæpe conspicitur. Venatoribus item spectatoribusque mirum agilitatis præbet exemplum.

Hunc cum Psyllio herba decoctū, *Aldrov. H. Inf. l. 7. c. 7.* & de collo suspensum rigorem tertianarum fugare; cum aqua marina aspersos, pulices pellere; tres in lapide psorite, qui & porus, sculptos, sub calamo viridi manentes, cum radice herbæ psyllii reclusos, contra morbum comitialem, amuletū esse scribit Kiranides. Meminisse eorundem videtur Plinius, cum dicit. *Adeo nihil non gignitur in mari, ut Cauponarum etiam æstiva animalia, pernici molesta saltu, aut quæ capillis maximè calat, existant: & circumglobata esca sæpe extrahuntur: quæ causa somnum piscium in mari noctibus infestare existimatur.*

Pediculus, qui Aristot. *ψύλλον*, *Rondel. de Piscib. l. 18. c. 28.* duplex ex Rondeletii sententia est. *Vnus* qui in mari, quod est à Cyrene ad Ægyptum circa Delphinum est: qui omnium pinguiissimus pabuli copia evadit, quæ à Delphin. suppeditatur. *Alter* est, quem hic depinximus, maioris fabæ magnitud. & latitudine, scarabæo terrestri similis, corpus ex aliquor

aliquot tabellis, veluti locustæ vel squillæ cauda, constat: ante os duo cornua brevia habet: utrinque pedes multos, incurvos, in acutum desinētes. Piscibus ita hæret ut eripi non possit. Sugit ut hirudo, nec prius abscedit, quam tabidum & exsuccum piscem reddiderit. Reperitur cervici mugilum, luporum, & saxatiliū piscium affixus. Aristotelis esse demonstrat ibidem. Belonius perperam Asilum seu Oestrum vocat. Octo utrinque pedes habere, octonis tabellis *in tergore* locricari; priorum pedum ungues ad caput, posteriorum ad pedes converti; *oculos* parvos, nigros, & aliquanto eminentes habere; Erythrinis etiam dentalibus ac fargis vesci; in orbem se contrahere; prægnantem denique plerumque inveniri, addit. Est & aliud animalculum marinum, cuius hic iconem appono. *Ἐγπίλι* quoque Numenii huc spectat, littoralis vermis & fossilis, longis pedibus cōstitans, repens & inescandis piscibus idoneus.

Asilus marinus, quem Oestrum marinum veteres à naturæ similitudine, quæ ei cum terrestri communis vocant, Ligures *Prusam* pro ore tubulum seu fistulam habet, pro corporis ratione longam. Utrinque sitæ sunt veluti manus duæ quæ ad os flectuntur, sequitur alvus cum incisuris, cui affixi sunt sex pedes, duo qui in extremâ alvæ sunt, crassiores sunt & longiores, qui sequuntur utrinque locati, paulo minores, reliqui duo, qui magis in lateribus sunt, omnium minimi. Ore sive fistula, scorpionis terrestris caudæ, pedibus, ejusdem brachiis similis est, alvæ & magnitudine, araneo. Ut Polypi acetabulis, ita hic ore adhæret parti molliusculæ & pingui sub pinna ita tenaciter, ut avelli integer non possit. Sanguinem exugit hirudinum ritu, usque dum præ plenitudine decidat & moriatur. Cur in summo tantum æstu, & Caniculæ tempore pisces dictos infestet, id in causa esse puto, quod æstate tantum nascatur, autumno pereat. Cur sub pinna hæreat,

in causa est partis mollitudo, pinguitudo, & sanguinis copia. Reliquo corpore Thynni cute quidem lævi integuntur, sed illi subsunt squamæ duriores.

Quantum ad *Scolopendras*, Aristoteles, *Ἐγπίλιος τὸ εἶδος τοῖς χερσὶν αἰσίου*, 2. c. 14. *aspectu terrenis similis* esse dicit; in saxosis locis gigni, colore magis rubro esse, pedum numero terrestres superare, gracilitatem crurum si excipias, serpentum more non in altis gurgitibus nasci, adjicit.

Rondeletius, *duas* species proponit. Prior minor est, colore plane rubro, dodrantali magnitudine, in saxosis locis degit. A capite ad caudam pedes habet plurimos: in flexus & volumina sese contorquet: nunc longior, nunc brevior, nunc gracilior, nunc crassior efficitur. *Aliera* est superiore multò longior, utpotè quæ ad cubiti longitudinem accedat, tenuior, colore ad candidum vergente. A capite ad caudam pedes utrinque habet plurimos, veluti superior. Aldrovandus addit ex Gesnero tertiam, colore miniacco. Gesnerus videtur quædam ex his in dubium vocare, dum Aristotelis descriptionem attendit. Minores terrestribus facere Aristotelem: Brasavolum verò ad se misisse duos pollices longam, apud se vix duos digitos æquare: Rondeletii longè majores esse, Marcellum Virgilium terrestribus longiores facere. Quòd forma attendatur, longè aliam caudæ capitisque in terrestribus vidisse. Ut sit, in lacertorum marinorum, ut & acuum ventriculo sæpè eas reperit Rondeletius: ita ut exinde, iisdem hos pisces vesci colligi possit: & quia in alto mari vivant, in littoribus aut littorum saxi easdem vivere, falsum sit. Appetere nidorulenta; hamum devoratum simul cum interaneis deicere, dejecto, ista iterum intro recipere; piscatoribus quòd si hamum attigerint, nullus piscis ad hamum post accedat, infestam esse; attractam adurere; naturæ ipsius est. Mousetus in limosis stagnis, & ubi ostreae faciuntur, latere scripsit. Nonnus

Arist. H. A. 2. c. 14.

Rondelet. de Insect. 6. 3.

Rondelet. de Insect. 6. 8.

Mouset. 2. c. 39.

psyllothrum ex thuris, atramenti futorij ana unc. ij. scolopendr. unc. iij. tritis, & cum calcis pulvere commistis commendat.

Rondel. de
Insect. c. 5.

De Vermibus in tubulis nascentibus, ita Rondeletius. Nascuntur in saxis marinis & super concharum vetustarum testas, tubuli vel Siphunculi testacei, rotundi, asperi, candidi; intus lævissimi, quorum alii recti sunt, alii contorti & replicati. In his procreantur & vivunt vermes, qui foras se exerunt hauriendæ aquæ gratia. Hi colore, substantia, scolopendræ rubræ similes sunt, figura & magnitudine non nihil differunt: longissimi enim digiti magnitudinem non excedunt. Pars posterior folij myrtei modo in acutum definit. Priore parte utrinque pedes habent, veluti scolopendræ, unde fistula prominēt in extremo obtusa tubæ modo, & perforata, qualem in asilo marino depingemus, eā aquam trahit. Horum vermiculorum testa Pharmacopæi nostri utuntur, in compositione unguenti citrini pro dentali. Huic similem testam etiam dentale vocant, quo in eodem unguento utuntur. Hujusmodi aliquot picturæ superiora asperimus.

TITULUS II.

De Insectis aquaticis apodibus.

CAPUT I.

De Hirudine.

Absoluta insectorum aquaticorum pedatorum historia, ad apoda progredimur. Hæc vero intra *Hirudines*, *Stellas*, *Hippocampum*, *Vivam marinam*, *Oripem*, *Lumbricum marinum*, *Setam*, *Vermem Indicum*, & alios consistunt.

Aldrov. H.
Inf. 7. c. 11.
Mouset. 2.
c. 41.

Nomen,

Hirudinem quidam ab hærendo, quod corporibus hæreat, alii ab hauriendo. Latinis dictam esse putant. Dicitur Latinis & *Sanguisuga*.


Græci βδέλλα, & quidem ὁ δαπὼν, λιμναία, dixerunt, sine dubio, ἀ βδάλλω, βδέλλω, ἀ μέλω, ἐκπέζω, ἐκμύζω. Helychio dicuntur δειμβλεῖς & βλεῖται, & δειλακῆς, secundum Elienses. Eidem βλεῖται βδέλλα est.

Duorum est generum. *Marina* nempe, & *Lacustris*. Illa, Rondeletio describente, digiti est magnitudine, cervice graciliore, cauda paulò crassiore. Os & caudæ extremum Polyporum acetabulis similia sunt, ut eorum adhæssione sese trahant. Corpus insectorum modo ex multis annulis circulisve constat, sed duriore cute quam palustres, quod in causa est, cur non ita in globum se contrahere, nec ita se colligere possint, sed caudam tantum & caput proferunt, & retrahunt. Interna omnia continuo ductu producta & indistincta. In luto vivit, virus olet, cibo idonea non est: pisces tamen lutosi & litorales ea vescuntur. In oleo antiquissimo decocta aurium dolorem sedat. In oleo amygdalino, vel Chamæmelino, dolorem hæmorrhoidum. In vino, vulneribus nervorum & convulsionibus utilis est. Ustæ alopecias cum acetato curant.

Lacustres circulis velut inter se colligatis constant, quorum opera quandoque in globum contrahuntur. Osibus & pinnis carent. Os illis trianguli instar, id vulnus infictum ostendit. Villanovanus fistulam in ore more culicis tribuit. Alii in majoribus acutius, in minoribus rotundum; in omnibus foramen in medio exile, observavere. Ab ore ad alvum continuus est meatus. In mortuis longitudo circiter digiti. Lineis & punctis nigris notantur omnes, reliquo colore variant. Varias differentias fortiuntur. Sunt quæ caput magnum habent, coloris rufi, variis filamentis distinctæ, lanuginosæ, & venenatæ. Sunt & aliæ tenuiores, capite brevi, ventre rubro, quæ in aquis puris habitant. Albertus Nigrarum & planarum; nec non quæ in dorso virgulas rubeas & aliquantulum rugatas habent &c. meminit. Apud Helvetios *Minores* sunt nigræ, *maiores* subvirides, striis per longitudinem subflavis

Insecta Varia ad loca sua referenda.


Apis fulv. nigrae
nid9



Papiliones



Maximi



Papil. exiguus




Musca




Phalangium
2




Tarantula
1




Folliculus Indici9




Vermes in tubulis delitescentes




Physali
1



Mouf.
2



Cincindel



Teredines



*Vermis fari-
nae*



Eruc.




Eruc.






Eruc.






Stello



Mar.














Lumbrici Aquatici seu Marini . Meerwürm .



Lampret .



Stellæ Marinæ . Meerstern Aldr .



Havis aut ruffis, in quibus puncta aliquot nigricant. Visæ Venetiis *virides*, maculis hinc inde nigris respersæ. In fluentibus aquis, *albas*, perexiguas, ore utrinque in circulum lato, sed altero duplo latiore, quales vel piscibus nonnunquam adhærent, invenies. In Mauritaniæ quodam flumine septenum cubitorum, quæ per gulam perforatam respirent, inveniri, Strabo prodidit. In jecinoribus boum similem hirudini lacustri vermem, alij. Mousfetis in *perforatas*, quas Europa non novit, & *imperfornatas* distinguit.

Ad *Naturam* earum pertinet, in paludosis & turbidis aquis ut plurimum, in saxosis, arenosis & clavis, raro inveniri: ex putri nasci, nec scitur an coeant: autumno condi, per hyemem latitare, circa Calendas Maij, aut paulò antè, & quidem non nisi tepido aëre apparere. Eadem, sanguine victitant. Ubi corpori adhærescere, non citius avelluntur, quàm expletæ decidunt: imò quantò magis trahuntur, tantò fortius insident, donec rumpantur. Caudæ & ori innitentes moventur. Cannæ inclusæ retrorsum exeunt: & quia os valdè acuerere, & in tenuitatem se extendere possunt, per angustissima etiam elabuntur.

Vfus Hircinum. Magni sunt in evacuando sanguine in Medicinâ usus. Fugiendæ rufæ, magnorum capitum, virides, nigrae, & quæ in limosis nimis agunt. Laudantur, quæ ex aquis fluentibus rufæ rotundæ, colore jecinoris, parvorum capitum. Præstantissimæ putantur, quibus venter rubet, dorsum viret, præsertim si ex aquis fluentibus fuerint. In Germania præferuntur majores, ex nigro subvirides, striis per longitudinem ruffis, in quibus maculae nigrae sunt. Applicantur in vulneribus venenatis, capitis, colli, jecoris, lienis, genitalium membrorum, &c. morbis.

De præparatione, & modo utendi, abundè apud Medicos invenies.

Nierem. H. E. 13. c. 19. Huc spectat, *Lumates* molestissima hirudinis species, inter herbas

& montium arbores vivens, semidigitum longa, & impensè tenuis, Adhærent iter agentibus, subeuntque quosvis humani corporis meatus, etiam angustos & foedos, neque prius discedunt, quàm humano satientur sanguine: tunc enim spontè cadunt, ac minus infestant Sole vigente. Remedium est, arundinibus quibusdam præacutis eas avellere, aut sese tueri intra aquas, confidendo saxis, si quæ fortè adsunt, aut pyram construere, atque interponere ignem.

CAP. II.

De Stellis.

Datum Insecto huic *Stella* nomen, quod stellas imitetur. Græcis est *ἀστὴρ*, Myrepso *ἀστὴρ*, modernis Græcis *στέλλα*, ut Gillius notavit; vel potius, ut Rondeletio visum, *συνὸς*, quod pali lignei infixi modo, radios habeant. Sylvaticus, Sydus marinum vocat; Cremonensis, Magiarrum marinum.

Os ipsius versus caudam, in medio radiorum situm, inque gyrum quinque digitos ostendere, author est Bellonius: Excrementorum nullum exitum, & ore excerni quæ supervacuæ sunt, Rondeletius. Duriore corio sive callo omnes integuntur; idè Aristoteles cum aliis testaceis recensuit.

In marinis littoribus sæpè conspicimus: vaganturque in mari, ut polypi, brachia deducendo, nunc antegradendo, nunc in orbem convolvendo, & suctu acerabulorum, Echini modo, lapidibus adhærent. Conchas aggrediuntur & devorant. Quinque in dissecto ventre cochleas invenisse scribit Rondeletius, tres integras, duas cum testis suis confectas. Adèd fervida ejus natura est, ut quicquid sumferit, id licet illico ab ea extrahatur, biscoctum, (*δισκοκτόν*) appareat. Plinius dicit, tam igneum fervorem ei esse tradi, ut omnia in mari contacta adurat, omnem cibum statim peragat. Extra aquam

Aldron. H. Inf. 6. c. 18. Nomen.

Descriptio

Rondelet. de Insect. c. 10.

Natura:

Arist. H. A. 5. c. 15.

Plin. H. N. 9. c. 6.

corpescere, prodidit Bellonius: inaquam immerfas, & supinas instratas, promuscides in extrema plusquam quinq; millia exerere cernet, & in pronam partem moveri.

usus.

Esse quasdam in *cibis*, ex Bellonio colligimus. In *Medicina*, Hippocrates, nigras cum brassica & vino odorato adversus uteri strangulationem propinat. Apud Myrepsum inter suffimenta contra epilepsiam recensetur. Inter psilothra à Galeno numerari, certum: & Gesnerus, carunculam, in quibusdam edulem esse scribit, reliquam substantiam pilos deperdere. Lavem, ad peritonæi rupturam, cum ononide, felici cum successe applicari posse existimat.

Rondel. de
Insect. v. 14.

Differetis.

Differentias & Genera si attendamus, sunt plura. Sunt parvæ, magnæ: sunt, quæ flavescunt, nigricant, cinerascunt: sunt aculeatæ, læves, longæ, brevès. Optimè vero, in eas quæ quinque radiorum sunt, & quæ plurium distinguuntur. Illæ *Cartilagineæ*, *Testaceæ*, *Lævès*, *Pectinatae*, *Echinatæ*, *Arborescentes*, *Solares*.

Cartilagineæ pronè & supinè exhibetur. Supinè partis marginibus puniceis, reliqua pars intima, & quæ hisce marginibus continetur, sanguineis maculis & albis, veluti in quodam marmoris genere, conspersa. Pronæ vero partis margines admodum sunt sanguineæ: quinque in mediorimæ, in singulas partes abeuntes, maculis autem cœruleis, ea pars, quæ margines undique contingit, insignitur: hæcæ aliæ sequuntur propè medium maculæ rubicundæ.

Testacea dicitur, non quod verè testacea sit (nam exsiccata, cum cortice teri manibus, quamvis agrè, potest) sed quod duritie corticis, magis quam aliæ stellæ, quas unquam observavi, ad testacea accedat. Hæc cortice candicat, spithamam longa quoquo versum dimensa, nempe ab uno radio ad alterum, qui è regione est.

Distant autem extremitates cuiusque radii à proximis mediam spithamam aut paulo amplius. Posset

etiam non immeritò tuberosa, & verrucaria nuncupari, nam superiori parte in singulis radiis tubera, & verrucas habet.

Lævis est duplex: *Rondeletij* nempe, aculeis enim omni ex parte, atque asperitate caret. Radii longi sunt rotundi, flexibiles, murium caudis persimiles: eorum integumentum cortici serpentum simile est: & ob nigrarum albarumque macularum varietatem, spectaculum jucundum. In medio corporis trunco circulus cernitur, intra circumferentiam quinque maculis rotundis: & inter has stellulæ pictura distinctus, à cujus circumferentia quinque radii exoriantur. Oris compositione à cæteris non differt, nec victus ratione. Brachiorum longitudine, & vario flexu celerrimè natat. Et *Aldrovandi* quæ duas ponit. *Prima* est pronæ parte & supina colore Lapidis lazuli: in medio punctulis nigris, & circulis aureis novem radiorum, ac totius corporis ea magnitudo est, quæ cernitur. Prona pars variis colorib. delineata, cujus medium, & colorem, & figuram pentaphylli æmulatur.

Secunda multò præscripta minor, undique colore ferruginea, sed nigris aspersa maculis mediam spithamam, aut amplius longa.

Pectinatarum quinque sunt species. *Prima* *Rondeletij*, primæ ejusdem similis, iis demptis, quæ sequuntur. Radii circa rotundum corpus dispositi, in exortu suo angulum acutum non constituunt, sed obtusum. Aculei, quibus latera muniuntur, rari, recti, pectinatim dispositi, unde pectinatam stellam appellavit *Rondeletius*.

In totius corporis centro stellula quædam expressa est, à cujus ambitu lineæ quinque per medium radiorum ad extremum usque protensæ sunt, radii initio satis lati sunt. Rara est hæc species, ore, dentibus, moribus, facultatibus aliis similis est. *Secunda* cujus figura exprimitur (folio 748.) marginibus albis pectinatim non rectè, sed obliquè dispositis;

lis: interius sanguineis undique conferta maculis in centro stellulam habet admodum rubram, sed radiis constantem, tota pedem longa est. *Tertia* nulla elegantior, ejusdem cum prædicta magnitudine, colore, ac tuberculis spinosis admodum varia. Nam in medio est os, instar echini, quinque denticulis vix conspicuis constitutum, hoc continet stellula septem radiorum, quæ interiori parte nigra fere est, exteriori vero cærulea, hanc circulus ambit albus, seu area alba, quam alia ruffa, seu carnea, hunc deinceps circulus circumdat ex undecim tuberculis constans in supremâ parte acutis. Singuli autem radii tres habent tuberculorum ordines singulos viginquique, aut triginta tuberculis constantes.

Quarta est haud dispari cum præcedenti longitudine, radiis albo cæruleis, marginibus pectinatis ferrugineis: in medio stellula est, ex sex punctatis radiis constituta.

Quinta quæ quinque radiis inæqualibus & hirsutis constat.

Echinata est corpore exquisitè rotundo, parvoque constat, & radiis quinque, sed brevioribus, unde fit, ut minor sit cæteris. Illi è parvo circulo, in quo crucis figura delineata est, veluti è centro, exoriuntur tenues frequentissimis aculeis horrentes, quâde causa echinatam Rondeletius nominavit, in laterib. dispositis. Radiorum flexuoso motu, serpentum ritu, repit hæc stella, & in sicco posita eos movere nequaquam desinit, quousque in partes disjecerit, quæ separatæ etiam moventur per flexus: ut Vermium partes, & Lacerorum caudæ abscissæ. Os habet cetratum.

Rondelet. de
Insect. p. 122.

Reticulata est duplex. *Rondeletij* & *Aldrovandi*. Illa à retis sive Cancellorum figura reticulatam, sive cancellatam nuncupamus, & quia inter distinctiones, retibus vel cancellis similes extant tubercula quædam rotunda, tuberosa etiam vocari potest. Inter majores stellas reponenda est,

brachia enim ad pedalem longitudinem perveniunt, crassiora sunt aliarum stellarum radiis. Aculeis parvis utrinque eadem munita sunt. Os habet cæterarum modo. Eleganti illa & reticulata distinctione spectabilis est, & inter anathemata collocanda. Hæc tuberculis rotundis cæruleis gemmæ Turcoiæ æmulis, radiorum marginibus hirsutis & pectinatis: quilibet radius supina parte apparet conus pinus idæ oblongior. Prona autem parte fertis, tum luteis, tum cæruleis. Singuli radii habent cauliculum tenuem per medium transeuntem.

Arborefcens à frondium & ramorum multitudine. Hujusmodi duas vidit Rondelitus. Unam permagnam apud Guilhelum Pelicerum Mospeliensem Episcopum, ad Lerinum iselam captam, alteram ex Italia ad ipsum delatam. Ab aliis omnibus stellis plurimum differt. Radios quinque, sive truncos habet, in medio oscum quinque appendicibus, quæ multis parvis dentibus horrent, pars ea depressa est, & submissa, ambitus tumet, in quolibet radiorum intervallo foramen, seu rima conspicitur. Quilibet radius statim in binos finiditur, hi rursus in binos ramos dividuntur, atq; ita deinceps, quousq; ad tenuissimos, & capillorum tenuitatem referentes deventum sit. A quolibet oris angulo linea albicans prodit, & per omnium ramorum medium producta est, alioqui tota stella nigricat, & tenui, atq; admodum durâ, sed asperâ cute tegitur, ramuli omnes intro flectuntur; quod argumento est hos tanquam cirros ad cibum captandum conditos esse, quibus undiq; dispositis in orbem præda elabi non potest. Id spectaculum aliquando Rondeletius in mari studiosè contemplatus est. Stellam parvo filo alligatam in mare demittebat, in quo expansis ramis natabat, sed prædam aliquam appropinquare sentiens, brachiis omnib. cōtractis amplexabatur urticæ ritu. Rara est hæc stellæ species, & propterea inter anathemata suspèditur.

Solaris Sol marinus Rondeletio, qui solis referat picturam. Differt à stellis quod in his à medio corporis trunco veluti è centro radij enascuntur, in hoc vero ex corporis rotundi circumferentia, breves, minime asperi superiore in parte, sed veluti ex squamis compositi, in lateribus verò parvis aculeis rigentes, albi ad extremum usque gracilescentes. Corpus illud rotundum, in medio rosæ pictæ figuram expressam habet. Ore victu, facultate à stellis non differt.


Aldrov. de Insect. lib. 7. cap. 18. *Stellæ quæ plurimum sunt radiorum, vel sunt septem radiorum, vel decem vel duodecim.*

Septenos quæ habet, parte gibba colo è ferrugineo obscuriore, spinosis, & parvis quibusdam tuberculis scabra, ac inæqualis, radiis in extremo lævi distortionem inflexis, parte concava ochræ ferè dilutum colorem exhibet ad ferrugineum minimum quid tendentem. Extremi laterum, quibus cum medio corpore, tum brachiis juxta eorundem longitudinem sectis committitur, margine crenis, seu denticulis quibusdam albicantibus sunt asperi. Longitudo totius, ac latitudo in peripheriam æqualis est, palmi unius cum dimidio. Singuli verò radij tres propemodum digitos sunt longi, qui longissime à se mutuo palmi unius intervallo diffusi sunt.


Aldrov. lib. 6. De illâ quæ decem brachia habet ita Columna. Nova & perelegans hujus stellæ forma, ab aliis omnibus differens, nec adhuc descripta: nostro littori frequens, ita ut nec ulla retrahantur retia quin ipsis implicata, & simul cum piscibus in foro etiamnum invehatur. Hæc admodum fragilis est, ut viva ne ab rete excipiat potius frangi patitur, ita illi se implexa cirris continet. Non vis ulla in extrahendâ stella est adhibenda, cum radii sint geniculati, atque genicula jungens cartilago sit admodum tenuis, qua de re facillimè genicula dissolvuntur, nec quamvis ra-

dii omnes sint disrupti, emoritur, nisi longo post intervallo. Hujus color subrubens est, forma vero ab aliis stellis dissidere videtur. Hæc enim parvum admodum corpus habet: radios quinque, sed singuli in binos dividuntur, ita ut decem prima facie, videantur: semipedem longos, nec majores huc usque vidi: stellæ diameter pedem æquat. Radij vero omnes geniculis parvis constant, atque singula genicula formam trianguli habent, lineæ quidem secantes nunc in dextram, nunc in sinistram partem conjunguntur, spirarum modo, quæ alternatim angulos oppositos conficiunt. E singulorum vero triangulorum basi, cirri etiam, ut bases quoque, utrinque alternatim producuntur, simili modo geniculati, minimi digiti longitudine, & canthabini fili crassitie, quibus maxime implicatur, graditur, & apprehendit: Horum superiores parum longitudine, sicuti & crassitie alios inferiores ad extremum usque superant. E centro ipsius alij tenues cirri filii etiam crassitie, & eodem modo geniculati, majoris digiti longitudine exeunt, quorum superiores inferioribus minores sunt, atque contrario modo, quo radii majores curvantur, quibus escam apprehendere, atque in os adducere censeo, in quorum umbilico visitur inesse, ex adversa parte corpus conspicitur rotundum, læve molle, cujus interiora propter tenuitatem considerare nequivi: ipsa verò facillimè disjungitur à stella: lævis est tota, sed aspera tactu videtur propter geniculorum, & cirrorum multitudinem, crusta integitur duriuscula, ita ut ossis geniculis, sed non admodum duris, compacta videatur. An splendeat, ut alia noctu, cum vivam domi habere non potuissem, experiri non potui. Hæc Fabius Columna.

Postrema duodecim habet radios, qui quidem singulis singulos habent habent caules cœruleos per medium transeuntes, à quorum utroque latere




Hippocampus. Meerbaan Mouf.



Hippoc. Aldr.

Vua Marina. Meertraubel Aldr.



tere sunt striæ, seu lineæ transversæ, sanguineæ frequentes: in medio quoque circulus ejusdem coloris, undique radorum margines denticulati, coloreque albicante. Tam variæ, & multiplices stellarum formæ conspiciuntur, ut quærendi, & contemplandi nullus sit futurus finis.

CAPUT III.

De Hippocampo & Uva marina.

Aldrou. H. Inf. 6. c. 16. **H**ippocampo, ab ἵππος & κάμψις nomen datum est. Repando enim est corpore, & in arcum se curvante, erucasque cauda maxime refert: reliquo verò corpore, equum imitatur. Marcellus voce ἵππος, magnitudinem denotari putavit. Nonnulli *gallum marinum*, quidam *Salamandram marinam* dixere.

Rondelet. de Inf. c. 9. Ita eum nobis Rondeletius descripsit. Hippocampus toto corpore incisuras habet, dodrantalem magnitudinem non superat, sæpè minor reperitur, pollicis est crassitudine, rostro oblongo, tubuli modo cavo sine scissurâ, ab inferiore ejus parte operculum foramini opponitur, ad claudendum, vel demittitur ad aperiendum: oculos habet rotundos, satis prominentes, in capitis vertice pili erecti sunt, qui adeo tenues sunt, ut non in mortuis & exsiccatis, sed in viventibus tantum Hippocampis, & natantibus appareant, quemadmodum & qui in reliquo sunt corpore. Toto capite, collo graciliore, ventre protuberante, equo valdè similis est.

Post oculos quo in loco in cæteris piscibus branchiæ esse solent, pinulæ duæ articulis similes sunt, maxime ob situm, utrinque unica. Branchiæ vero nullæ sunt, neque testæ neque detectæ, sed supra dictas pinulas duo sunt foramina sursum spectantia. Sub ventre rimulas duas

habet. Ex una alvi excrementa, ex altera ova foras emittuntur. Cauda reliquo corpore tenuior est, quadrata, cū exochis aculeatis, toto etiam est corpore similiter aculeato, veluti ex cartilagineis circulis compacto, ex quibus aculei extant, membranis intermediis, ut nulla caro appareat. Colore est fusco punctis albis notato, ventre albicante. Venter pro corporis ratione satis magnum habet, hepar rubrum, similiter ova rubra, cor exiguum. Caudam quovis modo inflectas, & qualem vivo figuram tribueris, talem mortuus & exsiccatus servat.

Venenatum, sed solo ventre Ael. Ælian. H. Anim. 14. 6. 16. lianus prodidit. Qui ex vino decoctum bibit, primò singulit, mox sicca tussi afficitur. Venter superior intumescit; per nares aquosa pisculenti odoris egeruntur: oculi sanguine suffunduntur, &c. Qui evadunt, aquam, mente capti, summo studio prosequuntur. Remedium, acetum in quo sepia suffocata est, Aëtius ponit. Veneficæ eum in amatoriis usurpant.

Usus eorum singularis in canis rabidi morsu est, ut apud Aelianum habemus. Plinius leporis marini venenum restinguere potos; alligatos Plin. H. N. 32. c. 6. 7. Venerem concitare ait. Galenus, Galen. L. II. simpl. 6. 41. ustos alopecii prodesse scribit. Vementer vermes, si torreantur, & cum aqua absynthii propinentur pellere Rondeletius ex Græco quodam habuit.

De Uva marina ita Aldrovandus, Rondelet. de Insect. c. 25. Aldrou. H. Inf. 7. c. 17. Piscatores nostri, inquit Rondeletius, ova sepiarum racematim compacta à pediculo uno dependentia, earundem atramento asperso Vvam marinam nominat. Est etiam Uva marina zoophyton, diversum sane ab eo, quod nobis depinxit Rondeletius, cujus imaginem, cum de zoophytis agimus, tradituri sumus: de hoc loquitur Plinius cum scribit. Rerum quidem non solum animalium


lium simulachra (mari) inesse, licet intelligere intuentibus uvam, gladium, ferras. Nos verò & hocce egregium aspectu animal Insectum potius, quam alterius cuiuspiam generis Vvarum racemum verè referens in Oceano deprehensum damus depictum, & ad vivum delineatum, ea magnitudine, qua depictum videtur in hac tabula: acinis sanè undiquaque refertissimum, quorum alii cœrulei: alii amethistini: alii ru-


bentes, capite duobus corniculis Li-
macis instar præmunito, movetur
motu progressivo.

Et tantum de Insectis. Si
quid interim scitu dignū ob-
servatum fuerit, addi poterit
imposterum. Quia verò ita

Historiam Animalium
absolvimus,

SOLI DEO ESTO GLORIA, IN
sempiterna secula, Amen.





INDEX

In HISTORIAM NATURALEM

de INSECTIS JOANNIS JONSTONI Med. Doctoris, prior numerus Historicae descriptionis paginam seu locum indicat, posterior Tabulam Iconisui demonstrat.

A.

A Nelytra Bipennia. Pag. 67.
 Detectipennia. p. 8.
 Quadripennia. p. 8.
 membranacea. p. 8.
 farinacea. p. 44.
 Anthrenus. p. 128.
 aquaticus. p. 189.
 Apis, Nomen, p. 8. t. 1. Descriptio, Locus, p. 9. Generatio. p. 10. Victus, Aetas, p. 11. Volatus, Sonus, Odoratus, Auditus, Antipathia, Morbi, p. 12. Ingenium, p. 13. Vfus, p. 14. Differentia, p. 15.
 Apis amphibia. p. 18.
 Aqua mulsa. p. 21.
 Araneus, tab. 18. Nomen, Descriptio, Locus, Victus, Generatio, p. 131. Antipathia, Ingenium, Nocumenta & Remedia, p. 132. Vfus, p. 135. Differentia, p. 133. 135.
 Ascarides, p. 184.
 Afellus, Nomen, Descriptio, Generatio, p. 170. 87. t. 23.
 Afellus arvensis. p. 128.
 Afilus, t. 10. Nomen, Descriptio, Natura, Differentia. p. 77.
 aquaticus. p. 86.
 Attelabus. p. 193.
 arachnoides. p. 191.
 Aurelia Aldrovandi. p. 169. t. 22.
 Axacoulin. p. 177.

B.

Bestiola alata Moufeti. p. 88.
 Blattæ, Nomen, Descriptio, Vfus, Differentia. p. 111. t. 16.
 Bombylius. p. 65.
 Bombycis æmulus Temi Ali dictus. p. 169.
 Bombycum historia. p. 153.
 Bombyx. p. 153. t. 22. 23.
 Bruchus. p. 86. t. 11.
 Buprestis. t. 16. Nomen, Descriptio, Locus, Victus, Venenum, Differentia. p. 106.
 Buprestis Dodonæi vera. p. 89.

C.

Cantharides, Nomen, Descriptio, Locus, Victus, Generatio, p. 102. t. 16. Nocumentum, Differentia. p. 103.
 Cantharides aquatica. p. 189.

Cera, Nomen, p. 25. t. 2. Descriptio, p. 25. Locus, Natura, Differentia. p. 26.
 Chrysalis. p. 65.
 Cicada, Nomen, p. 36. t. 11. 12. 13. Descriptio, p. 36. Locus, Victus, Generatio, p. 37. Aetas, Cantus, p. 38. Natura, Vfus, Differentia. p. 39.
 aquatica. p. 189. t. 12.
 Rondeletii. p. 88.
 Cicindela, Nomen, p. 108. t. 16. Locus, Generatio, p. 108. Vfus, Differentia. p. 109.
 Cimes, Nomen, p. 119. t. 3. Descriptio, Locus, Generatio, p. 119. Fuga, Vfus. p. 120.
 Cimices sylvestres. p. 40. t. 17.
 Genera varia. p. 40. 41.

Congener Tauri volantis Brasil. p. 102. t. 16.
 Corculus. p. 189.
 Cossi. p. 177.
 Coyayhoal. p. 171.
 Crabrones, Nomen, p. 34. t. 1. Descriptio, Locus, p. 34. Victus, Generatio, Antipathia, p. 35. Vfus, p. 36.
 Cucujo. p. 107.
 Cuchipulul. p. 177.
 Culex, Nomen, p. 78. t. 10. Descriptio, Locus, Cibibus, Generatio, Natura, p. 79. Remedia, Vfus, Differentia. p. 80.
 Curculio. p. 169.

E.

Éphéméron musca. p. 78.
 Eruca, Nomen, p. 141. t. 19. 20. 21. Nutrimentum, Generatio, Natura, p. 141. Vfus, Damnum, Remedia. p. 142.
 glabra Moufeti. p. 142. t. 19. 20.
 hirsuta densioris pili Mouf. p. 142. t. 19.
 rarioris pili Mouf. p. 146.
 Eruca Aldrovandi Tabula prima, p. 147. t. 21. secunda, p. 148. t. 21. tertia, p. 149. t. 21. quarta, p. 150. t. 21. quinta, p. 151. t. 21. sexta, p. 152. t. 22.

F.

Forbicina. p. 125. t. 17.
 Forficula. p. 112. t. 16.
 aquatica. p. 189.
 Formica, Nomen, p. 114. t. 17. Descriptio, Locus, Victus, Generatio, Natura & Ingenium, p. 114.

G.

Anti-

INDEX.

Antipathia, p. 116. *Vfus, Damna & Remedia*,
Differentia, p. 117.
 alata, p. 113.
Fucus, *tab. 1. Nomen, Descriptio, Generatio*, p. 28.

G.

Gryllus, *Nomen, Differentia*, p. 87. t. 12.
Gryllotalpa Moufeti. Nomen, Differentia,
 p. 87. t. 12.

H.

Herbivoræ, p. 73.
Hippocampus, p. 199. t. 26.
Hirudo *lacustris*, p. 194. t. 25.
 marina, p. 194. t. 25.
Dolapsect *Tigur*, p. 85.
Humifugæ, p. 73.

I.

Insecta aptera octo pedum, p. 128.
 duodecim & quatuordecim
 pedum, p. 141.
 aquatica, p. 188.
 apoda, p. 194.
 multipeda, p. 192.
 paucipeda, p. 188.
 pedata, p. 188.
Insecta Coleoptera f. Vaginipennia, p. 82.
 Terrestria apoda, p. 174.
 pedata non alata, p. 114.
 paucipeda, p. 114.
 multipeda non alata, p. 170.
Involvulus Plauti, p. 107.
Ips, p. 107.
Julus, p. 172. t. 23.

K.

Kupfferwurm, p. 185.

L.

Lacerta aquatica, p. 189. t. 27.
Lendes, p. 124.
Libellæ, *Aldrovandi: Moufeti*, p. 41. t. 3.
Ligniperda, p. 189.
Limax, p. 186. t. 24.
Locusta aquatica, p. 189. t. 27.
Locusta, *tab. 11. Nomen, Descriptio, Locus, Victus*,
 p. 82. *Generatio, Actiones animales, Vfus*,
 p. 84.
 Aldrovandi, p. 87.
 Moufeti, p. 85.
Lumbrici terrestres, p. 185.
 aquatici, t. 25.

M.

Majalis Scarabæus, p. 99. t. 15.
Mantes Africana, p. 186. t. 11. 12.
 Italica, p. 185.
Mel, *Nomen, Descriptio*, p. 18. *Electio*, p. 19. *Vfus*
 in cibis, p. 20. *in medicina*, p. 21. *Differentia*,
 p. 23.
Meloës Paracelsi, p. 99.
Mulfum, p. 22.
Muscæ in genere, *tab. 9. 10. Nomen, Descriptio*,
 Locus, Victus, Generatio, Sympathia & Antipa-

thia, Ætas, Volatus, Ingenium, p. 67. *Vfus, Dif-*
ferentia, p. 68.

Muscæ Aldrovandi Tabulæ primæ, p. 69. t. 9.
 secundæ, p. 69. t. 9. *tertiæ*, p. 70. t. 9.
Muscæ Moufeti aquaticæ, p. 70. t. 10.

terrestres, p. 73. t. 10.

militares Luciano seg. nob. nides, p. 73.

strutioptera, p. 74.

Erinoptera, p. 74.

Chelidonia, p. 74.

feticaudæ Moufeti, p. 74.

unifetæ, p. 74. t. 10.

bifetæ, p. 74. t. 10.

bipiles, p. 74. t. 10.

tripiles, p. 75. t. 10.

quadripiles, p. 76. t. 10.

Muscæ rariores speciei, p. 76.

scorpiuræ, p. 76. t. 10.

quadripennes, p. 76. t. 10.

Musca Chrysopis dicta, p. 76. t. 10.

Tabanides, p. 77. t. 10.

Muscæ terrestres Moufeti *ζωοφάγοι*, p. 71.
 αζωοφάγοι, p. 73.

Musca aquatica, p. 189.

N.

Notonecra, p. 189. t. 27.

O.

Oestrus, p. 77. t. 9.

Orfodacna, p. 40.

P.

Papiliones in genere, Nomen, Descriptio, Lo-
cus, Victus, Generatio, Natura, p. 44. *Vfus, Dif-*
ferentia, p. 45.

Aldrovandi Tabulæ primæ, p. 46.

 47. t. 5. *secundæ*, p. 47. 48. t. 5.

tertiæ, p. 48. 49. t. 5. *quartæ*,

 p. 49. 50. t. 5. *quintæ*, p. 50. 51.

 t. 5. *sextæ*, p. 51. t. 5. *seprimæ*,

 p. 51. 52. t. 5. *octavæ*, p. 52. 53. t. 5.

nonæ, p. 53. 54. t. 6. *decimæ*,

 p. 55. t. 6. *undecimæ*, p. 55. 56.

 t. 6.

Papiliones Moufeti, p. 56. t. 7.

diurni, magni Mouf., p. 60. t. 7.

medii, p. 63. t. 7.

minimi, p. 64. t. 7.

Papilio Bombycum, p. 65. t. 22.

Indicus, p. 46. t. 5.

Pediculi alati, p. 113.

Pediculus, Nomen, Generatio, Vfus, p. 120. *Diffe-*
rentia, p. 121.

marinus, p. 192. t. 27.

Perlæ vulgò dictæ, Differentia, p. 41. 42. t. 3. 4.

Phalangia, p. 137. 28.

parva Bellonii, p. 140.

Phalangæ magnæ Moufeti, p. 56. t. 7.

mediocres M., p. 59. t. 7.

minimæ M., p. 60. t. 7.

Pinguiculus Agricolæ, p. 99.

Pollin, p. 171.

Portapefo Insubr, p. 99.

INDEX.

Propolis. p. 27.
 Proscarabæus. p. 99. t. 15.
 Pseudospheca. p. 31. t. 2.
 Pulex, *Nomen, Descriptio, Victus, Locus, Ortus, Natura, Fuga, Differentia.* p. 124.
 marinus. p. 192. t. 27.
 Pulices. p. 140.
 Q.
 Quici Brasil. p. 92. t. 15.
 R.
 Reduvius. p. 123.
 Ricinus. p. 123.
 S.
 Scarabæi, *Nomen, Descriptio, Locus, Victus, Generatio, Natura.* p. 90.
 Scarabæi Aldrovandi. p. 95. t. 14.
 Moufeti majores Cornuti. p. 90. t. 15.
 minores non cornuti. p. 93.
 t. 15.
 Scarabæus aquaticus. p. 189. 100.
 Scolopendra terrestris, *Nomen, Descriptio, Natura, Morfus, Vfus, Differentia.* p. 171. t. 23.
 marina. p. 193. t. 25.
 Scorpio, tab. 18. *Nomen, Descriptio, Natura, & mores.* p. 128. *Locus, Victus & Generatio, Venenum & medela.* p. 129. *Antipathia, Vfus in medicina, Differentia.* p. 130.
 alatus. p. 113. t. 16.
 palustris. p. 189. t. 27.
 Sphondylis. p. 126.
 Cordi. p. 89.
 Squilla. p. 188.
 Staphylinus. p. 127.
 Stellæ, *Nomen, Descriptio, Natura,* p. 195. *Vfus, Differentia.* p. 196. t. 25. 26.

T.

Tabanides musca. p. 77. t. 10.
 Tabanus, *Nomen, Descriptio,* p. 76. t. 9. *Differentia.* p. 77.
 Tagliadizzo Ital. p. 107. & 105.
 Talpa Ferrantis Imperati. p. 125.
 Tambeiva Brasil. t. 16.
 Tarantula. p. 138. t. 28.
 Taurus volans Brasil. p. 100.
 Tenamaznanapaloo. p. 87.
 Teocuilin. p. 105.
 Teredines. p. 178.
 Teredo. p. 185.
 Termites. p. 177.
 Thripes. p. 177.
 Tinea. p. 122.
 Tinea. p. 192.
 Tipula, *Wasserwürden.* p. 190. t. 4. & 27.
 Tunga Brasiliens. p. 140.
 Tryxalis Moufeti. p. 88.

V.

Vermes, *Nomen, Generatio, Natura, Vfus, Differentia.* p. 174.
 arborarii. p. 175. t. 24.
 fruticarii. p. 179.
 Leguminarii & frumentarii. p. 181.
 t. 24.
 farinacei. p. 181.
 Herbarii. p. 182.
 in animalibus nati. p. 183.
 Homine. p. 184. t. 24.
 tubulis nascentes. p. 194. t. 28.
 Vespa, *Nomen, Descriptio, Locus,* p. 29. *Victus,* p. 30. *Ætas, Vfus, Differentia.* p. 31.
 Uva marina. p. 199. t. 26.

F I N I S.

Referenda

Ad paginam 87. Art. III.

In prima tabula omnium maxima est, quæ prima depingitur alis clausis & rursus apertis, à capite ad extremum alvi usq; commensurata longitudine sex digitos explet, extēris verò pedibus digitos decem. Reperitur in nostris collibus nonnunquam inter herbas in locis ferè incultis. Capta acriter mordet, dolorem inferēs haud exigū. Ova mihi peperit innumera, quæ omnia animari non puto; nam si ita esset, inextinguibilis semper earum esset numerus, omnemq; quotannis segetem absumerent. Volat magis, quàm salit, quamobrem pedes natura dedit anteriores nescio ad quem usum, nisi ad hærendum, cui involat, firmitus tenaciusq;e, crassiores, cum in cæteris posteriores crassitie præcellere soleant, ut iis insistentes facilius saliturg à terra eleventur. Toto corpore pedibusq; colore vestitur gramineo viridi, alvus tamen nonnihil per intervalla rubet, potissimum in superiori parte. Differt ab aliis non sola magnitudine & ventris crassitie (crassus est autem pollicem) sed & partium quarundam situ & figura. Capite Perlam vulgò nominatam potius quàm locustas, quæ equinum quodammodo caput habent, exprimit. Dorsum gibbosum est, è priorum pedum regione longius, quàm aliis: pedes anteriores, quos diximus posterioribus esse crassiores, è principio ferè pectoris ortum suum habent, in extremo chelis astacorum more insignes subflavis, neutiquam ferratis, sed ipsi inter primum & secundum articulum insigniter ferrati sunt, ut minus horum exemplo Plinium miremur, qui ex Indicis Serras fieri tradidit. Medii sub alis oriuntur, anterioribus breviores, quibus ferè contigui postremi, omnium longissimi. Alæ intus argento resplendent, albo cinereoq;e variantes, in extremo virides, viridi includuntur tegmine sive vagina. Antennas è fronte exerit exiles, breviusculas, subflavas.

Ex minimis est tertio loco picta

locusta, dorso ac vagina rubicundis, alvo nigra, luteis Zonis distincta, capite planè equum refert. Antennas habet brevissimas, brevissimosq;e pedes anteriores & medios, postremos contrà longissimos lutescentes.

Mediocribus adscribenda est quarta, toto corpore flavescens, tæniis quibusdam fuscis transversalibus, pedes ac potissimum postremi albo nigroq;e distinguuntur. Alvus coloris castanei diluti, respersa multis maculis, exiguis, fuscis. Alæ vaginæ inclusæ ex cæruleo diluto perpulchrè admodum virescunt.

Quinto & sexto loco posita ex maximis est, medium digitum corporis crassitie æquans, palmum ferè longa, capite viridi, nec non toto capite continuato articulo, qui in dorsum deorsum excurrens triangulari cuspidè, squamaceis marginibus cucullij cuiuspiam speciem præbet, medio acclivi, & in acumen surgente supercilio à fronte ad alarum principium, quod ipsum integit, disseptus, in cuius lateribus utrinque lacunæ quædam, seu scrobiculi in longum excavati hinc ab ipso medio gibberæ, illinc exiguo tuberculo constitutæ uti inter montes valles mediæ jacere solent, colore nigro distinctæ spectantur. Ocelli, ut cancri, immobiles, nigri, minimè sphærici, sed longiores, quàm latiores. Inter hos medios duæ non ita longæ, nempe digitum tantummodò, antennæ extant; reliquum corpus, nempe pectus latum ac compressum, ac æquabile, alvus novenis coagmentata incisuris, quæ veluti loricarum lamellæ exterius imbricatim sese excipiunt. Petilli item quaterni, nempe antici, & medii coloris cinerei; postici verò longissimi, quibus tanquam remigibus nixa sese vibrans procul salit, versicolores sunt; Femur enim nigris maculis notatur, femur verò viridi & subalbido variat. Tibia ac pediculi instar ferræ dentati, dilute punicea sunt. Alæ media sui parte ultra extremam alvum in longum protenduntur quaternæ. Harum binæ superiores fusco & balio maculosæ. Inferio-

feriores ex fusco argenti splendore micant, ac à volatus officio cessante infecto, minimè ut illæ simplæ sunt, sed decuplo rugarum ordine in se complicatæ, quomodo mantilia extergendis manibus dicata & puerorum illæ ex charta laternæ viæ duces multiplici plicarum serie sibi mutuò incumbèrium componi solent, quas cum ad volatum explicat, in trium digitorum latitudinem distensus est intueri.

Secunda tabula duodecim habet Locustarum diversas species. Prima è majorum genere dorsum habet colore ochræ nigris minutis punctis sive guttulis consperso. Alarum tegmen viridescit, & ejusdem coloris & magnitudinis notatur. Caput, pectus & alvus, item pedes viridi ochroque variat. Alvus in aduncum aculeum ochræ colore definit, capite Perlis similis est. Antennas habet miræ longitudinis & tenuitatis, rubicundas subrutilas.

Num. 2. locusta capite & antennis Cochleam sive Domiportam æmulatur; capite, nisi oculi id proderent, carere videretur. Antennæ crassæ sunt, & crassæ quoque admodum femora posteriorum pedum. Alas habet corpore protensiores, undique concolor sibi, color est cinereo flavescens.

Num. 3. locusta est è genere vulgarium, unicolor, viridis, præter antennis, quæ lutescunt.

Quarta tricolor Locusta vocari potest, vulgò Frate, hoc est, Monachus nominatur, non ob colorum diversitatem, sed quod cucullata est. Caput, & collum cucullatum est, pectus & femora posteriorum pedum sunt viridia. Tibiæ verò eorundem pedum sanguinei planè coloris, cætera omnia cinerea, antennæ exiles, sursum erectæ.

Quinta ex aculeatarum sive caudatarum genere, ubiq; unicolor, viridis; Num. 6. ex atro cinerea, undiq; sibi concolor est.

Septima à Neq. Bruchus dici potest, fatum illius maximæ, quæ primo loco in prima tabula spectatur, esse

puto; Nam etiam gibbosa est, & priores pedes è pectoris initio è gibbi seu tuberculi regione producit, & viridis est tota.

Num. 8. ea videtur, cujus descriptionem suprâ dedimus ex Autore de natura rerum; nam aculeum habet pro cauda, ut ille loquitur, & tota viridis est, caput equino capiti simile. Tales Hollandi, ut audio, Corenmesen vocant. Tales ego propriè legittimas Locustas esse putem, hanc cum Cyprio ostenderem, Bruchum vocabat, quod non probo.

Num. 9. ex Atteluborum genere dici potest propter alarum brevitatem. Hæ enim alvo, quæ admodum crassa est, comparatæ inutiles esse videntur, impotentes scilicet eam de terra attollere. Cucullum quoq; habet, eumq; viridem, reliquo toto corpore ex viridi, albo, flavo & nigro varia.

Decima insigni ac notabili aculeo sursum reflexo viridi insignis ex vulgarium genere est, sed differens plurimum colore. Tota alvo & dorso coloris est amethestini sive violacei, rostro viridi, fronte, cucullo & antennis, quæ proceræ sunt ac exiles, coloris ochræ, pedibus posterioribus viridibus, alis caret, Bruchus adhuc ac imperfecta Locusta.

Undecimo & postremo numero Locusta seu Attacus cinereus linea in vertice & dorso ferruginea alis exteriorib; nigro & cinereo variis, cruribus postremis in femore interno & inlimis tibiis phæniceo suave rubentibus, & maculis atris in rubeo colore & poplitibus distinctis.

Tertia tabula tredecim habet Locustas. Prima etiamnum Bruchus est, ejus generis locustarum, quod ceu maximum primò posuimus; nam & chelas habet in anterioribus pedibus, figura corporis, qualem figura ostendit, ubiq; sibi concolor, tota ex cinereo lutescens.

Num. 2. Locusta ex minimorum genere sive Attacus, sive Attelabus, capite, dorso, pectore alisq; & pedibus è viridi lutescentibus, alvo minicea, Zonis distincta atris.

Num. 3. Bruchus viridi & atro varius, alvi extremum habet bifurcatū.

Quarto numero datur Bruchus si-
ve ἀνείδιον ἀπὸ πηγῶν omnium minimum,
totum viride, exceptis pediculis, qui
flavescent.

Num. 5. Papilionis icon est, quam
suprà dedimus inter Papiliones.

Num. 6. Bruchus est corpore te-
nui, totus viridis.

Septimo numero ex vulgatis Lo-
custis maximis est aculeo admodum
longo, tota viridis, per dorsum verò
& alvi Zonas purpurascit.

Num. 8. ex eodem genere, sed mi-
nor & alis caret, Bruchus adhuc, su-
pino ventre flavescit, pectore candi-
cat, cætera viridis.

Num. 9. Bruchus est inusitata pla-
nè formæ albo fermè rotunda, sive
sphærica, assulatim compacta tota ex
cinereo fuscescens.

Num. 10. Attacus vel Attelabus
haud dubio omnium maximæ Locu-
stæ, capite, pedibus & dorso subfla-
vis, alarum tegmine ad ferrugineum
vergente.

Undecima tota ferruginei coloris
ex majoribus est.

Num. 12. Bruchus alius totus vi-
ridis.

Num. 13. Bruchus viridi, albo & a-
tro varius.

Num. 14. Bruchus viridi, luteo &
nigro distinctus.

Num. 1. in quarta tabula est omniū
minimus, totus ex flavo ad ferrugi-
neum vergit.

Num. 2. & 3. insolentis admodum
formæ Bruchum F. Gregorius Ca-
puccinus Regiensis, rarioribus stir-
pibus investigandis intentus, in pra-
tis collium nostrorum inventum ad
me detulit, ut eum studiosis curiosis-
que Lectorib9 communem facerem.
Cum quiescit, ita sedet, quemadmo-
dum prior icon exprimit, incedit ve-
rò, progrediturvé, ut in altera osten-
ditur. Capite cervum vel equum cri-
statum refert, item cauda, quæ mul-
tifida est, sed surrecta. Sub articulis
posteriorum pedum tubercula habet
sphærica, corpore toto fusco, luteo
& albo variat. Rarissimum est Inse-
ctum, & mihi alias nunquam visum
vel observatum.

Num. 4. depictum Insectum locu-
staceum Bruchus quispiam imperfe-
ctus totus fuscus est, & exiguo admo-
dum corpore.

Tres istæ separatim pictæ, cum
præcedentes tabulæ eas non cape-
rent, ex minimis sunt. Prior alis, cor-
pore toto & anterioribus pedibus
coloris cinerei, dorso viridis, pedibus
postrema rubicundis; Altera per su-
perna viridis, cætera cinerea.


Postrema tota purpurea.

ADMONITIO ad Bibliopegum quo quævis
Tabula loco suo sit inferenda.

TABVLA	I.	pag. 1.
	II.	p. 25.
	III.	p. 119.
	IV.	p. 41.
	V.	p. 46.
	VI.	p. 56.
	VII.	p. 56.
	VIII.	p. 56.
	IX.	p. 69.
	X.	p. 71.
	XI.	p. 85.
	XII.	p. 78.
	XIII.	p. 88.
	XIV.	p. 95.
	XV.	p. 90.
	XVI.	p. 100.
	XVII.	p. 114.
	XVIII.	p. 131.
	XIX.	p. 142.
	XX.	p. 145.
	XXI.	p. 147.
	XXII.	p. 153.
	XXIII.	p. 171.
	XXIV.	p. 175.
	XXV.	p. 195.
	XXVI.	p. 199.
	XXVII.	p. 188.
	XXVIII.	p. 194.

HISTORIÆ
NATURALIS
De
SERPENTI-
BUS
LIBRI DUO.

JOANNES JONSTONVS MEDICINÆ
DOCTOR CONCINNAVIT.



FRANCOFVRTI ad Mœnum,
Ex Bibliopolio Hæredum Merianæorum.

ANNO MDC LIII.

PERILLVSTRI ET REVERENDISSIMO
DOMINO, DOMINO


ARNOLDO

DIVINA PROVIDENTIA MO-
NASTERII DVCALIS LIBVSIEN-
SIS ABBATI,

Domino & Patrono suo gratioso,

Hanc de SERPENTIBVS Historiam
Observantiæ ergo offert

*JOANNES JONSTONVS, Medi-
cina Doctor, Zibeniaci Dominus.*



HISTORIÆ NATVRALIS

De

SERPENTIBUS

Liber Primus.

De Serpentibus Vulgaribus, seu Minoribus.

TITVLVS I.

De Serpentibus in genere.

Nomen.
Ambros.
de Serpen-
tib. l. 1. c. 1.



Erpentis vocabulum, vel à ser-
pendo, quòd occultis accessi-
bus, non occultis passibus, ani-
mal hoc progrediatur; vel à
Græco ἑρπετῶν, nisi Festus fallit,
descendit. In genere sumptum, omnia illa,
quæ vel citra usum pedum repunt, vel tam
exiguos habent ut repere quàm incedere vi-
deantur, complectitur. Dicitur etiā priscis
Serpula, si Festo credendum; alijs *Coluber*, seu
quòd in lubricos tractus flexibus sinuosis
labatur: seu quòd umbras colat, ut apud Vir-
gilium legimus: quanquam alij pro serpente
domestico accipiant; alij pro serpente aque,
ut Theophrastus, *Gaza*, & Ponzettus su-
mant. Dicitur & *Anguis*, quòd semper quasi
angulosus & plicatus conspiciatur: quan-
quam Servius, aquaticis duntaxat hoc no-
mentribuit, alij etiam terrestribus. *Thyrum*
Echydnæ & *Draconem* vocari, passim apud au-
thores invenies. Græcis veteribus est ὄφις,
modernis ὄφιδ, sine dubio παγαλὸν ὄφιον, seu
quòd acutum cernat; seu quòd oculis aper-
tis dormiat: Hefychio ἀργύς, Argivorū Dia-
lecto. Unde Pausanias Mercurium *Argiphon-*
tem dixit, quòd sit ὄφιονόμος, id est, serpenti-
cida.

Virgil. Ge-
org. l. 3.

Descriptio.

Lacertis valdè sunt similes. *Caput* qui-
busdam leve, grave alijs; quibusdam latum,
angustum, album, nigrum, nonnullis flavum
variegatum. Sunt qui illud tam velociter
in utramq; partem vertunt, ut intuenti bici-
pites vel amphicephali videantur. *Aures* etsi
habeant, non eminent tamen; rectè caver-
nas ad audiendum, Plinius vocavit. Sed nec
meatus narium, *nares* rectè appelles, quòd
non ita explanati sint. *Oculus* sunt duriori-
bus. *Palpebras* superiores non movent, infe-
riore tantum connivent. *Collo* carent. *Dentes*
pectinatim coeunt. *Cortice* tanquam pelle

teguntur. *Caudam*, ut in sequentibus agemus,
variā gerunt.

De Internis partibus & Anatomicis ita habet
Ambrosius. Primitus caput serpentis osse
unico tegitur coniectu figurā, sicuti astruit
Cardanus. Imo in hoc osse oculorum fo-
ramina natura non inculpsit, quod ideò fa-
ctum est, ne facile laderentur, dum humi ser-
punt. *Dentes* habent serratos, & acutos,
quemadmodum paulò ante in descriptione,
hujus animalis fuit exaratus. Sed ut notat E-
doardus Wottonus duo sunt in supremā
parte, dextrā, levāque longissimi, tenui fistu-
lā, instar aculei Scorpionum perforati, per
quam postea venenum, datā occasione, eja-
culantur. *Lingua* serpentum tenuis, longa, a-
troque colore referta est; ideoque longius
protrahitur: In summitate verò est bifida, &
secundum nonnullos pilosa, seu potius exilis
instar pili, ut in capite de lacertis fuit expli-
catum. Plinius linguam serpentum *trifur-*
cam vocavit, quā tantā celeritate illam vi-
brant, ut triplicem linguam exerere videan-
tur. Sub linguā in quibusdam cuticula in-
venitur, quā tanquam *vesicula* dentes operit,
in qua venenum occultatur, quod postmo-
dum mordendo per cavitatem dentis com-
municant. *Cor* exiguum longum, & figu-
ram renum repræsentans, postremā adhæ-
ret arteriæ, & naturā valde calidum est: Ob
hanc causam tradebat Galenus Serpentes In libro de
inter ceteros animantes maximā audaciā *Anatomiā*
esse refertos. *Arteria* est admodum longa, *vivorum* 2.
& juxta os suam trahit originem, ita, ut sub
linguā esse videatur. Imo linguæ quodam-
modo videtur præminere, quā ipsa contra-
hitur, neque eodem loco, ut in ceteris ani-
malibus, permanet. Hæc postea defertur
in *pulmonem* quo angues ad differentiam pi-
scium, utuntur: Quo circa notabat Plinius,
serpentum & piscium omnia esse similia,
præter pulmonem, quem natura serpenti-
bus & non piscibus largita est, cum pisces
loco pulmonis branchias adhibeant. Hic
pulmo

Lib. 2. re-
rum vari-
etat. c. 29.

Lib. 2. de
differ. Ani-
mal.

pulmo simplex est fibrosus fistulis divisus, prælongus, fungosus, & cordi non multum proximus. *Lingulam* verò quam Græci ἐν γλώττῃ vocant, arteriæ superpositam angues non habent, sed ipsum meatum, adhibitum, modò contrahunt, modo laxant, idque præstant, ne aliquid in pulmonem delabatur. *Ventriculum* habent serpentes veluti amplum intestinum canino similem, nempe angustum, & figuræ longæ. *Intestinum* verò spiris carens tenue, & longum ad meatum usque excrementorum protrahitur. Nam interanea serpentum partibus internis lacertorum similia sunt, sed viscera, propter longitudinem, & angustiam corporis ita longa & arcta sunt, ut vix à se invicem dignosci possint. *Iecur* igitur longum est, & simplex, *lien* exiguus, & rotundus qualia viscera etiam in lacertis observavimus. *Fel* præter natricem, in omnibus serpentibus, intestinis adhæret, & nigro quodam, liquidoque excremento refertum est, sicuti in vipera fœmina nuper conspicati sumus. Hoc excrementum, in comparatione ad corporaturam animalis, est valde copiosum. Quare meritò tradebat Plinius, serpentes, nec non pisces copioso fellis excremento redundare. *Vescicæ*, & renibus serpentes carere, notat Aristoteles, veluti, & alia, quæ pennis, squamis, & cortice integuntur, præter testudinem. Hoc autem inde nascitur, ut autore Vincentio in speculo naturali visum, quia humiditas anguini, sicut & avium pauca est; ideoque in squamas, quoad serpentes, & in pennas quoad aves degenerat. Amplius vim fœtificam natura his animalibus velut, & piscibus impertita est, cum pene, & testibus careant. Scripsit n. Aristoteles, eos pene carere, cum non habeant crura, nã hic à cruribus, originẽ habere dicitur. *Testes* verò propter corporis longitudinem non sunt sortiti, sed meatum, more piscium obtinuerunt: quandoquidem propter longum iter genitura facile refrigeraretur, & infæcunda evaderet. Hoc sæpe iis contingere solet, qui longo pene à naturâ sunt donati, quamobrem infæcundi redduntur; cum semen ob mentulæ longitudinem refrigeratum infæcunditatem pariat. Verum loco prædictarum partium genitalium, natura his animantibus *binos* communicavit *meatus*, qui à septo orientes latus spinæ ab utrâque parte perreptant, & utrinque superne juxta spinam junguntur, atque ita ad os excrementi finiunt. Himeatus, tempore congressus, humoris fœtifici pleni conspiciuntur, attrituque mutuo candidum semen effluit, quemadmodum in historijs piscium fuit memoratum. *Mammæ* in anguibus non observantur, quia lac non habent, cum in ovo lacteus ille cibus, ingenuus contineatur. *Vulva* seu uterus ex sententiâ Aristotelis in

omnibus serpentibus bifidus videtur prolixior, ab uno inferiori meatu ad utrumque spinæ latus deductus, in quo ova generantur; indeque continuâ quadam serie exire solent. Circa ossa anguini docet Aristoteles hæc esse naturæ spinarum: quare spina dorsii illis, ritu piscium, inest. *Vertebræ* cartilaginossæ, & flexiles sunt, sicuti natura horum animalium ex postulat; Nimirum ut quoscunque motus, & corporis flexiones facilius excercere possent. Tot *costæ* insunt anguib⁹, quot dies mensem complere solent: Unde Plinius in singulis anguib⁹ costas tricenase enumerabat. Caterum in confirmationem eorum, quæ hætenus de anatome Serpentium explicata sunt, addemus illa, quæ de inspectione anatomicâ hujus animalis observavit Io. Gregorius Macer, qui scribens ad Gesnerum retulit, se in serpente interfecto primò inter cutem, & carnem, subtilem quandam & pingviusculam membranam invenisse, quæ tamen cum ipsa cute descendeat. Secundò dum scindens animal ad meatum excrementorum pervenisset, fæces gravissimo odore excrementa humana superantes invitus olfecit. Detectâ cute, membra interna partim avibus, partim piscibus communia esse vidit. Nam trachea arteria longitudine quatuor digitorum, parvis, & gracilibus circulis insignita ad pulmonem usque descendeat, cui cor, & cistis fellis adhærebat. Postea *iecur* ad instar hepatis lucij piscis in longitudinem extendebatur. Deinde pinguedine candida intestina erant referta, quæ à faucibus usque ad podicem more intestinorum piscium progrediebantur. Infra hepar utrinque juxta intestina vera nervosa longo ductu descendeat, cui ova pelliculis albis rectâ inhærebant, ut in gallinis videre licet, sed situ distincta, quia longo ordine ducuntur. Numerus in quolibet latere erat triginta, & duorum ovorum, quamobrem ratione cordis, pulmonis, & asperæ arteriæ serpens avibus valde assimilatur. Ratione hepatis intestinorum & abdominis Serpens cum piscibus convenit. Verum postea ratione cistis fellis, & dispositionis ovorum, Serpens ab utrisque nempe tam ab avibus quàm à piscibus dissidet. Hactenus Ambrosinus.

Nullos esse in Ebuso insula prodidit Plinius, in Creta Aristoteles & Solinus; in Britannia Cardanus; in Laponia, alij. In Hi- berniam allatos interire, imò terrâ illius regni conspersos, exanimari, Angli prodidere. Navibus in Bugum fluvium delati, edito sibi loco aliò confugiunt, si scriptoribus Polonicis fides. Bellonius tamen nonnullas in Creta species observavit: rationes verò Cardani de Britannia, à Scaligero confutatae sunt. Frequentes sunt in Ophiussa, Melitæa, Thesalia, Apulia, Arabia, Numidia, Æthiopiâ,

Lib. 3. de
part. An.
cap. 9.

Plin. H. N.
L. 11. c. 37.

Lib. 20. c. 3.

Lib. 1. de
gen. Anim.
cap. 5.

Locus Plin.
H. N. l. 35.
cap. 19.

Cardan.

Bellon. obs.

Scalig.

Septentrionalibus regionibus, Helvetia, & Italia. *Ophiufam* seu Colubariam ob serpentum copiam inhabitabilem factam Plinius refert. *Melitam*, in qua terra *Gratia S. Pauli* dicta nascitur, eorundem fecundissimam notum. *Theffalia* in tantum abundat, ut nisi à Ciconijs vorarentur, incolae sedibus pellerent. Oppidi S. viti in monte *Apulia* Gargano cives, aliò migrare coëgerunt, ut apud *Leandrum* legimus. In *Arabia* circa thuriferas arbores versantur: inde in *Ægyptum* avolant. In *Numidia* moribus eorum venenosis plurimi quotannis moriuntur. In *Æthiopia*, si *Pierio* credendum in gyrum invicem volvuntur, ut montis speciem intuentibus præsentent. In *Africa* agricolæ præaltas induunt ocreas, ne à serpentibus qui ibi copiosi appetantur. In *Indijs* sunt maximi. In *Septentrionalibus regionibus* per campos & sylvas vagantur. In *Lombardia* & agro *Ferrariensi* multas inveniri species, *Scaliger* auctor est. *Celsus* minus ibi venenatos tradit. Maxime verò caulas, casas rusticas, cavernas, pratas, sylvas cæduas, & arbores amant. *Ælianus* sanè circa paludem sitam juxta *Ephesiam* metropolin, cavernam serpentibus plenam inveniri narrat. Apud *Septentrionales*, in cavatis betulæ radicibus resident, & hyemetalem juxta radices calorem efflant, ut arbor folia non deponat. In terra etiam topheaca latibula parant. De *Vlmo* inter *Brachianum* & *Romam*, in qua serpentes stabulantur, ita *Kircherus*. Ab his montis spiraculis deorsum versus quindecim ferè passuum spatio descendentes, occurret ulmus, arbor sat eminus spectabilis, sub quâ specus, seu caverna quædam, vulgo *la Grotta delli Serpi*, duorum hominum capax, fistulosis quibusdam foraminibus in cribri formam perforata cernitur, ex quibus ingens quædam principio *Veris* diversicolorum serpentum, nulla tamen, ut dicitur, singulari veneni qualitate imbutorum, progenies quotannis pullulare solet. In hac spelunca *Elephantiacos*, *leprosos*, *paralyticos*, *arthricos*, *podagricos*, similibusque desperatis membrorum affectionibus laborantes nudos exponere solent, qui mox halituum subterraneorum calore in sudorem resoluti, serpentum propullulantium totum corpus infirmi implicantium suctuque linctuque, ita omni vitioso virulentoque humore privari dicuntur, ut repetito hoc per aliquod tempus medicamento, tandè perfectæ sanitati restituantur. De hac spelunca cum varia à varijs inaudissem, & jam dudum ingens me reitam prodigiosæ veritatem exactè & κατὰ τὴν ἀποψιν examinandi invasisset desiderium, tandem cum hoc anno 1640. 8. die Decemb. eas oras in negotio quodam Geodætico pervagarer, tam insignem veritatis indagandæ occasionem minimè negligem-

dā ratus sum: conducto itaque non viarum duntaxat, sed & naturæ montis perito duce, speluncam per avia & devia non sine periculo adij, & quæ de situ montis, de spiraculis sive evaporario, de cavernâ & serpentibus inaudieram, omnia vera esse cognovi, speluncam ingressus, eam utcunque calidam inveni, at serpentes non vidi, ut pote eo tempore latitantes, spolijs tamen & exuvijs eorum ultmus paulo antè memorata ita onerabatur, ut *staphylo dendrum*, *coluteam*, seu *vesicariam* folliculis refertam dixisses, quæ serpentium, quorum mons scateret, geniminis luculentum præbebant testimonium, imo auribus ad meatuum orificia applicatis, nescio quod obtusi murmur, aut quis sibilosus strepitus, si non aëris cum halitibus inclusis luctæ certe latentium angvium manifestum signum percipiebatur, & c. *πύμφαγοι*, sunt *Aristoteli*, & herbis quoque victitant. Pulverem comedere ex sacris quidam *Victus* concludunt: nec negandum, dulci glebâ *Arist. H. A.* delectari. In *Africa* oniscis: in Oriente, teste *l. 8. c. 4.* *Vitriaco*, pipere albo nutriuntur. Exiguo interdum contentos cibo, & inediâ benè tolerare, vel circulatores norūt, qui angves in capulis, modico furfure pastos circumferunt. Hyeme sub cervicali, vel ad ignem, ad verusque vitam protrahunt. *Ambrosinus* in vasculo per sex menses sine cibo conservavit. *Aristoteles*, devorato aliquo animalculo, totam ab eo nutritivam substantiam extrahere, reliquum per secessum excutere scripsit. Dum vorant ex longis brevissimi, & ex tenuibus latissimi fiunt, ut quod deglutivere, melius in ventrem delabatur. Avibus devoratis, plumas & ossa vomunt. In regione *Senegæ* pullis pisticorum insidiantur. *Vino*, lacte, aquâ, & o- *Arist. H. A.* vorum vitellis delectantur. Hæc quidam ab *l. 8. c. 4.* ijs deglutiri tradunt, si faucibus capiantur, mox ab ipsis in semet convolutis frangi, & cortices per inferiora dejici. Juniores orbe spiræ perstringunt; & fracto putamine, liquorem hauriunt. Vini incontinentes esse *Aristoteli* proditum. Ideò quidam vino circa sepes apposito, viperas venantur. Temperamento quibusdam sunt frigidi, calidi quibusdam. Illis *Galenus* in primis, his *Avicenna* favet.

De *Generatione* serpentum duo occurrunt, Unde orti sint, & quomodo generent. De *Ortu* variæ sententiæ. Quidam Poëtæ ex sanguine *Titanum* à *Saturno* & *Opiocci* forum prodiisse fabulantur. Alij ex guttis *Ovid. Met.* capitis *Medusæ* sanguineis: Nonnulli ex putredine terræ, ex qua magnus ille serpens *Python* prodiit. Nec absolum hoc. Nam *Metam. l. 1* & *Nervi Scythiæ* populi ob natos ex terra serpentes, paulò ante *Darij* expeditionem *Herodot.* solum mutare coacti sunt, *Herodoto* teste: *l. 4.* & *Amyclas*, *Italia* inter *Terracina* & *Capetana*

Plin. H. N. l. 8. c. 29. jetam civitatem, à serpentibus ex vicinis pul-
ludibus prognatis, deletam, Plinius asse-
rere ausus est. In corpore humano nasci, in
Historia de Homine dicemus. Ex sanguine
quarundam avium confuso, Democritus
prodidit, referente Plinio: ex saliva in ster-
quilinio putrefacta alij. In solido & vasto
Pareus. l. 20. c. 24. marmore inventum fuisse, Martini v. Pon-
tificis tempore, ex Baptista Leone apud Pa-
Cardan. de variet. rer. l. 7. cap. 29. reum habemus; Causam Cardanus reddit.
Ex cadaveribus humanis nasci, & corrupta
spinæ medulla, apud Cæmerarium invenies.
A tali ex plumbeo feretro profliente, Aven-
nionensem opificem læsum, apud Pareum
Plin. H. N. l. 10. c. 62. legimus. Modum generationis aperuit ex
Aristotele *Plinius*. Coeunt, inquit, complexu
Arist. H. A. l. 5. c. 4. ad eò circumvoluti sibi ipsi, ut unus existi-
l. 6. c. 34. mari biceps possit. Contecta ova in terra
incubant, & sætum sequente excludunt an-
no. Continuat à illa serie contexta, ut mo-
nilis instar videantur. Quidam & animal
pariunt. Fætorem in congressu edere, apud
Ælian. H. A. l. 9. c. 49. Ælianum legimus.
Vox Luca. l. 6. Vos ipsis est sibilus. Obtusum testudines,
longum serpentes reddunt, stridere id Lu-
cano: ποίσειν Apollonio in Argonauticis. E-
rectos ante lapsum incessisse, imaginantur
nonnulli: serpere, quis non novit! Flexuo-
sis impetibus incedunt, & caput, reliquo
corpore quiescente, ob vertebra cartilagi-
nosas vertunt; sicque corpus suum longum
& angustum in partes adversas respicientes,
melius tueri possunt. Squamis quasi ungui-
bus, & costis quasi cruribus innituntur. Græ-
ci de hoc motu verbum ἐλυσσάν. τας usurpāt.
Antipathia Plin. H. N. l. 7. c. 2. l. 28. c. 3. Inimicitiam cum hominibus, plantis & ani-
malibus gerunt. Quantum ad homines, o-
mnibus contra serpentes inest venenum;
feruntque ictos salivā, ut ferventis aquæ
contactum effugere. Crates Pergamenus
in Hellesponto circa Parium, genus homi-
num fuisse tradit, quos *Ophiogenes* vocant,
serpentum ictus contactu levare solitos, &
manu impositā, venena extrahere corpori.
Varronis tempore, pauci ibidem erant,
quorum salivæ contra ictus serpentum me-
debantur. Similis & in Africa gens *Psyllor-*
Rege dicta, Agatharchides scribit, à *Psyllo-*
Rege dicta, cujus sepulchrum in parte Syrti-
um majorum est. Horum corpori ingeni-
tum fuit, virus exitiale serpentibus, ut cujus
odore sopirent eas. Mox verò liberos ge-
nitos, protinus obijciendi sævissimis eorum,
eoque genere pudicitiam coniugum experi-
undi, non profugientibus adulterino san-
guine natos serpentibus. Simile & in Italia
Marforum genus durat, quos à *Circes* filio
ortos servant, & idè inesse ijs vim natura-
lem eam. Idem apud *Srabonem* invenies.
Inter animalia gerunt inimicitias cum avi-
Arist. H. A. l. 9. c. 1. bus, quadrupedibus, & ex angvibus. Avibus. Nam
pulli à serpentibus lædantur. Eadem in
montibus regni *Morfili* angvibus vescun-
tur. Notum, quam gratitudinem *Aquila* *Ælian. H. A. l. 6. c. 37.*
à serpente *Spiris* arctissimè complicata, ru-
sticò liberatori præstiterit, apud Ælianum.
Pavonis clamore terrentur, *Ciconia* in *Thes-*
saliā maximè immunes, quod serpentes in-
terimant. Ejusdem in Italia pulli tribus an-
nis continuis aliquando devorati fuere. Huc *Halient.*
accipitres, ibides, quorum pennas timent, vul-
l. 5. tures, hirundines galli & gallinae pertinent. Ex
quadrupedibus sunt *Elephant* qui Spiritu cer-
vorum ritu, serpentes è cavernis evocant:
Leopardi, quorum odorem vitant, *Cervi*, qui
seu tanquam medicamento, quod *Isidorus*
tradit; seu tanquam pabulo, quod *Bellua-*
censis; seu levandi senij ergò, & ut pilos mu-
tent cornuaque deponant, quod alij, serpen-
tibus vescuntur. *Sues* etiam angues inven-
Arist. H. A. l. 9. c. 1. tos edūt. Per eas ager *Plombinensis* à quodā
serpente purgatus est. A *sericibus* brumali
tempore infestantur, quòd tūm langvore
quodam laborent. Cum iisdem, testudo, ich-
neumon, lacerta, & *Chamaeleon*, ut proprijs
locis est dictum, congregiuntur. Catum
quoque cis infestum, apud *Aristotelem* ha-
bemus. Ex *Exangvibus*, *Locustæ* species
quædam *Ophiomachus* dicitur, quòd cum ser-
pentibus prælietur, eosque gutture arrepto
interimat. *Albertus* *Opimatum* vocavit. *Ælian. H. A. l. 16.*
Cancris serpentes ad *Ephesiam* metropolim,
forcipibus arripiunt, dum paludes juxta
Ephesiam tranare conantur. *Aranei* sub
umbrosis arboribus apicantes, ictu inflicto
vertiginosos reddunt; quod tamen melius
de lacertis sumferis. De plantis hoc habe.
Nec umbras quidem fraxini arboris ferre;
idè hæc prolixo naturæ beneficio, ante
quam è latebris egrediantur floret; post-
quam delituere, folia demum deponit.
Smilax in *Trachinio* solo, si appropinquarent,
interire. Folijs quernis injectis, si *Geopo-*
nicor. auctori credimus, perire. Octorem
florescentis uve averfari, nec tum temporis
in vitibus inveniri. *Vetonicæ* circulo in-
clusos flagellando, quia exire non audent,
sefe perimere. Odore alij deterreri; rutæ,
verò *Lybicas* imprimis, animo linqui. *Tacco*
trifolij quandam speciem, ut *Plinius* volu-
it, absynthium, artemisiam, abrotonum, li-
banotidem nepetham viticem, quam mulie-
res in *Thesinophorijs* pulvinaribus subster-
nebant; *Helenium* denique seu *Enulam*
Campanam, cujus idè Ælianus meminit.
Therionarca in *Cappadocia* & *Mysia* nas-
cente, omnes feras torpescere, fabulatur
Plinius. Ab igne abhorrere apud *Cardanum*
habemus.

Sympha-

Amicitiam colunt inter se, quia in caver-
nis sæpè conglobatim inveniuntur: cum
angvillis, ut *Gefnerus* exemplo cujusdam
pueri docet: cum vulpibus, quia in cryptis
com-

Plin. H. N. communem vitam degunt: cum *Cattis*, quia
l. 16. c. 34. aliquando secum colludere visi sunt. *Hede-*
ram serpentum frigori gratissimā, ut mirum
Plin. H. N. sit ullum honorem habitum ei. *Feniculo* de-
l. 20. c. 23. gustato, senectutem facilius exuunt: & suc-
 co oculorum aciem, in latibulis ferè amif-
 sam, recipiunt. Circa *sabinam* semper obser-
 vantur.

Natura & Mores sequentia exprimunt.
Mores. Terra serpentes homine percusso non am-
Plin. H. N. plius recipit, panasque etiam inertium no-
l. 2. c. 63. mine exigit; venenum secundum quosdam,
 in cauda habent, quod in vesicam ori vici-
 nam deducatur; quæ, priore etiam ejecto,
 intra diei naturalis spacium aliò impleatur.

Arist. H. A. Quatuor frigidissimis mensibus latent, nec
l. 2. 8. c. 15. quicquam comedūt, imbecillitum adeò ve-
Galen. l. 2. neno, ut impunè tractentur: Urgente cani-
de locis culā adeò æstuant, ut nunquam ferè quies-
affectis. cant: Plinius, cum sol est in cancro, torqueri
Plin. H. N. dixit. Vere, dum è latebris prodeunt, e-
l. 32. c. 5. xuvias deponunt; quas quidam *sphar*, alij
Arist. H. A. *senium*, *γῆρας*, nonnulli ad Plinij mentem,
l. 5 c. 17. *vernationem* vocant. Incipiunt à capite ut

l. 18. c. 17. quasi, à decidentibus obcæcentur: diei na-
 turalis spacio devolvuntur ad caudam, totū-
 que aufertur spoliū, ut Aristoteles prodit,
 prout factus membranarum involucris
 liberantur. Degustato *feniculo* in homi-
 nis conspectum prodeunt. Genuina ne
 hæc pellis, an eximuo & sordibus per hye-
 mem contractum spoliū, ad Disquisitionem
 causarum pertinet. Diuturniorise-
 tiam sunt vitæ, seu quòd exuvias deponant,
 seu quod parci sint cibi, seu in comparatio-
 ne ad alias bestias. Diei noctem pervigilem
 conjungere, dum apertis oculis som-
 num capiunt, alij prodiderunt. Prudentia
 in eo notatur à quibusdam, quod totum
 corpus periculo exponant, ut caput illæsum
 servant. Illud faciliè pristinæ sanitati vulne-
 ratum redditur; hoc attacto, moriuntur fa-
 cilè. Arundine percussis, mortuorum instar
 jacent: si frequenti ictu petieris totis viri-
 bus mordere conantur. Stercus serpen-
 tum benè olere, faciliè concedi potest, si ve-
 rum est, inter *Calecutum* & *Cranganon* in-
 veniri, qui ab *Ore* suavissimum & mosci in-
 star spirent odorem.

Venenum. Huc *veneni* consideratio spectat. In ey-
Plin. H. N. sti fellis istud, secundum Plinium, residet; in
l. 11. c. 37. vesicâ quadam sub lingua, qua disrumpa-
 li quor quidam biliosus emanat & corpus in-
 ficit, secundum Grevinum. Tot eorum ve-
 nena quot genera, tot pernicies quot species, tot do-
 lores quot colores, *Isidorus* dixit. Diversa ta-
 men operatio. Marces feminis, senes ju-
 nioribus, magni parvis, jejuni saturis, om-
 nes, estate quàm hyeme, sūt perniciosiores.
 Deposito senio magis formidolosi feruntur.
 An aliquando veneno carcant, disquiritur.
 Præ dolore ob amissum disrumpi, quæ Vin-

centij mens est, fallum. Breviore an diuturni-
 ore temporis spacio icti intereant, partim
 veneno, læso partim, adscribi debet. In Indiis
 Orientalibus sues vel canes à quibusdam
 admorsis, sex duntaxat horis supervivunt:
 homines diem naturalem: remedijs liberati,
 periculo vacant si postea admorsis fuerint.

Alibi, vel ipse halitus prætereuntes interi-
 mit. Quendam interiisse, cum se in aqua li-
 gnis propè serpentis cavernam excaletis,
 lavasset, *Ponzettus* author est. *Scaliger* Para-
 vicinum quendam, non procul *Dertonâ*,
 serpente, in venatione hasta occiso, mortu-
 um, prodit. *Mathiolus* in agro Tridentino
 vaccarum custodem in periculo, & morti
 paratum, nisi theriacâ & alijs refocillatus
 fuisset. Habet & *locus* aliquid. Ferociore ijs

qui in plano montani, qui inter Arabica bal-
 sameta minus nocere creduntur. Vulnere
 inflicto, stupet primò æger: mox vulnus
 dolore afficitur, color mutatur, inflamma-
 tur, rubet, livet, nigricat, & æger totus ardet.

De Remedijs multa habentur. Vulcani in
 Lemno antistes, Umbro de gente Marubi-
 orum apud Virgilium, Atyr apud Silium Ita-
 licum, virtutem Serpentum morsus sanandi
 possidere credebantur. Mira de Pysyllis Ly-
 bicis *Ælianus*. Non valdè si doluissent pun-
 cti, solâ Saliva sanasse: ubi dolore preme-
 bantur, colluto aquâcore, bibendam tan-
 quam salutarem dedisse: si ne hoc juvisset,
 accubasse ægro, & corpòris sui contactu,
 infregisse venenum. Certiora remedia sunt,
 quæ aliunde sumuntur. Laudatur, capræ ni-
 græ lac, si locum affectum eo foveris. Puella
 quædam caseo capræ recenti ulceri imposi-
 to sanata est. Medullâ cervi perlinitus, ab eo-
 dem optimè defenditur. *Vegetius* in jumen-
 tis demorsis, stercore suillo recente utitur.

Dioscorides finum bubulum vehementer
 commendat. Quid si ipsemet serpens suos
 ictus sapet? Herbarum huc facientium ca-
 talogū, apud Ambrosinum vide. *Maphæum*
 si sequimur, sunt in India arbores *Copaiba*
 dictæ, balsamum fundentes, quo læsi à ser-
 pentibus sanantur. Idem arbores ex nucum
 genere, si Plinio fides, faciunt: nec non in
 Græcia frutex, *Epipactis* nominatus, alij
 Embolinen vocarunt. Ex *Compositis*, *Theri-*
aca *Andromachi* intra, extra, Confectio
Hermetis, *Emplastrum* *Epigonum*, *Oleum*
scorpionum, & *divinum*, de quibus *Ambro-*
sinus, laudantur.

Vsu in Cibis
 Vescebantur ijs olim, *Troglodytæ*, & *Æ-*
thiopes, si *Herodoto* credimus; *Candæi*,
 qui & *Ophiophagi* inde, si *Plinio*; *Arabes*,
 si *Solino*. In *Brasilia*, carnem quorundam
 qui brachij humani crassitudine, conci-
 dunt, & inter apparatus reponunt. In *Cuba*,
 inter regios apparatus censentur. Ova co-
 mesta per murenam redduntur innoxia.

In *Medicinâ* magni sunt usus. Totum si spe-
 ctes, *Medicinâ*.

Vsu in Cibis
 Vescebantur ijs olim, *Troglodytæ*, & *Æ-*
thiopes, si *Herodoto* credimus; *Candæi*,
 qui & *Ophiophagi* inde, si *Plinio*; *Arabes*,
 si *Solino*. In *Brasilia*, carnem quorundam
 qui brachij humani crassitudine, conci-
 dunt, & inter apparatus reponunt. In *Cuba*,
 inter regios apparatus censentur. Ova co-
 mesta per murenam redduntur innoxia.

In *Medicinâ* magni sunt usus. Totum si spe-
 ctes, *Medicinâ*.

tes, capite & caudâ trûcatis, interaneis abjectis, deglubiti, carne benè lotâ, & cû vino coctâ, jure aromatib. condito, in leprâ cõmendantur. Suffitu inveterati in mensib. provocandis Plinius utitur. Quidâ cû florib. herbæ paralyfis in oleo ad podagrâ decoquunt. Cinis cõbusti in fistulis sanandis vehementer cõmendatur. Baculus quo rana ab angve excussa est, parturiêtes adjuvat. Quantû *ad partes*, Oculû dextrû utiliter ad epiphoras alligari, dũmodo serpens dimittatur, Plinius alii cubi, author est. Cor si mordeatur aut alligetur, in odontalgia efficax perhibetur. Iecur qui degustaverit, si credere fas est, à nullo serpente tangetur. Fel tosti Paulo Veneto, demorsos, à cane rabido sanat; parturientes, degustatû, felicissimè juvat; & hæmorrhoidibus illitum opitulatur. De *sanguine*, ex lib. in-

cendi gestabat; deprehensus, tanquam veneficus, interfectus fuit. *Senecam* tanquã amuletû, in armillis quidam ligare solebât. Cardanus ad nescio quẽ non, in certis constellationib. adhibet. Plinius cum sale, & serpillio tritam bob. in fauces, uvâ maturescen- te in- jicit, ut per totû anni curriculû valeat. Wottonus in armarijs & cistis reponit, ut velles à tineis immunes servet. Alij ejus pulverem inspergunt, ut apes ad alvearia revertan- tur.

Differentia serpentum multæ sunt, Prima-Differetia.

rias ad sequens caput rejicimus, *secundaria*, à *quantitate*, *colore*, *loco*, *odore*, *noxâ*, *aspectu*, & *aliis accidentibus* sumuntur. De *quantitate* nota, Marem fæminâ semper minorem. In plagâ septentrionali, ineunte astate, parvos reperiri, qui regem cristatum habeant, eodẽq; occiso dissipentur. In Thessalia parvû & *hirsutum*, si Belluacensi fides, quem Incolæ *sacru*

Belluacensi

Speculi. l.

20. c. 11.

Ælian. H.

A. l. 17. c. 2.

Plin. H. N.

l. 8. c. 14.

voce, aliû, solâ voce animalia interimere. In India quoq; magnitudine alijs longè inferiores, *πικίλας ἢ χρῶαν versicolores*, & *ὠσπερὲν φαρμάκων καὶ λαγυρὰ φέβας*, quasi pigmentis distinctos. Alibi maximi sunt. Megasthenes scribit, *verba sunt Plinij*, in India serpentes in tantam magnitudinem adolefcere, ut solidos

hauriant cervos taurosq; Metrodorus, circa Rhyndacum amnem, in Ponto, ut supervolantes quamvis altè perniciterq; alites haustu raptas absorbeant. Nota est in Punicis bellis, ad flumen Bagradam, (nunc Megerada) à Regulo Imperatore balistis, tormentisque ut oppidum aliquod, expugnata serpēs, C. XX. pedum longitudinis. Pellis ejus maxillæq; usque ad bellum Numantinum duravere Romæ in templo. Huc *Seneca* respexit.

Valer. Max.

l. 1. c. ult.

se videtur, dum scribit, Lenis & privata perniciis non solas urbes movet. Quod latè furerẽ cæpit, & omnes appetit, undique configitur. Serpentes parvulæ fallunt, nec publicè consequuntur; ubi aliqua solitam mensuram tranfit, & in monstrum excrevit, ubi fontes potu infecit, & si afflavit, deurit, obteritque, quacunque incessit, balistis petitur. Circa mare rubrum longitudine XL. cubitorum, crassitie eidem proportionata olim observati sunt. In loco quodam Macra, visus, qui jugeri lōgitudinem æquaret, crassitie, si credere fas est tantâ, ut equites ex utraque parte adstantes, seipsos intueri non possent. Po-

Seneca de

Clement.

l. 1. c. 25.

Ælian. H.

A. l. 17. c. 1.

sidonius id retulit. Porus Indorum Rex ad Augustum decem Cubitor. misit. In Malaber octonum pedum inveniuntur, puerorum amatores. Iacentes angvillinâ esse facie dicuntur; surgentes, eam ad eò dilatant, ut ad humanam effigiem propius accedere videantur. Novem pedum pellem apud Clusium invenies. Tantam & Ambrosi-

Strabo Geo.

gr. l. 15.

nius apud magnum Hetruriæ Ducem vidit. Ideò non inepte forte Gillius scripsit, suum magnitudinem Calecuti æquare: cum præsertim edicto regio, ne occidantur cau-

b

tum

M. Paulus Venetus l.

2. c. 40.

Ambrosin.

de serpent.

l. 1. c. 1.

Porta Phy-

togn. l. 5. c.

12.

Tagaut. l. 1.

Infir.

Chirurg.

Porta Phy-

togn. l. 5.

c. 12.

Galen. Eu-

perist. l. 2.

& l. 11.

de simpl.

medic.

Dioscor.

M. M. l. 2.

c. 17.

Plin. H. N.

l. 28. c. 1. l.

29. c. 6. l.

30. c. 7.

Vfus in va-

rijs.

Egnat. ver.

hiflor. l. 6.

lepra easdẽ inhumat donec vermes enascantur: mox cum his exsiccat, & drachmam pulverizatarû cû syrupo de melle leprosis exhibet. Tagautius, strumis & elephantiafi iisdẽ medetur: Porta vulneribus & nervis incisis quòd dissecti brevi tẽporis spaciò coalescât.

Spoliû insigniû virium esse credidere antiqui. Ad casum pilorum cõducere, ait Galenus; ad claritatem oculorû, si eodẽ fricentur, Plinius: ad odontalgiam in aceto decoctum, & dentes eradicandos iisdẽ. Aurium dolori, seu in vino seu in oleo, coctû, prodesse Dioscorides & Theophrastus; cum capitib. papaveris Archigenes. Suffimentum partus difficultates solvit. Ex sententia Plinij, lûbis parturientis alligari debet. Villanovanus suffitu ex eodẽ, cum opopanace, myrrha, galbano, Castoreo, stercore columbino vel accipitris facto, fatum mortuum & vivum educit.

Olim iisdem in puniendis parricidis utebantur. Ægyptii in foveam serpentib. plenâ eos conjiciebant: Romani, culeo, cum simia, gallo gallinaceo & serpente infutos, in mare projiciebât. In India, teste Linschotano, à circulatorib. circûferûtur, qui eosdẽ in instrumenti musci sonum tripudiare cogunt. Anibal, injectâ magnâ vi serpentum fictilibus inclusorû in Romanorum classẽ, effecit, ut Antiochus victoriam reportaret. *Adipe* veterinarij ad equor. stranguriam utuntur: aucupes *carnib.* ut aves citius pennas mutant. Albertus multa ex partibus, sed nugatoria, cõficit, quæ apud Ambrosinum vide. *Ovum* quidam eques corâ Claudio litigaturus, spe vin-

tum sit. Circa fluvium Senegæ capras, alibi cervos devorare dicuntur. *Colorem* species, in septentrionalibus regionibus variegati vagantur.

Ælian. H. A. l. 17. c. 2. In India, si Ælianum sequimur, vitis à capite ad caudam pertinentibus, alijs ereis, alijs aureis & argenteis conspicui sunt. Thevetus quosdam rubescētes, cum squamis versicoloribus, alios instar foliorum lauri virides facit. Huius coloris & apud Valesianos inveniuntur.

Arist. H. A. l. 2. c. 14. Hefychius *Saurin* as vocat. A loco sunt aquatici, terrestres, quorum alij montosis, alij planis, alij quercetis, alij latibulis circa fagos, & corylos delectantur, & amphibij. Observavit

Bellonius circa Abydenum portum genus quoddam, rubore in levophæo refulgens, quod interdum in mari vivebat, noctu continentem, quietis causam petebat. *Odon* ratione sunt quidam exijs moscati, ut serpens Æsculapij, & *Cusso* cypriorum, capite magno, & corpore exosse. Integrum agnū devorat, hoc absumpto, ad arborem se tamdiu fricat, donec ossa excusserit. *Noxam* si attendas, in Hispaniola in nocui versantur: circa regiam Peruanam Cusco, incantationibus ligati, nihil damni, postquam ferè integrum exercitum delevissent, inferunt. Inter hos Nicander *Moluros* reponit, *Aspetu* sunt vario. Alij habent oculos prægrandes, ut Lybici; alij parvos & locustis similes: nonnulli sanguineos & luteo colore suffusos. Ad accidentia pertinet, quod quidam sunt ore acuto, quidam vasto. Nonnulli cono tanquam crista in vertice superbiant: nonnulli cornua habeant; quidam denique alas. Huc pertinet molitrosi, qualis unus biceps, in Musæo Bononiensi videndus, alter latissimi corporis, & cōprescaudam, quorū icones damus.

Ambrosin. de serp. p. 6

TITVLVS II.

De Serpentibus in specie.

CAPVT I.

De Serpentibus terrestribus.

ARTICVLVS. I.

De Vipera.

Primaria ferè Serpentum Differentia est, in quatuor in *Terrestres* & *Aquaticos* & *Dubios* distinguntur. *Terrestres* sunt, *Vipera*, *Ammodontes*, *Cerastes*, *Hæmorho*, *Seps*, *Aspis*, *Dipsas*, *Scytale* & *Amphisbæna*, *Cacilia*, *Cæchr*, *Acetia Dryinus*, *Elaps* & *Anguis Æsculapij*. His *Indicos* adde. *Viperam* quidam ab eo quod vi pariat, nomen sortitam putant: quasi à fætu exeunte, alvus matris laceretur: alij, & quidè verissimè, quasi viviparam, & per contractionem *viparam* & *viperam*, quod ova intra alvū concipiat, deinde fætu vivum enitatur. Græcis est aliquando per excellentiam *ὄφις*, ut in Oppiano animadvertere est, cōmuniter *ὄφις* mas, & *ἑχιδνα* fæmina, *παρὰ τὸ ἑχέειν ἐν αὐτῇ τὴν γυνὴν ἄγει θάλασσαν*, quod ad interitum usque fætu contineat, cui fabulæ apud veteres fides data; vel *παρὰ τὸ ἑχέειν ἐν αὐτῇ τὸ ζῶον*, quod animal intra alvum contineat, quod verissimū. Hodierni Græci Echendras, teste Bellonio, nominant. Itali

Ambrosin. de serpent. l. 1. c. 2.
Nomen.

Aristot. l. 1. de generat. Animal. c. 10.

Maraffos. An rectè, alibi disquiretur. Svestanus *Scorzonem* vocat: Nicolaus Florentinus *Scorzonen*; quod vocabulū, apud Italos, omnibus serpentibus commune est. Arabes *Thyri* vocabulū ipsis imponunt. Unde Andromachus viperinos pastillos, ferinos appellavit, à Græco *ῥῆπ* seu *ῥῆπον*. *Nepam* non esse, certum.

Serpens est venenosus longitudine cubitali, sæpè prolixiore, colore subflavo, pluribus maculis consperso, *Mari* caput angustum & acutū, collum crassius, corpus tenuius. *Cauda* ritu aliorum serpentū gracilescit, non tam acervatim ut fæminæ. Squamis circa extremitatē superioribus tegitur, quas ira percita erigit. *Meatus* excrementorum in cauda est ventri propinquior. Canini *dentes* duo, fæminis plures. *Galenus*, fæminas subflavi coloris, admodū agiles, collū maximè porrigētes, oculis subrubētibus, inverecūdis, & ferini intuitus facit. *Æt*, multis notis instar rotarū exornatas, magnitudine Cubitali caudā acervatim in tenuitatem definēte, alvo sinuosiore, & quæ caudā innixa gradiatur. *Cardanū* si sequamur, erit præstantissimis viperis caput latum, erectum, & cavū, figurā rhombi, oculi vivaces, breve corp⁹, & ad motū alacre. *Amatus Lusitan⁹* in Hispaniā cubitalē esse scribit, capite presso & acuto in quo verruca cōspicitur, dorso veluti quadā catenā depicto.


Descriptio.

Galen. de Theriaca ad Pisonē.


Anatomica ipsius Ambrosini verbis exequemur. Sic autē ille. In dissectione viperini capitis *cerebrum* subnigri coloris cōspicitur, & adeo pusillū, ut vix quantitātē quatuor granorum milij adæquet. propterea hoc animal à quibusdā calidū, & siccū esse esse creditur: quod immodicus calor cordis a frigideitate cerebri temperari nequeat. *Auriculis* viperæ carēt, sed earum loco quasdā cavernas habet: Etenim Plinius tradidit animalibus fætu vivū parientibus, aures inesse eminetes, exceptis cartilagineis, vitulo marino, Delphino & viperis quæ quibusdā foraminibus pro auribus, utuntur. Quoad *dentes*, Gelsnerus tradit quosdā viperinū caput secantes, quatuor oblongos dentes in superiori mādibulā spectasse; cum alij dētes tū superioris quā inferioris maxillæ, ob parvitatē, non appareant, sed maxillam aspericando asperitatem, & stridorem percepisse; Hos pusillos dentes, tam in vivis, quam in mortuis viperis, nisi auferatur *vesicula*, in qua conduntur, nemo unquam intueri poterit. Baldus Angelus Abbatius quatuor dentes caninos tam mari, quam fæminæ viperæ attribuit, cum hoc tamen discrimine, ut mas duos habeat deciduos: Ideoque non admirandum esse putat, si interdum maris dentes duos tantummodo esse conspiciamus.

Quamobrem Authores Nicandrum secutos procul dubio hallucinari statuit, quando pronunciat, demorsos à viperā mare, duo tantum ulcuscula, & à fæminā quatuor reportare; cum duos dentes maribus, & quatuor fæminis semper inesse crediderint. Et tamen


Vipera *Mas*





Vipera *Fæminina*



Ammodytes



Serpens *Biceps*



men vipera mas, antequam illi duo dentes cadant, quatuor etiam vulneribus possit patientes afficere. Hæc autem sententia si sit vera nec ne, indiget animadversione; quandoquidem nostri circulatores vipers quotidiè pertractantes, duos tantum dentes tam in mare, quam in fæminâ se observasse referunt. Nos igitur decocto viperæ capite, & carne diligenter à craneo separata, duplex dentiū genus conspiciatī & sumus: unū, quo hæc bestia se tuetur, & mordendo venenat; alterum quo ad mordendū utitur. Hi autem sunt dentes quatuor supra triginta ab Antiquis non descripti: cum in gingivis occultati non appareant. Horum a. talis est ordo; nam præter quatuor caninos nominatos, duodecim in superioribus maxillis, nimirum sex in utroque latere conspiciuntur; suntque ad instar ferre versus gulam, & aliquanto majores dentibus armantibus, inferiores maxillas. Inferiores dentes sunt viginti duo, nempe undecim in quolibet latere, quo circa quando authores memorant vulnera à dentibus viperinis inflicta, eos de caninis dentibus verba facere opinamur; Cum cæteri dentes horum animalium illis ignoti fuerint. Quandoquidem veteres, harum ferarum caninos tantummodo dentes, descripserunt, quos vidimus perforatos, & vesicula veneno plena munitos, quæ novo toxico quotidie repletur, dum primum in ictu consumptum fuerit. Etenim quemadmodum in singulis animalibus aliqua semper generantur excrementa, quæ per partem determinatam extra corpus trudentur: Ita etiam viperæ venenosum excrementum per dentes evacuant, dum se defendentes, mordendo cætera animalia venenant. Hoc etiam præstat scorpio, qui in caudâ aculeum perforatum instar dentium anteriorum viperæ possidet, & sub aculeo habet vesicam veneno plenam, quod punctis animalibus communicat. Neque mirandum est vipers caninis dentibus ad tutelam tantum sibi met à naturâ comparasse: siquidem accidit idem pisci pistrici rostrum hinc inde dentatum possidenti, quos dentes huic animanti non nisi ad tutelam naturæ impertita est. Quod autem nostri viperarum venatores pronunciant, se tam in mare, quam in fæminâ duos tantum dentes conspiciatos fuisse, inde natū esse credimus: quoniam cæteri in gingivis latentes non videntur: deinde hoc genus hominum tanquam rude, & imperitum nunquam anatomen harum bestiarum exercuit. Pulmo in viperis veluti vesicula oblonga membranosa, varijsq; meatibus plena, & aëre turgens observatur. Item cor grandiusculum apparet, & mobile in pericardio; hocq; quando animal alexipharmaco necatur cōcitatus movetur, quā si ferro interimeretur, ob repugnantiam alexipharmaci ad venenum. Iecur est oblongum venâ admodum crassâ per medium per-

currente, quæ dimanans à corde ad extremâ usq; caudâ serpentis progreditur. Ibi etiam visuntur *venæ* seu *arteriæ*, quæ à corde & hepate ad gingivas, s. vesiculas dentiū ascendant; cum in *vesicâ felleâ* tanquam in propriâ lacuna contineatur hæc materia venenosa, quæ inde ad dentes defertur. Possumus a. necessariò attestari hanc venenosam materiam in cysti fellis residere, quoniam neq; hepar, neq; cor, neque sanguis viperæ venenū participât. *Ventriculus* sub jecore latitat, cui *oesophagus* adhæret cum asperâ arteriâ ad pulmones usque descendente. *Splen* colo intestino annectitur. *Colon* flexuosum est, & in latere sinistro terminatur. *Rectum* a. intestinum à fundo ventriculi dimanare videtur.

Et tantum de viperæ anatomia Ambrosii Severinus. Severinus in viperâ se fecit sequentia observavit. Oblonga omnia viscera, item & ova. *Zootom. part. 4. pag. 359.* Primum exerto spolio ad cervicem, aspera arteria per longum annexa pulmoni eodem ductu. *Cordis* substantia alba tota, nisi quantum auriculæ rubent, quarū sinistra amplior. Aqua in pericardio; Cor triangulare complanatum. *Fellis vesicula* non hepatis affixa, sed Ecphyli. *Renes* oblongi duo ex multis quasi renibus conflati, inferiores hi visceribus omnibus, & propè anum. *Testes* oblongi, formâ æmulantes Pineæ semen. Reperti in utero tres *catuli* viperini, qui à matre biduo jam mortuâ superstites inventi sunt, caudis micantes. Ad hæc ova multa ad vasa spermatica utrinq;: hinc autem descendunt rectè per medios renes. Intra caudam vesiculæ duæ plene viru illo. *Intestina* rubra, carnosa præsertim supernè convoluta in quosdam veluti nodulos. In *ventriculo* & intestinis herbaceum alimentū. *Ventriculi* tunica internè rugosa, rugæ autem rectæ, quæ postea diductæ utraq; tunica faciliè explicantur. Differentia sexus in hoc genere: Mari cauda longior; fæminæ brevior & latior. Mari sub caudam vasa quædam oblonga, interne spinosa; genitalia non dubito. In multis inveniuntur regionibus, Italia, Hispania, India, Melita, Cipro, Chio, circa Amyclas, ubi insanabilis earū morsus, & alibi. Aristoteles tamen in Creta nasci negat. Cordus in Germania nunquā conspicius est. In insula Syagro Arabiæ promontorio vicina, magnæ reperiuntur. Marfi populi qui impunè vipers tractabant, alibi generari negavere. Delectantur in primis locis montanis; idè circa Haliacmon Macedoniæ fluvium, & in Euganeis Patavinis montibus inveniuntur; aquis, populeis arboribus, & locis, quarum carnes Galenus pro antidoto reprobat, quod ægrotantibus sitim intolerabilem faciant. Hyeme latent, non tantum sub saxis, immotis fimo præsepibus, ut Aristoteles & Virgilius prodideret; sed etiam statuis lapideis, & terris. Rustici sanè Itali, dum ligonibus profundiora terræ tentarent, simul glomeratas sæpissimè invenerunt. *Martial. l. 3. Epigr. 16.*

*Locis
Solin. in
Polyhist.
Aristor. in
Mirabil.*

*Martial.
Epigr. l. 4.
59.*

*Arist. H. A.
l. 10. c. 62.
Virgil. Ge-
org. l. 3.*

*Martial. l.
3. Epigr. 16.*

Vitus. In montanâ Phœniciæ parte herbis vesci, *Pausan. in* & quasdam radices vorare, *Pausanias* prodit. Non tantû herbis, sed & crucis, buprestib⁹, Câtariidib⁹, phalangijs, mure araneo, *Theriaca* stellionibus, scarabeis, bufonibus, *Galenus:* ad *Pisonem* scorpionibus *Aristoteles*; picæ pullis, *Albertus*, Circulatores furfuribus in pyxidibus & caplis alunt. Venatores quidam decimo quinto quoque die potum cum herba quadam præbent. Vino delectari alijs visum: *Temperamentum.* diu à potu abstinere, *Bellonio*. Frigidas videtur *Aristoteles* facere, quòd hyemalitent: calidas, *Galenus*, *Dioscorides* & alij. Hyme minus tales esse, facile exinde colligas, quia non mordent: æstate, & præsertim sub ortum Caniculæ vehementer æstuant, quia fervorem quandam præferunt. *Arif. Gener. animal. l. i. c. 9. 10. Galen. de simplic. medic. facult. l. 11. c. 2.* Ex capite Cerberi natus, antiquitas olim fabulata est. Ex cinere vel putri materia oriri posse vel exinde colligitur, quòd *Julio Obsequente* prodente, bello civili inter *Augustum* & *Antonium* durante, Pado effuso, ingens viperarum copia proruperit. Ex congressu maris & fæminæ progigni, tam certum, quàm falsum, cum murena pisce *Conpl. H. N. l. 10. c. 62.* gressum morfu avelli, quod apud *Plinium* *Ælian. H. A. l. 1. c. 24. l. 1. c. 16.* legimus, cui *Herodotus*, *Nicander*, *Plutarchus*, *Solinus*, & alij aditipulantur. Ova prius unius coloris & mollia, iñstar ovorum piscium concipiunt, & quidem supernè verus præcordia: tempore parturitionis, catuli sine ullis membranis quandoque quod eas scindant, aliquando iisdem obuoluti, produnt. Vere postquam concepere, fætum ad mensem Augusti gestant. Viginti, unâ die, & quidem singulos parere, apud *Aristotelem* habemus. Tres supra viginti ab una in pyxide servata prodijisse, quarum quæ à matre separatæ erant, inertes reddebantur, *Iohannes de Savijs* pharmacopæus auctor est. *Antipathia* Cum multis occultam inimicitiam exercet vipera. *Sputo humano*, si hoc in ipsius ventrem penetret, interficitur. *Mulier gravidæ* si occurrat, abortum inferre creditur. Solâ voce facit ut mures musculos suos aliò deportent. Cum ossifraga, & testudine dimicat, illa sibi herbâ loncho simili providet: hæc origano vel rutâ medetur. Cum scorpione congregi, & mutuo se conficere, *Caspar Wolfius* observavit. *Allij*, scordij, & alliaræ odorem vitare, apud *Theophrastum* habetur. Arum radix manibus affricata morsus viperarum arcet, si *Avicennæ* credimus. *Sinapi* iisdem adversari, idem affirmat. Ramulo fagi leviter contactæ obstupefcunt, si *Lacunarum* fides est. Inter folia fraxini & prunas constitutæ, igni se potius credunt. Solani succo *Galenus* manus contra eandem madefaciebat. Rhafes viperæ oculos smaragdû intuentes liquefieri, & mox à capite effluere, reliquit.

Ad *Naturam* spectat, quòd vere & autumnos polium deponunt: tempore vernali oculos faniculo affricant, ut visus in cavernis contractam hebetudinem tollant; & quòd gravissimum odorem spirant. Fæminæ, quæ pingvior mare, acerbior morsu est.

Venenatum animal esse, superius diximus: signa varia occurrunt. Aulicus quidam apud *Rhodiginum* in colorem porraceum incidit. Purpurascentem vel amethystinum aliquando contrahi apud *Grevinum* habemus. Excitatur aliquando singultus, quòd vetricul⁹ veneni acrimoniâ vellicetur. Semper ferè corpus intumescit, pustulæ ambustis similes erumpunt, sitis infestat, gingivæ cruore suffunduntur, jecur inflammatione vexatur, biliosi vomitus succedunt, vertigo, sopor, tremor, & urinæ difficultas, ut *Dioscorides* & *Ægineta* reliquit, oboriuntur. Ubi verò virus totum occupavit corpus, unguis ob caloris defectum livescunt & corpus grandinem congelantem sentit. Remedia varia habentur. Amatus *Lusitanus* partem ictam scarificari iussit: emplastrum ex alijs cum theriaca eidem imposuit, & drachmas tres theriacæ in vino meraco propinavit. Ex animalibus laudantur Caro viperina quæ interaneis abjectis cocta, virus ad cutem pellit; cervi maris genitale, mustelæ venter salitus; cancri fluviatiles vel marini; sangvis fulicæ cum oleo potus; testudinis marinæ cum aceto; patientis urinæ hausta; sterces caprinum in aceto decoctum, vel in vino tritum, butyrum denique vetus. Inter plantas plurima quoque occurrunt. *Anchusa* manducata & in fauces projecta eadem perimit. *Abensina* radicem, folia, & corticem *Aristolochiæ* laudat; *Crollius*, aconitum cum vino tepido: *Alij* bistortam, quæ contortis suis radicibus, convoluti serpenti figuram repræsentat: *Matthiolus* *Bryoniæ* radicem, Citri semen & succum *Rhafis*: *Ferulam* & juniperi baccas *Dioscorides*: *Plinius* *Tragoriganum*: *Claudius Imperator*, taxum arborem: semen viticis *Ægineta*; acetum calefactum & potum *Dorotheus* *Helius*. Ex Compositis sunt plurima, inter quæ præcipua, *Theriaca* *Andromachi*, & *Antiochi* *Philometoris*; *Antidotus* *Apollodori*, rusticici medici, *Avicennæ* & *Galli*, quæ ex Arabia redux *Cæsari* obtulit. Pulvis viperinus quem nobis Medici describunt, plurimum quoque prodest. Extra applicantur, humani dentes in pulverem redacti: urina humana calida: Caput viperæ amputatum, & impositum: emplastrum ex ranis: simus caprinus in aceto dissolutus, & pellis recens ab eadem detracta: herba de *Corso* nuper apud *Hispanos* inventa, quam *Cantabricam* quidam autumant: radix ebuli in vino elixata: fraxini cinis cum succo foliorum permixtus: furfures cum aceto & rutâ decocti: lignum

Natura.
Arif. H. A.
l. 8. c. 17.

Venenum.

Remedia.
Amatus
Lusit. Cu-
rat. Cent. I

Plin. H. N.
l. 22. c. 20.
& 21.
Crollius de
signaturis.

Dioscor. M.
M. l. 3.
Plin. H. N.
l. 20. c. 17.

Galen. de
simpl. me-
dic. l. 6. c.
10.

gnum colubrinum in Malabar nascens. Ided ab incolis per arva decurrentibus, circumfertur. Laudantur etiam, melissæ folia eorumque succus; origanum viride contusum, radix personata in vino elixata: pix liquida cum sale: decoctum pulegij: serpillum cum aceto, & cætera, quæ in Ambrosino vide. Pareus theriacâ antiqua in aqua vitæ dissolutâ, usus est. Sunt qui cantus tibicinum pro remedio ponunt. Amatus Lusitanus cujusdam fontis mentionem facit, in quo si

Pareus. l. 20. c. 16. ægri demergantur, evadunt. Fallopius observavit, (verba sunt Ambrosini) dum ruri versaretur, filium agricolæ à vipera in pede morsum. Unde pater senex ad clamorem filij accurrens, arcto vinculo pedis digitum vinxit: deinde digito scarificato cum nō mediocri sanguinis effusione, iussit sibi locum ostendi, ubi à vipera filius percussus fuit: quo cognito, ut læsum pedem ibi natus figeret, imperavit; postea ducendo ferulam circum pedem, illius figuram obfignavit, & sumptogladio, cretam intra vestigij lineam radens, in vino dissolutam, filio propinavit: quo præsidio juvenis, vomitione & alvi fluore correptus, tandem sanatus est. Virus quoque à vesiculis gingivarum exemtum & fel ejusdem insicere, Gesnerus author est, qui puellam quandam, quæ carnem cui viperina permixta erat, gustaverat, in opisthotonum & alia gravia symptomata incidisse scribit. Fel confestim animi deliquium generat. Semen citri faccaro conditum, scordium, cornu cervi, lapis bufonites, hyacinthus, sapphirus, smaragdus, interpretæ servativa recensentur. Et olim & nunc in mensis habuere locum. Ægyptij, Troglodytæ, & Arabes, passim eas conquirebant.

Fallop. l. de tumoribus. Cirni, Indi ultra flumen, & qui montem Athon incolunt, Æthiopes, Macrobij, & Seres ipsi dem alebantur, ided ad centum quinquaginta annos vitam prorogabant. Athenæus ritu piscium conditas apponit. Nunc in Italia à mulieribus ob pulchritudinem expectantur.

Ælian. H. A. l. 4. c. 7. In Medicina multus earum usus, ex ipsi- que pulveres, sales, olea, extracta, tincturæ, & vina, parantur. Caput collo appensum contra gutturis affectus, & anginas celebratur. Cerebrum in pellicula ligatum dentitionem præservat. Ossâ in purpurea sindone ligata, & portata, epilepsiam & vertiginem amoliuntur. Spolium, medicamentis opthalmicis miscetur: ex sententia Hippocratis, in delenda impetigine commendatur. Pel- lis ad facilitatem partus valet, si dextro parturientis femori alligetur. Pinguedo, si dilige- ter præparetur, ad oculorum suffusiones, ortum, cutis eminentias, in paralyti, com- mendatur. Carnes quidam ad vitam pro- ro-

Vfus in Ci- bis. Viperarum differentias, Color, & magnitu- do dabant. Ratione Coloris, Pausanias in Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, ru- bras, rufas, albas, & nigras observavit. Car- danus rubræ crassæ & brevis, Milort ab Italis dictæ meminit: sed Mathioli, innocentis- simum animal esse, domibusque familiare, addit. Magnitudinis respectu, in Hispania, nonnisi cubitales invenitur, si Amato Lu- sitano credimus. In regione Troglodytica, tan- longitudo decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiaca- rum pelles tomæto repletæ duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico uni- co in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in lynce- cipite, capite latiore & compressiore esse, & à cæcatis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem il- lum, qui Escurzo Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipedalari, capite crasso & quadrato, ore magno & hiante, lingua nigrâ & mucronatâ, & tardè incedit, in viperarum censum referri non po- terit. De Viperis Chiappæ ita Nierembergius, H. Exor. l. Genus 12. c. 3.

Plin. H. N. l. 7. c. 2. In Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, ru- bras, rufas, albas, & nigras observavit. Car- danus rubræ crassæ & brevis, Milort ab Italis dictæ meminit: sed Mathioli, innocentis- simum animal esse, domibusque familiare, addit. Magnitudinis respectu, in Hispania, nonnisi cubitales invenitur, si Amato Lu- sitano credimus. In regione Troglodytica, tan- longitudo decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiaca- rum pelles tomæto repletæ duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico uni- co in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in lynce- cipite, capite latiore & compressiore esse, & à cæcatis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem il- lum, qui Escurzo Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipedalari, capite crasso & quadrato, ore magno & hiante, lingua nigrâ & mucronatâ, & tardè incedit, in viperarum censum referri non po- terit. De Viperis Chiappæ ita Nierembergius, H. Exor. l. Genus 12. c. 3.

Athen. Dip. nos. l. 8. In Medicina multus earum usus, ex ipsi- que pulveres, sales, olea, extracta, tincturæ, & vina, parantur. Caput collo appensum contra gutturis affectus, & anginas celebratur. Cerebrum in pellicula ligatum dentitionem præservat. Ossâ in purpurea sindone ligata, & portata, epilepsiam & vertiginem amoliuntur. Spolium, medicamentis opthalmicis miscetur: ex sententia Hippocratis, in delenda impetigine commendatur. Pel- lis ad facilitatem partus valet, si dextro parturientis femori alligetur. Pinguedo, si dilige- ter præparetur, ad oculorum suffusiones, ortum, cutis eminentias, in paralyti, com- mendatur. Carnes quidam ad vitam pro- ro-

Galen. l. 7. de Compos. Medic. f. loca. Viperarum differentias, Color, & magnitu- do dabant. Ratione Coloris, Pausanias in Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, ru- bras, rufas, albas, & nigras observavit. Car- danus rubræ crassæ & brevis, Milort ab Italis dictæ meminit: sed Mathioli, innocentis- simum animal esse, domibusque familiare, addit. Magnitudinis respectu, in Hispania, nonnisi cubitales invenitur, si Amato Lu- sitano credimus. In regione Troglodytica, tan- longitudo decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiaca- rum pelles tomæto repletæ duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico uni- co in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in lynce- cipite, capite latiore & compressiore esse, & à cæcatis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem il- lum, qui Escurzo Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipedalari, capite crasso & quadrato, ore magno & hiante, lingua nigrâ & mucronatâ, & tardè incedit, in viperarum censum referri non po- terit. De Viperis Chiappæ ita Nierembergius, H. Exor. l. Genus 12. c. 3.

gandam facere scribunt, quibus Renodæus refragatur. Alij cum faniculo decoctæ jusculo, visum imbecillū firmant. Ejusdem usu, servus Crætetis Medici, cui caro ab offi- bus in morbo abscesserat, sanatus est, si Por- phyr. phyr. fides. Plurimum siccare, & excre- menta ad cutim detrudere, ided elephantia- cis, & alijs qui cutaneis morbis laborant, summè proficuum, apud plurimos Medicos invenies. Galenus aliquot exempla pro- didit, qui cum vinum in quo vipera extincta bibissent, liberati sunt. Cardanus eadē phthi- ficos curavit. Fuere qui Gallinas nutriebant, donec deplumarētur, quas postea egris exhibebāt. Matthæi de Gradib, & Gattinariū id fecisse proditū. Alij ex tali pastu ova propa- gādæ vitæ idonea, sibi pollicentur. Pulveres & alia quomodo parentur, vide apud Ambrosinum, qui ex authoribus collegit. Pul- verem sitim excitare, ipsi experti sumus. Ad aquas hydro picorum exsicandas adhiberi, apud Petrum invenies. Cinis inter cau- stica à Fallopio censetur. Aquam Gallelij pharmacopæi ibidem vide. Baldus Angelus in dolium vini injectas, corruptum pristino nitori restituere, idque in cella Cardinalis Ursini accidisse, scripsit. Ad theriacam sin- gulari ratione præparantur. Primus Andro- machus adhibuit, Antoninus Imperator re- vocavit. Galenus egregiè descripsit. Con- sultis placet Ambrosinum, sed & nos ante Theriacâ Andromachi, exposuimus, cū ejus Lesnæ in Polonia dispensationi præflessemus.

Viperarum differentias, Color, & magnitu- do dabant. Ratione Coloris, Pausanias in Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, ru- bras, rufas, albas, & nigras observavit. Car- danus rubræ crassæ & brevis, Milort ab Italis dictæ meminit: sed Mathioli, innocentis- simum animal esse, domibusque familiare, addit. Magnitudinis respectu, in Hispania, nonnisi cubitales invenitur, si Amato Lu- sitano credimus. In regione Troglodytica, tan- longitudo decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiaca- rum pelles tomæto repletæ duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico uni- co in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in lynce- cipite, capite latiore & compressiore esse, & à cæcatis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem il- lum, qui Escurzo Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipedalari, capite crasso & quadrato, ore magno & hiante, lingua nigrâ & mucronatâ, & tardè incedit, in viperarum censum referri non po- terit. De Viperis Chiappæ ita Nierembergius, H. Exor. l. Genus 12. c. 3.

Viperarum differentias, Color, & magnitu- do dabant. Ratione Coloris, Pausanias in Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, ru- bras, rufas, albas, & nigras observavit. Car- danus rubræ crassæ & brevis, Milort ab Italis dictæ meminit: sed Mathioli, innocentis- simum animal esse, domibusque familiare, addit. Magnitudinis respectu, in Hispania, nonnisi cubitales invenitur, si Amato Lu- sitano credimus. In regione Troglodytica, tan- longitudo decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiaca- rum pelles tomæto repletæ duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico uni- co in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in lynce- cipite, capite latiore & compressiore esse, & à cæcatis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem il- lum, qui Escurzo Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipedalari, capite crasso & quadrato, ore magno & hiante, lingua nigrâ & mucronatâ, & tardè incedit, in viperarum censum referri non po- terit. De Viperis Chiappæ ita Nierembergius, H. Exor. l. Genus 12. c. 3.

Viperarum differentias, Color, & magnitu- do dabant. Ratione Coloris, Pausanias in Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, ru- bras, rufas, albas, & nigras observavit. Car- danus rubræ crassæ & brevis, Milort ab Italis dictæ meminit: sed Mathioli, innocentis- simum animal esse, domibusque familiare, addit. Magnitudinis respectu, in Hispania, nonnisi cubitales invenitur, si Amato Lu- sitano credimus. In regione Troglodytica, tan- longitudo decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiaca- rum pelles tomæto repletæ duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico uni- co in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in lynce- cipite, capite latiore & compressiore esse, & à cæcatis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem il- lum, qui Escurzo Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipedalari, capite crasso & quadrato, ore magno & hiante, lingua nigrâ & mucronatâ, & tardè incedit, in viperarum censum referri non po- terit. De Viperis Chiappæ ita Nierembergius, H. Exor. l. Genus 12. c. 3.

Viperarum differentias, Color, & magnitu- do dabant. Ratione Coloris, Pausanias in Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, ru- bras, rufas, albas, & nigras observavit. Car- danus rubræ crassæ & brevis, Milort ab Italis dictæ meminit: sed Mathioli, innocentis- simum animal esse, domibusque familiare, addit. Magnitudinis respectu, in Hispania, nonnisi cubitales invenitur, si Amato Lu- sitano credimus. In regione Troglodytica, tan- longitudo decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiaca- rum pelles tomæto repletæ duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico uni- co in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in lynce- cipite, capite latiore & compressiore esse, & à cæcatis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem il- lum, qui Escurzo Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipedalari, capite crasso & quadrato, ore magno & hiante, lingua nigrâ & mucronatâ, & tardè incedit, in viperarum censum referri non po- terit. De Viperis Chiappæ ita Nierembergius, H. Exor. l. Genus 12. c. 3.

Viperarum differentias, Color, & magnitu- do dabant. Ratione Coloris, Pausanias in Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, ru- bras, rufas, albas, & nigras observavit. Car- danus rubræ crassæ & brevis, Milort ab Italis dictæ meminit: sed Mathioli, innocentis- simum animal esse, domibusque familiare, addit. Magnitudinis respectu, in Hispania, nonnisi cubitales invenitur, si Amato Lu- sitano credimus. In regione Troglodytica, tan- longitudo decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiaca- rum pelles tomæto repletæ duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico uni- co in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in lynce- cipite, capite latiore & compressiore esse, & à cæcatis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem il- lum, qui Escurzo Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipedalari, capite crasso & quadrato, ore magno & hiante, lingua nigrâ & mucronatâ, & tardè incedit, in viperarum censum referri non po- terit. De Viperis Chiappæ ita Nierembergius, H. Exor. l. Genus 12. c. 3.

Viperarum differentias, Color, & magnitu- do dabant. Ratione Coloris, Pausanias in Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, ru- bras, rufas, albas, & nigras observavit. Car- danus rubræ crassæ & brevis, Milort ab Italis dictæ meminit: sed Mathioli, innocentis- simum animal esse, domibusque familiare, addit. Magnitudinis respectu, in Hispania, nonnisi cubitales invenitur, si Amato Lu- sitano credimus. In regione Troglodytica, tan- longitudo decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiaca- rum pelles tomæto repletæ duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico uni- co in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in lynce- cipite, capite latiore & compressiore esse, & à cæcatis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem il- lum, qui Escurzo Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipedalari, capite crasso & quadrato, ore magno & hiante, lingua nigrâ & mucronatâ, & tardè incedit, in viperarum censum referri non po- terit. De Viperis Chiappæ ita Nierembergius, H. Exor. l. Genus 12. c. 3.

Viperarum differentias, Color, & magnitu- do dabant. Ratione Coloris, Pausanias in Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, ru- bras, rufas, albas, & nigras observavit. Car- danus rubræ crassæ & brevis, Milort ab Italis dictæ meminit: sed Mathioli, innocentis- simum animal esse, domibusque familiare, addit. Magnitudinis respectu, in Hispania, nonnisi cubitales invenitur, si Amato Lu- sitano credimus. In regione Troglodytica, tan- longitudo decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiaca- rum pelles tomæto repletæ duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico uni- co in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in lynce- cipite, capite latiore & compressiore esse, & à cæcatis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem il- lum, qui Escurzo Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipedalari, capite crasso & quadrato, ore magno & hiante, lingua nigrâ & mucronatâ, & tardè incedit, in viperarum censum referri non po- terit. De Viperis Chiappæ ita Nierembergius, H. Exor. l. Genus 12. c. 3.

Viperarum differentias, Color, & magnitu- do dabant. Ratione Coloris, Pausanias in Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, ru- bras, rufas, albas, & nigras observavit. Car- danus rubræ crassæ & brevis, Milort ab Italis dictæ meminit: sed Mathioli, innocentis- simum animal esse, domibusque familiare, addit. Magnitudinis respectu, in Hispania, nonnisi cubitales invenitur, si Amato Lu- sitano credimus. In regione Troglodytica, tan- longitudo decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiaca- rum pelles tomæto repletæ duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico uni- co in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in lynce- cipite, capite latiore & compressiore esse, & à cæcatis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem il- lum, qui Escurzo Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipedalari, capite crasso & quadrato, ore magno & hiante, lingua nigrâ & mucronatâ, & tardè incedit, in viperarum censum referri non po- terit. De Viperis Chiappæ ita Nierembergius, H. Exor. l. Genus 12. c. 3.

Viperarum differentias, Color, & magnitu- do dabant. Ratione Coloris, Pausanias in Æthiopia & Lybia nigras esse scribit. Porta pro ratione soli in quo vivunt, virides, ru- bras, rufas, albas, & nigras observavit. Car- danus rubræ crassæ & brevis, Milort ab Italis dictæ meminit: sed Mathioli, innocentis- simum animal esse, domibusque familiare, addit. Magnitudinis respectu, in Hispania, nonnisi cubitales invenitur, si Amato Lu- sitano credimus. In regione Troglodytica, tan- longitudo decem & novem cubitorum exæquant si Æliano. In aurea Castella, viginti pedum sunt, si Cardano. Ægyptiaca- rum pelles tomæto repletæ duplo majores sunt nostris, si Bellonio. Alpinus in Illyrico uni- co in fronte cornu insignes, marem album gerere, fæminam duo tanquam acus in lynce- cipite, capite latiore & compressiore esse, & à cæcatis differre, scripsit. Sumunt & à veneno quidam differentiam, & serpentem il- lum, qui Escurzo Italis adferunt. Verum hic, quia est colore cinereo nigricante maculis distincto, longitudine sesquipedalari, capite crasso & quadrato, ore magno & hiante, lingua nigrâ & mucronatâ, & tardè incedit, in viperarum censum referri non po- terit. De Viperis Chiappæ ita Nierembergius, H. Exor. l. Genus 12. c. 3.

Genus viperarum Chiappa nutrit magnum, simile putrido ligno, pestilentem spiritum quatuor narium fenestris fundens. Quædam morfu equum intra diem occidunt, fuso per omnes juncturas sanguine. Sunt aliæ variegatæ, aliæ nigrae & prolixæ. Quemcumque momorderint, perimunt: crescente lunâ mitescunt, decresciente irritantur. Aliæ sunt pallidæ, nigris distinctæ lineis, interstinctæ maculis albis; morfo ab ijs decedit per frusta caro. Alijs tanta pestis superest, ut si fuste contingantur, subeat virus usque ad brachium. Aliæ hujus sunt conditionis, ut si mordeant mane, morfus evomens sanguinem pereat; sub vesperum, non sunt lethales. Visus ibi serpens, in cuius utero inventi triginta & unus factus.

ARTICVLVS II.

De Ammodyte.

Nomen.
Ambrosin.
l. i. c. 3.

Refertur hic tum ratione figuratum partus ad viperarum genera. Vocatur à Latinis *Ammodytes* vocabulo à Græcis desumpto, qui & ἀμμοδύτης, ψαμμοδύτης, ἀμμοδύτης, per ypsilon, & ἀμμοδύτης per iota appellantur; ibi ἀμμοδύτης καὶ δὲ δύνειν quoniā arenam subeat: hic ab ἀμμος & δούρτω perfodio. Actio est *Cenchrias* vel potius *Cenchrias* ab asperitate miliari, quod cauda ipsius instar granorum milij dura sit. An ἀμμοβύτης apud Lexicographos sit ab eo diversus, vel ἀμμοβύτης apud Suidam difficile est dicere. Nonnulli Ammoditem, Centriam, aut Centritem, ob duritiem caudæ dici debere innuunt. Cum νέμεζα quædam lignorum & lapidum vitia dicantur ut apud Theophrastum videre est: & Plinius, in quibusdam arboribus veluti in marmore, centra quædam, id est, durities clavis similes, & seris inimicas esse asseveravit. Ut ut sit, *cornutum* vocavi, quod eminentiam quandam cornu æmulantem supra nasum gerat; & *viperam Cornutam Illyricam*, quod in illa regione frequens sit, *monoceron* denique, propter calum qui summam oris partem exornat, certum est.

Descriptio. De ejus forma & Descriptione ita Ambrosinus. Olaus Magnus scriptis mandavit quoddam esse serpentes arenacei coloris, longitudine cubitali, maculis nigris distinctos habentes supra dorsum linearum vestigia: Deinde inter hæc serpentium genera Ammoditem commemorat. Quamobrem Lucanus colorem arenaceum hujus serpentis contemplans canebat hunc in modum. Concolor exultis atque indifferetis arenis Ammodites. Est igitur fera hæc viperæ perquam similis, capite tamen ampliore, & ma-

xillis latio ribus, & in superiore parte rostri, eminentiam quandam acutæ verrucæ similem gerens. Propterea vulgares, non injuria, cornutum serpentem vel cornutam viperam nuncuparunt. Ætius quoque Ammoditem cubitalis magnitudinis, & arenacei coloris esse statuit. Immo pellem maculis nigris præditam, & caudam præduram ei assignavit: Has a conditiones lector in iconem, quam exhibebimus melius & commodius meditari poterit.


In Lybia teste Solino, in multis Italiæ & Illyriæ locis, comitatu inprimis Goritienfi stabulatur. Quadramius observavit in Circulatorum capsulis, catulos ritu viperarum eniti.

De Veneni signis & remedijs, ita idem Ambrosinus. Olaus Magnus describens signa veneni hujus serpentis ea esse protulit, quando particula demorsa non solum ingenti dolore & tumore afficitur, verum etiam quando virus à vulnere effluit, & propterea si patiens tertio die non perit, quandoque ad septimam usque diem vitam protrahit. At Inter cæteros Autores, clariora hujus veneni signa assignat Matthiolus, dum percussos ab Ammodite, festina morte opprimi scribit, & à vulnere eorum, qui tam brevi tempore non obeunt, sanguinem primò dimanare, labiaque vulneris intumescere, deinceps paulò post saniem effluere, capitisque gravitatem, & animi deliquiū generari. Imo addit homines etiam robustos ab hoc serpente iustos triduo interire, & celerius qui à femina sauciantur. Quamvis observaverit nonnullos ab hoc serpente percussos ad septimam usque diem vitam protraxisse.


Præsidia hoc venenum castigantia, inprimis communia laudat Abensina; deinde tanquam Alexipharmaca, castoreum, cinnamomum, & radicem centaureæ cum vino exhibet. Item radicem Aristolochiæ longæ, & Gentianæ probat, postmodum pro emplastris parandis, mel exsiccatum, & tritum, radices gracatorum, centaureæ, semen lini, harmel, lactucæ, & volubilis præscribit. Verum Matthiolus admonet primò appositis cucurbitulis ambitum vulneris scarificandum esse, injectis tamen vinculis arctissimis partibus superioribus. deinde tanquam præsidium peculiare mentam ex aqua mulla potam, castoreum, casiam, & succum artemisiæ, cum aqua commendat. Præterea theriacam in potu exhibet, eademque vulnus linit, & tandem emplastris attrahentibus utitur. Imò in hac affectione cataplamata nomis, & ulceribus serpentibus con-

ferentia summo opere celebrat.


Cerastes Greuini Aldrou. Gebörnichte Schlang



Cerastes ex Libija. Aldrov.



Hæmorrhôus Parei



Seps Parei



ARTICVLVS III.

De Ceraſte.

Ambroſi. **E**Xcipit hic Ammodytē ſerpens, quod
I. c. 4. in locis etiam arenosis libenter ſtabule-
Nomen. tur. Nō ē a duob⁹ eminentijs, ἀπὸ τῶν ἐminentῶν,
 quę in fronte, cochlearum inſtar, ſed ſolidio-
Bellon. obſ. res habet, fortitus eſt. Ariſtotele Thebanum
I. 2. c. 54. colubrum, dici placitum eſt Bellonij. Olao eſt
 Criſtalis, Alberto M. Ceriſtalis, Sirtalis & Triſ-
 calis.

Deſcriptio. In Deſcriptione variatur. Plinius corpore
Pli. H. N. l. Ceraſtis eminere cornicula ſapē quadrige-
8. c. 23. mina ſcribit: quorum motu reliquo corpo-
Solin. Poly. re occultato ſollicitent ad ſe aves: Toti-
hiſt. c. 40. dem & Solinus habet. Albertus octo. Bello-
Bellon. Obſ. nius duo inſtar granorum hordei ſupra ocu-
2. c. 54. los, gemina minuta cornua imitantia, ponit.
 Addit, dentes viperinis ſimiles, dorſum lincis
 quibuſdam puniceis variegatum habere. Aë-
 tius cubitalis magnitudinis, longiſſimum,
 duorum cubitorum, corpore arenacei co-
 loris, juxta caudam deſquamato, partibus
 ventris per ordinem ſquamatis, reliquit.

Locus. Invenitur in Lybia, cujus mediterranea
 arida & fabulo ſerata ſunt. Olim in Ægyptū
 migrāſſe, & magnam regionis partem inha-
 bitabilem reddidiſſe, prodidere quidam, &
Lucan. ex his Lucanus. Bellonius dum Cairo in
Pharſal. montem Sinai iter faceret, copioſos con-
l. 9. ſpicatus eſt. In vijs per quā pluſtra agun-
Bellon. obſ. tur, frequens ſtabulatur, obvioſque aggre-
I. 2. c. 56. ditur & perimit.
Natura.

Duo iſpis congenita adſcribit Bel-
 lonius, nempe, quod ritu viperarum fœ-
 tus edant vivos, & quod inter omnia ſerpen-
 tum genera diutiſſimē ſitum tolerent. Grefſu
 flexuoſo volutari, quoniam breves & craſſi
 ſunt; mole corporea arenis obruta, exertis
Ælian. H. cornibus aviculas allicere, ut ſuperius dixi:
A. l. 16. c. Pſylos populos non attingere, adijci præte-
28. ritus poteſt.

Venenum. Demorſus à Ceraſte, parte affectā intu-
Dioſcor. l. 6 meſcit, & duritiem quandam inſtar capitis
 clavi cum puſtulis experitur. Mox ſanies
 modò nigricans, modò ſubpallida effluit:
 mens alienatur; viſus hebeſcit, inguina & po-
 plites dolent. Tenſis genitalibus convul-
 ſus obit. Inter remedia ponit Dioſcorides
 membri præciſionem. Ægineta & Aretæus
 ſcarificari & ferro ut inſuratur jubent. Celfus
 rutam ex aceto coctam, & nepetam cum ſale
 & melle permixtam laudat. Plinius pice cum
 polentā quandoque utitur, interdum Caſto-
 ris teſtibus cum panace & ruta in vino. Quo-
Ælian. H. modo id Pſylli frangant, apud Ælium habemus.
A. l. 19. c. Cornu ad præſentiam viperæ, na-
28. pelli, aut fellis Pardi exudare, Grevinus &
 Petrus de Abano affirmant.

Datur apud Nicandrum genus Ceraſtæ *Differētia.*
mutum vel quod cornibus careat; ſed ſic Ce-
 raſtes appellari non poſſet: vel quod non
 tam patenti habeat: & quidem grandiori-
 bus quàm alij maxillis inſtructum eſt, *Maxil-
 lare* vocatur. Forte illud quod ſuperius ex
 Matthiolo in Illyrico inveniri diximus,
 Thair Ægyptijs dictum, & quod in theria-
 ca, ut Proſper Alpinus ſcripſit, adhibent.
 Herodotus circa Thebas Ægyptias cornu-
 torum ſerpentum, parvi corporis meminit,
 qui ſacri dicuntur. Sed quia in poxij, ad
 Ceraſtas referri non poſſunt. Nos duas hic
 in Iconibus ſpecies exhibemus. Secunda
 ad Sereniſſ. M. Hetruria Ducem ex Lybia
 allata eſt, una fortē ex illis, de quibus Fau-
 conerius Anglus ad Geſnerum ita ſcribit. Allati
 fuerant ex Cairo tres ſerpentes ad nobilem
 quendam Venetum qui, diligentiffime in
 vitro magno & arena propē focum ſerva-
 bantur. Tres numero erant, quorum unus
 ferme erat triplo reliquis major, iſque *femi-
 na*, quę tum fortē quatuor, aut quinque ova in
 ipſa arena edidit magnitudine fere ovi co-
 lūbini; longitudo erat triū pedū, craſſitudo
 fere brachij: *caput* duos digitos latum, idque
 compreſſum. *Oculorum* pupilla nigra, reli-
 quā parte alba quorū cilijs utrinque promi-
 nebant cornicula duo brevia non carnea ut
 in quibuſdam alijs, ſed verē cornea. *Collo* e-
 rat pro magnitudine corporis tenuiſſimo,
 & ſatis longo. Totus parte ſuperiore tectus
 erat *ſquamis* cinereis. Suprema ſquamarum
 parte nigricantibus, *cauda*, in extremo exte-
 nuata, & ſubſuſca. Alijs duobus eadem erat
 forma, niſi quod cornua adhuc non exta-
 bant. Dixerunt eſſe filios illius majoris.

ARTICVLVS IV.

De Hæmorrhoo.

Hæmorrhous, Gręcis & ſæmininē αἱμορροῦς *Ambroſi.*
 & masculinē αἱμορροῦς ἀπὸ τῆς αἱμα- *de ſerp. l. 1. c.*
 τος, & ῥέω, quod ad ejuſictum ſanguis ab o- *cap. 5.*
 mnibus corporis humani meatibus effluat. *Nomen.*
 Iſidoro eſt *Aspis hæmorrhous*, Arnoldo *Afrodus*,
 Sylvatico *Afudius*, Avicennæ etiam *Sabris*, &
Alfordius. Olaus tria differentia genera eſſe
 putavit. *Thonium* Nicandro dici, quod lo- *Rhodig.*
 cis illis Ægypti, quibus Thonis imperavit, *Antiq. lect.*
 delectaretur, Rhodiginus author eſt. *l. 16. c. 9.*

Deſcriptionem huius ſerpentis, apud Æ- *Deſcriptio.*
 lium, Nicandrum, & Paræum habemus. *Ælian. H. 4*
 Corpore eſt puſillo. *Oculus* igneo quodam ſul- *l. 15. c. 13.*
 gore ardentibus, *Cure* ſplendiſſimā, dorſo
 multis albis & nigris notis maculato, *cervice*
 anguſtā, *Caudā* prætenui, cum corniculis ſu- *Nicand. in*
 pra oculos. Avicenna ei *dentes* æquales tra- *Theriac.*
 dit. Nicander ita deſcribit:

Vnum

Vnum longa pedem, totoque gracillima tra-
ctu;

Igneâ quandoque est, quandoque est candida
forma,

Constrictumque satis collum, & tenuissima
caudâ

Bina super gelidos oculos frons cornua profert,
Splendendum quadam radiorum albertia luce

Sylvestres ut apes, populatricesque locustæ.

Insuper horribile ac asprum caput horret, &

instat

Ipsius oblique sua parvula terga Cerastræ

Claudicat, ex medio videas appellere dorso,

Parvum navigium terit imam lubrica terram.

Alvus & haud alio tacite trahit ilia motu

Ac per arundineum si transeat illagrabatum.

Locus.

In Ægypto & illis locis quibus Thonis
imperabat, vivere superius dictum. In In-
dia reperiri, ex Diodoro Siculo colligi po-
test. Is enim in eo tractu quo Alexander
Porum persequabatur, inventos fuisse ser-
pentes, parvos equidem, sed quorum alij æ-
reis virgis specie erant simillimi, alij densam
& hirsutam cristam arrigebant, ad eorum-
que morsum toto corpore sanguineum su-
dorem dimanasse, scribit. Particularem lo-
cum si attendamus, saxorum cavernas incolere solent.

Ælian. H.

A. l. 9. c. 43

Natura.

De Naturâ hoc occurrit, segnem admo-
dum in incessu & pigrum esse: naturaliter,
non aliter ac navis dum mare sulcat, incede-
re; more undæ, quæ assurgit & deprimitur:
& feminam à mari gressu ita distingvi, quod
hæc cum internè circa caudam firmet, cum
mas ventri tantummodò innitatur, & col-
lum serpendo extendat. Quæ de obliqui
incessus causa, & Canobo Menelai guberna-
tore veteres nugantur, apud Ælium & Ni-
cander videtur. Nemo aliàs hujus fabulæ me-
minit.

Ælian. H.

A. l. 15. c.

13.

Nicander

in Theria-

cis.

Venenum.

Mathiolus

ad Dioscor.

l. 6. c. 50.

In ejus morsu, (verba sunt Mathioli) color
loci percussus sit cruentus, ex quo ab initio ni-
hil præter aquosum quoddam, effluit: ven-
triculus dolore afficitur: deinde sanguis non
solum ex foraminibus morfis, sed etiam ex
naribus fluit: spirandi difficultas subsequi-
tur, & si quæ in corpore obduæ fuerint
cicatrices, recrudescunt. In morsu feminae,
anguli oculorum & radices unguium sangui-
nem fundunt: immò sanguis ab omnibus
corporis meatibus manat, & tandem den-
tes, putrefactis gingivis excidunt. Eadem
Nicander, Galenus, Lucanus, & Ælianus
prodidere. Immedicabiles quibusdem e-
jus morfus, alij partem scarificatam candenti
ferro inurunt: quidam statim præcidunt;
deinde cataplasmatibus validè attrahentibus,
utuntur. Dioscorides ad sistendum sangui-
nem emplastrum ex folijs vitium coctis &
cum melle tritis primò imponit, post por-
tulacam cum polenta antequam sanguinea

Galen. de

Theriaca

ad Pisonē.

Lucan.

Phar. sal.

l. 9.

Ælian. H.

A. l. 9. c. 43.

Nicander

in Theri-


acis.

urina prodire incipiat. Mathiolus allium
& vinum dilutum, cum theriaca, exhibet:
vulnus aquâ frigidâ abluit, & demum, regio-
nem vesicæ spongijs calidis fovet. Plinius,
flores & morarubi commendat.


Circa Differentias nihil ferè occurrit *Differentia*
præter ea quæ Nierembergius de Indico hæ-
morrhoo, & Kokob scribit, Piso & Marcgravius
de Cucurucu, ille de Ibiracão habent. De Hæ-
morrhoo ita Nierembergius. Habet novus H. E. l. 12.
orbis suum hæmorrhoom, Abucyatli di-
ctum, similem teutlacotzuchqui, nisi quòd
sonalib. careat, majorem hæmorrhoo anti-
qui mundi, sed ejusdem veneni. Per omnes
corporis meatus & cicatrices profundunt
sanguinem morfi. Et alius qui etiam per
juncturas prodigè cruorem facit. De Kokob
sic idem. Offenditur in agris Iucatanensi-
bus, quidam serpens ad hæmorrhoi nostratis
pertinens genus, quatuor longus dodran-
tes, fusco colore, sed cyaneis & rubrescenti-
bus maculis consperso. Hujus ictus adeò
pestilens est, ut intra horæ unius spatium co-
gati ictum hominem sanguinem rejicere, &
intra diem unum ex omni corporis parte
effundere, atque ita demum mori. Antidotum
esse inquit siliqua tri succum liquori ta-
baci permixtum, ex quo alia confusa atque
resoluta sint, epotumque. Saxorum colit
cavernas, & in his cubilibus educat prolem.
Egressus antrum, cum strepitum audit, im-
petum facit in obvios.

Cucurucu Marcgravius vocat, quem Piso Marcgr. H.
Cucurucu Brasilianis dici scripsit. Ille novem
pedes longum facit, squamis flavescens, B. l. 6. c. 14.
ac per dorsum maculis nigris grandibus va-
riegatum. Nimirum, in toto flavo macula
est grandis, in nigro duæ flavæ, in quibus-
dam nigris etiam unica flava, & sic continuè.
Cl. Piso, amicus & condiscipulus noster, qui Piso de Me-
per aliquot annos illas oras lustravit, ita de-
scribit. Cucurucu est angvis crassus, cine-
ritij coloris interius flavus, externis maculis
nigris distinctus, & ipsdem ut Cascavel squa-
mis vestitus; novem & interdum duodecim
pedes longos. Maxime est venenatus, &
plurimum metuendus, licet caro ejus præ-
parata à Barbaris comedatur. Præcipuum
illi venenum in capite, ideoque Brasiliani
intercepto quantocius caput amputant &
cooperiunt humo: Ab illo ictus, corripitur
vertigine, tremoribus, torminibus, animi
deliquijs, febribus ardentibus, quibus sudor
frigidus ac ipsa denique mors, intradiem na-
turalem, aliquando & celerius succedit. Præ-
ter enarratas qualitates, peculiare est huic
serpenti, quòd morsu ejus virulento, venæ
erodi videantur, tantamque inflammationem
& ardorem efficiat, ut sanguis bulliens mox
è naribus, auribusque, imò manuum & pe-
dum unguibus promanet. Huic malo si quæ
Medicina detur, ipsius serpentis, qui mor-
sum

Seps Aetii ex Matthiolo.




Aspis Vulgaris




Aspidis species


Colore ferrugineo.




Aspidis species colore ferrugineo, Vipera parua Vulgo dicta



Dipas Greuini



Ibiyara Serpens Margraf



liquo majorem tramite ducit. Colorem
in eorum quæ attigit similitudinem mutat.
Venenum, quod ad morsum illic de tabe de-
struit, ex dentibus ejaculatur. Offa cum
corpore dissolvere, Lucanus scripsit. Dici-
tur Nicandro *δυσίος*, vel quod sit *ἐξηγός*, vel
quod faciat *δυσπᾶν τοῖς θανάσιμους*; vel ob
ficatorem, vel quod percussus situm adferat. De
signis veneni ita Lucanus:

Lucan.

Pharsal. l. 9

mus, vix aliquid est discriminis, etsi Scholiafles Nicandri, Sepi colorem coccineum, Sepedoni varium assignet. Videntur tamen reperiri serpentes qui ad eundem referri poterunt. Meminit Ari-

storeles

De Sepe.

quod vulneratorum ab hoc serpente caro, statim putredinem concipiat. Ideo nonnulli ex Scaligero, non male *Putriam* vocare. Dicitur & *συνπιδόν*, quamvis Nicander Sepis & Sepedonis diversis locis meminerit. Nec vel iste diversas Sepis & Sepedonis descriptiones habet; nec morsus Sepis symptomata ab Actio recitata, ab accidentibus Sepedonis ictus, quæ apud Nicandrum leguntur, differunt. Ideo Gesnerus, & Grevinus pro synonymis sumserunt. Avicenna *Selsir* vocavit.

14.

stoteles cuiusdam pusilli; quem quidam *Sacrum* vocant, quē & reliqui serpentes, etiam magni vitant. Huius morfu omnia putrescunt. Legitur quoque apud *Ælianum*, *vi-*
rum quendam solo serpentis tactu periisse, & vestem ægripaulo post putuisse. Huc
Nierēberg. & *Agvasen* pertinet, de quo ita *Nierembergius*.
H.E.L.12. Subita pestis *Agvasen* serpens duas spithamas longus duntaxat, fusco colore, lato capite atque compresso: ad eodē verō lethali est ictu, ut intra dimidiæ horæ spacium interimat, decedente carne vulnere vicina, ac misere putrescente. Versatur montosis locis, editis, atque arentibus. Alexiterium ejus *Pangagvasen*, nascitur in Philippicis.

ARTICVLVS VI.

De Aspide.

Ambrosin. S Erpenti quē *Aspidem* vocamus nomen, *de Serp. l.*
I.c.7. vel ab aspergendo, quod venenam morfu aspergat, ut *Isidorus* placet; vel ab asperitate cutis, ut *Arnoldus*; vel ab aspiciendo, quod acutum intueretur, nisi eorum oculi à quibusdam carunculis comprimentibus impederentur, ut *Abensinæ*; vel à *απεισιν*, quod est, more serpentis bestię sibilare, & se gyrare, propter acutum nempe sibilum, vel ejus corporis longitudinem, ut alijs; impositum est. Quidam Serpentem *Niliacā* & *Ægyptiā* dixere, quod *Ægypto* sit peculiaris: Proptertius *sacrum colubrum*, quod in *simulachris* *Isidis* adhiberetur, dixit, alij *Hypnalin* à somni inductione. Quatramius *Marassum* vocavit, quod viperarum instar, vivos catulos pariat.

Descriptio. Descriptionem apud *Nicandrum* habemus.

Nicand in Theriacis.

Tam procera, (inquit) extensa queunt quam brachia duci

Tantaq; crassities est, quantum missile telum, Quod faciens hastas docta faber expolit arte; Protrucium horri sona taurorum, & cede leonum.

Squalidus interdum color albet, sæpè virenti Cum maculis sæpè est cineres imitante figura; Nonnumquam ardenti veluti succenditur igne Idque nigra æthiopum sub terra, qualere refusus Nilus sæpè lutum vicinum in *Nerea* polyit. Præterea geminæ calli instar, fronte caruncle Herent sanguineis scintillant lumina flammis Turgida squallet item cervix, grave sibilat ipsa Bestia, dum certam vomit ira concita mortem Quatuor hinc intra maxillæ concava dentes Radices fixere suas quas juncta quibusdam Pelliculis tunica abducit, triste unde venenum Effundit, si forte suo hæc approximet hosti.

Belluacensis ei cæruleum colorem, dentes extra labia, ut in apro, exporrectos, adscribit. *Agricola* longitudinem & crassitu-

udinem mediocris anguillæ, *Wottonus* senum pedum, assignant. *Plinius*, duos dentes *Plin. H. N.*
in supera parte dextera lævaque longissimos, *l. 11. c. c. 37.*
tenui fistulâ perforatos, ut scorpionum aculei, venenum infundentes. *Ælianus* tenuissimis quibusdam tunicis indui scribit, quibus inversis venenum effundatur, effuso, illæ ad pristinum statum redeant.

In Gallia nullas divagari *Bellonius* author *Locus.*
est: plurimas in Hispaniæ insulis *Christophorus Andreas*. Calidior ære gaude-
re certum, id eodē Africam, & ripas Nili in primis incolunt. *Olaus* in septentrionalibus regionibus observavit, scabrosâ cute, cinereo colore, oculis scintillantibus, longitudine trium vel quatuor cubitorum.

Umbrosis locis delectantur. Id eodē *Seneca* *Sympathia*
ca, ad umbram exfurgere dixit. Abhorrent & *Antipathia*
Ichneumone, *Argolis* anguibus, rana-
rum fætibus, cimicibus, aris, & halicacabo. *Nicand in*
Ichneumon ova ejus conterit, & mordente *Theriac.*
dente laceffit. Bellum, quod & apud *Æli-*
num invenies, *Lucanus* ita egregie descrip-
sit. *Ælian. H.*
A. l. 3. c. 22.
Æ. 6. 38.

Aspides ut *Pharias* cauda solertior hostis
Ludit, & iratas incerta provocat umbra,
Obliquasque caput vanas serpentis in auras
Effuso tuto comprehendit guttura morfu,
Lethiferam citra saniem tunc irrita pestis
Exprimitur faucesq; fluunt pereunte veneno.

Argoli serpentes aspides interimunt, ideo iussu *Suidas*.
Alexandri M. Alexandriæ deportati fuere. *Ra-*
narū fetus caudâ insignes persequuntur. *Gal. de anim.*
linæ eâ die quâ cimices comedere, ab ijs non subter-
tanguntur. Fumo *arii* ita inebriantur, ut tor-
pidæ evadant. De *Halicacabo* ita *Plinius*. Nec *to gn. l. 7.*
illud præteribo aspidum naturæ *Halicaca-*
bum in tantum adversam, ut radice ejus *Plin. H. N.*
propius admotâ, soporetur illo sopore ene-
cans vis earum. Ergo trita ex oleo percussis *Athen. H.*
auxiliatur. De amore aspidis maris erga an-
serum custodem puerum, & fæminæ rivali-
tate commotæ erga eundem odio, vide *Athenæum*.

Ad Naturâ pertinet, quod *Isidorus* scribit, *Natura*.
ad incâtatoris vocē alterâ auriū premere, al-
terâ caudâ obruere: nūquā marē nisi comite
fæminâ è spelunca egredi; alterutrum ab ali-
quo occisum, occisorem etiam in turba que-
rere, quod aliqui affirmant; visum imbecillum ob carunculam, de quâ superius, seu tubercula fronti adhærentia habere; & levissimo strepitu audito, quasi ex somno excitatas sese erigere, quod apud *Nicandrum* legimus. In ira-
cundia precipitibus tumet collū. De ovorū natura prodiit *Bartholomæus Anglicus*, parva, *Anglic. l.*
rotunda, livida, viscosa, fætida, summè venenosa, & filamentis quibusdam conglobata esse, quæ si à *Rubeta* vel alio venenoso animali foveatur, vermē procreari, qui visu & halitu more *Basilisci*, primò foventem, dein de alios etiam animantes perimat. Mansue-
fieri,

Ælian. H. A. l. 17. c. 5. fieri, apud Ælianum legimus. Cicurantur cibo; cum infantibus vivunt, & crepitu digitorum vocatæ ex cavis prodeunt. Mensam etiam, in quâ temperatæ vino & melle farinæ ipsis apponuntur, circumstant, ac reliquâ omni spirâ in terra relicta, caput allevantes circumlâbunt, sensumque explentur.

Plin. H. N. l. 8. c. 23. Egregiè de illo *Plinius*. Unicus huic tam pestifero animali sensus vel potius affectus est. Conjugæ fermè vagantur: nec nisi cum cōpare vita est, itaque alterutra interemta, incredibilis alteri ultionis cura. Persequitur interfectorem, unumq; cum in quanto libet agmine populi, notitia quâdam infestat, perumpit omnes difficultates, permeat spacia, nec nisi ab omnibus arcetur, aut præcleri fuga.

Venenum. Nicand. in Theriaca. Ictus Aspidis tam subtilis est, ut visum effugiat: ideo mors Cleopatæ difficilis erat cognitu. Tumor circa vulnus nullum; post ictum statim sopor insurgit, oculi caligine suffūdūtur, facies pallet, frons refrigeratur; icti assiduè hiant, & tandem convelluntur. Actuarius ægri colorem in viridem & herbaceum permutari asserit. Inter remedia, Aristoteles & alij solam partis mutilationem ponunt. Visum haud paucis, si centaurium in vino tritum æger evomuerit, perituum certò; victurum, sin secus. Mercurialis plagæ exustionem suadet; Pareus, quòd sanguinem in venis & arterijs congelari putet, tenuiorum partium, medicamēta, si pars nigricet amputandam censet. Tentari tamen remedia tam *simplicia* quàm composita possunt. In *illis* sunt, origanum virens cum vino tritum; allia cum Zytho; aristolochia cum rosis; apium cum mero. De aceto ita *Plinius*. Nuper cū ab aspide calcata percussus, utrem aceti ferens deposuisset, sentiebat ictum aliàs illaeso similis. Intellectum ibi remedium est, potuque succursus. De Citris videri Ælianus poterit. Obiecti aspidibus rei, evasere quod id pomum comedisent.

Plin. H. N. l. 23. c. 1. Huc urina impubium, quam Plinius laudat, fel mustelarum, stomachus ciconiæ, urina & sangvis testudinum, lapis Malacensis & histricis pertinent. Ex *Compositis* sunt, Theriaca magna Andromachi, Antidotus Antipatri, & alia. Quidā compositionē ex folijs tap-sibarbat, caryophyllatæ, leucoij rubri, pari pondere sumptis, quæ in aceto acerrimo & urina hominis sani decocta, parti extra applicatur: Aëtius pro fomento aquam marinam adhibebat; quandoque post scarificatas cucurbitulas, centaurium cum myrrha & modico opio apponebat.

Ælian. H. A. l. 3. c. 5. *Plin. H. N. l. 28. c. 6.* *Vfus. Galen. ad Glauc. l. 2. cap. 10. Galen. de Composit.* Maris in Cibus inservire, capite abscisso, & caudâ ad digitos quatuor, interaneisque exemptis, cute detractâ, & corpore aquâ abluto, Galenus prodidit. Medicinam si species, Plinius ad visum clarificandum ejus membranâ cū adipe alterius animalis permiscet. Galenus emplastri Andromachi meminit,

ad discutiendas strumas & podagras, quæ ex medicis aspidibus vocatur, quòd cinerē ipsarū recipiat. *l. 6. c. 14.*

Differentia Aspidum apud authores sunt *Differentia*. varia. Apud Galenum est *χρηγία, terrestris*, quæ loca mediterranea incolit, *χελιδων, hirudinaria*, quæ hirundinē colore æmulatur, & circa Nili ripas excubat: *Ανὰς, sputatrix*, Galen. *l. de Theriaca* quæ sputo animalia interficit. Prioris longitudinem quinque; cubitorum æquant. Chelidonia colore albo & nigro referta sunt; Ptyades cinereo ad aureum inclinante asperguntur. Illa quatuor horarum spacio in animalium perniciem operantur. Ista, instinctu quodam naturali, cum sumē debet crescere per dies triginta alta petunt, & momento interimūt. Hæ cineræ & virides præter mortuum salivam habent venenosam, & adeo tenuem, ut angustissimos etiam cutis poros penetrare possit. Galenus, exporrectâ cervicē, & certâ intervalli longitudine venenum exspuere scripsit: quod & apud Porphyrium invenitur. Ab his admorsi, motu privantur, post continuos saltus soporantur, & cū torsione colli, spasmus, pulsu inordinato, & absque dolore vitâ privantur. Bellonius in Italia apud Brutios serpentē callum in fronte tuberculi instar gestantem vidit, quem aspidem veterum esse putat. Dioscorides unam tantū aspidem describit. Strabo duas Ægyptiarum species facit, quarum una, spithamalis sit longitudinis, & *Οξυθαλαττωτέρα*, chelidonia forte; altera, unius orgyæ, sub qua ptyas & terrestris sine dubio continetur. Apud Ponzettū tres sunt, *Sicca* nempe, & longior quæ oculos carbonis instar micantes habet. *Caput elevans*, & contractis dentibus sputum ejaculans: & *Hirudinaria* quarum icones exhibemus. His addere placuit, *parvam*, coloris ferruginei; & alteram colore subviridi maculoso insignitam, quæ Italis *aspido tormento* quod morsu tormentum adferat. In America quoque; inveniuntur, quæ caudæ aculeo feriunt. Propè Bononiam ejusque villam Malalbergo dictam, habentur varij coloris, quæ dentibus vulnerant, & oblongo caudæ aculeo ferire nituntur. Rustici faucij partem tumefactam ligant, & adhibitis præsidij tridui spacio liberantur.

ARTICVLVS VII.

De Dipfade.

Aspidem sequitur *Dipsas*, quam Solinus *Ambrosii*. inter species aspidum numeravit. Nomen *l. c. 8.* à siti quâ ictu suo infert promeruit. Unde Isidorus *Situlam* vocavit. Dicitur etiā *μελάνθρ- Isidor. Orig.* *205*, à nigra caudâ; *ἀμμοβλήης*, quòd per arenâ *l. 12.* incedat; *πενήρ* quod ictus ejus veluti flamma *Ælian. H. A. l. 6. c. 51.* durat; *ἀδυσος*, ob eandem rationem. Videtur tamen inter Presterem & Dipladem aliquā esse *Differentia*, ut Agricola prodidit. Præster percussum immobilem veluti quadâ syderatione, menteque alienum reddit: mox pilis defluentibus, & urgente pruritu, alvique fluxu, patientem absomit: quod de *Dipsa-*

Diplade scriptum non invenias. Dioscorides solum nominum causam Differentiam ponere credit.

Descriptio. Isidorus tantæ exiguitatis esse credit, ut *Ælian. H.* non videatur, dum calcatur. At *Ætius A. l. 6. c. 51.* longitudinem cubitalem, quæ paulatim ex crassâ in tenuem definit, corpus albicans, sed simul maculis rufescentibus partim nigris variegatum, ei assignat. Solstratus caudam duabus lineis nigricantibus insignitam: *Abensinacollum* magnum, & *tergum* ad extremitatem nigricans, & caudam valdè tenuem.

Locus. Nascentur in Africa & Arabia, ut *Ælianus* prodidit: in Lybia & Syria vagari apud *Galen. l. II. de simpl. medic. facult.* *Lucianum* & *Abensinam* legimus. Plerumque *Galenus* autor est.

Natura. De *Natura* hoc occurrit, inter ova Struthionum in arenis condita stabulari: sic *Garamantas*, qui illis fictilium & pileorum loco utuntur, adoriri. Acri quoque ardere siti & ferè inextinguibili. Ideo os siccum habere fertur: & veneno suo totum in corpore humorem absumere. *Aulus Tuscus* Catonis miles nullo aquæ potu, nec etiam proprio sanguine satiari potuit.

Venenum. De *Signis* veneni, nimia inprimis & inextinguibili siti non est quod multa dicamus, quia jam de ea egimus. Aqua nec per lotium, nec per sudorem exit, sed intus detenta, abdomen ita tumidum reddit, ut hydropem mentiat. Reliqua symptomata cum iis quæ à morfu viperæ conveniunt. *Lucanus* eleganter de iis:

Ecce subit facies letho diversa fluenti,
Nasidium Marfi cultorem torridus agri
Percussit Prester: illi ruborigineus ora
Succendit, tenditq; cutem, pereunte figura,
Miscens cuncta tumor toto iam corpore maior,
Humanumque egressa modum super omnia membra,

Efflatur sanies latè torrente veneno.
Ipse latet penitus congesto corpore morsus,
Nec lorica tenet distenti corporis auctum.
Spumeus accenso non sic exundat aheno
Vidarum cumulus, nec tanto carbasa Coro
Curvare sinus, tumidos iam non capit artus
Informis globus & confuso pondere truncus:
Intactum volucrum rostris, epulasque datu-
rum

Haud impudè feris non ausit radere busto,
Nondum stante modo crescens fugere cadaver.

Morsum immedicabilem esse, *Dioscorides* prodidit: posse tamen ad inunctionem partis affectæ & scarificationem procedi. *Galenus* Theriacam *Andromachi* vehementer laudat. *Abensina* vomitum provocat, & diuretica commendat; exterius verò, emplastrum ex sale, calce, & oleo com-

ponit. *Plinius* decoctum ex folijs lauri *Plin. H. N.* laudat: nec non falsamentorum cibum *me- 23. c. 8.* ro subinde hausto, ita ut circavesperam, vomitu subinde reddatur.

De *Differentijs* nihil ferè occurrit. Soli *Differentia.* *Dioscorides* *Grevin. de* toto genere differre existimat. *Ætius* ad *ven. c. 14.* illud viperarum genus reducit, quod in maritimis locis stabulatur. *Grevinus* à viperamaculis parvis in cauda, & quod citius mortem inferat distingvit. At *Marfi* *Galen. l. II. de simpl. medicam.* *puli* *Ætio* accedunt, & degentes in solo uliginoso viperas; in falso, *Dipladas* nominant.

ARTICVLVS VIII.

De Scytale.

Serpens Latinis *Scytale* dictus, Græcis *Nomen.* quoque *σκυτάλη, σκυτάλις*, aut *τὸ σκυτάλιον* *Ambrosi. l. c. 9.* seu à *formæ ἢ σκυτάλης*, quæ vox baculum significat, seu à *longa & terete figurâ*, quod *σκυτάλην* lorum coriaceum aut baculum æquet; dicitur. Quidam *Caciliam* vocant, quod ineunte vere ex antro egressus, fœniculum fugiat, ne visum recuperet.

Forma est tereti & ita æquali, ut ubi ca- *Descriptio.* put vel caudâ sit, discerni vix possit. Magnitudinem ligoni terrestri *Nicander* comparat, Quidam in tergo variâ macularum *ποικιλότης* distingvi tradunt. Unde pictum serpentem *Mantuanus* vocavit. De ipsius & *Nicand. in* *Amphisbænæ* discriminè *Nicander*: *Theriac.*

Bifronti similem reperis scytalem Amphibænæ,

Pingvior est tamen, & cauda quæ nulla ferè exit,

Crassior, ut quantum solita est comprehendere lignum,

Curva manus strictum, quoties tenet ipsa lignum,


Tam proluxa, vagans, pluvio quàm reptile celo,

Quod facunda genus sua gignit viscera tellus.

In descriptione ejus errat *Lucanus*, & *Solinus* forte ex eo. De *Natura* hoc duntaxat habemus, tergo fulgere, forte, ut quia tardè *Natura.* progreditur, spectatores alliciat: primum, nondum dissipato brumæ rigore egredi, & spoliū deponere: ne visum recipiat, à fœniculo abstinere: (Gillius tamen oppositum scribit) nec ictu mortem inferre. Inflammationem duntaxat infert, qualis ab apum & vesparum aculeis prodire solet.

De *Differentiis* nihil occurrit. *Olaus M.* cum *Amphisbænâ* confundit.

Scytale




Ampibisæna Greuini




Cæcilia Blindſchleich




Cæcilia Vulgaris




Cenchris Veterum Belloni




Acontias Iaculus . Angelschlang



Acontias Alter





ARTICVLVS IX.

De Amphibæna.

Nomen. **A**mphibænæ nomen ab ἀμφὶ & βῆινω, quod geminum ut caput ita incessum habeat, venit. Dicitur alias Amphicæphalos, Hefychio ἀμφικεφαλῶς Ethymologo ἀμφικεφαλῶς, Alberto Amphiselenæ & Armena, Latinis quibusdam Utrimquegrada.

Descriptio. Descriptionem apud Nicandrum habemus.

Post hanc exiguam tibi subdimus Amphibænam

Duplici conspicuam (monstrum mirabile) vultu,

*Cujus perpetua cæcum caligine lumen
Quod latas utrinque genas, porrectaque menta
Plus aliis alto serpentibus agere tendat;
Terreus est illi color, & densissima pellis,
Plurima quam varie distinctam signa figurant.*

Exiguam dicit, quia parvus & imbecillus serpens est. Hefychius cubitalem & decur-
tatam caudam habere scripsit. De duplici
Ælian.H.A vultu ingens est controversia, Ælianus, Pli-
L.9.c.23. nius, Lucanus & Mantuanus affirmant, Mat-
Thi.H.N.L. thiolus negat, Hefychius dubitari ait. Dari
8.c.23. tamen bicipites serpentes in Differentijs di-
cemus. Color terreus illi est, quem Græci
φῶλος, Latini pullum appellant. Cæcum ad-
dit, quia tam latas habet genas, ut oculos
quodammodo premant. Notis in tergore
pictam, nemo classicorum auctororum dixit;
& in Nicandri textu, pro περιστερῆς, περιστερῆς
legendum est, quod idem est quod περιστερῆς,
Circulatis enim tractibus serpit.

Locus. Reperitur in Lemno, sed in Lybia maximè,
si Luciano credimus. Germaniæ ignotam
Agricola fecit.

Natura. De Natura hoc occurrit, mulierem gravi-
dam si Amphibænam transierit abortire:
& ante cuculi cantum egredi, & sibilo e-
tiam interficere. Quidam ore eniti fabulati
sunt. Ælianus, caudæ loco alterum adhibe-
re scripsit.

Venenum. Morsum ejus ea quæ à punctura apum
proficiscuntur, insequi Aëtius; quæ à vipe-
ræ ictu, Dioscorides prodidit. Id forte in
principio fieri solet; hoc, temporis succef-
su. Remedia ex capite de vipera peti pos-
sunt. A vite citissimè interim, apud Rho-
diginum habemus. Alij semen papaveris
& Castoreum laudant.

Rhodig. De Usu egregiè scripsit Nicander.

Antiqu. *Hæc ubi jam crevit cadentes ligna coloni
Sectam deglabrant oleastri ex arbore virgam
Quale pedum strictis præbenti pellibus an-
gis*

*Insertam obvolvunt, quas certis deinde diebus
Exarere sinunt, cantantes ante cicadas*

*Vtilis hic baculus frigentibus artubus esse
Fertur, ubi ex animis digitos torpedo fatigat.
Tunc quia constrictos & eorum vincula nervos
Calfacit immisso fovet, extenditque calore.*

Quod de nervis scribit, proditum est e-
tiam Plinio. Ælianus verò habet, corium fu-
gandis serpentibus & venenatis inservire.
Dantur quædam in India Occidentali, quas *Differētia.*
incolæ Maqvizcoatl, & Tezauhcoatl vocant,
quasi angves abusus, quod rarò conspiciantur,
sesqui digitum longi, & minimi digiti
crassitudinem æquant. Coloris sunt ar-
gentei, nitidi, ac veluti translucidi. Gradi-
genti, nitidi, ac veluti translucidi. Gradi-
untur in utramque partem. In Brasilia *cap. 10.*
quoque est serpens *Ibyara* Brasiliensis,
Bodry Tapuyis, dictus. Vulgo fertur duo *Marogr.*
habere capita sed falso; inde autem error *Hist. Brasil.*
promanavit; quia tam caudâ quam ore fe-
rit & inficit suo veneno; nec facile cauda à
capite discerni potest, quia ejusdem sunt fi-
guræ & magnitudinis: Minimi digiti cras-
sitiem æquat, & longitudine unum pe-
dem & duos digitos circiter. Color est albus
splendens instar vitri, & annulis & eleganti-
bus lineis notatur, coloris brunnei aut ærei.
Oculos habet minimos & vix conspicuos, hæ-
rent in cute, instar punctuli acui facti. Non
procul ab extremitate caudæ anum habet, in-
star reliquorum serpentum. Contra vene-
num illius nullum dari remedium affirmant
Lusitani. Sub terra vivit & illam fodiendo
eruitur, vivit at formicis.

Huc spectant tria hæc quæ apponimus ser-
pentū genera. *Primum* Brasiliæ, quod bi-
ceps est, & cancri modo incedit. Alterum
caput tam est amplum ut toti corpori ad-
æquetur; alterum proportioni corporis
respondet, ut Iosephus Acofta prodidit. *Al-*
terum Taprobanense apud Ramulium, qua-
drangulari formâ, s. quatuor capitibus in-
structum, ut unum orientem, alterum occi-
dentem, tertium meridiem, quartum sep-
tentrionem spectet. Unicuique oculus in-
est, & quo se unum gradiendo convertit, eò
& alia feruntur. Animal est multipedum,
sanguis vulnera citissimè consolidat. *Tertium*
in Hungaria reperitur, breve, duorum pal-
morum longitudine, nulla cauda, & æquali
per totum corpus crassitie, ut olim Vitus
Hungarus Gesnero narravit. De *Amphibæna*
marina in mari Anglico capta, refert idem,
bina capita, geminis ornata oculis habuisse,
quorum unum ab altero vix distingui po-
terat. Quatuor, addit, lineæ coloris ame-
thistini totum corpus exornabant; quæ
quidem lineæ, undiquaque stoculis
quibusdam erant decoratæ pul-
cherrimis, instar florum
pseudosycomori.



ARTICVLVS X.

De Cæcilia.

Ambros. l. I. c. II. **N**omen *Cæcilia* à cæcitate inditum est. Albertus & Isidorus Cæculam vocant.

Nomen. Niphus Cærialam. Græcis dicitur *Ἰσφλωψ* & *Ἰσφλωπος*, Hefychio *κωφίας*, quasi furdaster, quod hebetis sit auditus. Nicander *ἀπημαύσων* vocavit, quod nullam noxam inferat. Germanis est *Blindtschleiche*, modernis Græcis *Tephloti*, *Tephli*, & *Tephlini*, pro ut annotavit Bellonius.

Descriptio. Fusci & obscure maculosi est coloris, cum subrufo exiguo vix notabili. Color hic ad latera magis varius est, cum nigricantibus maculis dilutâ purpurâ distinctis, tanquam in marmore porphyrite obscuriore. Totus venter atro colore saturo nigricat. Sub collo & parte proxima color est glaucus, maculis quibusdam nigris variegatus. *Dentes* minimi, asperi, & qui vix apparent, in inferiori mandibula plures & magis conspicui. *Lingva* bifida. *Oculos* an absolutos habeat, explorare in mortua non potuit Gesnerus; observavit tamen, totum oculum ab inferiore palpebra tegi, cujus foramen in comparatione ad reliquū corpus, erat per exiguum. *Alianus* Caput murene simile habere scripsit. *Fœmina*, aliquando capta ex Gesneri descriptione, erat dodrantalis, crassitudine scytalis, cute admodum nitida. Meatus in medio ventris apparebat, quo compresso, ova velut immatura exibant. Infra ad caudam meatus erat excrementi : Oculorum cavitates magis quàm oculi conspiciebantur. Deinde squamæ majusculæ magis caput quàm reliquum corpus tegebant.

Natura. Tam velociter repit ac lacerta *Chalcidica*. *Arist. H. A. ca. 13.* Fætus vivos more viperarum enitur. Percussâ unâ Gesneri uxore, fætus vivi ejecti sunt. Præ multitudine fætuū, uterum ipsis aliquando dehiscere, *Plinius & Aristoteles* prodidere. Virus bubus esse lethale apud *Columellam* legimus, Remedio caro ciconiarum, quæ Cæciliæ vorant.

Vfus. In Medicina adhibuit *Osvaldus*. *Theriacam* namque ex Cæciliæ & aqua theriacali paratam, pro sudorifero in pestilentia exhibebat.

Differētia. Bellonius in *Terrestrem* & *Aquaticam*, sed nullo argumento nixus distingvit. Potest in *Vulgarem* & *Crassio rem* dividi, quarum icones damus. Lusitani *Cegæ* nomen, serpenti indiderunt, quem Brasilienses *Ibyara*, Tapuyæ Bodty vocant, Crassitiem minimi digiti æquat, longitudine unum pedem & duos digitos circiter. Color est albus splendens instar vitri, & annulis & elegantibus lineis notatur, coloris brunni aut ærei. *Oculos* habet minimos & vix conspicuos, hærent in cute, instar punctuli acufacti. Non pro-

cul ab extremitate caudæ anum habet, instat reliquor. serpentum. Non facile caudâ à capite discerni potest, quod ejusdem sint & figuræ & magnitudinis. Tam cauda quàm ore ferit. Sub terra vivit, & eam fodiendo eruitur. Visitat formicis. Contra venenum illius nullum remedium dari, affirmant Lusitani. Videtur mihi inter Cæciliam & *Amphisbænam* ambigere.

ARTICVLVS XI.

De Cenchro.

Cenchri nomen Latini à Græcis desump- *Amrosin.* clere. Dicitur enim his *κέγχρος*, *κέγχρει* de serpent. *διὰς ὄφις*, ut apud Dioscoridem legitur, *κεγ- l. i. c. 12.* *χρίνης*, & *κέγχρις*, ut apud Nicandrum : *κεγ- Nomen.* *χρίνη* apud Varinum : *κέγχρινος*, & *κέγχρις*, ut apud Lexicographos. Dicitur verò ita à milio, seu quod quibusdam notis milij instar exornetur : seu quod tempore tantum milij appareat, ut Ethymologus reliquit : seu quod florente milio sit perniciosior, ut Aëtio placet : seu quod calorem milij plantæ referat, ut Avicennæ & Olao Magno placuit. Idè ab aliquibus *Miliaris* appellatur. Nobis prima derivatio placet. Nicander eum *λεόντα* vocat, vel quod squammæ ejus instar *Nicand. in Theriac.* Leonis Lybici sint varijs notis distinctæ : vel quod caudâ erectâ, more leonino se ad pugnam paret : vel quod more leonis sanguinem humanum exorbeat. Quidam laculum dixere, sed perperam, ut in sequentibus apparebit. Avicennæ est *Famulus Aracis*, & *Aspis diversicolor*. Alberto, *Arachis*, *Centris*, *Miliaris*, & *Falivisus*, An *Serpa Serena* serpens Siculus, subalbidus, longitudine humanum corpus, brachium circa carpum crassitudine æquans, venenosus ut Massarias ad Gesnerum scripsit, referri ad eum possit, difficile est dictu, cum nullas notas appofuerit.

Longitudine est duor. cubitorum figurâ *Descriptio.* crassâ in tenuem abeunte, & colore viridi, *Lucan.* ad luteum tendente, qui maximè juxta al- *Pharsal.* vum apparet. *Lucanus* marmor serpenti- *l. 9.* num Thebis advectum pluribus maculis æmulari scribit. Nicander quoad crassitiem & longitudinem nihil determinat, quod & grandior & minor reperitur; totum verò maculosum esse ait.

Inveniuntur in Lemno, & Samo, in qua *Locus.* mons *Mosychlus*. Hinc Nicander : *Nicander in Theriacis.*

*At qui cum rapidis fervescens Solibus æstus
Ardet in horrida sylvarum devia confert,
Imbecilleque rapax venatur prædo bibentes:
Percelsive Sai juga, frondosive Mosychli,
Sub viridis quando frigentibus abietis umbris,
Securi recubant, grege circum errante magistri.*

Morsum

Venenū & Remedia. Morsum Cenchri symptomata quæ in morſu viperæ occurrunt, excipiunt: ſed in primis aquæ in ventre inferiore, qualis in hydropo generari ſolet collectio, ut Nican- der notavit: ut Dioſcorides & Ægineta, pu- tridum primò ulcus, poſt partium tumor, tandem lethargus. Eraſiſtratus jecur, inte- ſtinum colon, & jejunum ingenti putredine corripit credidit. Remedia ex illor. Cenſu ſunt, quæ viperino morſui adverſantur. **Plin. H. N.** Commendantur præterea, ſatureja ſylve- **l. 20. c. 22.** ſtris, radix menthæ ſaracenicæ, gentianæ, & ariſtolochiæ: maximè verò Ciconiæ caro, & reliqua membra.

Natura. Maximo æſtu per montes vagatur: ru- bos & ſpinas fugiens per rectum trami- tem incedit: & animalia caudâ implicat, & pertiſque jugularibus venis ſanguinem for- bet.

ARTICVLVS XII.

De Acontia ſeu Iaculo.

Ambroſin. l. 1. c. 13. **Nomen.** **S**erpens hic ἀκοντίας Græcis ἀπὸ τοῦ ἀκόντιος quod jaculi inſtar ſe vibret. Hefychio eſt ἀκόντιος, Nican- dro ἀκοντίων, Varino ἀκον- τίος. Latini iaculum vocaver; Author li- bri de Natura, ſerpentem volentem ob cel- terem motum; Aëtius Cenchritem, Cenchriam, & Aſpidem acontiam; quidam Cheryſydrum: Sylva- ticus Acoran; Abenſina Coſezati & Altaravat. Lemni incolæ Sagittarium.

Deſcriptio. Is quem Bellonius vidit, erat tres palmos **Bellonius l. 1. c. 13.** longus, & digitum craſſus. Colore cine- reo, ſub ventre albo, juxta dorſum ſquam- matus, juxta ventrem laminis munitus. A cervice nigra duæ albæ linæ per longitu- dinem dorſi ad caudam uſque percurrant: deinde, maculis nigris oculi figuram æmu- lantibus diſtinguebatur, ut benè lenticula- ris à quibuſdam dictus ſit. De eo cujus icon in Muſæo Senatus Bononiensis habetur ita Ambroſinus. Eſt craſſitudinis baculi, longitudinis trium circiter pedum. Caput habet magnum coloris cinerei, reliquo cor- pore fuſco præter ventrem, qui ad colorem minus obſcurum vergit.

Locus. Non inveniuntur in Germania, ut Agri- **Lucan. in Dialogo de Diſſadib.** cola prodidit. In Ægypto & Lybia reperiri, Lucianus & Marcellinus prodidere. Viſi & in Norvegia ab Olao Magno, à Bellonio in Lemno & Rhodo. An in Calabria & Si- cilia occurrant, quod Matthiolo relatum, dubium. Qui inde à circulatoribus defe- runtur, & Boæ ac Serperigenæ nominantur, pinnas longas & acutas à capite ad medium uſque corpus gerunt, quibus ſeſe in altum attollere poſſunt.

Venenum. Morſum majora quam viperinum iſtum ſymptomata inſequuntur; putredo in pri-

mis & carniū deſluxus. Remedia ex capi- te de vipera peti poſſunt.

De Natura hoc duntaxat conſtat, tam in Natura. locis viar. publicar. abditis, quàm in arbori- **Ælian. H. bus,** capite intra frondes occultato, degere: **A. l. 8. c. 13.** jaculi modò ſerpendo ruere, & quidem tam validè, ut ſpaciū viginti cubitorum tran- ſiliat; & humi jacentem, antequam inſiliat, primò ſeſe contorquere.

Fel ejus habet in Medicina uſum. **Ac. Vſus.** tius ex eo cum lapide ſcythico trito collyri- um parat, contra diuturnas ſuffuſiones.

Albertus duplicis generis eſſe ſcribit. A- **Differētia.** lios mortem ſine ſenſu inferre. Alios diu- turno dolore fatigare. Ut verò hoc incer- tum, nec cujuſquam authoritate probatum; ſic certum eſt, non unius generis eſſe. **Tex- Nieremb. mineni** enim, quem & **Micoat** vocant, ſerpens **H. E. l. 12.** eſt apud Quanahuacenſes, prælongus & te- **cap. 29.** nuis, cujuſmodi etiam caput cernitur, ven- tre livido, dorſo fuſco. Vibrat ſe ex arbo- ribus in homines & hominum oculos. Vi- rulentus eſt, nec ultra cænum aſurgit. Re- ſtâ incedit, corpus minime in ſpiras con- volvens. Ille quoque qui in agro Tigurino ruſtici brachium ita laſerat, ut carne nuda- retur, baculi craſſitudine, & trium vel qua- tuor pedum longitudine ex genere iaculo- rum erat. Bononiensium etiam Acontias à iaculo Bellonij differt, Ambroſinus **alte- rum** vocat. In Hungaria quoque qui **De- curtati** vocantur, de quibus ſuperius quæ- dam, in homines eminus, jaculi modo inſili- unt. Apud Indos in campis & locis ſub- terraneis inveniuntur, qui velociſſimis ſal- tibus ſerpunt, & homines eo potiſſimū tem- pore, quo prolem educant, aggrediuntur. In Hiſpaniola habentur perexigui, coloris viridis, qui ſola cauda arbor. ramis hærent, reliquo corpore propendentes, prætereun- tos lædunt. Apud Sabæos verſantur co- **Ælian. l. 6.** loris rubicundi, longitudine palmi, qui in homines inſiliunt, nec tantum iſtus, ſed & tactu nocent. Scholiaſtes denique Nican- dri ſub nomine jaculor. non tantum hos de quibus egimus venire ſcribit: ſed & illos, qui celerrimi & innoxij ſunt. Huc pertinet ſerpens **Polpoch**, de quo ita **Nierembergius.** In **Nieremb. agris** provinciæ Iucatænensis offenditur **H. E. l. 12.** monſtrificum quoddam ſerpentium genus, **cap. 48.** tres dodrantes cum maximè longum, bra- chium craſſum, aut fuſco exſaturatoque tin- ctum colore, ſed à capite ad quinque uncia- rum longitudinem nigro & candenti vari- um, lato & compreſſo capite, oculis magnis & ſplendentibus, & caudâ quæ reliquo corpo- ri craſſitudine non cedit, non diſſimilis ſcor- pionis, nec ungvium terrore ælurorum ma- gnitudini cedit. Nec vero uno tantum modo maleficum eſt animal, ſed caudâ pun- gens, & ore mordens. Viſuntur magna ex parte hi ſerpentes arbores amplexi; cum verò

verò ictu virus jaculari volunt, si solo consistant, visum hominem è longinquo infestantur, cauda supra caput contortâ atque convolutâ ferotantes in eum, atque ita brevi saltibus attingentes; Cum vero arboribus inhærent, ita caudam capiti adjungunt, ut arcus representent figuram, & jaculi sagittæve more, sese non sine strepitu qui sentiri possit, jaculentur atque contorqueant. Ictus est exitialis intra tres dies ictæ partis carne deciduâ atque putrescente; ossibus verò nudatis, & in colorem fulvum vergentibus, & adeo fætido odore exhalante, ut omne rapacium avium genus invitetur ad carnificinam. Ajunt indigenæ ictu ejus non inferri vehementem dolorem, sed universi corporis sensum potius hebetari atque torpescere, atque ita ictum hominem velut temulentum mori. Sibila edit cothurnicū cantui haud dissimilia, quæ præterquam quod longius audiuntur, nomen serpentis, quod polpoch esse diximus, exprimunt, non sine vehementi formidine atque fuga indigenarum.

ARTICVLVS XIII.

De Dryino.

Ambrosin. **A** Contiam excipit Dryinus, tum quòd **l. i. c. 14.** **Nomen.** ejus icon cum jaculo Bellonij bellè conveniat: tum quòd Scaliger eundem à jaculo ob similitudinem non discreverit. Nomina plura obtinuit. A Scaligero & Grevino dicitur *Querculus*, alijs *Ilicinus*. A Græcis, vocatur *δρυῖνος*, & *δρυῖνης*, à *δρῦς*, seu quod in quercubus lateat: seu quòd à crabronibus vexatus continuo in quercum confugiat: seu quòd squamis cortices quercus æmulantibus tegatur: *χέλυδρος*, quod aspera cute ad instar testudinis sit munitus, *κέλυδρος*, *Alidrat* cuidam scriptori seu *Cherisdal* qui addit fumum à terra excitare, & non nisi in interioribus Africæ reperiri, *Andrias* Olao; *Durissos* Abensinæ, *Glandosa* Alberto, *Dendrogail* modernis Græcis, ut Bellonius prodidit. Quidam & *Bryinum*, & *Hydrum* seu *Cherhydram* dictum esse volunt. **Bryinum**, quod relictis interdum muscosis locis **Nicand. in** (*βρυὸν* villosum illud in arborum truncis dicitur) prata petat humida, ubi moluridas locustarum species, & partus ranarum imperfectos venatur. *Hydrum* quòd per humecta convallium loca libenter divagatur.

Agricola de In *Descriptione* in diversa abeunt authores. **Animal.** **Nicander** *Caput* ei *Natricis* capiti æquale *subter.* assignat, *tergus* album. **Agricola** longitudinem & crassitudinem mediocris angillæ, **Wotton. l. 6. de Dis-** *tergus* cinerei coloris, in capite convenit. **fer. Ani-** *Wottonus* illi tribuit longitudinem duor. **mal. c. 20.** cubitorum, *Corpus* obesum, squamas aspe-

ras, in quibus parvæ muscæ nidulantur; colorem tergoris subatrum, *caput* hydroæquale sed latiusculum, nec ita acuminatum. In tantam aliquando molem excrescere **Bellon. Ob-** *nus* scripsit, ut lacco impositum ruficus **serv. l. 3.** per duo milliaria, quin interdum quiesce- **cap. 51.** ret, ferre non potuerit. Idem spoliū fœno replevit, quod humani cruris crassitudinem adæquabat.

Veneri proprietatem accurate descripsit **Nicander**, his verbis.

Quod si cui prehensum Dryinus talumue pedem

Luserit, à toto se spargens corpore fertur

Tristis odor, surguntque nigri, qua plaga tumores,

Mæstaque tristitia, & lacrymabilis opprimit

angor

Comprehensam morfi quadam caligine mentem

Et periens nimio flaccescit forma dolore:

Usque adeò pascens absūmit membra venenum,

Quin etiam obfuscat obducit lumina nubes

Et miserè affectum perdit lethaliter agrum.

Sunt etiam ejusdem qui morfi dentibus angvis,

Instar balantum soleant clamare caprarum

Sive ovium, & gravibus torti cruciatibus angui.

Pallidus urina liquor it, torpensque veternus

Ingruit, & crebris quas si singultibus agri

Nunc etiam felix vomitum, nunc sanguinolentum

Eijciunt, ipsumque malum facit arida labra,

Postremoque gravem fundit per membra tremorem.


Symptoma illud de balatu, ab Aëtio, Aëgi. **Alian. H.** neta, & alijs confirmatur. **Alianus** omnes **A. l. 4. 17.** illos affectus Dryini mor sui adscribit, qui **Porta Phy-** *in Chelydro* occurrunt. Videntur ei quæ **togno. l. 4.** cum radices resistere. Inflexæ enim hæ **cap. 2.** & circumvolutæ, à summo ad imum sensim deficientes, corpus gradientis Dryini imitantur, ejusque characterem ferunt. **Dioscorides** *Aristolochiam* cum vino laudat: **Grevinus** *origanum* contusum & mor sui impositum, *lixivium* cum oleo, & *theriacam* probat.

ARTICVLVS XIV.


De Elape seu Elaphe.

E Lops seu Elaps inter innocuos serpentes à **Nicandro** ponitur. Quidam **di. H. S. l. 1. c. 15.** *το ελαπεν* *ἡν ὄντα*, quòd visu destituatur dictum opinantur: & fortasse cum *Cæcilia* **Nomen.** confundunt. Alij ab *ελαφος* Cervo deducunt; seu quòd more **Cervorum** sint meticuloſi;


Dryinus . *Stinckſchlang* .



Elapſ .





Anguis Aesculapii Vulgaris .



Anguis Aesculapii

niger Aldrov.





Bellon. Obs. culosi seu quod celeri cursu ferantur. Bello-
l. 2. c. 51. nius cuiusdā serpentis in insula Lemni me-
Fallop. de minit, quam *Laphiati* vocant, eundemq; cum
tumorib. eo qui veteribus *Elaphis* arbitratur. Facit &
14. & 22. Fallopius cuiusdam quem *Cervonis anguem*
 vocat mentionem; ut & *Cerveri angvis*: sed
 cū illum Caprimulgum, hūc Anzam, quo no-
 mine apud Patavinos angvis Æsculapij venit,
 vocet, diversos ab isto concludendum est.

Descriptio. De Descriptione ita *Ambrosius*. Mona-
 chi qui commentati sunt in Mesuem pro-
 mulgarunt serpentes quosdam cervinos si-
 miles esse nigris illis, qui multis in regionibus,
 & potissimum in Apuliā sunt no-
 tissimi, neque multum veneni participant:
 quapropter per hos fortē Boas intelligere
 voluerunt. Nos in Musæo Illustrissimi Se-
 natūs Bononiensis, quod olim fuit doctissi-
 mi Ulyssis Aldrovandi, invenimus coloratā
 iconem serpentis, longitudinis trium pedum
 circiter, cuius venter lutei est coloris, & ter-
 gus coloris Leucophæi, cum tribus lineis ni-
 gris à capite ad caudam usque percurrentibus:
 sub icone hæc nomina extant scripta.
Elope, vel *Elape*, forte *Nicandri*, *Elaphis*
 quorundam, *Laphiati*, incolis Lemni insulæ
 apud Bellonium. *Elephantias*, forte & *Cer-
 vone*. Quamobrē ut lectores hujus animalis
 figuram contemplari possint, illam hoc in
 loco exhibemus.

Plin. H. N. Morsum ejus volvulosa tormina sequun-
l. 32. c. 5. tur, si Aetiij Elaps, cū nostro idem est. Contra
 eum, cōmunia auxilia, illa in primis quæ urinā
 cient, profunt. Nec non salamentorū cibus.

ARTICVLVS XV.

De Angve Æsculapij.

Ambrosin. **A** Ngvi Æsculapij nomen à tutelari Æscu-
l. 1. c. 16. lapij nomine indutum est. Dicitur:
Nomen. Angvis simpliciter & quasi per excellentiam:
Ælian. H. quod fortē solus inter serpentes beneficus &
Al. 8. c. 12. innocuus sit. Æliano est *Pareas*, Græci *παγεί-
 α* & *παγεία* scribunt, seu *παγεία* *πεφωτισμέ-
 νος καὶ μέγας παγείας ἔχειν*, quod maxillas
 quodammodo turgidas habeat seu à *πέποιον*,
 quæ vox aliquanto *πέπον* mitem & mansue-
 tum significat. *Lucanus* Phariam vocat:
 nonnulli *Pagerinam*. Apud *Hesychium* &
Varinum legitur *πύππας*, à colore sic dictus,
 quæ cum hoc eundē esse vehementer dubito.

Descriptio. Descriptionem si species, oblongus est sub-
 lutei aut potius porracei obscurioris coloris,
 sed magis circa tergus nigricans. Pars in-
 ferior albescit paulō in se subviridis. In qui-
 busdam nota quædam formā crucis ex squa-
 marum ordine apparet, si aliquibus credi-
 mus. Ælianus lato ore esse dixit; *Ovidius* illū
Ælian. l. c. qui Romæ pestilentia tempore cristis in-
*Ovid. Me-
 tam. l. 15.* signitum, poetica fortelientia. Maxillæ den-
 tibus utrinq; multis valdē acutis armantur.
 In cervice duæ parvæ eminentiæ conspiciun-
 tur, inter quas locus vacuus. *Sceletron* hic ex-
 hibemus. In eo sequentia *M. Aurelio Seve-*

rino observata. *Larynx* nulla, sed *arteria aspera* *Zootom.*
 caput teres, & tonsus, ut fistula, ubi lingua *Democrit.*
 radix inde inchoans, in cōfinio scilicet ter-
 minantis maxillæ inferioris. In tunica peri-
 tonæide, vesiculæ plurimæ oviculorum in-
 star. *Hepar* multo superius ventriculo. Huic
 quidem finietū non illi adhæret *vesicula fellis* ē
 vena cavā descendens. Alternò latere splen
 pusillus, pisum referēs, ruber. *Ventriculi* fun-
 dus corpus uni versū determinat ferē. *Renes*
 infimi utero proximi, his cava quinque; binos
 insignes ramos mittit. *Intestinum* ferē unū,
 quamvis *Baldus Angelus Abbatius* colon
 distinguit. *Vteri* cornu cavæ applicitum. *Glā-
 dula* oviformis supposita licni, fundo ventri-
 culi adhærens; glandulæ autem cholido-
 chus, perforans ipsam ad intestinum.

Invenitur pleriq; in locis, Germaniæ, Ita-
 le, Hispaniæ, Poloniæ, &c. in Asia etiam A-
 frica & America. In Italia tam familiariter
 cum hominib. vivunt, ut & in lectis inveni-
 antur. Idem sæpē & in Lemno insula accidit,
 ut apud Leonem *Allatium* habetur.

De Natura dici potest, benignum quidem
 esse, & mitem, sed qui irritatus feriret. *Plini-
 us* per mensem lunā instigare scribit, *Ambrosius*
juvenis cuiusdā exemplum adfert,
 qui cum eum complicare in nodum conare-
 tur, ita admorsus est, ut copiosus sanguis pro-
 fluere. Excrementa ejus moschi odorē spi-
 rant: vix tamen omnium, aut omni tempore.
 Romæ in domibus olim pascebatur. *Nisi in-
 cendys semina exurerentur, non esset fecunditati
 eorum resistere* inquit *Plinius*.

De Usu ita *Plinius*. Prodest vivus cōprehensus, vsus.
 & in aqua cōtus, si foveatur ita morsus. Quin &
 inesse ei remedia multa creduntur, & ideo Æscula-
 pio dicatur. *Democritus* quidē ex his monstra quæ-
 dam conficit, ut possint avium sermones intelligi.

Duplicis sunt generis. Alij pallidiores; alij, *Differētia.*
nigredine persusi quorum icones damus. *Wot-*
tonus totidem Syriacorum facit. Alij æris re-
 ferunt colorē; nigricant alij. Morsum tumor
 duntaxat & levis inflammatio excipit. In A-
 frica, ejusq; in Mauritania monte *Ziz* qui va-
 gantur, prandij tempore micæ de mēsis ca-
 dentes legūt. Tales & apud *Pyrenæos* *Bige-*
rones haberi, testatur *Scaliger*. In Norvegia
 vaccino aut ovino lacte aluntur, & plerum-
 q; in infantū cunis, sidi ipsorū custodes do-
 miunt; verum si quando incendio domus de-
 leantur, aut pestilentia incolę pereant, in an-
 tris conditi ita se propagant, ut incolis gra-
 ves sint. Hujus generis ille fuit, quem *Marfus*
 quidā *Venetis* circū ferebat, à *Geshero* de-
 script⁹. Capite erat elegātū & subflavo, corpo-
 re nigricante maculis purpureis distincto. In
 laterib. linea quædā secūdū longitudinē cō-
 spicua erat, quæ paulo supra caudā termina-
 bat, & infra caput, per spaciū palmi incipi-
 ebat. Lōgus erat dodrantes quatuor cū dimi-
 dio, ex plaga orientali delatus. Venenatū non
 fuisse inde patet, q̃ circulator, caput ejus ori-
 d indere

Locus.
Allat. in l.
de opinio-
nibus
Græcor.

Natura.
Plin. H. N.
l. 29. c. 4.

Plin. l. c.

Plin. l. c.

Scalig.
Exerc.

indere solet. In Angue super omnes tenuis-
simo quem propter innocentiam Neapolita-
ni dicunt *Angioleta*, Bononienſes *Bisognola*
Sever. Zoo- sunt hæc singularia. Cor cum cæco quodam
17. Demo- angulo ad basin affurgens, qui cum toto
crit. p. 368. corpore & alligato vase figuram refert cal-
cei. *Hepar* bifidum, tum in longum, tum in la-
tum. Uteri cornua sicut & in caprimulgo
angue; talis etiã vulva & vesiculæ duæ sper-
maticę hinc atque hinc ad eam formam.

ARTICVLVS XVII.

De serpentibus terrestribus Exoticis,
Indicis imprimis.

PUNCTVM I.

De Boicinginga, seu Teutlacocauhqui.

EXotici serpentes varij sunt, quos hic sub
sex punctis trademus. Sub primo po-
nimus *Boicingam*, quæ & *Boicinininga* &
Boiquira, Brasiliensibus, *Ayug* Tapuyis, Lusi-
tanis *Cascavela*, & *Tangedor*, Belgis *Râetel*
schlange, Mexicanis *Teutlacocauhqui* dicitur.
Tres ipsius descriptiones dabo, quia lcones
variant, *Marcgravi*, *Pisonis*, & *Nierembergij*.
Marcgravi est serpens quatuor pedes & tres
digitos longus, Corpore in medio crassiori,
versus utramque extremitatem verò attenu-
ato; in medio a. ubi crassissimus, brachium
humanum prope cubitum crassitie æquat.
Hiſt. Brasl. Venter illius est planus: Caput cōpressū, selqui-
1.6. c. 14. digitū lōgū & latū. Oculi parvi; lingua teres &
bifida. Inter cæteros dentes, quatuor habet
reliquis longiores, falcatos, albos, acutos
instar spinæ, quos retrò condere & gingivā
occultare potest. In pelle squamas habet, verū
haud talis duritiei. Totum dorsum insignitur
catenā pallide flava, hamulis illius figura cu-
bica constantibus, fimbriatis nigro: spatium
a. intermedium inter quemlibet hamulum
fufceſcit. Lateralia corporis flavescentia cubis
nigris ordine positis variegantur: nimirum
duplex ordo cuborum nigrorum in quolibet
latere, & cuilibet angulo hamuli catenæ
dorsalis, respondet cubus unus lateralis uni-
us seriei, alter alterius seriei respondet, inter-
stitio duorum hamulorum catenæ dorsif. Ven-
ter squamas habet grandiores reliquis, quasi
parallelogrammas, pallidè flavescentes.
Cauda a. in extremitate adnatum est corpus
parallelogrammum, paululum compres-
sum, constans quasi hamulis catena-
rij singulari modo invicem aptatis, ut
cymbali modò serpens sonum eo edat, & è
longinquo audiri possit. Quot annorū ser-
pens, tot partes habet crepitaculum hoc.
Serpens decem annorum habet crepitaculū
hoc longum duos digitos aut paulò plus, la-
tum quoq; plus quā semidigitum. Substantia
constat lævi, glabrâ, pellucida, sicca, coloris
ex albo & cinereo subfufceſcentis. Serpens
est apprime venenatus, nec Antidotum co-


Piso de Med gnitum contra illud virus.

Brasl. 1.3. De eodem serpente ita *Piso*. Primo serpens
ille Bocinininga, quem *Cascavel* & *Tangedor*

Hispani nominant, propterea quod sonitū
instar tintinnabuli caudâ edat, in trivijs juxta
ac devijs locis cernitur, tãque celeriter pro-
reptans, ut volare videatur. Huic tam perni-
cioso colubro, benigna natura, cautionis
quasi gratiâ, nolam addidisse, ut illius sonitu,
admonitus quilibet tempestive sibi caveat
à vicino hoste. Brachij est crassitie, longitu-
dine interdum quinque pedum, *lingvâ biful-
ca, dentibus* longis & acutis, colore fulco, & ad
flavum vergente. Quotannis articulus, quo
infectare solet, in cauda crescit, cujus extre-
mitate in anū hominis immissa, mortem in-
fert confestim; venenum a. quod ore vel dē-
tibus infert, multo lētius vitam tollit. Ex vul-
nere mox sanies cruenta effluit, caro liver,
ulcusq; paulatim serpit. Ad remedia extrahē-
tia, vulnus dilatantia, scarificationes, cucur-
bitulas, & si pars læsa intercepti possit, ad vin-
cula festinant, idq; junco lacepe cui reme-
dio maximè fidunt Brasiliani; sin minus, cau-
terio utendum est. Interim dum veneni qua-
litas ad cor penetrat, curandum ut interius
præmuniatur Tipiocæ haustu, sudoresque e-
vocantibus insistendum. Præsentissimū præ-
cæteris remedium, quod Barbaris, cōtra hu-
jus aut qualicunq; serpentis morſus restat,
est ipsius nocentis caput, quod contundunt,
contusū emplastri forma vulnere calens ap-
plicant: cui remedio simul addunt, in omni
fere morſu, salivam hominis ieiuni, qua per-
petuo partem affectam demulcent. (Plinius
1.7. c. 2. Galen. 1.10. simplic. Scaliger in Hist.
Animal. 1.11. c. 18. hanc salivæ vim quoque ag-
noscunt.) Adeoq; his duobus Antidotis ni-
tuntur, ut desperent, si in illis voti compotes
non fiant. Ego hæc & similia remedia, quæ
longa illis experientia dictavit, jubente ne-
cessitate, lubet sum imitatus. Nō intermit-
tendo tamen ea quæ à veneranda antiquitate
& authoribus nobis sunt relicta. Ne nimium
temere hæc novitijs, aut pertinacius veteri-
bus viderer ad hære.

Nieremberg Dominam Serpentū vocat, *Nieremb.*
& hæc de ea habet. Non sine naturæ usu rep-
Hiſt. Exot. tilia sunt: nec minus majestaté creatoris hu-
1.12. c. 1. militate suâ exaggerant, non minus bonitate
peſte suâ. Scit pessimis Deus juvare, scit vene-
no mederi; liberalem medicina opẽ è noxijs
istis usurpat. Exordium occupet atrox serpe-
tum genus, *Teutlacocauhqui*, seu *dominā ser-
pentum* Barbari vocant, *viperam* Hispani, live
ob similitudinē capitis sive pestis. Anvis hic
quaternos pedes aut amplius longus, & hu-
manū, ubi mediocriter crassus est, latus: *dorso*
eminēt, *viperino capite, vêtre* ex albo palleſ-
cēte, *lateralib.* opertis, cādentib. *squamis*, fascijs
tamen pullis per intervalla intermixtis, *dorsū*
fufcū est, luteis tamen lineis sese in ipsâ spi-
nâ secantib. insignē. Multe sunt ejus serpētis
differētiæ, nō plurimū inter se distantes, & ictu
mortē inferētes, nisi celerrime præſidijs oc-
curratur. In spiras, irritatus, aut cōtrectatus
ac ina-

Boicininga .




Boicinininga aliter .




Boiguacu .




Ibiboboca .




Iararaca .



Amore pinima .









Domina

*Serpentum
Nieremb .*



Mater Formicarum Clus .



*Serpens Peregrinus ampu-
tato Capite
Clus .*

ac inæqualiter caput contorquet, sed ita fibi undique cavet, ut nullâ non parte se vindicet ab injuriâ. Ex cogitatum est ic̃ta humare mēbra terrâq; obnuere, & ita manere donec omninò cesset dolor, aut morbus sit curatus: prospero magnâ ex parte eventu. Per saxa fertur celeri cursu, at per terrestria plana que (quod mirum videtur) non adeò: Ob quod Mexicanorum quidam à vento nomen indidere, vocantes *Hoacoati*. Quot annos natus est, tot accedunt caudæ perstreptentia sonalia, posteriore in parte caudæ vertebrarum instar connexæ. *Oculi* sunt nigri, mediocris magnitudinis. *Dentes* habet supernâ maxilla caninos, quib. jaculatur venenum; utroque a latere oris quinque parvi dentes supernæ maxillæ insunt, sed qui facile conspici à quolibet aperto ore queant. Et sinuosè graditur, ictus, toto corpore hiantibus rimis fatiscit, & viginti quatuor horis tranfactis à morsu animam dicitur agere. Apprehensos caudâ, Indi, quicquid veniantur, tuto tenent appendentes: tamen torquentes collum, perstreptentes sonalibus, corpus illuc hucque jactantes, ac nihil non molientes, ut pœnas de venatore sumant. Narrant multi, qui eum serpentem domi alere solent atque educare, annum integrum durare absque cibo ullo potuque, abscissumque caput decem aut amplius dies ferunt apud Panucensēs in femoris crassitudinem, & longitudinem incredibiliter adolescere. Norunt cicurari posse permulti, qui eos domi alentes habent in delicijs. Venenum jaculatur caninorum tubulis; cavi n. sunt. Nec desunt, qui affirmant, vivum parere etsi falsò, quemadmodum ex aliorum narratione constat. Cum læsus irascitur, sonalibus concussis vehementer perstreptit, erigitque collum non sine adstantium timore, nec tamen mordet, nisi compressus aut incitatus. Caninis in usus medicos servatis, pungunt Mexicani Medici collum cervicemque, doloris capitis placandi gratiâ, pinguedineque animalis omnium ferè nocentissimi, lumbos perungunt, sedando illorum dolori, aliasque corporis partes dolore infestatas, ac discutiunt præter naturam tumores. *Edunt* Indi eorum carnes, ac verissimum esse statuunt, corticalium carnibus, esse præstantiores, ac gustu gratiores. Linteo cōvoluta quantum velis, tenui raroque, ita tepescit illa feritas, ut vel à puero quolibet circa formidinem, aut noxam ullâ deferri possit. Ajunt *caput* hujus serpentis alligatum collo, instar viperini, gutturi morbo ferè suppetias; Febrientibusq; medentur puncturæ serpentium omnium, quibus natura appendet sonalia, humano stercore duarum unciarum pondere, ex quâ congruenti propinato, aut commanfo, *picietl*, & admoto vulnere, item corniculis cujusdam arboris vulgaris novi orbi tulsis, atque applicatis. Est etiam

huic malo cōvenientissima Chipato ac provenit in calidis locis Novæ Hispaniæ ubique ferè. Est & alius serpens, *teutlacoutraubqui* quoque nuncupatus, quinq; dodrauntes interdum longitudinem superans, & humerū crassitudine, nec dissimilis alteri ejusdē nominis tum formâ, tū veneni atrocitate, præterea etiam & sonalibus, in quæ finitur caudâ; sed hujus color pullus est, vergens in luteum, pallidis maculis (quod alteri quoque contigit) oblique sese interfecantibus. Ajunt eam esse veneni hujus vim, ut non ictu tantum, verum contactu quoque officiat: unde sortitum nomen.

PUNCTVM II.

De *Ibiboboca* & *Boigvacu*.

Ibibobocam & *Piso* & *Marcgravius* describunt. Ille ita de ea. *Ibiboboca* Brasiliensibus, angvis pulcher, Lusitanis *Cobra de Corais* appellatur, *Marcg. hist. Brasil. l. 6. cap. 13. Piso Med. Bras. l. 4.* duos pedes longus, pollicem autem crassus, colore niveo, & nigris, rubrisque maculis variegatus. Morsus illius venenatissimus, non extēplò vitam depascitur, sed tardè se promovet. Sanatur emplastro è capite serpentis cōcinnato, & efficaciter appposito. Pulvis plætæ Nhambi, tū & succus foliorū *Caapeba*, & *Cajatia*, vulnere instillatus, extrahit virus.

Exactius paulo *Marcgravius* suum depinxit. Ita n. de eo. *Ibiboca* Brasiliensibus; *Cobra de Coral* Lusitanis: serpens duos pedes longus & pollicem humanum ferè crassus, ubi crassissimus; nam versus posteriorem partem teres est, & acutus, instar subulæ. Totus venter est albus & splendens: *dorsum* & latera tinēta. *Caput* habet squamulas albas cubicas, ad oras nigras, hinc cinnabria sequitur macula, cujus squamæ per oras nigræ, & ita semper rubra macula est, hinc sequitur nigra, hinc alba, iterū nigra hinc rubra & sic deinceps. Rubra macula plus uno digito est longa, duæ albæ & tres nigræ simul sumptæ selsquidigitum longæ, æquales inter se: nigræ a maculæ totaliter sunt nigræ, albarum autem oræ nigræ, venenatus est serpens.

Boigvacu aliquot species habet *Marcgravius*, quas ejusdē verbis exhibemus. *Boigvacu* Brasiliensis *Cobra de Veado* Lusitanis. Erat pel- *Marcg. hist. Brasil. l. 6. cap. 13.* lis septem, & semis pedes *Rhynlādicos* lōga, in medio corpore undecim digitos lata, sensim versus caput & caudâ in angustiorē latitudinem vergens, ita ut eo loco quo caput abscissum, tantum circiter quatuor digitorū latitudinem haberet, & in caudæ extremitate paulo minorē. Tota autē pellis squamis erat tecta certa serie dispositis in ventre majorib. in dorso minorib. ut in omnib. serpentibus; Elegantissime autē erat variegata; nēpe per mediū dorsū secundum longitudinē maculis nigris, q̃ catenæ cujusdā majorib. partib. cōstatis figurâ quasi referebāt, ad latera autē utrinq; palmū inter se distātes maculæ nigræ rotundæ fere, in quarū centro albo macula itidē

rotunda, magnitudinem autem hæ macula habebant majorem imperiali: inter hæc, attamen extrailarum ordinem, versus ventrem iterum utrinque duæ series minorum macularum nigrarum discurrebant. Ejusdem coloris & similibus maculis accipiebam Septimo Augusti 1638. Sed majorem priori, crassities n. corporis medij erat tredecim digitorum, longitudo a. octo pedum & supra. Ejusdem speciei unum accepi vivum tertio Augusti 1638. similibus maculis; longum quinque pedes & quatuor digitos; crassum vero, ubi crassissimus, semipedem. *Caruem* habebat albam angvillæ similem. *Cor* exemptum è corpore per quadrantem horæ subsiliebat. In postica parte corporis, septem digitorum intervallo ab extremitate caudæ duos breves *ungues* habebat quasi avium, circa anum nimirum. Duplicem ordinem *dentium* acutissimorum, in utraque maxilla. Caput latum & supra oculos in duo tubera clatum.

Ejusdem speciei ingentem accepi sexto Octobris 1638. inquit *Marcgravius*, cujus longitudo erat octo pedum & semis; crassities ubi maxima, quindecim digitorum: eratque valde nigro & albo variegatus. *Carnem* habebat albissimam & pinguem. *Carnem* sepelivi, & ossa post quadrimestre spatium exemi pro scelecto. *Pellem* tomento replevi. Spina a. dorso ossibus constat, & costæ dura spina. Duplicem ordinem habebat *dentium* in utraque maxilla, quæ itidem duplex erat. *Dentes* longi acutissimi, paulum incurvi, acus pectinum referentes, splendide albi coloris, instar matris perlarum politæ. serpens hic vocatur à Brasiliensibus *Boaguacu*, i. e. magnus; nam vidi qui integram capream deglutiverat. Non sunt venenati & caro illorum comeditur.

Alterius speciei mihi allatus decimo quinto Novembris 1639. cujus longitudo erat quatuor pedum & unius digiti crassities, ubi maxima, quinque digitorum. Squamis in ventre argentei coloris splendidissimi, reliquo corpore, nigro & albo variegati. Cauda quasi è sex annulis composita erat argenteis. Sex acutos dentes habebat in utraque maxilla.

Habui etiam ferrei plane coloris & in ventre albi, longitudine trium pedum aut circiter, crassitie ubi maxima, duorum digitorum. Habitant in ædibus & ova gallinarum exforbent. Sæpius inveni in ædibus & extra planè virides, duos aut tres pedes longos, crassitie digiti articularis. Amplum his os & nigra lingua: suntque admodum venenosi, vocantur à Brasilianis *Borobi*.

Piso Med. Bras. l. 3.

Piso eundem serpentem paucis nobis ita exhibet. *Boiguacu* sive *liboya*, serpentium omnium facile maximus, peccus ferè hominis crassus, Lusitanis *Cobre de*

Veado dictus, quod *Dorcadæ* integras devoret, idque sugendo potius, quam masticando. Ex horum genere quidam octodecim vel quatuor & viginti pedes reperiuntur longi: Cineritio, spadiceo variegato sunt colore. Non æque veneno, ut multi alij, turgent. Carne eorum non solum Indigenæ & Nigritæ, sed & nostrates vescuntur. Famelicus hic angvis vel ex dumetis profilit, caudæque suæ nitens, horrendè se erigit & strenue cum feris & hominibus luctatur, & sibilat irritatus, vel ex arbore insidiosè in viatorem desilit, eumque validissimis cingit amplexibus, ita ut vel sola complexione interimat: nec minus validi atque feroces existunt duo ingentes illi *Arabo* & *Cucuraciu*, hominibus æquè ac capreis insidiantur. Quippe omnes hujus generis solidis vertebis & costis præditos ex Anatome animadverti. Ictus eorum vix censetur venenatus, & per se aliquando, etiamsi nullo vel leviori saltem adhibito remedio, curatur. Ita ut hi inter non venenatos serpentes, de quibus passim auctores multa testantur, debeant numerari: quibus Caninana, Macina, & Vicia annumerare licet, quod nihil vel parum saltem hominibus noceant.

His similes sunt serpentes in Regno *Nierëb. H. negæ*, si *Aloysio Cadamusto* credendum est. *E. l. 12. c. 43*
Duorum n. pedum mensuram excedunt: alas, nec pedes habent ut serpentes, alioquin immensi, & tantæ quidem vastitatis, ut integras capras hauriant, nec lancinent, solidè devorent. Ferunt incolæ, serpentes hujusmodi congregari statim anni diebus, & migrare in loca quædam, ubi formicarum est vis magna, quibus & color albicans quæ suapte natura humiles quasdam casas instar specus serpentibus extruunt.

Nam ore terram portant, & ferruminant absque calce. Diceret *clibanos* aliquos vel *rusculas* in ordine dispositas. nam ex hujusmodi casis videbis centum & quinquaginta continenter subordinatas, ut alteram sequatur altera, miro naturæ ordine. Sed & contumax viribus serpens quidam est *Thema*, cui *cabuilla* enim idem est, atq; cum *Nierëmb. H. Ex. l. 12. cap. 41.*
quinque pugnans; in obvios n. impetum facit, eaque vi opprimit, ut si collo semet se advolverit, strangulet interimatque, aut salvo homine ipse coluber disrumpatur suo obnixu. Qui hujus naturam novere, eum deludunt, opposcentes arborem aut aliud cujus nexu disrumpatur, putans comprimere hominem, ut ita tandem convulsus intereat.

PUNCTVM III.

De Boitiapo, & Iraraca.

Boitiapo Brasiliensibus; Lusitanis *Cobra de cipo* serpens septem aut octo pedes longus, brachium humanum crassius: Teres ac in postica parte instar subulæ acuminatus; coloris olivacei, in ventre flavescens. Vestitur squamulis elegantibus quasi triangulatis. Visitat ranis; Est venenatus. *Iraraca* brevis est hic serpens raroque semicubiti longitudinem excedit, venis quibusdam in capite prominentibus instar viperarum, & haud aliter quam ille stridens: rubris & nigris maculis insignis, cæterum terreo colore: Ejus morsus venenatus non minora adfert symptomata, quam vel reliquorum serpentum, exceptis ijs qui lentè & clam vitam depascuntur. Ipsa fera postquam vulnus infixit, à cute, cauda, capite & intraneis repurgata, & in aquâ radicis lurepeba, cum sale, oleo, porro, anetho & similibus cocta, à vulneratis comeditur, magnoque illis solet esse præsidio. Convenit denique præcæteris, *Caatia*, quæ merito *Herba de Cobras* dicitur, quod foris & intus exhibita, hujus aliorumque serpentum morsus facile restituat. Idem feliciter præstant acini arboris Suibira, contusi & moribus applicati.

PUNCTVM IV.

De Caninana, Serpente mansueto, Apochycoatl, & Alatis.

Caninana Serpens, ventre est flavo, dorso autem viridi, octo circiter palmos longus, inter minus venenatos habetur: ovis visitat & volucris: Capite & cauda relictis, ab Afris & Americanis comeditur. De peculiari illius Antidoto, nihil adhuc certi affirmare possum. Vulgaribus alexipharmacis sive Europæis, sive indigenis supra enarratis, malum si quod infert facile expugnatur. Familiare autem illud decoctum antidotale, ex radice lurepeba, cū pauxillo salis huic alijsque moribus vel puncturis venenatis sæpe applicandum est, nec non fructus Ananas viridis, isque in cataplasmatibus modum contusus. Denique si necessitas ulterius urgeat, pars læsa scarificetur, moxque vivus gallinaceus pullus imponatur.

Alii vidimus ab Indis, ait Franciscus Hernandus deliciarum gratiâ, *colubros* quosdam virides, qui allati ab agris, pollicari tantum magnitudine, in femoris crassitudinem amplicentur & adolecant. Ubi pro antro est illis dolium stramento indulgentiæ gratiâ

emollitum, ubi magnâ ex parte quiescunt, vivuntq; nisi cum edendi est tempus. Tunc n. egressi cubile, aut humeros heri amice conscendunt, benevolè terrifici animalis amplexus tolerantis, aut è pistillis, in medio contracti in spiras, rotamque magnam æquant, innocentissimi vescuntur oblati, atque quiescunt.

Serpens quidam est apud Pamæenses *Nieremb.* quinos prolixus cubitos, & quatuor digi- *H.E. l. 12.* tos latus, Squamis nitidis, albo nigroque *cap. 45.* variantibus colore; *Apachycoatl* vocatur, & morsu minime exitiali.

Alati serpentes in Floridâ reperti alis eate- *Nieremb.* nus instructi, ut possent tolli è terrâ & volare *H.E. l. 12.* demissè viderentur. Americus Vesputius *cap. 36.* quoque invenit Indos piscatores, qui serpentem alatum craticulæ ligneæ impositum asfabant. In tugurijs complures ejusmodi serpentes vivos habebant, quorum pedes vinculis alligati, faucesque funibus constrictæ erant, ne quid hominibus noxæ inferrent.

PUNCTVM V.

De Bojobi, Tetrauchcoatl, Tleoa seu igneo, sangvineis & Trinhutli.

Bojobi Brasiliensibus, Lusitanis *Cobre Verde*, ulnæ est longitudine & pollicis crassitie, coloris porracei & pulchre micantis. *Piso. Med. Bras. l. 3.* Edificijs gaudet, neque ulli nocet nisi irritanti: morsus tamen illius venenatus, remedio quamvis eximio vix cedit. Radix a. illa nodosa herbæ Caapia confusa & ex aqua pota, summopere prodest, cæterisq; herbis Antidotilibus, facile palmam in hoc casu præripit. Miles quidam gregarius anguem hunc inter arbuscula latitantem, dum pede forte conterit, ab eo in femore demorsus, paucis post diebus, toto corpore tumefacto & livescente, deficiente radice Caapia, cæterisque remedijs frustra adhibitis, præsentibus commilitonibus, quam miserimè expiravit. Idem videtur cum illis de quibus supra ex Hernando.

Tetrauchcoatl serpens est tres dodrantes longus, ac digitum crassus, cujus ictus pestilens est; *dorsum* nigrum, *venter* candescens *Nieremb. H. Exot. l. 12.* ex pallido, & rubescens infernâ caudâ, *cap. 35.* venter a. & cauda punctis nigris conspersa, *caput* nigrum, actorque circumcinctus luteo. Remedium morsus est, ictum locum sugere, sed commanfo prius piceis, ne venenum noceat præsidium adferentibus, quod etiam velut egregium antidotum admoveere expedit vulnere; nec solum adversans illatæ noxæ, sed ipsis quoque serpentibus infensum & inimicum.

Tleoa s. igneus coluber angvis est sesquidrandentem longus, ac digitum crassus *squamis* albis, nigris, fulvis, fuscisque distinctus. *Caput* est viperæ nostratis capiti simile, caudaque juxta finem subito attenuata, intervalloque binum tantum digitorum, quæ desinit in sonalia. Lethalem infert morsum, u-
Nieremb. rentemque unde evenit ei nomen. Cum
H.E.L. 12. incedit, in latera utrumque se convolvit, ac
cap. 31. lento procedit gressu. Contra ejus morsum ajunt conferre tusam radicem herbæ, quam vocant ancola. Idem auctor scribit de thecoatl, signito serpente: Coluber est sex dodrantum mensuram adolescens, triumque digitorum crassitudinem. Vivit montanis locis, & lethalem infert morsum: color est fulvus, sed dilutior circa ventrem, ac vergens in cinereum sinuosè incedit, in utraque sese latera contorquens, vivit in montibus Teportlanicis.

Sunt tamen *alijs serpentes*, qui aspectu referant ignem, octo pedibus longi, colore sanguinei, qui noctu inflammati apparent, ut ignis aliquis videatur, quemadmodum Antonius Herrera prodidit. Scribit quoque Franciscus Hernandus vocari *cumcoatl* colubrum, qui nocturnis tenebris splendeat, qui & letifer morsu, quatuor longus cubitos, & brachium crassus.

Serpens est Panucinus, longus ac latus, albis & nigris distinctus maculis, trinuittili vocatus, quod caudâ, quæ præacuta est, lethaliter pungat.

PVNCTVM VI.

De quibusdam Veterum serpentibus.

PRæter hæc quæ jam enumeravimus serpentum genera, sunt & alia apud veteres obvia, quæ difficulter ad jam explicata referri possunt. Facit Ælianus cujusdam *Hyæne* disti mentionem, quem utriusque sexus participem esse narrat. Altero anno marem, altero faminam observari. Ad stipulatur eidem Orus. Nicander quâsdam *Libyas* angves inter innoxios recensuit. Suidas scribit de *Argolis* serpentibus, quos Alexander Argo Pelasgico Alexandriam deferri, & in flumen pro extinguendis Aspidibus conjici curavit. Gesnerus *Mergolos* etiam nominat, ex Africa delatos; sed qui & quales sint, non addit. A Helychio & Varino *tegiotes* *Edotes* *Opotes* nominatur.

Clitarchus etiam, referente Æliano, serpentes in India sedecem cubitor. generari scribit; alios etiam multo minores pigmentis distinctos. Virtas enim à capite ad caudam pertinentes habere, alias æreas, alias argentæas, nonnullos rubras, alias aureas,

easdemque celerrimè pestifero ictu interire. Meminit & alterius, puniceis coloris, quem forte *Porphyrum* Ælianus vocat, Strabo, apud Indos dodrantali magnitudine, capite candido, dentibus nullis, quem venatores in montibus meridiei obversis, ex quibus Sardius eruitur, indagant. Non mordet, sed vomitu ejus conspersus locus subitam contrahit putredinem. Quapropter, caudâ suspensus, duplex veneni genus eructat; alterum nigrum & speciem electri referens, quod à vivo ejcitur: alterum simpliciter nigrum, de ore animantis prodit. Illud grano sesami exhibitum, cerebrum per nares excutit: hoc tabem inducit.



CAPVT II.

De Serpentibus Aquaticis.

ARTICVLVS I.

De Hydro seu Natrice.

Tantum de Terrestribus serpentibus, sequuntur *Aquatici*, nempe *Hydrus* seu *Natrix*, *Natrix torquata*, *Natrix rubetaria*, *Boa*, *Hydrus marinus*, *Scolopendra marina*, & quidam *Exotici*. *Hydrum* *ὑδρῶς* *ὑδατος* ab aqua nempe dici, clarum est. Cretensibus est *ναρξῶς*; alijs *ὑνδρῶς*, quod nomen generale est de illis quæ in aquis vivunt; Nicandri interpreti *χερσυνδρῶς*, quod in aquis & terrâ divagetur. Latini vocant *Hydram*, masculum, *Hydrum* *Athen.H.A.* *fæminam*, cujus nomen Ælianus Dryino im-
l.8.c.13. posuisse videtur, dum ait Hydram in Cercyra genitas, maligno flatu hominem persequentem reprimere; *Natricem* à nandi peritia; *Colubrum aquaticum*, quem tamen Plinius, dum jecur colubri aquatici & hydritrum lithias subvenire scribit, ab Hydro; distingvit; *Natricem*, denique, quod apud Gazam legitur. Belluacensis & author libri de natura rerum, Naderæ serpentis Germanici meminit, crassitudine brachij, colore ventris luteo, & dorso virèti, halitu adedò noxio, ut in cortice virgæ recenter casæ, & ori admotæ, vesicæ felleæ excitentur; imò fulgens gladius lingua veneno inficiatur, quod ad summitatem usque gladij deferatur. Pede hominis vulnerato, venenum statim in totum corpus penetrat. Ideo ictus confestim suspenditur, ne ascendere possit.


Pulcherrimos serpentum in orbe terrarum Plinius facit; sed nullis serpentium inferiores veneno. Nicander caput plenum & humile adscribit, & dum terrestrem squalidum prodit & decorem, videtur aquatico pulchritudinè vindicare. Alioquin
aspi-

Ambrosi.
l.c.17.
Nomen.

Athen.H.A.
l.8.c.13.

Descriptio.
Plin.H.N.
l.29.c.4.

Chersydrus Greuini Hydrus Natrix .



Natrix Torquata .




Natrix Rubetaria .



Natrix Rubetariae sceleron



Serpens Marinus .



aspidem formâ referût; cervicem si excipias, quæ non ita lata conspicitur. Cinereo quoque sunt colore, & quibusdam maculis spectabiles, *Lingvam* bifidam habere, (falsò ducas ponunt) commune illi cum alijs serpentibus.

Locus. Stabulantur in Cercyra teste Æliano, in lacu Mycleo, circa Terracinam in Italia: in palude Agnani inter Puteolos, & Neapolim, quos ipsi vidimus; in aquis calidis & Thermalibus. Idèd redemptores balnearum ad Limagum lacum; laminas ferreas crebris foraminib. pervias emissariis obdunt, ne alveos subeant. In aquis etiam corruptis plerumque reperiuntur. Adventante hyeme subterraneas cavernas eligunt, in ijsque ad vernum tempus latent. In aquis autem præcipuè versantur; exsiccatis terram petunt, victus conquirendi gratiâ. Extra aquas etiam ova parere, Aristoteles prodidit.

Gesner. de serpent. De victu hoc tradit Virgilius, piscibus & ranis vesci, gulososque esse. Unde Nicander *λίσυες* vocavit. Virgilij verba sunt.

Virgil. Georg. 4. 3. Est etiam ille malus Calabus in saltibus agyis,
Squamea convolvens sub lato pectore terga,
Arque notis longam maculosus grandibus alvum.
Qui dum amnes ubi rumpuntur fontibus, & dum
Vere madent udo terræ ac pluvialibus Austris,
Stagna colit, ripisque habitans hic piscibus atram
Improbis ingluviem, ranisque loquacibus explet.
Postquam exhausta palus, terræque ardore debiscunt
Exilit inficcum, & flammantia lumina torquens
Savit agris, asperque siti, atque exterritus aestu.

Aratus in Phenom. Rectè ergò Aratus, ranas hydrorum cibum dixit. Fallitur tamen sæpe ab Ægyptiaca, quæ Cherfydrum eminus conspicata, frustum arundinis transversum arripit & gestat ne deglutiri possit: nec ille tam aperto ore ut utrumque absorbeat.

Natura. Ad naturam duo spectant, venenum, & lapidis quem in capite gestat. De veneno abeunt in diversa authores. Cardano nihil venenati habent, si per viperas undam incoherentes, Cherfydros intellexit Cælius Rhodiginus in terra sæviorem, minus in aqua facit. At Ælianus ex Apollodoro tam pernitiosum scribit, ut & cadaveris ejus contactus perimat. Plinius nulli hac in parte serpentum generi inferiorem dicit, ut supra allatum. Columella denique, exsiccata uilagine, in qua Natrices morabantur, cæcos

sæpe morbos contrahi, quor. causas Medici perscrutari minimè possint, addit. Ut ut sit, Dædalus & Euridice Orphei uxor, icu Cherfydri perijsse traduntur. *Lapis* à deglutito evomi creditur. Quidam eum caudâ suspensum folijs lauri suffiunt, & per Deum ut lapidem ejiciat, orant, quod non minus superstitiosum quàm blasphemum est. Holierius vas aqua plenum suspensio subjicit; lapis ejectus totam absumit. Sed de eo alibi.

De veneni signis ita Nicander.

Veneni signa & medela.

Pessima quas fecit plagas hæc signa sequuntur.

Arida tota cutis circum putret horribilemque

Elevat aspectum, magni ignitique dolores

Tandem hominem interimunt, mox plurima pustula surgit,

Ac alia ex alia bullæ se partem pendunt

Et miserum diris turbant affectibus ægrum.

Adde his, vomitum cholerae fætida, quem vel tertiâ horâ, vel tertio die mors excipit; vulneris dilatatio & nigredo, ex qua nigra & fætida sanies extillat, quod apud Aëtium & Abensinam habetur. *Morsui* Dioscorides origano trito & cum aqua subactio, vel Cortice Aristolochiæ, radice quernâ, occurrit; Ægineta, nasturtio sylvestri, aut asphodeli fructu, vel semine fæniculi; Plinius ipsorum hydrorum jecore & eryngio: Apulejus verbenaca: Aëtius theriacâ, mithridatio, & drachma nucum cupressi, cum æqua portione baccarum myrti, & melle aut vino: Celsus, panace, prasio, & satureja: Abensina, emplastro ex calce, calamintha montana, Cortice radice quercus & oleo parato. Pareus in quodam admorso, qui cum manu ori admota, vulnus luserat, in tumorem quoque linguæ, & brachij, cum dolore ingenti & syncope inciderat, theriacâ ad sudores, & vulneris elotionem feliciter usus est.

Magni est in Medicina usus, si veteribus, & recentioribus credimus. Ex dente dentiscalpium odontalgiam sedat, si eo scalpentur. Duo superiores superiorum, totidem inferiores inferiorum dolorum mitigant, alligati. *Adipe* Niliaci peruncti à Crocodilis non tanguntur. *Iecur* lithiasi medetur. *Spolum* suffitum uteri prolapsui & sedis prodest; quod ab Encelio proditum. Cinis in olla luto probè circumlita, igne sarmentor. vitis cremati, cum oleo permixtus ad strumas à Sylvio laudatur. *Lapis* hydropi vehementer conducit, si genuinus est. Talem esse scribit Gesnerus, si conchæ æneæ aqua plenæ circumligatus, quotidie cotylas duas, seu unciâs decem ejusdem absumserit. Venenatos vermes fugare, Camillus Leonhardus 3. de lapidibus. Pifaurensis prodidit. Sumptum lapidem vesicæ perfringere fabulantur quidam.

Pauca

Differētia. Pauca de Differentijs occurrunt ; Alij sunt *Vulgares*, quales sunt illi qui circa thermas Porrectanas versantur, & interdum ab ore fontis cum aqua exeunt. Aut sunt planè innocui; aut si nocent levem dūtaxat tumorem aut inflātionem morfu inferunt. Alij sunt *Venenati*, & magnitudine pro ratione locorum differentes. In flumine enim Argade ad Persicam Sittacem sito, copiosi sunt, capite albo, reliquo corpore nigro, quatuor cubitorum longitudine inveniuntur, qui interdum sub aquâ latent, noctu aquantibus exitio esse solent. In lacu infano, qui ter singulis diebus saporem mutat, primò amarus, mox falsus, tandem dulcis evadit, vicenū cubitorū conspiciūtur. Anno M. CCC. XCIX. die vigesima quinta Maij, sub Ponte Ursæ amnis vicenum cubitorum visum, Gesnerus ex chronicis Tigurinorum M. SS. author est. In lacum Anianum mense Iunio multi invicem permixtorum globi, se præcipitant. In Lybiæ desertis tam perniciosus est hydrus, brevis ille, caudâ tenui, circa collum gracilis, ut omnino partis læsæ amputationem requirat. Agricola Boam, domesticam natricem appellavit.

ARTICVLVS II.

De Natrice torquata, & Rubetaria.

Ambros. H. S. l. c. 18. **N**atrix torquata nomen à circulis quibus tanquam torquibus superior animalis pars circumdatur, invenit. Scholiastes Nicandri *πυλινθέας* vocat, seu multis coronis insignes: alij & *μυάγρης* seu *μυόθηγας*, quod muribus vescantur, & *όροφίας*, quod circa domorum tecta versentur, vocant. Apud Aristophanem, *όφεις ιινεροι*, domū custodes dicuntur. *Nerophis* est modernorum Græcorum vocabulum, *Serpens niger* à Matthiolo impositum nomen. In Italia aliqui *Carbonarium* vocant.

Descriptio. *Descriptionem* ex Ambrosino dabimus, de qua ille ita. Aëtius Myagrū veterum describere videtur, dum inquit, hunc angvem ex crasso in tenuem caudam abire, lato capite esse præditum, & mures comedere, neque morfu necare, sed inflammationem tantum inducere. Hujus natricis iconem ad vivum expressam servamus in Musæo Illustrissimi senatus Bononiensis, ubi tenuis conspicitur circa *collum & caput*, crassior penes circa *ventrem*, qui postea in caudam admodum exilem finit. *Color* tergi nigricat, circa alvum, color inter luteum, & viridem est medius lineis nigris virgatus, hujusa. nota insignis est in collo; nam maculæ candicantes è pallido, instar torquis, circulum tamen non absolventis apparent. Inter utrasque maculas in

summo cervicis angustū est interstitium duarum formā squamularum, ubi maculæ utrinque quasi triangulari figurā in acutum definunt. Deinde maculæ nigræ splendide utrinque etiam post torquem singulæ conspiciuntur.

De Loco & Natura & alijs pauca occurrunt. In pratis uliginosis, aquis, & sterquilinijs stabulari solent. Muribus vicitant, & ideo circa Lucarnum atque Verbanum lacum non interimuntur, quod isdem vineas purgent. Vaccarum ubera fugere, & postea sanguinem sequi, Flandri prodidere, quod veteres Boæ tribuunt. In fimetis quandoque pariunt. Gesnerus quandam mense Majo quatuordecem peperisse vidit; constitutione anni pluviosâ, & ijs gignendis commoda. Per ora dormientium irrepere, vapore lactis fervidi illectos, iterum egredi, quorundam traditio est. An verum sit, homines in quorum os intrarunt suaviter canere, penes lectorem sit judicium.

Huc *Natrix Rubetaria* spectat, quæ vocem *Differentia* sonoram & rubetarum æmulantem edit. Maculosa est valdè, & venustate admiranda, sibiloque à rusticis agnoscitur. Poloni *Padalica* vocant. Ictus remedium patientis pedem, in terræ humidæ scrobe per diem naturalem sepelire. Iconem & sceleton exhibemus.


ARTICVLVS III.

De Boa.


DE Boa serpente paucissima occurrunt. *Ambros. H. S. l. c. 19.* Nomen accepit, non tam ab effectu, *S. l. c. 19.* quod bovem integrum deglutire possit: quam quoddam armentorum greges sequatur, & rigua vaccar. ubera fugat; & ita lacte bulbulo alatur. Salmasius à voce *δύης*, quæ *Æ-de animal. olibus Bæoticis δύης* deducit. *δύτης* verò *subterranean* rinator est.

In ingentem excrescit molem, ita ut sub Imperatore Claudio ex sententia Solini, occisa fuerit, quæ integrum infantem in alvo gestabat. In Calabria in eam magnitudinem crescere posse, verisimile. Nam & M. Antonius Cuccinus Episcopus Anglonensis ad Thomasinum scribit, quadraginta & Thomas in sex ab hinc annis, in agro oppidi S. Archangel, Anglonensis diæceseos, à pastore scolo- *ad ill. viros præfat. Italia.* pii ictu interfectum, qui armenta & greges depascebat, cujus mandibulæ, duorum ferè palmorum longitudinis, in templo Dei paræ de Urleolo appensæ exhibeantur. Morfu inflammationem dūtaxat inducere, communis est opinio.

Huc *Angvem Caprimulgum*, quem Cervo- Severi. ne vocant de quo duplex est M. Aurelij Zoot. De- Severini quantum ad Anatomica, illa *sin-mocrit. p.* gularis, observatio, quàm cum iconibus 36. addo,



*Serpens Marinus flauis Coloris
Maris Suedici Aldro.*



*Scolopendra Marina
Aldro.*




Scolopendra Marina amethyſtini Coloris Aldr.



Serpens American,

Indicus





addo, referre libet. Prior se ita habet. *Larynx* exerta atque conspicua quacunq[ue] cordis diductione: sub larynge *lingua* per meatum ultro citroque excurrens. Quòd sibilum er-
gò edit, ne quidem mirum. Hæc n. velut fi-
stula coniecta in infernam genam mediam
recto ductu videtur. *Dentium* ordo supernè
quadruplex, infernè duplex. *Oculi* veluti vi-
trei. *Aspera arteria* parte anteriori circulis
cartilagineis, posteriori membranâ tenui &
ampla satis constructa. *Oesophagus* latissimus
pro corporis ratione. *Ventriculus* item am-
plus, in quo reptæ aviculæ tres nidææ.
Cor viscerum omnium primum & supremum
apparet: Nam sunt & inferiores eo *pulmones*,
qui cavi & fistulosi sunt, ductu eodem quo a-
spera arteria. *Magna arteria* descendens re-
versivi duo rami, alter ad oesophagū, alter ad
pulmones. *Vena cava* in parte hepatis cava:
porta verò in gibba. Hæ postquâ fines hepa-
tis excederint, committuntur, & non ante
distinguntur quam ad *testium* confinia per-
venerint; ubi primum *spermatica* vasa pro-
muntur: *Fellis* vesica longe infra hepar, dupli-
cem ductum habet; alter à portâ insertus
τῇ ἐκφύσει per mediam quandam glandulam,
forma & figura tonsillæ humanæ: cuius &
à latere *splen* visitur parviculus satis & ex ru-
bro candicans. Alter verò vesiculæ fellis tam-
mus, ab eadem glandulâ ad basin dictæ vesi-
culæ procedit, mediâ membranâ cum cor-
pore vesicæ adalligatus. *Testes* situ dispares;
nam dexter superior, ad quem mittit aorta
spermaticum & varicosum ramum, colore
albidum unum; minores deinde alios huic
oblique mittit infernè. Idem in sinistro. Sed
ramus spermaticus à vena cava simplex est
participatus ab utroque teste. *Renes* infra tes-
tes consistunt, ex multis quasi renibus con-
flati.

Ab arteria magna rami conspicui de-
cendentes oblique ad testes utrosque. *Vterus*
hac figura tibialium vestimentorum instar.
Cerebri forma eadem est, quam observavi-
mus. In alio *Caprimulgo angue*, hæc obser-
vata. *Pulmo* internè cavus, oblongus, velu-
ti saccus ubi primum inchoat hepar, desin-
ens mox per vesiculâ ad renes usq[ue] descen-
dens. *Fel* sub stomacho, convolutus gyris:
huic adhæret *splen* (verius n. credo, quam
glandula) ex albo rubescens, parvus tere-
que, velut exile pisum. *Vesica* oblonga, flatu
plena, sub visceribus naturalibus piscium
modo, continuo ductu descendens à pul-
monibus ad renes. Causam assererat F.
Thomas Campanella nostras, quod cum
certis quibudâ motibus assurgat hic serpens,
copia spiritus egebat, in longinquo alio-
quin corpore, quatenus attollere & sustine-
re se sursum posset. *Omentum* à fine hepa-
tis ad usque anum. Inter nervosam & car-

neam ventriculi membranam glandulæ mili-
ares. *Vterus* non intestino, sed huic inte-
stinum incumbit quâ cervicis medium.
Venæ renis ramus in principium uteri, intra
cujus membranas miro quodam artificio
vesica latitat parva. *Masculorum* nota,
cauda prolixior, crassior, solidior; maribus
penes duo spinosi, quemadmodum viperæ.
Vterusque item spinosus duplici cornu. Quo-
rum utrorumque fines in acutum desinen-
tes cum caudâ finiunt, & pari ejusdem gra-
cilitate. Aspritudinis finis delectatio. *La-
rynx* è faucibus exerta; credo equidem, cõ-
naturæ consilio, ne per amplos deglutitus
præfocaretur animal.

ARTICVLVS IV.

De Hydro marino, & Scolopendra marina.

DE Hydro seu serpente marino in Tomo *Ambros. H.*
de Piscibus libro primo, Titulo primo, *S. l. i. c. 20.*
capitis secundi articulo quinto dictum est:
hic pauca duntaxat ibi omiſſa adiciemus. Et
de *Loco* quidem addi potest, nusquam in a-
quis dulcibus inveniri, & ab illis quos Ari-
stoteles ibi reperiri ait diversos esse; tum
quòd illos parum ab aspidè distingvi dicat:
hi veri congruo corpore & colore sint simi-
les: tum quòd illi veneno noceant, hi innoxij
sint: tum denique, quòd illi pulmones ha-
beant, hi branchias. De *Natura* hoc dun-
taxat occurrit, captum, si dimittatur, are-
nam rostro quam primum adacto terebra-
re, subireque totum. Quantum ad *Diffe-
rentias*, dantur qui & è mari in terram
egrediuntur, qualem circa Abydum in par-
vis quibusdam alveis seu canalibus falsis
Bellonius invenit. Ejus qui in Balthico
seu Suetico mari flavi coloris, teste Olao Ma-
gno versatur, iconem hic apponimus. Cum
radice lilij adhibitum Plinius contra urinæ
incontinentiam commendat.

Scolopendra marina propter similitudinem *Scolopen-
cum* terrestri nomen obtinuit, quasi *ἐχσρα δρα.*
σκόλοπι ἐν τῇ ἐδρᾷ, quod in extremo, quod *Ambros. H.*
caudæ loco est, corniculum quasi radius at *S. l. i. c. 21.*
que impactus aculeus supereminet. Mari- *Arist. H. A.*
num anguem æmulatur; & terrestri secun- *l. 2. c. 14.*
dum Aristotelem minor est, coloreque ma-
gis rubens; nisi in loco mendum cubet, quod
Vottonus suspicatur, sic enim ne mi-
norem quidem hamum deglutire posset,
quod tamen facit. Gillius digiti lon-
gitudine se vidisse asserit. Alberto a-
nimal quadraginta quatuor vocatur,
cum tot pedes habere videatur. De *Na-
tura* hoc duntaxat occurrit, quod apud
Aristo-

Plin. H. N. Aristotelem & Plinium extat, hamo devorato omnia interanea vomere, donec hamum egerat, deinde reforbere. Addit Gillius, ob tetrum odorem piscatoribus infestissimum esse; quod hamum ab ea actum, *Ælian. H.* pisces vitent. Morfu urticæ instar urit, ut *A. l. 7. c. 30.* *Ælianus* prodidit: qui etiam adjecit, sputo *Ælian. H.* hominis interire, & rumpi. Duarum hic *A. l. 4. c. 22.* exhibemus icones, ad cubitum fere accedentes; quarum altera est *nuda* instar angvis, altera pedibus hirtis & coloris amethystini.

ARTICVLVS V.

De serpentibus Exoticis Acoatl & Maripetis.

Nieremb. berg. H. Exot. l. 12. cap. 7. **A**Coatl dicitur serpens aquatilis (alij *Miocoaatl*, quod imitetur colore spicam *Maizij*) qui etiam vivum parere fertur. *Dentibus* parvis est, & innocenti morfu: longus quinque dodrantes, pollicem crassus; tænis nigris & cyaneis alternis distinctus supernè; in ferne verò cyaneus est, capitis superna nigra, inferna lutea, latera cyanea. In paludibus regionum temperatarum invenitur.

Nieremb. H. Exot. l. 12. c. 44. De *Maripetis* ita idem. In Orientali India nonnulli angves, ut fallant instans senium aut fatum, post certum tempus petunt mare: ubi concussâ in undas caudâ, & velut flagellante, scinduntur in multos ramos velut pedes: quâ astutiâ miro naturæ miraculo evadunt in genus quoddam polypi, tam simile illis quos Lusitani vocant *poluos*, ut fallant ignaros. P. Christophorus Borrus enarravit mihi (*verba sūt Nierembergij*) se vidisse quosdâ Lusitanos, cepisse in India aliquos, rati *poluos* esse, utijs sedarent famem: incolas tamen admonuisse ne facerent, noxios esse; nec *poluos* suos esse, & distingvi pedum numero, nam angves illi impares illos habent.

Bembus. Venet. Hist. l. 6. Huc ponemustum illos qui sesquipedales, eximij coloris, in Cuba insula vivunt, & *Boquatara* vocantur: tum eum cujus iconem à Pellicerio observati Rondeletius exhibet. Terrestris angvis specie est, colore rubro, cum lineis obliquis & sinuosis à dorso ad ventrem ductis, eamque lineam à capite ad caudam secantibus. Scissura oris non admodum grandis, dentes acuti & ferrati, branchiæ operæ, squamosi piscis instar. In dorso à capite ad caudam ferè, quædam veluti capillamenta tenuia, pariterque in alvo. Claudant agmen illi qui in flumine Americano Urquaja, quatuordecem passuum longitudine, duarum ulnarum latitudine, capitibus super undas eminentibus natant, & homines natandi vel bibendi cau-

sa flumen accedentes caudâ involutos in eundem trahunt.



Historiæ Naturalis

De Serpentibus

LIBER II.

De Draconibus.

TITVLVS I.

De Draconibus in genere.

DRaconis nomen non tam *πῆρ ἀ το δῶν Ambros. A. αἶχος*, quod magnam hominibus molestiam creet, ijs intensissimus; quàm *πῆρ ἀ το δῆκεν*, quod visione valeat, venit. Græci *Δράκοντα* vocant. Syrenas alibi dictos apud *Isidorum* extat, & in Arabia alatis tale nomen.

In *Descriptione* non benè convenit authoribus. Abensina & Aëtius asperrimis squamis obsitos, magnis oculis, pelle superciliorum loco eminenti, cum pelle barbe instar sub mento, amplo *ricu*, linguâ exerta, dentibus magnis instructos faciunt. At Solinus adeò parva ora habere scripsit, ut mordere non possint: id est, non dehiscencia ad morsum: *Dentium* quoque numerus in controverfo est. Claudius Minos sedecem ponit. Nicander triplici ordine dispositos. Eadem Draco est colore nigro, ventre subviridicum palearibus sunt mento rufi coloris. Philostratum si sequimur, montanorum juvenes modicam gerent cristam, ætate proveci grandiores, & crocei coloris barbam; palistres cristis carere. Plinius verò expressè. Id modò mirum, unde *cristatos* *Iuba* crediderit. Circa Atlantem mediâ corporis parte crassescunt, caudâ & collo gracilimi.

In Africa in primis & India reperiuntur. Nam Plinius apud Æthiopes *Azachæos*, Strabo apud Hesperios; Leo Africanus in specubus Atlantis; Solinus in montibus Æthiopiarum ardentibus meridiei obversis; Philostratus circa Gangem flumen; Abensina in partibus Nubiæ; in provincia Caraja Paulus Venetus prodidit. In Calecut multos adollescere, alij authores sunt. Bellonius ex quadam Arabiæ parte in Ægyptum alatos deferri scribit. Nicander in Pelethronijs ad Pelium in Thessalia montem, vallibus quendâ olim stabulatum. Fuisse & ad Cracoviam, in historia Polonica legimus.

Famè diutissimè ferre possunt. Semel cibû aggressi, difficillime satiantur, ita ut reb. venenatis, herbis, pomis in primis, quor. succo alium

H. S. l. 2. c. 1.

Descriptio.

Plin. H. N. l. 8. c. 13. Leo African. l. 9.

Locus.

Plin. l. c.

Solin. Poly.

hist. c. 33.

Philostr. in

vita Apol-

lonij.

Bellon. Obs.

l. 2. c. 7.

Nicand. in

Theriac.

Victus.

Arist. H. A. alvum laxant, vescantur : nausea ex illis vexati, lactuca sylvestri sibi medentur. Ova serpentum spectanda arte torbent. Aut enim

Plin. H. N. solida hauriunt, si jam fauces capiunt, quæ

l. 10. c. 72 deinde in semet convoluti frangunt intus, atque ita putamina excutiunt : aut si tenerior est, & catuli adhuc ætas, orbe apprehensa spiræ, ita sensim vehementesque præstringunt, ut amputata parte ceu ferro, reliquam

Ælian. H. A. l. 2. c. 21. quæ amplexu tenetur forbeant. Simili modo avibus devoratis solidis (dicuntur hos

Phile in lambis. spiritu copioso de stabulis egressi attrahere) contentione plumas & ossa revomunt. Aristoteles sumptum ovum iterum atq; iterum

sibi admove, quoad summam partem rectam statuunt, & tum, parum contractos se

Arist. H. A. l. 8. c. 4. colligere, ut distento corpore, haustum ovum deorsum labatur, dixit.

Generatio. De Generatione vix habeo quod scribam, quia & apud authores nihil ferè occurrit.

Herodot. in Thalia. Herodotus capite maris in fæminæ os inserto coire fabulatur : mutuo complexu congre- di verisimile est. Afri ex lupæ cum aquila congressu, Draconem erumpere, rostro &

alis patri, caudâ matri similem, corio serpentino, multisque maculis versicolore, nudantur. Quidam fætus vivos parere docent ; alij ova, quod de Ternatensibus Balthasar Diaz scripsit. Utrumque faciliè concederem.

Antipathia Geopon. l. 9. c. 5. Inimicitias cum Aquila & Elephante gerit ; adeo ut Geoponicorum author prodiderit, non stabulari ibi Draconem ubi ster- cus aquilæ inveniretur ; auditoque alarum ejus strepitu, in antrum aufugere, Ælianus scripserit. Dimicationem cum ea ita Nican- der describit.

Arist. H. A. l. 9. c. 1. Hunc petit invisum, magni Iovis armiger hostem,

Cumque genus parat acre suis ex æthere bellum,

Pascentem in sylvis quam primum viderit illum

Quod toros ferus in nidos cum mitibus ovis Et simul ipsa terens, & vastans pignora perdit.

Non timet hoc serpens, immò quodam impete durus,

Proflitens, ipsamque Aquilam, leporemque tellurem

Extrahit ex rapidis, vi fraudeque fortior unus. Cauta malum declinat avis, sit ibi aspera pugna ;

Vt queat extortam victor sibi tollere prædam,

Sed frustra elapsam, & volitantem hinc inde volucrem

Insequitur, longos sinuum contractus in orbem,

Obliquoque levans forsum sua lumina visu.

Quomodo cum Elephantibus dimicent,

Plin. H. N.

in horum historia scripsimus. Quæ de Gryphibus apud Philostratum habentur, fabulosa sunt.

Venenum habere nonnulli negant : solo in- terficere morfu. Alij ætem inhære halitu, *Venenum. Plin. H. N. l. 29. c. 4.*

cujus exemplum apud Aristotelem legitur. Tempore Philippi Regis Macedonum inaccessa ideò montis cujusdam Armeniæ via,

extinctis demum Draconibus patuit. At Gesnerus & Stumpfius venenatos probant.

Propè Niderburgum oppidum, cum se Dracones in quodam fonte abluissent, quicun-

que post ex eo bibere, alvo tumefacti moriebantur. Is qui Helvetiam à Dracone supra pagum Wilver stabulantem purgavit,

sanguine ejusdem conspersus, occubuit. Morsum dolor partis & fætor excipiunt,

vulnusque paucum fundit sanguinem. Laudat Plinius gramen ; Aëtius remedia quæ in

Plin. H. N. l. 24. c. 19. aliorum ictibus adhibentur, præscribit. Ponzello caput abscissum, pelle nudatum & impositum placet.

Circa Mores observa, vigilantes esse, & i- deò non tantum auditus exquisiti, sed & visus

Plin. H. N. l. 8. c. 27. acutissimi. Aurimicis si quas invenerint, incubare, Philostratus prodidit. Rem ali-

Plin. H. N. l. 8. c. 13. quam aggressuri ingentem sibilum edunt. Vernam nauseam lactucæ sylvestris succo

Ælian. H. A. l. 6. c. 4. adstringunt. In Æthiopia quaterni & quin- ni inter se cratium modo implexi erectis ca-

pitibus velificantes, ad meliora pabula Arabiæ, fluctibus vehuntur. Indies majorem

adipiscuntur vigorem, & ad extremam senectam perveniunt. Homines adorsuri mortiferas radices comedunt. Cicuri denique

solent. Heraclides Philosophus exarmatum habuit, qui gradienti & quiescenti canis instar adstare solebat.

Æthiopes eis vescuntur, quod vitrei sint eorum carnes coloris & maximè refrigerent. *Vfus in Ci-*

Vesputius etiam, cum extra fortunatas insu-

las navigaret, populos quosdam similibus draconi animalibus demptis alis in cibo uti vidit. Ægyptij serpentibus vescuntur, ut Ga-

lenus scripsit. Quantum ad Medicinam, com-

Galen. de mendas ad fugandas venenatas bestias adi-

Alim. fa- *Plinius :* eadem in ulceribus illatis uti- *cult. l. 1.*

tur : Cum melle commisto, inchoantes caligines sanat. Caput si gestetur, à lippitudine præservare scribit. Os ex (pina dentium dolores sedat. Reliqua nugatoria sunt. De lapide alibi agemus.

Differentiæ Draconum à magnitudine, loco, co- lore, figurâ & venefica qualitate sumi possunt. Magnitudo pro ratione natalis soli variat. Mar-

M. Paulus *Venet. l. 2.* *cap. 40.* *Philadelphus* duo quatuordecim cubitorum ex Æthiopia Alexandriam delati fuere.

Hieronymus unius XV. cubitorum meminit. Ælianus in Æthiopia XL. Octavia-

Ælian. H. N. l. 17. c. 1. nus Augustus L. cubitorum Romæ aluit, & *populo*

Ælian. H. A. l. 15. c. 21. populo ostentavit. Tempore Alexandri vi-
sus in India LXX. longus. Apolyfares LXXX.
cubitorum nutrit. Strabo, centum re-
periri, scripsit: jugeri in Macra juxta Iorda-
nem longitudine, & tam altum, ut duo equi-
tes hinc inde locati se conspiciere non pos-
sent. Taceo Posidonium qui de quodam
propè Damascum, centum quadraginta
pedum scribit: Gellius, apud quem de illo,
qui M. Attilij Reguli exercitum infestavit:
Egnatium, qui de ejusdam intestino cen-
tum viginti pedes longo prodidit. Locirati-
one sunt alij *montani* qui grandiores, & acri-
ores, cristis insigniuntur: alij *palustres*
qui tardi motus, caput vix attollunt, & cristis
carent. *Colorē* si spectes, sunt Aëtio, nigri, ru-
fi, cinerei; Nicandro ventre subviridi: Phi-
lostrato tergore nigri; Homero rubicundi:
Pausaniæ fulvi; Lucano aurati.

Lucan. Pharsal. l. 9. *Figurae* sunt variae. Sunt auctori libri de
natura rerum Draconopades, facie huma-
na, vultu venusto, reliqui corpore tortuo-
so: inter quos & ille qui primos parentes
seduxit, censetur. Sunt suisbus similes, cor-
pore graciliore, rostro validissimo, dentibus
aprinis, ut apud Aëtium legimus. Sunt in
Congo arietis magnitudine, alati, fulvi, ob-
longi rostri, crudis carnibus victitantes.
Sunt ad Gangem, si Philostrato credimus,
quorum oculi, lapidis preciosi instar, corus-
cant. Sunt apud Plinium, pedibus anserinis:
apud Thebanos cornu munitissimi, in re-
gione Carajam quidam qui tantum anteri-
ores pedes habent: alij qui pedum loco du-
abus ungulis armantur, ventre enormi, ri-
ctu amplo. Dari *Alatos* nullum dubium;
eosque membrana ab anterioribus ad po-
steriores instructos, quam in volando ex-
pandunt, dum quiescunt ad alvum colligunt.

Lucian. de Dipsadib. Iovius Hist. l. 18. Sanè tales Aristoteles in Æthiopia, Lucia-
nus in Lybia, Iovius in Georgiana, Bello-
nii qui & cadaver conditum habuit in Æ-
gypto, ponunt. Cardanus duos Lutetiae
bipedes vidit. Solinus, circa Arabiae palu-
des versari observavit. Visus & in Florida
tam exiguis alis, ut vix se à terra attollere
possit. De iisdem quoque apud Pomponi-
um Melam, Ciceronem, & Herodotum ha-
betur: qui ab Ibidibus in Ægypto perimi
addunt. De *Venenorum* differentiis habe-
re. In monte Atlante solo contactu interimere,
capite & caudâ graciles, sed ventre adeo im-
manes, ut vix sint ad rependum idonei. In
monte regni Narfingæ, qui in arboribus ver-
santur, obtuitu perimunt. Unde qui-
dam in *arbores* & *Chamodracones*
distingere.



0690 0690 0690 0690 0690 0690

TITVLVS II.

De Draconibus in specie.

CAPVT I.

De Draconibus non alatis.

ARTICVLVS I.

De Draconibus non alatis
apodibus.

PVNCTVM I.

De Basilisco.

DRacones optimè in *non alatos* & *alatos*:
illos in *apodes* & *pedatos* distingvemus. *A-*
podes sunt *Basiliscus*, *Draco Pythius*, & quidam
Exorici. *Basiliscus* Latinis *Regulus* vel quod *Nomen*.
terrori alijs Draconibus sit, vel quod dia-
dema in capite gerat, ut Festus, habet, dicitur.
Sibilo ejus reliquos terreri, & prædam
derelinquere, apud Ælianum legimus. De
scriptiones ejus variae habentur. Galenus
facit flavum, triplici apice frontis decorum. *Theriaca*
Abensina, ad flavedinem & nigredinem
vergentem, capite valde acuto, oculis admo-
dum rubentibus. Plinius XII. non amplius
digitorum magnitudine, candida in capite
maculâ, ut quodam diademate insignem.
Grevinus ex Nicandro III. palmos longum,
corpore flavo, tribus eminentijs superbum.
Alas nonnulli tribuunt, sed exiguas & absque
usu. Ille qui in Marchia, in Abbatis Zin-
nensis ditione propè Lucken Waldam in-
terfectus est, erat acuti capitis, flavi coloris,
tres palmos longus, & valde crassus, caudâ in
latus turbinata, alvo notis candidis distin-
cta, ore magno, tergore ad cyaneum ten-
dente, prout eum Encelius descripsit. Addi-
dit pastor, circa paludes divagari, ranis, fer-
pentibus & alijs animantibus vesci, vaccas
sæpè interimere, & lacte delectari. Forman-
tur & ex Raja, prout exicone videre est. Ser-
vantur in Mulsæo Bononiensi. In Cyrenaica
nasci prodidit Plinius; Africae proprium Æ-
lianus dixit.

De *Generatione* vix quicquam compertum.
Ex ovis Ibidum prodire posse, Ægyptijs cre-
ditum: ex ovo galli in lutamine sepulto Al-
berto: figurâ, gallo, caudâ exceptâ, futurum
scribit; ex ovo galli decrepiti, vulgata sen-
tentia; ex sylvestris Encelio proditum. Quid
sentiendum sit alibi dicemus. Quomodo
formari à gallo intra ovum possit, cum utero
destituatur non video. Incubasse à gallinis
posita,


Ælian. H. A. l. 2. c. 7.
Descriptio.
Galen. l. de Theriaca ad Pisonem.
Plin. H. N. l. 8. c. 21.

Encel. de re metall. l. 3. c. 54.

Ælian. H. A. l. 3. c. 31.
Generatio.


Basiliscus, siue regulus Greuini
Aldro.

Tab. XI




Ouum galli putatum Aldro.

Ouum galli natum Regii anno 1628 Aldr.




Draco Apicios Greuini
Aldro.



Hydra septiceps Ges. Aldro.



Hydra septiceps
Aldro.




Draco ex Raia effictus
Aldrou.




Draco alter ex Raia


exsiccata concinnatus . .
Aldro.



Basiliscus in solitudine Africæ viuens
Aldro.



Basiliscus ex Raia effictus prone'
Aldro. .



Antipathia posita, non diffiteor. Inimicitias gerit cum *mustela*, gallo, insectis & alijs *Serpentibus*; De *Mustela* ita Plinius. Huic tali monstro (sæpè enim enectum concupivere Reges videre) mustelarum virus exitio est; adeò naturæ nihil placuit esse sine pari. Iniiciunt eas cavernis facile cognitæ soli tabe, necant illæ simul odore, moriunturque, & naturæ pugna conficitur. Mustelis tantum vinci dixit Solinus, quas illi homines inferciunt cavernis in quibus delitescit. Vis tamen ne defuncto quidem deest. *Ælianus* galli præsentiam pertimescere dixit: ideo iterantibus per Africam comes. Mori quoque siccanentem audit, addit. De insectis Solinus. Basilisci reliquias amplo festertio Pergameni comparaverunt. Ut ædem Apellis manu insignem, nec araneæ intexerent, nec alites involarent, cadaver ejus reticulo aurea suspensum ibidem locarunt. De *Gressu* habet Plinius, nec flexu multiplici ut reliquos corpus impellere, sed celsum & erectum in medio incedere. Cum movetur, mediâ corporis parte serpere, mediâ arduum & excelsum esse, scripsit Solinus.

Venenum. Necat frutices, inquit *Plinius*, non contactos modò, verum & afflatus: exurit herbas, rumpit saxa. Talis vis malo est. Creditum quondam ex equo occiso hastâ & per eum subeunte vi, non equitem modo sed equum quoque absumptum. *Solinus* verò tradit, non hominis tantum vel aliorum animalium exitijs datum, sed terræ quoque ipsius, quam polluit & exurit, ubicunque ferale sortitur receptaculum, Denique extingvit herbas, necat arbores; ipsas etiam corrumpit auras, ita ut aëra nulla alitum impunè transvolet insectum spiritu pestilenti. Intuitu interimere, vix crederem, quis enim primus vidisset. Halitus pestilens interitus causa, qui per aerem diffusus, homini se insinuat. Ideò *Nicaner*.

Tam teter vacuas odor hinc exhalat in auras,

Atque propinquantes penetrant non segniter artus.

Lucan.
Phars. l. 9. Venenum etiam per tela currere, & manum invadere apud *Lucanum* habetur.

Dioscor. l. 6. c. 55. Morsus ex inflammatione, vulneris flavedine, & capillorum defluvio colligitur. Id *Dioscorides*, ex *Erasistrato*; hoc *Ætius* prodidit, Remedio est colubrinum lignum, quod ex insula *Zeilan* adfertur. Adhiberi ibi contra serpentem coronatum, qui *Hispanis* *Gobras* de capolo dicitur, & sine ducio Basiliscus est, *Carolus Clusius* prodidit. Animalculum etiam quod ibi cum eodem pugnat, eo sese munire observatum.

Clus. Exot. l. l. c. 44. Quidam tria Basiliscorum genera constituit, *Helyochryson*, qui quæ vidit accedit, & in-

flamat, aurei coloris; *Chrysocephalon*, capitis aurei qui quod videt perterrefacit & occidit: & *Hematiten*, sanguinei coloris, ad cuius ictu carne animal nudatur. Sed has ego fabulas esse puto. *Encelius* in *Sylvestres* & *Domesticos* distingvit. De reliquis ita ex *Cardano Ambrosio*, de *Ambrosio*. Recitat *Cardanus* quòd circulator quidam Serpentem, in macerijs cap. 2. domus dirutæ *Mediolani* inventum servabat, qui caput ovi magnitudine, & pro ratione corporis prægrande habebat, dentes in utraque mandibulâ viperinos, corpore & formâ stellioni simili. Pedes illi inerant duo, cruraque breviora: unde constabat non satis proportionatum animal à naturâ fuisse fabricatum, cum longitudini corporeæ quatuor pedes necessarij fuissent. Tales pedes erant magni: Et ungulis veluti folium muniti, cauda longitudinem totius animalis adæquabat, cujus extremitas capiti stellionis æquali erat prædita. *Cardanus* ex genere Basilisci hunc fuisse credidit: Siquidem dum stabat, gallo similis esse videbatur, nisi quod corio, & non plumis tegebatur, alique carebat. Denique in volumine de ostentis observatur icon cujusdam Basilisci in solitudinibus *Africæ* stabulantis; quæ quoniam est figura animadversione digna, diciturque animal, sibilo, halitu cæteras animantes necare herbasque exficcare; libuit ante legentium oculos talem iconem repræsentare.

PUNCTVM II.

*De Exoticis, nempe Dracone
Pythio, & serpentibus
Bambæ.*

DE Dracone *Pythio* pauca occurrunt. Putatur ita dictus, quod post *Deucalionis* diluvium ex putredine terræ natus fuisset. *Suidas* *Delphinem* etiam fuisse dictum restatur, quod ex *Apollonij Argonauticis* habet. Ratio nominis à *Delphici* oraculi cultodia sumpta est. Dicitur habuisse os triplicidentium ordine armatum, oculos magnos, & visum acutum, magna sub mento palearia, & corpus ex flavo rutilans. Fuere tamen & virides & cærulei, ut apud *Statium* videre *Stat. Theb.* est; *Cyanei*, quod *Claudianus* reliquit. *E. l. c.* minentibus fulgidis & duris squamis tegebatur. Iconem ex *Grevino* damus. Ex terra post *Deucalionis* diluvium genitum *Poëtæ* fabulati sunt. Ideò *Deucalionæus* dicebatur. De *serpentibus Bambæ* ita *Nierembg.* *Nierembg.* *Serpentes* sunt magnitudinis horrendæ, si conferantur cum nostratibus, & præcipuè *palustres*, quorum aliqui longitudine 25. & in latitudine 5. *pitthamas* excedunt, ventre tam capaci, ut totum cervum,

aut aliud ejus magnitudinis animal unâ vice devorent. Ex aquis egrediuntur & paſti cō redeunt; unde & ab incolis *magna natrix* appellatur. Ascendunt quavis altiffimas arbores, in quibus vagabunda animalia, quafi è ſpecula contuentur: & ubi ea viſtum quærentia acceſſerunt, ſummâ vi ſe in ea demittunt, atque ita & morſu, & mole occiſa, in ſolitudinem aliquam vicinam tracta, tota cum pelle offibus & carnibus deglutiunt. Et ſapius etiam accidit, ut cibo nimium repleti, quafi ebrii reddantur, & in ſomnum maximum incidunt; ita ut puer etiam illos occidat; durat hæc ſatietas ac ſomnolentia per quinque aut ſex dies continuos, poſt quos demum experrecti, ad conſuetas ſuas venationes redeunt. Pellem ſtatim temporibus mutant. Aliquando etiam nimîa dilatione ex cibo nimio rugoſam antea tempus exuunt, quæ inuenta, homines in admirationem, & bellæ magnitudinem inde cognofcentes; rapit. Magni ejus carnes toſtas faciunt Æthiopes, & gallinarum habentur multum delicioſiores, ſed vix eas adipiſci poſſunt, niſi cum aliquando nimio calore incenduntur ſylvæ, & tum omnes, quæ à ſuis lacubus, aliquando fuerunt remota, ſemitofæ inveniuntur, & in magnis habentur delicijs. Viperæ præterea inveniuntur ibi adeo venenatæ, ut morſi ab ijs, poſt 24. horas ſummo cum dolore moriantur. Incolæ itaque diligenter ſe muniunt herbâ, quam ejus antidotum eſſe norunt.

Idem de illis & Iaricus prodiit. Quod autem addit, eſſe quoddam genus, in cauda rotundam lagenulam, quæ dum ſe movet, ſtrepitum edit habens, ad illum quem Teuhtlacacahuqui vocari diximus, referendum eſt.

PUNCTVM III.

De Bitin, & ſerpentibus Senegæ.

Nieremb.
H.E. l. 12.
cap. 18.

AD Exoticos quoque ſpectant *Bitin* & *Serpentes Senegæ*, Incolamontanorum locorum *Bitin* eſt, aſpectu ſerpens terrifico, nigris punctis, rubeis ac candidis, vitulino capite, amplâ fronte aduſque oculos, qui nigri ſunt lucidique, ſed virenti circumdati iride, riçtu oris magno, munito multis & acutis dentibus, caninis quaternis, digitum prolixis, ſeſe mutuo invicem excipientibus, quatuor ulnarum longitudine & craſſitudine hominis. Conſcendit arbores, unde ſe vibrat appenſus caudâ: Rapit boves & apros, & alia hujus generis animalia, devorans ea quandoque integra, ex hoc venatu vivens. Amat inſulam Cubu, viſuſque eſt in Inſulâ Lutaî à militibus Hiſpanis, cum vellent na-

ves exonerare. De *Serpentibus Senegæ* ſuperius diximus.

ARTICVLVS II.

De Draconibus non alatis pedatis.

PUNCTVM I.

De Hydra.

DRacones non alati pedati, ſunt *Hydra* Nomen. & *Draco bipes Bononiensis*. *Hydra* nomen *Plautus* in *apud* *Idolos* accepit. *Virgilius* belluam *Lernæ* *Perſeo*. à lacu *Lernæo*, in quo à *Hercule* interfecta *Eurip.* in dicitur: *Plautus* *Excedram*, ſeu ut *Iſidorus* *Hercule* *Excedram*, quod uno capite detruncato, duo *furente*. vel tria excreſcerent vocavit. *Euripides* *χύνει* dixit.

Plurium capitum eſſe, Poetæ fabulantur. *Descriptio.* *Εννεακέφαλον* *Alcæus*, *Πενήκοντακέφαλον*, *Simonides*. Unum habere *Pausanias* prodidit, quod veriſimile: magnitudinē à reliquis hydrys diſcerni. Quorum *Icones* appoſuimus, arti ortum debent. *Una* viſa *Venetijs* in theſauro Principis, incredibilis ob raritatem pretij, ut *Gesnerus* ex amico accepit, ſepticeps. *Alter* eſt *Equitis* de *Corneto*. Allatam *A. C. 1530.* menſe *Januario*, *Venetias* ex *Turcia* totidem capitum, *Regique Gallorum* oblatam, icon teſtis eſt. Viſa ibidem non multis ab hinc annis *bipes*, ſex ungvibus armata, ut *Ambroſinus* reliquit. Lato valdè corpori, ſeptem artificio ſingula *Ambroſ.* ri formata capita, annexa erant. *Cardani* *Hiſt. ſerpēt.* illa, quam *Meona Piſanus* ſiçtitiâ ſeçtione *l. 2. c. 4.* comperit; medium Caput longius & craſſius *Cardan.* gerebat, viperar. omnia æmulabatur. *Oculi* *de ſubr. l. 9.* poſt aures, hiatus maximus, dētes canini; lingualati, Colla maculoſa erant. Cauda toto corpore dimidio longior; pedes ungvibus parvis armati. Magnitudine cuniculum æquabat. Color ſub ventre candidus, circa dorſum flavus, ſeu viridi dilutus.

Apud inferos ſtabulari Poetæ dixerunt, *Virgil.* *Æneid. l. 6.* *Pausan.* quadam ad fontem *Amymone* altam ſcribit. In lacu *Lernæo* *Argivis* & *Mycenis* contermino vixiſſe, vulgaris eſt opinio.

Hefiodus *Echidnæ* ex *Typhone* filiam fecit. Ex ſordibus in *Lernam* conjeçtis, ibidemque putreſcentibus, extitiſſe veriſimile eſt.

Vel ipſo aſſlatu exitium attuliſſe, multi *Venenum.* tradiderunt: ſanguine infecta *Herculis*, qui eam ſuperavit tela, exitialia fuiſſe, paſſim apud Poetas occurrit. Toxicum veterum, quod quidam napellum, alijs taxum, nonnulli *venenum Scythicum* eſſe volunt, non facile dixerim. Linguam, ſi in illud incurras, inflammat, tuſſim ſiccam, phrenitidem, & tremo-

Locus.

Virgil. *Æneid. l. 6.*

Pausan.

Corinth.

l. 2.

Ortus.

*Draco bipes apteros captus in
Agro Bononiensi .*



*Draco alatus Apes
ex Greuino Aldro .*




figura ex Pareo .



Draco Æthiopicus





tremorem cordis excitat. Cutis adusta quasi, Corij flamme admoti instar, facile rumpitur. Ager in ululatus & vociferationes solvitur, quas strictum in se videns enssem excitare consuevit. Remedium à Colocasia, panace Asclepio, Carne inprimis cydoniorum, & sanguine hircino, quod apud Dioscoridem habemus, petitur.

PUNCTVM II.

De Dracone Bononiensi bipede.

DRaco hic Anno Christi 1572. 111. Idus Martij primum in loco Malavolta sibi-
lum edidit: post diem Ascensionis verò, juxta sepem apparuit, & à rustico curru & boves, qui eo viso ulterius progredi non audebat, hasta ictus & interfectus est.

Descriptionem ejus, verbis *Ambrosini* apponam. Admirabilis hic Draco, inquit, ille, à capite ad extremitatem usque caudæ erat duorum cubitorum: ab ore ad initium usque latitudinis corporeæ dodrans inter corporis latitudinem & caudæ principium observatur. Deinde ad extremitatem usque caudæ longitudo cubitalis, nempe duorum dodrantum, hujusmodi partem adæquabat. Propè collum erat latitudinis duorum digitorum, & à capite ad primum usque & anteriorem pedem dodrantalis longitudinis & à primo pede ad eam usque partem, vipere assimilabatur. Et corpus in eâ parte latitudinis sesquipalmaris, nimirum sex digitorum visebatur. Posteriorem colli partem torques albus exornabat, ad instar Natricis torquæ, vel instar Anatis sylvestris torquæ, quæ Italis vulgò *Cesone* nuncupatur, vel tandè instar merulæ alpestris torquæ, quæ vulgò *Merla della collana* cognominabatur. Cæterum in hoc dracone torques non erat mutilus, ut in multis alijs animantibus observatur, sed absoluti circuli torquem integrabant. Supra dorsum squamæ latæ apparebant, æmulantes squamas Cyprini piscis Aristotelis, qui vulgò *Raina* appellatur. Major pars harum squamarum ad viriditatem tendebat: imò aliquæ erant subrubræ, sed inter has quædam nigrescebant: hinc deprehensum est hoc animal ad genus Draconum referendum esse: Propterea quod Dracones, ut plurimum, virides effigiari soleant. Pars alvi Draconem propriè representans squamis viridibus erat exornata. Si pedes contemplerur. Primum advertendum est, quod femur junctum tibiæ erat latitudinis pollicis; & digiti suis articulationibus connectebantur ut in lacertorum digitis observatur. Digiti tamè non erant quini, ut in lacertis, sed tantum quatuor brevibus unguibus ar-

mati, qui adhuc eorum primordia præ se ferebant: unde Draconem juvenem esse conjectavimus: quemadmodum etiam ex dentibus dignosci poterat. Præterea altitudo pedum latitudinem corporis adæquabat. Immo magnâ admiratione tenebamur, quòd pedes ex opposito juncti non essent: veluti in cæteris animalibus quadrupedibus, & in alijs exanguibus multipedibus observamus: sed pedum unus erat anterior altero, distantia sex digitorum, neque in eodem latere; immo per Diametrum erant oppositi: ut facilius fortè corpus movere posset: propterea quòd mediâ pars corporis motu progressivo impellebatur, reliquæ autem partes, nempe colli, & caudæ per lubricos fluxus ritu serpentinò movebantur. Podex ab extremitate caudæ duabus distabat palmis, pars caudæ superior viperæ erat similis, inferior vero dissimilis: siquidem squamæ partim nigræ, partim virides erant, hoc tamen ordine, & figura, ut quasi singulæ formam semicircularem referrent, & binæ tantum latitudinem caudæ amplectebantur. Secus verò in vipera se habent, quoniam squamæ rectæ sunt per totam corporis partem inferiorem. In hoc autem Dracone à podice ad caput usque squamæ inferiores, tam residuæ caudæ, quam ventris, & totius colli ad os usque rectæ erant, ut in vipera, hoc tamen ordine, ut imbricatim sitæ essent, colore usque ad alvum partim albo, partim nigro, sub ventre albæ, & latiores dimidio ferè digito. At in extremitate squamarum rectarum non nihil coloris viridis conspiciebatur. Demum extremitas caudæ durissimo, & corneo ferè apice munita erat, cujus una pars squamulis tegebatur, & extremitas apicis nigerrima, & aculeus instar literæ C. seu instar Centri scorpionis, erat repandus. Quamobrem verisimile fuit, hoc animal hujusmodi aculeo, pro tutela adversus cætera animantia uti. Cæterum, ut melius forma hujus draconis intelligatur, denuò singulas partes considerabimus. Caput erat admodum simile viperino, pars capitis superior juxta extremitatem, erat nigra, novem nigris squamis integrata, reliqua autem pars squamis majoribus leucophæis trigonam figuram æmulantibus. Oris hiatus longitudo erat duorum digitorum: lingua tenuis, longa & bifida, more aliorum serpentum conspiciebatur. Singula oris latera dentes ferrati, & graciles armabant, anterioribus tamen in vipera observatis carebat. Hinc colligimus hoc animal non valde fuisse venenosum. Oculos in comparatione ad molem corpoream magnos habebat, & aurei coloris: quare draconem hunc solaris naturæ fuisse judicavimus. Foramina aurium, ritu aviū, habebat; deinde auriculis carebat, quāvis in Helvetijs Anno 99. supra millesimum & quadringentesi-

*Ambros.
Hist. Ser-
pent. l. 2.
cap. 5.*

tesimum Draco auribus longissimis præditus fuerit inventus. Idcirco ad monstrum in genere serpentum reducendum fuisse putavimus.

CAPVT II.

De Draconibus alatis.

DRacones alatos dari negat Ammianus, comprobatur experientia. Dari in Æthiopia certum. Visus & in agro Piltoniensi squamosus, bipes, dentibus magnis, auribus urfi instar pilosis; cuius alæ, cubitum longæ & latæ, multis intertexebantur nervis. Sirenes Æthiopibus dari Isidorus auctor est. Descripsit & Scaliger longitudine pedum quatuor, crassitie brachij humani, cui alæ cartilagineæ de lateribus dependebant. Similem in agro Santonico occisum, & ad Regem Franciscum delatum, Galliam vidisse Brodæus testis est. Cardanus quoque Lutetiæ tam diligenter exsiccatos, ut vivi viderentur, bipedes, alis exiguis, capite serpentino, colore lurido, pilis nullis, cuniculi magnitudine vidit. Ex India allatæ dicebantur. Bellonius integra eorundem Variet. rer. cadavera, diligenter condita se vidisse dicit; & quidem de eorundem genere, qui ex


Arabia in Ægyptum advolant. Crassi hi circa alvum, bipedes, alis vespertilionum, & anguinâ caudâ instructi. Respondit eis icon quam Gabriel Barbarus Aldrovando cōmunicavit; & Æthiopicus exsiccatu Draco, quem à Francisco Cetenſi accepit; tubercula quinque in dorso prominentia si excipias, Squammæ virides, & subnigricantes erant; pedes bini, ungue armati; auriculæ totidem, alæ ad volandum factæ; Os dentibus acutis instructum; nares binæ; pars capitis inferior versus auriculas plana; Oculi pupilla cum circulo semiluteo nigra; Cauda longa, flexuosa, subluteis squammis tecta. Nos hic quatuor icones exhibemus; quarum prior est ex Grevino; altera ex Pareo; reliquæ duæ Æthiopicos expriment, unum sine eminentijs in dorso; alterum cum eminentijs, quarum modò mentionem fecimus. Reperiuntur in Arabia, & si Herodoto fides, circa arbores thuriferas, si Plinio, circa Cassiæ. Inde in Ægyptum avolant & ab ibidibus consumuntur. Cicero Lybia discedere scripsit. In antris plerumque degunt. Cum aquila & elephanto dimicare, Plinius auctor est. Et tantum de Serpentibus & Draconibus. Si quæ interim occurrent, vel in Paralipomenis, vel in editione iterata, reponentur, volente Deo, cui laus, honor & gloria, in sempiterna secula

Amen.

Cicero l. 1.
de Nat.
Deorum.
Pli. H. N.
l. 8.

Brodæus
Miscell. l. 3.
cap. 1.

Cardan. de
Variet. rer.
l. 7. c. 29.





INDEX

IN HISTORIAM NATURALEM

de SERPENTIBUS JOANNIS JONSTONI Med.

Doctoris: prior numerus Historicae descriptionis locum
exhibet, posterior Tabulam Iconismi demonstrat.

A.

A Contias, Angelschlang / Nomen, Descriptio,
Locus, Venenum, Natura, Differentia,
Vfus. pag. 23. Tab. 4.

Aguafen. p. 18.

Ahucyatli. p. 16.

Ammodytes, Nomen, Descriptio, Locus, Vene-
num, Remedia. p. 14. t. 1.

Amphisbæna, Nomen, Descriptio, Locus, Natu-
ra, Venenum, Differentia, Vfus. p. 21. t. 5.

Anguis Angioleta Neap. p. 26.

Æsculapii, Nomen, Descriptio, Locus,
Natura, Vfus, Differentia. p. 25. t. 5.

Bisognola Bononiens. p. 26.

Caprimulgus. p. 32.

Cerveri. p. 25.

Cervonis. p. 25.

Apochycoatl. p. 29.

Argoli. p. 30.

Aspis, Nomen, Descriptio, Locus, Sympathia &
Antipathia, Natura. p. 18. t. 3. Venenum, Vfus.
p. 19.

B.

Basiliscus, Nomen, Generatio, Venenum, Diffe-
rentia. pag. 36. 37. tab. II.

In solitudinibus Africæ. p. 37. t. 12.

è Raja effectus prone & supine pi-
ctus. t. 12.

Bitin. p. 38.

Boa. p. 32.

Bodty. p. 22.

Boicininga. p. 26. t. 6.

Boicinininga. p. 26. t. 6.

Boiquira. p. 26. t. 6.

Boiguacu. p. 27. t. 6.

Bojobi Brasil. p. 29.

Boitiapo. p. 29.

Boquatrara. p. 34.

Bor obi. p. 28.

C.

Caninana. p. 29.

Cascavela Lusit. p. 26.

Cacilia Blindschleich / Nomen, Descriptio, Na-
tura, Vfus, Differentia. p. 22. t. 4.

Cega Lusit. p. 22.

Cenchrus, Nomen, Descriptio, Natura, Vfus,
Differentia. p. 22. t. 4.

Cerastes, Gehörnichte Schlang / Nomen, De-
scriptio, Locus, Natura, Venenum, Differentia.
p. 15. t. 2.

Cefonc. p. 39.

Cherlydrus. p. 22. 23. t. 8.

Cobra de Cipo Lus. p. 29.

Cobra de Coral. p. 27.

Cobra de Vcado. p. 27.

Cobre Verde. p. 29.

Cuilcahuilia. p. 28.

Cumcoatl. p. 30.

Curucucu. p. 16.

D.

Decurtati. p. 23.

Diplas, Nomen, Descriptio, Locus, Venenum, Dif-
ferentia. p. 20. t. 3.

Domina Serpentum Nieremb. p. 26. t. 7.

Draco, Nomen, Descriptio, Locus, Vicius, Genera-
tio. p. 34. Antipathia, Venenum, Mores, Vfus in
Cibus, Differentia. p. 35. t. 10. II.

æthiopicus. p. 40. t. 10.

bipes Bononiensis. p. 39. t. 10.

Pythius. p. 37. t. II.

ex Raja effectus Aldr. t. 12.

alter ex Raja exiccata Aldr. t. 12.

Dryinus, Stinckschlang / Nomen, Descriptio,
Venenum. p. 24. t. 5.

E.

Excedra Isidori. p. 38.

Excetra Plauti. p. 38.

Elaps, seu Elops, Elaphis, Nomen, p. 24. t. 5. De-
scriptio. p. 25.

H.

Hæmorrhous, Nomen, Descriptio. p. 15. t. 2. Lo-
cus, Natura, Venenum, Differentia. p. 16.

Hoacoati Mexic. p. 27.

Hyæna Eliani. p. 30.

Hydra, Nomen, Descriptio, Locus, Venenum, Or-
tus. p. 38. c. II.

Hydrus marinus, p. 33. c. 8.


L

Hy-

INDEX.

- Hydrus, *Nomen, Descriptio*, p.30, *Locus, Victus, Natura, Vfus*, p.31. t.8. *Differentia*, p.32.
Hypnalis. p.18.
- I.
- Ibiboboca Braf. p.27. t.6.
Ibyara Marcgr. p.21. t.3.
Illicinus. p.24.
Iraraca. p.29. t.6.
- K.
- Kokob. p.16.
- L.
- Laphiati. p.25.
- M.
- Maquizcoatl. p.21.
Maripeti angues. p.34.
Mater formicarum. p.28. t.7.
Mergoli. p.30.
Miliaris. p.22.
- N.
- Natrices magnæ. p.38.
Natrix. p.30.
 Torquata. p.32. t.8.
 Rubetaria, *Nomen, Descriptio, Natura*, p.32. t.8.
- P.
- Padalica Polon. p.32.
Polpoch. p.23.
- Q.
- Querculus. p.24.
- R.
- Raetelschlang. p.26.
- S.
- Scolopendra marina. p.33. t.9.
 amethystini coloris. p.34. t.9.
- Scytale, *Nomen, Descriptio, Natura*, p.20. t.4.
Seps, *Nomen, Descriptio, Locus, Venenum, Differentia*, p.17. t.2. & 3.
Serpentes in genere, *Nomen, Descriptio*, p.4.
 Locus, p.5. *Victus, Generatio*, p.6. *Sympathia*, p.7. *Natura & mores, Venenum*, p.8. *Vfus*, p.9. *Differentia*, p.9.
Serpens alatus. p.29.
 americanus Indicus. p.34. t.9.
 biceps. t.1.
 mansuetus. p.29.
 mari Norwegico familiaris. p.33. t.9.
 Suetico. p.33. t.9.
 marinus. p.33. t.9.
Serpentes aquatici. p.30.
 Bamba. p.37.
 exotici. p.26. t.9.
 Senegæ. p.38.
 Terrestres. p.10.
 Veterum. p.30.
- Situla. p.19.
- T.
- Tangedor Lust. p.26.
Tetrauchcoatl. p.29.
Teutlacocauhqui Mexic. p.26.
Texmineni. p.23.
Tezauhcoatl. p.21.
Tleoa. p.30.
Trinhuitili. p.30.
- V.
- Vipera, *Nomen*, p.10. t.1. *Descriptio*, p.10. *Locus, Victus*, p.11. *Temperamentum, Generatio, Antipathia, Venenum, Remedia*, p.12. *Vfus*, p.13.
Vipera Chiappæ. p.14.

F I N I S.



ADMO-

ADMONITIO ad Bibliopegum quo quævis
Tabula suo fit loco inferenda.

<i>TABVLA</i>	<i>I.</i>	<i>pag.</i>	<i>10.</i>
	<i>II.</i>	<i>p.</i>	<i>15.</i>
	<i>III.</i>	<i>p.</i>	<i>17.</i>
	<i>IV.</i>	<i>p.</i>	<i>20.</i>
	<i>V.</i>	<i>p.</i>	<i>24.</i>
	<i>VI.</i>	<i>p.</i>	<i>26.</i>
	<i>VII.</i>	<i>p.</i>	<i>26.</i>
	<i>VIII.</i>	<i>p.</i>	<i>30.</i>
	<i>IX.</i>	<i>p.</i>	<i>33.</i>
	<i>X.</i>	<i>p.</i>	<i>39.</i>
	<i>XI.</i>	<i>p.</i>	<i>36.</i>
	<i>XII.</i>	<i>p.</i>	<i>37.</i>

2 E3

of 1000

M.H.

H - TO - O

K

1/3

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01690 0888